This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

+ *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.

+ *Ne pas procéder à des requêtes automatisées* N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.

+ *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.

+ *Rester dans la légalité* Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse `http://books.google.com`

VERSITY OF MICHIGAN
9015 06829 7954
Filmed by Pres
Filmed by


1837
ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
SI QUAERIS PENINSULAM AMOENAM
CIRCUMSPICE
HOMOEOPATHIC
LIBRARY

H615.11
P545
I9

Pharmacopoea universalis,

oder

Uebersicht der Pharmacopöen

von

Amsterdam, Antwerpen, Dublin, Edinburgh, Ferrara, Genf, London, Oldenburg, Würzburg; deren America's, Dänemark's, Finnland's, Frankreich's, Hannover's, Hessen's, Holland's, der Niederlande, Oesterreich's, Polen's, Portugal's, Preußen's, Rußland's, Sachsen's, Sardinien's, Schweden's, Spanien's, Würtemberg's;

der Dispensatorien

von Braunschweig, Fulda, Hessen, Lippe und der Pfalz;

der Militärpharmacopöen

Dänemark's, Frankreich's, Preußen's, Rußland's und von Würzburg;

der Armenpharmacopöe

von Hamburg;

der Formularien und Pharmacopöen

Augustin's, Bories's, Brera's, Brugnatelli's, Cadet de Gassicourt's, Cox's, Ellis's, Ferrarini's, Hufeland's, Magendie's, Piderit's, Pierquin's, Ratier's, Saunders's, Sainte-Marie's, Spielmann's, Swediaur's, Taddei's und van Mons's.

Nach

der Pharmacopée universelle des A. J. L. Jourdan,

mit Zusätzen.

Morbos autem non eloquentia sed remediis curari.

Celsus.

Zweiter Band, I bis Z.

Weimar,

im Verlage des Großh. Sächs. pr. Landes-Industrie-Comptoirs.

1830.

Erklärung der Abkürzungen.

Pharmacopöen und Dispensatorien.

A. Pharmacopoea Austriaca. Vindobonae 1820 in 8.
Am. The Pharmacopoeia of the United States of America. Boston 1820 in 8.
Ams. Pharmacopoea Amstelodamensis nova. Amstelod. 1792 in 4.
An. Pharmacopoea manualis. Anvers 1812 in 8.
B. Pharmacopoea Batava. Amstelod. 1805 in 4.
B*. Zusätze von Riemann. (Lips. 1811 2 vol. 4.)
Ba. Pharmacopoea Bavarica. Monachii 1822 in 8.
Bel. Pharmacopoea Belgica. Hagae 1823 in 4.
Bor. Pharmacopoea Borussica, Berolin. 1813 ed. 3.
Bor4. Edit. 4., mit der Bearb. von Duft. Leipz. 1828. in 4.
BorC. Pharmacopoea castrensis Borussica. Regiomonti. 1823 in 8. ed. 4.
Br. Dispensatorium pharmaceuticum Brunsvicense. Brunsv. 1777 in 4.
D. Pharmacopoea Danica. Hafniae 1803 in 4.
DD. Pharmacop. militaris Danica. Hafn. 1818 in 12
Du. Pharmacopoea Dublinensis 1807 in 8.
Ed. Pharmacopoea Edinburgensis. Edinb. 1813 in 8.
Fenn. Pharmacopoea Fennica. Aboae 1819 in 8.
Fer. Farmacopea Ferrarense. Padova 1825 in 18 rd. 10.
Ful. Dispens. Fuldense. Franc. ad M. 1791 8 ed. 3.
Gal. Codex medicamentarius sive Pharmacopoea Gallica. Paris 1818 in 4.
GalF. Ausgabe von Fée. Paris 1826 in 8.
GalH. Ausgabe von Ratier und Henry. Paris 1828 in 8.
GalM. Formulaire pharmaceutique à l'usage des hôpitaux militaires de France. Paris 1811 in 8.
Gen. Pharmacopoea Genevensis. Genev. 1780 in 8.
Hamb. Pharmacopoea pauperum in usum instituti clinici Hamburgensis. Hamb. 1804 in 8. ed. 3.
Han. Pharmacopoea hannoverana. Hannov. 1819 in 8.
Hass. Dispensatorium electorale Hassiacum. Marburg. 1806 in 8. und
HassP. Pharmacopoea Hassiae electoralis. Casselis 1827.
His. Pharmacopoea Hispanica. Madrid 1798 in 8.
Lip. Dispensatorium lippiacum genio moderno accommodatum. Lemgoae 1792—1794 2 vol. in 8.
Lon. u. LonN. (nova edit.) Pharmacopoea Londinensis. Lond. 1815 in 8. und 1824 in 8.
Lus. Pharmacopoea Lusitanic. Lissab. 1711 in fol.
O. Pharmacopoea Oldenburgica. Oldenb. 1801 in 8.
Pal. Dispensatorium medico-pharmaceuticum Palatinatus. Mannh. 1764 in fol.
Pol. Pharmacopoea regni Poloniae. Varsov. 1817 in 8.
R. Pharmacopoea Rossica. Petrop. 1803 in 8.
RC. Pharmacopoea castrensis Ruthena auct. J. Wylie. Petropol. 1808. in 8.
Sar. Pharmacopoea Sardoa. Turin 1773. in 4.
Sax. Pharmacopoea Saxonica. Dresd. 1820. in 8.
Suec. Pharmacopoea Suecica. Stock. 1817 in 4. ed. 5.
Wir. Pharmacopoea Wirtembergica. Stuttg. 1798 in fol. ed 6.
Würr. Pharmacopoea Herbipolitana. Würceb. 1796 in 8. ed. 2.
WW. Pharmacopoea in usum nosocomii militaris Wurceburgensis. Wurceb. 1815 in 4.
A. Ainslie Materia indica etc. Lond. 1826 2 voll. in 8.
Au. Augustin Pharmacopoea extemporanea etc. Berol. 1822 in 18. ed. 2.
B. Brera Ricettario clinico. Padov. 1825 in 8. ed. 3.
Be. Bergius Materia medica etc. Stockh. 1782. 2 voll. in 8.
Bo. Bories Formulaire de Montpellier. Montp. 1822 in 12.
Br. Brugnatelli Pharmacopée générale etc. Paris 1811 2 voll. in 8. ed. Panche.
Br. Zusätze Pfaff's.
C. Cox The american dispensatory etc. Philadelphia. 1825 in 8.
Ca. Cadet-de-Gassicourt Formulaire magistral etc. Paris 1823 in 18. ed. 5.
D. Ellis The medical formulary etc. Philadelphia 1826 in 8.
Fr. Ferrarini Farmacopea. Bologna 1825. in 4.
G. Guibourt Histoire abrégée des drogues simples. Paris 1826 2 voll. in 8. ed. 2.
Huf. Hufeland Arzneipharmacopoe. Berl. 1825 in 8. ed. 4.
M. Murray et Gmelin. Apparatus medicaminum etc. Götting. 1776—1796 8 vol. in 8.
Ma. Magendie Formulaire. Paris 1827 in 12. ed. 6.
Par. Paris Pharmacologie. Lond. 1825 2 voll. in 8. ed. 6.
ParC. Dispensaire des bureaux de Charité de Paris. Paris 1819 in 8.
Pid. Piderit Pharmacia rationalis. Gerlach 1806 in 8.
Pie. Pierquin Mémorial pharmaceutique. Montpell. 1824 in 32.
Ra. Ratier Formulaire pratique des hôpitaux civils de Paris. Paris 1827 in 18 ed. 3.
Sa. Saunders Pharmacopoea in usum studiosorum. Lips. 1790 in 8.
Sm. Sainte-Marie Nouveau formulaire médical et pharmaceutique. Paris et Lyon 1820 in 8.
Sp. Spielmann Pharmacopoea generalis. Argentor. 1783 in 4.
Sw. Swediaur Pharmacopoea medici practici universalis. Bruss. 1817. 3 voll. in 12 ed. *van Mons.*
Sw. Zusätze von van Mons.
Sy. Pharmacopoea syphilitica (von *Swediaur.*) Paris 1799 in 12.
T. Taddei Farmacopea generale. Firenze 1826.
Vm. Van Mons Pharmacopée usuelle, théorique et pratique. Louvain 1821 2 voll. in 8.
Z. Zarda Pharmaca vegetabilia juxta pharmacopoeam austriaco-provincialem sistens. Pragae 1778 in 8.

219936

Namen von Schriftstellern.

A. St. H. August St. Hilaire.
Ach. Acharius.
Ait. Aiton.
All. Allioni.
Alp. Alpini.
Aub. Aublet.
B. Beudant.
Bart. Barton.
Be. Berzelius.
Beauv. Palisot de Beauvois.
Big. Bigelow.
Bl. Blainville.
Blackw. Blackwell.
Bon. Bonpland.
Br. Brown.
Brongn. Brongniart.
Brug. Bruguière.
Burm. Burmann.
Cand. Decandolle.
Cass. Cassini.
Cat. Catesby.
Cav. Cavanilles.
Clus. l'Écluse.
Col. Colebrooke.
Coll. Colladon.
Comm. Commelin.
Curt. Curtis.
Cuv. Cuvier.
Dand. Daudin.
Del. Delile.
Dela. Delaunay.
Desc. Descourtils.
Desf. Desfontaines.
Dill. Dillen.
Dod. Dodoens.
Dryand. Dryander.
Duh. Duhamel.
Dum. Duméril.
Esp. Esper.
Fab. Fabricius.
Fer. Férussac.
Feuill. Feuillée.
Forsk. Forskal.
Forst. Forster.
Gaert. Gaertner.
Garid. Garidel.
Gled. Gleditsch.
Gmel. Gmelin.
Gom. Gomes.
Gualt. Gualtieri.
H. Haüy.
Herm. Hermann.
Hern. Hernandez.
Hum. Humboldt.
J. Jussieu.
Jacq. Jacquin.
K. Kunth.
Kn. Knorr.
Kniph. Kniphoff.
L. Linné.
Lab. Labillardière.
Lac. Lacépède.
Lat. Latreille.
Latour. Latourette.
Lf. Linné filius.
L'Hér. L'Héritier.
Lmk. Lamarck.
Lmx. Lamouroux.
Lob. Lobel.
Lois. Loiseleur-Deslongchamps.
Lyngb. Lyngbye.
Mart. Martyn.
Mat. Maton.
Mér. Mérat.
Merr. Merrem.
Mich. Michaux.
Michel. Micheli.
Mill. Miller.
Moe. Moench.
Mor. Morison.
Murr. Murray.
Mut. Mutis.
Oed. Oeder.
Ol. Olivier.
Pall. Pallas.
Panz. Panzer.
Pers. Persoon.
Pluk. Plukenet.
Plum. Plumier.
Poir. Poiret.
Pu. Pursh.
Purm. Purmann.
Rauw. Rauwolf.
Réaum. Réaumur.
Red. Redouté.
Regn. Regnault.
Re. Retzius.
Rich. Richard.
Rivin. Rivinus.
Roem. et *Schult.* Roemer et Schultes.
Roes. Roesel.
Ro. Roth.
Rottb. Rottboell.
Roxb. Roxburgh.
Ru. et *Pav.* Ruiz et Pavon.
Rumph. Rumphius.
Sal. Salisbury.
Schaeff. Schaeffer.
Scheuch. Scheuchzer.
Schk. Schkuhr.
Schn. Schneider.
Schrad. Schrader.
Schreb. Schreber.
Scop. Scopoli.
Ser. Seringe.
Sl. Sloane.
Sm. Smith.
Sonn. Sonnerat.
Spr. Sprengel.
Sw. Swarz.
Thunb. Thunberg.
Vaill. Vaillant.
Vand. Vandelli.
Vauch. Vaucher.
Vent. Ventenat.
Willd. Willdenow.
Wr. Wright.
Zann. Zannichelli.

Völkernamen.

Ang. Englisch.
Ar. Arabisch.
Arm. Armenisch.
Ba. Bali.
Be. oder *Beng.* Bengalisch.
Bel. Holländisch.
B. Böhmisch.
Br. Brasilisch.
Cal. Kalmückisch.
Ce. Celebes.
C. Chinesisch.
Co. Cochinchinesisch.
Cy. Cyngalesisch.
D. Dänisch.
Dah. Dahomesisch.
Eg. Egyptisch.
Gr. Mod. Neugriechisch.
Gua. Guzurate.
Heb. Hebräisch.
Hin. Hindnisch.
His. Spanisch.
Hu. Ungarisch.
Ir. Irokesisch.
I. Italienisch.
J. Japanisch.
Ja. Javanisch.
Lus. Portugiesisch.
Ma. Mandschu.
Mal. Malaiisch.
Malab. Malabarisch.
Mar. Maratisch.
Me. Mexicanisch.
Mo. Mongolisch.
Mos. Mozambique.
N. Nepaul.
Pe. Persisch.
Pol. Polnisch.
R. Russisch.
Sa. Sanskrit.
Si. Sicilisch.
Suec. Schwedisch.
Syr. Syrisch.
Ta. Tartarisch.
Th. Thibetanisch.
Te. Tellingu.
Tam. Tamulisch.
Tur. Türkisch.
Tern. Ternate.

I.

Ilex.

Ilex vomitoria, Ait.; Brechhülsen, Apalachine; Apalachina, Thé de la mer du Sud (*Gal.*).

Br. Gal. Wir. *C. Sp.*

♃ (Tetrandria Tetragynia, L.; Rhamneae, *J.*) Eine Pflanze Florida's. (Hort. Kew. I. p. 170.)

Die Blätter, welche man anwendet, sind elliptisch oder lanzettig, stumpf, sägezähnig, glatt und glänzend.

Ein sehr kräftiges Brech- und harntreibendes Mittel.

Imperatoria.

Imperatoria Ostruthium, L.; Meisterwurz, Kaiserwurzel, Ostranz; Imperatoire (*Gal.*); Master wort (*Ang.*); Wssedobr (*B.*); Mesterurt (*D.*); Imperatoria (*His. Lus.*); Imperatoria, Erba rena (*I.*); Mesterwortel (*Bel.*); Maesterrot (*Suec.*).

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. Fer. Ful. Gal. Gen. Han. HassP. His. Li. R. Sax. Suec. Wir. Wür. *Be. Br. Fi. G. M. Pid. Sp.* Z.

♃ (Pentandria Digynia, L.; Umbelliferae, *J.*) Eine im gemäßigten Europa wachsende Pflanze. (*Blackw.* t. 279. *Schk.* t. 74. *Plenck* t. 211. *Hayne* VII. t. 15. Fl. méd. IV. 200.)

Man wendet die Wurzel (radix Imperatoriae s. Ostruthii s. Magistrantiae s. Astrantiae) an; sie ist dick, ästig, fast knollig, wie geringelt, mit langen Fasern besetzt, außen graulichbraun, inwendig weiß. Sie hat einen starken gewürzhaften Geruch und einen scharfen, bittern und unangenehmen Geschmack.

Reizend, blähungtreibend, die Ausdünstung und Speichelsecretion befördernd; Hoffmann nannte sie ein *divinum remedium*, sie hat aber keine besondern Kräfte und wird jetzt nur wenig gebraucht. — Gabe des Pulvers, zwanzig bis dreißig Gran.

Pulvis masticatorius. (*Sp.*)

℞. Radicis Imperatoriae,
Corticis Sambuci,
singulorum semunciam,
Foliorum Lauri sesquidrachmam.
Seminum Sinapis,
— Staphisagriae,
singulorum drachmam unam.
Caryophyllorum scrupulos quatuor.
Myrrhae . . . . drachmas sex.

Gabe, ein Scrupel in einen Knoten geknüpft, zum Kauen bei Sprachlosigkeit und Zungenlähmung.

Infusum Imperatoriae. (*Fi.*)

Paratur cum Radicis Imperatoriae drachma dimidia vel drachma una et Aquae bullientis unciis decem.

Indicus Color.

Pigmentum Indicum; Indigo; Indigo (*Gal.*); Nil (*Ar. Cy. Duk. Pe.*); Chamnhola (*Co.*); Tarum (*Mal.*); Anil (*Lus.*); Nili, Nilini (*Sa. Tam.*); Nilum (*Tel.*).

Br. Wir. *A. Be. G. Sp. T.*

Ein Färbestoff in kleinen, derben, brüchigen, sehr dunkelazurblauen Stücken ohne Geruch und Geschmack, welche durch Reiben einen Kupferglanz annehmen.

Man gewinnt den Indigo von Indigofera Anil (*Desc.* Fl. méd. d. Ant. t. 17. *Bert.* Bild. I. 71. f. 1.), argentea und tinctoria, *L.* (Diadelphia Decandria, *L.*; Leguminosae, *J.*), welche in Südamerica gebaut werden. Isatis tinctoria, L., liefert ihn auch, aber in geringerer Menge.

Er enthält mit mehrern andern verschiedenen Stoffen einen eigenthümlichen, den sogenannten Indigostoff, Indigotin (Indigotinum), welcher in gutem Indigo fast die Hälfte beträgt.

Die Pharmaceuten wenden ihn bisweilen, jedoch selten, an, um manchen Präparaten die Farbe zu geben. — Manche Aerzte geben ihn bei Icterus (*T.*)

Tinctura Resinae Indigo. (*Br.*)

℞. Resinae Indigo drachmam unam.
Alcoholis . . quantum sufficit.
Solutionem filtra. — Man erhält das Indigoharz durch Destillation von vier Theilen Schwefelsäure über einen Theil Indigo.

Sulphas Pigmenti Indici liquidus. (*Ma.*)

℞. Pigmenti Indici Bengalensis pulverati . . . . partem unam.

Acidi sulphurici concentrati partes sex.

Actioni calidae subjice et dilue Aquae destillatae partibus nongentis nonaginta tribus.

Diese Flüssigkeit dient zur Prüfung der Stärke alkalinisch salzsaurer Salze, durch welche sie entfärbt wird.

Inula.

In den Pharmacopöen kommen zwei Arten dieser Pflanzengattung vor:

1) *Inula dysenterica, L.*; Dürrwurz; Ruhralant; Aunée antidysenterique, Herbe de Saint-Roch (*Gal.*); Niddle seize, Fleabane (*Ang.*); Roo loops alant (*Bel.*).

Br. Gal. *M. Sp.*

4 (Syngenesia Polygamia Superflua, L.; Synanthereae, *Cass.*) Eine in Europa an feuchten Orten häufig wachsende Pflanze. (*Zorn.* Ic. pl. t. 272. *Hayne* VI. t. 46.)

Man wendet das Kraut (herba Conyzae mediae s. Arnicae spuriae s. suedensis) an; es besteht aus einem rundlichen, filzigen Stängel mit umfassenden, länglichherzförmigen, sägezähnigen, wellenförmigen, gerunzelten, etwas filzigen Blättern. Es hat keinen Geruch, aber einen scharfen, etwas gewürzhaften, adstringirenden Geschmack.

2) *Inula Helenium, L.*; Alant, Alantwurz, Alantwurzel, Brustalant, Oland, Helenenkraut; Aunée commune (*Gal.*); Elecampane (*Ang.*); Usulalrasun (*Ar.*); Women (*B.*); Oland Sanct Ellensron (*D.*); Enula campana (*His. Lus.*); Alantswortel (*Bel.*); Enula campana, Elenio (*I.*); Bekhizan jabilischami (*Pe.*); Omanowy (*Pol.*); Aland (*Suec.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. LonN. Lus. O. Pdl. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. *Be. Br. C. Fi. G. M. Pid. Sp. Z.*

4 Eine in ganz Europa wachsende Pflanze. (*Blackw.* t. 473. *Plenck* t. 624. *Hayne* VI. t. 45. Düss. off. Pfl. IV. t. 9. Fl. méd. I. 48. *Bert.* Bild. VI. 95. f. 1.)

Die Wurzel (radix Enulae s. Enulae Campanae s. Helenii s. Inulae) ist spindelförmig, daumendick, fleischig, ästig, mit wenigen Fäserchen besetzt, außen gelbbraun oder braun, inwendig weiß. Frisch hat sie einen starken durchdringenden Geruch, welcher beim Trocknen veilchenähnlich wird. Der Geschmack ist eigenthümlich, etwas bitter, gewürzhaft und beißend.

Sie enthält ein flüchtiges Oel, eine Art Stärkemehl, Inulin (Inulinum) genannt, einen bittern und einen harzigen Stoff.

Tonisch, harn- und schweißtreibend, den Auswurf und die Reinigung befördernd, wurmwidrig. — Gabe des Pulvers, eine halbe bis zwei Drachmen.

§. I. Präparate, welche den Alant in Substanz enthalten.

Conserva Inulae. (Gal. Sar. *Fi. T. Vm.*)

℞. Radicis recentis Enulae mundatae libram unam.
Aquae communis . . libras octo.
Macera per aliquot dies, radicem tunc coctione mollem redde et in decocto clarifica
Sacchari albi . . . semilibram.
Digere radicem in syrupo per dies tres, coque tunc, donec spississimus factus sit et illam in eo serva vel balnei vaporis ope sicca. (Sar.)

℞. Radicis Enulae . . quantum vis.
Coque in Aquae sufficiente quantitate, donec inter digitos conteri possit; contunde in mortario marmoreo, pulpam per cribrum bombycinum trajice et adde Syrupi ad plumam cocti pondus duplum. (Sar.)

Gal. Pulpae partem unam et quatuor Sacchari in decocto radicis ad electuarii solidi consistentiam cocti; — *T.* Pulpae libras quatuor et Syrupi Enulae libras sex; — *Vm.* Pulpae partem unam et tres Sacchari albi; — *Fi.* Radicis libram unam coquere, pulpam per setaceum trajicere, decocti liquidum cum Sacchari albi libris duabus ad syrupi spissi consistentiam coquere, et pulpa addita, totum ad justam spissitudinem redigere jubet.

Pulvis Inulae aromatisatus. (*Sa.*)

℞. Pulveris Radicis Inulae partes sex.
— Angelicae partem unam.
Misce.

Pulvis antilyssicus Ormskirkianus. (B*.)

℞. Pulveris Radicis Inulae drachmam unam.
— Cretae . . semunciam.
— Boli Armenae drachmas tres.
— Aluminis . grana decem.
Olei essentialis Anisi guttas quinque.

Ehedem sehr berühmt.

Unguentum Inulae s. Enulae s. Helenii s. enulatum. (B*. Br. His. RC. Wir. *Au. Huf. Sp. Sw.*)

℞. Radicis Enulae . . semilibram.
Aquae fontanae uncias centum viginti octo.

Coque et in pulpam redige, cui adde
Butyri recentis . uncias quatuor.
Misce. (B*.)

Sw. Coquere Enulae semilibram in Aquae libra una et pulpae addere Butyri uncias tres; — *Au.* et *Huf.* Radicem coquere in Aquae quantitate sufficiente, ut fiat pulpa, quae cum Axungiae Porci sufficiente quantitate conteratur; — RC. Radicis pulveratae semilibram cum Aquae fontanae libra una ad consistentiam pultis coquere et addere Adipis suilli praeparatae uncias tres.

℞. Radicis Enulae . libram unam.
Axungiae Porci . . semilibram.
Olei Olivarum . uncias quatuor.

Tere in mortario lapideo; coque blando igne ad humidi consumptionem, exprime et colaturae adde

Cerae flavae,
Terebinthinae purae,
singularum unciam unam.

Misce bene (Br. Wir. *Sp.*)

℞. Olei Enulae compositi
libras quatuor.
Cerae flavae . . libram unam.
Axungiae Porci . uncias quatuor.

Liquatis et semirefrigeratis adde

Styracis liquidae
drachmas undecim.
Mastichis pulverati drachmas sex.

Agita donec refrixerint. (H's.)

Gegen scabies empfohlen.

Theriaca officinalis. (Li.)

℞. Pulveris Enulae . . uncias duas.
— Zedoariae,
— Myrrhae,
— Aristolochiae rotundae,
— Angelicae,
singulorum sesquiunciam.
Rob Juniperi . . . uncias sex.
Mellis depurati,
Syrupi Capitum Papaveris,
singulorum uncias octo.

Misce bene. — Gabe, eine Drachme bis eine halbe Unze.

Trochisci Enulae. (*Bo. Ca.*)

℞. Pulveris Enulae . semunciam.
— Iridis Florentinae
drachmam unam.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae
quantum sufficit.

Bei Scorbut, Waſſerſucht, Bleichſucht, eine halbe Unze täglich.

§. II. Präparate, welche nur einen Theil der Beſtandtheile des Alants enthalten.

A. Auszug durch Deſtillation.

Aqua Enulae s. Helenii. (Gal. *Fi.*)

℞. Radicis recentis Enulae
partem unam.
Aquae communis partes quinque.

Destillent partes duae.

Aqua antiasthmatica. (Br. Pal. Wir. *Sp.*)

℞. Radicis Enulae,
— Liquiritiae,
— Iridis Florentinae,
singularum uncias duas.
Herbae Hederae terrestris,
— Farfarae,
— Botryos,
singularum semilibram.
— Hyssopi,
— Marrubii albi,
— Pulegii,
— Salviae,
singularum uncias tres.
Anisi,
Foeniculi,
singulorum unciam unam.
Alcoholis . . . . libram unam.
Aquae fontanae . libras decem.

Post tres dies digestionis destillent librae sex vel septem. (Wir.)

℞. Radicis Enulae . . uncias duas.
— Pimpinellae albae,
— Iridis Florentinae,
singularum sesquiunciam.
Herbae Hyssopi,
— Marrubii albi,
— Salviae,
singularum uncias duas.
Anisi,
Foeniculi,
Baccarum Juniperi,
— Lauri,
singulorum unciam unam.
Cardamomi minoris,
Cinnamomi,
Zingiberis, singulorum semunciam.
Styracis Calamita . drachmas sex.
Alcoholis . . libras duodecim.
Aquae Acaciae . . libras octo.

Post tres dies digestionis destillent librae decem; producto adde

Julep rosati . . . . libras duas.
Aquae Foeniculi . . libras octo.

Misce. (Br.)

℞. Radicis Enulae,
— Liquiritiae,
— Iridis Florentinae,
singularum unciam unam.
— Angelicae,
— Pimpinellae albae,
singularum drachmas sex.
Herbae Capilli Veneris,
— Hyssopi,
— Pulmonariae,
— Hederae terrestris,
— Salviae,
— Farfarae,
Seminum Anisi,
— Foeniculi,

Seminum Urticae,
singulorum semunciam
Croci . . . . scrupulos duos.
Alcoholis . . . . libram unam.
Aquae Scabiosae,
— Marrubii,
— Veronicae,
singularum semilibram.
Post tres dies digestionis destillatio in balneo aquae instituatur. (Pal.)

℞. Radicis Enulae . . uncias duas.
— Iridis Florentinae
sesquiunciam.
Herbae Hyssopi,
— Rorismarini,
— Salviae,
singularum unciam unam.
Anisi,
Foeniculi,
Cinnamomi,
singulorum semunciam.
Cardamomi minoris drachmas duas.
Croci . . . . scrupulos duos.
Alcoholis . . uncias duodecim.
Aquae Hyssopi
uncias viginti quatuor.
Digesta per tres dies destillent. (*Sp.*)

Bei feuchtem Husten alter Leute. — Gabe, Morgens eine oder zwei Unzen.

B. Auszug durch mechanische Mittel.

Syrupus Enulae. (Gal.)

℞. Succi depurati Radicis Inulae
sesquilibram.
Sacchari albi
libras duas cum dimidia.
Liqua et cola.

Brustmittel.

C. Auszug durch Wasser.

Tisana Enulae. (Gal.)

℞. Radicis Enulae . unciam unam.
Aquae bullientis . . libras duas.
Infunde, cola et adde
Mellis vel Syrupi Capilli Veneris
unciam unam.

Extractum Enulae s. Helenii aquosum. (A. Ams. An. B. Bor4. Br. Gal. Gen. HassP. His. Li. Pal. Suec. *T. Vm.*)

℞. Radicis recentis Enulae
quantum vis.
Bene lotam raspa et exprime succum; pulpam cum Aquae pauxillo tritam iterum exprime; succus tunc per manicam trajectus blando calore ad extracti consistentiam evaporet. (Gen. *Vm.*)

℞. Radicis Enulae . libram unam.
Aquae fontanae . . . libras sex.
Macera per dies quatuor in loco calido et coque parumper; cola exprimendo et colaturam consume. (Br. Li. Pal.)

℞. Radicis Enulae . libram unam.
Aquae frigidae . libras quatuor.
Macera in vase tecto, subinde agitando et cola; residuo novam Aquam infunde et macera, quo facto leni expressione coletur; liquores mixti et colati in balneo aquae evaporent. (Gal.)

℞. Radicis Enulae . partem unam.
Aquae bullientis . . partes octo.
Digere per horas viginti quatuor, tunc coque per horae quadrantem et cola; residuo per horae quadrantem cocto cum Aquae novae partibus quatuor et colato, liquores commisce, et post desidentiam decanthatos consume. (An.)

B. Digestionis horas viginti quatuor et duas bullitionis cum Aquae partibus decem, tunc secundum per horas duas coctionem cum Aquae partibus octo; — Ams. Coctionem primam cum viginti, secundam cum quindecim partibus Aquae, ad dimidium quamque continuatas; — His. Digestionem per horas viginti quatuor et ebullitionem per duas cum partibus decem Aquae et secundam coctionem cum Aquae nova quantitate ad dimidii remanentiam; — HassP. ut extractum Colombo p. 561; — *T.* ut extractum Centaurii minoris p. 449; — Bor4. ut extractum aconiti p. 61.

℞. Radicis Inulae . . quantum vis.
Aquae . . . quantum sufficit.
Radice pluribus ebullitionibus sequentibus penitus extracta, liquores misce et decanthatos vaporando consume. (A. Suec.)

Gabe, ein Scrupel bis eine halbe Drachme.

Mixtura pectoralis. (*Ca.*)

℞. Extracti Enulae . scrupulos duos.
Gummi Arabici . drachmas duas.
Aquae Hyssopi . . semunciam.
Oxymellis scillitici,
Syrupi Hyssopi,
singulorum sesquiunciam.

Löffelweise.

Mixtura antiasthmatica. (*Sp.*)

℞. Extracti Enulae,
— Cascarillae,
singulorum scrupulum unum.
Essentiae Pimpinellae albae,
— Liquiritiae,
singulorum drachmam unam.
Elixir pectoralis Wedelii
drachmas duas.
Oxymellis scillitici . semunciam.
Aquae Tussilaginis,
— Pulmonariae,
— Hyssopi,

Aquae Foeniculi,
— Veronicae,
Syrupi Althaeae,
singulorum unciam unam.
Löffelweiſe.

Decoctum Helenii s. Enulae. (B*.)

℞. Radicis Enulae . . semunciam.
Aquae fontanae . quantum sufficit ut coquendo colaturae unciae sex obtineantur.
Gabe, alle zwei Stunden einen oder zwei Löffel.

Decoctum Enulae s. Helenii compositum, Hydromel compositum. (*Ra.*)

℞. Radicis Enulae . unciam unam.
Summitatum Hyssopi,
Foliorum Hederae terrestris,
singulorum drachmas duas.
Aquae . . . quantum sufficit.
Coque et colaturae adde
Syrupi Mellis uncias duas.
Schwach reizend, bei chroniſchen Catarrhen, Aſthma und Herzerweiterung empfohlen.

Potio Enulae composita s. cordialis diuretica. (*Ra*)

℞. Decocti Enulae . uncias quatuor.
Tincturae Digitalis . semunciam.
— Potassae
guttas octodecim.
Syrupi quinque Radicum
unciam unam.
Reizend, harntreibend. — Löffelweiſe.

Decoctum Carnis s. Jus purificans. (*Pie.*)

℞. Carnis vervecinae (collet)
uncias quatuor.
Radicis Enulae . semidrachmam.
— Hydrolapathi
drachmam unam.
Cancrorum contusorum . no. 2.
Foliorum Cichorii,
— Fumariae,
— Nasturtii,
singulorum manipulum unum.
Coque in Aquae sufficiente quantitate.

Oxymel pectorale. (Br. *Ca. Sp.*)

℞. Radicis Enulae . unciam unam.
— Iridis Florentinae
semunciam.
Aquae fontanae uncias triginta sex.
Coque ad unciarum viginti quatuor remanentiam, cola et post desidentiam colaturae adde
Mellis albi . . uncias sedecim.
Gummi Ammoniaci unciam unam in
Aceti albi . . . . unciis octo dissoluti. Coque ad mellis consistentiam.

Bei Huſten und feuchtem Aſthma empfohlen. — Löffelweiſe, von Zeit zu Zeit.

D. Auszug durch Weineſſig.

Acetum theriacale. (Pal.)

℞. Radicis Enulae,
— Angelicae,
— Cyperi,
— Zedoariae,
— Caryophyllatae,
— Contrayervae,
— Imperatoriae,
— Valerianae sylvestris,
— Viperinae,
singularum semunciam.
Corticis recentis Aurantii,
— — Citri,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Galangae,
Baccarum Juniperi,
— Lauri,
Summitatum Salviae,
— Rorismarini,
— Rutae,
singularum drachmas duas.
Aceti . . . . . libras septem.
Macera per mensem in loco calido, cola fortiter exprimendo et adde
Theriacae . . . uncias septem.
Macera per mensem et filtra.
Innerlich zu einem halben bis ganzen Löffel, als ſchweißtreibend und gegen Anſteckung empfohlen; auch äußerlich in Einreibungen als ſtärkend.

E. Auszug durch Wein.

Vinum Enulae s. Helenii s. enulatum. (B*. GalM. Sar. *Vm.*)

℞. Radicis recentis Enulae
partem unam.
Vini albi . . . partes sedecim.
Digere frigide per plures dies, cola exprimendo et filtra. (*Vm.*)
Sar. Radicis siccae uncias duas, Vini albi libras quatuor et viginti quatuor horas macerationis.

℞. Tincturae Enulae . partem unam.
Vini rubri partes decem vel viginti.
Misce bene. (GalM.)

℞. Essentiae Enulae drachmam unam.
Vini albi . . . . . uncias sex.
Syrupi simplicis . drachmas sex.
Misce. (B*.) — Erneſting's Formel.

F. Auszug durch Alkohol.

Tinctura Helenii s. Enulae. (A. Ams. An. B. Pal. *Fi. T.*)

℞. Radicis Enulae . partem unam.
Alcoholis (15°) . . . partes sex.
Post tres dies digestionis, blando calore, filtra. (B.)
A. Radicis partem unam, et sex Alcoholis (0,910); — Ams. Radicis par-

tem unam, et sex Alcoholis (0,917); — *Fi.* Alcoholis 24° sex; — Pal. et Wir. Radicis partem unam et quatuor Alcoholis; — *T.* ut tincturam Contrayervae p. 567. parat.

℞. Radicis Enulae . unciam unam.
Alcoholis (20°) uncias quatuor.
Infunde in balneo aquae tepido per dies quatuor, cola et residuo infunde
Alcoholis (20°) . . uncias duas.
Macerando continua per dies duos, cola, et colaturas mixtas filtra.

Reizend, blähungtreibend, Ausdünstung beförderud; besonders bei Brustaffectionen empfohlen — Gabe, sechs Tropfen bis eine Drachme.

Extractum Enulae s. Helenii alcoholicum.
(Ba. Bor. Bor4. Ful. Han. O. Pol. Sax. Wir. Wür.)

℞. Radicis Enulae,
Alcoholis, singulorum libras duas.
Aquae communis libras novem.
Digere per horas duodecim, cola exprimendo, alcoholem destillatione elice, et residuum ad aptam consistentiam consume. (Pol.)

Ba. Bor. Han. O. et Sax. Radicis partes duas, Alcoholis tres et novem Aquae; — Ful. Radicis unam, sex Alcoholis et tres Aquae.

Bor4. ut extractum Aconiti p. 61.

℞. Radicis Enulae . libram unam.
Alcoholis libras quinque vel sex.
Post sufficientem extractionem cola fortiter exprimendo; residuum digere et tunc coque parumper cum Aquae libris tribus, decoctum albuminis ope clarifica, liquores commisce et, alcohole destillando elicito, quod restat ad extracti consistentiam consume. (Wir.)

℞. Radicis Enulae . . quantum vis.
Alcoholis . . . quantum sufficit ut radix quatuor digitorum crassitiem tegatur; digere in loco calido et decantha; coque per horam cum Aqua, cola cum expressione, et colaturam ad mellis consistentiam consume, tincturam sub finem addendo ut massa sit homogenea neque grumosa.
Dieselbe Gabe, wie beim extr. aquosum.

Elixir antihystericum. (*Ca. Vm.*)

℞. Radicis Asari . . . partes tres.
— Iridis Florentinae
partes quinque.
— Enulae,
— Calami,
singularum partes decem.
— Liquiritiae partes quindecim.
Seminum Anisi partes quinque.
Aquae Vitae . . partes octoginta.
Stent in infusione frigida per plures dies; colaturae adde
Camphorae . . . partem unam.
Dissolve. (*Vm.*)

Ca. Liquiritiae sesquidrachmam, Calami, Enulae, singulorum drachmam unam, Iridis, Anisi, singulorum semidrachmam, Radicis Asari grana octodecim, Camphorae grana sex et Alcoholis semilibram.

Reizend, besonders bei feuchtem Asthma empfohlen. — Gabe, zehen bis dreißig Tropfen in einer Tasse Thee oder irgend einem schwachen Aufguß.

Elixir pectorale Elsneri. (*Vm.*)

℞. Radicis Liquiritiae,
Croci,
Anisi stellati,
singulorum partes quatuor.
Radicis Enulae,
— Iridis Florentinae,
singularum partes octo.
Spiritus Hyssopi
partes nonaginta sex.
Infunde in balneo aquae, filtra et adde colaturae
Balsami Peruviani partem unam.
Mellis Narbonnensis
partes sedecim.
Sepone per aliquot tempus et filtra.

Elixir americanum Courcellesii. (B*, *Ca.*)

℞. Alcoholis (32°),
Aquae Vitae (21°), singulorum octarios (litre) octo.
Radicis Enulae . libras quatuor.
— Sacchari,
— Aristolochiae rotundae,
singularum libras tres.
— Donacis,
Foliorum Lauri Perseae,
singulorum libras duas.
Florum Hyperici libram unam.
— Sambuci . . semilibram.
Corticis Sideroxyli . uncias sex.
Foliorum Aurantii,
Crotonis balsamiferi,
singulorum uncias quatuor.
Juniperi . . . . . uncias tres.
Opii puri uncias duas cum dimidia.
Justiciae assurgentis,
Florum Aurantii,
— Tiliae,
Summitatum Rorismarini,
singulorum uncias duas.
Radicis Asari,
— Chamaeropis humilis,
Cucurbitae Lagenariae,
singularum unciam unam.
Macera et cola; residuum combure et cinerem in liquore infunde cum

Florum Rhoeados . . uncias sex.
Rubiae tinctoriae uncias tribus.
Piltra. — *Ca.* hat dieſe Formel auf folgende Weiſe verbeſſert:

℞. Alcoholis partes centum viginti.
Radicis Enulae . libras sedecim.
Florum Hyperici . libras octo.
Foliorum Aurantii . libras sex.
Florum Sambuci libras quinque.
Foliorum Tanaceti libras quatuor.
Florum Tiliae
libras duas cum dimidia.
Radicis Donacis,
Juniperi,
Florum Rorismarini,
Opii, singulorum libras duas.
Radicis Asari . . libram unam.
Aquae . . . . quantum sufficit ut liquor 24° indicet. Colora cum rhoeado.

Ein Reizmittel, welches in America in einer Menge Beſchwerden, welche theils von nervöſen Krämpfen, theils von Schwäche hergeleitet werden, ſehr geſchäzt iſt und gleichſam als Univerſalmittel betrachtet wird. — Gabe, ein ſtarker Löffel, allein oder in einem paſſenden Getränk, zwei oder drei Mal zu wiederholen.

G. Auszug durch Oel.

Oleum Inulae s. Enulae s. Helenii compositum. (*E.*)

℞. Radicis Inulae,
— Valerianae,
— Bardanae.
Summitatum Hyperici,
— Abrotani,
— Absinthii,
— Basilici,
— Calaminthae,
— Balsamitae maris,
— Majoranae,
— Menthae rotundifoliae,
Foliorum Salviae,
Florum Sambuci,
singulorum uncias tres.
Summitatum florescentium Chamomillae,
— Meliloti,
— Stoechatis,
singularum uncias duas.
Foliorum recentium Lauri,
— — Ebuli,
— — Rorismarini,
— — Rutae,
singulorum uncias sex.
Seminum Cumini,
— Foenugraeci,
— Urticae,
singulorum unciam unam.
Olei Olivarum . . libras duas.
Macera per dies quatuor, coque tunc ad consumptionem humidi et sepone ut depurificetur.

Iodium.

Iodum s. Iodina; Job, Jodine; Iode (*Gal.*).

B*. Ba. Bor4. Fer. HassP. *Fi. Ma. T. Vm.*

℞. Lixivii Natri Fucorum quantum vis.
Affunde Acidum sulphuricum concentratum in excessu et coque lente liquorem in retorta vitrea, recipiente instructa; acus s. squamas splendentes in hoc concretas Aquae frigidae parva quantitate lotas blando calore sicca.

Ba. HassP. *T.* ope Oxydi Mangani et Acidi sulphurici sublimatione paratum indicant; — *Fi.* Lixivii uncias quinque, Mangani nigri pulverati unciam dimidiam, Acidi sulphurici uncias sex, Aquae fontanae sesquiunciam, post horas viginti quatuor digestionis fiat destillatio; iodum obtentum cum pondere quadruplo Magnesiae commisce et purifica.

Ein ſehr kräftig reizendes und erregendes Mittel, in hohen Gaben ein Gift, welches unter gewiſſen Umſtänden eine ſehr bedeutende Wirkung auf die Bruſtdrüſen und beſonders auf die Schildbrüſe äußert, in Folge deren dieſe Organe mehr oder weniger vollkommen ſchwinden. Man hat es bei der Behandlung der Scrofeln und des Kropfes, bei lymphatiſchen Geſchwülſten jeder Art, bei'm Tripper, ſelbſt acuten, bei chroniſcher Leukorrhöe, Hodengeſchwülſten ꝛc. empfohlen. — Man wendet es innerlich und äußerlich an, jedoch iſt Vorſicht nöthig und man muß ſogleich damit aufhören, ſobald Abmagerung eintritt, welche im Allgemeinen das erſte Zeichen ſeiner ſchädlichen Wirkung iſt —. Gabe, von einem achtel bis zu einem ganzen Gran, täglich zweimal, in Pillen.

Tinctura s. Alcohol Iodii s. Iodi. (B*. Ba. Bor4. Fer. GalF. HassP. *Bo. Fi. Ma. Pie. Ra. T. Vm.*)

℞. Iodii . . . . . partem unam.
Alcoholis (35°) partes duodecim.
Dissolve. (Fer. GalF. *Bo. Ma. Ra.*)

Pie. Iodii partem unam et octo Alcoholis; — Ba. Iodii unam et Alcoholis novemdecim (viginti HassP. *Tinctura Iodinae diluta* ut reagens); — *Vm.* Iodii unam et Alcoholis decem cum pauxillo; — B*. Iodii unam et Alcoholis sedecim ad septemdecim; — Bor4. Iodii grana quadraginta octo, Spiritus Vini alcoholisati unciam unam; — HassP. Iodii grana quadraginta, Spiritus Vini rectificatissimi unciam unam;

— *T.* Iodii scrupulos sex, Alcoholis 33° B. uncias duodecim; — *Fi.* Iodi scrupulos duos, Alcoholis 35° unciam unam.

Zwanzig Tropfen der ersten Formel enthalten etwa einen Gran Jod und der Tropfen wiegt ¼ Gran. — Gabe, für Erwachsene vier bis zehen Tropfen, täglich dreimal, in einem halben Glase Zuckerwasser, allmälig bis auf zwanzig und mehr Tropfen gestiegen. — Richond wendet wahrscheinlich eine schwächere Tinctur an, als die Magendie'sche, da dreißig Tropfen nur etwa einen Gran Jod enthalten; auch giebt er sie bis zu dreißig Tropfen Morgens und Abends.

Syrupus Iodii. (Fer. *T.*)

℞. Tincturae Iodii drachmas duas.
Syrupi Sacchari uncias quatuor.
Misce frigide.

Tinctura Iodii aetherea, Aether iodinicus s. ioduratus. (Fer.)

℞. Iodii . . . . . grana sex.
Aetheris (66°) drachmam unam.
Dissolve.

T. Alcoholis 86° B. partes vol. duas, Acidi hydroiodici (1,700) partem unam, destillent in balneo aquae; productum cum Aqua tracta.

Pilulae Iodii s. iodatae. (Fer. *B.*)

℞. Iodii . . . . . granum unum.
Liquiritiae pulveratae scrupulum unum.
Rob Sambuci quantum sufficit.
Fiant pilulae duae.

Unguentum Iodii s. iodatum. (Fer. *B. T.*)

℞. Iodii . . . . . semidrachmam.
Axungiae praeparatae sesquiunciam.
Terendo exacte misce.

T. Iodii scrupulos sex, Axungiae praeparatae uncias quatuor, Sebi uncias duas.

Tinctura Alcoholis Sulphuris iodata s. Carbureti Sulphuris iodurati. (*Vm.*)

℞. Iodii . . . . . partem unam.
Alcoholis Sulphuris partes tres.
— Vini . . . partes novem.
Misce ut sensim solvatur iodium.

Acidum iodicum. (*T. Vm.*)

℞. Kali iodici pulverati quantum vis.

Infunde ei Acidi tartarici in Aquae quantitate qua potest minima soluti sufficientem quantitatem, liquorem post aliquot tempus decantha, et lenta vaporatione consume, refrigescere sinendo quoque momento, donec nihil amplius subsideat.

Secundum *Davy* purum obtinetur, Iodium cum Gase oxydato Chlori sicco commiscendo, quo facto chloro decomposito acidum iodicum excernitur. (*T.*)

Kali iodicum s. iodinicum. (Fer. *T. Vm.*)

℞. Iodii . . . . . quantum vis.
Liquoris Kali caustici concentratae . . . quantum sufficit.

Solutione ad siccum evaporata, residuum cum Alcohole lava et quod non solutum remansit, serva. (Fer. *T.*)

℞. Natri Fucorum cribrati et pulverati quantum vis.
Aquae leviter potassatae pondus duplum.

Coque et operationem cum eadem Aquae quantitate repete, liquores commixtos filtra, vaporando consume et crystallos, prout formantur collectas et exstillatas pulvera et Aqua calida lava; Aquâ lotionum cum illa exstillata commixta totum ad siccum evaporet; residuum serva. (*Vm.*)

Dieser Rückstand enthält viel salzsaures Natron und Kali. Man könnte ihn statt des Jodinwasserstoffkali anwenden.

Calcaria iodica s. iodinica.

In keiner Pharmacopöe ist die Bereitung angegeben.

Boli resolventes deprimentes. (*B.*)

℞. Calcariae iodinicae grana sex ad decem.
Extracti Aconiti grana viginti quatuor.
Fiant boli sex. — Gabe, ein Stück alle vier Stunden. — Bei chronischer Bronchitis und tuberkulöser Schwindsucht.

Boli emmenagogi resolventes. (*B.*)

℞. Calcariae iodinicae grana decem.
Extracti Sabinae grana duodecim.
Fiant boli quatuor. — Gabe, alle vier Stunden ein Stück. Bei Mangel der Reinigung mit Scrofelcomplication.

Acidum hydroiodicum. (Fer. GalH. *T.*)

℞. Phosphureti Iodii quantum vis.

Retortae intromissum parumper humecta et lente calefac; acidum inde evolutum, tubi longi recurvati ope, in fundum catilli angusti excipe.

Immittere potes quoque Iodio Aqua destillata diluto torrentem Gasis Acidi hydrosulphurici donec liquor colore sit privatus, hunc calefacere et filtratum sub recipiente apparatus pneumatici sedulo (ad dimidiae vel tertiae part.s remanentiam *T.*) concentrare.

Proto hydroiodas Potassii.

Hydroiodas Protoxydi Potassii, Hydroiodas Potassii s. kalicus, Iodetum Kalii, Kali hydroiodicum, (B*. Bord. Fer. GalF. GalH. HassP. *Ma. T.*)

1) Verfahren Turner's.

℞. Solutionis Kali caustici (1,150) quantum vis.

Adde sensim, blando calore

Iodii . . . . quantum sufficit ad neutralisandum kali (donec liquoris color intense ruber in rubicundum nec flavescentem vergat Bor4.). Evaporatum ad siccum calcina fortiter et in Aqua dissolutum crystallisationi subjice. (Bor4. GalF. GalH. *Ma.*)

B°. Kali cum Acido hydroiodico saturatum ad liquoris spissi consistentiam evaporare jubet.

2) Verfahren Caillot's und Baup's.

℞. Iodii . . . . . partes decem.
Aquae destillatae
partes quinquaginta.
Retortae vitreae immissis adde sensim, dosibus divisis
Limaturae Ferri purae
partes quinque,
quaque vice vas agitando. Calefac usque liquor colore sit privatus; filtra hunc et filtrum cum Aqua bulliente ablue donec liquor saporis sit expers; liquorem et lotionum Aquam commisce et totum in arena ad ebullitionem usque calefac; infunde deinde solutionem Kali subcarbonici tantum ut omne ferrum oxydatum praecipitetur; filtra et filtrum sedulo ablue; liquores commisce et si charta exploratoria rubra baseos excessum indicet, Acidi hydroiodici paxillum adde; evaporent tunc in balneo arenae ad cuticulae apparitionem usque; quo facto igne exstincto crystallisationi subjice, Aqua parumper lava et crystallos sicca. (GalH.)

HassP. Iodinae purae uncias duas, Aquae dest. octo, Limaturae unam; liquido limpido filtrato et residuo cum Aqua dest. abluto liquores cum Aquae dest. unciis triginta misceantur et liquoris cinerum clavellat. depurat. tantum addatur ut omne Oxydum ferri praecipitetur; residuo cum Aqua dest. cloto et expresso, liquores clari vaporent lento calore et crystallisationi subjiciantur etc.; — *Fi.* Iodii drachmam unam, Aquae destillatae unciam unam, Limaturae sesquidrachmam, Kali subcarbonici quantum sufficit.

3) Verfahren Tabbei's.

℞. Iodii . . . . . quantum vis.
Dissolve in
Alcoholis (25° B.)
quantitate sufficiente.
Solutioni deinde infunde per vices Kali hydrosulphuricum (liquidum?), donec colorem lacteum induerit; liquori tunc sponte clarificato adhuc infunde guttas aliquot kali, filtra, et ad siccum evaporatum crystallisationi subjice. (GalH. *T.*)

Brandes Kali sulphuratum liquidum adhibet.

Dieſe Zuſammenſetzung erhält nur im flüſſigen Zuſtande den Namen iodinwaſſerſtoffſaures Kali; cryſtalliſirt iſt es Jodinkali. (Ioduretum Potassii).

℞. Acidi hydroiodici partem unam.
Aquae . . . . partes quatuor.
Infunde sensim Kali subcarbonicum ad perfectam saturationem usque, filtra et evaporata crystallisationi subjice. (Fer.)

Potio resolvens ex Iodio, Solutio Hydroiodatis Potassae. (Fer. GalF. GalH. *B. Bo. Ma. Pie. Ra.*)

℞. Hydroiodatis Potassae
grana triginta sex.
Aquae destillatae unciam unam.
Dissolve.

Ein Tropfen dieſer Flüſſigkeit iſt über einen Gran ſchwer. — Man hält ſie allgemein für vorzüglicher, als die Tinctur, und verſchreibt ſie auf dieſelbe Weiſe, in denſelben Gaben und unter denſelben Umſtänden, wie dieſe.

Potio stimulans.

℞. Hydroiodatis Potassae grana duo.
Magnesiae sulphuricae semunciam.
Tartari stibiati granum dimidium.
Aquae . . . . . uncias sex.

Gabe, ein Kaffeelöffel drei oder vier Mal täglich, bei Scrofeln.

Pilulae Hydriodatis Potassae. (*Pie.*)

℞. Hydriodatis Potassae
drachmas quinque.
Aquae destillatae drachmas sex.
Panis biscocti . quantum sufficit ut fiat massa in pilulas trecentas dividenda, quarum quaeque salis unum granum continet.

Bei Kropf, Leukorrhoe und weißen Geſchwülſten.

Unguentum Kali hydroiodici s. Hydriodatis Potassae. (B°. Bor4. Fer. GalF. GalH. *B. Bo. E. Ma. Pie. Ra. T.*)

℞. Hydriodatis Potassae
semidrachmam.
Axungiae Porci . sesquiunciam.
Misce triturando.

Bor4. Kali drachmam unam, Magnesiae carbonicae grana sex, tere additis aliquot guttis Aquae destillatae cum Unguenti rosati uncia una; — *T.* Kali drachmas tres, Axungiae uncias sex; si placet, guttas aliquot essentiae Bergamottae addere potes.

In Einreibungen, beſonders gegen Kropf. — Gabe, Morgens und Abends, jedesmal haſelnußgroß eingerieben.

Tabellae cum Coffea Moccaënse. (*Pie.*)

℞. Sacchari pulverati uncias quatuor.
Coffeae Moccaënsis porphyrisatae semidrachmam.
Hydriodatis Potassae grana septuaginta quinque.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae cum infuso forti Coffeae paratae quantum sufficit.

Fiant tabellae trecentae. — Bei weißem Fluß, Kropf, Amenorrhoe, Drüsenstockungen, Scrofeln.

Hydroiodas ioduratus Potassae. (Fer. *Fi. Ma. T.*)

℞. Hydriodatis Potassae partes viginti.
Iodii puri . . . . . partes sex.

Misce in mortario vitreo et diu tritura ut mixtura sit homogenea et obscure rubra.

Fi. Hydriodatis semidrachmam, Iodii grana decem; — *T.* Hydriodatis drachmas sex, Iodii scrupulos quinque.

Solutio Hydriodatis iodurati Potassae, Solutio Coindeti. (Fer. *B. Ca. Ma.*)

℞. Hydriodatis Potassae grana triginta sex.
Aquae destillatae unciam unam.
Solutioni adde
Iodii . . . . . grana decem.

Ein Tropfen wiegt anderthalb bis zwei Gran.

Syrupus Hydriodatis iodurati Potassae. (*T.*)

℞. Hydriodatis iodurati Potassae grana octodecim.
Aquae destillatae drachmas duas.
Solutioni adde
Syrupi simplicis . uncias decem.

Fi. Hydriodatis drachmam unam, Aquae destillatae unciam unam, Syrupi simplicis uncias quadraginta.

Gabe, zwei Drachmen bis eine halbe Unze in 24 Stunden.

Unguentum Hydriodatis iodurati Potassae. (Fer. *B. Bo. Ca. Ma. Pie. T.*)

℞. Hydriodatis iodurati Potassae semidrachmam.
Iodii grana decem ad quindecim.
Axungiae . . . sesquiunciam.

Contere bene. (Fer. *Bo. Ca. Ma.*)

℞. Hydriodatis Potassae drachmam unam.
Iodii . . . . . grana viginti.
Succi gastrici Vituli quantum sufficit

ut fiat, intra horarum viginti quatuor tempus, solutio, cui adde
Axungiae . . . . uncias duas.

Misce bene. (Fer. *B. Pie.*)

Fi. et *T.* ut unguentum kali hydroiodici sed cum Kali iodurato. (*T.*)

Alle diese Präparate sind wirksamer, als die mit dem einfachen Jodinwasserstoffkali.

Mixtura s. Potio resolvens. (*B.*)

℞. Ononidis . . . unciam unam.
Aquae . . . quantum sufficit ut decocti unciae sex obtineantur; colaturae adde
Solutionis Hydriodatis iodurati Potassae . . guttas quadraginta.
Syrupi Sacchari . unciam unam.

Allmälig zu nehmen, bei scrofulösen Krankheiten.

Natrum hydroiodinicum, Hydroiodas Sodae, Sodium iodatum. (Hass P. *T.*)

Ut Kali hydroiodinicum sed cum Sale Sodae depurato, Aqua soluto, loco liquoris cinerum clavell.

Ioduretum Carbonii s. Carburetum Iodii. (*T.*)

℞. Solutionis alcoholicae (Alcoholis 33° B.) Iodii saturatae quantum libet
Instilla guttatim
Solutionem Kali caustici alcoholicam

ita tamen, ut iodii parva quantitas libera restet; sepone liquorem per aliquot tempus, tunc Aquae magnam copiam ei infunde, squamulae iodureti citrini coloris in Alcohole rectificato solve et hanc solutionem per chartam filtratam in vase vitreo vel porcellaneo amplae superficiei evaporationi spontaneae subjice ut squamulae iodureti purae obtineantur.

Könnte versucht werden bei Krankheiten, wo die Tinctur den Magen angreift.

Hydriodas Ferri, Ferrum hydriodicum.

Die Bereitungsart ist in keiner einzigen Pharmacopöe angegeben.

Solutio ad strumam s. antistrumosa. (*Pie.*)

℞. Hydriodatis Ferri drachmas quatuor et grana quadraginta.
Aquae destillatae uncias quatuor.

Gabe, zehen Tropfen Morgens und Abends und allmälig gestiegen.

Unguentum ad scrofulas s. antiscrofulosum. (*Pie*)

℞. Hydriodatis Ferri grana sexaginta.
Axungiae . . . unciam unam.

Soll mit Erfolg gegen Leukorrhoe, weiße Geschwülste und Drüsenverstopfungen angewendet worden seyn.

Trochisci emmenagogi. (*Pie.*)

℞. Hydriodatis Ferri grana triginta.
Croci pulverati semidrachmam.

Sacchari . . , uncias quatuor.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae,
Infusi Cinnamomi,
singulorum quantum sufficit.
Fiant trochisci ducenti quadraginta.
Bei Amenorrhoe und Leukorrhoe gerühmt. — Gabe, fünfzehen bis zwanzig Stück täglich, allmälig gestiegen.

Ipecacuanha.

Brechwurzel; Ruhrwurzel; Ipecacuanha (*Gal.*); Ipecacuan (*Ang.*); Hipecacuana, Bejuguillo (*His.*); Ipekakuang (*Pol.*); Kraekrot (*Suec.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Per. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *Be. Br. C. Fi. G. M. Par. Pid. Sp.* Z.

Die wahre Ipecacuanha ist die Wurzel von Cephaelis Ipecacuanha, *Rich.*, einer Pflanze (Pentandria Monogynia, L.; Rubiaceae, J.), welche in den Wäldern Brasilien's wächst. (Dict. d. Sc. méd. T. XXVI. pl. 1. *Hayne* VIII. 20. *Rich.* Hist. Ip. t. 1. *de Mart.* Spec. mat. med. Bras. t. 1. *Plenck.* t. 754. Berl. Jahrb. X. et XXII. t. 1. Linn. Trans. VI. t. 6. *St. Hil.* pl. us. Bras. t. VI.)

Von dieser Wurzel (radix Brasiliensis) kommen im Handel drei Varietäten vor:

1) Die graue, geringelte, schwärzlichgraue, braune Ipecacuanha; sie ist nicht über federspulendick, unregelmäßig geringelt, außen schwärzlichgrau und enthält weniger Holz als Rinde; der Bruch ist weißlich und harzig, der Geschmack bitter und etwas scharf.

2) Röthlichgraue, rothgraue oder graue Ipecacuanha; sie hat äußerlich eine röthliche Farbe, unregelmäßige Ringe, einen harzigen, rosenröthlichweißen Bruch, und ihr Geschmack ist etwas bitterer als der der vorhergehenden.

3) Grauweiße, weiße oder größergeringelte Ipecacuanha, mit wenig hervorstehenden, fast regelmäßigen Ringen, von grauweißer Farbe, harzigem, weißlichem Bruche, bitterem Geschmack und von größerer Dicke, als die beiden vorhergehenden. Im Handel kommen von der ersteren etwa zwei, von der zweiten ein Drittheil vor, die dritte findet man dagegen äußerst selten.

Noch führen eine Menge anderer Wurzeln den Namen Ipecacuanha; so in America, nach Decandolle, alle die, welche brechenerregende Eigenschaften besitzen. Unter ihnen unterscheidet man die von Psychotria emetica, *Mut.*, einem Strauche Peru's (*Hayne* VIII. 19. Berl. Jahrb. XXII. t. II. *Mart.* Spec. mat. med. Bras. t. 8. f. 8—10 radix. *Rich.* Hist. Ip. t. 2. *Desc.* fl. méd. d. Ant. t. 120. *Humb.* Pl. aequin. II. t. 126. Fl. méd. IV. 201. *Bert.* Bild. VII. 24. f. 1.), die sogenannte schwarze, gestreifte, aschgrau, fußholzartige Ipecacuanha. Sie hat gar keine oder nur sehr wenige und unregelmäßige Ringe, aber Längsstreifen. Der Bruch ist harzig, aber weniger dicht, als bei den vorigen, und deutlich schwarzgrau, besonders wenn man sie befeuchtet. Sie hat keinen Geschmack. Sie kommt aus Peru, jedoch nur wenig in den Handel. Auch ist sie nicht sehr geschätzt.

Noch wird einer weißen oder stärkemehlartigen Ipecacuanha gedacht, die Wurzel von Richardsonia Brasiliensis, *Gom.* (Lus. *M.*) (*Hayne* VII. 21. *Aug. St. Hil.* pl. us. du Brés. t. VIII. *Mart.* l. c. I. t. 9. f. 13. 14 radix), an welcher man unregelmäßige, kaum halbkreisrunde Ringe bemerkt. Sie hat die Stärke einer Taubenfeder, ist runzelig, gedreht, weißgrau und ohne Geschmack. Sie riecht schimmelig. Der Bruch ist weiß, stärkemehlartig und durchaus nicht harzig. Man findet sie nie unter der käuflichen Ipecacuanha.

Die wahre Ipecacuanha enthält, nach Pelletier, einen fetten Stoff, Gummi, Satzmehl und besonders ein Alcaloid, das sogenannte Emetin (Emetina, Emetinum), dem sie ihre Eigenschaften verdankt. Dieses Alcali ist in der Wurzel der Psychotria in geringerer Menge vorhanden, als in der der Cephaëlis, und Richardsonia enthält dessen nur sehr wenig.

Reizend, Brechen und Stuhlausleerungen bewirkend, oder bloß aufregend oder tonisch, wenn man sie in geringer Gabe reicht. — Gabe, als Reizmittel, einen bis vier, als Brechmittel zwölf bis dreißig Gran in vier Unzen Wasser.

§. I. Präparate, welche die Ipecacuanha in Substanz enthalten.

Pulvis ad diarrhoeam s. antidiarrhoeicus. (*Sm.*)

℞. Ipecacuanhae . . . grana duo.
Sacchari . . drachmas quatuor.
Olei Nucis moschatae guttas duas.
Fiat pulvis in quatuor partes dividendus. — In vier und zwanzig Stunden, jedes Pulver in einem halben Glase Zuckerwasser zu nehmen und 15 oder 20 Tage lang fortzubrauchen. — Von Frank bei chronischer Diarrhoe empfohlen.

Pulvis emeto-catharticus. (*E. Ra.*)

℞. Ipecacuanhae grana viginti quatuor.

Rhei . . . . grana duodecim.
Fiat pulvis. (*Ra.*)
E. Ipecacuanhae et Rhei, singulorum scrupulum unum; in Syrup zu nehmen.

Pulvis motum peristalticum invertens s. nauseam ciens. (*Au. B.*)

℞. Ipecacuanhae grani quadrantem.
Sacchari . . grana quindecim.
Alle zwei Stunden zu nehmen. — Von Richter bei eingeklemmten Brüchen empfohlen. (*Au.*)

℞. Ipecacuanhae . granum unum.
Gummi Arabici,
Sacchari,
singulorum scrupulum unum.
Alle zwei Stunden zu nehmen, bei chronischen Catarrhen. (*B.*)

Pulvis emeticus s. vomicus. (RC. *Au.*)

℞. Ipecacuanhae,
Sacchari albi,
singulorum scrupulum unum.
Divide in partes quatuor. — Gabe, ein Stück alle Viertelstunden, bis Erbrechen eintritt.

℞. Ipecacuanhae,
Sacchari albi,
singulorum grana quindecim.
Sulphuris Antimonii aurati
grana quinque.
Divide in partes quatuor.

℞. Ipecacuanhae,
Sacchari albi,
singulorum grana quindecim.
Tartari stibiati . granum unum.
Divide in partes quatuor.

℞. Ipecacuanhae scrupulum unum.
Tartari stibiati . granum unum.
Misce ut fiat pulvis subtilissimus, pro dosi sumendus.

Pulvis febrifugus. (*Sm.*)

℞. Ipecacuanhae scrupulum unum.
Magnesiae subcarbonicae
unciam unam.
Divide in partes viginti quatuor. — Gabe, ein Stück alle drei Stunden, in einer Tasse Thee. — Von Wichmann empfohlen.

Pulvis expectorans. (*E. Par. Ra.*)

℞. Ipecacuanhae
grana viginti quatuor.
Scillae . . . grana duodecim.
Fiat pulvis. (*Ra.*)

℞. Ipecacuanhae . . . grana sex.
Myrrhae . . . grana duodecim.
Nitri . . . . semidrachmam.
Divide in partes quatuor. — Gabe, viertelstündlich ein Stück. (*E. Par.*)

Pulvis carminativus. (*Pie.*)

℞. Ipecacuanhae . granum unum.
Succini porphyrisati
grana duodecim.
Fiat pulvis.

Boli digestivi. (*Ca. Sw.*)

℞. Ipecacuanhae
grana duo ad quatuor.
Pulveris aromatici grana decem.
Syrupi Cinnamomi
quantum sufficit.

Pulvis alexiterius. (Ful.)

℞. Ipecacuanhae,
Extracti Opii,
singulorum grana sex.
Kali sulphurici . drachmas tres.
Gabe, zehen Gran.

Boli antidysenterici. (*Ca. Sm.*)

℞. Ipecacuanhae . . . grana duo.
Theriacae . . scrupulum unum.
Cretae praeparatae
quantum sufficit.

Boli adstringentes. (*Pie.*)

℞. Ipecacuanhae
granum unum cum dimidio.
Aluminis . . . . . grana sex.
Diascordii . . quantum sufficit.
Fiat bolus.

℞. Ipecacuanhae
granum unum cum dimidio.
Laudani liquidi Sydenhami
granum unum.
Conservae Cynorrhodi
quantum sufficit.
Fiat bolus.

Boli vomitivi. (*Ra.*)

℞. Ipecacuanhae grana octodecim ad viginti quatuor.
Mellis . . . quantum sufficit.
Fiant boli tres. — Halbstündlich zu nehmen.

Pilulae nauseam cientes. (*B.*)

℞. Ipecacuanhae . . . grana sex.
Rob Sambuci quantum sufficit ut fiant pilulae sex. — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden.

Pilulae expectorantes. (*E.*)

℞. Extracti Cicutae,
Pulveris Ipecacuanhae,
singulorum grana decem.
Fiant pilulae quatuor. — Gabe, zwei Stück auf einmal.

℞. Ipecacuanhae grana quindecim.
Saponis albi . quantum sufficit.
Fiant pilulae quindecim. — Gabe, ein Stück täglich vier Mal.

Linctus s. Marmelada pectoralis. (*Bo.*)

℞. Ipecacuanhae pulveratae
grana duodecim.

Florum Sulphuris scrupulum unum.
Radicis Iridis Florentinae
drachmam unam.
Mannae in lacrymis,
Syrupi Althaeae,
singulorum uncias duas.
Bei Keuchhusten empfohlen. — Gabe, ein Kaffeelöffel zwei oder drei Mal täglich.

Opiatum antidysentericum. (*Ca.*)

℞. Ipecacuanhae . semidrachmam.
Radicis Tormentillae
drachmam unam.
Opii purificati . grana quatuor.
Conservae Rosarum rubrarum,
Syrupi Myrtillorum,
singulorum drachmas sex.

Electuarium Ipecacuanhae moschatum s. vomitivum. (*Au.*)

℞. Pulveris Rhei,
— Tartari boraxati,
singulorum drachmam unam.
— Ipecacuanhae
semidrachmam.
— Moschi . . grana quatuor.
Sulphuris aurati Antimonii
grana decem.
Mellis . . . quantum sufficit.
Gabe, ein Kaffeelöffel, bis ein leichtes Erbrechen erfolgt. — Bärens empfiehlt es bei Keuchhusten.

Trochisci Ipecacuanhae. (An. B*. Ba. Bel. Bor4. Fer. Gal. Han. His. Suec. *Br. Ca. Fi. T. Vm.*)

℞. Ipecacuanhae . . partem unam.
Sacchari albi partes quadraginta.
Mucilaginis Tragacanthae cum Aqua Rosarum paratae
quantum sufficit.

Fiant trochisci granorum duodecim. (Fer. Gal. *Ca.*)

Br. Ipecacuanhae partem unam, Sacchari duodecim, et Mucilaginem Gummi Arabici ad formandos trochiscos nonaginta quatuor; — Bor4. Ipecacuanhae drachmas duas, Aquae fervidae q. s. stent loco calido per horas aliquot; colaturae expressae adde Gummi Tragacanthae q. s. ut cum Sacchari albissimi pulverati unciis sedecim massa fiat in trochiscos formanda; — His. Ipecacuanhae partem unam, Sacchari quadraginta quatuor, Gummi Tragacanthae tres et Aquae quantum satis ut fiant trochisci centum quadraginta quatuor; — B*. et Ba. Ipecacuanhae partem unam, Sacchari sexaginta et Mucilaginis Tragacanthae q. s. ut fiat massa, cujus drachma quaeque in trochiscos decem dividatur; — An. et Bel. Ipecacuanhae partem unam, Sacchari septuaginta duas et Mucilaginis Gummi Tragacanthae quantum satis ut fiant trochisci granorum decem; — Suec. Ipecacuanhae partem unam, Sacchari nonaginta sex et Mucilaginis Gummi Tragacanthae quantum sufficit ad formandos sexaginta trochiscos; — *Fi.* Radicis drachmas duas, Sacchari pulverati uncias sex, Mucilaginis Tragacanthae q. s. ut fiant trochisci no. 288; — *T.* Radicis drachmas duas, Sacchari pulverati uncias decem, Mucilaginis Tragacanthae cum Aq. Flor. Aur. paratae et aliquot guttis Essentiae Caryophyllorum aromatisatae quantum satis ut fiant trochisci granorum circiter sedecim, quorum quisque Ipecac. gr. ½ continet.

℞. Pulveris Ipecacuanhae
grana triginta sex.
Mucilaginis Gummi Arabici
quantum sufficit
ut fiant trochisci centum quadraginta quatuor. (Han.)

℞. Pulveris Ipecacuanhae
partem unam.
Sacchari . partes triginta duas.

Ipecacuanham cum aequali pondere sacchari tritam cum reliquo saccharo ad plumam cocto commisce. (*Vm.*)

Trochisci Ipecacuanhae opiatae. (GalH.)

℞. Ipecacuanhae . partes sedecim.
Sacchari albi
partes sexcentas quadraginta.
Extracti Opii . partes quinque.
Gummi Tragacanthae partes octo.
Aquae Florum Aurantii
quantum sufficit.

Opium in Aquae pauxillo solutum mucilagini addendo, trochisci formentur.

Trochisci Ipecacuanhae compositae. (B*.)

℞. Ipecacuanhae scrupulum unum.
Salis Ammoniaci . semunciam.
Chocolatae pulveratae
sesquiunciam.
Gummi Arabici drachmas duas.
Syrupi Capilli Veneris
quantum sufficit.

Fiant trochisci octoginta.

Potio vomitiva. (GalM. *Bo. ParC. Ra. Sa. Sm. Sw.*)

℞. Ipecacuanhae . grana duodecim.
Aquae . . . . uncias quatuor.
Misce bene. (*Ra.*)

GalM. et *Bo.* Ipecacuanhae grana viginti et Aquae uncias quatuor.

℞. Ipecacuanhae
grana viginti quatuor.
Aquae purae . . uncias novem.
Syrupi Capilli Veneris
unciam unam.
Misce bene. (Gal.)

ParC. Ipecacuanhae grana decem, Aquae uncias quatuor et unam unciam Syrupi Sacchari.

℞. Ipecacuanhae
grana viginti quinque.
Oxymellis scillitici
drachmam unam.
Aquae purae . . unciam unam.
Misce sedulo. (*Sw.*)

Sa. loco aquae purae Aquam alexiteriam simplicem adhibet.

℞. Ipecacuanhae . . grana decem.
Kermetis mineralis granum unum.
Aquae Cinnamomi hordeatae
drachmas quatuor.
— communis . . uncias sex.
Misce. (*Sm.*)

℞. Ipecacuanhae . scrupulum unum.
Tartari emetici . granum unum.
Syrupi Mellis . . . semunciam.
Aquae . . . . uncias quatuor.
Misce. (*Ra.*)

℞. Ipecacuanhae . . grana viginti.
Aquae . . . . uncias quatuor.
Tartari emetici . . grana duo.
Misce. (GalM.)

Auf zwei oder auf mehrere Male und selbst auf einmal zu nehmen.

Potio antispasmodica. (Ham.)

℞. Ipecacuanhae . . . grana tria.
Aquae Valerianae,
— Menthae piperitae,
singularum uncias tres.
Misce.

Potio antemetica s. antivomitiva. (*Sm.*)

℞. Ipecacuanhae
grana duo ad quatuor.
Natri subcarbonici . grana decem.
Syrupi Capitum Papaveris
unciam unam.
Aquae Menthae . . uncias sex.

Gegen krampfhaftes Erbrechen. — Alle Stunden oder zwei oder drei Stunden einen Löffel.

Mixtura emetica s. vomitiva. (B*.)

℞. Ipecacuanhae . . grana viginti.
Olei Amygdalarum dulcium
unciam unam.
Misce bene.

§. II. Präparate, welche das wirksame Princip der Ipecacuanha ohne das zur Ausziehung benutzte Vehikel enthalten.

Extractum Ipecacuanhae. (*Vm.*)

℞. Corticis Radicis Ipecacuanhae pulverati . . . . quantum vis.
Prelo de Real submitte, Aqua frigida humectans; post horas viginti quatuor apparatûs columnae pedum viginti duarum ad quinque Aquae bullientis pressurâ adhibita, liquidum, quamdiu colore praeditum prodeat, susceptum per pannum laneum (Flannell) colatum ad extracti consistentiam consume.

§. III. Präparate, welche das wirksame Princip der Ipecacuanha zugleich mit dem zur Ausziehung benutzten Vehikel enthalten.

A. Auszug durch Wasser.

Infusum Ipecacuanhae. (Ams. B*. Ful. Ham. Li. *Vm.*)

℞. Ipecacuanhae . drachmas duas.
Aquae bullientis . . uncias sex.
Post horae quadrantem infusionis cola. (Ful. Li.)

℞. Ipecacuanhae contusae
sesquidrachmam.
Corticis Aurantii . drachmas duas.
Aquae . . . . uncias quinque.
Infunde in vase tecto per semihoram et adde
Cremoris Tartari drachmas duas.
Vas tege et post refrigerationem cola absque expressione. Colaturae unciis quatuor adde
Oxymellis . scillitici semunciam.
Misce bene. (Ams. B*. Han. *Vm.*)

Gabe, alle Viertelstunden einen bis zwei Löffel.

Infusum tonicum. (*Bo.*)

℞. Ipecacuanhae contusae
grana viginti quinque.
Corticis Aurantiorum amarorum
drachmam unam.
Aquae . . . . quantum sufficit ut colaturae unciae sex obtineantur, quibus adde
Syrupi Florum Aurantii
unciam unam.

Gabe, ein Eßlöffel eine halbe Stunde vor jeder Mahlzeit.

Decoctum Ipecacuanhae. (*Sp.*)

℞. Ipecacuanhae grossiuscule pulveratae . . . . drachmas duas.
Aquae fontanae . uncias quatuor.
Decoque blando igne ad dimidium et cola; residuo bis eodem modo cocto, colaturae tunc commisceantur.

Bei Ruhr empfohlen. — Auf dreimal zu nehmen, drei Tage hinter einander.

Syrupus Ipecacuanhae aquosus. (Bor. Gal. Li. *Fi. T. Vm.*)

℞. Radicis Ipecacuanhae contusae
scrupulos octo.

Infunde
Aquae communis fervidae
quantitatem sufficientem
ad colaturam unciarum novem, cui
adde
Sacchari albissimi uncias sedecim.
Fiat ebullitione unica syrupus. (Bor4.)

℞. Radicis Ipecacuanhae griseae contusae . . . . . semilibram.
Aquae . . . . . libras septem.
Coque in vase clauso ad liquidi librarum sex remanentiam; subsideant; tunc clarificatis filtratisque addantur
Sacchari albi . librae duodecim.
Coque ad consistentiam syrupi. (Gal.)

T. Ipecacuanhae uncias duas, Aquae communis libras duas et uncias quatuor ad librarum duarum remanentiam coquere et liquori post refrigerationem et subsidentiam decanthato filtratoque addere Sacchari libras quatuor, ut fiat syrupus; — *Fi.* Ipecacuanhae cinereae unciae uni Aquae bullientis uncias quatuordecim infundere et leviter ad unius librae remanentiam coquere, filtrare per chartam et additis Sacchari albissimi libris duabus balnei aquae ope in vase clauso syrupum parare.

℞. Ipecacuanhae grossiuscule contusae . . . . . partem unam.
Aquae frigidae . quantum satis ad humectandum. Post horas duodecim adde
Aquae bullientis . partes viginti.
Refrigeratis et colatis adde
Sacchari albi
partes viginti quatuor.
Clarifica et vaporando ad syrupi consistentiam inspissa. (*Vm.*)

℞. Ipecacuanhae . . libram unam.
Aquae . . . . . libras sex.
Macera per horas duodecim, residuo infunde Aquae aequalem quantitatem; infusis tum commixtis et filtratis fiat coctione sufficiente, cum Sacchari libris viginti quatuor syrupus.

℞. Ipecacuanhae . . . semunciam.
Aquae . . . . libras quinque.
Coctis per octo vel decem sexagesimas et colatis adde
Sacchari albi
libras duas cum dimidia.
Coquendo ad syrupi consistentiam redactis adde denique
Aquae Florum Aurantiorum
unciam unam.
Misce. (Li.)

Syrupus incisivus s. expectorans. (Fer. *Bo. Pie. Sw*.*)

℞. Radicis Ipecacuanhae
drachmas duas,
— Iridis Florentinae,
Lichenis pyxidati,
singulorum unciam unam.
Sacchari . . . . . libras duas.
Fiat syrupus. (*Sw*.*)

B. et *Pie.* Radicis Iridis unciam unam, Lichenis semunciam et Polygalae Virginicae tantidem.

Syrupus Ipecacuanhae compositus s. pectoralis de Courti. (B. Fer. *Pie. T.*)

℞. Polygalae Virginicae,
Lichenis Islandici,
singulorum uncias duas.
Chinae rubrae contusae semunciam.
Iridis Florentinae drachmas duas.
Ipecacuanhae . drachmam unam.
Sacchari . . . . . libras duas.
Fiat syrupus. (*B. Pie.*)

℞. Ipecacuanhae . . uncias duas.
Chinae . . . . uncias quatuor.
Opii . . . . . scrupulos duos.
Aquae . . . . . libras septem.
Macera per dies duos vel tres et decantha, et hoc cum Aqua nova tam diu repete quam haec colorem extrahat; liquoribus filtratis adde
Sacchari albi . . libras novem.
Evaporent in balneo aquae ad syrupi consistentiam. (Fer.)

T. Aquae libras sex, evaporationem ad librarum quatuor cum dimidia remanentiam, caeterum ut Fer.

Potio emetica s. vomitiva. (Ful.)

℞. Cremoris Tartari semidrachmam.
Aquae bullientis . uncias quatuor.
Colaturae adhuc ferventi adde
Pulveris Ipecacuanhae
drachmas duas.
— Corticum Aurantiorum
drachmam unam.
Post aliquot tempus filtra. — Löffelweise.

Potio febrifuga. (*Ca. Sm.*)

℞. Ipecacuanhae . sesquidrachmam.
Corticis Aurantii . drachmas duas.
Cremoris Tartari . semunciam.
Aquae . . . . uncias quatuor.
Coctis et colatis adde
Oxymellis scillitici . semunciam.
Misce bene. (*Ca.*)

Sm. Ipecacuanhae semidrachmam ad drachmam, Corticis Aurantiorum drachmas duas, Cremoris Tartari tantidem, Aquae uncias duodecim coquendo ad octo redactas et Oxymellis scillitici uncias duas.
Löffelweise zu nehmen.

Potio expectorans et incisiva. (Gal. *Bo. Ca.*)

℞. Ipecacuanhae . drachmam unam.

Folliculorum Sennae
drachmas duas.
Aquae bullientis . . uncias sex.
Post horas duodecim infusionis colatarae adde
Oxymellis scillitici,
Syrupi Hyssopi,
singulorum unciam unam.
Bei'm Keuchhusten. — Gabe, Kindern des Morgens sechs Kaffeelöffel.

Mixtura expectorans et tonica. (*Pie.*)
℞. Ipecacuanhae . . grana decem.
Corticis Aurantiorum immaturorum,
Lichenis Islandici,
singulorum drachmas duas.
Aquae . . . . . uncias sex.
Coque per semihoram, tunc liquorem infunde
Herbae Hyssopi,
Radicis Polygalae Virginicae,
singularum manipulo uno.
Cola et adde
Syrupi Boraginis . unciam unam.
Löffelweise, bei Catarrhalbeschwerden.

B. Auszug durch Wein.

Vinum s. Tinctura Ipecacuanhae s. Ipecacuannae, Infusum Ipecacuanhae vinosum, Vinum Psychotriae s. Psychotriae emeticae. (Am. Ams. An. B. Bel. Du. Ed. Fenn. Li. Lon. LonN. Lus. RC. Suec. *Br. C. Sw. Vm.*)

℞. Ipecacuanhae contusae
partem unam.
Vini albi boni partes quindecim.
Macera per tres dies et filtra. (Ams. B. Bel. Ed. Lus. *Br. Sw.*)

RC. Vinum Hispanicum album et dierum septem macerationem; — Am. Du. Lon. et *C.* Ipecacuanhae uncias duas, Vini albi Hispanici octarios duos et macerationem per dies quatuordecim; — Fenn. et Suec. Ipecacuanhae drachmas sex et Vini albi Hispanici semilibram; — *Vm.* Ipecacuanhae partem unam, Vini Maderani triginta duas; — Li. Ipecacuanhae drachmas sex et Vini Hispanici uncias sex.

℞. Ipecacuanhae contusae
uncias duas,
Spiritus tenuioris
fluiduncias duodecim.
Aquae destillatae
fluiduncias viginti.
Macera per dies quatuordecim et cola. (LonN.)

℞. Ipecacuanhae grossiuscule contusae . . . . . unciam unam.
Vini albi . . . . uncias octo.
Alcoholis (20°) . . uncias duas.
Digere in arenae balneo per tres dies, cola et residuo infunde
Vini albi . . . uncias quatuor.
Alcoholis (20°) . unciam unam.
Post duos dies digestionis cola et colaturas commixtas filtra. (An.)

Vinum emeticum s. Ipecacuanhae compositum. (B°. Wür.)
℞. Ipecacuanhae . . uncias duas.
Corticis Aurantiorum semunciam.
Vini generosi
libras duas cum dimidia.
Infunde frigidè per dies aliquot et cola. (Wür.)

℞. Ipecacuanhae . uncias quatuor.
Sacchari albi . . . uncias duas.
Alcoholis (32°) . . libras duas.
Digere in balneo arenae per hebdomadem et adde
Vini albi . . . . libras octo.
Anisi stellati . . unciam unam.
Sacchari albi . uncias quatuor.
Post sex dies filtra. (B°.)
Eine Unze ist gleich 18 Gran Ipecacuanha.

Syrupus Ipecacuanhae compositus. (*Pie.*)
℞. Ipecacuanhae contusae drachmas quinque et scrupulum unum.
Vini albi . . . . libram unam.
Infusis per horae quadrantem adde
Aquae bullientis . libras quatuor.
Salis vegetabilis . uncias quatuor.
Serpylli . . . . drachmas sex.
Corticis Aurantii amari drachmas quinque et scrupulum unum.
Infunde per horas quatuor, cola et adde
Syrupi Althaeae . . libras duas.
Aquae Florum Aurantiorum
uncias duodecim.

Syrupus de Desessarts. (*B. Br°. Ca. Pie.*)
℞. Ipecacuanhae contusae
unciam unam.
Sennae mundatae . uncias tres.
Vini albi . uncias viginti quatuor.
Macera per horas duas, decantha liquorem et filtratum sepone; residuo adde
Magnesiae sulphuricae uncias tres.
Summitatum Serpylli
unciam unam.
Florum Rhoeados uncias quatuor.
Aquae bullientis . . libras sex.
Stent in infusione per quatuor horas, tunc cola, filtra liquorem et adde
Aquae Florum Aurantiorum
uncias viginti quatuor.
Sacchari albi contusi
libras quindecim
et tincturam vinosam, misce et frigide solve.

C. Auszug durch Alcohol.

Tinctura Ipecacuanhae. (*T. Vm.*)

℞. Ipecacuanhae . . unciam unam.
Alcoholis 26° B. . uncias octo.

Digere per duodecim vel quindecim dies. (T.) Besonders zur Bereitung des syrup. alcoh. Ipec.

℞. Ipecacuanhae . . partem unam.
Aquae Vitae,
Vini Maderani,
singulorum partes quatuor.

Stent in infusione frigida per plures dies, quo facto expressa filtra. (*Vm.*)

Jéromel hat folgendes Verfahren vorgeschlagen:

℞. Ipecacuanhae griseae grossiuscule pulveratae . . uncias quatuor.
Alcoholis (37° B.) . libram unam.

Digere in balneo vaporis per horas viginti quatuor, caloris 34° ope, subinde agitando; refrigerata filtra; residuo infunde

Alcoholis (22°) . libram unam.

Digerentur denuo in vaporis balneo per horas viginti quatuor et filtrentur. Residuo infunde

Aquae fluviatilis filtratae fervidae libram unam.

Continuetur infusio per horas viginti quatuor; tunc, refrigefactis, quod subsedit, filtri ope separa; commisce tincturas et agitatas sepone e quibus praecipitatum abundans quod subsedit post horas duodecim separatur. E liquore filtrato destillatione libris duabus Alcoholis abstractis, liquidum quod in balneo aquae remansit, filtra et ei Alcoholis 36° B. unciam unam adde.

Die letztere Tinctur ist sehr stark, indem sie in zwei Unzen Flüssigkeit sechs und funfzig Gran Stoff aufgelöst enthält.

Syrupus Psychotriae emeticae s. Ipecacuanhae (alcoholicus). (An. Bel. *T.*)

℞. Radicis Ipecacuanhae contusae . unciam unam.
Alcoholis 20° uncias novem cum dimidia.

Macera radicem per septimanam in Alcoholis dimidio; decantha et quod liquidi restat, pulpae infunde. Digere in aquae balneo, filtra et cum tinctura antea parata commisce. Tunc mixturae drachmis quinque Syrupi communis tepidi libram unam addendo fiat syrupus. (An.)

Bel. eandem formulam, sed Alcoholem 10°; — *Jéromel* syrupum parare proposuit commiscendo Tincturae Ipecacuanhae suae uncias duas cum Syrupi communis libra una et unciis duabus et, ut consistentia requisita obtineatur, per momentum coquendo; — *T.* Tincturae (*T.*) unciam unam, Syrupi simplicis 32° B. uncias triginta; misce agitando.

Tinctura Ipecacuanhae anisata. (*Bo. Ca. Ra.*)

℞. Ipecacuanhae pulveratae unciam unam.
Spiritus Anisi . uncias quatuor.

Digere. (*Ca.*) — Interdum Sacchari vel Syrupi Capilli Veneris pauxillum additur.

Ra. Ipecacuanhae unciam unam et duas Spiritus; — *Bo.* Spiritus Anisi et Sacchari, singulorum uncias quatuor, Tartari emetici grana duodecim, Ipecacuanhae unciam unam, Vini albi libras duodecim et quatuordecim dies infusionis.

Ein Brechmittel, welches Albert besonders bei Kindern empfohlen hat. — Gabe, eine bis zwei Unzen.

Elixir sudorificum Willisii. (*Ca.*)

℞. Ipecacuanhae,
Balsami Tolutani,
singulorum semunciam.
Florum Benzoës,
Opii purificati,
Croci, singulorum drachmas duas.
Olei essentialis Anisi drachmam unam.
Camphorae . . scrupulos duos.
Alcoholis . . . . libras duas.

Reizend, schweißtreibend. — Gabe, eine bis zwei Drachmen. — Eine halbe Unze enthält zwei Gran Opium.

Iris.

In den Pharmacopöen werden mehrere Arten dieser Pflanzengattung aufgeführt:

1) *Iris Germanica, L.*; Deutscher, blauer Schwerdtel; Flambe vraie (*Gal.*); Blue flower de Luce (*Ing.*); Kosatec (*B.*); Sverdlilie (*D.*); Lirio de Alemania (*His.*); Blaawe iris (*Hel.*); Giglio celeste azurro (*I.*); Mieczyk ziele (*Pol.*); Lirio roxo dos montes (*Lus.*); Swaeras lilja (*Suec.*).

Ams Br. Fer. Ful. Gal. Gen. His. Pal. Wir. Wür. *Be. G. M. Sp.* Z.

♃ (Triandria Digynia, L.; Irideae, *J.*) Eine Europäische Pflanze. (*Bull.* t. 141. *Blackw* t. 69. *Plenck* t. 54. Dict. de Sc. nat. cah. 5. *Zorn.* Ic. pl. t. 188.)

Man wendet die Wurzel (radix Ireos nostratis s. Gladioli coerulei) an: sie ist lang, walzig, gegliedert, dick, fleischig, runzelig, außen bräunlich und faserig, innen weiß. Frisch ist ihr Geruch unangenehm, getrocknet schwach veilchenartig. Der Geschmack der frischen Wurzel ist scharf und beißend, wird aber bitter und widerlich, wenn sie getrocknet ist.

2) *Iris Pseudacorus, L.*; Ackermann, Wasserschwerdtwurzel, gelbe Teichlilie, fal-

sche Acoruswurz, unächter Kalmusschwerdtel; Flambe bâtarde, Faux acore, Acore bâtard (*Gal.*); Yellow iris (*Ang.*); Svaerdlilie (*D.*); Acore bastardo (*His.*); Geel lisch (*Bel.*); Irida gialla (*I.*); Mieczyk zo.ty (*Pol.*); Svaerds lilja (*Suec.*).

Br. Gal. Wir. *Be. G. M. Sa. Sp.*

4 Eine Europäische Pflanze. (*Bull.* t. 137. *Blackw.* t. 261. *Plenck* t. 36. *Zorn* Ic. pl. t. 187.)

Man wendet die Wurzel (radix Acori palustris s. vulgaris s. Pseudacori s. Acori adulterini s. Ireos palustris s. Gladioli lutei) an; sie ist lang, etwas zusammengedrückt, daumenstark und stärker, außen schwärzlichbraun und runzlig, innen röthlich und schwammig. Sie hat einen starken und unangenehmen Geruch und einen scharfen, styptischen Geschmack.

Beide Wurzeln sind purgirend.

3) *Iris foetidissima*, L.; Waldläusekraut, stinkende Schwerdtlilie; Iris fétide, Glayeul puant (*Gal.*); Stinking gladwyn (*Ang.*).

Gal.

4 (Triandria Monogynia, L.; Irideae, J.) Eine Europäische Pflanze. (*Blackw.* Herb. t. 158.)

Man wendet die Wurzel (radix Xyridis s. Spathulae foetidae) an; sie besitzt einen unangenehmen Geruch und einen scharfen Geschmack.

4) *Iris Florentina*, L.; Florentinischer Schwerdtel, Violenwurzel, Veilchenwurz, Veilchenwurzel; Iris de Florence (*Gal.*); Florantine orris (*Ang.*); Ussul, ussosunul, Asmon junie, Irsa (*Ar.*); Fialowy koren (*R.*); Piolrod (*D.*); Lirio de Florencia (*His.*); Irsa (*Hin.*); Florentynse iris (*Bel.*); Irios, Giaggiolo, Giglio celeste, Iride di Firenze (*I.*); Korzen fiolkowy (*Pol.*); Irio de Florença (*Lus.*); Piolrot (*Suec.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. HasiP. His. Li. Lus. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *A. Be. Br. C. Fi. G. M. Pid. Sa. Sp.* Z.

4 Eine Pflanze des mittägigen Europa's. (*Blackw* t. 414. *Plenck* t. 35. Fl. méd. IV. 204.)

Die Wurzel (radix Ireos s. Iridis Florentinae), welche angewendet wird, ist dick, knotig, derb, außen bräunlich, innen weiß. Sie hat einen scharfen, bittern und anhaltenden Geschmack. Man verkauft sie gemeiniglich, nachdem man die Oberhaut abgezogen, in walzigen, abgeplatteten, höckrigen Stücken von rosenröthlichweißer Farbe, welche fast ohne Geruch sind, aber einen sehr angenehmen Veilchengeruch besitzen.

Sie enthält, nach Vogel, Schleimharz, einen braunen Extractivstoff, Satzmehl, ein fettes und ein flüchtiges Oel, Pflanzenfaser ꝛc. Speri hat Emetin darin entdeckt.

Frisch, purgirend, auch gilt sie als einschneidendes und als Niesemittel. Man verordnet sie bisweilen bei Catarrhen. — Gabe des Pulvers, ein Scrupel; des Safts, eine bis zwei Unzen in vier Unzen Wein.

5) *Iris versicolor*, L.; bunte Schwerdtlilie; Iris variée (*Gal.*); Blue flag (*Ang.*).

Am. C.

4 Eine Pflanze Nordamerica's. (Hort. Elth. t. 155. f. 187.)

Die Wurzel, welche angewendet wird, ist faserig.

Species diaereos. (An. B*. Br. Pal. Wir. *Sp. Vm.*)

℞. Radicis Iridis Florentinae,
Sacchari crystallisati (Candis) albi,
Specierum diatragacanthae frigidarum, singulorum drachmas sex.
Fiat pulvis. (Br. Pal. Wir. *Sp.*)

B*. Iridis semunciam, Specierum et Sacchari, singulorum drachmas duas; — *Vm.* Iridis et Specierum, singularum partem unam et Sacchari unam cum dimidia; — An. Iridis partes duas, Gummi Tragacanthae et Sacchari, singulorum unam; — Han. Iridis semunciam, Gummi Tragacanthae et Sacchari, singulorum drachmas duas.

Pulvis puerorum citrinus. (Br.)

℞. Radicis Iridis Florentinae uncias octo.
— Liquiritiae drachmas sex.
Anisi,
Foeniculi,
singulorum drachmas tres.
Croci drachmas duas cum dimidia.
Sacchari . pondus toti aequale.
Fiat pulvis.

Species pro odoramento s. odoriferae. (*Sp.*)

℞. Florum recentium Rosarum rubrarum . . . . . semunciam.
— Lavandulae
drachmas duas cum dimidia.
Ligni Rhodii . . . semunciam.
Radicis Iridis Florentinae uncias duas.
Herbae recentis Basilici,
— — Calaminthae montanae,
— — Majoranae,
singularum drachmas duas.
— — Menthae piperitae scrupulos quatuor.
— — Origani,
— — Pulegii,

Herbae recentis Salviae,
— — Saturejae,
Corticis Aurantii,
— Citri,
singulorum drachmas duas.
Cinnamomi,
Summitatum Rorismarini,
Caryophyllorum,
Macidis, singulorum drachmas tres.
Foliorum Lauri . . semunciam.
Moschi cum Sacchari pauxillo triti grana duo.
Ambrae griseae itidem tritae grana quatuor.
Fiat pulvis grossus.

Species cephalicae pro cucuphis. (Br. Pal. Wir. *Sp.*)

℞. Radicis Cyperi rotundi,
— Iridis Florentinae,
singularum semunciam.
Florum Lavandulae,
— Rorismarini,
— Rosarum,
singulorum drachmas sex.
Ligni Rhodii,
— Santali citrini,
— Aloës,
singulorum semunciam.
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Nucis moschatae,
Succini flavi,
Styracis, singulorum drachmas tres.
Concisa contusaque misce. (Br. Wir.)

℞. Radicis Iridis Florentinae uncias tres.
Herbae Lavandulae,
— Majoranae,
singularum unciam unam.
Ligni Rhodii,
— Santali citrini,
singulorum drachmas sex.
Cinnamomi . . drachmas duas.
Corticis Aurantii . . semunciam.
— Citri . . sesquiunciam.
Caryophyllorum drachmas duas cum dimidia.
Benzoës,
Mastichis,
Storacis Calamita,
Succini flavi,
singulorum semunciam.
Concisa contusaque misce. (*Sp.*)

℞. Radicis Iridis Florentinae sesquiunciam.
Herbae Betonicae,
— Majoranae,
— Rorismarini,
singularum semunciam.
— Salviae . drachmas duas.
Florum Rosarum rubrarum unciam unam.
— Lavandulae,
— Cheiri,
singulorum drachmas duas.
Storacis in granis,
Succini rasi,
singulorum drachmas tres.
Nardi Indicae,
Santali citrini,
Ligni Rhodii,
singulorum drachmas duas.
Caryophyllorum,
Cyperi rotundi,
Cinnamomi,
Benzoës,
singulorum scrupulos quatuor.
Fiat pulvis. (Pal.)

Extractum Iridis Florentinae. (Sar. Wir.)

℞. Radicis Iridis Florentinae partem unam.
Aquae bullientis . . partes sex.
Infusionem post tres dies coque parumper, cola exprimendo et liquorem vaporando ad extracti consistentiam consume. (Wir.)
Sar. infusum pro tertia parte consumere et tunc colare et evaporare.

Faecula Ireos. (Gal. Gen. Pal. *T.*)

℞. Radicis recentis Iridis quantum vis.
Raspa et pulpam in saccum e tela confectum inclusam prelo subjice; succum Aquae pauxillo addito, sepone, quo facto, parte limpida decanthata, faecula blando calore siccata pulveretur.

Confectio Iridis. (*Vm.*)

℞. Radicis Iridis Florentinae partem unam.
Sacchari albi . . . partes tres.
Contere.

Conditum Iridis saccharatum s. Marmelada Iridis. (*Sw*.*)

℞. Radicis Iridis Florentinae libram unam.
Kali subcarbonici . unciam unam.
Scillae contusae drachmam unam.
Aquae . . . . libras quatuor.
Macera blando igne donec mollefiant; trajice per cribrum, residuo novam Aquam infunde, macera et iterum cola; et hoc repete donec omnia cribrum transierint. Adde deinde
Sacchari,
Syrupi Sacchari,
singulorum libras tres.
Evaporatis ad gelatinae spissae consistentiam denique adde
Extracti Martis pomati uncias duas.

gencatarrhen. — Gabe, vier, fünf oder sechs Kaffeelöffel täglich.

Rotulae diaereos, Tabellae Iridis Florentinae compositae, Trochisci hechici albi. (An. Br. Wir.)

℞. Specierum diaereos unciam unam.
Sacchari albi in Aqua Violarum dissoluti et ad plumam cocti uncias duodecim.

Fiant trochisci. (Br. Wir.)

℞. Radicis Iridis Florentinae sesquiunciam.
Amyli . uncias duas cum dimidia.
Sacchari albi . . uncias viginti.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae quantum sufficit

ut fiant trochisci. (An.)

Pasta Iridis Florentinae. (Vm.)

℞. Radicis Iridis Florentinae partem unam.
Aquae frigidae . partes sedecim.

Post horarum aliquot infusionem cola; colaturam calefac cum
Gummi Arabici . partibus viginti, et solutioni adde
Sacchari crystallisati (Candis) partes quindecim.

Clarificata albuminis ope cola et ad gelatinae consistentiam evaporata marmori oleo illito infunde

Aqua violacea. (Sp.)

℞. Radicis Iridis Florentinae uncias quatuor.
Alcoholis . uncias triginta duas.

Stent in infusione per dies quatuordecim.

Schönheitsmittel.

Oleum Iridis s. Ireos s. irinum. (Br. His. Pal. Sar. *T.*)

℞. Radicis et Florum Iridis partem unam cum dimidia.
Olei Olivarum . . partes tres.

Digere in balneo aquae per duos dies, refrigerata exprime et macerationem cum nova herba repete. (Sar.)

T. Macerare jubet Florum Iridis uncias quindecim in Olei Olivarum libris quinque soli exposita per tres vel quatuor dies filtrare hocque cum simili florum quantitate bis repetere, supremam macerationem per mensem circiter protrahendo et oleum aliquot dierum sepositione clarefactum decanthare.

℞. Radicis et Florum Iridis,
Olei Olivarum,
singulorum partes aequales.

Coque blando igne ad humidi usque consumptionem. (Pal.)

℞. Radicis recentis Iridis sesquilibram.
Olei Olivarum . . . libras tres.

Digere per horas viginti quatuor, coque deinde ad humidi consumptionem, cola cum expressione, colaturam infunde Florum Iridis semunciae, digere per horas duodecim, coque ad humidi consumptionem et cola. (His.)

℞. Succi Radicis et Florum Iridis,
Olei Olivarum,
singulorum partes aequales.

Coque ad consumptionem humidi et exprime. (Br.)

Unguentum pectorale. (Sar. Wir. *Sp.*)

℞. Olei Amygdalarum dulcium uncias quatuor.
— Chamomillae,
— Violarum,
singulorum uncias tres.
Butyri . . . . . uncias sex.
Adipis Gallinarum,
— Anatum,
singulorum uncias duas.
Cerae albae . . . uncias tres.
Massae liquatae adde
Pulveris Iridis Florentinae drachmas duas.
— Crooi . semidrachmam.

Misce bene. — Ehedem Kindern bei mühsamem Husten und Athmen empfohlen.

Acetum aromaticum. (Fer. *T.*)

℞. Aceti albi . . . . . libras sex.
Radicis Iridis,
Petalorum Rosarum,
— Dianthi,
singulorum unciam unam.
Cinnamomi,
Nucis moschatae,
Caryophyllorum,
Corticis Aurantii,
Storacis,
Benzoës,
singulorum drachmas duas.
Majoranae,
Menthae,
Thymi,
Dictamni Cretici,
singulorum unciam unam.

Post digestionem per mensem fiat moderato calore destillatio.

Isatis.

Isatis tinctoria, L.; Waid, Scharte, Färberwaid; Pastel (*Gal.*); Woad (*Ang.*); Wede (*D.*); Pastel (*His. Lus.*); Verfwede (*Bel.*); Guado (*I.*); Linilo (*Pol.*); Vejde (*Suec*).

Br. Gal. *Be. G.*

♂ (Tetradynamia Siliculosa, L.; Cruciferae, *J.*) Eine Europäische Pflanze. (*Blackw.* t. 246. *Schk.* t. 188. *Lam.* t. 554. *Zorn* Ic. pl. t. 191. *Bert.* Bild. II. 10. f. 1.)

Man wendet das Kraut (herba Glasti s. Isatis) an; es besteht aus glatten, etwas blaugrünen Blättern, von denen die Wurzelblätter lanzettförmig und gestielt, die Stängelblätter sitzend, halbumfassend und am Grunde in zwei Anhänge verlängert sind. Es hat einen scharfen und etwas bittern Geschmack.

Man zieht daraus einen dem Indigo ähnlichen Stoff, Indigotin (Indigotinum s. Indigotina) oder Isatin (Isatina s. Isatinum).

J.

Jacea.

In den Pharmacopöen kommen zwei Pflanzen dieses Namens in Erwähnung:

1) *Jacea nigra, Moe.*; gemeine schwarze Flockenblume; Jacée (*Gal.*); Common knapweed (*Ang.*); Knopurt (*D.*); Knopkruid (*Bel.*); Knapper (*Suec.*); Erba trinitas, Suocera, Nuora, Fiore del pensiero (*I.*).

Gal. Gen.

4 (Syngenesia Polygamia Frustranea, L.; Synanthereae, *Cass.*) Eine in Europa sehr gemeine Pflanze. (*Oed.* Fl. Dan. t. 519.)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an.

Die Wurzel (radix Jaceae nigrae) ist holzig und hat einen schwach adstringirenden Geschmack.

Das Kraut besteht aus einem ästigen, harten, steifen, rauhen, fast glatten Stängel, dessen untere Blätter gezähnt, die obern sitzend, eirundlanzettig und gewöhnlich ganz sind. Es hat einen süßlichbittern Geschmack.

Schwach adstringirend und tonisch.

2) *Viola tricolor, L.*; Dreifaltigkeitsblume, Stiefmütterchen, Freisamkraut; Pensée (*Gal.*); Three coloured violet (*Ang.*); Stedmodersblomst (*D.*); Pensamientos (*His.*); Driekleurige Viool (*Bel.*); Fiore del pensiero (*I.*); Fiolek potrogny, Brat zsiostra (*Pol*); Amor perfetto (*Lus.*); Wdowki (*R.*); Styfmorsblomster (*Suec.*).

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Fenn. Fer. Ful. Gal. Ham. Han. Hass. HassP. Li. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *Be. Br. Fi. G. M. Sp.*

⊙ (Syngenesia Monogamia, *L.*; Violaceae, *J.*) Eine sich in ganz Europa findende Pflanze. (*Hayne* III. 4. 5. *blackw.* t. 44. *Plenck* t. 641. Düss. off. Pfl. II. 8. *Zorn* Ic. pl. t. 290.)

Man wendet das Kraut (herba Jaceae s. Violae tricoloris s. Trinitatis) an; es besteht aus einem ästigen, dreikantigen Stängel mit abwechselnden, eirunden, gezähnten, von fiederspaltigen Nebenblättern begleiteten Blättern. Es hat einen etwas scharfen Geschmack.

Reizend, blutreinigend, harntreibend, besonders gegen Flechten und Milchgrind empfohlen.

Extractum Jaceae. (Fenn.)

℞. Herbae Jaceae . partem unam.
Aquae bullientis . . partes sex.
Coque per horae quadrantem, cola, exprime; residuum cum nova Aqua coctum itidem coquatur; liquores commixti in balneo aquae evaporent.

HassP. inter praeparata nominat sed parationem non communicat.

Decoctum Herbae Jaceae s. Violae tricoloris cum Aqua. (B*. *Fi.*)

℞ Herbae Jaceae . drachmas sex.
Aquae fontanae . quantum sufficit ut coquendo unciae sex colaturae obtineantur. — Gegen Milchschorf, Flechten und Kopfgrind. — Gabe, alle zwei Stunden einen Löffel.

Fi. Herbae recentis drachmam unam vel duas (siccae drachmam unam), Aquae q. s. ut decocti libra una obtineatur.

Decoctum Jaceae s. Herbae Violae tricoloris cum lacte. (B*. *Au. Fi.*)

℞. Herbae Jaceae . . semunciam.
Lactis vaccini . . libram unam.
Coque leniter et cola. — In denselben Fällen wie das vorhergehende empfohlen. — Die vorgeschriebene Gabe Morgens und Abends zu wiederholen.

Fi. ut decoctum aquosum, loco aquae Lac sumendo.

Infusum Herbae Jaceae. (*Au.*)

℞. Herbae Jaceae . drachmas duas.
Aquae bullientis . uncias duas.
Infusione peracta colaturae adde
Vini stibiati . scrupulum unum.
Syrupi Althaeae . drachmas duas.
Gabe, alle zwei Stunden einen oder zwei Kaffeelöffel.

℞. Herbae Jaceae,
Sacchari Lactis,
singulorum drachmas duas.
Sulphuris praecipitati,
Magnesiae subcarbonicae,
singulorum semidrachmam.
Gabe, einen Scrupel alle zwei Stunden.

Mistura in haematuria chronica, Tisana leniens. (*B.*)

℞. Seminum Cannabis unciam unam.
Aquae . . . . quantum sufficit ut decocti libra una obtineatur. Sub finem adde
Florum Jaceae . . semunciam.
Stent in infusione per tempus aliquot, colaturae infunde
Syrupi Althaeae . unciam unam.

Jalapa.

Convolvulus Jalapa, L.; Jalape, Jalappwurzel; Jalap (*Gal.*); Jalapa (*Ang.*); Galapa (*B.*); Jalap (*D.*); Jalappe (*Bel.*); Scialappa, Sciarappa, Gialappa, Jalappa (*I.*); Jalappa (*His. Lus. Suec.*); Jalopy (*Pol.*).

Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pal. R. RC. Sax. Suec. Wir. Würt. *Be. Br. C. Fi. G. M. Par. Pid. Sa. Sp.* Z.

♃ (Pentandria Monogynia, L.; Convolvulaceae, *J.*) Eine Pflanze Mexico's. (Ann. du Mus. II. 40. 41. *Plenck* t. 94. Berl. Jahrb. XXV. Fl. méd. IV. 207. *Bert.* Bild. III. 18. fig. 2.)

Man wendet die Wurzel (radix Jalappae s. Jalappii s. Gialappeae s. Chelapae s. Rhabarbari nigri s. Gelappii s. Mechoacannae nigrae) an; sie ist dick, lang, derb, in runden oder dicken, sehr schweren, runzligen Stücken, welche außen schwärzlichbraun, inwendig aschgrau, mit concentrischen Linien, mit glattem, welligem, überall mit glänzenden Puncten bestreutem Bruche. Das Pulver ist bräunlichgelb; der Geruch eigenthümlich, der Geschmack scharf, beißend und etwas widerlich.

Sie enthält, außer Gummi, Harz, Satzmehl ꝛc. einen eigenthümlichen Stoff, die Jalapine (Jalapina), in welchem Hume den Grund ihrer Wirkung sucht.

Gabe des Pulvers, ein oder zwei Scrupel.

§. I. Präparate, welche die Jalape in Substanz enthalten.

Pulvis laxans s. purgans, Pulvis laxans cum sale s. cum Mercurio, Pulvis laxativus vegetabilis, Pulvis Jalappae compositus s. salinus s. tartaricus s. hydrargyratus, Pulvis Radicis Jalappae cum Natro s. Kali sulphurico s. cum Hydrargyro muriatico miti, Species diojalappae, Specificum jalappinum. (Am. B*. BorC. Br. D. DD. Ed. Fenn. Ful. Gal. GalM. Gen. His. Li. Pal. RC. Suec. Wir. Würt. WW. *Au. C. Cā. E. Huf. Pis. Ra. Sa. Sp. Sw.*)

1) Ohne ein Salz.

℞. Pulveris Jalapae . uncias duas.
Sacchari albi . . unciam unam.
Misce diu triturando. (Würt.) — Gabe, eine halbe bis eine ganze Drachme.

℞. Jalapae . . . . . grana duo.
Rhei,
Cinnamomi,
singulorum granum unum.
Misce. (*Ra.*) — Für ein Kind.

℞. Jalapae . . . drachmam unam.
Scammonei . scrupulum unum.
Ipecacuanhae . . grana decem.
Fiat pulvis in partes granorum octo dividendus. (*Pie.*) — Dumas verschrieb es gegen Verschleimung.

℞. Radicis Jalapae
partes viginti quatuor.
— Mechoacannae
partes duodecim.
— Rhei,
Cinnamomi,
singulorum partes octo.
Gummi Guttae . . partes tres.
Foliorum siccatorum Soldanellae
partes sex.
Anisi . . . . partes duodecim.
Fiat pulvis. (Gal.)

2) Mit Salpeter.

℞. Jalapae pulveratae unciam unam.
Nitri depurati . . semunciam.
Misce. (Gen.)
Pulvis ad ulcera crurum (*Sw.*). Jalapae drachmam unam, Nitri tres; — eine halbe Drachme zweimal täglich.

3) Mit einem Eisensalz.

℞. Jalapae,
Millepedum praeparatorum,
Croci Martis aperientis,
singulorum grana sedecim.
Auf eine Gabe. (*Pie.*)

4) Mit Weinsteinkali.

℞. Jalapae . . . . semidrachmam.
Cremoris Tartari scrupulum unum.
Auf eine Gabe. (Ful.)
Am. Ed. Suec. *C. E.* et *Sw.* Jalapae partem unam et duas Cremoris Tartari; — *Sp.* Resinae Jalapae partem unam cum dimidia, Cremoris Tartari partes duas cum dimidia; — RC. et *Au.* Jalapae et Cremoris partes aequales.

℞. Jalapae,
Zingiberis,
Cremoris Tartari,
singulorum grana decem.
Auf eine Gabe. (*Sw.*)

℞. Radicis Jalapae
uncias duas cum dimidia.
Cremoris Tartari drachmas duas,
Olei Cinnamomi drachmam unam.
Fiat pulvis. (Pal. Wir.)

℞. Jalapae,
Cremoris Tartari,

Elaeosacchari Foeniculi,
singulorum partes aequales.
Fiat pulvis. (*Huf.*)

℞. Jalapae,
Cremoris Tartari,
Magnesiae purae,
singulorum partes aequales.
Misce diu triturando. (His.)

℞. Jalapae . . . drachmam unam.
Cremoris Tartari drachmas duas.
Gummi Guttae . . . grana sex.
Divide in partes sex. (*E.*)

℞. Jalapae . . . scrupulum unum.
Rhei . . . . scrupulos duos.
Cremoris Tartari drachmam unam.
Olei essentialis Cinnamomi
guttam unam.
Misce. (*Sa.*)

℞. Jalapae,
Cremoris Tartari,
singulorum uncias duas.
Resinae Jalapae drachmas tres et
grana duodecim.
Scammonei
drachmas duas cum dimidia.
Cinnamomi . sesquidrachmam.
Misce. (B*. Br.)

℞. Jalapae . . . . . uncias duas.
Tartari solubilis . . semunciam.
Sacchari . uncias quatuordecim.
Olei essentialis Aurantii
drachmas duas.

Elaeosaccharum para cui sal et jalapa admisceantur. (*Ca.*) — Gabe, zwei oder drei Drachmen in einem Nöſel (chopine) gekochtem Pomeranzenwaſſer. — Ein ſehr angenehmes, unter dem Namen sucre orangé purgatif (Saccharum aurantiacum purgans) bekanntes Purgirmittel.

5) Mit ſchwefelſaurem Kali oder Natron.

℞. Jalapae . . . . . partes duas.
Kali sulphurici . partem unam.
Misce. (D.) — Gabe, eine halbe Drachme.

RC. et *Sw.* Jalapae et Sulphatis partes aequales; — DD. loco Kali Natron sulphuricum sumendum jubet.

℞. Radicis Jalapae semidrachmam.
Kali sulphurici . semiscrupulum.
Olei Foeniculi . guttam unam.
Fiat pulvis. (BorC. WW. *Au.*) — Auf ein oder zwei Mal.

℞. Radicis Jalapae scrupulos duos.
Resinae Jalapae grana quatuor.
Kali sulphurici,
Sacchari albi,
singulorum grana decem.
Fiant doses quatuor. (*Sa.*)

℞. Radicis Jalapae . . uncias duas.
Ipecacuanhae scrupulos quatuor.
Kali sulphurici . . semunciam.

Gabe, zwei Scrupel für einen Erwachſenen. (Li.)

℞. Radicis Jalapae,
Scammonei,
singulorum partem unam.
Kali sulphurici . . partes duas.
Fiat pulvis. (GalM.)

℞. Radicis Jalapae . sesquiunciam.
Resinae Jalapae,
— Scammonei,
singularum drachmas tres.
Cremoris Tartari,
Kali sulphurici,
singulorum unciam unam.
Olei essentialis Cinnamomi
scrupulum unum.
Resinis cum Amygdalarum dulcium drachmis duabus contritis adde radicem, sales et denique oleum. (Wir.) — Gabe, ein halber bis ganzer Scrupel bis eine halbe Drachme.

6) Mit ſchwefelſaurer Magneſia.

℞. Radicis Jalapae,
Magnesiae sulphuricae,
singularum semidrachmam.
Olei essentialis Foeniculi
guttas duas.
Fiat pulvis. (B*.)

℞. Radicis Jalapae,
— Gentianae,
singularum unciam unam.
— Zingiberis drachmas duas.
Magnesiae sulphuricae uncias duas.
Fiat pulvis. (Fenn. Suec.)

Pulvis anthelminticus. (*Au. Sw.*)

℞. Radicis Jalapae,
— Valerianae,
Seminis Cinae,
singulorum unciam unam.
Gabe, Morgens eine halbe bis ganze Drachme. (*Sw.*)

℞. Seminum Tanaceti . grana sex.
Ferri sulphurici . . grana tria.
Radicis Jalapae . semidrachmam.
Morgens in Waſſer zu nehmen. (*Au.*)

Pulvis febrifugus et purgans. (*Ca.*)

℞. Jalapae . . . . . uncias duas.
Cremoris Tartari
drachmas quatuordecim.
Kali sulphurici,
Succi Allii,
singulorum unciam unam.
Chinae . . . . drachmas sex.
Scammonei . . . . semunciam.
Tartari natronati drachmas tres.
— emetici . drachmas duas.
Nitri . . . . drachmam unam.
Croci,
Gummi Guttae,
singulorum grana duodecim.
Cinnabaris . . . . grana sex.

Gabe, achtzehen Gran bis eine halbe Drachme bei Wechselfiebern und Wurmbeschwerden.

Boli purgantes s. cathartici, hydragogi s. resolventes. (GalM. *B. Pie. Sa. Sw.*)

℞. Jalapae pulveratae partes decem.
Scammonei . . partes quatuor.
Mellis . . . quantum sufficit.
Misce benè. (GalM.)

℞. Radicis Jalapae semidrachmam.
— Zingiberis . . grana sex.
Syrupi Rosarum solutivi
quantum sufficit.
Addi potest si necesse, Cremoris Tartari scrupulus unus vel Mercurii dulcis grana quinque. (*Sa.*)

℞. Jalapae pulveratae grana decem.
Electuarii lenitivi
scrupulos quatuor.
Adde si necesse est, Mercurii dulcis grana decem. (*Sa.*)

℞. Jalapae . . . . grana viginti.
Mercurii dulcis . grana decem.
Syrupi Sacchari quantum sufficit ut fiat bolus unus (*Sw.*)

℞. Radicis Jalapae,
Kali sulphurici,
singulorum semidrachmam.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.
Misce sedulo. (*Sw.*)

℞. Jalapae pulveratae,
Zingiberis,
Gummi Guttae,
Cremoris Tartari, singulorum grana quinque ad decem.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.
Fiat bolus. (*Sw.*)

℞. Jalapae pulveratae grana duodecim.
Gummi Guttae,
Mercurii dulcis,
singulorum grana sex.
Syrupi Zingiberis quantum sufficit.
Fiat bolus. (*Sw.*)

℞. Radicis Jalapae semidrachmam.
Resinae Scammonei,
Gummi Guttae,
Salis Absinthii,
singulorum grana sex.
Syrupi Rhamni quantum sufficit ut fiant boli tres. (*Pie.*)

℞. Jalapae pulveratae,
Sacchari, singulorum grana viginti quatuor.
Pulveris Rhei . . grana triginta.
Syrupi de Cichorio compositi
quantum sufficit.
Fiant boli duodecim. (*B.*)

Pilulae laxantes s. purgantes. (Ful. Ham. *T.*)

℞. Pulveris Jalapae drachmam unam.
— Aloës,
Mercurii dulcis,
singulorum semidrachmam.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.
Fiant pilulae granorum duorum. (Ham.)

T. Rhei, Aloës, Jalapae, singularum pulv. partes aequales, fiant cum Syrupi simplicis q. s. pilulae.

℞. Saponis Alicantini uncias duas.
Extracti Aloës gummosi,
Pulveris Rhei,
— Jalapae,
singulorum unciam unam.
Syrupi Zingiberis quantum sufficit.
Misce. (Ful.)

Gabe, zehen, zwanzig bis dreißig Gran (bis eine halbe Drachme *T.*).

Panes saccharati purgantes. (*Bo. Ca. Pie. Sp.*)

℞. Jalapae pulveratae
drachmas viginti.
Farinae . . . . . uncias duas.
Ovorum . . . . . no. 24.
Sacchari . . . . libram unam.
Fiant panes sexaginta. (*Ca. Pie.*)

Bo. Jalapae drachmas duas, Sacchari libram unam, Anisi drachmas duas, Farinae uncias octo et Vitellos Ovorum no. 8.; — *Sp.* Farinae, Sacchari, singulorum uncias quatuor, Vitellos Ovorum no. 3 et Resinae Jalapae quantum placet.

Trochisci anthelmintici. (Ful.)

℞. Pulveris Jalapae unciam unam.
— Florum Tanaceti
sesquiunciam.
— Ferri sulphurici semunciam.
— Sacchari albi uncias sex.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae
quantum sufficit.
Fiant trochisci ducenti quadraginta. — Gabe, ein, zwei Stück oder mehr, nach dem Alter.

Morsuli s. Trochisci solventes s. solutivi. (Fer.)

℞. Pulveris Jalapae . uncias duas.
— Scammonei unciam unam.
Chocolatae . uncias quindecim.
Fiant morsuli septuaginta duo. — Ein Stück auf ein Mal.

Electuarium hydragogum s. purgans. (Br. *Ca. E. Sm.*)

℞. Jalapae pulveratae,
Kali sulphurici,
singulorum scrupulos duos.
Resinae Scammonei
scrupulum unum.
Gummi Guttae . grana decem.
Mellis . . . quantum sufficit.
Misce. — Gabe, alle zwei Stunden ei-

nen Kaffeelöffel. (*Ca.*) — Gegen Bandwurm, nachdem man drei Tage vorher das mit Zinn bereitete electuarium vermifugum Kuttingeri zu geben angefangen hat.

℞. Pulveris Jalapae . . semunciam.
— Zingiberis scrupulos quatuor.
— Kali sulphurici
drachmas tres.
Roob Sambuci rubri uncias duas.
Oxymellis colchici . uncias tres.
Misce. (Ful.) — Gabe, zwei bis sechs Drachmen.

℞. Pulveris Jalapae,
— Salis de Seignette,
singulorum drachmam unam.
Conservae Nasturtii uncias quatuor.
Syrupi Fumariae . uncias duas.
Misce. (*Sm.*) — Gabe, ein Kaffeelöffel täglich zwei oder drei Mal.

℞. Jalapae pulveratae
scrupulum unum.
Cremoris Tartari drachmas sex.
Kali sulphurici . drachmas duas.
Syrupi Althaeae quantum sufficit.
Misce. (*Sm.*) — Gabe, Morgens zweimal einen Kaffeelöffel voll.

℞. Cremoris Tartari,
Jalapae pulveratae,
Nitri, singulorum . semunciam.
Confectionis Sennae unciam unam.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.
Misce. (*E.*) — Gabe, haselnußgroß, vier oder fünf Mal täglich.

℞. Radicis Jalapae . . semunciam.
Kali sulphurici . drachmas duas.
Oxymellis scillitici unciam unam.
Roob Juniperi,
— Ebuli,
singulorum uncias duas.
Syrupi Rhamni quantum sufficit.
Misce. (*Ca.*) — Gabe, eine Drachme in kurzen Zwischenräumen, bis reichliche Ausleerung erfolgt ist.

℞. Roob Juniperi,
Pulpae Tamarindorum,
singulorum uncias quatuor.
Radicis Jalapae . sesquiunciam.
Scammonei electi unciam unam.
Cinnamomi,
Foenuculi,
singulorum drachmas duas.
Sacchari clarificati uncias decem.
Misce. (Br.) — Gabe, eine bis zwei Drachmen.

Electuarium s. Conditum ad vermes s. vermifugum. Opiatum vermifugum. (Ful. GalF. GalH. *Ca. Huf. Sa. Vm.*)

℞. Pulveris Jalapae,
— Valerianae,
Kali sulphurici,
singulorum drachmam unam.
Oxymellis scillitici, uncias tres.
Misce. (Ful. *Sa.*) — Gabe, zwei bis sechs Drachmen.

GalF. GalH. et *Ca.* loco sulphatis Kali tartaricum adhibent.

℞. Jalapae,
Rhei, singulorum partem unam.
Valerianae . . . . partes duas.
Kali sulphurici . partes quatuor.
Santolinae . . . . partes octo.
Oxymellis scillitici quantum sufficit.
Misce sedulò. (*Vm.*)

℞. Pulveris Valerianae
sesquidrachmam.
— Jalapae drachmam unam.
— Seminis Cinae semunciam.
— Tartari tartarisati
drachmas duas.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.
Misce. (*Huf.*)

Confectio Anisi laxativa. (Wir. *Sp.*)

℞. Anisi . . . . . uncias tres.
Calefac in vase amplo, cochlearia aliquot Sacchari ad plumam cocti adspergendo; adde tunc sensim
Pulveris Resinae Jalapae
drachmas tres cum dimidia.
— Cinnamomi drachmas duas.
Agita donec massa siccata et Sacchari quantitas unciarum viginti quatuor sit consumpta. (*Sp.*)

Wir. Anisi sesquiunciam, Sacchari libram unam et mixturam e Jalapae, Mechoacannae albae, singularum pulveratarum semuncia, Diagrydii sulphurati, Cinnamomi, singulorum pulv. drachma una.

Dieses Präparat war ehedem sehr stark in Gebrauch, besonders bei Kindern; heutzutage wendet man es nur noch sehr wenig an.

Opiatum stimulans. (*Pie.*)

℞. Limaturae Chalybis porphyrisatae,
Gummi Ammoniaci pulverati,
singulorum unciam unam.
Millepedum praeparatorum
drachmas sex.
Extracti Aloës . drachmas tres.
Pulveris Jalapae . . semunciam.
— Castorei,
— Croci,
singulorum drachmas tres.
Extracti Gentianae
quantum sufficit.

Gabe, Morgens eine Unze, gegen Schwäche und Schwindel.

Opiatum antiherpeticum. (*Pie.*)

℞. Limaturae Chalybis porphyrisatae,
Myrrhae,
Gummi Ammoniaci,
singulorum drachmas sex.

Extracti Hellebori nigri
drachmas duas.
Jalapae pulveratae . semunciam.
Millepedum praeparatorum
drachmas quinque.
Syrupi Fumariae quantum sufficit.
Zehen Tage lang, Morgens nüchtern zu nehmen.

Emulsio purgans. (GalM.)

℞. Amygdalarum dulcium mundatarum . . . . . no. 12.
Syrupi Sacchari . unciam unam.
Aquae . . . . uncias quatuor.
Emulsioni adde
Jalapae pulveratae grana viginti.

Potio purgans. (*Huf. Ra. Sm.*)

℞. Pulveris Jalapae semidrachmam.
Decocti Cichorii uncias quatuor.
Misce. (*Ra.*)

Huf. Jalapae grana triginta sex et Decocti Prunorum siccatorum uncias quatuor.

℞. Pulveris Jalapae grana triginta.
Natri sulphurici drachmas quinque.
Syrupi Mellis . . unciam unam.
Decocti Cichorii . . uncias sex.
Misce. (*Ra.*)

Potio purgans major. (GalM.)

℞. Sennae . . . . drachmas duas.
Natri sulphurici drachmas quatuor.
Aquae . . . . . uncias sex.
Coque per sexagesimas aliquot, cola et adde
Pulveris Jalapae compositi (GalM.)
grana duo ad quatuor.

Mixtura vermifuga et purgans. (*Sm.*)

℞. Tartari natronati,
Jalapae pulveratae,
Valerianae sylvestris,
singulorum drachmam unam.
Oxymellis scillitici uncias quatuor.
Gabe, für Erwachsene Morgens um sieben und um neun Uhr einen Eßlöffel voll.

§. II. Präparate, welche das wirksame Princip der Jalappe ohne das zu seiner Ausziehung angewendete Vehikel enthalten.

Extractum Jalapae gummosum. (*Vm.*)

℞. Gummi Arabici . partem unam.
Jalapae grossiuscule pulveratae
partes duodecim.
Macera jalapam ut mollefiat, in Aquae sufficiente quantitate, tunc cum gummi triturata bis in emulsionem tere; residuo bis cum Aquae partibus septuaginta duabus cocto, decocta bullientia cola; tunc bullitione ad partem octavam voluminis redacta commisce cum emulsione et totum, blando igne et continua agitatione, vaporando ad extracti consistentiam redige.

Extractum Jalapae resinosum. (*Vm.*)

℞. Jalapae contusae et a pulvere subtili separatae . quantum vis.
Aquam adsperge donec mollis sit reddita, tunc Aqua addita cola exprimendo, quod repetatur quamdiu residuum in emulsionem verti potest; liquores deinde commixti ad extracti consistentiam evaporent.

Extractum Jalapae aquosum. (Du. *Sw. Vm.*)

℞. Liquoris a depuratione Jalapae relicti . . . . . quantum vis.
Albuminis ope clarificatum ad extracti spissitudinem consume. (*Sw. Vm.*)

℞. Radicis Jalapae grossiuscule contusae et a pulvere separatae
quantum vis.
Infunde in vase amplo, Aquae frigidae duplum circiter pondus addendo, per duos vel tres dies in maceratione relinque, decantha absque agitatione et liquorem filtratum ad extracti consistentiam consume. (*Vm.*)

Extractum Jalapae alcoholicum. (Am. Du. Ed. Fer. Ful. Gen. Li. Lon. LonN. Lus. Suec. Wir. Wür. *C. T.*)

℞. Radicis Jalapae grossiuscule pulveratae . . . libram unam.
Alcoholis (0,840)
partes (octarios) quatuor.
Post quatuor dies digestionis alcoholem decantha, residuum coque cum Aquae octariis decem (congio uno) ad duos redigendis, decoctum colatum consume, tincturam in retorta destillationi subjice et liquores, quum spissescere coeperint, commixtos ad massae pilularum consistentiam consume. (Am. Du. Ed. Fer. Gen. Lon. LonN. *C.*)

Fi. Aquae quantum sufficit, sed infusionem tantum adhibet et in fine tincturam et infusum commixta in balneo aquae salito ad extracti consistentiam evaporare jubet; — Wür. Pulveri Jalapae Alcoholis tantum infundere jubet ut digitorum quatuor orassitiem tegatur, totum blando calore digerere et tinctura decanthata, residuum cum Aqua per horam unam coquere, colare cum expressione, colaturam in balneo aquae ad mellis consistentiam consumere, ei sub finem tincturam sensim addendo et continue agitando ut massa homogenea neque grumosa obtineatur; — Suec. Macerare per dies qua-

tuor Jalapae libram unam in Alcoholis unciis sexaginta quatuor, residuum coquere in Aquae unciis centum sexaginta quatuor ad triginta duas redigendis, decoctum vaporationi, tincturam destillationi, subjicere, tunc, quum spissescere coeperint, commixta ad aptam spissitudinem consumere; — Wir. quod ad rem attinet, eodem modo procedit; — Lus. Digerere per dies quatuor Jalapae libram unam in Alcoholis quatuor, residuum coquere cum Aquae libris decem ad duarum remanentiam, tunc decoctum evaporatum et tincturam destillatam mixta ad aptam consistentiam redigere; — Pul. et Li. Digerere Jalapae libram unam in Aquae Vitae sex, residuum coquere cum Aquae libris tribus et decoctum tincturamque ad extracti consistentiam redacta rite consumere.

T. ut resinam parari jubet eâ tamen differentia, ut destillata tinctura nec per aquam praecipitata, ad mellis consistentiam statim consumatur.

Gabe, sechs bis funfzehen Gran.

Resina Jalapae s. Gialappae s. Jalappae. (A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Fenn. Ful. Gal. Han. Hass. HassP. Lus. O. Pal. Pol. R. Sar. Sax. Wir. Wür. *Br. Sp. Sw. T. Vm.*)

℞. Jalapae grossiuscule contusae quantum vis.

Pluribus digestionibus, singulâ per dies aliquot, in Alcohole calenti extrahe, cola fortiter exprimendo, et alcohole destillatione elicito, residuum Aqua tepida lotum sicca atque pulvera. (Pal.)

℞. Radicis Jalapae . quantum vis.

Digere aliquot es in Alcohole calido, tincturis mixtis et filtratis Aquae quadrantem circiter ponderis adde et alcohole destillando ex balneo aquae elicito, resinam in fundo vasis residuam Aqua calida lotam balnei aquae ope sicca. (Ba. Bor. Bor4. Br. Fenn. Ful. Han. Hass. Li. O. Pol. R. Sax. Wir. Wür. *Sw.*)

HassP. quamque digestionem cum Alcoholis 12° B. quadruplo per dies tres continuare jubet.

℞. Tincturae Jalapae quantum vis.

Dodrante in balneo aquae destillatione abstracto, residuo Aquae pondus aequale addendo, praecipitatum ortum in filtro excipe, lotum bene cum Aqua destillata et exstillatum, caute exprime et in Alcohole tepido dissolutum ad siccum vaporando consume. (Gal.)

T. Radicis libras duas in Alcoholis 35° B. per dies sex vel octo digerere, tincturam filtrare, hoc repetere, tunc destillando, blando calore, trientes duos vel dodrantem alcoholis adhibiti elicere, Aquae pluvialis vel destillatae pondus triplum infundere, liquorem sepositione clarificatum decanthare, praecipitatum Aqua abluere, siccatum et in Alcohole moderato calore solutum ad mellis consistentiam evaporare, et in rotulas redactum vaporis balnei vel solis calore penitus exsiccare; — *Fi.* fere eodem modo procedit, Radicis quantum vis, Alcoholis 24° quantum satis et Aquae frigidae partes quadraginta vel quinquaginta sumendo.

℞. Radicis Jalapae contusae partem unam.
Alcoholis . . . . . partes sex.

Digestione repetita ex balneo arenae radicem penitus extrahe, et tincturis commixtis ad dimidium evaporatis, residuo Aquam infunde et praecipitatum bene lotum caloris blandissimi ope sicca. (A. An. D. Lus. Sar. *Br. Sp.*)

℞. Radicis Jalapae pulveratae libras quatuor.
Alcoholis (0,907) libras sedecim.

Destillent leni igne, spiritus libras duas, residuum refrigeratum exprimendo colatum sepone; spiritum obtentum additis duodecim libris Alcoholis (0,907) residuo reaffunde, et destillatione libram unam elice; residuo tunc refrigerato et iterum cum expressione colato, liquores mixtos post dierum octo sepositionem decantha, adde Aquae libras sex, spiritum leni igne destillationis ope elice, resinam vasi adhaerentem Aqua bullienti lava, donec liquidum saporis expers evadat et Alcoholis rectificati ope mollefactam in massam redige, quae igne blandissimo siccetur. (Ams.)

℞. Radicis Jalapae pulveratae libras quatuor.
Alcoholis (30°) . libras decem.

Digere ex arena, saepius agitando, per triduum et cum residuo novaque Alcoholis quantitate operationem repete, colaturis sepositione et decanthatione depuratis adde Aquae libras octo, misce et omni alcohole destillationis ope, blando igne, elicito, residuum bene lotum et Alcoholis pauxillo molle redditum in massam redige quae lente siccetur. (B. Bel.)

℞. Jalapae pulveratae partem unam.
Alcoholis rectificati partes sex.

Radici in balneo aquae tepido alcoholis duos trientes infunde, stent per horas viginti quatuor, tunc refrigerata

cum expressione forti colentur; residuum cum reliquo alcohole digestum itidem exprime; colaturis filtratis adde Aquae frigidae partes novem absque vasis agitatione; resina postquam subsedit, horis viginti quatuor lapsis, decantha, Aqua resinae infusa, alcohol destillationis ope in alembico, eliciatur; resinae priori quantitati eam quae liquido residuo inest affunde, lava totum primò cum Aqua frigida deinde cum calida et lente in balneo arenae sicca. (*Vm.*)

Das durch Präcipitation mittelst Wasser erhaltene Harz wird *Magisterium Jalapae* genannt. — Es wird als Purgirmittel nie allein angewendet, indem es heftige Kolik, übermäßiges Purgiren und selbst Darmentzündung hervorbringt. Man giebt es in Pillen, mit Extracten. — Gabe, vier bis sechs Gran, in Pillen; verschreibt man es in Pulver, mit Mandeln oder Piniennüssen abgerieben, was jedoch nicht nachzuahmen ist, so kann man bei sehr starken Personen bis zu einem halben Scrupel und selbst bis zwölf Gran steigen.

Resina Jalapae praeparata. (Bor4. *Sp.*)

℞. Resinae Jalapae,
Amygdalarum dulcium,
singularum partes aequales.
Pulveratas bene misce.

Pilulae purgantes. (*Ca. Vm.*)

℞. Radicis Jalapae,
Scammonei,
singulorum uncias quatuor.
Extracti catholici unciam unam.
Alcoholis . . quantum sufficit.
Fiant pilulae granorum quatuor. (*Ca.*) — Gabe, von zwei bis fünf Stück, bei Wassersucht und Krankheiten von Asthenie.

Vm. Resinae, Scammonei, singulorum partem unam, Extracti catholici duas et Alcoholis sufficientem quantitatem.

Pilulae cephalicae. (*Sp.*)

℞. Massae pilularum Succini,
Extracti Rhei,
— panchymagogi,
Resinae Jalapae,
singulorum semunciam.

Gabe, eine halbe Drachme. — Sie haben den Namen von ihrer früheren Anwendung bei sogenannten serösen Kopfkrankheiten.

Sapo jalapinus s. Jalapae. (B. Ba. Bor. Bor4. D. Gal. GalM. Ham. Han. Hass. HassP. Li. O. Pol. Sax. *Ca. Fi. Sm. Sw. T. Vm.*)

℞. Resinae Jalapae pulveratae,
Saponis medicati rasi,
singulorum partes aequales.
Alcoholis (20°) quantum sufficit.
Liquata blando calore evaporent, continue agitata ad massae pilularum consistentiam. (B. Ba. Bor. D. Gal. Ham. Han. HassP. Li. O. Pol. Sax. *Ca. Sw. Vm.*)

T. Saponem Alicantinum et Alcoholem 30° adhibet; — *Fi.* Alcoholem 30°; — GalM. Saponis partem unam et Tincturae Jalapae duas; solutio in balneo aquae evaporet; — Bor4. Resinae, Saponis, singulorum uncias duas, Spiritus Vini rectificati quantum requiritur, solutio ad pilularum massae consistentiam evaporet ut totius massae remanentis pondus sit unciarum quatuor cum dimidia; — *Vm.* Resinae partem unam, Saponis unam cum dimidia et Alcoholis quantum sufficit; — Hass. Saponis et Resinae, singulorum partes aequales et Aquae quantum satis ad resinam humectandam, et liquationem blando igne faciliorem reddendam, alcohole omisso.

Gabe, bei Kindern zehen bis zwanzig Gran.

Pulvis hydragogus. (*Sw.*)

℞. Saponis jalapini,
Cremoris Tartari,
singulorum partes aequales.

Gabe, fünf bis dreißig Gran alle vier oder fünf Tage (?).

Pilulae Jalapae s. purgantes. (Bor4.)

℞. Saponis jalapini . . partes tres.
Radicis Jalapae pulveratae
partem unam.
Misce ut fiat massa, ex qua formentur pilulae ponderis granorum duorum.

Pilulae laxantes s. laxativae. (Li.)

℞. Saponis jalapini,
Rhei pulverati,
singulorum unciam unam.
Aquae . . . quantum sufficit.

Gabe, von einer halben Drachme bis zu zwei Scrupel für Erwachsene.

Sm. Pilulas granorum quatuor e sapone jalapino solo parari jubet.

Mixtura saponcea purgans. (B*. *Ca.*)

℞. Alcoholis rectificati semilibram.
Resinae Jalapae,
Saponis amygdalini,
singulorum uncias unam.
Solutionem filtra. (*Ca.*) — Gabe, Kindern eine bis anderthalb Drachmen.

℞. Saponis jalapini,
Syrupi Althaeae
singulorum grana decem.
Tincturae Cinnamomi
grana viginti.
Misce. (B*.) — Auf einmal.

℞. Saponis jalapini uncias sedecim.

Alcoholis . uncias triginti duas.
Syrupi Sacchari uncias sedecim.
Tincturae alcalinae,
Olei Menthae piperitae,
singulorum drachmam unam.
Gabe, eine halbe bis ganze Drachme. (B*.)

Oleum Ricini artificiale. (B*.)

℞. Resinae Jalapae . grana novem.
Saponis Veneti . . . grana tria.
Olei Amygdalarum dulcium
sesquiunciam.
Tritura simul. — Vogler verſchrieb alle Stunden oder zwei Stunden einen Eßlöffel für Erwachſene.

Morsuli s. Tabellae purgantes. (Br. Pal. Wir. *Sp.*)

℞. Resinae Jalapae drachmam unam.
Amygdalarum dulcium excorticatarum . . . drachmas tres.
Trituratis bene adde
Cardamomi minoris
scrupulum unum.
Cinnamomi . . scrupulos duos.
Sacchari rosati ad plumam cocti
uncias septem cum dimidia.
Fiant morsuli. (Br. Pal. Wir.)
Sp. cardamomum et cinnamomum omittit. — Gabe, je nach dem Alter von einer bis ſechs Drachmen.

Diacydonium jalapinum s. lucidum jalapinum s. solutivum pellucidum, Gelatina purgans. (Br. *Sp.*)

℞. Gelatinae Cydoniorum
uncias triginta duas.
Resinae Jalapae cum Nucleis Pineae
tritae . . . . . uncias duas.
Misce bene. (*Sp.*)
℞. Gelatinae Cydoniorum
uncias sexaginta quatuor.
Resinae Jalapae uncias quatuor.
Alcoholis . . uncias duodecim.
Solutionem resinae alcoholicam cum gelatina misce. (*Sp.*)
Br. Gelatinae libras duas cum dimidia, Resinae uncias quatuor et sedecim Alcoholis.

Electuarium pectorale laxans. (*Sp.*)

℞. Looch sani et experti uncias duas.
Syrupi Rhoeados drachmas sex.
Resinae Jalapae sesquidrachmam.
Misce bene. — Ein Purgirmittel, welches bei Schleimkrankheiten der Kinder empfohlen worden iſt.

Electuarium hydragogum. (*Sp.*)

℞. Roob Ebuli,
— Juniperi,
singulorum drachmas duas.
Syrupi Rhamni . unciam unam.
Pulveris Resinae Jalapae
sesquidrachmam.
— Kali sulphurici
drachmas sex.
Gabe, eine halbe bis eine Unze.

Emulsio laxans s. purgans s. Jalapae, Julep purgans. (Gal. R. *Bo. Pie. Sa. Sm. Sw.*)

℞. Resinae Jalapae semidrachmam.
Gummi Arabici drachmam unam.
Aquae . . . . . unciam unam.
Contere. (*Sw.*)
℞. Resinae Jalapae . . grana octo.
Vitelli Ovi,
Sacchari albi,
singulorum drachmas duas.
Aquae . . . . . semunciam.
Resina cum saccharo et vitello tritis fiat aquae ope emulsio. (R.)
℞. Resinae Jalapae grana duodecim.
Sacchari albi . drachmas duas.
Tere diu, sensim addendo
Vitellum Ovi . . . . . no. ℈.
Triturare continua, partitim addendo
Emulsionis simplicis
uncias quinque.
Aquae Florum Aurantiorum
drachmas duas.
Misce bene. (Gal.)
Sm. Resinae grana octo ad decem, Vitellum Ovi unius, Sacchari uncias duas, Emulsionis sex et Aquae Florum Aurantii drachmas duas.
℞. Resinae Jalapae . . grana duo.
Amygdalarum dulcium . no. 8.
Aquae Cinnamomi drachmas sex.
— Cerasorum nigrorum
unciam unam.
Fiat emulsio. (*Sa.*)
℞. Emulsionis communis uncias sex.
Resinae Jalapae,
— Scammonei,
singularum grana octo.
Sacchari . . . drachmas duas.
Misce. (*Pie.*)
Bo. Emulsionis uncias quatuor, Resinae Jalapae grana octo, Scammonei grana sex et Sacchari drachmas sex.

§. III. Präparate, welche den wirkſamen Beſtandtheil der Jalappe zugleich mit dem zum Ausziehen angewendeten Vehikel enthalten.

A. Auszug durch Waſſer.

Potio purgans anglica. (*Pie.*)

℞. Natri phosphorici drachmas sex.
— subcarbonici,
Jalapae pulveratae,
singulorum grana viginti quatuor.
Sacchari . . grana triginta sex.

Aquae . . . . uncias quatuor.
Coctis per sexagesimas duas et filtratis adde
Alcoholis Citri . . guttas duas
et quo momento potio hauritur
Acidi tartarici pulverati
grana quadraginta.

Purgativum Leroyi. (Fer. *Fi. T.*)

℞. Scammonei Aleppensis uncias duas.
Radicis Turpethi unciam unam.
Jalapae . . . . . uncias octo.
Aquae Vitae (20°) libras duodecim.

Digere in balneo aquae, calore 20°, per horas duodecim, filtra et adde Syrupum cum Infuso e Sennae unciis octo et Aquae bullientis libris duabus et Sacchari libris duabus cum dimidia paratum.

Fi. et *T.* quatuor gradus indicant: 1) Scammonei sesquiunciam, Radicis Turpethi drachmas sex, Jalapae uncias sex, Alcoholis 20° libras sedecim et Syrupum cum Sennae mundatae unciis sex, Aquae bullientis libris duabus, Sacchari albi libris tribus paratum; 2) Scammonei uncias duas, Radicis Turpethi unciam unam, Jalapae octo, Alcoholis 20° libras sedecim, Sennae uncias octo, Aquae bullientis libras duas et uncias octo, Sacchari libras tres et uncias quatuor; 3) Scammonei uncias tres, Radicis Turpethi sesquiunciam, Jalapae libram unam, Alcoholis 21° libras sedecim, Sennae libram unam, Aquae bullientis libras quatuor, Sacchari albi duas et uncias octo; 4) Scammonei uncias quatuor, Jalapae, Sennae, singularum uncias sedecim, Radicis Turpethi uncias duas, Alcoholis 22° libras sedecim, Aquae bullientis libras quatuor et uncias octo, Sacchari albi libras duas.

Gabe, einen bis zwei Löffel täglich (eine halbe bis höchstens eine Unze, worüber der Arzt bestimmen muß *Fi.*). — Ist für den großen Schaden, den die unvorsichtige Anwendung desselben unter denen, welche gern zu Quacksalbermitteln ihre Zuflucht nehmen, angestiftet hat, leider nur zu berühmt.

Syrupus jalapinus s. de Jalapa s. Jalapae aromatisatus. (Gal. *Sw*. T. Vm.*)

℞. Jalapae subtilissime pulveratae
drachmas decem.
Seminum Coriandri,
— Foenicoli,
singulorum semidrachmam.
Aquae uncias duodecim cum dimidia.

Lagenae immitte quae ad collum usque repleatur, tunc balneo aquae immersa coque per sexagesimas viginti, quo facto balneum ab igne remotum gradatim refrigescat. Repone deinde lagenam et liquori post horas viginti quatuor decanthato et colato adde
Sacchari albi
uncias viginti quinque,
quae balnei aquae calore solvantur. (Gal.)

T. Omnium duplicem quantitatem sed eundem agendi modum indicat.

℞. Gummi Arabici,
Resinae Jalapae,
singulorum partem unam.

Triturando simul, addita sensim Aquae sufficiente quantitate emulsionem spissam para, quae cum
Syrupi Rhei
partibus sexaginta quatuor commisceatur. (*Vm.*

*Sw**. Syrupi partes triginta duas.

Gabe, Kindern zwei bis vier Drachmen.

B. Auszug durch Bier.

Cerevisia purgans. (*Ca. Pie.*)

℞. Jalapae . . . . drachmas tres.
Rhei . . . . drachmas duas,
Aloës Socotrinae semidrachmam.
Cerevisiae vel Hydromellis
libras duas.

Macera, saepius agitando, per dies duos et filtra. (*Ca.*) — Gabe, ein oder zwei Pfund bei lymphatischen Subjecten.

Ca. praeterea: Jalapae, Rhei, singulorum drachmas duas, Aloës semidrachmam et Cerevisiae octarium unum. (*Infusum purgans.*)

℞. Jalapae,
Rhei, singulorum drachmas duas.
Cerevisiae . . octarium unum.

Post duos dies macerationis filtra. (*Pie.*) — Gabe, Morgens ein oder zwei Gläser.

Cerevisia antihydropica s. ad hydropem. (*Sw*. Vm.*)

℞. Radicis Jalapae . . semunciam.
— Inulae,
— Calami,
Baccarum Lauri,
— Juniperi,
Corticis Aurantiorum,
singulorum unciam unam.
Radicis Bryoniae,
— Rubiae,
Seminum Dauci sylvestris,
singulorum sesquiunciam.
Foliorum Absinthii manipulos duos.
Cerevisiae fortis octarios quatuor.

Macera per plures dies, decantha et residuo infunde
Cerevisiae fortis octarios duos.

Post sufficientem macerationem iterum decantha, colaturasque commisce.
Gabe, vier Unzen mehrmals täglich.

C. Auszug durch Wein.

Vinum antiapoplecticum. (*Ca.*)

℞. Radicis Jalapae . . semunciam.
— Armoraciae sesquiunciam.
— Rhei,
Cinnamomi,
singulorum drachmas duas.
Nitri . . . . semidrachmam.
Vini albi libras duas cum dimidia.

Post dies quatuor frigidae digestionis filtra et adde
Tincturae aromaticae ammoniatae drachmas duas.

Gabe, Morgens nüchtern drei bis vier Unzen.

D. Auszug durch Alkohol.

Tinctura Jalapae s. Convolvuli Jalapae. (Am. B. Bel. Du. Ed. GalM. Gen. Ham. Lon. LonN. Lus. Suec. Wür. *Br. C. Sw.*)

℞. Jalapae . . . . partem unam.
Alcoholis (20°) . . partes octo.

Digere blando calore per dies sex et cola. (B. Bel.)

GalM. Jalapae partem unam et quatuor Alcoholis (22°); — Du. Jalapae uncias quinque et Alcoholis (0,930) octarios duos; — Am. Lon. LonN. et *C.* Jalapae uncias octo et Alcoholis (0,930) octarios duos; — Ed et *Sw.* Jalapae partem unam et quinque Alcoholis (0,935); — Lus. Jalapae uncias quatuor et Aquae Vitae libram unam; — Suec. Jalapae partem unam et Spiritus tenuis quatuor; — Wür. Jalapae uncias tres et Aquae Vitae libram unam; — Han. Jalapae uncias octo et Spiritus rectificati triginta; — Br. Jalapae uncias tres et unam libram Spiritus rectificati; — Gen. Jalapae semilibram et Aquae Vitae libras duas.

Purgirend. — Gabe, eine halbe bis ganze Drachme.

Tinctura Resinae Jalapae. (Br. Gal. HassP.)

℞. Resinae Jalapae scrupulos quatuor.
Alcoholis concentrati drachmas decem.

Post sufficientem digestionem filtra. (Br.)

HassP. Resinae partem unam, Spiritus Vini rectificatissimi partes sex; solutio ex tempore fiat, ita ut tincturae filtratae pondus partes sex aequet; — Gal. Resinae partem unam, Alcoholis (26°) quatuor et sex dies digestionis.

Diese Tinctur ist wirksamer als die der Wurzel. — Besser bereitet man sie auf der Stelle, indem man zehen Gran Harz in einer Drachme Branntwein auflöst und nöthigen Falls zwei Drachmen Mandel- oder Althäasyrup zusetzt. Dieß ist die Gabe für einen Erwachsenen.

Tinctura Jalapae confortans s. aromatica. (Ams.)

℞. Jalapae . . . . . uncias tres.
Corticis Citri . . unciam unam.
Cinnamomi . . . . semunciam.
Seminum Anisi . drachmas duas.
Alcoholis (0,884) . uncias sedecim.

Post dies octo digestionis filtra.

Mixtura Olei Ricini cum Jalapa s. purgans. (*Au.*)

℞. Tincturae Jalapae,
Sacchari albi,
singulorum drachmam unam.
Olei Ricini,
Mannae, singulorum unciam unam.
Syrupi Rosarum quantum sufficit.

Gabe, jede halbe Stunde zwei Löffel, bei der Malerkolik.

Tinctura Jalapae composita, Elixir Jalapae compositum s. Citri purgans s. anthelminticum Suecorum, Essentia catholica purgans Rothii, Tinctura purgans. (Gal. R. Suec. Wür. *Ca. Pie. Sp.*)

℞. Corticis recentis Citri sesquiunciam.
Alcoholis . . . . . uncias sex.

Infunde per horas viginti quatuor, tum tincturam decanthatam infunde
Resinae Jalapae . . unciae unam.

Post solutionem filtra. (*Sp.*)

℞. Jalapae electae . . semilibram.
Scammonei . . . unciam unam.
Alcoholis (22°) . . . libras sex.

Post octo dierum macerationem decantha et cola. (Gal.)

℞. Jalapae . . . . . semilibram.
Scammonei . . . . uncias duas.
Turpethi vegetabilis drachmam unam.
Aquae Vitae . . . . libras sex.

Post viginti quatuor horarum infusionem cola. (*Ca.*)

℞. Jalapae . . . uncias quatuor.
Scammonei . . . . semunciam.
Gummi Guttae . drachmas duas.
Alcoholis Aqua diluti libras duas.

Post tres dies digestionis cola cum expressione. (Suec.)

℞. Jalapae . . . . uncias quatuor.
Seminum Carthami . uncias duas.
Scammonei . . . . semunciam.
Gummi Guttae . drachmas duas.
Spiritus Corticum Citri sesquilibram.

Post dies aliquot decantha; residuo infunde

Spiritus Citri . . libram unam. Digere iterum; liquoribus mixtis, dodrantem destillatione elice et quod remanet ad usum serva. (Wür.)

Pie. eandem formulam sed nihil de destillatione postrema monens et pro secunda digestione Spiritus Citri semilibram praescribens; — *Sp.* Quinque substantiarum illarum solidarum easdem quantitates sed libras duas Alcoholis simplicis, infusionem residui tamen non repetendo nec destillationem partis unius producti jubendo; — Br. Infundere jubet Jalapae unciis novem, Seminum Carthami sex, Scammonei et Gummi Guttae, singulorum drachmis duabus, Spiritus Citri libras quatuor.

Reizend, purgirend, wurmtreibend. — Gabe, sechszig bis hundert Tropfen für einen Erwachsenen mit syrupus Rhamni.

Potio purgans. (*Ra.*)

℞. Tincturae Jalapae compositae unciam unam vel duas.
Syrupi Rhamni semunciam ad unciam unam.
Aquae Cichorii . uncias quatuor.

Aqua Vitae s. Spiritus purgans. (*Ca.*)

℞. Aquae Vitae (20°) octarios octodecim.
Sacchari crudi . . libras octo.
Jalapae . . . . . libras tres.
Baccarum Juniperi uncias decem cum dimidia.
Nitri . . . . drachmas septem.
Scammonei,
Rhei,
Calami,
Cinnamomi, singulorum uncias tres cum dimidia.

Post octo dies infusionis filtra. — Gabe, anderthalb Unzen.

Jasminum.

Jasminum officinale, L.; Jasmin; Jasmin commun (*Gal.*); Gelsomino (*His.*). Br. Fer. Gal. His. R. Sax. Wir. *Be. Br. M. Sp.*

Ein Strauch (Diandria Monogynia, L.; Jasmineae, *J.*) des mittägigen Europa's, des Orient's und Indien's. (*Zorn* Ic. pl. t. 153. *Blackw.* t. 13. *Plenck* t. 9.)

Man wendet die Blüthen (flores Jasmini) an; sie sind weiß, gestielt und bilden weitläufige Sträuße. Frisch haben sie einen angenehmen Geruch, der Geschmack ist etwas bitter.

Spiritus Jasmini. (*Sp.*)

℞. Olei Jasmini . . uncias sedecim.
Alcoholis . . uncias octodecim.
Misce fortissime agitando, tunc ad frigidum locum posito, spiritum ab oleo congelato defunde.

Essentia Jasmini. (*T.*)

℞. Florum Jasmini . quantum vis.

In scatulam e lamina alba confectam quadrilateram et pollices 6 ad 8 altam, operculo munitam, in cujus fundo pannus laneus oleo Behen impraegnatus positus est, ingere, ita ut pannus pollicis dimidii circiter altitudinem tegatur et hoc modo scatula alternis stratis florum et panni repleatur, lamina deinde crystallina aut plumbea et postremo operculo obtegens, post horas 12 aut 15 flores exemti cum novis mutentur, quod repetendum est. Pannis deinde exemtis Alcohole rectificato frigido superinfuso compressis et lotis, liquidum hoc, oleo expresso impraegnatum retortae tubulatae infunde et destillatione balnei aquae ope partem tertiam aut dimidiam elice.

Juglans.

Zwei Arten dieser Pflanzengattung werden in der Medicin benutzt:

1) *Juglans cinerea, L.*; weiße Wallnuß; Noyer cendré (*Gal.*); Butter nut, white walnut (*Ang.*). Am. *C.*

Ein Baum (Monoecia Polyandria, L.; Juglandeae, *Cand.*) Südamerica's. (*Big.* Med. Bot. II. t. 32.)

Man wendet die innere Rinde des Stamms und der Wurzel an, welche purgirend wirkt. Die der frischen Wurzel soll Blasen ziehen.

2) *Juglans regia, L.*; Nußbaum, Wallnuß; Noyer commun (*Gal.*); Walnut tree (*Ang.*); Akirut, jowz, Khusif (*Ar.*); Walsky orech (*B.*); Ho-tao (*C.*); Valnood (*D.*); Akirut (*Duk. Hin.*); Nogal (*His.*); Noce (*I.*); Olass-dio (*Ma.*); Girdigan, Charmughz, Jouzirumie (*Pe.*); Orzeszina wloska (*Pol.*); Nogueira (*Lus.*); Greziak orechi (*R.*); Walnaettraet (*Suec.*).

A. An. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Fer. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *Be. Br. Fl. G. M. Pid. Sp. Z.*

Ein Baum (Monoecia Polyandria, L.; Terebinthaceae, *J.*), welcher, in Persien ursprünglich zu Hause, in ganz Europa gezogen wird. (Fl. méd. V. 250. *Blackw.* t. 347. *Plenck* t. 672. *Schk.* t. 302. *Bert.* Bild. VIII. 27.)

Man wendet die Frucht (Nux Juglans s. Juglandis) entweder reif (nuces Juglandes) oder unreif (Nuces immaturae) an. Es ist eine eirunde Steinfrucht mit

einer grünen, fleischigen Hülle oder Schaale (cortex s. putamen nucis Juglandis) von bitterem sehr herben Geschmack. Die darin eingeschlossene Nuß (nucleus nucis Juglandis) besteht aus einer harten, brüchigen, holzigen, braungelben, außen gefurchten, geruch- und geschmacklosen Schaale, welche einen vierlappigen, sehr unregelmäßigen Kern enthält, der unter einem gelblichen, sehr dünnen, adstringirenden Fellchen (epidermis nuclei Juglandis) ein süßes, öliges Fleisch von sehr angenehmem Geschmack einschließt.

Electuarium antihydrophobicum. (B*.)

℞. Nucum Juglandium maturarum no. 30.
Herbae Rutae manipulum unum.
Mellis . . . . . uncias octo.
Contere. — Von Strackwitz gerühmt. — Man läßt Morgens und Abends vor dem Essen einen Löffel nehmen.

Oleum Nucum Juglandium s. Juglandis regiae. (An. Bor4. Br. Gal. Hass. HassP. His. Li. Pal. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. *Br. Pid. T. Vm.*)

℞. Nucum Juglandium maturarum quantum vis.
Putamine septisque remotis nucleos contunde pistilli lignei ope in mortario marmoreo et pastam sacco e tela confecto (cilicino aut cannabino Bor4.) inclusam frigide inter duas laminas stanneas (laminis in aqua fervente tepefactis Bor4.) exprime.

HassP. inter materiae medicae substantias nominat.

Dieses Oel kann, wenn es frisch und nicht ranzig ist, das Süßmandelöl ersetzen.

Roob Nucum s. Corticis Nucum Juglandis regiae, Roob Diacaryi Galeni, Diacaryon. (A. B*. Br. Ful. Pal. Wir. Wür. *Sp. Sw*)

℞. Nucum Juglandium immaturarum libram unam.
Contusas in mortario coque cum Aquae libris duabus per horas aliquot; cola exprimendo et succum cum Mellis despumati pondere aequali ad aptam consistentiam consume. (Br. Ful. Wir. *Sp. Sw.*)

℞. Succi expressi Nucum Juglandium immaturarum . . libras duas.
Mellis . . . . . libram unam.
Coque blando igne, spumam dehauriendo, ad aptam consistentiam. (A. B*. Pal. Wür. *Sp.*)

Schwach adstringirend, auflösend, besonders äußerlich.

Extractum Nucum Juglandium s. Juglandis s. Nucum Juglandium viridium. (A. Am. B*. Ba. Bor. Bor4 Br. D. Fenn. Han. Hass. HassP. Li. Pal. R. Sax. Suec Wir. *C. Vm.*)

℞. Nucum Juglandium viridium ante maturitatem decerptarum quantum vis.
Contunde in mortario lapideo, Aquae pauxillum addendo et succum exprime qui statim in balneo aquae, sub finem cum spathula continue agitatus, evaporet. (A. B*. Ba. Bor. Bor4. Br. D. Fenn. Han. Pol. Sax. Suec. *Vm.*)

HassP. ut extractum Aconiti I. p. 60.

℞. Putaminum Nucum Juglandium partem unam.
Aquae purae . . . partes sex.
Coque, cola et colaturam vaporando rite consume. (Am. Hass. Li. R. Wir. *C. Pid.*)

Reizend, tonisch, bitter, antiscorbutisch, wurmtreibend. — Gabe, ein halber Scrupel bis eine halbe Drachme. Man wandte es ehedem auch äußerlich, als reinigendes Mittel, bei übelaussehenden, selbst venerischen Geschwüren an.

Das Wallnußschaalenextract bildet die Basis des *Remedium antivenereum Mitié*, zu welchem Alyon und Cadet zwei verschiedene Formeln gegeben haben:

1) ℞. Foliorum Juglandis,
— Apii,
— Trifolii,
singulorum pondus aequale.
Contusis simul succum exprime, qui ad massae pilularis consistentiam inspissetur. (*Alyon.*) — Gabe, zwei bis sechs Stück sechsgranige Pillen täglich mit einer Tisane von botrys oder scordium.

2) ℞. Foliorum Juglandis sesquiunciam.
Jalapae pulveratae unciam unam.
Foliorum Angelicae,
— Cardui benedicti,
— Saponariae,
singulorum uncias quatuor.
Fiat infundendo extractum aquosum, quod evaporatum in pilulas granorum sex dividatur. (*Cadet.*)

Außerdem führt Cadet noch folgenden Syrup an:

℞. Foliorum viridium Juglandis libras viginti.
Stent cum Aqua fervida in infusione per horas viginti quatuor; infunde tunc
Foliorum viridium Angelicae libris sedecim.
Stent iterum per horas viginti quatuor, ita ut in balneo aquae continue calida teneantur; superfunde deinde
Foliorum Saponariae libris sedecim.
Rosarum moschatarum unciis duodecim.

Rosarum vulgarium . unciis sex.
Sennae mundatae
unciis viginti sex.

Infusis per horas viginti quatuor adde et in iis solve Sacchari crudi libras triginta septem, tum coque, albuminis ope clarifica et ad syrupi consistentiam redige.

Mittié ließ den Kranken Morgens, zwei Stunden vor dem Frühstück, acht, und zwei Stunden vor dem Abendessen, vier Stück Pillen nehmen, und zugleich außerdem Morgens nüchtern vier Löffel Syrup in einem Glase Wasser und zwei Löffel zwei Stunden vor dem Abendessen.

Mixtura Nucum Juglandium, Guttae anthelminticae. (Ham. *Au.*)

℞. Extracti Juglandis drachmas duas.
Aquae Cinnamomi unciam unam.

Gabe, sechzig Tropfen für ein Kind von zwei Jahren und hundert für einen Erwachsenen.

Essentia s. Tinctura Corticis viridis Nucum Juglandis. (D.)

℞. Corticis Juglandis recentis concisi
uncias sex.
Spiritus Vini Gallici libras duas.

Stent blando calore in digestione per dies quatuor, tum filtrentur. — Bitter, adstringirend, tonisch, aufregend.

Aqua Nucum Juglandium. (*Fi.*)

℞. Florum Juglandium recentium
libras undecim.
Juglandium recentium immaturarum . . . libras duodecim.
Aquae communis
libras triginta sex.

Coque in lebete stanneo florum libram unam cum Aqua ad quadrantis fluidi consumptionem et decoctum colatum cum reliquis floribus in alembico cupreo stanno obducto macerationi per unum diem subjice, quo facto duo trientes fluidi destillent; hanc aquam destillatam nucum viridium contusorum libris sex infunde, ut post unius diei macerationem trientes duo destillent; tum nucibus rejectis, decocto aquam destillatam affundendo reliquas nucum libras sex adde, quo facto aquae librae decem destillatione eliciantur. — Gabe, eine bis sechs Unzen.

Decoctum Drupae Juglandis regiae s. Corticis viridis Nucum Juglandium. (B*. Gen. *Au.*)

℞. Corticum Juglandium viridium
unciam unam.
Aquae bullientis uncias decem.

Coque per horae quadrantem et cola. (B*. Gen. *Au.*)

℞. Nucum Juglandium paulo ante maturitatem decerptarum et siccatarum . . . . uncias tres.
Aquae fontanae uncias quatuor.

Decoque ad dimidium et colaturae adde

Mellis albi . . . uncias duas.

Dissolve. (Gen.)

Bei rebellischen venerisch-mercuriellen Krankheiten und solchen, welche sehr reizbare Personen befallen, gerühmt. Frank empfiehlt die Flüssigkeit bei Flechtengeschwüren in Waschungen.

Infusum Juglandis compositum. (*Sw**.)

℞. Corticis Juglandis sicci,
Foliorum Juglandium,
singulorum manipulos quatuor.
Aquae . . . . quantum sufficit ut colaturae librae octo obtineantur.

Post unius horae infusionem adde

Calcariae muriaticae sesquiunciam.

Adstringirend, äußerlich in Bädern bei 36 bis 38° R. gegen Scrofeln, Lungentuberkeln und im Allgemeinen gegen alle Krankheiten, deren Grund man in das Lymphsystem setzt.

Decoctum Drupae Juglandis regiae s. compositum s. Pollini s. antisyphiliticum Pollini. (B*. GalF. *Au. Fi. Ra. Sa. Sw. Sy. T.*)

℞. Corticis Juglandium viridium
uncias decem.
Radicis Sarsaparillae.
— Chinae,
Pumicis,
Antimonii sulphurati (in nodulo),
singulorum semunciam.
Aquae uncias sexaginta quatuor.

Decoque in vase leviter tecto ad dimidii remanentiam. (B*. GalF. *Au.*)

℞. Radicis Sarsaparillae,
— Chinae,
singularum uncias duas.
Corticis Juglandium siccatorum
libram unam.
Antimonii sulphurati in nodulo,
Pumicis in nodulo,
singulorum uncias duas.
Aquae . . . . . libras viginti.

Decoque ad librarum decem remanentiam. (B*.)

℞. Radicis Sarsaparillae uncias tres.
— Chinae . . sesquiunciam.
Antimonii crudi in nodulo
uncias duas.
Nucum Juglandium integrarum
no. 30.
Aquae . . . . . libras decem.

Decoque ad librarum decem remanentiam. (*Sa.*)

℞. Corticis Juglandis uncias octodecim.

Radicis Sarsaparillae,
— Chinae,
Antimonii sulphurati, in nodulo.
Pumicis in nodulo,
singulorum semunciam;
Aquae . . . . . libras octo.
Post horas duodecim macerationis coque in vase tecto, tunc nodulis remotis coquendo continua ad librarum quatuor liquidi remanentiam et cola absque filtratione (*Sy.*)

Fi. Corticis recentis uncias decem, Radicum et Mineralium, singulorum semunciam et Aquae libras quatuordecim post macerationem per noctem unam ad dimidiam decoquendas; — *T.* ut antea, sed Corticis tantum uncias quinque.

Sy. Decoctum syphiliticum roborans: Antimonii uncias quatuor, Pumicis, Sarsaparillae, Chinae, singulorum uncias duas, Nucum ante maturitatem siccatarum no. 40, et Aquae libras viginti ad decem redactas.

℞. Corticis Juglandium siccati
unciam unam.
Sassaparillae,
Chinae, singulorum uncias duas.
Antimonii sulphurati in nodulo
uncias quatuor.
Pumicis in nodulo . uncias duas.
Aquae . . . . . libras viginti.
Coquendo dimidium consume. (GalF. *Sw.*)

℞. Chinae grisene,
Sassaparillae,
singulorum uncias tres.
Pumicis,
Antimonii crudi,
singulorum sesquiunciam.
Corticis Juglandium libram unam.
Aquae . . . . . libras octo.
Decoque ad octarii remanentiam et colaturae adde
Kali subcarbonici drachmas duas.
Dissolve. (*Ra.*)

Reizend, tonisch, bei Ausſatz, Flechten und hartnäckigen venerischen Uebeln empfohlen. — Gabe, Morgens und Abends ein Pfund. — Auch äußerlich in Waschungen.

Jujubae.

Zizyphus sativus, Cand.; Bruſtbeerſtrauch; Jujubier (*Gal.*); Jujeutree (*Ang.*); Azufeifas (*His.*); Jotlenboom (*Bel.*); Giuggiolo (*I.*); Anafegas (*Lus.*).

An. Ba. Br. Fer. Gal. HassP. His. Wir. Be. *Fi. G. M. Sp.*

Ein Strauch (Pentandria Digynia, L.; Rhamneae, *J.*) Oſtindien's, welchen man im ſüdlichen Europa zieht. (*Lamk.* Ill. gen. t. 185. f. 1. *Plenck* t. 142. Nouv. Duh. III. t. 16.)

Man wendet die Früchte, Bruſtbeeren (Jujubae s. Baccae Jujubae s. Zizyphi) an. Es ſind Steinfrüchte von der Geſtalt und Größe einer Olive, von rothgelber oder rother Farbe, welche unter einer dicken Schaale ein weiches, gelbes, ſchleimiges, ſüß und ſchleimig ſchmeckendes Fleiſch, und von demſelben bedeckt, einen länglichen, harten, gefurchten Kern enthalten.

Nach Ainslie's Bericht gebrauchen die Indier die Abkochung der Wurzel gegen manche Fieber, jedoch iſt er der Meinung, daß ſie wohl keine großen Kräfte beſitzen möge.

Species pectorales cum fructibus s. pro decocto Florum et Fructuum s. bechicae. (HassP. Pal. Wir.)

℞. Radicis Liquiritiae uncias duas.
Herbae Capilli Veneris Monspeliaci,
— Eudiviae,
singulorum drachmas duas.
Florum Boraginis,
— Buglossi,
— Violarum,
— Rosarum,
singulorum drachmam unam.
— Lupuli . drachmas duas.
Jujubarum,
Siliquae dulcis,
Prunorum Damascenarum,
singulorum uncias duas.
Tamarindorum . unciam unam.
Grossiuscule concisa misce. (Wir.)

Pal. Siliquam omittit, praescribit tamen Jujubarum, Prunorum et fructuum Sebestenae, singulorum no. 20; — HassP. Siliquae, Jujubarum, singulorum uncias tres, Dactylorum, Caricarum, Passularum minorum, Hordei mundi, singulorum uncias quatuor, Radicis Liquiritiae, Herbae Capillorum Veneris, Veronicae, Hyssopi, Florum Verbasci, singulorum uncias duas.

Fructus pectorales. (Gal.

℞. Jujubarum,
Dactylorum enucleatorum,
Ficuum,
Uvarum passarum,
singularum partes aequales.
Misce.

Pulpa Jujubarum. (Gal. *Fi. T.*)

℞. Jujubarum . . . quantum vis.
Aquae . . . quantum sufficit.
Coque ad emolliendos fructus, pulpam per crinium trajice, et aquam decocti cum ea commiscens totum blando igne ad aptam consistentiam consume.

Fi. Jujubarum libras septem, Infusi

Sennae, Sacchari, singulorum libras tres, caeterum ut Gal. ea tamen differentiâ, ut pulpa cum syrupo ex infusione et saccharo parato commixtâ, totum ad aptam consistentiam consumatur; — *T.* ut pulpam dactylorum.

Pasta Jujubarum. (B*. Ba. Gal. *Fi. T.*)

℞. Jujubarum . . . libram unam.
Gummi Senegalensis libras sex.
Sacchari puri . libras quinque.
Aquae filtratae . libras triginta.
Tincturae Corticis Citri unciam unam.

Coque in aquae libris decem et cola decoctum; in aquae reliquo gummi dissolve, colaturas commisce et, addito saccharo, albumina quinque cum Aqua subacta addendo, coque, spumam eximendo; liquorem ad tertiam partem redactum per linteum cola et ad syrupi spissi consistentiam redige; adde tunc tincturam et evaporationem in aquae balneo ad extracti moll's consistentiam usque continua, quod in formas ferreas stanno obductas, oleo oblitas effusum in vaporario sicca. (Gal.)

Fi. ut Gal. sed loco tincturae Aquae aromaticae Citri uncias duas; — *T.* Jujubarum enucleatarum uncias decem coquere in Aquae sufficiente quantitate, Albumina cùm Aquae circiter uncia una subacta et Tincturae alcoholicae Citri drachmas tres cum pondere aequali Aquae dilutae, caeterum ut antea; — B*. et Ba. coquere praescribunt Jujubarum, Dactylorum, Passularum minorum, singulorum partem unam in Aquae partibus triginta sex ad viginti quatuor redactis, colaturae addere Sacchari pondus duplum et tunc Albuminis cum Aquae pauxillo subacti partem dimidiam et ad syrupi consistentiam redactis addere, continuè agitando, Mucilaginis Gummi Arabici partes viginti quatuor et ad aptam consistentiam redacta ac in modulos effundere blandoque calore siccare.

Syrupus de Jujubis. (Br. Wir. *Sp.*)

℞. Jujubarum recentium uncias tres.
Liquiritiae . . . drachmas sex.
Capilli Veneris Monspeliaci,
Florum Violarum,
singulorum drachmas quinque.
Seminum Malvae,
— Cydoniorum,
— Papaveris albi,
singulorum drachmas tres.
Aquae fontanae libras duas cum dimidia.

Coque ad unciarum octodecim liquidi remanentiam et in iis dissolve

Gummi Tragacanthae electi drachmam unam.
Sacchari albi uncias triginta duas.
Serva. (Br. Wir.)

℞. Jujubarum . . . . uncias tres.
Radicis Liquiritiae,
Capilli Veneris Monspeliaci,
Hordei mundati,
singulorum unciam unam.
Aquae uncias quadraginta quatuor.

Coque ad unciarum triginta sex remanentiam, sub finem addendo
Florum Violarum uncias quinque.
Cum colatura et
Seminum Malvae unciis quinque.
— Cydoniorum,
— Papaveris albi,
— Melonum,
— Lactucae,
singulorum drachmis tribus emulsione parata, in liquore dissolve
Sacchari uncias viginti quatuor.
Gummi Tragacanthae drachmas tres.

Coque ad syrupi consistentiam. (*Sp*)

Decoctum pectorale. (Sar. *Ca. T.*)

℞. Jujubarum,
Caricarum pinguium concisarum,
Uvarum passarum mundatarum,
Radicis Liquiritiae,
singularum semunciam.
Aquae communis . . libras sex.

Coque fructus in aqua, donec haec ad tertiam partem sit redacta, adde liquiritiam ab igne removens, infunde per tempus aliquot et cola. (Sar.)

Ca. Fructuum pectoralium uncias duas et Aquae libras duas cum dimidia, coctione ad libras duas redactas; — *T.* Foliorum siccatorum Farfarae uncias sex, Caricarum siccarum, Uvarum passarum, Jujubarum siccatarum, singularum uncias duas, Aquae libras duodecim. Coque ad tertiae partis consumptionem, addendo Radicis Liquiritiae uncias duas.

Jusculum pectorale. (*Pie. Sm.*)

℞. Pulmonis vitulini,
Colli vervecis,
singulorum no. ½.
Jujubarum . . . . . no. 20.
Dactylorum . . . . . no. 12.
Uvarum Damascenarum semunciam.
Radicum Napi . . uncias duas.
Gruti . . . . drachmas duas.
Conservae Angelicae unciam unam.
Aquae . . . . . octarios duos.
Ebulliant. (*Pie.*)

℞. Pulmonis vitulini concisi,
Pulli gallinacei pelle privati,
singulorum no. ½

Jujubarum . . . no. 12 aut 15.
Hordei perlati
cochlearia duo majora.
Aquae
octarium unum cum dimidio.
Parte tertia consumpta, absque despumatione et aliquot momenta antequam ab igne removeris, adde Foliorum viridium Pulmonariae manipulum unum.

Juniperus.

Drei Arten dieser Pflanzengattung werden in den Pharmacopöen angeführt:

1) *Juniperus communis, L.*; Wachholder, Kaddig; Génévrier commun (*Gal.*); Juniper (*Ang.*); Galowec (*B.*); Ene, Enebaer (*D.*); Enebro (*His.*); Genever (*Bel.*); Ginepro (*I.*); Jalowiec (*Pol.*); Zimbro (*Lus*); En (*Suec.*).

Am. Am. An. B. Ba. Bel. Bor. BorG. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RG. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *Be. Br. C. Fi. G. M. Par. Pid. Sp.* Z.

Ein Baum oder Strauch (Dioecia Monadelphia, L.; Coniferae), welcher in Europa einheimisch ist. (*Blackw.* t. 187. *Plenck* t. 719. *Schk.* t. 338. Dict. d. Sc. nat. Livr. VII. *Bert.* Bild. VIII. 32. Fl. méd. IV. 181.)

Man wendet das Holz, die Spitzen und die Früchte an.

Das Holz (lignum Juniperi, lignum cedrinum) ist fest, schwer und sehr harzig und hat eine außen graue oder röthlichbraune, inwendig gelbliche oder röthlichgelbe Rinde. Der Geruch ist angenehm und balsamisch, der Geschmack gewürzhaft, harzig und etwas bitter.

Die Spitzen oder Enden der Zweige sind dünn und bestehen aus stehenden, meist zu drei vereinigten, schmalen, spitzigen, harten und stechenden Blättern (Nadeln).

Die Früchte sind kugelige, schwärzliche Beeren von harzigem Geruch und balsamischem, etwas bittern und zugleich süßlichen Geschmack.

Alle Theile der Pflanze, und besonders die Beeren, werden als kräftig harntreibend angesehen. Auch legt man dem Holze Kräfte gegen die Syphilis bei.

Gabe des Pulvers, zwei bis sechs Drachmen.

2) *Juniperus Virginiana, L.*; Virginischer Wachholder; Génévrier de Virginie, Cèdre rouge (*Gal.*); Common red cedertree (*Ang.*).

Am. *C.*

Ein Baum (Dioecia Monadelphia, L.; Coniferae, *J.*) Nordamerica's. (*Pluk.* Alm. 201. t. 197. f. 4. *Big.* Am. Bot. T. IV. t. 45.)

Die Blätter sind ganz einfach, lanzettförmig und spitzig. Sehr jung angewendet können sie die Sadebaumblätter ersetzen.

3) *Juniperus Sabina, L.*; Sadebaum, Sevenbaum; Sabine (*Gal.*); Savine (*Ang.*); Sawina neb klasterska chwogka (*B.*); Sevenbom (*D.*); Sabina (*His. I. Lus.*); Seevenboom (*Bel.*); Sawina (*Pol.*); Saefwenbom (*Suec.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RG. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *Be. Br. C. Fi. G. M. Par. Pid. Sp.* Z.

Ein Strauch Südeuropa's und der Levante. (*Bull.* t. 139. *Blackw.* t. 214. *Plenck* t. 720. *Schk.* t. 338. *Zorn* Ic. pl. t. 525.)

Man wendet die Blätter (folia s. herba Sabinae) an; sie sind entgegengesetzt, eirund, etwas spitzig und auf dem Rücken gewölbt. Sie haben einen harzigen, gewürzhaften, sehr durchdringenden Geruch und einen sehr bittern Geschmack.

Kräftig reizend, aufregend und die Reinigung treibend.

Conserva Juniperi. (*Sw.*)

℞. Baccarum recentium Juniperi
uncias octo.
Contusis adde sensim
Sacchari albi . uncias quatuor.
Solve leviter calefaciendo.

Conserva Sabinae. (Han. Pol. Sax. *Sw.*)

℞. Foliorum Sabinae contusorum
partem unam.
Sacchari albi pulverati partes duas.
Contere. (Pol. Sax. *Sw.*)
Han. Foliorum partem unam et tres Sacchari.

Pulvis diureticus. (B*. *Au.*)

℞. Baccarum Juniperi tostarum,
Radicis Pimpinellae albae,
singularum grana quinque.
Nitri antimoniati . grana tria.
Von Theden empfohlen. (B*.)

℞. Baccarum Juniperi tostarum,
Sacchari albi,
singulorum partes aequales.
Gabe, alle zwei oder drei Stunden einen Kaffeelöffel. (*Au.*)

Pulvis emmenagogus. (*E.*)

℞. Herbae Sabinae,
Zingiberis,
singulorum drachmam unam.
Kali sulphurici drachmas duas.
Divide in partes sex. — Gabe, ein Stück zweimal täglich.

Pulvis Sabinae compositus. (RC.)

℞. Pulveris Herbae Sabinae,
Ferri carbonici praecipitati,
Zingiberis vel . . . .

Reizend, von van Swieten bei Bauchwassersucht gerühmt. — Gabe, alle drei Stunden eine bis zwei Unzen.

Elixir juniperinum s. malvaticum juniperinum. (*Sp.*)

℞. Roob Juniperi . uncias quatuor.
Vini Maderani uncias duodecim.
Mixta bene per linteum trajice.

Reizend, blähungs- und harntreibend. — Gabe, ein Löffel auf einmal.

Potio juniperina s. hydragoga. (B*. *Au. Ca. Sa.*)

℞. Roob Juniperi . uncias quatuor.
Aquae Juniperi . . libras duas.
Mixtis bene, adde
Spiritus Juniperi . uncias duas.
Misce. (B*. *Au. Ca.*)

℞. Roob Juniperi . unciam unam.
Aquae Juniperi . . uncias sex.
Spiritus Juniperi . . semunciam.
— Nitri dulcis semidrachmam.
Misce. (*Sa.*)

Gabe, alle zwei oder drei Stunden zwei Unzen.

Tinctura s. Essentia Sabinae. (Ham. HassP.)

℞. Foliorum Sabinae partem unam.
Alcoholis . . . . partes sex.
Stent per plures dies in digestione, tum colentur cum expressione et filtrentur.

HassP. ut tincturam croci I. p. 574.

Gabe, dreißig Tropfen mehrmals täglich.

Potio emmenagoga. (*E.*)

℞. Tincturae Sabinae unciam unam.
— Hellebori nigri semunciam.
— Castorei . drachmas duas.

Gabe, vierzig Tropfen dreimal täglich.

Tinctura Sabinae kalina s. arthritica. (B*. *Au. Sw. Vm.*)

℞. Foliorum recentium Sabinae unciam unam.
Tincturae alcalinae . uncias sex.
Stent in digestione per dies quatuor.
B*. *Au. Vm.*)

Ex tempore paratur solvendo Olei essentialis Sabinae drachmas duas in Tincturae alcalinae unciis sex.

Sw. Sabinae unciam unam et Tincturae alcalinae uncias octo.

Ceratum s. Unguentum Sabinae. (Am. B*. Ba. Du. Ed. Lon. LonN. Suec. *C. Fi. Sw. T. Vm.*)

℞. Foliorum recentium Sabinae partes duas.
Cerae flavae . . partem unam.
Axungiae Porci partes quatuor.
Foliis cum axungia cootis ceram adde. (B*. Ba. Du. Ed. Lon. LonN. Suec. *Sw. Vm.*)

Am. et *C.* miscere jubent Cerati resinosi partes sex et Sabinae pulveratae partem unam; — *Fi.* Foliorum, Cerae et Axungiae easdem quantitates ut antea, in vase ferreo lente coquere ad coloris viridis extractionem et humidi consumptionem; — *T.* Ceram et Axungiam liquatas cum Foliis ad humidi consumptionem coquere.

Als epispasticum angewendet.

Oleum Baccarum Juniperi aethereum, Aethereoleum Baccarum Juniperi. (Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Han. HassP. His. Lon. LonN. Lus. O. Pal. Pol. R. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. *Br. C. Sw. T.*)

℞. Baccarum Juniperi contusarum quantum vis.
Aquae . . . quantum sufficit.
Destillent et oleum separetur. (Am. Ams. B. Bel. Du. Ed. Fenn. Fer. Gen. Lon. LonN. Lus. R. Suec. *C.*)

Ba. Baccarum partem unam et tres Aquae; — Fer. Ful. et *Sw.* Baccarum unam et quatuor Aquae; — D. et *Vm.* Baccarum unam, Aquae sex; — Bor. Han. O. Pol. et Sax. Baccarum unam et octo Aquae; — Bor4. et HassP. ut Bor. caeterum ut oleum absinthii, corticum aurantiorum, calami etc.; — Gal. Baccarum quinque et Aquae septem; — An. et *Br.* Baccarum tres et decem Aquae; — His. Bacoarum unam et Aquae quadraginta; — *T.* Baccarum quantum vis, Aquae duplum pondus; destillando dimidium vel duae partes quintae liquidi adhibiti elice, cohoba usque quantitas requisita sit obtenta.

℞. Baccarum Juniperi partes quatuor.
Aquae . . . . partes sedecim.
Salis culinaris . . partem unam.
Post tres dies macerationis fiat destillatio. (Br. Pal. Sar. Wir.)

℞. Baccarum Juniperi quantum vis.
Aquae Juniperi quantum sufficit.
Post horas duodecim fiat destillatio. (Wür.)

Gabe, zwei bis zehen Tropfen in einem Vehikel.

Oleum Ligni juniperini aethereum, Aethereoleum Ligni juniperini. (A. Han. Pal.)

℞. Ligni Juniperi . partem unam.
Aquae . . . . . partes octo.
Destillent. (Han.)

Pal. Ligni partem unam et sex Aquae; — A. Ligni unam et duodecim Aquae. Sar. Oleum obtinet destillando lig-

um raspatum prope ignem apertum et oleum foetidum a liquore claro, qui antea prodit, separando.

Elaeosaccharum s. Oleosaccharum Juniperi. (BorC. HassP.)

℞. Olei essentialis Juniperi guttas duodecim.
Sacchari pulverati . semunciam
Triturando misce.

HassP. Olei guttas quatuor, Sacchari drachmas duas.

Pulvis excitans. (*Au.*)

℞. Sacchari albi . . . semunciam.
Olei essentialis Juniperi guttas tres.
Terendo fiat elaeosaccharum, cui adde
Salis culinaris drachmam unam.
Divide in partes duodecim. — Gabe, drei Stück täglich, bei weißen Gelenkgeschwülsten.

Oleum Sabinae aethereum, Aethereoleum Sabinae. (A. Ams. An. Bor. Bor4. Br. Ed. Fer. Ful. Gal. Han. Hass. HassP. O. Pal. Pol. R. Sar. Sax. Wür. *C. Pid. Sw. T. Vm.*)

℞. Foliorum Sabinae quantum vis.
Aquae purae . quantum sufficit.
Destillent. (Ams. Ed. Fer. R. *C.*)

T. Sabinae partem unam, Aquae bullientis duplum pondus, destillent et repetitae cohobationi subjiciantur; — Ful. et Sar. Sabinae partem unam et tres Aquae; — *Sw.* Sabinae unam et quatuor Aquae; — *Vm.* Sabinae unam et sex Aquae; — Bor. Bor4. Han. HassP. O. Pol. et Sax. Sabinae unam et octo Aquae (caeterum ut oleum calami aethereum Bor4.); — A. Sabinae unam et Aquae duodecim; — An. Sabinae sex et viginti Aquae; — Gal. Sabinae quinque et septem Aquae.

℞. Herbae Sabinae partes viginti quinque.
Aquae partes sexaginta quatuor.
Salis culinaris . . . partes tres.
Destillent. (Br. Hass. Pal. *Pid.*)

℞. Herbae Sabinae . quantum vis.
Aquae destillatae Sabinae quantum sufficit.
Destillent. (Wür.)

Gabe, vier bis zwanzig Tropfen in einem Trank.

Potio emmenagoga. (*Ca. Ra.*)

℞. Aquae Artemisiae uncias quinque.
Syrupi Florum Aurantiorum unciam unam.
Aquae Florum Aurantiorum semunciam.
Olei essentialis Rutae,
Olei essentialis Sabinae, singulorum guttas sex.
Kaffeelöffelweise.

Aqua Juniperi. (A. B°. Ba. BorC. Gal. Hass. HassP. Li. Sax. Wür. *Br. Fi. Pid. Sw. T. Vm.*)

℞. Baccarum Juniperi partes duas.
Aquae . . . partes quindecim.
Destillent partes quatuor. (Gal.)

T. Baccarum partem unam, Aquae quatuor; destillent partes duae; — B°. Ba. Baccarum partem unam et quinque Aquae; destillent partes duae; — Wür. Baccarum partem unam et Aquae duodecim; — A. Bacoarum unam et decem Aquae; destillent partes sex; — *Br.* Baccarum unam et duodecim Aquae; destillent partes quatuor vel sex (Hass. Li. *Pid.*) vel duodecim (*Fi.*); — Sax. Baccarum unam, Aquae viginti duae; destillent quindecim; — *Sw.* Baccarum unam et Aquae sufficientem quantitatem; destillent partes viginti; — HassP. Baccarum libras tres, Aquae quantum sufficit; destillent librae viginti quatuor.

℞. Foliorum recentium Juniperi partem unam.
Aquae Vitae . partem dimidiam.
— purae partes centum sexaginta.
Destillent partes quadraginta, oleum separa et aquam serva. (*Vm.*)

℞. Elaeosacchari Juniperi drachmam unam.
Aquae destillatae . uncias octo.
Dissolve. (BorC.)

Aqua Sabinae. (Wür. *Pid.*)

℞. Herbae Sabinae . partem unam.
Aquae . . . . . partes octo.
Post macerationem viginti quatuor horarum destillent partes octo. (*Pid.*)

Wür. Sabinae partem unam et sex Aquae.

Spiritus Juniperi. (An. Bor4. Br. Ful. Han. Hass. HassP. Li. Pal. Wir. Wür. *Pid. T. Vm.*)

℞. Baccarum Juniperi partem unam.
Alcoholis . . partes duodecim.
Post horas viginti quatuor macerationis destillent. (Ful. Hass. *Pid.*)

An. et Li. Baccarum partem unam et octo Alcoholis; — Br. Pal. Wir. et Wür. Baccarum unam et duas Alcoholis; — *T.* Baccarum integrarum libras tres, Alcoholis 22° libras octo; post trium dierum digestionem destillent trientes duo.

℞. Baccarum Juniperi partem unam.
Alcoholis (Spiritus Vini rectificati) partes quatuor.

Aquae . . . quantum sufficit.
Post horas viginti quatuor destillent. (librae quatuor Bor4. HassP.) (Bor4. Han. HassP.)

℞. Baccarum Juniperi libras quindecim.
Sacchari . . . . . semilibram.
Fermenti Cerevisiae . uncias duas.
Aquâ tepida infusa bene dilue et temperaturae + 15 — + 18° R. expone; post fermentationem alembico infunde; additis deinde duplo volumine Aquae et Spiritus Frumenti libris octo, destillet spiritus 18 ad 20° indicans.

Spiritus Juniperi compositus, Alcohol Juniperi compositum. (Am. B. Bel. Ed. Lon. LonN. Suec. *C. Fi. Sw. T. Vm.*)

℞. Baccarum Juniperi libram unam.
Carvi,
Foeniculi, singulorum sesquiunciam.
Aquae Vitae . . octarios octo.
— purae . . quantum sufficit ad prohibendum empyreuma. Destillent octarii octo. (Am. B. Bel. Ed. Lon. LonN. Suec. *C. Sw.*)

Fi. Baccarum libram unam, Seminum Cumini, Anisi, singulorum sesquiunciam, Alcoholis 25° libras sex, Aquae communis libras duas; destillent librae sex; — *T.* ut *Fi.* sed Alcoholem 30°, pro aqua simplici Aquam Florum Aurantiorum, duorum dierum maceratione et destillationem trientium circiter duorum.

℞. Baccarum Juniperi . partes sex.
Foliorum recentium Ribium nigrorum . . . . partem unam.
Seminum Dauci sylvestris,
— Ribium nigrorum,
singulorum partes duas.
Spiritus Frumenti partes triginta sex.
Aquae purae partes centum et octo.
Destillent partes viginti quatuor. (*Vm*)

Stärkung- und harntreibend. — Gabe, zwei bis vier Drachmen.

Spiritus Sabinae. (Ham. *Au.*)

℞. Herbae Sabinae . partem unam.
Alcoholis . . . partes quatuor.
Aquae purae . quantum sufficit.
Post horas viginti quatuor macerationis fiat destillatio.

Linimentum juniperinum. (*Au.*)

℞. Spiritus Juniperi . uncias duas.
Olei Caryophyllarum,
Balsami Nucistae,
singulorum semidrachmam.

Von Rosenstein bei Ekchymosen und kalten Geschwülsten gerühmt. Chrestien wendet es in Einreibungen auf das Rückgrat und die Lenden bei Frauen, welche zu Mißfällen geneigt sind, an.

Linimentum resolvens et diureticum. (*B.*)

℞. Spiritus Saponis . . uncias tres.
— Juniperi . unciam unam.

Morgens und Abends auf den Unterleib eingerieben, bei Bauchwassersucht mit Atonie.

Linimentum excitans. (*Au.*)

℞. Spiritus Sabinae . . uncias sex.
Olei essentialis Sabinae drachmam unam.

In Einreibungen, bei gichtischen Schmerzen.

Tinctura hydragoga. (*Bo.*)

℞. Radicis Aristolochiae rotundae,
— — longae,
singularum sesquiunciam.
Radicis Zingiberis,
— Armoraciae,
Bulborum Scillae siccorum,
singulorum semunciam.
Summitatum Absinthii,
— Centaurii minoris,
Baccarum Juniperi,
singulorum unciam unam.
Salis Absinthii . . semunciam.
Alcoholis Juniperi . . libras sex.

Post dierum octo macerationem filtra. — Reizend, harntreibend, von Boerhaave bei Wassersucht empfohlen. — Gabe, eine Unze täglich viermal.

Infusum Baccarum Juniperi. (B*. BorC. RC. WW. *Au. Ra.*)

℞. Baccarum Juniperi contusarum sesquiunciam.
Aquae bullientis . sesquilibram.
Digere in vase tecto per horam dimidiam et cola. (BorC. WW. *Au.*)

Ra. Baccarum drachmas duas et Aquae libras duas; — B*. Baccarum unciam unam et Aquae satis ut colaturae uncias tres obtineantur; — RC. Baccarum unciam unam, Aquae libram unam; stent per horam. Interdum adduntur: Aetheris sulphurici alcoholisati drachmae duae vel Tincturae aromaticae vel Calami semuncia.

Aromatisch, schwach urintreibend, bei Wassersucht empfohlen. — Glasweise.

Infusum Sabinae. (RC. *Au.*)

℞. Herbae Sabinae drachmam unam.
Aquae bullientis . uncias septem.
Infunde et cola. — Gabe, alle zwei Stunden einen Löffel. — Rau rühmt es bei sogenannten asthenischen Entzündungen des Uterus und der Blase.

RC. ut infusum baccarum Juniperi.

Infusum Baccarum Juniperi compositum. (*Sa.*)

℞. Baccarum Juniperi contusarum uncias duas.
Aquae Juniperi . . libras duas.
Digere blando calore per horas tres, cola et adde
Roob Juniperi . . uncias duas.
Oxymellis scillitici sesquiunciam.
Misce. — Harntreibend.

Decoctum Juniperi. (*Fl. Sa. Sw.*)

℞. Summitatum Juniperi uncias tres.
Aquae . . . . libras quatuor.
Decoque ad librarum duarum remanentiam et sub finem adde
Baccarum Juniperi unciam unam.
Cola. — Reizend, harntreibend, bei Wassersucht, Asthma und Hautkrankheiten empfohlen. — Gabe, vier bis acht Unzen täglich drei Mal.

Decoctum Ligni Juniperi. (B*.)

℞. Ligni Juniperi raspati semunciam.
Aquae fontanae . uncias sedecim.
Decoque ad dimidium et cola. — Reizend, ehedem bei der Behandlung venerischer Krankheiten gepriesen. — Der Kranke verbraucht täglich acht Unzen.

Decoctum Sabinae. (B*.)

℞. Herbae Sabinae . unciam unam.
Aquae bullientis . libram unam.
Decoque ad unciarum sex liquidi remanentiam, cola et adde
Syrupi cujuslibet . unciam unam.
Gabe, alle zwei Stunden zwei Eßlöffel.

Potus diureticus, Tisana diuretica. (*Sm. Sw.*)

℞. Baccarum Juniperi contusarum manipulum unum.
Aquae semisextarios (semi-setiers) tres.
Coque per horam dimidiam et colaturae adde
Syrupi Polygalae Virginicae uncias duas.
Vini albi . . . . uncias octo.
Misce. (*Sm.*)

℞. Baccarum Juniperi,
Seminum Sinapis,
singulorum unciam unam.
— Dauci . drachmas sex.
Foliorum Absinthii drachmas tres.
Cerevisiae . . . libras quatuor.
Infunde frigide et cola. (*Sw.*)

Decoctum Fructuum Juniperi carminativum, Potus carminativus. (His.)

℞. Baccarum Juniperi,
Seminum Anisi,
Salis Ammoniaci,
singulorum unciam unam.
Florum Chamomillae uncias duas.
Aquae . . . . libras quatuor.
Coque leviter, cola et colaturae adde
Aquae Vitae . . . libram unam.

Vinum Juniperinum s. diureticum. (*Au.*)

℞. Baccarum Juniperi,
Seminum Sinapis,
Armoraciae,
singulorum semunciam.
Kali subcarbonici . semilibram.
Vini Rhenani . octarios quatuor.
Post aliquot dies cola.

℞. Radicis Zedoariae,
— Scillae,
Baccarum Juniperi,
singularum drachmas duas.
Cinnamomi . . drachmas tres.
Kali subcarbonici sesquidrachmam.
Vini Rhenani . . sesquilibram.
Post sufficientem extractionem cola.

Unguentum Juniperi. (*Vm.*)

℞. Gemmarum Juniperi contusarum partem unam.
Axungiae Porci fusae partes duas,
Macera per horas duas et cola fortiter exprimendo.

Ceratum Juniperi Virginicae. (Am. C.)

℞. Foliorum Juniperi Virginicae partem unam.
Cerati resinosi . . . partes sex.
Misce.

Justicia.

Justicia pectoralis, L.; Zimmermanns wundhelz; Carmantine pectorale, Herbe aux charpentiers (*Gal.*).

Gal.

♃ (Diandria Monogynia, L.; Acanthaceae, *J.*) Eine auf den Antillen wachsende Pflanze. (*Jacq.* Austr. III. t. 3.)

Das Kraut, welches angewendet wird, besteht aus vier kantigen, knotigen, glatten Stängeln mit entgegengesetzten, linienlanzettförmigen, spitzigen, ganzen, glatten Blättern. Es ist schwach adstringirend.

K.

Kalmia.

Kalmia latifolia, L.; großblättrige Kalmie; Kalmie à larges feuilles (*Gal.*); Montain laurel (*Ang.*).

C.

ℏ (Decandria Monogynia, L.; Rhodoraceae, *J.*) Eine Pflanze Carolina's und Virginien's. (*Trew Ehret.* t. 38. f. 1. *Catesb.* t. 98. *Pluk.* Alm. t. 379. f. 6. *Wangenheim* t. 24. f. 50.)

Die Blätter sind eirundlänglich, fest, glatt, ganz, zwei bis drei Zoll lang und einen Zoll breit.

Adstringirend.

Decoctum Kalmiae latifoliae. (B*.)

℞. Foliorum Kalmiae unciam unam.
Aquae fontanae . . uncias octo.
Decoque ad dimidium et cola. — Bei chronischem Durchfall empfohlen. — Gabe, sechzig Mal dreißig Tropfen, bis der Kranke Schwindel empfindet.

Kikekunemalo.

Resina Kikekunemalo.

Br. Wir. *M. Sp.*

Ein grünliches, halbdurchsichtiges, brüchiges Harz aus America, in dessen Bruche sich gelbe Körner zeigen, von angenehmem Geruch und etwas bitterem Geschmack.

Nach Guibourt ist es eine Art Anime. Nach Birey kommt es von Bursera gummifera. Man gebraucht es jetzt nicht mehr.

Kino.

Gummi Kino, Gummi Gambiense, Gummi adstringens Fothergilli; Kinoharz, Kinogummi, Gambienser Gummi; Kino, Gomme Kino, Gomme de Gambie (*Gal.*); Tumble hoau (*Tam*); Dumumlackwayn, Kandamur garittum (*Tel.*).

Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Han. Hass. HassP. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. RC. Sax. Suec. Wir. *Br. C. Fi. G. M. Par. Sp.* Z.

Man unterscheidet vorzüglich drei Arten Kino.

1) In unregelmäßigen, trocknen, brüchigen, dunkelbraunen, auf dem Bruche fast schwarzen und glänzenden, undurchsichtigen, geruchlosen, adstringirend und etwas bitter schmeckenden Massen. Man hält es für die bis zur Trockenheit abgedunstete Abkochung der Zweige von Nauclea longiflora, *Poir.* (Pentandria Monogynia, L.; Rubiaceae, *J.*), einem Strauche Indien's. (*Rumph* Amb. V. t. 34. f. 1.)

2) In sehr kleinen, glänzend schwarzen, undurchsichtigen, aber durchscheinenden, zu dünnen Blättchen zerkleinert, rubinrothen, geruchlosen, deutlich adstringirend schmeckenden Stücken. Es wird für das Product der Abkochung des Holzes von Coccoloba uvifera (Octandria Digynia, L.; Polygoneae, *J.*), einem Baume Jamaica's, gehalten.

3) In löcherigen, trüben, an manchen Stellen röthlichen, glänzenden, an andern schwarzen, geruchlosen Massen von adstringirendem Geschmack. Es scheint aus dem Stamme der Eucalyptus resinifera, *Sm.* (Icosandria Monogynia, L.; Myrteae, *J.*), einem Baume Neuholland's. (*White* Itin. 23.) zu fließen.

Es enthält viel Gerbestoff und Extractivstoff, doch kennt man seine Bestandtheile nicht genau. — Eisen-, Silber- und Bleisalze, so wie Gallerte dürfen nicht damit verbunden werden.

Kräftig adstringirend. — Gabe des Pulvers, zehen Gran bis eine halbe Drachme.

Pulvis Kino compositus s. stypticus s. Kino gummosus s. adstringens (Lon. LonN. RC. *Au. C. Ca. T.*)

℞. Kino . . . drachmas quindecim.
Cinnamomi . . . semunciam.
Opii . . . . drachmam unam.

Gabe, ein Scrupel, bei innern Blutflüssen. (Lon. LonN. *C. Ca.*)

℞. Kino . . . . semidrachmam.
Gummi Arabici drachmam unam.

Fiat pulvis. — Aeußerlich bei Blutungen. (*Au.*)

℞. Aluminis pulverati . uncias tres.
Liqua in crucibulo et adde per vices
Kino subtilissime pulverati
unciam unam.

Misce et pulvera. (*T.*) — Statt des Kino ebensoviel Drachenblut hinzugesetzt giebt das Pulvis aluminosus Helvetii I. p. 135.

Pilulae e Kino et Camphora. (*Au.*)

℞. Kino . . . . scrupulos duos.
Camphorae . . sesquiscrupulum.
Pulveris aromatici
scrupulum unum.
Zinci oxydati . scrupulum unum.

Fiant pilulae viginti. — Gabe, zwei Stück Morgens und Abends, bei Harnruhr.

Pilulae ad diarrhoeam s. antidiarrheicae. (*E.*)

℞. Kino . . . . . grana viginti.
Opii . . . . . grana duo.

Mucilaginis Gummi Arabici
quantum sufficit.
Fiant pilulae quatuor. — Gabe, alle Stunden ein Stück.

Pilulae stimulantes ad gonorrhoeam s. adstringentes. (*Sy.*)

℞. Kino . . . . . semunciam.
Balsami Canadensis . uncias duas.
Radicis Tormentillae
quantum sufficit.
Fiant pilulae granorum quinque.

Electuarium adstringens. (*Sw.*)

℞. Kino . . . . . drachmas sex.
Aluminis,
Cinnamomi,
singulorum drachmas duas.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.
Bei Durchfall, chronischer Ruhr und Blutflüssen. — Gabe, eine Drachme zwei oder drei Mal täglich.

Potio adstringens. (*ParC.*)

℞. Rosarum provincialium
drachmas duas.
Aquae bullientis . uncias quatuor.
Infunde per horas duas, cola et adde
Kino . . . . . semidrachmam.
Aquae Rabelii . . guttas viginti.
Syrupi Corticis Granati
unciam unam.

Injectio adstringens. (*Sw. Sy.*)

℞. Kino grana viginti ad triginta.
Aquae bullientis . libram unam.
Post unius horae infusionem cola. (*Sy.*)

℞. Kino . drachmam unam ad duas.
Aluminis grana viginti ad triginta.
Aquae bullientis . . libras duas.
Post unius horae digestionem cola. (*Sw.*)

Bei chronischer Harnröhrenentzündung.

Mixtura roborans. (*Sw.*)

℞. Kino . . . . . drachmas duas.
Nitri. . . . . drachmam unam.
Mucilaginis Gummi Arabici
uncias duas.
Electuarii adstringentis
drachmas duas.
Misce triturando et sensim addendo
Aceti . . . . . sesquiunciam.
Aquae Cinnamomi . uncias sex.
Syrupi Cinnamomi unciam unam.
Bei Mutterblutfluß. — Gabe, einen oder zwei Löffel, alle vier oder sechs Stunden.

Syrupus Kino. (*Br.* *T.*)

℞. Kino pulverati grana
sexcenta nonaginta.
Aquae purae . . libras septem.
Sacchari albi . . . libras duas.
Tritura per horae quadrantem in mortario marmoreo pulverem cum Aquae bullientis fere simul infusae libris quatuor. Liquorem refrigeratum filtra et colaturam repone. Residuo reliquas tres Aquae ad 60° calefactae libras adde et utramque solutionem commisce. Saccharo clarificato et ad electuarii consistentiam cocto solutionem adde et ad syrupi consistentiam consume.

T. Kino purificati uncias duas, Aquae tepidae libras tres; solutioni adde Sacchari libras quatuor.

Tinctura Kino. (Am. An. B°. Bel. Du. Ed. Fer. Ful. HassP. Li. Lon. LonN. Lus. Sax. *Br. C. Fi. Sw. T. Vm.*)

℞. Kino . . . . . uncias tres.
Alcoholis (0,930) . octarios duos.
Post dies quatuordecim filtra. (Am. Lon. LonN. *C.*)

Du. Kino uncias tres, Alcoholis (0,930) sesquioctarium; — B°. et Ed. Kino uncias duas et Alcoholis (0,935) sesquilibram; — Fer. et *Sw.* Kino uncias duas, Alcoholis (0,935) libram unam et octo uncias Aquae Cinnamomi; — Bel Kino partem unam et octo Alcoholis (20°); — *Br.* Kino partem unam et sedecim Alcoholis (0,935); — Sax. Kino partem unam et quinque Spiritus rectificati; — *Vm.* Kino unam et sex Alcoholis; — Lus. Kino uncias duas, Aquae Vitae sesquilibram; — Ful. Kino drachmas duas, Aquae Cinnamomi simplicis sesquiunciam et Aquae Cinnamomi vinosae semunciam; — Li. Kino uncias duas, Aquae destillatae uncias sex et Spiritus Nitri dulcis tantidem; — HassP. Kino uncias duas, Spiritus Vini rectificati sedecim, sex dierum digestionem calore 20 ad 24°; pondus tincturae filtratae uncias quatuordecim aequet. — *T.* Kino unciam unam, Alcoholis 25° B. uncias sedecim, digere per dies duodecim vel quindecim; — *Fi.* Kino uncias novem, Alcoholis 24° libras tres, macerata per dies quatuordecim filtra.
Adstringirend — Gabe, eine halbe Unze.
RG. Kino sesquiunciam, Corticis Lauri Cassiae unciam unam, Alcoholis diluti libram unam. — Gabe, eine bis drei Drachmen.

L.

L a c.

Milch; Lait (*Gal.*); Milk (*Ang.*); Lebn (*Ar.*); Leche (*His.*); Dud (*Hin.*); Melk (*Bel.*); Latte (*I.*); Schir (*Pe.*); Khschira, Payas, Dughda (*Sa.*); Jaelk (*Suec.*). Ams. Ba. Bor4. Gal. GalM. Ham. Hass. HassP. His. Suec. Wir. *A. G. Pid Sp. T.*

Eine undurchsichtige, weiße, etwas fettige, und schwerere Flüssigkeit als Wasser, welche die Brustdrüsen weiblicher Säugthiere kurze Zeit nach der Geburt abzusondern anfangen. Sie hat einen süßen, angenehmen, mehr oder minder zuckerartigen Geschmack und einen eigenthümlichen Geruch, welcher sich in dem Maaße, wie sie erkaltet, verliert.

Man wendet drei Arten Milch an:

1) *Lac vaccinum s. bubulum*; Kuhmilch; Lait de vache (*Gal.*); Ellakerry (*Cy.*); Ghayka dud (*Duk.*); Gaicha dud (*Mah.*); Susu (*Mal.*); Gokschira (*Sa.*); Paschuin paal (*Tam.*); Au palu (*Tel.*).

2) *Lac caprinum*; Ziegenmilch; Lait de chevre (*Gal.*); Jlukirie (*Cy.*); Chaylie ka dud (*Duk.*); Leche de cabra (*His.*); Ajakschira (*Sa.*); Aatu paal, Vellata paal (*Tam.*); May ka palu. (*Tel.*).

3) *Lac asininum*; Eselsmilch; Lait d'Anesse (*Gal.*); Cotalukirie (*Cy.*); Gadika dud (*Duk.*); Ghadwa tscha dud (*Mah.*); Kharakhira (*Sa.*); Kalady paal (*Tam.*); Gadilay paala (*Tel.*).

Die beiden erstern sind einander sehr ähnlich; die letztere enthält weit mehr Rahm als sie.

Ueberläßt man die Milch sich selbst, so trennt sie sich nach einiger Zeit in drei Theile:

1) den *Cremor*; Milchrahm; Crème (*Gal.*); Graedda (*Suec.*);

2) das *Caseum*; Käse und

3) das *Lac ebutyratum*; Buttermilch; Sérum (*Gal.*); Dogh (*Ar.*); Schaatssh (*Duk.*); Mutha (*Hin.*); Takram, Dan dabatam (*Su.*); Moru (*Tam.*); Tsalla (*Tel.*).

Schlägt man den Rahm, so erhält man die Butter; Butyrum, Beurre (*Gal.*); Butter (*Ang.*); Manteca de vacca (*His.*); Boter (*Bel.*); Burro (*I.*); Smaer (*Suec.*). A. Ams. B. Ba. Bel Gal. Hass. His. Li. Pal. Sax. Suec. WW. *G. Pid. Sp.*

Eine fette und derbe Substanz, von weißer oder gelber Farbe, angenehmem Geschmack und etwas würzigem Geruch, welche, nach Chevreul, Käsestoff, Buttermilch, Elain, Stearin, einen färbenden Stoff, etwas Buttersäure und ein Oel enthält.

Der Käsestoff, welchen man in den Kälberlab findet, führt den Namen présure (Gal. Gen.). Er ist mit Essig-, Salz- und Buttersäure vermischt, welche die Wände dieses Magens absondern, wodurch er einen sauren Geruch bekommt.

Dampft man die Molken ab, so erhält man das

Saccharum Lactis; Milchzucker; Sucre de lait (*Gal.*); Milksugar (*Ang.*); Melksukker (*D.*); Melkzuiker (*Bel.*); Zucchero di latte (*His. I.*).

Ams. Ba. Bor. Bor4. Br. D. Fenn. Fer. Ful. Gen. Han. Hass. HassP. Li. O. Pal. Pol. Sax. Suec. Wir. Würr. WW. *Fi. G. Pid. Sp. T. Vm.*

Eine in weißen Parallelepipeden crystallisirende, halbdurchsichtige Substanz von etwas zuckerartigem, fadem und erdigem Geschmack.

Hydrogale. (*Ra.*)

℞. Lactis vaccini . . uncias quatuor.
Aquae Hordei . . . libras duas.

Pulvis pectoralis. (B°.)

℞. Sacchari Lactis . unciam unam.
Gummi Arabici drachmas quinque.
Elaeosacchari Foeniculi
drachmas tres.

Potus Sacchari Lactis, Tisana pectoralis. (*Au.*)

℞. Sacchari Lactis . . semunciam.
Aquae bullientis . . libras duas.

L a c c a.

Unter diesem Namen sind zwei verschiedene Substanzen bekannt:

1) *Lacca, Gummi Laccae*; *Καγκαμον*?; Lack, Gummilack; Laque, Gomme Laque (*Gal.*); Lake (*Ang.*); Laak (*Ar.*); Kambalo (*Ba.*); Lukada (*Cy.*); Lacca (*His. Lus.*); Lak'h (*Hin.*); Balo (*Ja.*); Ambalu (*Mal.*); Leka (*Pol.*); Laksscha (*Sa.*); Lacka (*Suec.*); Komburruk (*Tam.*); Commolekka (*Tel.*).

Ams. An. Ba. Bor. Bor4. Br. D. E. Fer. Ful. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. His. Li. Lus. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Würr. *A. Be. Br. G. M. Pid. Sp. T.*

Man unterscheidet zwei Sorten Lack.

1) *Lacca in ramulis s. ramis*; Stocklack, Stablack, Stangenlack; Laque en bâtons (*Gal.*); Sticklac (*Ang.*). Es ist mehr oder weniger dunkelroth, fast durchsichtig, ungleich, uneben, hart, zerreiblich,

und bildet eine einige Zoll lange, eine Linie dicke Rinde um ein kleines Stöckchen, um welches es jedoch selten ganz herumgeht. Auf seiner Oberfläche bemerkt man viele Löcher, welche mit eben so viel eirunden, unregelmäßig neben einander liegenden Zellen zusammenhängen und aus denen ein weißer filziger Stoff hervorkommt.

2) *Lacca in granis;* Körnerlack; Laque en grains (*Gal.*); Seed Lac (*Ang.*); sind Stücke des vorigen, von den Zweigen losgebrochen.

3) *Lacca in tabulis s. massis;* Schellack; Laque en masses ou en pains (*Gal.*); Lamplac, Shell lac (*Ang.*); in dünnen Plättchen oder Schuppen, welche durch Schmelzen des vorigen von Unreinigkeiten befreit worden sind.

Das Lack wird durch den Stich des Weibchens von Coccus Lacca, *Ker.*, Coccus Ficus, L., eines halbflügeligen Insects Indien's (Journ. compl. des Sc. méd. T. X. p. 20.) in der Rinde vieler harziger Bäume hervorgebracht, unter denen man besonders unterscheidet: Ficus religiosa, L., Ficus indica, L., Croton castaneifolium, L., Rhamnus Jujuba, L., Mimosa cinerea, *Willd.* und Mimosa Corinda, *Willd.* Virey hegt und wahrscheinlich mit Recht, Latreille entgegen, die Meinung, daß das Harz nicht von dem Insect selbst ausgearbeitet werde, sondern nur nach dem Stich desselben ausfließe, und daß nur die schöne purpurrothe Farbe desselben von dem Weibchen und den Eiern des Insects herrühre.

Es besteht, nach Funke, aus Harz, einem eigenthümlichen Stoffe, dem Lackstoff (Laccinum), Laccin (*Gal.*), welcher zwischen Wachs und Harz steht, und einem thierischen Farbestoff. John will auch eine eigenthümliche Säure, die Lacksäure (Acidum laccicum), Acide laccique (*Gal.*), darin gefunden haben.

2) *Lacca coerulea, Lacca musica, Tornasolis coerulea, Laccae muscus, Lacmus;* blauer Lack, Lackmus; Tournesol (*Gal.*); Litmus (*Ang.*); Lackmus (*Bel.*).

HassP. *Fi. T.*

Ein Farbestoff, von welchem man zwei Sorten im Handel unterscheidet:

1) Lackmus in Broden oder Steinen, Tournesol en pains ou en pierre (*Gal.*) (A. Bel. Br. Du. *G. M. Sp.*), in kleinen, geraden Parallelepipeden von blauer Farbe, welches man aus mehreren Flechtenarten bereitet, indem man sie pulvert, mit Weinhefenasche und Kalk mischt und mit Menschenharn gähren läßt.

2) Lackmus in Lappen; Tournesol en drapeaux, Becetta, Nezetta (*Gal.*), alte Lappen, welche mit dem Saft der Spitzen von Croton tinctorium, L. (Monoecia Monadelphia, L.; Euphorbiaceae, *J.*), einer Pflanze (*Lob.* Ic. 26.) des südlichen Europa's, getränkt, dann getrocknet und dem Dunste eines Gemisches von Harn und ungelöschtem Kalk so lange ausgesetzt worden sind, bis sie eine blauviolette Farbe bekommen haben.

Tinctura aquosa Laccae s. Gummi Laccae aquosa; (Bor4. Br. His. Pal. R. Sar. Sax. Wir. *Sp. T.*)

℞. Laccae in granis pulveratae partem unam.
Aluminis crudi partem dimidiam.
Aquae destillatae . partes octo.
Coque ad dimidii remanentiam; post refrigerationem adde
Aquae Rosarum rubrarum,
— Salviae,
singularum partes duas.
Filtra. (R. Sax.)

Fi. et *T.* Aquae destillatae partes sex, Aquae Rosarum et Salviae, singularum partes tres, caeterum ut antea.

℞. Laccae pulveratae unciam unam.
Aluminis . . . . semunciam.
Aquae Rosarum . . libras duas.
Digere in vase tecto et liquorem rubro colore bene impraegnatum filtra. (His.)

℞. Laccae pulveratae unciam unam.
Alumin's crudi sesquidrachmam.
Aquae Salviae . . . uncias tres.
— Rosarum . sesquiunciam.
Coque et filtra. (*Sp*)

℞. Laccae electae . unciam unam.
Aluminis crudi pulverati drachmam unam.
Aquae Salviae,
— Rosarum,
— Cochleariae,
singularum uncias duas.
Coque lente et cola. (Sar.)

Br. Laccae unciam unam, Aluminis drachmas duas et Aquarum, singularum uncias duas; — Wir. Laccae unciam unam, Aluminis sesquidrachmam et Aquarum, singularum sesquiunciam.

℞. Laccae . . . . drachmas sex.
Aluminis . . . drachmas duas.
Aquae Salviae,
— Brunellae,
— Cochleariae,
singularum libram unam.
Stent in digestione absque bullitione, donec liquor colore rubro bene sit impraegnatus et cola. Addere potes Caryophyllorum scrupulos duos. (Pal.)

Reizend, für antiscorbutisch gehalten. — In Waschungen und Gurgelwassern angewendet.

Tinctura Laccae alcoholica. (Ams. Ful. T. Vm.)

℞. Laccae in ramulis pulveratae partem unam.
Alcoholis . . . . . partes sex.
Infunde per horas duodecim in balneo aquae et filtra. (*Vm.*)

Ams. Laccae partem unam, Alcoholis (0,884) octo et octo dies infusionis; — Ful. Laccae partem unam et Spiritus Cochleariae sedecim; — *T.* Laccae unciam unam, Alcoholis 36° libram unam; digere.

Bei Krankheiten im Munde und am Zahnfleisch von Schwäche, meist in Form von Gurgelwasser oder collutorium; sie scheint nur vermittelst des darin enthaltenen Alcohols zu wirken.

Tinctura Laccae alcoholica composita. (Ba. Fer. Lus. R. Sar. Suec. Wür.)

℞. Laccae pulveratae unciam unam.
Myrrhae electae . . uncias tres.
Spiritus Cochleariae sesquilibram.
Post aliquot dies digestionis cola. (R. Suec.)

. Lus. Laccae unciam unam, Myrrhae drachmas tres, Spiritus libras duas et octo dies macerationis; — Fer. Laccae unciam unam, Myrrhae drachmas duas et Spiritus Cochleariae sesquilibram.

℞. Laccae pulveratae uncias duas.
Aluminis crudi pulverati sesquidrachmam.
Spiritus Cochleariae libram unam.
Digere ex arena tepida et cola. (Sar.)

Wür. digerere jubet Laccae semunciam et Aluminis scrupulos duos in una libra Spiritus Cochleariae, donec liquor pulchrum acceperit rubrum colorem; — Lus. Laccae unciam unam, Myrrhae drachmas tres, Spiritus libras duas et octo dies digestionis; — Ba. Laccae partes quinque, Aluminis unam, Aquae triginta sex et Spiritus quinque.

Schwach reizend, in Waschungen, Gurgelwassern oder Collutorien, bei Mundgeschwüren, welche man von Asthenie herleitet. Die nach der zweiten Formel bereitete Tinctur ist wirksamer als die andere und abstringirend.

Tinctura Laccae kalica. (Bo. Ham. Hass. *Fi. Pid. T. Vm.*)

℞. Laccae in granis unciam unam.
Myrrhae electae . . semunciam.
Pulveratis infunde
Olei Tartari per deliquium semunciam.
In pastam redige, blando igne siccandam et massae pulveratae infunde
Spiritus Cochleariae uncias sex.
Post tres aut quatuor dies digestionis filtra.

Fi. et *T.* Laccae pulveratae unciam unam, Kali subcarbonici drachmas duas; mixta in patina porcellanea per duos dies aëri stent exposita, quo facto infundantur Spiritus Cochleariae librae uni et digerantur etc. (Si loco Spiritus Cochleariae Alcoh. purum adhibetur *Tincturam Laccae spirituosam s. Alcoholem cum Lacca habes Fi.*)

Boerhaave empfahl diese Tinctur innerlich bei Gicht und Rheumatismen, äußerlich bei scorbutischen Affectionen des Mundes und des Zahnfleisches. Er gab sie in Spanischem oder Madera-Wein. Das kohlensäuerliche Kali ist die Hauptursache ihrer Wirksamkeit.

Tinctura Laccae aluminata. (An. His. Sar. Wür.)

℞. Laccae pulveratae uncias duas.
Aluminis crudi pulverati sesquidrachmam.
Spiritus Cochleariae libram unam.
Digere in arena tepida et cola. (Sar.)

Wür. Laccae semunciam, Aluminis scrupulos duos et Spiritus libram unam; — An. Laccae unciam unam, Aluminis drachmas duas et Spiritus libram unam.

℞. Laccae purae contusae unciam unam.
Aluminis in Aqua dissoluti sesquidrachmam.
Spiritus Cochleariae aut Lepidii uncias octo.
Digere donec liquor bene ruber sit factus et filtra. (His.)

Ebenso gebraucht wie die einfache Tinctur, außerdem ist sie etwas abstringirend.

Tinctura Laccae coeruleae. (*Fi. T.*)

℞. Laccae in panibus quantum libet.
Alcoholis diluti 20° B. quantum sufficit.
Digere, subinde agitando per dies aliquot, decantha per chartam etc.

Die *Tinctura Laccae coeruleae aquosa*, welche mit Wasser vermittelst Maceration bereitet wird

℞. Laccae pulveratae drachmam unam.
Aquae destillatae bullientis sesquiunciam.
Solutionem filtra. (*Fi.*)

bekommt zwar eine intensiver blaue Farbe, ist aber leichter der Verfärbung und dem Verderben unterworfen. (*T.*)

Charta exploratoria coerulea. (Bor4. *T.*)

Laccae muscus in pulverem tritus quatuor Aquae partibus infundatur et per viginti quatuor horas reponatur, vas subinde agitando. Liquore filtrato

illinantur segmenta chartae albissimae expansa, quae siccata in vasis bene clausis loco umbroso serventur. (Bor4.)

T ut chartam exploratoriam auriantiam parari jubet I. p. 596.

Charta exploratoria rubefacta s. rubra. (Bor4. HassP. *T.*)

Charta exploratoria coerulea aceto destillato aut acido muriatico valde diluto rubro inficiatur colore, tum siccetur et servetur. (Bor4. *T.*)

HassP. Acidum Aceti vel Phosphori adhibet.

Lacryma Iob.

Coix Lacryma, L.; Hiobsthränen; Larme de Iob (*Gal.*).

Wir. *Sp.*

☉ (Monoecia Triandria, L.; Gramineae, *J.*) Eine ostindische Pflanze. (*Rumph* Amb. 5. t. 75 f. 2.)

Man wendet den Saamen (semen Lacrymae Iob s. Lithagrostis) an; er ist bläulichweiß, glänzend, sehr hart, eirund und am Ende etwas spitzig

Er galt ehedem als harntreibend.

Lactuca.

Man wendet in der Medicin drei Arten dieser Pflanzengattung an:

1) *Lactuca sativa, L.*; Lattich, Gartensalat; Laitue cultivée (*Gal.*); Gardenlettuce (*Ang.*); Salat, Locyka (*B.*); Laktuk (*D. R. Suec.*); Leschuga (*His.*); Gewoone salade, Lataw (*Bel.*); Lattuca (*I.*); Loczyga (*Pol.*); Leituga (*Lus.*).

Br. Ed. Fer. Gal. GalM. His. LonN. Wir. *Be. Br. C. G. M. Sp. Z.*

☉ (Syngenesia Polygamia Aequalis, L.; Synantherae, *Cass.*) Eine in Gärten gebaute Pflanze, wo sie viele Varietäten hervorbringt. (*Blackw.* t. 88. *Plenck* t. 594. *Hayne* VII. 30. Fl. méd. IV. 213.)

Man wendet das Kraut und die Saamen an.

Das Kraut herba Lactucae) besteht aus länglichen, eirunden, welligen Blättern von süßlichem, wässerigen Geschmack.

Die Saamen sind länglich, platt, an beiden Enden spitzig und grau.

2) *Lactuca Scariola, L.*; wilder Lattig, Wildlattich, Leberdistel, wilder Salat; Laitue sauvage (*Gal.*).

A. Am. Fer. Gal. Li. Wir. *Fi. G.*

☉ oder ♂. Eine in Europa wachsende Pflanze. (*Hayne* I. 46. *Zorn* Ic. pl. t. 294.)

Man wendet das Kraut (herba Lactucae sylvestris s. Scariolae) an; es besteht aus abwechselnden, sitzenden, umfassenden, länglichen, am Grunde pfeilförmigen, oben spitzigen, meist fiederspaltigen, am Rande mit einigen dornigen Zähnen versehenen, glatten Blättern. Es hat einen unangenehmen Geruch und einen bittern Geschmack.

3) *Lactuca virosa, L.*; giftiger Lattich, stinkender Lattich, Giftlattich; Laitue vireuse (*Gal.*); Strong scented lettuce, Hemlock lettuce (*Ang.*); Locyka lesnj neb plana (*B.*); Stinkende laktuk (*D.*); Stinkende salade (*Bel.*); Salata jadowita, locyga dzika (*Pol.*); Alsace brava (*Lus.*).

An. Ba. Bor4. Br. Ed. Fer. Ful. Gal. GalM. Han. Hass. HassP. Pol. R. Sax. Wir. Wür. *Br. C. G. M. Sp. Z.*

☉ oder ♂. Eine Europäische Pflanze (*Schk.* t. 217. Düss. off. Pfl. IV. t. 22. *Hayne* I. 47. *Zorn* Ic. pl. t. 285. *Bert.* Bld. V. 38. f. 2.)

Man wendet das Kraut (herba Lactucae virosae s. Intybi angusti) an; es besteht aus abwechselnden, sitzenden, umfassenden, langen, eingeschnittenen, an der Spitze stumpfen Blättern, von denen die untern buchtig und gezähnelt sind. Es hat einen widerlichen Geruch und einen scharfen und sehr bittern Geschmack.

Der Gartensalat wird als beruhigend betrachtet, wirkt aber ohne Zweifel nur erweichend. — Gabe des Safts, eine halbe bis zwei Unzen. Der Giftlattich ist außerordentlich stark reizend, wirkt auf das Nervensystem und vermehrt die Urinabsonderung.

Extractum Lactucae virosae. (A. An. Bel. Bor4. Ed. Ful. Han. Hass. HassP. Li. R. Wir. Wür. *Br. Sw. Vm.*)

℞. Foliorum Lactucae virosae quantum vis.

Contunde in mortario lapideo, Aquae pauxillum adspergendo, exprime succum et illum statim in aquae balneo, agitando continuè sub finem spatulae ope, consume. (Ed. Ful. Ham. Li. R. Wür. *Br.*)

Sw. contundere jubet Foliorum libras decem, Aquae libras sex affundendo, succum exprimere et illum semel ebullitum vaporando consumere; HassP. ut extractum Aconiti, Belladonnae etc.; — Bor4. ut extractum Aconiti.

℞. Herbae Lactucae virosae libram unam.

Contunde in mortario marmoreo et exprime succum; residuum per horam coque cum Aquae libris tribus; cola exprimendo, et succo cum decocto mixto totum simul inspissa. (Hass.)

℞. Herbae recentis Lactucae virosae quantum vis.

Exprime succum, qui in loco, ne fermentet, frigido servetur; decantha, coque per aliquot momenta et per pan-

num cola, albumine clarificatum iterum cola, dimidium deinde blando igne consume; refrigeratum et iterum albumine clarificatum atque colatum ad extracti consistentiam vaporando redige. (Wir.)

℞. Foliorum Lactucae virosae quantum vis

Contunde cum Aquae pauxillo et per pannum cola; repone, decantha, super igne coagulatum denuo cola; tum ad massae pilularis consistentiam evaporatum ab igne remove et additâ faecula antea sepositâ, denuo ad consistentiam aptam vaporando consume. (An. *Vm.*)

℞. Foliorum recentium Lactucae virosae . . . . quantum vis.

Contunde in mortario et exprime succum qui in tantum evaporet ut Pulveris Herbae siccae Lactucae pars quarta sufficiat ad consistentiam extracti ei praehendam. (Bel.)

℞. Foliorum Lactucae virosae quantum vis.

Aquae . . . quantum sufficit.

Herba pluribus sequentibus bullitionibus perfecte extractâ, liquores mixti et decanthati in balneo aquae evaporent. (A.)

T. ut extractum Cicutae I. p. 516. praeterea autem ut Bel. vel succum expressum, balnei aquae vel vaporis ope aliquanto condensatum et per manicam laneam filtratum ad mellis consistentiam evaporare, et ab igne remotum, faeculâ addita, ad extracti vel massae pilularis consistentiam redigere.

Gabe, vier bis zwölf Gran und mehr.

Extractum Lactucae sativae. (LonN. *T.*)

℞. Foliorum recentium Lactucae libram unam.

Contunde in mortario lapideo, inspersa exiguo Aquae; dein exprime succum, eumque non defaecatum consume, donec idoneam crassitudinem habeat. (LonN.)

T. Succum expressum et cum Aquae copia modica dilutum albuminis et caloris ope clarificare, filtrare et vaporando ad extracti consistentiam inspissare.

Aqua Lactucae sativae. (Gal. Sar. *Fi*)

℞. Herbae Lactucae recentis partem unam.

Aquae . . . . . partes duas.

Destillent partes duae. (Sar.)

Fi. Lactucae recentis libram unam, Aquae communis libras decem; destillent libras sex; — Gal. Lactucae capitatae partes quinquies mille, Aquae duodecies mille et quingentas; destillare partes decies mille, productum in novam Lactucae recentis quantitatem refundere, Aquae partes decies mille admiscendo, partes decies mille destillando elicere et tertiò hoc repetere.

Gabe, eine halbe bis zwei Unzen.

Pediluvium sedativum. (B*.)

℞. Lactucae plantas integras no. 8. aut 10.

Aquae . . . quantum sufficit.

Stent parumper in infusione, tum coquantur. — Nicht durchgeseiht anzuwenden.

Tinctura s Essentia Lactucae virosae. (B*. Sax.)

℞. Succi Lactucae virosae recens express,

Alcoholis concentrat, singulorum partes aequales.

Macera frigide per aliquot dies et filtra. (Sax.)

℞. Herbae Lactucae virosae . . unciam unam.

Cinnamomi . . drachmam unam.

Alcoholis concentrati,

Aquae destillatae, singulorum uncias quatuor.

Post aliquot dies digestionis cola exprimendo et filtra. (B*.)

Reizend, bei Wassersuchten empfohlen. — Narcotisch. — Gabe, funfzehen Tropfen und mehr, allmälig gestiegen.

Lactucarium.

Lactucarium; Θριδαξ; Thridace (*Gal.*); Lettuce opium (*Ang.*).

Am. B*. Ed. *C. Sp.*

Eine dunkelbraune, harte, brüchige Substanz von etwas betäubendem Geruch und einem sehr merklich bittern Geschmack

Es ist der getrocknete Milchsaft, welchen man dadurch erhält, daß man die Stängel von Lactuca sativa, L., in horizontale Scheibchen zerschneidet Auch quillt er aus in die Epidermis gemachten Stichen bis zum Reifen des Saamens ununterbrochen aus. Ueber Lactucarium und dessen Gewinnung s. Berl. Jahrb. XX. S. 196. Buchners Repert. XV 2. S. 273 und XXV. S 104. Taschenb. 1823. S 24.

Nach Caventou enthält das Lactucarium kein Morphin, sondern Aepfelsäure und Kalk.

Man hält es für Schlaf bewirkend ohne narkotische Nebenwirkung und für ein Verminderungsmittel der Häufigkeit des Pulses und der thierischen Wärme. — Gabe, zwei bis vier Gran und mehr allmälig.

Tinctura Lactucarii. (B*. *C.*)

℞. Lactucarii . . . unciam unam.

Aquae Vitae . ocerium unum. Post suffic entem digestionem filtra. — Gabe, zehen bis sechzig Tropfen.

Syrupus de Thridace. (GalF.)

℞. Succi recentis stipitum Lactucae, tempore florescentiae foliis privatarum . . . libram unam.
Sacchari albi . . . libras duas.
Solve frigide et filtra.

Pilulae torpentes ac resolventes. (*B.*)

℞. Lactucarii . . grana duodecim.
Roob Sambuci,
Extracti Liquiritiae,
singulorum quantum sufficit.
Fiant pilulae quatuor. — Gabe, ein Stück alle drei Stunden, bei hartnäckigem Husten ohne Auswurf und bei sogenannten activen Wassersuchten.

Potio nutriens et sedans s. sedativa. (*B.*)

℞. Lichenis Islandici . uncias duas.
Aquae fontanae quantum sufficit ut decocti unciae octo obtineantur; colaturae adde
Lactucarii . . semidrachmam.
Mucilaginis Gummi Arabici semunciam.
Syrupi Sacchari . unciam unam.
Allmälig zu nehmen, bei hartnäckigem Husten und knotiger Lungensucht.

Ladanum.

Gummi Ladanum; Λαδανον; Ladanum; Ladanum; Labdanum (*Gal.*); Ladun (*Ar.*); Ladano (*His.*).

Ams. An. B. Bel. Br. Fer. Gal. Gen. His. Lus. Wir. Wür. *A. Be. Br. G. M. Sp. T. Z.*

Man unterscheidet von diesem Harz zwei Sorten:

1) *Ladanum in massis*; Ladanum in Broden, Ladanum en masses (*Gal.*), in weichen, schlüpfrigen, beim Druck jede Form annehmenden, schwärzlichrothen oder schwarzen Massen.

2) *Ladanum in tortis*, Ladanum in Stöcken: Ladanum en bâtons (*Gal.*), in walzigen, platten, schraubenförmig gedrehten, trocknen, harten, brüchigen, schwärzlichgrauen Stücken.

Der Geruch ist angenehm, der Geschmack schwach, aber balsamisch und etwas bitter.

Dieses Harz schwitzt von selbst aus den Blättern und Zweigen von Cistus Creticus, L., einem Strauche (Polyandria Monogynia, L.; Cisteae, J.) des Archipels. (Fl. méd. IV. 212.)

Reizend, aber wenig in Gebrauch.

Emplastrum Ladani s. stomachicum. (Ams. Lon. Lus. *Br. C. Sw. T. Vm.*)

℞. Ladani . . . . . uncias tres.
Olibani . . . . unciam unam.
Liquatis blando calore adde
Olei Nucis Moschatae expressi,
Balsami Peruviani,
Cinnamomi pulverati,
singulorum semunciam.
Misce. (Lus.)

Br. et *Sw.* Olibani unciam unam, Ladani tres, Olei Nucis moschatae semunciam, Cinnamomi tantidem et Olei Menthae viridis essentialis drachmam unam; — C. Ladani uncias tres, Resinae Pini unciam unam, Olei Nucis moschatae sesquiunciam, Cinnamomi tantidem et Olei Menthae drachmam unam.

℞. Emplastri communis,
— Cumini,
singulorum libram unam.
Colophonii . . . . semilibram.
Styracis . . . . . semunciam.
Liquatis igne blando adde
Ladani pulverati . . uncias duas.
Misce bene. (Ams.)

℞. Cerae flavae . . . partes sex.
Sebi vervecini,
Colophonii,
singulorum partes quatuor.
Elemi . . . . partem unam.
Liquata macera cum
Seminum Cumini,
Baccarum Lauri,
Florum Meliloti,
singulorum partibus duabus.
Liquorem calidum cola et adde
Emplastri Lithargyri fusi partes triginta sex.
Gummi Ammoniaci partem unam.
Ladani . . . . partes quatuor.
Misce. (*Vm.*)

℞. Ladani,
Mastiches, singulorum semunciam.
Benzoës,
Caryophyllorum,
Nucis moschatae,
singulorum drachmas duas.
Tacamahacae . uncias quatuor.

Pulverata et mixta sparge supra Cerae flavae uncias tres, Terebinthinae uncias duas, singulas fusas; massae concrescere coeptae admisce
Storacis Calamita unciam dimidiam.
Opii . . . drachmam unam
in Vino albo dissoluta et ad mellis consistentiam redacta; adde, quum emplastrum consistentiam butyraceam acceperit, Olei Menthae, Juniperi et Absinthii singulorum guttas aliquot.

Lamium.

Lamium album, *L.*; weißer Bienensaug, weiße Todtennessel; Ortie blanche (*Gal.*); White dead-nettle (*Ang.*); Hlucha, Mrtwa, Smzadlawa, Kopriwa (*B.*); Daednelde (*D.*); Ortiga maerta (*His.*); Pokozywa martiva (*Pol.*); Ortiga morta (*Lus.*); Blind nesla (*Suec.*).

An. Br. Gal. Sax. Wir. Würr. *Be. Br. M. Sp.* Z.

♃ (Didynamia Gymnospermia, L.; Labiatae, *J.*) Eine in ganz Europa sehr gemeine Pflanze. (*Bull.* t. 213. *Blackw.* t. 33. *Hayne* V. 41. *Zorn* Ic. pl. t. 80.)

Man wendet das Kraut und die Blüthen an.

Das Kraut (herba Lamii albi s. Galeopsidis s. Urticae mortuae) besteht aus einem fast glatten oder nur wenig behaarten Stängel und herzförmigen, gestielten, spitzigen, spitzig gezähnten Blättern. Es hat einen unangenehmen Geruch und einen styptischen Geschmack.

Die Blüthen, von welchen man nur die Kronen nimmt, sind weiß und haben einen unangenehmen Geruch und einen süßlichen Geschmack. Sie sind erweichend.

Lapis nephreticus.

Nephreticus lapis; Griesstein; Pierre néphrétique, Jade néphrite ou oriental (*Gal.*); Piedra cananor, Piedra nefritica (*His.*).

His. Wir. *Sp.*

Ein grüner Stein von fettigem Ansehen. Ehedem gebrauchte man ihn als Amulet und Schutzmittel gegen Epilepsie.

Laserpitium.

Die Pharmacopöen führen zwei Arten dieser Gattung an:

1) *Laserpitium latifolium*, *L.*; Hirschwurzel, weißer Enzian; Laser à larges feuilles, Gentiane blanche (*Gal.*); Broad leav'd lasserwort (*Ang.*).

Br. Gal. Wir. *Be. M. Sp.*

♃ (Pentandria Digynia, L.; Umbelliferae, *J.*) Eine Europäische Pflanze. *Jacq.* Fl. Austr. t. 146. *Schk.* t. 67.)

Man wendet die Wurzel (radix Gentianae albae) an; sie ist sehr lang, rund, außen gelblichbraun, inwendig gelblichweiß. Sie hat einen gewürzhaften, angenehmen Geruch und einen gewürzhaften, scharfen und etwas bittern Geschmack.

Tonisch, reizend.

2) *Laserpitium Siler*, *L.*; roßkümmelartiges Laserkraut; Laser sermontain (*Gal.*); Montain lasserwort (*Ang.*); Eselskomin (*Bel.*); Laserpicio silvestre (*Lus.*).

Br. Gal. Wir. Würr. *Be. M. Sp.*

♃ Eine Alpenpflanze. (*Jacq.* Fl. Austr. t. 145. *Hayne* VII. 7.)

Man wendet den Saamen (semen Sileris montani) an; er ist länglich, platt, gefurcht und sehr schmalgeflügelt. Er hat einen angenehmen gewürzhaften Geruch und einen scharfen, gewürzhaften und bittern Geschmack.

Tonisch, reizend.

Laurus.

Laurus nobilis, *L.*; Lorbeerbaum; Laurier commun (*Gal.*); Common sweet bay, Laureltree (*Ang.*); Bob (*B.*); Laurbaertrae (*D.*); Laurel (*His.*); Laurierboom (*Bel.*); Lauro ricio, Alloro, Meloro (*I.*); Bobek drzewo (*Pol.*); Loureiro (*Lus.*); Lagerbaerstraed (*Suec.*).

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Würr. WW. *Be. Br. C. Fi. G. M. Pid. Sp.* Z.

Ein Baum (Enneandria Monogynia, L.; Laurineae, *J.*), welcher ursprünglich in der Levante zu Hause, im südlichen Europa naturalisirt ist. (*Blackw.* t. 175. *Plenck* t. 315. *Schk.* t. 310. Dict. d. Sc. nat Cah. IV. *Zorn* Ic. pl. t. 52.)

Man wendet die Blätter und die Früchte an.

Die Blätter (folia Lauri) sind glatt, hart, ledrig, an den Rändern etwas wellenförmig, vier bis fünf Zoll lang, und haben, wenn man sie reibt einen starken, gewürzhaften Geruch und einen brennenden, gewürzhaften Geschmack.

Die Früchte oder Beeren (baccae Lauri) sind klein, eirund, fast so groß wie Kirschen, frisch dunkelblau, getrocknet schwärzlich und runzelig und enthalten, unter einer dünnen brüchigen Schaale gelbe oder gelblichbraune Saamen. Sie haben einen gewürzhaften, angenehmen Geruch und einen etwas bittern, scharfen und gewürzhaften Geschmack.

Man wendet die Blätter eher als Gewürz denn als Arzneimittel an. Uebrigens sind sie nicht minder reizend, als die Beeren.

Pulvis Lauri carbonicus s. stimulans. (*Au.*)

℞. Baccarum Lauri . . uncias sex.
Nucis moschatae,
Cornu Cervi calcinati,
singulorum uncias (?) sex.
Liquiritiae . uncias triginta sex.

Gabe, ein Kaffeelöffel, bei Rhachitis.

Oleum laurinum s. Baccarum Lauri s. Lauri expressum. (A. Bor. Bor4. Br. Ful. Gal Hass. HassP. His. Lus. Pal. Sar. Wir. *Sw. T.*)

℞. Baccarum Lauri . quantum vis.
Contusas lente in mortario, tere supra lapidem calefactum et exprime. (His.)

℞. Baccarum Lauri . quantum vis.
Contusas in mortario et supra lapidem calefactum tritas coque cum Aqua et post refrigerationem, oleum superficiei inhaerens, collige. (A. Br. Gal. Hass. Lus. Pal. Sar Suec Wir.)

℞. Baccarum Lauri . quantum vis.
Contusis in mortario, pastam in sacco e tela confecto inclusam vapori Aquae bullientis expone et deinde prelo calefacto submitte. (*Sw.*)

T. Baccas cum Aquae quantitate modica in pastam redigere et hanc sacco e tela confecto inclusam prelo subjicere.

Bor. Bor4 Hass. HassP. O. Pol. et *Vm* oleum venale praescribunt.

Reizend, auflösend, blähungtreibend, stärkend, nervenstärkend, bei Krankheiten des Uterus, Krämpfen, Koliken, Würmern bei Kindern, Schmerzen und Schwäche der Gelenke, Ohrenschmerzen.

Enema carminativum. (Li.)

℞. Florum Chamomillae semunciam.
Aquae communis libram unam.
Coque parumper, cola et adde colaturae
Olei Baccarum Lauri semunciam.

Linimentum aethereum. (*Au.*)

℞. Aetheris sulphurici drachmas duas.
Alcoholis . . . . . uncias duas.
Olei Baccarum Lauri semunciam.

In Einreibungen auf Brüche, besonders Nabelbrüche der Kinder.

Unguentum s. Pomatum laurinum, Oleum laurinum. infusum. (Gal. Sar. *Fi. Vm.*)

℞. Foliorum Lauri . partem unam.
Axungiae . . . . partes duas.
Contunde et coque lente ad consumptionem humidi usque, sub finem addendo
Baccarum Lauri contusarum
partem unam.
Post horas decem digestionis in balneo aquae, cola et exprime. (Gal.)

Sar. Digerere per tres dies jubet in balneo aquae Foliorum Lauri recentium concisorum libras tres in Olei Olivarum libris sex, colare fortiter exprimendo et colaturam novae per tres dies digestioni subjicere cum Foliorum et Baccarum Lauri, singulorum sesquilibra; — *Fi.* Axungiae Porci libras decem, Foliorum Lauri libras duas cum dimidia; per tres dies in infusione calida relictas cola fortiter exprimendo, adde Baccarum contusarum libras decem, infunde itidem per dies tres et cola; post refrigerationem partem aquosam liquefac lentissimo calore etc.; — *T.* Foliorum libras tres, Axungiae libras sex, Baccarum tres, digestionem 24 horarum.

℞. Foliorum recentium Lauri,
Olei Amygdalarum dulcium,
singulorum partem unam.
Baccarum Lauri recentium contusarum . . . partes quatuor.
Axungiae Porci . . partes octo.
Folia et deinde baccas contusa coque lente cum axungia per horas duodecim, cola et refrigeratis sedimentum exime; quod restat liqua aut ab initio Aqua calida lava, donec haec clara transeat. (*Vm.*)

Jeromel Foliorum siccorum et contusorum unciis tribus infundere jubet Axungiae Porci recentis libram unam, vas per horas duodecim eaedem caloris vi exponere, colare et axungiam liquare in Olei Baccarum Lauri expressi libra una.

Reizend, stärkend.

Unguentum nervinum s. laurinum s. aromaticum s. Rorismarini compositum. (A. Ams. An. B. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Ful. Han. Hass. Li. Lus. O. Pal. Pol. R. Sax. Suec. Wir. WW. *Br. Fi. Pid. Sp. Sw. Vm.*)

℞. Herbae Salviae,
— Chamaepityos,
— Majoranae,
— Rorismarini,
— Menthae,
— Lavandulae,
— Hyperici,
— et Florum Primulae veris,
Florum Chamomillae,
— Meliloti,
Summitatum Anethi,
Radicis Pyrethri,
singulorum drachmas duas.
Baccarum Lauri,
— Juniperi,
singularum unciam unam.
Mastichis . . . . . semunciam.
Benzoës . . . . . drachmas sex.
Terebinthinae . uncias quatuor.
Olei Lumbricorum,
— Anethi,
— Hyperici,
Adipis vulpinae,
singulorum uncias tres
— humanae,

Tere ad refrigerationem usque. (B. R.)

Ams. Sebi uncias octo, Olei Lauri libram unam, Essentiae Terebinthinae unciam unam et Olei Cajeput semunciam.

℞. Unguenti simplicis libras duas et dimidiam.
Olei Lauri,
Cerae flavae,
singulorum uncias tres.

Mixturae liquatae et semirefrigeratae adde
Olei essentialis Juniperi,
— — Serpylli,
singulorum drachmas duas.

Misce. (A.) — *Unguentum aromaticum.*

Diese Salbe, welche äußerlich als stärkend, auflösend und schmelzend angewendet wird, unterscheidet sich fast nur durch den Namen von der vorhergehenden und den folgenden.

Unguentum carminativum. (Ful. Pal.)

℞. Baccarum Lauri . . semunciam.
Foliorum recentium Chamomillae manipulos duos.
— — Meliloti,
Summitatum recentium Abrotani,
— — Hederae terrestris,
— — Menthae crispae,
— — Tanaceti,
singularum manipulum unum.
Seminum Cumini,
— Levistici,
singulorum drachmas duas.
Olei Chamomillae . libram unam.
— Anethi,
— Rutae,
singulorum semunciam.

Post dierum quatuordecim macerationem, coque leviter, donec humidum disparuerit et colaturae adde
Cerae flavae . . . uncias duas.
Styracis liquidae . drachmas sex.
Olei essentialis Anisi,
— — Carvi,
— — Menthae,
singulorum drachmam unam.

Misce. (Pal.)

℞. Axungiae Porci . drachmas sex.
Cerae flavae . drachmam unam.

Mixturae liquatae et semirefrigeratae adde
Olei Lauri . . drachmam unam.
— Anisi . . guttas octodecim.
— Carvi . . guttas duodecim.

Misce. (Ful.)

Erweichend, krampfstillend, blähungtreibend.

Unguentum laurino-camphoratum s. aromaticum camphoratum s. contra perniones. (Ba. HassP. *Ca.*)

℞. Sebi vervecini . partes sedecim.
Olei Lauri . . . partes viginti.
Calefac lente et in fine adde
Camphorae in Olei Juniperi pauxillo solutae . . . . partes duas.
Misce. (Ba.)

Ca. Liquare jubet Axungiae Porci, Adipis bubulae, Olei Lauri, Cerae, singulorum uncias duas et post refrigerationem addere Camphorae in uncia una Alcoholis solutae semunciam; — HassP. Sevi vervecini uncias novem; liquatis et semirefrigeratis admisce Olei Laurini uncias decem et tandem Camphorae unciam unam solutam in Olei Baccarum Juniperi, Lavandulae, destillatorum singulorum uncia dimidia.

Unguentum martiatum. (Wir. *Sp. Vm.*)

℞. Foliorum recentium Lauri uncias octo.
— — Rutae uncias quinque.
— — Majoranae uncias quatuor.
— — Rorismarini uncias tres.
— — Myrti,
— — Ebuli,
— — Menthae,
— — Basilici,
singulorum unciam unam.
Vini albi . . . uncias quatuor.
Olei Olivarum . libram unam.
Butyri recentis,
Axungiae ursinae,
— gallinaceae,
Medullae cervinae,
singulorum drachmas sex.

Infunde per dies aliquot, tum coque lente ad humidi consumptionem usque, cola exprimendo et colaturae adde
Cerae flavae . . . uncias octo.
Pulveris Storacis drachmas quinque.
— Mastichis . semunciam.
— Olibani . drachmas tres.

Misce. (Wir. *Sp.*)

℞. Foliorum recentium Absinthii,
— — Abrotani,
— — Basilici,
— — Calamintae,
— — Balsamitae maris,
— — Chamaedryos,
— — Lauri,
— — Majoranae,
— — Menthae aquaticae,
— — Rorismarini,
— — Rutae,
— — Sabinae,
— — Salviae,
singulorum partes duas.

Contunde in mortario, succum exprime, quo supra ignem coagulato, faeculam exemtam lava, Aquam quam potest, separa et solve deinde in
Axungiae Porci
partibus sexaginta quatuor calefactae cum
Seminum Cumini,
— Foenu graeci,
singulorum parte una.
Nucis moschatae . partibus sex.
Adde deinde
Styracis liquidae,
Cerae albae,
singularum partes quatuor.
Cola et donec refrixerint agita. (*Vm.*)
Reizend, auflösend.

Emplastrum Baccarum Lauri (Br. Pal. Sar. Wir. *Sp.*)

℞. Baccarum Lauri . uncias quatuor.
Cyperi rotundi,
Corticis Winterani,
Olibani,
Mastichis,
Myrrhae, singulorum unciam unam.
Pulverata admisce mixturae liquatae de
Cerae flavae . . . unciis octo.
Resinae Pini,
Olei Lauri,
— Terebinthinae,
singulorum unciis duabus.
Reizend, auflösend.

Electuarium Baccarum Lauri. (Pal. Sar. *Sp.*)

℞. Baccarum Lauri . uncias duas.
Mastichis,
Myrrhae,
Olibani, singulorum unciam unam.
Costi Arabicae,
Cyperi rotundi,
singulorum semunciam.
Olei Baccarum Lauri,
Terebinthinae Chiensis,
singulorum uncias tres.
Mellis purificati . sesquilibram.
Melli calefacto adde terebinthinam et olea liquata et deinde reliquas substantias pulveratas. (Sar.)

℞. Baccarum Lauri . sesquiunciam.
Radicis Calami . drachmas duas.
Herbae Rutae,
— Menthae,
— Origani,
Seminum Ammi,
— Cumini,
— Nigellae,
— Levistici,
— Carvi,
— Carottae,
Piperis nigri,
Piperis longi,
Castorei,
singulorum drachmas duas.
Sagapeni . . . . semunciam.
Opopanacis . . drachmas tres.
Mellis despumati
uncias quatuordecim.
Misce. (Pal. *Sp*)

Alcohol aromaticum. (An.)

℞. Baccarum Lauri . unciam unam.
Myrrhae,
Styracis, singularum drachmas sex.
Cinnamomi,
Zingiberis,
Nucis moschatae,
Caryophyllorum, singulorum drachmas duas cum dimidia.
Aquae,
Alcoholis (20°), singulorum uncias quinquaginta quatuor.
Post horas viginti quatuor macerationis destillatio eo producatur, donec productum 30° indicet.

Mit Unrecht nennt An. dieses Präparat Balsamum Fioravanti, dieser enthält keine Terpentintinctur.

Lavandula.

Lavandula Spica, L.; Lavendel; Lavande commune (*Gal.*); Lavandel (*Bel. D. Suec.*); Lavander (*Ang.*); Espliego, Alhugema (*His.*); Lavendola, Spigo Nardo Italiano (*I.*); Lawanda (*Pal.*); Alfazema (*Lus.*).

A. Am. Ams. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *Br. C. Fi. G. M. Pid. Sp.*

♃ (Didynamia Gymnospermia, *L.*; Labiatae, *J.*) Eine Pflanze des mittägigen Europa's. (*Bull.* t. 337. *Hayne* VIII. t. 37. *Zorn* Ic. pl. t. 53.)

Man wendet die blühenden Spitzen (herba et flores s. summitates s. spicae florentes Lavandulae s. Spicae) an; sie bestehen aus aufrechten, verästigten Stängeln mit linienförmigen, filzigen, weißlichen Blättern und blauen oder violetten, Wirtel bildenden Blüthen, welche vereinigt eine unterbrochene Aehre zusammensetzen, die durch schmale linienförmige Deckblätter geschützt ist. Sie haben einen durchdringenden, sehr angenehmen Geruch und einen gewürzhaften, bittern Geschmack.

Ein kräftiges Reizmittel. — Gabe des Pulvers, von einem Scrupel bis zur halben Drachme.

Species aromaticae. (Bor. Bor4. GalM.

Han. HassP. Pol. Sar. *Huf. Sp. Sw.*)

℞. Herbae Majoranae,
— Menthae piperitae,
— Rorismarini,
— Serpylli,
Florum Lavandulae,
singulorum partes duas.
Caryophyllorum,
Cubebarum,
singulorum partem unam.
Fiat pulvis grossus. (Bor. Han. HassP. Pol. Sar.)

Bor4. Majoranae, Rorismarini, Serpylli, Thymi, Florum Lavandulae, singularum partes duas, Caryophyllorum partem unam.

℞. Herbae Rorismarini,
— Rutae,
— Salviae,
— Hyssopi,
— Lavandulae,
— Absinthii,
— Origani,
— Thymi,
Foliorum Lauri,
Florum Rosarum rubrarum,
— Chamomillae,
— Meliloti,
— Sambuci,
Salis Ammoniaci,
singulorum partes aequales.
Fiat pulvis grossus. (*Sp.*) — Zum Bähen.

℞. Florum Lavandulae,
— Chamomillae,
Herbae Menthae piperitae,
— Melissae,
— Thymi,
— Majoranae,
singulorum partes aequales.
Concisa misce. (*Huf.*)

℞. Florum et Summitatum Lavandulae,
— — Melissae,
— — Menthae piperitae,
— — Salviae,
— — Thymi,
— — Absinthii,
— — Menthae aquaticae,
— — Origani,
— — Rorismarini,
singulorum partes aequales.
Concisa misce. (GalM.)

℞. Florum Lavandulae,
— Arnicae,
Herbae Majoranae,
Serpylli,
— Rorismarini,
singulorum unciam unam.
Concisa misce. (*Sw.*)

Species cephalicae pro fomentatione s. epithemate. (Pal. Wir. Wür. *Fi. T. Vm.*)

℞. Herbae Majoranae,
— Menthae,
— Melissae,
— Serpylli,
Florum Lavandulae,
— Arnicae,
singulorum partes aequales.
Concisa misce. (Wür.)

℞. Herbae siccatae Origani,
— — Serpylli,
— — Thymi,
— — Menthae Romanae,
— — Salviae,
— — Majoranae,
— — Rorismarini,
Florum Lavandulae,
— Rosarum,
singulorum unciam unam.
Concisa misce. (*Fi. T.*)

℞. Herbae et Summitatum Betonicae,
— — Hyssopi,
— — Lavandulae,
— — Majoranae,
— — Origani,
— — Rorismarini,
— — Rutae,
— — Salviae,
— — Serpylli,
Florum Chamomillae,
— Meliloti,
— Rosarum,
— Sambuci,
Foliorum Lauri,
singulorum unciam unam.
Salis Ammoniaci . . semunciam.
Concisa et contusa misce. (Pal. Wir. *Vm.*)

Infusum Lavandulae. (GalM.)

℞. Summitatum siccatarum Lavandulae,
Liquiritiae rasae, singularum drachmas duas cum dimidia.
Aquae bullientis quantum sufficit ut colaturae libras duae obtineantur.

Aqua vulneraria, Tinctura aromatica composita. (GalM.)

℞. Specierum aromaticarum partem unam.
Alcoholis (22°) . partes novem.
Species cum alcoholis parte dimidia stent in infusione per octo dies et colentur deinde cum expressione; residuo reliquum Alcoholem infunde et liquores commixtos filtra.

Aeußerlich in Waſchungen und Bähungen, meiſt mit Wein. — Reizend.

Acetum Lavandulae. (Gal. Lus. Pal. Wir. Wür. *Fi. Pid. T.*)

℞. Florum Lavandulae partem unam.

Aceti albi . . . . partes sex.
Macera soli exposita per aliquot dies et cola cum expressione. (Pal. Wir. *Pid.*)

Gal. Lavandulae partem unam, Aceti sedecim et quatuordecim dies macerationis; — Wür. Lavandulae partem unam, Aceti novem et tres septimanas macerationis; — *Fi.* Lavandulae libram unam, Aceti fortis libras duodecim; digere loco tepido per dies sex: — *T.* Lavandulae uncias sex, Aceti libras sex et digestionem per dies sex vel decem.

℞. Florum siccatarum Lavandulae libram unam.
Aceti . . . . . libras sex.
Post sex dies macerationis coque parumper et colaturae adde
Alcoholis . . . . semilibram.
Misce bene. (Lus.)

Gewürzhaft, bisweilen in Form von epithema angewendet.

Acetum Lavandulae compositum, Acidum aceticum aromaticum, Spiritus aromaticus acetosus, Acetum quatuor latronum. (B*. Fenn. *Br. Vm.*)

℞. Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Nucis moschatae,
singulorum drachmam unam.
Menthae piperitae . semunciam.
Lavandulae,
Rorismarini,
singularum unciam unam.
Aceti . . . . . uncias octo.
Aquae Vitae . . uncias viginti.
Destillent partes viginti octo. (*Vm.*)

℞. Herbae recentis Absinthii,
— Menthae crispae,
— Rutae,
— Rorismarini,
singularum sesquiunciam.
Florum siccatarum Lavandulae uncias duas.
Radicis Calami,
Cinnamomi,
Nucis moschatae,
Caryophyllorum,
singulorum drachmas duas.
Aceti albi . . . libras decem.
Post dierum decem macerationem cola exprimendo et filtra. (*Br.*)

℞. Summitatum Absinthii,
— Millefolii,
Herbae Menthae piperitae,
Florum Lavandulae,
Caryophyllorum,
Zingiberis,
singulorum drachmas quatuor.
Aceti bullientis
libras septem cum dimidia.
Acidi acetici . . . semilibram.
Macera per dies quatuor, cola exprimendo, lacte vaccino clarifica, cola iterum et adde colaturae
Spiritus Rorismarini uncias quatuor.
Serva. (Fenn.)

℞. Cinnamomi,
Macidis,
Caryophyllorum,
singulorum semunciam.
Ligni Rhodii,
— Santali albi,
Seminum Foeniculi,
singulorum drachmas duas.
Aceti . . . . . octarios duos.
Digere blando calore per dies duos; adde deinde
Herbae Absinthii,
— Rorismarini,
— Menthae piperitae,
Florum Lavandulae,
singulorum semunciam.
Herbae Majoranae drachmam unam.
Stent in digestione per dies duos, tunc coque et refrigerata cola. (B*.)

Aqua Lavandulae. (A. Gal. Pal. Sar. Wir.)

℞. Herbae florescentis Lavandulae partem unam.
Aquae communis partes quatuor.
Destillet dimidia pars. (Gal. Pal. Sar.)
Wür. Lavandulae partem unam et sex Aquae; — A. Lavandulae unam et duodecim Aquae.

Gabe, zwei bis vier Unzen.

Oleum Lavandulae aethereum; Aethereoleum Lavandulae. (A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br D. Du. Ed. Fer. Ful. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. His. Lon. LonN. Lus. Pal. Pol. R. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. *Br. C. Fi. Pid. Sw.*)

℞. Herbae florentis Lavandulae quantum vis.
Aquae . . . . quantum sufficit.
Destillatione oleum quod separatur, collige. (Am. Ams. B. Bel. Du. Ed. Fer. Ful. Gen. Lon. LonN. Lus. R. Suec. *Br. C.*)

Sw. Herbae partem unam et quatuor Aquae; — Bor. Han. His. Pol. Sax. et *Fi.* Herbae unam et octo Aquae; — D Herbae unam, Aquae sex; — An. Herbae sex et viginti Aquae; — Gal. Herbae quinque et septem Aquae; — Ba. Herbae unam et Aquae novem; — A. Herbae unam et duodecim Aquae; — *T.* ut oleum florum aurantiorum I. p. 527.

℞. Lavandulae partes viginti quinque.
Aquae partes septuaginta quinque.
Salis communis . . . partes tres.
Destillent. (Br. Hass. Pal. Sar. Wir. *Pid.*)

℞. Lavandulae . . . quantum vis.
Aquae Lavandulae
quantum sufficit.
Destillent (Wür.)
Gabe, zwei bis acht Tropfen.
Bor4. et HassP. Oleum venale.

Linimentum aromaticum, Balsamum Lavandulae. (*Br. Sw.*)

℞. Olei Lavandulae partem unam.
— Nucis moschatae
partes quinque.
Misce. (Br.)

℞. Olei Lavandulae,
— Nucis moschatae,
Butyri Cacao,
singulorum partes aequales.
Misce. (*Sw.*)

Dieses sehr einfache Präparat ersetzt das unguentum nervinum vollkommen, und wird auch von *Sw.* so benannt.

Oleum Lavandulae (pingue). (*Fi. T.*)

℞. Florum Lavandulae recentis
libram unam.
Olei Olivarum . libras quatuor.
Macera calide per duos dies, tunc coque per horae quadrantem, exprime et oleum separa; — *T.* Florum uncias quindecim, Olei libras quinque, tres macerationes, priores per tres vel quatuor dies, tertiam per mensem circiter protrahendam.

Spiritus Lavandulae. (A. Am. An. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Han. Hass. HassP. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pal. Pol. R. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. *C. Pid. Sw. T. Vm.*)

℞. Lavandulae . . partem unam.
Alcoholis (20°) . partes quatuor.
Spiritus destillatione elicitus 28° indicet. (An. Br. Ed. Hass. Pal. Wir. *Pid.*)

Bel. Lavandulae partem unam et sedecim Alcoholis; — Suec. Lavandulae partem unam cum dimidia et decem Alcoholis; — Lus. Lavandulae partem unam cum dimidia, et decem Alcoholis; — *T.* Florum recentium libras duas, Spiritus Vini 32° B. libras octo, destillando libras circiter quinque elice; — Sar. Lavandulae partem unam, Alcoholis quatuor et cohobationem producti supra novam herbam; — D. Lavandulae partem unam, Alcoholis sex et cohobationem supra novos flores; — Wür. Lavandulae partem unam cum dimidia, Alcoholis decem, et cohobationem supra novam herbam; — Fer. Florum libram unam cum dimidia et octo Alcoholis; destillent librae sex.

℞. Lavandulae . . . partes tres.
Aquae Vitae . . . partes sex.
— purae partes triginta sex.
Destillent partes novem. (*Vm.*)

Bor. Han. O. Pol. et Sax. Lavandulae partem unam, Alcoholis et Aquae, singulorum quatuor; — Ba. Lavandulae unam, Alcoholis (0,900) quatuor et octo Aquae; — A. Lavandulae unam, Alcoholis (0,910) quatuor cum dimidia et Aquae sex; — Fenn. Lavandulae unam cum dimidia, Alcoholis quatuor et tres Aquae; — Du. Herbae sesquilibram, Alcoholis octarios octo et Aquae sufficientem quantitatem; — Am. Lon. LonN. et *C.* Herbae libras duas, Alcoholis octarios octo et Aquae quantitatem sufficientem ut empyreuma prohibeatur; — Bor4. HassP. Florum libram unam, Spiritus Vini rectificati libras quatuor, Aquae fontanae quantum satis; post macerationem per horas viginti quatuor, destillando libras quatuor elice.

℞. Lavandulae . partes duodecim.
Alcoholis . . . . . partes sex.
Aquae . . . . . partes duas.
Partibus sex destillando elicitis productum novae destillationi cum Lavandulae partibus duodecim et Aquae duabus subjiciatur, quo partes sex extrahantur. (*Sw.*)

℞. Lavandulae . . . semilibram.
Aquae Lavandulae libram unam.
Alcoholis . . . libras quatuor.
Post infusionis horas viginti quatuor destillent librae tres. (R.)

Tinctura Lavandulae composita s. aromatica, Spiritus Lavandulae compositus, Alcohol cum Lavandula Spica compositus. (Am. An. B*. D. Du. Ed. Fenn. GalF. Gen. Han. Lon. LonN. Pal. Suec. *C. Ca. Sw. Vm.*)

℞. Spiritus Lavandulae
partes triginta duas.
— Rorismarini partes sedecim.
Cinnamomi,
Nucis moschatae,
singulorum partes duas.
Infunde frigidè per tres dies et adde
Ligni Santali rubri partem unam.
Macera iterum per aliquot dies, tunc cola exprimendo et filtra. (*Vm.*)

Han. Spiritus Lavandulae libras duas, Spiritus Rorismarini uncias octo, Cinnamomi, Nucis moschatae, singulorum drachmas duas, et Ligni Santali rubri semunciam; — B*. et GalF. Spiritus

Lavandulae libras tres, Spiritus Rorismarini unam, Cinnamomi, Nucis moschatae, singulorum semunciam et Santali rubri unciam unam; — Pal. et Suec. Spiritus Lavandulae libras tres, Spiritus Rorismarini unam, Cinnamomi, Nucis moschatae, singulorum semunciam et Santali rubri drachmas tres; — *Ca.* Spiritus Lavandulae libras tres, Spiritus Rorismarini libram unam, Cinnamomi, Santali rubri, singulorum sesquiunciam et Nucis moschatae unciam unam; — *Vm.* Spiritus Rorismarini uncias duodecim, Spiritus Lavandulae uncias triginta sex, Cinnamomi, Nucis moschatae, singulorum semunciam, Coccionellae semidrachmam

℞. Spiritus Lavandulae libras tres.
— Rorismarini libram unam.
Cinnamomi,
Nucis moschatae,
singulorum semunciam.
Coccionellae contusae
semidrachmam.

Digere, modico igne, per tres dies et cola. (Fenn.)

℞. Spiritus Lavandulae libras duas.
— Rorismarini . uncias sex.
Pulveris Cinnamomi,
— Nucis moschatae,
singulorum semunciam.
— Santali rubri drachmas tres.

Post digestionem per septimanam filtra et residuo infunde

Spiritus Lavandulae libram unam.
— Rorismarini . uncias sex.

Stent in digestione per tres dies, quo facto colaturae filtratae misceantur. (An.)

℞. Spiritus Lavandulae libras tres.
— Salviae . . libram unam.
Cinnamomi . . unciam unam.
Nucis moschatae . semunciam.
Rasurae Santali albi
drachmas tres.

Post frigidam per octo dies infusionem cola. (*Sw.*)

℞. Spiritus Lavandulae libras tres.
— Rorismarini libram unam.
Cinnamomi,
Nucis moschatae,
Santali citrini,
singulorum semunciam.
Ambrae griseae semiscrupulum.
Croci . . . drachmam unam.

Post octo dies macerationis cola. (Gen.)

℞. Spiritus Lavandulae,
— Rorismarini,
singulorum uncias viginti quatuor.
Cinnamomi . . unciam unam.
Nucis moschatae . semunciam.
Caryophyllorum drachmas duas.
Aquae . . uncias centum viginti.

Destillent liquidi unciae quadraginta octo, in quibus infunde

Ligni Santali rubri drachmas tres et filtra, vel totum absque destillatione, infusioni subjice per plures dies, cum utroque spiritu et filtra. (*Vm.*)

℞. Spiritus Lavandulae
partes octoginta quatuor.
— Rorismarini
partes quadraginta octo.
— Citri . . partes duodecim.
Cinnamomi . . . . partes tres.
Cubebarum,
Caryophyllorum,
singulorum partem unam.

Stent per plures dies in frigida infusione, tum filtrentur (*Vm.*)

℞. Spiritus Lavandulae octarios tres.
— Rorismarini octarium unum.
Nucis moschatae,
Cinnamomi,
singulorum semunciam.
Caryophyllorum drachmas duas.
Rasurae Ligni Santali rubri
unciam unam.

Post decem dies cola. (Am. Du. C. Lon. LonN. Caryophyllos omittunt; — Ed. et *Sw* Spiritus Lavandulae libras tres, Spiritus Rorismarini libram unam, Cinnamomi unciam unam, Caryophyllorum drachmas duas, Nucis moschatae semunciam, Santali rubri drachmas tres et octo dierum macerationem.

℞. Foliorum Lavandulae
partes duodecim.
— Rorismarini . partes sex.
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
singulorum partes tres.
Cubebarum . . partem unam.
Aquae Vitae partes centum quadraginta quatuor.
Aquae purae
partes ducentas octoginta octo.

Destillent partes centum octo. (*Vm.*)

Spiritus Lavandulae ammoniacalis, Guttae anglicae cephalicae (*T.*)

℞. Spiritus Cornu Cervi (destillatione cornu cervi vel fili bombycini obtenti) . . . . uncias octo.
Olei essentialis Lavandulae
drachmas duas.
Alcoholis 38° B. unciam unam.

vergl. I. p. 165., wo ſtatt Spiritus Fuliginis zu leſen iſt Spiritus Cornu Cervi.

D. Lavandulae libras duas, Rorismarini libram unam, Corticis recentis Citri uncias tres, Alcoholis libras duodecim, destillationem ad siccum et infusionem producti cum Cubebarum, Ca-

ryophyllorum, singulorum uncia una et Cinnamomi unciis tribus.

Reizend. - Gabe, von zehen Tropfen bis zu zwei Drachmen in Zuckerwasser.

Aqua odorifera. (B*. Wir.)

℞. Herbae Rorismarini,
— Majoranae,
Florum Lavandulae,
singulorum unciam unam.
— Liliorum Convallium,
— Rosarum,
singulorum uncias duas.
Ligni Rhodii,
Cortic s recentis Citri,
singulorum sesquiunciam.
Cinnamomi . . . uncias duas.
Caryophyllorum . sesquiunciam.
Alcoholis . . . . libras octo.
Aquae . . . . libras quatuor.

Post tres dies digestionis destillent tres quadrantes. (Wir.)

℞. Lavandulae,
Melissae, singularum libras duas.
Radicis Calami . libram unam.
Caryophyllorum,
Herbae Rorismarini,
singulorum semilibram.
— Majoranae,
— Menthae piperitae,
Cinnamomi,
singulorum unciam unam.
Alcoholis . . . . libras duas.
Aquae . . . . libras triginta.

Destillent unciae viginti. (B*.)

Dieses gewürzhafte Wasser unterscheidet sich fast nur dem Namen nach von dem Karmeliter- und Köllnischen Wasser. Es dient zu demselben Gebrauch.

Lawsonia.

Lawsonia inermis, L.; rothes Mundholz, rothes Aegyptisches Färbekraut; Henné (*Gal.*); Alkanet (*Ang.*); Pachar (*Jav.*); Pontalesche (*Malab.*).

Ba. Gal. Wir. *A. M. Sp.*

Ein Strauch (Octandria Monogynia, L.; Salicariae, *J.*) Ostindien's und Africa's. (Hort. Malab IV. p. 117. t. 57.)

Man wendet die Wurzel (radix Alcannae verae s. orientalis s. Cypri antiquorum s. Ligustri Aegyptiaci) an; sie ist dunkelroth und hat einen herben, styptischen Geschmack.

Schwach abstringirend.

In Ostindien gebraucht man die Wurzel der Lawsonia spinosa, L.; Henné épineux (*Gal.*); Urkan (*Ar.*); Maritondi (*Cy.*); Mayndie (*Duk.*); Daun lacca (*Mal.*); Mail anschi (*Malab.*); Henna (*Pe.*); Sakachero (*Sa.*); Marudanie (*Tam.*); Gorunta chettu (*Tel.*).

Sie hat viel Aehnlichkeit mit der vorigen; sie soll bei Aussatz und andern Hautkrankheiten, sowohl äußerlich als innerlich angewendet, zu einem halben Kaffeelöffel gegeben, nützlich seyn.

Ledum.

Ledum palustre, L.; Haidebienenkraut, Sumpfporsch, wilder Rosmarin, Porsch, Porst; Romarin sauvage (*Gal.*); Marsh ledum (*Ang.*); Vild rosmarin (*D.*); Wilde rosmaryn (*Bel.*); Ledo (*I.*); Rozmarin czeski (*Pol.*); Getporss, Sqwattram (*Suec.*).

A. Bor. Bor4. Br. D. Fenn. Fer. Gal. Ham. Han. Li. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. *Be. M. Sp.*

ℏ (Decandria Monogynia, L.; Rhodoraceae, *J.*) Eine Nordeuropäische Pflanze. (*Schk.* t. 117. *Plenck* t. 337. *Hayne* III. 21. *Zorn* Ic. pl. t. 54.)

Man wendet die Spitzen (herba s. folia Ledi palustris cum floribus s. Rorismarini sylvestris s. Anthos sylvestris) an; sie bestehen aus behaarten, röthlichen Zweigen mit linienförmigen, fast sitzenden, am Rande umgeschlagenen, oben grünen, unten filzigen und röthlichen Blättern und weißen, endständige, sitzende Dolden bildenden Blüthen.

Diese Pflanze wird für narkotisch gehalten und in convulsivischen und Krampf-Krankheiten gepriesen.

Infusum Ledi s. Ledi palustris. (B*. *Sw. Sy.*)

℞. Foliorum Ledi palustris
semunciam ad unciam unam.
Aquae bullientis . libram unam.
Infunde per horam unam et cola.

Bei Aussatz, Krätze, Kopfgrind, Keichhusten, venerischen Krankheiten empfohlen.

Lens.

Ervum Lens, L.; Linse; Lentille (*Gal.*); Common lentil (*Ang.*); Lentecchia (*I.*); Linz (*Suec.*).

Gal. *Be. G. M. Sp.*

⊙ (Diadelphia Decandria, L.; Leguminosae, *J.*) Eine in Europa gebaute Pflanze. (*Plenck* t. 565. *Schk.* t. 202. *Sturm* Fl. D. I. 32 *Oed.* Fl. Dan. t. 95.)

Man wendet den Saamen (semen Lentis) an; er ist kreisrund, platt, an beiden Seiten bauchig und von gelblicher Farbe.

Ehedem gab man die Abkochung der Blattern; sie ist, schwach bereitet, etwas abstringirend.

Lepidium.

Zwei Arten dieser Pflanzengattung werden in den Pharmacopöen angeführt:

1) *Lepidium latifolium*, *L.*; Pfefferkraut; Passerage à larges feuilles, grande Passerage (*Gal.*); Broadleav'd paperwort (*Ang.*); Peperur (*D.*); Breedlabig peperkruid (*Bel.*); Lepidio (*I.*); Peparaer (*Suec.*).

Gal. His. *Sp.*

4 (Tetradynamia Siliquosa, L.; Cruciferae, *J.*) Eine in Europa gemeine Pflanze. (*Blackw.* t. 448. *Oed.* Fl Dan. t. 557.)

Man wendet das Kraut (herba Lepidii) an; es besteht aus einem walzigen, glatten ästigen Stängel mit eirundlanzettigen blaß- und selbst blaugrünen, gezähnelten oder bisweilen ungetheilten Blättern, von denen die untern gestielt, die obern sitzend und schmal sind. Es hat einen scharfen, gewürzhaften, pfefferartigen Geschmack.

2) *Lepidium Iberis*, *L.*; kleines Pfefferkraut; Passerage ibéride, petite Passerage (*Gal.*).

Gen.

⊙ Eine in Europa gemeine Pflanze. (*Zorn* Ic pl. t. 593.)

Man wendet das Kraut (herba Iberidis) an; es besteht aus einem ästigen Stängel gestielten, lanzettigen, an der Spitze gezähnten oder selbst eingeschnittenen, fiederspaltigen oder leierförmigen Wurzelblättern und linienförmigen ganzen und ganzrandigen Stängelblättern. Es hat einen scharfen, starken, dem der Kresse ähnlichen Geschmack.

Reizend, gegen Scorbut.

Conserva Lepidii. (His.)

℞. Foliorum recentium Lepidii partem unam.

Contundendo pistilli ligni ope in mortario marmoreo in pastam mollem redige, addendo sensim

Sacchari albi pulverati partes duas.

Infusum Lepidii. (B°.)

℞. Herbae Lepidii semunciam ad unciam unam.

Aquae bullientis quantum sufficit ut colaturae unciae sex obtineantur.

Dieser Aufguß ist, nach Erdmann, in Rußland gegen Wechselfieber in Gebrauch. — Gabe, alle Stunden einen Löffel.

Lichen.

Wir fassen unter diesem Namen folgende Flechten zusammen:

1) *Physcia nivalis*, *Cand.*; Schneeflechte; Lichen blanc de neige (*Gal.*).

Wir.

Ein kryptogamisches Gewächs der Alpen und der Pyrenäen. (*Dill.* Musc t. 21 f. 56.)

Es besteht (Lichen terrestris cinereus) aus weißen oder gelblichen, am Grunde etwas abstehenden, oben wieder aufwärts gerichteten, ästigen, fast ausgezackten, krausen Blättern, welche in platte, rundliche oft mit schwarzen Puncten gesäumte Läppchen endigen; die auf den Blättern sitzenden Schildchen sind sehr selten, sitzend, braun und von einem gekerbten Rande eingefaßt.

Das Pulver dieser Pflanze wurde ehedem als ein specificum gegen die Wuth betrachtet.

2) *Scyphophorus cocciferus*, *Cand.*; scharlachfarbige Becherflechte, Feuerkraut, Fiebermoos; Lichen coccifère (*Gal.*).

Gal.

Diese Flechte (herba ignis s. Musci pyxidati) besteht aus kleinen, oben grünlichweißen, unten weißeren Blättern, von denen walzige, oft ästige Stängel entspringen, welche sich in Becher erweitern, an deren Rändern rothe Höcker sitzen.

3) *Peltigera canina*, *Cand.*; Hundsflechte; Lichen contre la rage (*Gal.*); Ashcolour'd ground liverwort (*Ang.*); Honds moos (*Bel.*); Musgo canino (*Lus.*); Hund mossa (*Suec.*).

Br. Gal. *M. Sp.*

Ein sehr häufig in Hölzern auf der Erde wachsendes kryptogamisches Gewächs. (*Plenck* t. 747. *Vaill.* Bot. t. 21. f. 16.)

Es besteht diese Flechte (herba Musci canini s. Lichen cinereus terrestris) aus großen, breiten, lebrigen, rundlichen, aschgrauen oder braunen Blättern, welche unten mit rothen, behaarten, ästigen und unter einander zusammentretenden Rippen versehen und in rundliche Lappen getheilt sind, von denen einige aufsteigende die rothen ebenen, länglichen, scheitelrecht stehenden Schildchen tragen; der Rand der letztern ist eingewächsen.

Peltigera venosa, horizontalis, polydactyla und aphthosa (*Haffm.* Lich. I. t. 6. f. 1. *Jacq.* Coll IX. t. 17.), welche von der Französischen Pharmacopöe ebenfalls angezeigt sind, haben viel Aehnlichkeit mit ihr.

Ehedem hielt man diese Pflanze als gegen die Wuth für sehr nützlich

4) *Scyphophorus pyxidatus*, *Cand.*; Becherflechte; Lichen en entonnoir (*Gal.*).

Ful. Gal. GalM. Ham. Li. *M. Sp.*

Ein kryptogamisches Gewächs, welches man auf der Erde, auf Holz und an alten Mauern antrifft. (Handb. d. pharmac. Bot. t. XCII. f. 427. *Dill.* Musc. t. 14. f. 2.)

Dieses Moos (herba Musci pyxidati) besteht aus lappigen oder gekerbten, oben etwas grünlichen, unten weißern Blättern, welche regelmäßig von unten nach oben ausgerandete becherförmige Schildchen tra-

gen, an deren Rande dunkelbraune Höcker sitzen.

Ehedem gegen Husten empfohlen.

5) *Usnea plicata, Cand.*; Haarflechte, Wickelflechte; Lichen entrelacé, Mousse de chêne (*Gal.*); Hairy treemoss (*Ang.*); Skinslav (*D.*); Musco arboreo (*His.*); Worrig schurffmoos (*Bel.*); Musgo dos carvalhos (*Lus.*); Taf (*Suec.*).

Gal. His. Wir. *M.*

Ein kryptogamisches Gewächs, welches sich auf den Zweigen alter Bäume häufig findet. (*Dill.* Musc. t. 11. f. 1.)

Es besteht (Muscus albus quernus s. arboreus) aus bisweilen über 1 Fuß langen, sehr festen, höckrigen, in durcheinander gewirrte Aeste getheilten, weißlichen Stängeln und vielen fast endständigen, weißen, mit haardünnen Wimpern am Rande versehenen Schildchen. Es hat einen angenehmen Geruch und einen etwas adstringirenden Geschmack.

Ehedem bezahlte man die, welche auf dem Schädel Erhenkter wachsen, dem Gewichte nach mit Gold.

Schwach adstringirend, ehedem für schmerzstillend gehalten und sowohl um den Magen zu stärken, als auch um Ausflüsse jeder Art zu hemmen und Husten zu mildern, angewendet.

6) *Physcia Islandica, Cand.*; Lungenmoos, Isländisches Moos; Lichen d'Islande (*Gal.*); Iceland lichen, Iceland liverwort (*Ang.*); Gaternjk (*B.*); Islandskmoos, Fielgraes (*D.*); Liquen islandico (*His.*); Yslandisch moos (*Bel.*). Lichene islandico, Musco catartico (*I.*); Meck islandzki (*Pol.*); Musgo islandico (*Lus.*); Islandsmosse (*Suec.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen Ham. Han. Hass. HassP. His Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RC Sax. Suec. Wir. Würr. WW. *Be. Br. C. Fi. G. M. Sar. Pid. Sp.* Z.

Ein in Europa, besonders im Norden, sehr gemeines kryptogamisches Gewächs. (*Jacq.* Coll. IV. t. 8. f. 1. *Plenck.* t. 744. *Blackw.* t. 599. *Oed.* Fl. Dan. t. 153. f. 879.)

Es besteht (herba Lichenis islandici s. Muscus Islandicus s. catharticus) aus häutigen, kastanienbraunen oder olivenfarbigen, am Grunde bräunlichrothen, unten blässern, aufrechten, ästigen, in zurückgebogene, fast linienförmige, vielspaltige, hohle, gezähnte und gefranste Lappen getheilten Ausbreitungen; die breiteren Lappen tragen ebene, sitzende, angedrückte, gleich- oder weniger dunkelgefärbte Schildchen mit erhabenem, ganzem und gefranstem Rande.

Nach Prouft enthält diese Pflanze in 100 Theilen, 64 Schleim, 33 satzmehlartigen und 3 bittern Stoff.

Es besitzt, je nachdem man ihm den bittern Stoff entzogen hat oder nicht, entweder bloß nährende oder zugleich auch tonische Eigenschaften. Man hat es besonders in der Lungenschwindsucht gerühmt.

7) *Imbricaria parietina, Cand.*; Wandflechte, goldgelbe Schuppenflechte, Plankenflechte; Lichen des murs (*Gal.*); Common yellow lichen (*Ang*); Guul skorpemoos (*D.*); Maurig schurffmoos (*Bel.*); Vaeggmosse (*Suec.*).

A. Ba. Fer. GalM. Sax.

Ein Kryptogamist Europa's. (Fl. Dan. 1005. *Hoff.* Enum. Lich. XVIII. 1. *Hayne* V. t. 47. *Dill.* Musc. t. 24. f. 76.)

Es besteht aus einem häutigen, geschinbelten, unten weißlichen, oben grünlichen, später in's Goldgelbe und Aschgraue übergehenden Laub mit rundlichen, in Lappen getheilten, krausen, großen, ausgebreiteten Blättern, in deren Mitte zahlreiche Schildchen mit dunkler gefärbter Scheibe und ganzem Rande sitzen.

Bitter, als Ersatzmittel der China bei Wechselfiebern ausgegeben. Doch hat die Schrader'sche Analyse eine Aehnlichkeit mit der China nicht dargethan.

8) *Physcia Prunastri, Cand.*; weißes Lungenmoos; Lichen du prunellier (*Gal.*).

Wir. *Sp.*

Diese Flechte wächst in Europa. (*Dill.* Musc. t. 21. f. 54 55. A.)

Sie besteht (Muscus arboreus s. Acaciae) aus einer weichen, häutigen, aschgrauen, weißlichen, bisweilen grünlichen, runzeligen, höckrigen, unten milchweißen, ungleich gabeligen, sehr ästigen Ausbreitung mit aufgerichteten, linienförmigen, verdünnten, ebenen Lappen; die Schildchen sind einzeln, braun und randständig.

Schwach adstringirend.

9) *Lobaria pulmonaria, Cand.*; Lungenflechte; Lichen pulmonaire, Pulmonaire de chêne (*Gal.*); Lungwort (*Ang.*); Lungemos (*D.*); Pulmonaria de arbol (*His.*); Longachtig lungwort (*Bel.*); Polmonaria di quercia (*I.*); Hepatica dos avores (*Lus.*); Lungmossa (*Suec.*).

Br. Gal. GalM. Gen. Wir Würr. *Be. Fi. M. Sp.*

Ein besonders im Norden Europa's sehr gemeines kryptogamisches Gewächs. (*Plenck* t. 745. *Hayne* V. t. 48. *Zorn* Ic. pl. t. 494.)

Es besteht (herba Pulmonariae arboreae s. Muscus pulmonarius) aus einer oben gelbgrünen Ausbreitung mit einem Netz hervorstehender Höhlen, unten gleichsam höckerig, weiß und an den Erhöhungen, welche die Höhlen daselbst bilden, glatt, in

den Zwischenräumen derselben braun und behaart.

Species pectorales. (Ful.)

℞. Lichenis Islandici . libram unam.
Radicis Althaeae . . libras duas.
Concisa misce.

Pulvis antilyssus. (Br. Wir. *Sp.*)

℞. Lichenis terrestris cinerei
uncias duas.
Piperis nigri . . unciam unam.
Fiat pulvis.

Chocolata Lichenis Islandici, Pasta cacaotina lichenifera s. Cacao cum Lichene Islandico. (Bor4. Sax. *Au.*)

℞. Seminum Cacao tostorum,
Sacchari,
singulorum libras quatuor.
Lichenis Islandici . libras duas.
Salep . . . . . uncias tres.

Von Trommsdorff angegeben. (*Au.*)

℞. Lichenis Islandici cum Aqua calida loti et siccati partem unam.
Pulveris Salep . partem octavam.
Sacchari albi . . . partes duas.
Mixtis exacte adde
Pastae Cacao calidae adhuc
partem unam.
Fiant tabellae. (Sax.)

℞. Lichenis Islandici uncias quatuor.
Infunde
Aquae communis fervidae .
libras duas,
in quibus solutae sunt
Kali carbonici e cin. clav.
drachmae duae.

Stent per horas tres. Tum liquorem decantha, residuum Aqua communi frigida probe ablutum et siccatum in pulverem redige. Hujus pulveris unciis tribus adde

Cacao tostae in mortario ferreo calido in massam subtilissimam redactae,
Sacchari albi pulverati,
singulorum sesquilibram.
Radicis Salep pulveratae
drachmas tres.

Massam intime mixtam aut in cistulas effunde aut refrigeratam in pulverem redige. (Bor4.)

Extractum Lichenis Islandici. (Wür.)

℞. Lichenis Islandici mundati
quantum vis.

Alcoholis . . . quantum sufficit ut quatuor digitorum crassitiem tegatur; digere blando calore et decantha; residuum cum Aqua coctum coletur cum expressione; colatura in balneo aquae ad mellis consistentiam evaporet, addita sensim tinctura et agitatione continua ut massa homogenea neque grumosa obtineatur.

Infusum Lichenis Islandici. (*Sa.*)

℞. Lichenis Islandici drachmas tres.
Aquae bullientis quantum sufficit ut post semihoram infusionis et aliquot momenta ebullitionis, colaturae librae viginti obtineantur, quibus adde
Syrupi Rubi Idaei sesquiunciam.

Syrupus Lichenis Islandici. (Han. *Vm.*)

℞. Lichenis Islandici . uncias sex.
Aquae bullientis . . libras sex.
Decoque ad librarum quatuor remanentiam et adde
Sacchari albi . . libras quinque.
Coque ad consistentiam syrupi. (Ham.)

Vm. Lichenis partem unam, Aquae triginta quinque ad viginti coctione redactas et decem Sacchari.

Syrupus de musco querno. (Wir.)

℞. Musci querni . . . uncias tres.
Herbae Chenopodii ambrosiaci,
Passularum minorum,
singularum sesquiunciam.
Radicis Consolidae majoris
unciam unam.
— Liquiritiae . semunciam.
Aquae bullientis . sesquilibram.
Infunde per noctem, tum lente coque. Colaturae unciarum decem clarificatae adde
Balsami Tolutani sesquidrachmam.
Sacchari albi pulverati
sesquiunciam,
Misce exacte.

Decoctum Lichenis Islandici. (B*. Sax. Suec. *ParC. Ra. T. Vm.*)

℞. Lichenis Islandici . partem unam.
Aquae frigidae . . partes octo.
Macera per semihoram et liquidum decanthatum rejice. Tum coque lichenem cum
Aquae . partibus triginta duabus ad dimidii remanentiam, cola et exprime. (Sax.)

T. Lichenis uncias duas, Aquae bullientis modicam quantitatem, quam decanthatam rejice et lichen coque cum Aquae libris quatuor ad dimidii remanentiam. Si aquam prioris bullitionis non rejicias addere potes, ad temperandum saporem amarum, momento, quo ab igne removes, Radicis Liquiritiae modicam quantitatem.

℞. Kali subcarbonici drachmam unam.
Aquae . . uncias triginta duas.
Dissolutionem infunde
Lichenis Islandici mundati
unciis duabus.
Post macerationem duodecim hora-

rum liquidum decantha, lichen bene cum Aqua pura ablue et ei infunde
Aquae . uncias quadraginta octo.
Decoque ad unciarum sedecim remanentiam, cola et exprime. (B*. Suec. *Vm.*)
℞. Lichenis Islandici . semunciam.
Coque, antea per sexagesimas quinque cum Aqua bulliente bene ablutum, cum
Aquae communis . libris tribus ad librarum duarum colaturae remanentiam. (*Rz.*)
℞. Lichenis Islandici . semunciam.
Aqua calida bene abluto adde
Aquae octarios duos cum dimidio.
Coque ad octarii unius cum dimidio remanentiam et colaturae adde
Syrupi Sacchari . . uncias duas.
Misce bene. (*ParC.*)

Decoctum Lichenis Islandici (amarum). (Am. B*. Ed. Gal.M. Lon. LonN. Suec. *Au. C. E. Fi. Sa.*)

℞. Lichenis Islandici unciam unam.
Aquae purae . . uncias sedecim.
Decoque ad unciarum duodecim colaturae remanentiam. (B*. WW. *E.*)
Am. Lon. LonN. et *C.* Lichenis unciam unam, Aquae sesquioctarium, pro triente consumendum; — Ed. *Fi.* Lichenis unciam unam, Aquae libras duas ad uncias sedecim redigendas; — Du. Lichenis uncias duas, Aquae libras duas ad uncias sedecim redigendas; — Suec. Lichenis libram unam et Aquae uncias viginti quatuor ad sedecim redigendas.
RC. Lichenis Islandici semunciam, Aquae fontanae sesquilibram ad libram unam coquenda et sub finem adden do Liquiritiae Radicis drachmam unam vel Mellis puri semunciam.
℞. Lichenis Islandici
semunciam ad unciam unam.
Aquae . . . . . libras duas.
Decoque ad unius librae colaturam, cui adde
Mellis albi . . . unciam unam.
Liqua. (GalM.)
℞. Lichenis Islandici . semunciam.
Aquae . . . . quantum sufficit ut colaturae sesquilibra obtineatur; post horae quadrantis ebullitionem adde
Syrupi Althaeae,
— Papaveris albi,
singulorum unciam unam.
Misce. (*Sa.*)
℞. Lichenis Islandici drachmas duas.
Salep . . . . . grana decem.
Cinnamomi . . . . grana octo.
Aquae . . . uncias duodecim.
Coque ad unciarum sex remanentiam et adde
Syrupi Sacchari . quantum vis.
Misce. (*Au.*)
Bitter. — Bei Lungenschwindsucht, weißem Fluß, Keichhusten empfohlen.. — Gabe, vier Unzen drei oder vier Mal täglich.

Decoctum Lichenis Islandici lacteum. (*Au.*)

℞. Lichenis Islandici unciam unam.
Seri Lactis . . . uncias viginti.
Decoque ad unciarum duodecim remanentiam et adde
Sacchari lactis . drachmas sex.

Potio nutriens et sedans. (*B.*)

℞. Lichenis Islandici abluti
uncias duas.
Rasurae Cornu Cervi unciam unam.
Aquae . . . . quantum sufficit ut potio gelatinosa formetur, cui adde
Laudani liquidi Sydenhami
guttas quindecim.
Allmälig den Tag über zu nehmen. — Bei Lungenschwindsucht mit großen Schmerzen empfohlen.

Decoctum pectorale nutriens. (*B.*)

℞. Lichenis Islandici . uncias duas.
Turionum Abietis . semunciam.
Aquae . . . . quantum sufficit ut colaturae libra una obtineatur.

Decoctum pectorale nutriens et incitans s. Lichenis Islandici compositum. (Wür. *Au. B. Sw.*)

℞. Lichenis Islandici abluti
unciam unam.
Chinae . . . . . semunciam.
Serpentariae Virginicae
drachmam unam.
Aquae . . . . quantum sufficit ut decocti unciae quatuor obtineantur, quarum colaturae adde
Emulsionis gummosae
uncias quatuor.
Misce bene. (*B.*)
℞. Lichenis Islandici,
Hederae terrestris,
singulorum semunciam.
Chinae . . . . drachmas duas.
Aquae . . . . quantum sufficit ut decocti librae duae obtineantur, quibus adde
Lactis vaccini . . uncias decem.
Misce bene. (*B.*)
℞. Radicis Polygalae Virginicae
drachmas duas.
Lichenis Islandici . semunciam.
Dulcamarae drachmam unam.
Aquae . . . . quantum sufficit ut unciae quatuor colaturae obtineantur, quibus adde

Lactis vaccini . . . uncias sex.
Misce bene. (*B.*)

℞. Lichenis Islandici . . semunciam.
Radicis Polygalae amarae unciam unam.
Aquae . . . . . libras tres.
Coque ad colaturae librarum duarum remanentiam. (*Sw.*)

℞. Lichenis Islandici . drachmas sex.
Fungi Melitensis,
Radicis Consolidae majoris,
— Polygalae amarae,
singularum semunciam.
Conservae Rosarum rubrarum uncias duas.
Seminum Hyoscyami drachmas tres.
Aluminis . . . sesquidrachmam.
Aquae fontanae . libras quinque.
Decoque ad librarum trium cum dimidia remanentiam et colaturae adde
Mellis rosati . . sesquiunciam.
Misce bene. (Wür.)

℞. Ligni Quassiae . drachmas duas.
Lichenis Islandici . drachmas sex.
Aquae . . . . uncias tredecim.
Decoque ad unciarum decem remanentiam et adde
Extracti Myrrhae drachmam unam.
Tartari stibiati . . . grana duo.
Oxymellis scillitici unciam unam.
Gebe, alle zwei Stunden einen Löffel. (*Au.*)

℞. Lichenis Islandici . uncias duas.
Boleti salicis,
Summitatum Millefolii,
Florum Salicariae,
Passularum minorum,
singulorum semunciam.
Harum specierum semunciam coque cum Aquae octario uno. (*Au.*)

Gelatina s. Mucilago Lichenis Islandici. (Ams. An. B. Bel. BorC. Fenn. Ful. Gal. Han. HassP. Li. Lus. Sax. Suec. Wür. *Au. Ca. Fi. Huf. T.*

1) Ohne den bittern Stoff.

℞. Lichenis Islandici Aqua alcalina abluti . . . . libram unam.
Aquae fontanae . libras duodecim.
Decoque ad dimidium, cola, exprime et ad locum frigidum repone, ut in gelatinam abeat. (Suec.)

Han. Lichenis Aqua alcalina loti uncias duas, Aquae uncias triginta ad sex redactas et quatuor librarum Sacchari additionem.

℞. Lichenis Islandici partem unam.
Aquae frigidae . . partes octo.
Macera per semihoram, liquidum rejice et residuo infunde
Aquae . . . partes triginta duas.
Decoque ad dimidium, tunc ad mellis consistentiam evaporatum in locum frigidum repone. (Sax.)

Gal. *Ca. Fi.* et *T.* coquere lente jubent Lichenis uncias duas in Aquae sufficiente quantitate, liquidum rejicere, coquere deinde bis residuum in Aqua (unciis duabus), decocta conjungere, addere iis Ichthyocollae solutae drachmam unam et Sacchari albi uncias quatuor, colare, clarificare et evaporando ad semilibrae remanentiam consumere; — HassP. Lichenis Islandici uncias tres. Aquae fervidae quantum sufficit, infunde et rejice aquam, lichenem coque in Aquae libris tribus ad unciarum decem remanentiam, quae leni igne ad sex evaporent.

2) Mit dem bittern Stoff.

℞. Lichenis Islandici . libram unam.
Aquae . . . . . libras viginti.
Decoque ad librarum sex remanentiam, cola fortiter exprimendo et in locum frigidum sepone. (Fenn.)

BorC. Lichenis unciam unam et Aquae uncias duodecim ad octo redactas; — *Huf.* Lichenis quantum satis ut Aquae quantitas arbitraria in mucilaginem redigatur; — *Au.* Lichenis unciam unam et duodecim Aquae ad octo redigendas.

℞. Lichenis Islandici . uncias tres.
Aquae . . . . libras quatuor.
Decoque ad tertiae partis remanentiam, cola, exprime, vaporando ad libram unam consume et adde
Syrupi cujuslibet . . uncias tres.
Misce bene. (*Au.*)

℞. Lichenis Islandici . sesquiunciam.
Aquae . . . . . libras duas.
Decoque ad colaturam unciarum sex et adde
Sacchari albi . . uncias quatuor.
Ad syrupi spissi consistentiam redacta refrigescant. (Ams. An. B. Bel. Li. Lus.)

Eo modo procedit *Regnault*, praescribens Lichenis uncias sex, Aquae octarios tres, quadrantem horae ebullitionis, colaturae evaporationem ad octarium usque, additionem Sacchari unciarum sex et coctionem ad syrupi spissi consistentiam; — *Idt* et *Chevallier* coquere proposuerunt in globo stanneo cochlea instructo, in balneo aquae, Lichenis Aqua calida loti unciam unam cum Aquae unciis quinque per horas tres, decoctum colare et exprimere, addere deinde colaturae Sacchari unciam unam, lente ad unciarum quatuor liquidi remanentiam consumere, in ollam effundere et postquam concreverint pelliculam in superficie formatam tollere. (GalF.)

3) Mit dem bittern und einem adstringirenden Stoffe.

℞. Lichenis Islandici,
Musci pulmonarii,
Fungi Melitensis,
singulorum drachmas sex.
Aquae . . . quantum sufficit.
Decoque ad colaturae sesquilibrae remanentiam, inspissa deinde ut fiat gelatina, cui adde
Sacchari rosati . sesquiunciam.
Misce bene. (Wür.)

℞. Lichenis Islandici sesquiunciam.
Musci albi querni,
Petalorum Rosarum,
Radicis Polygalae amarae,
singulorum semunciam.
Ichthyocollae . unciam unam.
Aquae sufficientem quantitatem.
Coque per horas duas et adde colaturae
Elaeosacchari Citri uncias duas.
Misce bene. (*Au.*)

Ful. Lichenis Islandici uncias tres, Fungi Melitensis unciam unam, Aquae libras quatuor ad tertiam partem redactas, evaporationem colaturae ad consistentiam aptam et additionem Syrupi Sacchari unciarum trium.

Diese Gallerte ist nach der ersten Formel analeptisch und der Gährung unterworfen, tonisch nach der zweiten, und adstringirend und selbst blutstillend nach der dritten. — Gabe, zwei bis sechs Löffel.

Gelatina Lichenis cum Chinâ. (Gal.)

℞. Lichenis Islandici . uncias duas.
Ichthyocollae drachmam unam.
Aquae . . . quantum sufficit.
Coque lichen leviter in aqua, qua rejecta, coque denuo bis e serie, duobus decoctis adde ichthyocollam separatim dissolutam et
Syrupi Chinae vinosi uncias sex.
Post levem ebullitionem cola, evaporatione pro parte dimidia consume et ad refrigerandum repone.

Gelatina Lichenis opiata.

℞. Lichenis Islandici,
Rasurae Cornu Cervi,
singulorum semunciam.
Aquae . . . . . uncias octo.
Decoque ad unciarum quatuor remanentiam et adde colaturae
Syrupi Opii . . unciam unam.
Extracti Opii gummosi
drachmas duas.
Aquae Florum Aurantiorum
semilibram.
Coque lichen in Aqua per aliquot tempus; liquido rejecto, coctionem continua, colaturam cum saccharo et gummi separatim dissoluta commisce et ad mellis spissi consistentiam evaporatis adde extractum in aquae florum aurantiorum parte una solutum, evaporationem continua, addendo aquae aromaticae quod restat, et coque donec massa non amplius manui adhaereat. (GalH.)

℞. Gelatinae Lichenis Islandici
partes duodecim.
Sacchari pulverati partem unam.
Gummi Arabici pulverati
partes duas.
Misce saccharum et gummi cum gelatina adhuc calida. (Sax.)

Trochisci Lichenis Islandici. (GalF. GalH.)

℞. Lichenis . . . . libram unam.
Aqua frigida ablutum coque cum
Aquae . . . . . libris sex
per sexagesimas viginti; colaturae adde
Sacchari albi . . libram unam.
Evaporata lente ad siccum pulvera; hujus pulveris et Sacchari albi partes aequales commixtae cum Aquae sufficiente quantitate in pastam redige in trochiscos dividendam.

Electuarium incrassans. (Wür.)

℞. Gelatinae Lichenis Islandici (form. Wür.) . . . . uncias duas.
Gummi Tragacanthae
unciam unam.
Radicis Consolidae majoris pulveratae . . . . drachmas tres.
Conservae Rosarum rubrarum
drachmas sex.
Syrupi Capitum Papaveris
quantum sufficit.

Jus pectorale s. Decoctum cum carne pectorale. (*Ca.*)

℞. Lichenis Islandici . semunciam.
Helicum (Pomatia) alborum no. 6.
Cordis vervecini partem dimidiam.
Pulmonis vitulini concisi
uncias quatuor.
Aquae, ... sesquioctarium.
Coquendo partem tertiam consume.

Hydromel antiscorbutarrhale. (*Ca.*)

℞. Lichenis Islandici Aqua bulliente abluti . . . . uncias duas.
Poliorum Hyssopi . semunciam.
Hydromellis . . . libras duas.
Macera per plures dies, cola et adde

Sacchari albi . . . uncias tres. Filtra denuo.

Lignum Agallochum.

Lignum Agallochi veri, Xylaloës; Aloëholz, Paradiesholz; Bois d'Aloes ou de Calambac, de Calembouc (*Gal.*); Calumbuk, Agha luchie (*Ar.*); Aggur, Agor (*Beng. Hin.*); Sukkiang (*C.*); Chin hiam (*Co.*); Aghir (*Duk.*); Legno aloe, Agalocho, Xilaloe (*I.*); Udhmndi (*Pe.*); Pae de aloes (*Lus.*); Aguru (*Sa.*).

Br. Fer. His. Wir. *A. Fi. G. M. Sp.*

Dieses Holz ist knotig, sehr schwer, derb, fettig und besteht fast ganz aus Harz; es ist außen röthlichbraun, auf der Durchschnittsfläche grauer und mit schwarzen Flecken gezeichnet. Es hat einen starken balsamischen Geruch und einen bittern Geschmack. Es brennt unter Verbreitung eines sehr angenehmen Geruchs.

Man leitet es von Excoecaria Agallocha, L., einem Baume (Dioecia Triandria, L.; Euphorbiaceae, *J.*) Cochinchina's her. (*Rumph.* Amb. II. t. 79. f. 80.)

Tonisch, reizend.

Species cordiales temperatae. (Wir.)

℞. Sericei crudi usti,
Eboris ad albedinem usti,
Corallii rubri,
— albi, singulorum semunciam.
Margaritarum praeparatarum sesquiunciam.
Radicis Doronici,
— Behen albi,
— — rubri,
singularum drachmas tres.
Ligni Agallochi . . semunciam.
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Ossis cordis cervini,
singulorum drachmas tres.
Hyacinthi,
Smaragdi,
Sapphiri,
singulorum drachmam unam.
Croci . . . . scrupulos duos.
Fiat pulvis, cui adde
Foliorum Auri,
— Argenti,
singulorum quantum vis.

Ein abgeschmacktes Präparat, welches man ehedem von einem halben Scrupel bis zur halben Drachme bei bösartigen Fiebern, Herzklopfen und Ohnmachten von Furcht gab.

Extractum Ligni Aloës s. Agallochi. (Br. Pal. Wir.)

℞. Ligni Agallochi . quantum vis
Alcoholis concentrati
quantum sufficit ut lignum penitus extrahatur; tincturam in balneo aquae vaporationi subjice et quod, Alcohole elicito, restat, serva. — Man setzte ehedem dieses Extract zu Haupt-Pulvern und Pillen. — Gabe, ein bis zwei Gran.

Tinctura s. Essentia Ligni Aloës s. Agallochi. (Br. His. Wir.)

℞. Rasurae Ligni Agallochi sesquiunciam.
Alcoholis concentrati semilibram.
Post sufficientem macerationem filtra. (Br. Wir.)

His. Ligni partem unam et duodecim Alcoholis.

Reizend, für magenstärkend, auf den Uterus, gegen Kopfschmerz und analeptisch wirkend gehalten. — Gabe, zwanzig bis vierzig Tropfen.

Lignum Aquilae.

Lignum Aspalathi; Adlerholz; Bois d'Aigle (*Gal.*); Legno d'Aquila, aspalato (*I.*)

Br. Wir. *Be. Fi. G.*

Dieses Holz ist schmutzig gelb, wenig harzig, faserig, bisweilen schwammig und schwer zu zerbeißen. Der Geschmack ist gewürzhaft, aber nicht bitter. Der Geruch ist schwach, moschusartig.

Es stammt, wie man glaubt, von Aquilaria ovata, *Cav.*, einem Baume (Decandria Monogynia, L.), welcher in Ostindien wächst. (*Cav.* Diss. bot. 7. p. 377. t. 224.)

Ein wenig gebrauchtes Reizmittel.

Lignum Brasiliense.

Lignum Brasilianum rubrum s. Fernambuci; Brasilienholz; Bois de Brésil, de Fernambouc (*Gal.*); Ibirapitanga (*Bras.*)

Br. Gal. Li. *G.*

Dieses Holz ist schwer, hart, geruchlos und von wenig bemerkbarem Geschmack; die rothe Farbe desselben zeigt verschiedene Abstufungen.

Es kommt von Caesalpinia echinata, *Lamk.*, Brésillet (*Gal.*), einem Baume (Decandria Monogynia, L.; Leguminosae, *J.*) Brasilien's. (*Piso* Bras. p. 164. Ic. *Bert.* Bild. 1. 45. fig. 2.)

Adstringirend, ehedem bei Diarrhoe angewendet, heutzutage aber außer Gebrauch.

Lignum Campechianum.

Lignum Campechiense s. Campechense, Campescanum s. Brasilianum rubrum s. Sappan s. coeruleum; Campescheholz,

Blauholz; Bois de Campeche (*Gal.*); Logwood (*Ang.*); Campesketraet (*D.*); Palo de Campeche (*His.*); Campechehout (*Bel.*); Legno di Campeggio (*I.*); Niebieskie drzewo (*Pol.*); Pao de Campeche (*Lus.*); Campechetraed (*Suec.*).

Ams. An B. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. Li. Lon. LonN. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Würz. *Be. Br. C. G. M. Par.*

Das Campescheholz, welches wir ohne Rinde und Baſt erhalten, iſt hart, ſehr dicht, ſchwer und außen graulichbraun. Die friſche Durchſchnittsfläche hat eine dunkelrothe, etwas in's Gelbliche ziehende Farbe mit der Länge laufenden ſchwärzlichen Adern. Queer durchgeſägt zeigt es kleine, wellenförmig gebogene, dunkelrothe Ringe. Der Geſchmack iſt ſüßlich, abſtringirend, hintennach etwas bitter. Es färbt den Speichel bläulichroth.

Es kömmt von Haematoxylon Campechianum, L., einem Baume (Decandria Monogynia, L.; Leguminosae, J.) Südamerica's. (*Blackw.* t. 493. *Plenck* t. 329. *Bert.* Bild. III. 43. f. 2. *Desc.* Fl. Ant. I. 73.)

Chevreul hat darin einen beſonderen färbenden Stoff, das Hämatoxylin oder Hämatin (Haemotoxylinum, Haematinum), Hématine (*Gal.*) entdeckt.

Abſtringirend, toniſch.

Decoctum Haematoxyli s. Ligni Campechiani s. Campechensis. (B*. Ful. His. Würz. *E. Sa. Sw.*)

℞. Ligni Campechiani unciam unam.
Aquae . . . . libras quatuor.

Digere primum, tunc coque ad dimidii remanentiam usque et cola. (His.)

B*. et *E.* Ligni drachmas duas ad quatuor, Aquae libram unam et decoctionem ad unciarum sex colaturae remanentiam; — *Sa.* Ligni unciam unam et Aquae quantum satis ad colaturae librae unius remanentiam; — *Sw.* Ligni raspati unciam unam, Aquae libram unam, reductionem ad dimidium et si necesse est, additionem Tincturae Chinae unciae unius et Tincturae sedativae guttarum triginta; — Ful. Ligni unciam unam, Aquae libras duas et decoctionem ad dimidium.

RC. Ligni rasi sesquiunciam, Aquae fontanae libras duas ad unam decoquere et sub finem addere Corticis Cassiae drachmam unam.

℞. Rasurae Ligni Campechiani uncias duas.
Aquae fontanae libras quatuor.

Decoque ad librarum duarum cum dimidia remanentiam et adde

Alcoholis . . . uncias quatuor.
Cinnamomi . scrupulos quatuor.

Liquorem, post unam vel duas ebullitiones cola. (Wür.)

Abſtringirend, bei Durchfall, chroniſcher Ruhr, Leberfluß und Blutungen empfohlen. — Gabe, eine bis zwei Unzen alle vier Stunden und öfter.

Extractum Ligni Campechiani s. Campechiensis. (Am. Du. Bor. Bor4. Ed. Ful. Han. HassP. Lon. LonN. Pol. RC. Sax. Wür. *C.*)

℞. Ligni Campechiani partem unam.
Aquae communis . partes octo.

Macera per horas viginti quatuor, coque deinde per horae quadrantem et cola fortiter exprimendo; residuum coquatur cum Aquae partibus quatuor, quo facto liquores commixti, post viginti quatuor horarum sepositionem, ad aptam consistentiam evaporent. (Sax.)

℞. Rasurae Ligni Campechiani partem unam.
Aquae fontanae . . partes octo.

Coquendo ad dimidium redacta cola exprimendo; tunc liquor ad massae pilularis consistentiam evaporet. (Am. Du. Ed. *C.*)

Lon. et LonN. Ligni libram unam, Aquae ferventis congium unum per horas 24 macerare, tum ad octarios quatuor decoquere et liquorem adhuc calentem colatum ad idoneam crassitudinem inspissare jubent; — RC. ut extractum Gentianae luteae I. p. 594.

℞. Ligni Campechiani partem unam.
Aquae bullientis . partes octo.

Coque leviter per horae quadrantem et cola cum expressione; residuum cum Aquae partibus quatuor coctum itidem coletur et exprimatur; tunc liquores commixti et post sufficientem sepositionem decanthati leni calore ad extracti consistentiam evaporent (Bor.)

Han. coquere jubet binis vel ternis vicibus sequentibus Ligni partem unam in Aquae sex et colaturas conjunctas vaporando inspissare; — Pol. coquere quater per horae quadrantem quaque vice cum Aquae partibus octo; — Bor4. ut extractum Cascarillae. I. p. 427; — HassP. ut extractum Colombo I. p. 561.

℞. Rasurae Ligni Campechiani quantum vis.

Alcoholis . . . quantum sufficit ut lignum quatuor digitorum crassitiem tegatur; stent blando calore in digestione et decanthentur; residuo cum Aqua per horam unam cocto et cum expressione colato, colatura in balneo aquae ad mellis consistentiam evaporet, addita pedetentim tinctura et inter continuam agitationem ut mas-

sa homogenea neque grumosa obtineatur. (Ful. Wür.)

Gabe, eine bis zwei Drachmen, in einem passenden Vehikel.

Potio adstringens. (*E.*)

℞. Extracti Ligni Campechiani drachmas tres.
Aquae . . . . uncias septem.
Tincturae Catechu drachmas duas.

Gabe, zwei Löffel alle drei oder vier Stunden, bei Durchfall und Ruhr.

Elixir adstringens. (Ham. *Au.*)

℞. Extracti Ligni Campechiani drachmas duas.
Aquae destillatae uncias quatuor.
Elixir acidi Halleri drachmam unam.
Misce exacte. (Ham.)

℞. Extracti Ligni Campechiani semunciam.
Vini rubri . . . . uncias duas.

Gabe, alle zwei Stunden sechszig Tropfen. (*Au.*)

Mixtura adstringens. (*Sw.*)

℞. Extracti Ligni Campechiani drachmas tres.
Aquae Cinnamomi spirituosae sesquiunciam.
Contere et adde
Aquae . . . . uncias septem.
Tincturae Kino drachmas duas.

Gabe, alle vier oder fünf Stunden zwei Löffel.

Lignum nephreticum.

GrieshoIz; Bois nephretique (*Gal.*); Palo nefritico (*His.*).

Br. Fer. Gal. His. Wir. *Be. G. M. Sp.*

Dieses Holz ist sehr schwer, geruchlos und besteht aus einem weißlichen, sehr derben Bast und einem röthlichen, sehr harten Kern; die Rinde ist leicht, innen faserig, auswendig schwammig und geborsten. Es hat einen nur wenig bemerkbaren, schwach pfefferartigen Geruch.

Einige leiten es von Guilandina Moringa, L., Andere von Mimosa Unguis cati, L., und noch Andere endlich, nach Virey, von einer Cissampelos her. Es kömmt aus Neu-Spanien.

Ehedem schrieb man ihm kräftige harntreibende Eigenschaften zu. Heutzutage ist es nur noch wenig in Gebrauch.

Lignum Rhodii.

Rosenholz, Rhodiser Holz; Bois de Rhodes, de rose, de Chypre (*Gal.*).

Ams. Be. Br. Fer. His. Sax. Suec. Wir. *Be. Br. G. M. Sp.*

Dieses Holz ist hart, schwer, gelbbraun, in der Mitte dunkler als im Umkreis und besteht aus concentrischen sehr dichten Schichten. Der Geschmack ist etwas bitter: der Geruch, besonders gerieben, stark rosenartig.

Es kommt von der Wurzel und bisweilen von dem untern Ende einer Pflanze, welche man allgemein für Convolvulus scoparius, L., hält, einen großen Strauch (Pentandria Monogynia, L.; Convolvulaceae, *J.*) der Canarischen Inseln. Manche Schriftsteller leiten es von Genista Canariensis, L., her; jedoch ist dieß weniger wahrscheinlich.

Reizend, wenig gebraucht.

Oleum Ligni Rhodii essentiale. (Br. Ful. Gal. Pal. Wir.)

℞. Rasurae Ligni Rhodii partes decem.
Salis communis . partem unam.
Aquae purae . . partes viginti.

Post horarum duodecim macerationem, fiat destillatio et oleum in fundu producti eximatur. (Gal.)

Br et Wir. Ligni partes sex, Salis unam et Aquae triginta sex; — Ful. Ligni unam, Aquae quatuor, absque sale et quatuor dies digestionis; — Pal. Ligni unam, Aquae sex et quinque vel sex dies digestionis.

Dieses Oel wird mehr als Schönheits-, denn als Arzneimittel gebraucht.

Aqua Ligni Rhodii destillata. (Gal.)

℞. Ligni Rhodii raspati partes duas.
Aquae communis partes sedecim.

Post duodecim horarum infusionem destillent partes octo.

Ligusticum.

Ligusticum Levisticum, L.; Liebstöckel, Badekraut, Badekrautliebstöckel, Bärmutterkraut; Livèche (*Gal.*); Common lavage (*Ang.*); Apich weliky, Apich libecek (*B.*); Lovstilk, Lobstik (*D.*); Ligustico (*His.*); Laveskruid (*Bel.*); Levistico (*I.*); Lakotnego ziele (*Pol.*); Levistico (*Lus.*); Libbsticke (*Suec.*).

A. Ams. B. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Fer. Gal GalM. Gen. Han. HassP. Li. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Würt. *Be. Br. G. M. Pid. Sp.* Z.

♃ (Pentandria Digynia, L.; Umbelliferae, J.) Eine Pflanze des gemäßigten Europa's. (*Blackw.* t. 275. *Hayne* VII. t. 6. Düss. off. Pfl. VI. 12. *Zorn* Ic. pl. t. 238.)

Man wendet die Wurzel und die Saamen an.

Die Wurzel (radix Levistici s. Lybi-

stici s. Ligustici s. Laserpitii Germanici) ist einen Fuß lang, fleischig, sehr ästig, außen braungelb, innen weißlich und runzelig. Sie hat einen starken, durchdringenden, wenig angenehmen Geruch und einen anfangs süßlichen, hinterher scharfen und widerlichen Geschmack.

Die Saamen sind länglich, gelb und fünfrippig.

Extractum Ligustici s. Levistici. (Bor. Bor4. O. Pol. Sax.)

℞. Radicis Levistici,
Alcoholis, singulorum libras duas.
Aquae communis libras novem.

Digere per horas duodecim, cola exprimendo, alcoholem destillatione elice et residuum ad aptam consistentiam inspissa. (Pol.)

Bor. O. et Sax. Radicis partes duas, Alcoholis tres et novem Aquae; — Bor4. ut extractum Aconiti I. p. 61.

Essentia Levistici. (Wir.)

℞. Radicis Levistici . uncias duas.
Seminum Levistici unciam unam.
Alcoholis . . . uncias decem.

Post sufficientem digestionem cola exprimendo et filtra.

Reizend, für ein Gegengift, blähung- und harntreibend gehalten. — Man hat sie bei Wassersuchten empfohlen.

Ligustrum.

Ligustrum vulgare, L.; Liguster; Troëne (*Gal.*); Liguster (*Bel. D. Suec.*); Alhena jermanica (*His.*); Ligustro (*I.*); Zoba (*Pol.*); Altena (*Lus.*).

Wir, *Sp*,

Ein Strauch (Diandria Digynia, L.; Jasmineae, *J.*) Europa's. (*Zorn* Ic. pl. t. 112.)

Man wendet die Blätter und die Blüthen an.

Die Blätter (folia Ligustri) sind lanzetförmig, ganz und ganzrandig, glatt, von bitterem und adstringirendem Geschmack.

Die weißen, angenehm riechenden Blüthen bilden kleine Trauben.

Schwach adstringirend, nicht häufig gebraucht.

Aqua Ligustri. (Pal.)

℞. Florum Ligustri partem unam.
Aquae . . . . . partes tres.

Destillet pars una cum dimidia.

Lilium.

Lilium candidum, *L.*; weiße Lilie; Lis blanc (*Gal.*); White lily (*Ang.*); Lilium bjle (*B.*); Hvide lilie (*D.*); Azucena blanca (*His.*); Witte lelie (*Bel.*); Liglio bianco (*I.*); Silia (*Pol.*); Lirio branco (*Lus.*); Hwit lilja (*Suec.*).

Ams. An. B. Bel. Br. Fer. Gal. Gen. HassP. His. Lus. Sax. Wir. *Be. Br. G. M. Sp.*

♃ (Hexandria Monogynia, L.; Liliaceae, *J.*) Eine ursprünglich in der Levante einheimische, in Gärten cultivirte Pflanze. (*Blackw.* t. 11. *Hayne* VIII. 26. *Plenck* t. 273. *Zorn* Ic. pl. t. 462.)

Man wendet die Zwiebel, die Blüthen und die Staubbeutel an.

Die Zwiebel ist rund, gelblich, außen schuppig, unten mit dicken büscheligen Fasern besetzt. Sie hat keinen Geruch, der Geschmack ist etwas scharf.

Die Blüthen bestehen aus fünf weißen, gerieften Blättern von einem angenehmen, durch Trocknen sich verlierenden Geruch.

Die Staubbeutel sind länglich und gelb.

Conserva Florum Liliorum alborum. (Gen.)

℞. Petalorum Liliorum alborum partem unam.
Sacchari albi . . . partes tres.

Contere.

Pulpa Lilii. (Gal. *T*)

℞. Bulborum Liliorum mundatorum quantum vis.

In chartam involutos coque sub cinere calido donec facile inter digitos conteri possint; partibus ustis remotis contunde reliqua in mortario marmoreo ut fiat pulpa, per cribrum aroteotextum trajicienda.

T. Bulbos pastae farinae alicujus cerealis involutos in furno coquere jubet.

Aqua Liliorum. (Gal. Gen. Pal. *T.*)

℞. Florum recentium Liliorum partem unam.
Aquae . . . . partes quatuor.

Destillet dimidia pars. (Gal. *T.*)

Pal. Florum partem unam et tres Aquae; destillet pars una cum dimidia; — Gen. Florum libras quatuor et Aquae quantum satis ad prohibendum empyreuma; destillent librae sex.

Oleum Liliorum alborum. (Ams. An. B. Bel. Br. Gal. HassP. His. Pal. Sar. Wir. *T.*)

℞. Petalorum Liliorum recentium partem unam cum dimidia.
Olei Olivarum . . partes tres.

Digere in balneo aquae per dies duos, refrigerata exprime et macerationem repete. (Sar.)

HassP. Florum libram unam, Olei sesquilibram, digere ad humidi evaporationem, oleum exprime et refrigeratum serva; — Gal. Petalorum partem

unam, Olei quatuor et tres macerationes sequentes quarum postrema per menses tres producatur.

℞. Petalorum Liliorum partem unam.
Olei Olivarum . partes quatuor.
Post aliquot horas digestionis in aquae balneo, exprime. (An. B. Bel.)

℞. Petalorum Liliorum partem unam.
Olei Olivarum . . partes tres.
Macera per dies aliquot in loco calido, tunc coquendo humidum consume et cola cum expressione. (Ams. His.)

T. Florum recentium uncias quindecim cum Olei Olivarum libris quinque solis calore per 3 vel 4 dies macerare, filtrare, exprimere, oleo filtrato, novos flores addere et ita macerationem bis repetere, supremam per mensem circiter protrahendo, filtrare tunc, exprimere et oleum post aliquot dierum sepositionem clarificatum decanthare.

℞. Petalorum Liliorum,
Olei Olivarum,
singulorum partes aequales.
Coquendo humidum consume et exprime. (Pal.)

℞. Petalorum Liliorum . partes duas.
Olei Olivarum . . partes tres.
Post octo dies digestionis coque et exprime. (Br. Wir.)

Erweichend, für schmerzstillend gehalten.

Linaria.

Zwei Pflanzen dieser Gattung kommen in den Pharmacopöen vor:

1) *Linaria spuria, Mill.*; Bastardleinkraut; Linaire bâtarde. (*Gal.*)
Gal. *Sp.*

☉ (Didynamia Angiospermia, L.; Scrofulariae, *J.*) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (*Oed.* Fl. Dan. t. 913.)

Man wendet das blühende Kraut an; es besteht aus einem ästigen Stängel mit behaarten, eirunden, ganzen Blättern und gelben Blumen mit violetter unterer Lippe, welche einzeln in den Blattachseln auf langen fadenförmigen Stielen sitzen.

2) *Linaria vulgaris, Moe.*; gemeines gelbes Flachskraut, Leinkraut, Frauenflachs; Linaire commune (*Gal.*); Common toad flax (*Ang.*); Vild torskemand (*D.*); Linaria (*His.*): Linaria, Lino selvatico, Urinaria (*I.*); Het gemeene vlachskruid (*Bel.*); Lennek panng maigi (*Pol.*); Fluysblomster (*Suec.*).

Ba. Bor. Bor4. Br. Fer. Ful. Gal. Gen. Han. HassP. His. Li. O. Sax. Wir. *Be. Br. M. Sp.*

4 Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (*Blackw.* t. 115. *Zorn* lc. pl. t. 442.)

Man wendet das blühende Kraut (herba et flores Linariae s. Antirrhini) an; es besteht aus einem einfachen glatten Stängel mit vielen lanzettförmigen, sitzenden, blaugrünen Blättern und gelben, eine dichte endständige Aehre bildenden Blüthen. Es hat einen etwas unangenehmen Geruch welchen es durch Trocknen verliert. Der Geschmack ist bitter und widerlich.

Linimentum antihaemorrhoidale, Unguentum de Linaria. (Ba. Bor. Bor4. Br. Han. HassP. Li. O. Sar. Sax. Wir. *Pie. Sp.*)

℞. Herbae recentis Linariae cum floribus . . . . libram unam.
Axungiae Porci . . libras duas.
Coque lente donec humidum evanuerit, cola et exprime. (Ba. Bor. Bor4. Han. HassP. O. Sax.)

Br. et Wir. Herbae et Axungiae partes aequales; — Li. Herbae partem unam et Adipis tres; — *Pie.* quantitates non indicat.

℞. Herbae Linariae uncias duodecim.
— Sedi minoris uncias duas.
— Hyoscyami unciam unam.
Butyri . . . uncias octodecim.
Macera per dies aliquot, coque tunc ad humidi usque consumptionem et cola exprimendo. (*Sp.*)

℞. Herbae Linariae cum floribus,
Axungiae Porci,
singularum libram unam.
Coque donec humidum evanuerit, cola cum expressione et adde
Olei Ovorum . . . semunciam.
— seminum Hyoscyami expressi drachmas duas.
Succi Sedi minoris drachmas tres.
Misce. (Sar.)

Linum.

Zwei Arten dieser Pflanzengattung werden in der Medicin angewendet:

1) *Linum usitatissimum, L.*; Lein; Lin ordinaire (*Gal.*); Flax (*Ang.*); Buzruk (*Ar.*); Len. (*B. Pol.*); Haer (*D.*); Ulsikebinge (*Duk.*); Lino (*His. I.*); Tisi, Pahaha (*Hin.*); Vlasch (*Bel.*); Bidgieramini (*Mal.*); Tokhemkutan (*Pe.*); Linhaca (*Lus.*); Uma, Atasi (*Sa.*); Lin (*Suec.*); Alleverei, Serru sanulverei (*Tam.*); Alivitulu (*Tel.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Würt. WW. *A. Be. Br. C. Fi. G. M. Par. Pid. Sp. Z.*

☉ (Pentandria Digynia, L.; Lineae, *Cand.*) Eine wahrscheinlich im Orient ursprünglich einheimische, durch einen grossen

Theil Europa's verbreitete Pflanze. (*Blackw.* t 160. *Plenck* t. 243. *Hayne* VIII. t. 17. Düss. off. Pfl. VIII. t. 6. *Bert.* Bild. II. 55. f. 1. *Zorn* Ic. pl. t. 251.)

Der Saame (semen Lini) ist braun, glänzend, eirund, länglich, spitzig, platt, ganz glatt, an den Rändern scharf. Er enthält unter einer schleimigen Schaale einen weißen, öligen Kern von unangenehmem Geschmack.

Dieser Kern enthält viel Oel, die Schaale dagegen Schleim. Die Saamen sind erweichend.

2) *Linum catharticum*, *L.*; Purgirflachs; Lin purgatif (*Gal.*); Purging flax (*Ang.*); Liven vildhaer (*D.*); Cantilagua (*His.*); Purgeervlasch (*Bel.*); Lino purgativo (*I.*); Linho purgante (*Lus.*); Villhaer (*Suec.*).

Du. Gal. Gen. Li. Lon. LonN. R. Sax. Wir. *Be. C. M. Par. Sp.*

☉ Eine Europäische Pflanze. (*Blackw.* t. 368. *Plenck* t. 244. *Hayne* VIII. t. 18. *Zorn* Ic. pl. t. 210.)

Man wendet das Kraut (herba Lini purgativi s. cathartici) an; es besteht aus einem dünnen in gabelige Zweige getheilten Stängel mit eirundlänglichen, entgegengesetzten, glatten Blättern. Es hat keinen Geruch, aber einen sehr bittern, widerlichen Geschmack.

Ein wenig gebrauchtes Purgirmittel.

Farinae emollientes. (Gal. *Sp.*)

℞. Farinae Seminis Lini,
— Foenu graeci,
singularum partes aequales.
Misce. (*Sp.*)

Gal. Farinae Lini, Frumenti et Hordei, singularum partes aequales.

Species emollientes pro cataplasmate. (BorC. WW.)

℞. Furfuris triticei,
Seminum Lini contusorum,
singulorum partes aequales.
Misce. (BorC.)

WW. Seminis Lini partem unam, Farinae Frumenti tantidem et Furfuris triticei duas.

Mucilago Seminum Lini. (Gal. Sar. *Sw.*)

℞. Seminum Lini . drachmas duas.
Aquae tepidae . . sesquiunciam.

Digere super cinere calido per horas viginti quatuor, subinde agitando et cola exprimendo. (Gal.)

Sw. Triturare jubet Aquae bullientis et seminum, singulorum partes aequales; — Sar. Macerare per horas duodecim Seminum partem unam in Aquae partibus decem, coquere deinde et exprimendo colare.

Cataplasma emolliens. (Gal. GalM. Li. RC. *ParC. Ra. Sw.*)

℞. Farinae Seminis Lini quantum vis.
Aquae bullientis vel
Decocti Althaeae quantum sufficit ut fiat cataplasma. (*Sw.*)

RC. Farinae Lini quantum vis cum Aquae fontanae vel Lactis sufficiente quantitate ad aptam crassitudinem coquere jubet.

Sw. praeterea coquere jubet per semihoram Seminum Lini quantitatem arbitrariam cum Aquae sufficiente quantitate, addendo Micae Panis duri quantum satis ut fiat cataplasma; — *Ra.* Farinae Hordei et Lini, singularum partes aequales et Aquae sufficientem quantitatem; — GalM. Farinae Hordei, Frumenti et Lini partes aequales et Aquae sufficientem quantitatem; — Gal. et *ParC.* Farinarum emollientium uncias quatuor, dilue in decocti emollientis quantitate sufficiente et coque tunc, addendo pulpae specierum emollientium uncias quatuor vel earum ipsarum specierum pulveratarum unciam unam; — Li. Seminis Lini pulverati et Lactis vaccini bullientis partes aequales commiscendas.

Infusum Lini s. Lini compositum s. Lini usitatissimi. (Am. B*. Ed. GalM. Lon. LonN. RC. Suec. *Au. C. E. Fi. ParC. Ra. Sa. Sw.*)

℞. Seminum Lini contusorum
unciam unam.
Liquiritiae contusae . semunciam.
Aquae bullientis . octarios duos.

Digere prope ignem per horas quatuor et cola. (Am. B*. Lon. LonN. Suec. *Au. C. E. Sa. Sw.*)

Fi. Aquae libras duas, caeterum ut antea; — Ed. Liquiritiae drachmas duas, Lini unciam unam et Aquae libras duas; — *Ra.* Lini drachmas duas, Liquiritiae drachmam unam et Aquae libras duas; — GalM. Lini drachmas duas cum dimidia, Liquiritiae drachmas duas et Aquae quantitatem sufficientem ut librae duae colaturae obtineantur; — *ParC.* Lini, Liquiritiae, singulorum drachmas duas et Aquae libras duas; — RC. Lini uncias duas, Liquiritiae semunciam, Aquae libras quatuor infundere per horas tres et colare; interdum additur Succus Citri vel Roob Oxycocci vel Oxymel simplex vel Saccharum purum ad gratum saporem.

℞. Seminum Lini . . sesquiunciam.
Pulveris Liquiritiae drachmas tres.
Aquae frigidae . . libras tres.

Infunde, saepius agitando, et cola. (*Sw**)

Erweichend, bei Leiden der Brust und der Harnwege nützlich. — Man kann anderthalb Unzen syrupus emulsivus oder Diacodion hinzusetzen.

Infusum Lini cathartici. (B*.)
℞. Herbae Lini cathartici
drachmas duas.
Aquae bullientis . . uncias duas.
Infunde et cola. — Schwach purgirt. — Auf einmal.

Fomentatio emolliens. (Ra.)
℞. Seminum Lini . drachmas duas.
Foliorum Malvae . uncias duas.
Aquae . . . . . libras duas.
Coque et cola.

Balneum emolliens. (Ca.)
℞. Specierum emollientium
libras quatuor.
Seminum Lini . . . semilibram.
Aquae . sufficientem quantitatem.
Coque leviter et cola.

Injectio mucilaginosa. (GalM.)
℞. Seminum Lini . . drachmas sex.
Coque leviter in
Aquae . . quantitate sufficiente ut libras duas colaturae obtineantur.

Potio leniens. (Sm.)
℞. Seminum Lini contusorum
drachmam unam.
Aquae bullientis . . uncias sex.
Infunde, cola et post refrigerationem adde
Syrupi Capitum Papaveris
drachmas quatuor.
Aquae Florum Aurantiorum
drachmas duas.

Looch leniens. (Sm.)
℞. Seminum Lini contusorum
semunciam.
Aquae libram unam (chopine).
Coque ad syrupi consistentiam et adde
Mellis rosati . . . uncias duas.

Oleum mucilaginosum s. de mucilaginibus. (Gal. Sar. Sp. T. Vm.)
℞. Seminum Foenu graeci,
— Lini,
singulorum partem unam.
Olei Olivarum . . partes octo.
Semina contusa stent per dies duos in balneo arenae; tum cola, sepone et decantha. (Vm.)
℞. Seminum Foenu graeci,
— Lini,
Radicis Althaeae,
singulorum libram unam.
Aquae fervidae . . libras decem.
Digere, subinde agitando, per horas viginti quatuor, cola fortiter exprimendo et adde
Olei Olivarum . . libras duas.
Coque donec humidum sit evaporatum et cola absque expressione. (Gal. T.)
℞. Radicis recentis Althaeae uncias duas cum dimidia.
— — Scillae semunciam.
Seminum Lini,
— Foenu graeci,
singulorum uncias duas.
Aquae . sufficientem quantitatem.
Coquendo fiat mucilago, cui adde
Olei infusi Anethi,
— — Chamomillae,
— — Liliorum,
singulorum uncias sedecim.
Coque ad humidi usque evaporationem et cola. (Sp.)
℞. Radicis Althaeae,
Bulborum Liliorum alborum,
Seminum Foenu graeci,
singulorum unciam unam.
Aquae . . . . . libras duas.
Olei Olivarum,
— Lini, singulorum libras duas.
Maceratis radice, bulbis et seminibus in Aqua ut mucilago extrahatur, olea ei admisce, coque lente ad totius usque humidi evaporationem, cola et adde
Florum Liliorum recentium,
— Chamomillae,
singulorum libram unam.
Post viginti quatuor horarum in balneo aquae digestionem cola et exprime. (Sar.)

Oleum Lini expressum. (A. Amm. Ba. Bor. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Ful. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pal. Pol. R. Sar. Sax. Sueç. Wir. Br. Pid. Sw. T.)

In universum ita paratur, ut semina contusa sacco e tela confecto inclusa inter duas laminas stanneas frigide exprimantur; — Gal. contusa mollia reddi jubet expositione per octo sexagesimas aquae bullientis vapori; — Bor. Bor4. et Li. prelum Aqua bulliente calefactum adhibent (Bor4. praeterea et oleum venale indicat); — Br. Pal. et Wir. pastam antequam exprimatur, parumper torrere jubent; — T. Semina tosta, antequam exprimatur oleum, vapori aquae bullientis exponere jubet *); — Fi. Semina contusa per cribrum trajicere, denuo contundendo in pastam redigere, quae in vasi ferreo,

*) Condensatur magis, si cum parte septima vel octava ponderis sui Lithargyrii subtiliss. pulv. ad colorem rubellum usque coquatur, tunc despumatum et sepositione clarificatum decanthatur (*oleum coctum*).

charta interne obtecto immittantur; oleum expressum per chartam filtretur.

HassP. Oleum venale recens expressum indicat.

Dieses Oel wird als ein specifisches Mittel gegen Seitenstechen, sowohl innerlich, zu einer halben bis ganzen Unze in Fleischbrühe, als äußerlich, warm mit Wolle auf die schmerzhafte Stelle aufgeschlagen, angewendet.

Clysma involvens s. oleosum s. emolliens s. commune. (Li. RC. *Au. Ra. Sp. Sw.*)

℞. Specierum emollientium
unciam unam.
Aquae . . . . . libram unam.
Coque et colaturae adde
Olei Seminum Lini . uncias duas.
Misce. (Li. *Ra. Sp.*)

℞. Lactis vaccini,
Olei Lini,
singulorum uncias quatuor.
Misce. (*Sp.*)

Sw. Olei uncias duas et octo Decocti Seminum Lini; — *Sw.* Olei uncias quatuor ad sex et Decocti Hordei tantidem; — RC. Infusi Seminum Lini sine Glycyrrhiza libram unam, Olei unciam unam. Loco Infusi Lini recipi potest etiam Natri muriatici vel sulphurici semuncia vel Saponis sebacei drachmae duae, vel Decocti Hordei vel Avenae vel Radicis Althaeae vel Infusi Florum Chamomillae vel Aquae tepidae libra una.

℞. Herbae Malvae . drachmas duas.
Aquae . . . . quantum sufficit ut unciae decem colaturae obtineantur; adde
Olei Lini . . . unciam unam.
Misce. (*Au.*)

Liquiritia.

Man wendet unter diesem Namen die Wurzeln zweier zu einer Gattung gehörenden Pflanzenarten an:

1) *Glycyrrhiza glabra, L.*; Süßholz, Lakrizenholz; Réglisse commune (*Gal.*); Liquorice (*Ang.*); Ussulsus (*Ar.*); Lekorice, Sladky koren, Sladky drewo (*B.*); Wellmie, Olinde (*Cy.*); Lakrits (*D. Suec.*); Mittie luckerie (*Duk.*); Rogaliza (*His.*); Jetimadh (*Hin.*); Zoethout (*Bel*); Legorizia, Ligorizia (*I.*); Oyot manis (*Ja.*); Urat manis (*Mal.*); Bikhmekeh (*Pe.*); Korzen lakrecyawy czyli slodni (*Pol.*); Alcacaz (*Lus.*); Dubez solotko (*R.*); Madhuko, Yastimadhuka (*Sa.*); Addimodrum (*Tam.*).

A. Am. Ams. An. B. Bà. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *A. Be. Br. C. Fi. G. M. Par. Pid. Sp. Sy.* Z.

4 (Diadelphia Decandria, L.; Leguminosae, *J.*) Eine Pflanze, welche in den warmen und gemäßigten Gegenden Europa's wächst. (*Hayne* VI. 41. 42. *Bert.* Bild. IV. 37. f. 1. Fl. méd. VI. 293.)

Die Wurzel (radix Liquiritiae s. Glycyrrhizae) ist sehr lang, walzig, ästig, holzig, fingersdick, außen braungelbaschgrau, innen gelblich und geruchlos. Sie hat einen zuckerartigen, etwas schleimigen Geschmack, welcher, wenn man sie lange Zeit kaut, bitter und etwas widerlich wird.

Sie enthält, nach Robiquet, Satzmehl, Eiweiß, ein scharfes, flüchtiges Oel, einen eigenthümlichen zuckerartigen Stoff, Glycyrrhizin (Glycyrrhizinum), Glyrrhizine oder Succo-gommite (*Gal.*) genannt, und einen andern crystallisirbaren Stoff, ebenfalls besonderer Art, welchen man Agedoides (Agédoide *Gal.*) nennt.

2) *Glycyrrhiza echinata, L.*; Igelschotensüßholz; Réglisse épineuse (*Gal.*).

Bor. Bor4. D. Fenn. Han. Hass. O. R. *M.*

4 Eine Pflanze Asien's und des südlichen Europa's. (*Jacq.* Hort. Vindob. I. p. 41. t. 95.)

Die Wurzel hat viel Aehnlichkeit mit der vorigen, ist aber dicker.

Species bechicae. (B.)

℞. Radicis Cheiri montani
uncias duas.
— Liquiritiae sesquiunciam.
Herbae Veronicae,
— Hederae terrestris, singularum manipulum unum.
— Hyperici . pugillos tres.
— Centaurii minoris
pugillos duos.
Seminum Foeniculi drachmas tres.
Concisa et contusa misce.

Species pro decocto s. pro potu infantum s. pectorales. (Pal. Wir. *Sp.*)

℞. Rasurae Cornu Cervi
uncias sedecim.
— Eboris . uncias quatuor.
Radicis Liquiritiae
uncias duodecim.
— Polypodii uncias quatuor.
Florum Tiliae . . uncias duas.
Caricarum,
Siliquae dulcis,
singularum uncias octo.
Seminum Anisi,
— Foeniculi,
singulorum uncias quatuor.

Concisa misce. (*Sp.*)

℞. Rasurae Cornu Cervi libras duas.
— Eboris . libram unam.
Radicis Liquiritiae libras quatuor.
— Polypodii . libras duas.
Caricarum pinguium libras quinque.
Dactylorum,
Jujubarum, singulorum libras duas cum dimidia.
Seminum Coriandri,
— Foeniculi,
singulorum sesquilibram.
Florum Boraginis,
— Buglossi,
— Violarum,
singulorum uncias duas.
Concisa misce. (Pal.)

Wir. Cornu Cervi libras duas, Eboris semilibram, Liquiritiae et Polypodii, singulorum tantidem, Caricarum, Siliquae dulcis, singularum libram unam, Foeniculi, Anisi, singulorum semilibram, Florum Tiliae uncias quatuor et Cornu Cervi usti libram unam.

Succus Liquiritiae crudus s. Extractum Liquiritiae crudum, Jus Liquiritiae. (Ams. An. B. Bor. Bor4. Br. Ed. Ful. GalM. Han. HassP. O. Pol. Sax. Suec. *G. M.*)

Dieſer Saft kommt im Handel in faſt walzenförmigen, etwa 6 Zoll langen, höchſtens einen Zoll dicken Stücken in Lorbeerblätter eingewickelt, vor; er hat einen ſüßen und zugleich etwas bittern Geſchmack.

Es iſt ein Extract, welches man erhält, indem man die Abkochung der Süßholzwurzel bis zur Trockenheit abdampft. Immer iſt er mehr oder weniger verbrannt und enthält oft etwas Kupfer. Man bezieht ihn aus Sicilien und beſonders aus Spanien.

Succus Liquiritiae depuratus. (B. Ba. Bel. Bor. Bor4. D. Han. Hass. HassP. Sax. *Vm.*)

℞. Succi Liquiritiae . quantum vis.

Solve in Aqua calida, trajice per pannum et ad massae solidae consistentiam consume, quae supra laminam marmoream oleo obductam circumvoluta, in cylindros parvos formata, et prope ignem siccata in bacillos duorum ad trium pollicum longitudine concidatur. (*Vm.*)

Bor. Bor4. et HassP. Succus in frustula discissus in Aqua communi solvatur, solutum per pannum laneum colatum primo leni igne, tandem in balneo vaporis ad extracti densitatem inspissetur; residuum loco calido siccatum in pulverem redige; — Ba. Macerare jubet Succi partem unam in Aquae duodecim per horas viginti quatuor, colare cum expressione et colaturam vaporando ad siccum consumere.

Succus Liquiritiae cum Gummi s. gummosus. (*Vm.*)

℞. Gummi Arabici,
Succi Liquiritiae,
singulorum partes aequales.

Dissolve quodque separatim in Aqua et solutiones per pannum trajectas atque commixtas vaporando atque semper agitando, ad massae solidae consistentiam redige.

Succus Liquiritiae anisatus. (*Vm.*)

℞. Succi Liquiritiae depurati et refrigescentis
uncias quadraginta octo.
Olei Anisi . . . drachmas tres.

Commisce intime, et in baculos teretes supra laminam marmoream oleo obductam forma, quos siccatos in parva frusta concide.

Extractum Succi Liquiritiae. (*Vm.*)

℞. Succi Liquiritiae in frusta minora concisi . . . . quantum vis.
Aquae frigidae . pondus duplum.

Macera per tres dies in vase amplo ac parum profundo, decantha absque agitatione, filtra et ad extracti consistentiam inspissa.

Extractum Glycyrrhizae. (A. An. Bel. Br. D. Du. Fer. Ful. Gal. HassP. His. Li. Lon. LonN. Pol. R. RC. Sar. Wür. *C. Pid. T. Vm.*)

℞. Radicis Liquiritiae . libram unam.
Aquae bullientis . libras sedecim.

Infunde per horas duodecim, cola, decantha et vaporando, sub finem in aquae balneo, ad extracti consistentiam inspissa. (His.)

An. et Bel. infundere jubent pro duabus vicibus Liquiritiae radicis libram unam in Aquae libris octo singula vice et colaturas conjunctas evaporando inspissare; — Fer. infundere per dies duos Liquiritiae uncias duas in Aquae libris decem et colaturam vaporando inspissare.

HassP. ut extractum Cardui benedicti I. p. 418; — RC. ut extractum Gentianae luteae I. p. 694; — *T.* ut extractum Columbo I. p. 561 ubi pro coque macera est legendum.

℞. Radicis Glycyrrhizae quantum vis.

Contunde, Aquae pauxillum addendo, in mortario; succum expressum et sepositione depuratum in balneo Aquae ad extracti consistentiam consume. (Ful. His.).

℞. Radicis Liquiritiae libram unam.
Aquae fontanae . . libras sex.

Macera in loco calido per dies quatuor et coque parumper; cola exprimendo et colaturam ad aptam consistentiam inspissa. (Br.)

Sar. infusionem pro tertia parte consumere, colare et evaporare; — Lon. LonN. et *C.* Liquiritiae libram unam in Aquae octariis octo macerare per horas viginti quatuor et coquere ad quatuor remanentiam, tunc ad idoneam crassitudinem inspissare; — Li. Radicis libras tres infundere in Aquae bullientis novem per horas duodecim, coquere deinde parumper et colaturam per horas sex sepositam inspissare.

℞. Radicis Liquiritiae partem unam.
Aquae . . . . . partes octo.

Coquendo dimidium consume, cola exprimendo et colaturam blando igne ad massae pilularis consistentiam redige. (Du.)

R. Coquere jubet Radicis siccatae partem unam in Aquae sex vel unam Radicis recentis in Aquae duabus vel tribus, colare exprimendo et liquorem probe inspissare; — D. Coquere Radicis partem unam in octo Aquae, colare cum expressione et colaturam ad massae pilularis consistentiam consumere; — Wür. Coquere Radicem in Aquae sufficiente quantitate per horam unam et decoctum decanthatum ad mellis spissi consistentiam redigere; — *Pid.* Coquere Radicis libram unam in Aquae sex et colaturam sepositione depuratam in balneo aquae evaporare.

℞. Radicis Liquiritiae libram unam.
Aquae frigidae . libras decem.

Macera per dies duos, subinde agitando, cola, sepone et decantha liquorem, qui tunc ad extracti consistentiam evaporet. (A. Pol.)

℞. Radicis Liquiritiae grossiuscule pulveratae . . . . quantum vis.

Prelo de Réal immissam et Aqua frigida humectatam, post horas duodecim macerationis aquae pressioni subjice ut tinctura exprimatur, quae leni calore ad extracti consistentiam redigatur. (*Vm.*)

℞. Radicis Liquiritiae libram unam.
Aquae frigidae . libras quatuor.

Macera per horas viginti quatuor, subinde agitando et cola; residuum itidem cum nova Aqua maceratum colletur; liquores mixti ad extracti consistentiam evaporent. (Gal.)

Pasta s. Gelatina s. Mucilago Liquiritiae s. Glycyrrhizae, Saccharum glycyrrhizatum, Glycyrrhiza lucida, Gluten pectorale. (A. B*. Bor. Bor4. Br. D. Gal. Han. HassP. Li. O. Pal. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. *Fi. Sp. Vm.*)

℞. Radicis Liquiritiae rasae s. concisae uncias quatuor.
Aquae bullientis . . libras octo.

Macera per horas duodecim, cola et in colatura dissolve
Gummi Arabici
libras duas cum dimidia.
Sacchari albi . . sesquilibram.

Colata iterum lente consume, donec guttula, supra laminam vitream frigidam abjecta in gelatinam concrescat; tunc pelliculâ sublata in cistulas e laminis ferreis, stanno obductis paratas et oleo inunctas effunde, leni calore sicca et in taleolas concide. (B*. Bor. Han. HassP. O. Pol.)

Bor4. Radicis uncias duas, caeterum ut antea; — Li. Radicis uncias duas, Aquae libras quatuor cum dimidia, Gummi et Sacchari, singulorum libras duas; — R. Radicis uncias octo, Aquae libras quatuor, Gummi et Sacchari, singulorum libras duas cum dimidia; — Sax. Radicis partem unam, Aquae viginti duas, Gummi novem et sex Sacchari; — Fenn. Radicis libram unam, Aquae quantitatem sufficientem, Gummi libras tres et Sacchari libras duas cum dimidia; — D. Radicis unciam unam, Aquae libras quinque, Gummi libras quatuor et Sacchari libras duas; — Wür. Liquiritiae unciam unam, Aquae libras quatuor, Gummi et Sacchari, singulorum uncias sedecim; — *Sp.* Liquiritiae unciam unam, Aquae centum viginti, Gummi sexaginta et Sacchari quadraginta.

℞. Radicis Liquiritiae uncias quatuor.
Aquae . . uncias triginta duas.

Decoque ad unciarum viginti quatuor remanentiam et in colatura dissolve
Gummi Arabici . . libras duas.
Sacchari albi . . sesquilibram.

Coque leviter ad consistentiam requisitam. (Br.)

Suec. Radicis uncias novem, Aquae uncias sedecim ad decem redigendas, Gummi et Sacchari, singulorum libras tres.

℞. Radicis Liquiritiae semunciam.
Aquae bullientis . . libras tres.

Post horarum duodecim infusionem in colatura dissolve
Gummi Arabici . libram unam.
Sacchari albi . . libras quatuor.

Cola, vaporando dimidium consume, despuma et adde
Aquae Florum Aurantiorum
semunciam.

In modulos effunde. (A.)

Fl. Eadem ingredientium quantitates sed gummi et saccharo in infusione dissolutis, despumare, colare, decoquere ad librarum sex materiae remanentiam et ab igne remoto aquam florum aurantiorum addere jubet.

℞. Radicis Liquiritiae partem unam.
Aquae . partes septuaginta sex.

Infunde radicem frigidè parte quarta, tunc calide reliqua aqua; post refrigerationem cola et in colatura solve

Gummi Arabici
partes quadraginta octo.
Sacchari crystallisati
partes viginti quatuor.

Albumine clarificata probe inspissa et in modulos effunde. (*Vm.*)

℞. Radicis Liquiritiae uncias quatuor.
Aquae . . . . libras quinque.

Post horas duodecim infusionis in colatura solve

Gummi Arabici loti,
Sacchari albi,
singulorum libras duas.

Per linteum arcte textum trajecta ad extracti consistentiam consume, subige tunc fortiter, pededentim pro libris quinque massae, addendo

Albuminum Ovorum . . no. 12.
Aquae Florum Aurantiorum
uncias quatuor.

Inspissa lente et in tabulam marmoream Amylo conspersam extende. (Gal.)

Pal. et Wir. Radicis uncias quatuor, Aquae libras octo coquendo ad quatuor redigendas, Gummi libras duas cum dimidia, Sacchari tantidem et Albumina cum Aquae Florum Aurantiorum subacta no. 6.

Pasta Liquiritiae fusca s. anisata, Succus Liquiritiae de Blois. (Gal. *Sp. T.*)

℞. Extracti Liquiritiae,
Sacchari albi,
singulorum libram unam.
Gummi Senegalensis libras duas.
Radicis Iridis Florentinae
drachmam unam.
Olei essentialis Anisi
grana viginti quatuor.

Dissolve gummi in Aquae sufficiente quantitate, solutionem cola et ei extractum adde, consume lente ad mellis consistentiam, adde pulverem iridis et continua evaporationem ad extracti consistentiam, oleum supremum addendo. (Gal.)

Extracti, Sacchari et Gummi Arabici ut antea; Iridis Florentinae scrupulos duos et grana sex, Essentiae Anisi guttas octodecim.

℞. Gummi Arabici
uncias triginta duas,
Aquae fontanae
sufficientem quantitatem.

Solutionem cola et in colatura solve

Succi Liquiritiae uncias novem.
Sacchari albi . uncias sedecim.

Evaporent lente ad syrupi spissi consistentiam; adde deinde

Pulveris Radicis Iridis Florentinae,
— — Inulae,
singulorum semunciam.

Vaporando continua, donec massa non ultra digitis adhaereat et adde

Olei essentialis Anisi
scrupulos duos.

Effunde in tabulam marmoream oleo obductam. (*Sp.*)

Pasta Liquiritiae opiacea s. cum Opio. (GalH.)

℞. Gummi Senegalensis,
Sacchari albi,
singulorum partes quingentas.
Aquae Florum Aurantiorum
partes triginta.
Extracti Liquiritiae frigide parati
partes sexaginta.
— Opii aquosi . partes duas.

Solutioni inspissatae gummi et saccharo infunde extracta antea in aquae parva quantitate dissoluta.

Tabellae Liquiritiae. (*Vm.*)

℞. Extracti Liquiritiae partem unam.
Sacchari super igne liquati
partes sedecim.

Extracto pulverato cum saccharo commixto fiant tabellae Amylo conspergendae.

Trochisci bechici s. bechici albi s. Glycyrrhizae s. e Glycyrrhiza, Confectio de rebecha. (Bor4. Ful. Li. Suec. *Au. Sp.*)

℞. Gummi Mimosae pulv. uncias duas.
Radicis Iridis Florentinae,
— Glycyrrhizae echinatae,
Seminis Foeniculi,
— Anisi, singulorum pulv. uncias quatuor.
Succi Glycyrrhizae depurati
libram unam.
Sacchari albi . . libras novem.
Gummi Tragacanthae cum Aquae s. q. in mucilaginem redacti
quantum requiritur

ut fiat l. a. massa, in trochiscos formanda. (Bor4.)

℞. Pulveris Radicis Liquiritiae
unciam unam.
— — Iridis Florentinae
semunciam.
— Sacchari crystallisati flavi
libram unam.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae
quantum sufficit

ut fiant trochisci. (Li.)

℞. Pulveris Radicis Liquiritiae drachmas tres.
— — Iridis Florentinae drachmas sex.
— Amyli . . . semunciam.
— Sacchari albi uncias octo.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae quantum sufficit.

Fiant trochisci. (Suec.)

Ful. Liquiritiae uncias octo, Iridis quatuor, Amyli unam cum dimidiâ, Sacchari sex et Mucilaginem Gummi Tragacanthae.

℞. Pulveris Radicis Liquiritiae sesquiunciam.
— — Iridis Florentinae,
— Gummi Arabici, singulorum semunciam.
— Sacchari albi uncias quadraginta octo.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae sufficientem quantitatem.

Fiant trochisci. (*Sp.*)

Baculi Liquiritiae albi. (Wir. *Sp.*)

℞. Gummi Arabici,
Specierum Diaereos simplicium,
— Diatragacanthae, singulorum semunciam.
Radicis Liquiritiae,
Amyli, singulorum unciam unam.
Sacchari albi . . . libras duas.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae quantum sufficit.

Fiant baculi.

Trochisci bechici citrini, Liquiritia cocta citrina, Tabellae Glycyrrhizae glabrae compositae. (An. Pal. Suec. Wir. *Sp.*)

℞. Radicis Liquiritiae,
— Iridis Florentinae, singularum unciam unam.
Croci . . . . scrupulos duos.
Sacchari albi . . libram unam.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae quantum sufficit.

Fiant trochisci. (Pal. Wir. *Sp.*)

℞. Pulveris Radicis Liquiritiae uncias octo.
— Gummi Tragacanthae compositi,
— Iridis Florentinae compositi, singulorum sesquiunciam.
— Croci . . scrupulos octo.
— Sacchari . . . libras sex.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae quantum sufficit.

Fiant trochisci. (*Sp.*)

Suec. Liquiritiae drachmas tres, Iridis drachmas sex, Amyli semunciam, Croci scrupulos duos, Sacchari uncias octo et Mucilaginem Gummi Tragacanthae.

Bacilli Liquiritiae citrini. (Q Sax. Wir. *Pid.*)

℞. Sacchari albi partes duodecim.
Radicis Liquiritiae partem unam.
— Iridis Florentinae partem quartam.
Croci . . . . partem octavam.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae quantum sufficit.

Fiat massa mollis in baculos dividenda, qui super cribro siccentur. (Q. Sax.)

℞. Sacchari albi . . libram unam.
Radicis Liquiritiae unciam unam.
— Iridis Florentinae,
Amyli, . singulorum semunciam.
Croci . . . . . semiscrupulum.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae quantum sufficit.

Fiant bacilli. (Wir. *Pid.*)

Trochisci bechici nigri s. Liquiritiae s. Glycyrrhizae s. Liquiritiae cum Gummi, Tabellae Anisi compositae. (Ams. An. B. Bel. Br. Fer. Ful. Han. Li. Lus. O. Pal. Wir. Wür. *Au. Br. C. Fi. Pid. Sp. Sw. Vm.*)

℞. Succi Liquiritiae,
Gummi Arabici, singulorum partes aequales.

Dissolve succum et gummi quodque separatim in Aqua, liquores commisce et vaporando ita consume ut fiant trochisci. (Fer.)

℞. Extracti Liquiritiae,
Gummi Arabici, singulorum partem unam.
Sacchari . . . . partes duas.
Aquae . . . quantum sufficit.

Solutionem probe inspissa ut fiant trochisci. (*C.*)

℞. Pulveris Succi Liquiritiae partem unam.
— Sacchari crystallisati (Candis) albi . . partes sedecim.
Mannae . . . partes quatuor.

Contritis adde
Mucilaginis Gummi Tragacanthae quantum sufficit ut fiant trochisci. (*Vm.*)

℞. Pulveris Extracti Liquiritiae uncias octo.
— Sacchari . libram unam.
— Gummi Arabici uncias tres.
Aquae Florum Aurantiorum quantum sufficit.

Fiant trochisci. (*Br.*)

Fi. Aquam aromaticam Citri adhibet.

℞. Pulveris Succi Liquiritiae,
— Gummi Arabici, singulorum partes tres.

Aquae fontanae quantum sufficit.
Solutioni adde
Sacchari pulverati . partes sex.
Evaporent lente ad aptam consistentiam. (Ams. B. Bel. Ful. Li. Lus. Wür. Sw.)

℞. Pulveris Radicis Iridis Florentinae,
— — Liquiritiae,
— Anisi,
— Foeniculi,
singulorum unciam unam.
Succi Liquiritiae in Aqua Hyssopi dissoluti . . uncias quatuor.
Sacchari albi . uncias sedecim.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae quantum sufficit.
Fiant trochisci. (Br. Han. Wir.)

Pal. saccharum omittit; — Lus. foeniculum omittit, reliquis formulae immutatis; — O. et Sax. Saccharum in Aqua Foeniculi dissolvi jubent.

℞. Pulveris Radicis Glycyrrhizae,
— — Iridis Florentinae,
singulorum uncias tres.
— Anisi,
— Foeniculi,
singulorum semilibram.
Extracti Glycyrrhizae
libras duas et uncias octo.
Sacchari albi . libras duodecim.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae quantum sufficit.
Fiant tabellae. (An.)

℞. Amygdalarum dulcium excorticatarum . . . . uncias duas.
Contusis, pastae adde
Pulveris Succi Liquiritiae uncias quatuor.
— Foeniculi . . semunciam.
— Sacchari . . uncias octo.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae quantum sufficit.
Fiant trochisci. (*Au. Pid.*)

℞. Storacis Calamita . partes sex.
Sacchari albi partes centum quadraginta quatuor.
Contritis adde
Amygdalarum dulcium excorticatarum,
Radicis Iridis Florentinae, singularum partes duas.
Gummi Tragacanthae partem unam.
Extracti Liquiritiae liquidi quantum sufficit.
Fiant trochisci. (*Vm.*)

Vm. praeterea Trochiscorum albo rum partes triginta sex et unam Storacis Calamita ut fiat cum dissolutionis aquosae Extracti Liquiritiae massa.

℞. Radicis Iridis Florentinae uncias tres.
— Liquiritiae,
Anisi,
Foeniculi,
singulorum uncias quinque.
Succi Liquiritiae uncias novem.
Storacis Calamita unciam unam.
Sacchari albi uncias nonaginta sex.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae quantum sufficit.
Fiant trochisci. (*Sp.*)

Trochisci Glycyrrhizae cum Opio s. thebaici, Trochisci sedativo-balsamici s. pectorales regis Danorum. (Ed. Lus. Suec. *Br. E. Sp. Vm.*)

℞. Succi Liquiritiae,
Sacchari albi,
singulorum unciam unam.
Extracti Opii . grana quatuor.
Fiant trochisci. (*Sp.*)

℞. Radicis Liquiritiae,
— Althaeae,
singularum drachmas novem.
— Iridis Florentinae,
Gummi Tragacanthae,
singulorum drachmas sex.
Opii . . . . scrupulum unum.
Sacchari . . . uncias sedecim.
Aquae . . . quantum sufficit.
Fiant trochisci. (*Vm.*)

℞. Succi Liquiritiae,
Gummi Arabici,
singulorum uncias quinque.
Opii . . . . . drachmas duas.
Tincturae Balsami Tolutani semunciam.
Syrupi Sacchari . uncias octo.
Opio cum tinctura contritis adde sensim syrupum et saccharum caloris ope mollefactum, deinde gummi et trochiscos septingentos viginti forma. (Ed. Lus. Suec. *Br. Sw.*)

℞. Gummi Arabici,
Extracti Liquiritiae,
Sacchari albi,
singulorum drachmas duas.
Opii . . . . . grana sex.
Olei Anisi . . guttas quatuor.
Aquae . quantum sufficit.
Fiant trochisci quadraginta. (*E.*)

Die letztern Trochisken sind bei den Engländern unter dem Namen Cough lozanges of Wistar berühmt.

Looch sanum et expertum. (Pal. Wir. *Pid. Sp.*)

℞. Aquae destillatae Looch sani et experti . . . unciam unam.
Nucleorum Pineae mundatorum,
Amygdalarum excorticatarum,
Seminum Papaveris albi,
singulorum semunciam.
Fiat emulsio, cujus colaturae adde
Sacchari albi . . uncias viginti.

Pulveris Liquiritiae,
— Gummi Tragacanthae,
— — Arabici,
— Amyli,
singulorum drachmas tres.
— Iridis Florentinae
drachmas duas.
Misce diu et celeriter agitando. (Wir.)

℞. Radicis Liquiritiae,
Herbae Hyssopi,
— Capilli Veneris Monspeliaci,
— Calaminthae montanae,
singularum semunciam.
Anisi,
Foeniculi,
singulorum drachmas duas.
Aquae fontanae,
uncias viginti quatuor.
Coctis parumper, cum decocto et
Amygdalarum excorticatarum,
Nucleorum Pineae mundatorum,
Seminum Papaveris albi,
singulorum uncia una
emulsionem para, cujus colaturae adde
Pulveris Liquiritiae,
— Gummi Tragacanthae,
— — Arabici,
— Amyli,
— Iridis Florentinae,
singulorum drachmas sex.
Sacchari albi uncias quadraginta.
Aquae Cinnamomi . uncias duas.
Misce. (*Sp.*)

℞. Cinnamomi,
Hyssopi,
Calaminthae,
Iridis Florentinae,
Anisi,
Foeniculi, singulorum semunciam.
Capilli Veneris Monspeliaci
manipulum unum.
Aquae fontanae . . libras duas.
Macera per horas viginti quatuor, destillet deinde liquidi libra una, cum qua et
Nucleorum Pineae mundatorum
drachmis quinque,
Amygdalarum dulcium excorticatarum . . . drachmis tribus
emulsionem para, cujus colaturae adde
Sacchari albi . . . libras duas.
Pulveris Liquiritiae,
— Gummi Tragacanthae,
— — Arabici,
— Amyli,
singulorum drachmas tres.
— Iridis . drachmas duas.
Misce (Pal.)

℞. Pulveris Radicis Liquiritiae,
— — Althaeae,
singulorum unciam unam.
— — — Iridis Florentinae
drachmas sex.
Pulveris Gummi Tragacanthae
unciam unam.
Fiat pulvis, cujus scrupulos quatuor extempore cum Syrupi emulsivi unciis duabus commisce. (*Pid.*)
Gabe, zwei Drachmen bis eine halbe Unze.

Looch pulmonale s. de pulmone Vulpis. (Li. Wir. *Sp.*)

℞. Pulmonis Vulpis pulverati,
Pulveris Succi Liquiritiae,
— Herbae Capilli Veneris Monspeliaci,
— Anisi,
— Foeniculi,
singulorum unciam unam.
ac chari clarificati
uncias quindecim.
Misce. (Wir. *Sp.*)

℞. Extracti Liquiritiae semunciam.
Aquae Foeniculi . uncias duas.
Solutioni adde
Pulveris Hederae terrestris,
— Anisi,
— Foeniculi,
singulorum drachmas duas.
Syrupi Sacchari . . uncias sex.
Misce. (Li.)
Dieses Looch, welches in Betreff der Wirkung mit dem vorigen viel Aehnlichkeit hat, wurde von Mesue eingeführt; es war bei Husten und Lungenschwindsucht sehr berühmt. — Gabe, zwei bis drei Drachmen.

Elixir pectorale simplex. (Br. Ham.)

℞. Succi Liquiritiae drachmas tres.
Aquae Foeniculi uncias quatuor.
Dissolve. (Ham.)
Br. Aquae Foeniculi libram unam et Succi Liquiritiae uncias sex.

Infusum Radicis Glycyrrhizae s. Liquiritiae. (BorC. WW. *Au.*)

℞. Radicis Liquiritiae concisae
unciam unam.
Aquae bullientis
uncias novem ad decem.
Digesta vase tecto per semihoram, cola.
T. Liquiritiae sesquiunciam, Aquae bullientis libram unam; stent per horas duas in infusione, tunc colentur.

Mel glycyrrhizatum s. Liquiritiae. (GalF. Ham. Pal.)

℞. Radicis Liquiritiae uncias octo.
Aquae bullientis . . libras tres.
Macera per horam unam, cola exprimendo, vaporando ad uncias quatuordecim inspissa et adde
Mellis albi . . . libras quinque.
Coque leni igne ad syrupi consistentiam. (GalF. Pol.)

Ham. infundere jubet per semihoram Liquiritiae sesquiunciam in Aquae fervidae sufficiente quantitate, ut unciae decem colaturae obtineantur, huic addere Mellis despumati duplum et coctione ad syrupi consistentiam redigere.

Syrupus Glycyrrhizae s. Liquiritiae. (Bor. Br. Han. Wir *Sp. Sw*. Vm.*)

℞. Radicis Liquiritiae rasae et contusae . . . . partem unam.
Aquae . . . . . partes tres.

Infunde in aquae balneo tepido per horam unam, tunc in colatura frigida dissolve

Mellis albi . . . . partes duas

et in calida

Sacchari albi . . . partes duas.

Serva. (*Vm*)

Sw.* eandem formulam, sed colaturam cum Melle et Saccharo ad syrupi consistentiam coquere jubet.

℞. Radicis Liquiritiae concisae unicias octo.
Aquae bullientis . . libras tres.

Macera, tunc coque leviter per horae quadrantem; cola et evaporatis ad unciarum quatuordecim liquidi remanentiam, adde

Sacchari albissimi,
Mellis despumati,
singulorum libras duas.

Ebulliant. (Bor. Bor4. Han. HassP.)

℞. Radicis Liquiritiae uncias duas.
Capilli Veneris Monspeliaci unciam unam.
Hyssopi . . . . . semunciam.
Aquae . . . . . libras duas.

Infunde per horas viginti quatuor, tunc ebullitione ad dimidium redactis, colaturae adde

Mellis despumati . uncias octo.
Sacchari albi . uncias sedecim.
Aquae Rosarum uncias quatuor.

Fiat syrupus. (Br. Wir. *Sp.*)

Decoctum pectorale. (*Sw.*)

℞. Radicis Liquiritiae,
Herbae Farfarae,
— Hederae terrestris,
singularum uncias duas.
Radicis Inulae . unciam unam.
Aquae . . . . . libras novem.

Decoque ad colaturae unius libras remanentiam. — Gabe, drei oder vier Unzen, mehrmals täglich. — Man versüßt dieſe Miſtane mit Zucker, oder beſſer, mit Honig

Essentia Liquiritiae. (Br.)

℞. Radicis Liquiritiae concisae unciam unam.
Aquae Vitae . . . uncias tres.

Post sufficientem extractionem cola et exprime.

Elixir pectorale regis Daniae s. Danorum s. Ringelmanni s. ex Succo Liquiritiae s. pectorale dulce s. Glycyrrhizae s. e Succo Liquiritiae. (Bor. BorC, Bor4. D. DD. Ful. Han. Li. O. Pol. Sax. Wir. *Sp. Vm.*)

1) Ohne Opium.

℞. Succi Liquiritiae partem unam.
Aquae Foeniculi . partes duas.
Alcoholis ammoniacalis partes sex.

Digere blando calore, per horas tres et cola. (DD.)

Li. Succi partem unam, Aquae Foeniculi quatuor et duas Alcoholis ammoniacalis; — Sax. Succi duas, Aquae Foeniculi sex et duas Alcoholis ammoniacalis; — Ful. Succi duas, Aquae Foeniculi sex et tres Alcoholis ammoniacalis; — Bor4. Han. HassP. Succi duas, Aquae Foeniculi sex et Alcoholis ammoniacalis anisati duas; — *Sp.* Succi unam, Aquae Foeniculi duas et sex Alcoholis ammoniacalis anisati; — *Vm.* Succi duas, Aquae Foeniculi octo et duas Alcoholis ammoniacalis anisati.

℞. Succi Liquiritiae . . partes sex.
Aquae Foeniculi partes duodecim.
Seminum viridium Anisi partem unam.
Alcoholis ammoniacalis partes triginta sex.

Stent in digestione per horas viginti quatuor et colentur. (D.)

Vm. digerere jubet Anisi partem unam in Alcoholis ammoniacalis sex, addere deinde Aquae Foeniculi partes duodecim, Succi Liquiritiae sex et post aliquot dies filtrare.

℞. Succi Liquiritiae depurati unciam unam.
Aquae Foeniculi . uncias octo.
Liquoris Ammonii subcarbonici semidrachmam.

Misce. (BorC.)

℞. Radicis Angelicae . uncias tres.
— Levistici . semunciam.
Florum Chamomillae Romanae sesquiunciam.
Anisi . . . . . uncias octo.
Foeniculi . . . uncias quinque.
Macidis . . . . drachmas tres.
Nucis moschatae,
Myrrhae,
singularum unciam unam.
Kali subcarbonici uncias octodecim.
Alcoholis . . . libras quatuor.
Aquae fontanae . . libras duas.

Stent in digestione per tres dies, tunc adde

Coque per horae quadrantem et cola exprimendo; residuum coquatur cum Aquae partibus quatuor et itidem colatur; liquores commixti et post sufficientem sepositionem decanthati leni igne ad extracti consistentiam evaporent. (Han.)

Suec. Coquere jubet parumper Lupulum cum Aquae duplo, exprimere, et residuo cum nova Aqua cocto, liquores commixtos in aquae balneo inspissare; — Li. Macerare per horas duodecim Lupuli libras tres in Aquae bullientis novem, coquere deinde, exprimere et vaporando consumere.

℞. Lupuli . . . . . libras duas.
Aquae communis libras decem.

Coque per horae quadrantem, cola exprimendo, sepone et liquorem decanthatum ad consistentiam requisitam consume. (An.)

Lon. LonN. et *C.* coquere jubent Lupuli uncias quatuor in Aquae octariis octo ad quatuor redigendis et colaturam ad idoneam crassitudinem evaporare.

Gabe, eine halbe bis eine Drachme.

Extractum Lupuli alcoholicum. (A.)

℞. Lupuli . . . . partes duas.
Alcoholis (0,910) . . partes tres.
Aquae communis partes novem.

Digere in aquae balneo, cola exprimendo, alcoholem destillatione extrahe et quod restat, in balneo aquae ad extracti consistentiam consume.

Die Gabe iſt wie bei'm vorigen.

Tinctura Humuli s. Lupuli s. Humuli Lupuli s. Lupuli strobilorum. (Am. An. B*. Ed. Han. Lon. LonN. RC. Suec. *C. Sw. Vm.*)

℞. Lupuli . . . . uncias quinque.
Alcoholis (0,935)
libras duas cum dimidia.

Digere per dies octo et filtra. (Ed. Suec.)

Lon. LonN. Lupuli uncias quinque et Alcoholis (0,930) octarios duos; — B. et *Sw.* Lupuli semunciam et Aquae Vitae semilibram; — An. Lupuli partem unam et Alcoholis (20°) octo; — Han. RC. Lupuli partem unam et sex Alcoholis (vel deficiente hac tinctura. Pulveris conorum Lupuli grana tria, hora decubitus, superbibendo succi Citri medicae vel Acidi acetici impuri cochlear sume. Iisdem virtutibus gaudet ut opium. RC.); — Am. et *C.* Lupuli uncias quinque et Alcoholis octarium unum.

Narkotiſch. — Gabe, eine halbe bis zwei Drachmen.

Infusum Lupuli. (E. Ra.)

℞. Lupuli . . . . unciam unam.
Aquae bullientis . . libras duas.

Infunde et cola. — **Gewürzhaft und bitter, bei Scrofeln, Scorbut und ſogenannten aſtheniſchen Krankheiten empfohlen.**

Ein wirkſameres Präparat erhält man durch Infuſion des Hopfens in Wein, nachdem man ihn mit einer hinlänglichen Menge Weingeiſt befeuchtet hat.

Aqua Lupuli. (B*. Han. *Vm.*)

℞. Lupuli . . . . . partes octo.
Aquae sufficientem quantitatem.

Destillent partes viginti quatuor. (B*. Han.)

℞. Lupuli . . . . partes quatuor.
Aquae Vitae . partem quartam.
Aquae . . . . partes triginta.

Destillent partes sex. (*Vm.*)

Magenſtärkend und etwas narkotiſch. — Gabe, ein Löffel.

Mixtura e Lupulo s. stomachica. (B*.)

℞. Extracti Lupuli aquosi
drachmas duas ad tres.
Aquae Lupuli . uncias septem.
Solutioni adde
Tincturae Lupuli semunciam ad unciam unam.
Syrupi Gorticum Aurantiorum unciam unam.

Gabe, alle drei Stunden einen Löffel.

Unguentum Lupuli. (*Sw*.)

℞. Lupuli siccati . . uncias duas.
Axungiae Porci . uncias decem.

Digere blando calore per horas aliquot et cola cum expressione.

Bei'm Krebs, um die Schmerzen zu ſtillen, empfohlen.

Pulvis Lupulini. (GalF. GalH. *Ma.*)

℞. Lupulini . . . partem unam.

Tere in mortario porcellaneo, sensim addendo

Sacchari albi . . . partes duas.

Unguentum s. Pomatum Lupulini. (GalH. *T.*)

℞. Lupulini . . drachmam unam.
Axungiae . . . drachmas tres.

Infunde in aquae balneo et per pannum e tela arcte textum (setaceum *T.*) cola.

Tinctura Lupulini. (Fer. GalF. *Ma. T.*)

℞. Lupulini contusi unciam unam.
Alcoholis (36°) . . uncias duas.

Digere in vase tecto per dies sex, cola fortiter exprimendo et adde

Alcoholis (36°) quantum sufficit ut tincturae unciae tres obtineantur.

T. Lupulini drachmas tres, Alcoholis (35° B.) unciam unam; digere, post dies duos exprime et operatione cum residuo repetita, liquores commixti filtrentur.

Gewürzhaft, bitter und tonisch, nach Ives außerdem auch narkotisch. — Die Gabe ist noch nicht bestimmt. T. schreibt von seiner Tinctur 40 bis 80 Tropfen vor, in einem passenden Vehikel zu nehmen.

Syrupus Lupulini. (GalF. *Ma. T.*)

℞. Tincturae Lupulini alcoholicae partem unam.
Syrupi communis partes septem.
Misce.

Extractum resinosum vel alcoholicum Lupulini. (*T.*)

Obtinetur evaporatione tincturae, solis vel evaporatorii calore, in laminis vitreatis.

Gabe, drei bis vier Gran.

Lycopodium.

Lycopodium clavatum, *L.*; Streupulvermoos, Bärlapp; Lycopode commun (*Gal.*); Club moss (*Ang.*); Mechowe Sewene (B.); Joramos, Ulvefod, Luse graes (*D.*); Licopodio (*His. I. Lus*); Geknodstaardmos (*Bel.*); Proszek koltanowy (*Pol.*); Gulnicht (*Suec.*).

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Ham. Hass. His. Li. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Würz. *Be. Br. G. M. Pid Sp.* Z.

♃ (Cryptogamia, L.; Musci, J.) Eine in ganz Deutschland sehr gemeine Pflanze. (*Hayne* VIII. 47. *Zorn* Ic. pl. t. 54.)

Man wendet das Kraut und den Saamen an.

Das Kraut (herba Musci clavati s. terrestris) besteht aus einem sehr ästigen Stängel mit zerstreuten, rippenlosen, gebogenen, in eine Borste endigenden Blättern. Es hat weder Geruch, noch Geschmack.

Der Saame (farina s. pulvis s. semen s. sulphur Lycopodii, Sulphur vegetabile; Bärlappsaamen, Hexenmehl, Trutenmehl, Alpmehl, Pillenmehl, Wurmmehl, Klopfpulver, Blitzpulver, Moospulver, Streupulver, Bärlappenpulver) ist ein außerordentlich feines, blaßgelbes, leichtes, einigermaßen fettig anzufühlendes Pulver, welches sich an die Finger hängt, weder Geruch noch Geschmack besitzt, sich leicht entzündet und aus kleinen, rundlichen, etwas platten und halbdurchsichtigen Körnern besteht.

Äußerlich austrocknend, innerlich harntreibend — Gabe, zehen Gran Morgens und Abends, bei Harnstrenge der Kinder.

Mixtura Lycopodii s. diuretica. (B°. *Au.*)

℞. Lycopodii . . drachmas duas.
Aquae purae . . . uncias duas.
Syrupi Althaeae . sesquiunciam.
Misce. — Gabe, alle zwei Stunden einen halben Löffel. (B°. *Au.*)

℞. Magnesiae subcarbonicae drachmas duas.
Satura
Aceti concentrati sufficiente quantitate.
Adde deinde
Aquae Menthae,
Syrupi Opii,
singulorum uncias duas.
Pulveris Lycopodii drachmas duas.
Gabe, alle zwei Stunden zwei Eßlöffel. (B°. *Au.*)

℞. Lycopodii . . . . semunciam.
Syrupi Papaveris quantum sufficit ut fiat looch. — Gabe, alle zwei Stunden einen Löffel.

Lysimachia.

In den Pharmacopöen findet man zwei Arten dieser Pflanzengattung angezeigt:

1) *Lysimachia vulgaris*, *L.*; gelber Weiderich; Lysimaque commune, Chasse-bosse (*Gal.*); Common loose strife (*Ang.*); Bastard dueurt (*D.*); Lis de tintureros (*His.*); Gemeene weiderik (*Suec.*).

Gal. Wir. *Sp.* Z.

♃ (Pentandria Monogynia, L.; Primulaceae, J.) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (*Blackw.* t. 278. *Hayne* VIII. t. 15. *Oed.* Fl. Dan t. 689.)

Man wendet das blühende Kraut (herba et flores Lysimachiae luteae) an; es besteht aus einem ästigen Stängel mit lanzettigen, fast sitzenden, gegenüberstehenden, drei- oder vierzeiligen Blättern und goldgelben, eine endständige Rispe bildenden Blüthen. Es hat fast gar keinen Geruch; der Geschmack ist etwas bitter und styptisch.

Schwach adstringirend.

2) *Lysimachia Nummularia*, *L.*; Pfennigkraut; Nummulaire (*Gal.*); Moneywort (*Ang.*); Pengekrud (*D.*); Numularia (*His. I. Lus.*); Penning kruid (*Bel.*); Pieniecznik (*Pol.*); Penningeaert (*Suec.*).

Br Gal. Gen. Wir. *Be. M. Sp.*

♃ Eine Europäische Pflanze. (*Blackw.* t. 542. *Hayne* VIII. t. 16. *Zorn* Ic. pl. t. 20.)

Man wendet das Kraut (herba Num-

mularlae s. Centummorbiae) an; es besteht aus einem meist einfachen, schwach vierkantigen Stängel mit entgegengesetzten eirunden, rundlichen, kurzgestielten Blättern. Es hat keinen Geruch. Den Geschmack ist etwas styptisch.

Ehedem wendete man es bei Durchfall und Blutungen an.

M.

Magnesium.

Ein ungebräuchliches Metall, von dem man aber folgende Zusammensetzungen anwendet:

Magnesia alba calcinata, Magnesia pura s. usta; gebrannte Magnesia. (A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. HassP. His. Li. Lon. LonN. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. *Br. C. Fi. Sp. Sw. T. Vm.*)

℞. Magnesiae subcarbonicae quantum libet.

Calcina igne maxime aucto, in crucibulo, donec particula acido immissa non amplius effervescentiam producat. (Ams. Ba. Bor4. Gal. GalM. Han. O. Pol. Sax.)

T. Solutioni filtratae e Magnesiae sulphuricae venalis libris duabus in Aquae bullientis libris duodecim infundere jubet Kali subcarbonicum liquidum, donec mixturam chartam curcuma tinctam non rubefaciat; praecipitatum cum Aqua communi tamdiu lotum, donec lotionum aqua illam chartam non amplius rubefaciat et solis vel balnei vaporis ope siccatum ure inter prunas ut antea etc.; — *Fi.* Magnesiam carbonicam inter prunas ad diminutionem ponderis ejus partium duarum calcinare jubet.

Die Probe auf Säuren allein ist hinlänglich, um die Reinheit der Magnesia zu prüfen; die einstündliche (Fenn. HassP. RC. *Br.*), einstündliche und längere (Bor.), ein- bis zweistündliche (R.), zweistündliche (A. B. Bel. D. Du. Ed. His. Lon. LonN. *Sp. Sw.*), dreistündliche (*Br°.*) Dauer der Calcination kann hierzu nicht genügen, da der Stärkegrad des Feuers sehr verschieden gewesen seyn kann.

Im Allgemeinen zieht man die gereinigte Magnesia der kohlensauren vor, welche denselben Nutzen gewährt.

Protocarbonas Magnesii, Magnesia alba s. aërata s. subcarbonica s. mitis s. nitri s. Edinburgensis s. salis Ebshamensis s. Epsomensis s. Salis amari s. cretosa s. dulcis s. effervescens, Carbonas Magnesiae s. magnesicus s. magnesicus cum Aqua, Lac terrae Hypocarbonas Magnesiae, Subcarbonas Magnesiae, Terra amara s. amara aërata s. absorbens mineralis s. talcosa oxyanthracodes, weiße Magnesia, kohlensaure Talkerde, Bittererde.

1) So, wie sie in der Natur vorkömmt.

Am. DD. Gal. GalM. *C. Par Sa.*

Weiß, geschmack- und geruchlos, von erdigem Ansehen, einem etwas derben Gefüge und einem feinen, sehr zähen Korn.

2) Im Ganzen bereitet

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Penn. Per. Ful. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pal. Pol. R. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. *Br. C. Pid. Sp. Sw. T. Vm.*

℞. Magnesiae sulphuricae libras duas.
Aquae bullientis . . libras octo.

Solutioni filtratae infunde pedetentim aliam solutionem cum Kali subcarbonici libra una et quatuor Aquae fontanae paratam, donec non ultra turbetur; lava praecipitatum Aquâ fontana, et quum haec plumbo acetico adjecto non amplius turbatur, pulverem sicca.

Bor4. Magnesiae sulphuricae depuratae, Kali carbonici e cin. clav. a terra silicea liberi, singulorum eandem quantitatem. Solvantur seorsim illa in sextuplo, hoc in quadruplo Aquae communis ferventis; soluta filtrata commixta et spathula ligneâ agitata coquantur per horam dimidiam, Aqua communi fervida diluantur et per linteum colentur. Quod in linteo remanet, edulcoratum leni calore siccetur. — Praeterea etiam venalem indicat; — HassP. Magnesiae sulphuricae venalis libras sex, Aquae communis calidae duodecim; solutionem filtratam cum Aqua communi calida usque ad libras quadraginta octo dilue et cum hac solutione aliam e Cinerum clavell. depur. libris quatuor et Aquae communis calidae libris viginti quatuor, utramque filtratam, subcalidam (40 — 50°) sensim perpetua sub agitatione commisce; post magnesiae subsidentiam liquorem defunde et sedimentum elutione, primum cum aqua subcalida, dein cum

frigida repetita depura et sicca etc.;— Lon. LonN. Magnesiae sulphuricae libram unam, Kali subcarbonici uncias novem, Aquae octarios viginti quatuor; kali in aquae octariis tribus, magnesiam in quinque solve, reliquam aquam adjice et coque etc.; — RG. Magnesiae sulphuricae et Kali subcarbonici, singulorum partes aequales, separatim quodque in Aquae destill. calidae duplo solve, coque cum Aquae bull. octuplo etc.; — *Fi.* Magnesiae sulphuricae libras sex et Salis Tartari libras quatuor, quodque seorsim in pondere quadruplo Aquae fontanae bullientis solvere, filtrare, coquere ad magnesiae praecipitationem usque, compositum multa Aqua bulliente diluere, post horae dimidiae coctionem per pannum gossypinum filtrare; magnesiam in filtro remanentem aqua calida lavare et siccare.

Außer dieſem Verfahren, welches man, einige unbedeutende Abweichungen abgerechnet, ſonſt allenthalben findet, geben Pal Sar. und Wir. noch folgendes an:

℞. Residui lixivii a crystallisatione Nitri (Mater Nitri) quantum libet.

Evaporet ad siccum igne gradatim aucto, donec materia liquefiat et calcinetur, tum massam pulverulentam aquae bullienti immitte, praecipitatum exortum lava et sicca.

Dieſes Salz, welches in ſtarker Gabe purgirt, wird nur in geringer Menge angewendet, um gaſtriſche Säuren, deren Gegenwart man Krankheiten zuſchreibt, zu neutraliſiren. Man hat es auch zur Verhütung der Erzeugung harnſaurer Steine empfohlen. — Gabe, drei bis ſechs Drachmen zum Lariren; ſechs bis zwanzig Gran als Abſorbens.

Pulvis purgans. (Per. *Au. Ra.*)

℞. Magnesiae subcarbonicae scrupulos duos.
Cremoris Tartari scrupulum unum.
Misce. (*Ra.*)

Fer. et *Au.* praescribunt Magnesiae unciam unam, radicis Rhei drachmam unam; — Gabe, von einem Scrupel bis zur Drachme.

Pulvis digestivus. (*Vm.*)

℞. Magnesiae subcarbonicae,
Acidi tartarici,
singulorum partes sedecim.
Corticis Cinnamomi partem unam.

Pulvis aërophorus e Magnesia carbonica. (Bor.)

℞. Magnesiae carbonicae drachmas duas.
Acidi tartarici triti semidrachmam.
Elaeosacchari Citri drachmam unam.
Misce.

Pulvis paregoricus. (*Sa.*)

℞. Magnesiae albae drachmas duas.
Nitri . . . . drachmam unam.
Corticis Cascarillae scrupulum unum.
Massae pilularum de Cynoglosso grana sex.

Pulvis Magnesiae compositus s. Magnesiae cum Rheo s. absorbens s. antacidus s. galactopoeus s. nutricum s. infantum s. infantum antacidus s. anodynus s. pro infantibus s. puerorum s. infantum citrinus s. epilepticus Marchionum s. ad tormina infantum antacidus s. antiemeticus s. carminativus. (B. Bor. Fer. Ful. Gal. Han. Hass. Hass. Li. O. R. Wir. *Au. E. Pid. Pie. Sm. Sp. Sw. T.*)

℞. Magnesiae,
Sacchari albi,
singulorum partes aequales.

Per longum tempus triturentur in mortario vitreo. (Gal. *T.*). — Melius Magnesia pura sumitur. (*T.*)

℞. Magnesiae . . . . grana octo.
Cinnamomi . . granum unum.
Misce. (R.)

Ham. praescribit Magnesiae drachmas sex, Corticis Aurantii pulverati duas; — His. Magnesiae drachmam unam cum dimidia, Radicis Columbo drachmam unam; dividetur in sex partes.

℞. Magnesiae . . . . partes sex.
Elaeosacchari Menthae piperitae partem unam.
Misce. (*Sw**.)

℞. Magnesiae . . . unciam unam.
Cinnamomi . drachmam unam.
Sacchari . . unciam dimidiam.
Misce. (R.)

Ful. praescribit Magnesiae unciam unam cum dimidia, Cinnamomi drachmam unam et Sacchari unciam unam; — Li. et Wir. Magnesiae uncias duas, Cinnamomi drachmam unam et radicis Liquiritiae unciam dimidiam.

℞. Magnesiae . . . unciam unam.
Foeniculi . . drachmam unam.
Sacchari albi unciam dimidiam.
Misce. (Hass. *Pid.*)

℞. Magnesiae . . . unciam unam.
Corticis Aurantii,
Seminum Foeniculi,
singulorum drachmas duas.
Misce. (Fer. Ful. Li.)

Hjs. praescribit Magnesiae unciam dimidiam, Foeniculi et Cinnamomi,

singulorum drachmam unam; — *Au.*

Magnesiae unciam unam, Foeniculi et Corticis Aurantii, singulorum unciam midiam.

℞. Magnesiae . . . . uncias tres.
Nucis moschatae
drachmam dimidiam.
Cinnamomi
drachmam unam cum dimidia.
Misce. (*Sw*)

℞. Magnesiae,
Sacchari Lactis,
singulorum uncias duas.
Corticis Cascarillae drachmas duas.
Elaeosacchari Foeniculi
drachmas sex
Misce. (*Sm.*)

℞. Magnesiae . . . drachmas sex.
Radicis Iridis Florentinae,
Seminum Anisi,
Sacchari albi,
singulorum drachmas duas.
Croci . . . drachmam unam.
Misce. (B., Han. *Sp.*)
HassP. Croci grana viginti.

℞. Magnesiae . unciam dimidiam
Seminis Cumini . drachmas tres.
Radicis Iridis Florentinae
drachmas duas.
Croci . . drachmam dimidiam.
Misce. (*Pie. Sp.*)

℞. Magnesiae carbonicae
unciam unam.
Elaeosacchari Foeniculi
semunciam.
Radicis Rhei pulveratae
drachmas duas.
Iridis Florentinae pulveratae
sesquidrachmam.
Misce. (Bor4.)

℞. Magnesiae
uncias duas cum dimidia.
Radicis Rhei unciam dimidiam.
Visci albi,
Radicis Liquiritiae,
singulorum drachmas sex.
Misce. (Li.)

O. praescribit Magnesiae unciam unam, Radicis Rhei drachmas duas, Pulveris analeptici drachmam dimidiam.

℞. Magnesiae . unciam dimidiam.
Natri subcarbonic.,
Radicis Zingiberis,
singulorum scrupulum unum.
Misce fiat pulvis. (His.)

℞. Magnesiae . . unciam unam.
Radicis Gentianae,
Seminum Foeniculi,
singulorum drachmas duas.
Fiat pulvis (*Au.*)

Die Gabe ist im Allgemeinen ein Kaffeelöffel voll. Mehrere Pharmacopöen, Gal. und His. unter andern, nehmen statt des kohlensäuerlichen Kali's reine Magnesia welche in der That den Vortheil hat, daß sie im Magen kein kohlensaures Gas entbindet.

Pulvis ecphracticus Sellii. (*Au.*)

℞. Magnesiae subcarbonicae,
Cremoris Tartari,
Florum Sulphuris,
Pulveris Rhei,
— Florum Chamomillae,
Elaeosacchari Foeniculi,
singulorum unciam dimidiam.

Gabe, ein Kaffeelöffel mehrmals täglich bei Stockungen und Schwäche der Unterleibseingeweide.

Bolus Magnesiae crocatus. (GalM.)

℞. Magnesiae . . partes quinque.
Croci . . . . . partes tres.
Canellae . . . . partes duas.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.

Tabulae absorbentes s. Magnesiae, Trochisci antacidi s. Magnesiae s. Carbonatis Magnesiae. (Am. An. Ed. Gal. Lus. *Br. C. Pie. Sw. Vm.*)

℞. Magnesiae . . . partem unam.
Sacchari albi . . partes octo.
Coque septem sacchari partes octavas ad plumam et reliquum trituratum cum magnesia commisce. (*Vm.*)

℞. Magnesiae . . . partem unam.
Sacchari albi . partes quatuor.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae
cum Aqua Florum Aurantii paratae . . quantum sufficit.
Fiant trochisci. (An. Gal. *Fi. T.*)

Ed. et *Pie.* praescribunt Magnesiae uncias sex, Sacchari uncias tres, Nucis moschatae scrupulum unum et Mucilaginis Gummi Tragacanthae quantum sufficit; — *Br.* Magnesiae uncias tres, Sacchari unciam unam cum dimidia, Zingiberis scrupulum unum itemque Mucilaginem Gummi Arabici; — *Sw.* Magnesiae uncias quatuor, Sacchari uncias duas, Zingiberis scrupulum unum et Mucilaginem Gummi arabici; — Lus. Magnesiae uncias sex, Sacchari uncias tres, Foliae Pichurim drachmam dimidiam et Mucilaginem Gummi Tragacanthae; — Am. et *C.* Magnesiae uncias quatuor, Sacchari uncias duas, Zingiberis scrupulum unum et Syrupi Sacchari sufficientem quantitatem.

Chevallier empfiehlt folgende Pastillen:

℞. Succolatae . . . uncias duas.
Sacchari . . . uncias quinque.
Magnesiae purae unciam unam.
Misce fiat cum Mucilagine Gummi Tragacanthae pasta, ad libitum cum

aromatibus miscenda, e qua formentur Morsuli granorum octo, sedecim et viginti quatuor.

Electuarium anodynum pro infantibus s. antacidum s. mithridaticum s. pro infantibus. (Br. Li. *Ca. Sp. Sw.*)

℞. Magnesiae . . . unciam unam.
Seminum Anisi unciam dimidiam.
Syrupi Cichorii compositi
uncias tres.
Misce. (Br.)

Ca. et *Sp.* Magnesiae drachmas sex, Anisi unciam dimidiam, Croci drachmam unam et Syrupi Cichorii compositi sufficientem quantitatem.

℞. Magnesiae . . . drachmas sex.
Seminum Foeniculi,
Carbonis,
singulorum drachmas tres.
Croci . . . drachmam unam.
Syrupi Sacchari . . uncias octo.
Petalorum Rhoeados
quantum sufficit
ad tingendum colore rubescenti brunneo. (Li.)

℞. Magnesiae
unciam unam cum dimidia.
Herbae Menthae crispae
unciam unam.
Croci . . . . drachmam unam.
Radicis Rhei . . drachmas duas.
Mellis depurati . . uncias sex.
Carbonis . . quantum sufficit
ad tingendum colore nigrescenti viridi. (Li.)

℞. Conservae Menthae crispae
unciam unam.
Pulveris aromatici
drachmam unam.
Magnesiae . . . drachmas duas.
Syrupi Menthae crispae
quantum sufficit.
Misce (*Sw.*)
Gabe, eine bis zwei Drachmen und mehr.

Aqua Magnesiae. (Am. B*. GalH. *C.*)

℞ Aquae . . . . octarios octo.
Magnesiae subcarbonicae
drachmas tres.
Antliae pressoriae ope solutioni inculcetur volumen circiter decuplum gas acidi carbonici. (Am. B*)

℞. Magnesiae carbonicae (hydratae)
partes quatuor.
Aquae acidulae gasosae quadruplo
Acidi volumine impraegnatae
partes quingentas.
Misce. (GalH.)

Aqua Pyrmontana factitia. (Gal.)

℞. Aquae acidulae, gas acidi carbonici mensuras quinque continentis uncias viginti cum dimidia.
Salis culinaris . . . grana duo.
Magnesiae sulphuricae grana octo.
— subcarbonicae
grana duodecim.
Ferri subcarbonici granum unum.

Mixtura antacida, Emulsio Amygdalarum composita, Mixtura Subcarbonatis Magnesiae. (Ham. Han. RC.)

℞. Magnesiae drachmam dimidiam.
Aquae Foeniculi
unciam unam cum dimidia.
Tincturae Rhei aquosae,
Sacchuri albi,
singulorum drachmas duas.
Misce. (Ham.)

℞. Saponis Hispanici
scrupulum unum.
Magnesiae . . drachmam unam.
Aquae destillatae . uncias tres.
Sacchari albi . drachmas duas.
Misce. (Ham.)

℞. Amygdalarum dulcium
unciam dimidiam.
Seminum Hyoscyami
drachmam unam.
Aquae Cerasorum nigrorum
uncias octo.
Facta emulsione, colaturae adde
Sacchari albi . . drachmas sex.
Magnesiae . . drachmam unam.
Misce. (Han.)

℞. Subcarbonatis Magnesiae
drachmam unam.
Aquae fontanae vel
— Menthae crispae semilibram.
Tincturae aromaticae
drachmas duas.
Ammoniae liquidae
drachmam unam.
Bei Cardialgie. — Gabe, eine bis zwei Unzen. (RC.)

Potio purgans. (Am. *C. E. Pie. Sm.*)

℞. Magnesiae . . drachmas duas.
Decocti seminum Ciceris
uncias octo (verrée).
Syrupi Capilli Veneris uncias duas.
Misce. (*Pie.*)

℞. Radicis Rhei drachmam unam.
Aquae . . . uncias duodecim.
Coctis ad dimidiae partis remanentiam, colaturae adde
Magnesiae . . drachmam unam.
Essentiae Anisi
guttas duas ad quatuor.
Misce. (*Sm.*)

℞. Magnesiae drachmam dimidiam.
Radicis Rhei . . . grana sex.
Sacchari . . drachmam unam.
Essentiae Menthae piperitae
guttas sex.
Aquae unciam unam cum dimidia.

Gabe, Kindern einen Kaffeelöffel voll alle zwei Stunden. (*E.*)

℞. Magnesiae . drachmam dimidiam.
Tincturae Asae foetidae
guttas quadraginta.
— Opii . guttas viginti.
Sacchari . . . drachmam unam.
Aquae . . . . unciam unam.

Gabe, fünf und zwanzig Tropfen für ein Kind von zwei bis vier Monaten. — Dewees wendet diese Formel sehr häufig an.

℞. Magnesiae . . drachmam unam.
Liquoris Ammonii subcarbonici
unciam unam.
Aquae Cinnamomi . uncias tres.
— purae
uncias quinque cum dimidia.
Misce. (Am. *C*)

Potio lithontriptica. (*E.*)

℞. Magnesiae . drachmam unam.
Infusi Gentianae . . uncias sex.

Von Brande in Fällen von vorherrschender Harnsäure empfohlen. — Gabe, ein Glas voll dreimal täglich.

Phosphas Magnesiae, Magnesia phosphorica. (B*.)

℞. Magnesiae purae . quantum libet.
Acidi phosphorici quantum sufficit ad neutralisandum; tum liquor filtratus evaporet ad siccum.

Man hat dieses Salz bei anfangender Rachitis gerühmt. — Gabe, zehen Gran bis eine halbe Drachme. In stärkerer Gabe, von einer Drachme und mehr, purgirt es.

Magnesia sulphurica, Magnesia vitriolata, Sal amarum s. Anglicanum s. Anglicum s. Anglicanum catharticum s. catharticum amarum s. Ebshamense s. Epsomense s. Seidschützense s. Seidlitzense s. Sedlitzense, Sulphas Magnesiae, Terra amara sulphurica s. vitriolata, Vitriolicum Magnesiae: Bittersalz, schwefelsaure Talkerde, Englisches Salz; Protosulfate de Magnésium, Sulfate de protoxide de Magnésium, Sulfate de Magnésie, Magnésie sulfatée, Sel de canal, Sel cathartique amer, Sel d'Epsom, de Seidlitz, de Seidschütz, Vitriol magnésien (*Gal.*); Bittersalt (*Ang.*); Engelsk Laxeersalt (*D.*); Sal amargo, Sal de la higuera (*His.*); Sale amaro (*I.*); Sal gorzka (*Pol.*); Sal cathartico amargo (*Lus.*); Bittersalt, eller engelskt salkt (*Suec.*).

1) Im Handel vorkommend.

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel Bor. BorC. Bor♃. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Per. Pul. Gal. Gen Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *C. Fi. G. Par. Pid. Sp. Sw. T. Vm.*)

In vierseitigen Prismen, welche in vierseitige Pyramiden oder in eine zweiseitige Spitze ausgehen, weiß, zerfallend, am Feuer schmelzend, von sehr bitterem Geschmack.

Alle Pharmacopöen lassen sie auf die Weise reinigen, daß man sie in heißem Wasser auflöst, und die bis zur Salzhaut verdunstete Flüssigkeit crystallisiren läßt.

2) Im Ganzen bereitet

℞. Magnesiae subcarbonicae pulveratae . . . . quantum libet.
Acidi sulphurici (15°)
quantum sufficit
ad neutralisandam magnesiam; cocta leviter et colata evaporent, donec liquor 25 gradus indicat, tum reponatur ad locum frigidum, ut in crystallos abeat.

Purgirend. — Gabe, von drei Drachmen bis zu einer und einer halben Unze in einem Pfund Wasser; eine bis zwei Unzen und mehr, in Klystir. Salzsaures Ammoniak und Kalk, kohlensaures Kali und Natron, essigsaures Blei und salpetersaures Silber dürfen nicht damit verbunden werden.

Liquor Magnesiae sulphuricae. (Bor♃) Ut reagens.

Pulvis salinus compositus s. Cheltenhamensis. (B*. Ed. *C.*)

℞. Magnesiae sulphuricae,
Salis culinaris,
singulorum partes quatuor.
Kali sulphurici . . partes tres.

Salia quodlibet separatim pulverata triturando misce. (B*. Ed. *C.*)

B*. Salis communis grana centum viginti, Salis Epsomensis sexaginta sex, Kali sulphurici decem et Ferri sulphurici granum dimidium.

Gabe, einen Kaffeelöffel voll in einer Pinte Wasser.

Pulvis digestivus. (Br.)

℞. Salis Sedlitzensis . uncias duas.
Nitri depurati,
Cremoris Tartari,
Radicis Ari maculati pulveratae,
singulorum unciam unam.
Salis Ammoniaci . drachmas sex.

Misce fiat pulvis. — Dieselbe Anwendung, wie bei'm vorhergehenden und dem Pulvis stomachicus Birkmanni verwandt.

Pulvis purgans. (*E.*)

℞. Magnesiae sulphuricae,
Pulveris Chinae,
singulorum drachmas sex.

Misce et divide in quatuor partes. — Gabe, ein Pulver alle zwei Stunden.

Potio cathartica s. laxans, Liquor salinus laxativus, Haustus cathartici salini, Mixtura e Magnesia sulphuri-

ca, *Aqua mineralis cathartica.* (Fer. Wir. WW. *Au. B. E. Sa. Sw*)
℞. Magnesiae sulphuricae,
Mannae calabrinae,
singulorum unciam unam.
Aquae calidae . uncias quatuor.
Solutionem cola. (WW.)
℞. Magnesiae sulphuricae
unciam unam.
Aquae bullientis . libram unam.
Solutioni adde
Magnesiae grana octo ad decem.
Misce. (*Siv*)
Swediaur giebt dieſe Formel unter dem Namen *Potio cathartica* und *Aqua mineralis cathartica.* Die Flüſſigkeit kann das Sedlitzer Waſſer erſetzen.
℞. Magnesiae sulphuricae,
Tincturae Rhei aquosae,
singularum unciam unam.
Aquae Melissae . . uncias duas.
Auf zwei oder vier Mal, Morgens und Abends, zu nehmen. (*Au.*)
℞. Magnesiae sulphuricae
unciam unam.
Tartari stibiati . granum unum.
Succi Citri . . . unciam unam.
Aquae purae . . . uncias tres.
Gebe, alle zwei Stunden einen Löffel voll.
℞. Foliorum Sennae unciam dimidiam.
Aquae . . . quantum sufficit ut infundendo colatura sit unciarum octo, quibus adde
Magnesiae sulphuricae
unciam unam.
Auf zwei Mal zu nehmen. (*B.*)
℞. Foliorum Sennae unciam dimidiam.
Aquae . . . . quantum sufficit ut infundendo colaturae sit unciarum quatuor, cui adde
Tincturae Rhei aquosae uncias sex.
Magnesiae sulphuricae
unciam unam.
Auf zwei oder drei Mal zu nehmen. (*B.*)
℞. Foliorum Sennae . drachmas sex.
Mannae,
Magnesiae sulphuricae,
singulorum unciam unam.
Cardamomi minoris drachmas duas.
Aquae bullientis octarium unum.
Infunde per horae quadrantem et cola. — Gabe, alle Stunden eine Taſſe voll. (*E.*)
℞. Foliorum Sennae . drachmas tres.
Magnesiae sulphuricae
drachmas sex.
Aquae bullientis . . uncias sex.
Post duodecim horarum infusionem cola. (Fer.)

Potio salina. (Ham.)
℞. Tartari stibiati . granum unum.
Magnesiae sulphuricae
unciam unam.
Dissolve in
Aquae fontanae . . unciis octo
Solutioni adde
Mellis glyzyrrhizati unciam unam.
Auf vier oder fünf Mal zu nehmen. (Ham.)

Ca. giebt unter dem Namen *Aqua Travezii* folgende Formel:
℞. Magnesiae sulphuricae
unciam unam.
Tartari stibiati granum dimidium.
Aquae . . . . libras duas.
Gabe, ſtündlich ein Glas voll, zum Abführen.

Mixtura salina antacida. (B.)
℞. Magnesiae sulphuricae
drachmas duas.
— subcarbonicae
scrupulum unum.
Syrupi Althaeae
unciam unam cum dimidia.
Aquae florum Chamomillae
uncias duas.
Gabe, alle zwei Stunden einen Löffel voll, bei Kindern.

Mixtura oleoso-salina. (Ham.)
℞. Salis Anglicani . unciam unam.
Aquae . . . libram dimidiam.
Solutioni adde
Olei Ricini cum Vitello ovi triti
unciam unam.

Aqua Sedlitzensis artificialis. (Gal.)
℞. Aquae triplo volumine Gas acidi carbonici impraegnatae
uncias viginti cum dimidia.
Magnesiae sulphuricae
drachmas duas.
— hydrochloricae
grana octodecim.
Dissolve. — Man kann es gehaltreicher und dem natürlichen Waſſer ähnlicher machen, indem man vier Drachmen ſchwefelſaure Magneſia und ſechs und dreißig Gran ſalzſaure Bittererde in derſelben Menge Sauerwaſſer auflöſ't.

Enema purgans s. cathartícum, Clyster cathartícus. (Du. RC. WW. *Au. E. Vi.*)
℞. Mannae . . . . unciam unam.
Decocti Chamomillae
uncias decem.
Solutioni adde
Olei Olivarum . unciam unam.
Magnesiae sulphuricae
unciam dimidiam.
Misce. (Du. *C.*)
WW. praescribit solutionem Magnesiae sulphuricae drachmarum sex in Aquae calidae unciis decem; — *E.* Magnesiae sulphuricae unciarum dua-

Ad libras quatuor redactis, colaturae adde
Syrupi Acidi citrici uncias quatuor.
Misce bene. (*Sw.*)

℞. Malti sicci . . . uncias duas.
Aquae communis libras quatuor.
Coque et colaturae, si necesse est, adde
Oxymellis uncias tres vel quatuor.
Coqui cum malto possunt etiam uvae passae. (Wür.)

Gabe, täglich zwei bis vier Pfund.

℞. Malti Hordei . uncias quatuor.
Specierum Turionum Pini comp. uncias duas.
Aquae fontanae . libras quatuor.
Decoque ad librarum trium colaturae remanentiam, vel

℞. Decocti Malti per se
— antiscorbutici aciduli,
singulorum partes aequales.

Gabe, drei bis vier Mal täglich vier Unzen. (RC.)

Gargarisma antiscorbuticum. (*Sm.*)

℞. Malti . . . . unciam unam.
Nasturtii aquatici manipulum unum.
Aquae . . . . libras quatuor.
Decoque ad librarum duarum remanentiam et adde
Aluminis . . . drachmas duas.
Salis Ammoniaci drachmam unam.

Malva.

Unter diesem Namen kommen in den Pharmacopöen drei Pflanzen vor:

1) *Althaea rosea, Cav.*; Pappelrosen, Stockrosenartig; Passerose, Rose trémière. (*Gal.*); Hollyhock (*Ang.*); Zahradnj neb kzimsky slez (*B.*); Haestro e (*D.*); Stokros (*Bel.*); Alcea, Malvone, Rosone (*I.*; Czarna roza (*Pol.*); Stockros (*Suec.*).

Ba. Bor. Bor4. Br. Fer. Ful. Han. Hass. HassP. Li. O. Pal. R. Suec. Wir. Wür. *Be. Br. Fi. M. Pid. Sp.* Z.

♂ (Monadelphia Polyandria, L.; Malvaceae, J.) Eine ursprünglich im Orient einheimische, in Europäischen Gärten gebaute Pflanze. (*Hayne* II. 26. *Blackw.* t. 54. *Cav.* diss. II. t. 28 f. 1. *Plenck* t. 542. Düss. off. Pfl. IV. t. 1. *Zorn* Ic. pl. t. 236.)

Man wendet die Blüthen (flores Malvae arboreae s. roseae s. hortensis) an; sie sind groß und von sehr verschiedener Farbe; man nimmt nur die dunkelschwarzen oder bräunlichrothen. Sie haben einen schwachen Geruch und einen schleimigen, etwas styptischen Geschmack.

2) *Malva rotundifolia, L.*; gemeine oder Käsepappel, Gänsepappel, rundblättrige Malve; Mauve à feuilles rondes, petite mauve (*Gal.*); Round leav'd mallow (*Ang.*) Zagecj slez (*B.*); Store kattevst (*D.*); Malva de boja redonda (*His.*); Rondbladige maluwe (*Bel.*); Mulva minore (*I.*); Szluz ziele (*Pol.*); Malva ordinaria (*Lus.*); Kattost (*Suec.*).

A. An. B. Ba. Bel. Bor4. Br. D. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lus. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. *Be. Br. Fi. G. Pid. Sp.* Z.

☉ (Monadelphia Polyandria, L.; Malvaceae, J.) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (*Hayne* II. t. 27. *Plenck* t. 541. *Blackw.* t. 22. Düss. off. Pfl. V. t. 7. *Zorn* Ic. pl. t. 237.)

Man wendet die Wurzel, das Kraut, die Blüthen und den Saamen an.

Die Wurzel (radix Malvae minoris s. vulgaris) ist dünn, walzig, faserig, weiß. Sie hat einen süßen, fast zuckerartigen Geschmack.

Das Kraut besteht aus einem runden, behaarten Stängel und kreisrunden, herzförmigen, fast fünflappigen Blättern von schleimigem, etwas bittern Geschmack.

Die Blüthen sind sehr klein, hellpurpurroth, fast weiß.

Der Saame ist klein, nierförmig, schwarz.

3) *Malva sylvestris, L.*; wilde, Wald-Malve; Mauve sauvage (*Gal.*); Common mallow (*Ang.*); Lillekatost (*D.*); Wilde maluwe (*Bel.*); Malvone (*I.*).

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. D. DD. Du. Ed. Gal. GalM. Gen. Ham. Hass. His. Lon. LonN. Lus. O. Pal. WW. *C. M.*

☉ Eine Europäische Pflanze. (*Blackw.* t. 22. *Plenck* t. 540. *Hayne* II. t. 28. Düss. off. Pfl. VII. t. 28. *Zorn* Ic. pl. t. 480.)

Man wendet ebenfalls die Wurzel, das Kraut, die Blüthen und den Saamen an.

Die Wurzel (radix Malvae sylvestris) ist weißlich, von süßem und klebrigem Geschmack.

Das Kraut besteht aus einem walzigen, schwach behaarten, ästigen Stängel und rundlichen, am Grunde herzförmig ausgeranbeten, an den Rändern gekerbten, in fünf bis sieben kurze Lappen getheilten Blättern.

Die Blüthen sind sehr groß, rosenroth, rothgestreift, bisweilen weiß.

Der Saame ist gelblich und glatt.

Beide Pflanzen sind erweichend.

Species emollientes, Species pro gargarismate emolliente. (Ful. Li. Suec. *Fi.*)

℞. Foliorum Malvae partes duodecim.
Florum Chamomillae partes sex.
Seminis Lini . . partes tres.
Concisa et contusa misce.

℞. Foliorum siccatorum Malvae,
— — Altheae,

Foliorum siccatorum Verbasci, singulorum uncias sex.
Florum Sambuci . . uncias tres.
Concisa misce. (*Fi.*)

Flores bechici. (Gal.)

℞. Florum Malvae,
— Immortellae,
— Farfarae,
— Rhoeados,
singulorum partes aequales.
Misce.

Conserva Malvae. (An. Sar. Wür.)

℞. Florum Malvae contritorum partem unam.
Sacchari albi . . . partes duas.
Fiat pasta homogenea. (Wür.)

℞. Florum Malvae cum Sacchari pauxillo contusorum partem unam.
Sacchari clarificati . partes tres.
Ebulliant. (Sar.)

℞. Florum Malvae subtil. pulv. partem unam.
Aquae Malvae quantum sufficit ut fiat pasta, quae in vase clauso per horas octo ad decem teneatur, ut pulvis penitus mollefiat; adde solutionem Sacchari albi pulver. in Aqua Malvae et pastae refrigeratae adde Sacchari albi subtiliss me pulv. tantum ut omne Saccharum partes quinque impleat. (*T.*)

℞. Pulveris Foliorum Malvae siccatorum . . . . partem unam.
Sacchari albi . partes quinque.
Aquae destillatae . partes duas.
Contere. (An.)

Cataplasma emolliens. (Per.)

℞. Malvae pulveratae uncias quatuor.
Radicis Althaeae pulveratae uncias duas.
Decocti Althaeae quantum sufficit ut fiat coctione pasta mollis.

Aqua Malvae. (Sar.)

℞. Herbae Malvae recentis partem unam.
Aquae purae . . . partes duas.
Destillent trientes duo.

Infusum Malvae s. bechicum. (GalM. *ParC. Ra. Sy. T.*)

℞. Foliorum Malvae siccatorum manipulos tres.
Aquae bullientis libras quatuor.
Infunde et cola. (*Sy.*)

℞. Foliorum Malvae siccatorum drachmas duas.
Liquiritiae rasae drachmam unam.
Aquae . . . . quantum sufficit ut colaturae octarius unus obtineatur. (GalM. *ParC.*)

℞. Florum Malvae drachmas duas.
Aquae bullientis . libras duas.
Infunde et cola. (*Ra.*)
Erweichend.

T. Cujusque partes dimidias jubet.

Decoctum Malvae. (*T.*)

℞. Foliorum Malvae uncias tres (recentium sex).
Aquae . . . . libras quatuor.
Decoque ad dimidii remanentiam et cola.

Decoctum Malvae compositum. (B*. Lon. LonN.)

℞. Foliorum Malvae siccatorum unciam unam.
Florum Chamomillae semunciam.
Aquae . . . . octarium unum.
Coque per horae quadrantem et cola.
In Bähungen und Klystiren.

Tisana pectoralis. (Gal)

℞. Florum bechicorum drachmas duas.
Aquae bullientis . . libras duas.
Post horae quadrantem infusionis cola et adde
Syrupi Capilli Veneris unciam unam.

Clyster emolliens. (His. *Ra. Sp. Sw.*)

℞. Foliorum Malvae . semunciam.
Aquae bullientis . libram unam.
Coque et cola. (*Ra.*)

℞. Foliorum Malvae unciam unam.
Florum Chamomillae semunciam.
Aquae . . . . . sesquilibram.
Coquendo partem tertiam consume. (*Sw.*)

℞. Foliorum Malvae unciam unam.
Florum Chamomillae,
Foeniculi, singulorum semunciam.
Aquae . . . uncias duodecim.
Coque et cola. (*Sp.*)

℞. Foliorum Malvae,
— Betae Cyclae, singulorum uncias duas.
Aquae . . . . . libras duas.
Decocto adde
Olei Olivarum . . uncias tres.
Misce bene. (*Ra.*)
His. Decocti Malvae uncias decem, Mellis et Olei Olivarum, singulorum uncias duas.

Gargarisma leniens. (*Ra.*)

℞. Decocti Malvae uncias quatuor.
Lactis vaccini . unciam unam.
Misce.

Fomentatio antihaemorrhoidalis. (*Pie.*)

℞. Foliorum Malvae,
— Verbasci, singulorum manipulos tres.

Aquae fontanae . . libras tres.
Coque et cola.

Unguentum Malvae s. malvinum.
(*Fi. T. Vm.*)

℞. Herbae Malvae recentis
sesquilibram.
Butyri recentis . . libras duas.
Coque lente ut humidum evanescat et cola exprimendo. (*Vm.*)

℞. Axungiae Porci colatae libras duas.
Adipis bubuli colati libram unam.
Foliorum Malvae viridium
libras tres.

Axungiae et adipi liquatis adde folia contusa et coque per horae spatium et exprime; refrigerato unguento aquam separa, liquefac et ad consistentiam melleam consume. (*Fi. T.*)

Tinctura Alceae purpureae. (*Fi.*)

℞. Petalorum Alceae purpureae siccatorum . . drachmam unam.
Alcoholis 24° . . . uncias duas.
Post duorum dierum tepidam infusionem filtra.

Manganesium.

Man wendet in der Medicin von diesem Metall folgende Präparate an:

Tetroxydum Manganesii, Magnesia nigra s. vitriariorum, Magnesium oxydatum nativum s. nigrum, Manganesium ochraceum nigrum s. oxydatum nativum, Manganum oxydatum nativum s. hyperoxydatum, Manganesium, Manganum, Manganum hyperoxydatum, Molybdaenum Magnesii, Oxodes Mangani nativa, Oxydum Mangani nativum, Oxydum Magnesii s. Mangani nigrum s. nigrum nativum, Peroxydum Manganesii nigrum nativum, Superoxydum manganicum; Braunstein, Graubraunsteinerz; Tetroxide de manganèse, Magnésie noire, Manganèse oxidé, *H.*, Oxide noir de Manganèse, Peroxide de Manganèse, *B.*, Acide manganésique, Savon des verriers, Savon de verre (*Gal.*); Manganese (*Ang.*); Brunsteen (*D.*); Magnesia (*His. Lus.*); Magnesia nera, Manganese, Sapone de Vetraj (*I.*); Brunsteen (*Bel.*); Mangana (*Pol.*); Marganezi (*R.*); Brunsten (*Suec.*).

A. An. B. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. Du. Fenn. Fer. Gal. GalM. Han. Hass. HassP. His. Li. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. WW. *A. C. Fi. G. T.*

In matten, in der Farbe vom reinen Schwarzen bis zum Braunen und Violetbraunen wechselnden Massen.

Die medicinische Anwendung dieses Oxyds ist beschränkt. Man hat es, mit gleichen Theilen Schmeer gemischt, bei Kopfgrind, Krätze und Flechten benutzt. Man braucht auch nur die leidenden Theile mit dem Pulver zu bestreuen. Besonders aber bedient man sich desselben zur Bereitung des Chlors.

Boli emmenagogi.

℞. Mangani oxydati nigri
grana quatuordecim.
Extracti Sabinae,
— Aloës,
singulorum grana decem.
Fiant boli sex. — Den Tag über zu nehmen.

Hydrochloras Manganesii, Murias Manganesii. (B*.)

℞. Manganesii . . . quantum vis.
Acidi hydrochlorici tenuis
quantum sufficit
ad solutionem metalli. Liquor evaporet.

Pilulae Manganesii muriatici s. Hydrochloratis Manganesii. (B*. *Au.*)

℞. Manganesii muriatici
scrupulos duos.
Gummi Arabici,
Radicis Liquiritiae,
singulorum scrupulum unum.
Fiant pilulae granorum duorum, pulvere Cinnamomi conspergendae.

Gabe, zehen bis zwanzig Stück bei Flechtenübeln.

Man hat auch eine wässerige Auflösung dieses Salzes in Gurgelwasser gegen Schwämmchen gerühmt. Auch das essigsaure Mangan, ein Scrupel auf drei Unzen Wasser, so wie eine Salbe aus gleichen Theilen schwefelsaurem Mangan und Schmeer sind gleichfalls empfohlen worden. (*Au.*)

Manna.

Μελία; Manna; Manne (*Gal.*); Manna (*Ang. B. D. I. Lus. Pol. R. Succ.*); Man, Terinjebin (*Ar.*); Mana (*His.*); Schirkischt (*Hin. Pe.*); Gambing (*Ja.*); Kapurrimba (*Mal.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Per. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *A. Be. Br. C. Fi. G. M. Par. Pid. Sa. Sp.* Z.

Eine zuckerige Substanz, von welcher man mehrere Sorten unterscheidet:

1) *Manna canellata s. canaliculata s. cannulata s. longa*; Manna in Stäben, Manne en bâtons (*Gal.*); in auf der einen Seite hohlen, auf der andern gewölbten, leichten, weißlichen oder hellgelben, bisweilen röthlichen Stücken von angenehmem Geschmack,

Manna in lacrymis s. lacrymata genannt, wenn sie kleiner sind.

2) *Manna in sortis s. communis;* gemeine Manna; Manne commune ou en sorte (*Gal.*) in rundlichen Brodten oder länglichen, gelblichen, weichen, fettig anzufühlenden, schweren, die Hände beschmierenden Stücken von etwas widerlichem Geschmack. Man nennt sie auch Manna von Giaraci oder Gerace oder von Capachi (ersteres in Niedercalabrien, letzteres auf Sicilien gelegen), Manne geracy, Manne capacy (*Gal.*). Die körnigen und weißen Stücke von ersterer werden unter dem Namen Manna electa s. granulosa, Manne choisie ou en grains (*Gal.*) abgesondert.

3) *Manna grassa, spissa, sordida, pinguis,* ist sehr feucht, gelblich, weich, klebrig und mit fremden Körpern verunreinigt.

Man erhält fast alle diese Substanzen durch Einschnitte, welche man in den Stamm von Fraxinus excelsior, L., rotundifolia, *Lmk.*, parviflora, *Lmk.*, subrufescens, *Mér.*, Ornus, *L.* und argentea, *Lois.* macht. Die von selbst ausfließende Manna ist selten und in Körnern von der Größe der Waizenkörner, sie führt den Namen Mastichina, Manna di fronde.

Die Manna enthält, nach Thénard, Zucker, einen eigenthümlichen Stoff, Mannit genannt und einen eckelerregenden Stoff.

Außerdem kennt man noch die

1) *Manna Brigantina s. laricina;* Manne de Briancon (*Gal.*), in kleinen, weißen, klebrigen Körnern. Sie schwitzt im Süden aus den Blättern von Larix Europaea aus.

2) *Manna persica;* Manne d'alhagi (*Gal.*); Transchibil, Tarandjubin (*Pe.*), in kleinen gelben, röthlichen oder braunen Körnern, welche im Orient aus den Blättern und Zweigen von Hedysarum Alhagi ausschwitzen.

Trochisci Mannae, Tabellae Calabricae. (GalF. GalH. *Vm.*)

℞. Gummi Tragacanthae
partem unam.
Sacchari albi partes nonaginta sex.
Contere et adde
Mannae . partes viginti quatuor.
Aquae Florum Aurantiorum
quantum sufficit
ut fiat pasta in trochiscos dividenda. (*Vm.*)

℞. Radicis Althaeae
partes nonaginta sex.
Aquae purae partes duodecies mille.
Coque per sexagesimas sex et adde
Sacchari . . . partes ter mille.
Mannae Calabrinae
partes centum nonaginta duas.
Cola et albumine clarificatis adde
Extracti Opii gummosi partes sex.
Olei essentialis Bergamottae
guttas decem.
Aquae Florum Aurantiorum
partes nonaginta sex.
In modulos chartaceos oleo obductos effunde et antequam refrigescat in trochiscos divide. (GalF. GalH.)

Gelatina laxans. (*Pie.*)

℞. Carnis vitulinae . . libras duas.
Aquae . . . . . octarios duos.
Coque per horas duas et adde
Mannae in lacrymis unciae tres.
Coque iterum per horas duas et per cribrum trajecta ad refrigerantum repone. — Eßlöffelweise alle Stunden.

Electuarium s. Pulticula de Manna. (Fenn. Pal. Suec. Wir. *Sw.*)

℞. Mannae purae . . . partes tres.
Olei Amygdalarum dulcium
partem unam.
Tere et adde pedetentim
Syrupi Mannae . partem unam.
Misce bene. (*Vm.*)

℞. Mannae electae . . uncias duas.
Aquae Foeniculi . unciam unam.
Tere frigide, cola et colaturam tritura cum
Sacchari . . . . unciis duabus.
Iridis Florentinae drachma una.
Producto adde
Olei Amygdalarum dulcium
unciam unam.
Misce. (*Vm.*)

Fenn. et Suec. Mannae uncias duas, Sacchari, Aquae Foeniculi, singulorum tantidem, Iridis Florentinae drachmam unam et Olei Amygdalarum dulcium unciam unam; — Pal. et Wir. Sacchari, Mannae, Aquae Florum Prunellae, singulorum uncias duas, Iridis drachmam unam et Olei unciam unam; — Wir. Mannae, Sacchari, Aquae Rosarum, singulorum uncias duas, Iridis drachmam unam et Olei semunciam.

Ein sanftes Abführmittel, welches besonders bei neugebornen Kindern empfohlen ist. — Gabe, eine bis vier Drachmen

Electuarium bechicum. (GalF.)

℞. Mannae electae . unciam unam.
Aquae Florum Aurantiorum
quantum sufficit
ut manna triturando in mortario marmoreo mollis fiat; terendo continuè adde
Pulveris Gummi Arabici
semunciam.
Extracti Liquiritiae mollis
drachmam unam.

Syrupi Capilli Veneris
quantum sufficit.

Electuarium antihaemorrhoidale. (*Ca.*)

℞. Mannae in lacrymis uncias duas.
Kali sulphurici,
Nitri,
Magisterii Sulphuris,
singulorum drachmas duas.
Mellis albi . . quantum sufficit.
Gabe, zwei bis drei Drachmen täglich.

Looch Mannae s. de Manna. (GalH.)

℞. Olei Amygdalarum dulcium,
Syrupi Althaeae,
Mannae in lacrymis,
singulorum partes quatuor.
Aquae Florum Aurantiorum
partem unam.
— purae . . . partes duas.
Mannam in aqua, blando calore solutam oleo et syrupo mixtis adde et misce exacte.

Dieſes Präparat, welches von Chevallier und Idt vorgeſchlagen wurde, unterſcheidet ſich wenig von dem Linctus s. Marmelada Tronchini. Uebrigens giebt es noch ähnliche, unter dem Namen: *Linctus mannatus* (Wür. *Sa. Sw.*), *Linctus aperiens* (*Sa.*), *Mixtura laxans* (*Sy.*) und *Potio purgans* (*Pie. Sm.*), zu denen die Formeln folgende ſind:

℞. Mannae purae . . uncias tres.
Olei Amygdalarum dulcium
sesquiunciam.
Misce triturando. (*Sw.*)

Sa. Mannae et Olei partes aequales, Vitelli Ovorum quantitatem sufficientem; — Wür. Mannae, Olei et Syrupi Violarum partes aequales; — *Sa.* Olei, Mannae, singulorum unciam unam et Syrupi Rosarum solutivi semunciam.

℞. Gummi Arabici . unciam unam.
Olei Amygdalarum dulcium
uncias duas.
Decocti Hordei . uncias decem.
Mannae . . . . unciam unam.
Mellis . . . . . semunciam.
Misce. (*Sy.*)

℞. Olei Ricini cum Vitello Ovi subacti,
Mannae electae,
singulorum unciam unam.
Magnesiae subcarbonicae
drachmas duas.
Aquae Hyssopi . . uncias octo.
Misce. (*Sm.*)

℞. Florum Persicae,
— Violarum, singulorum manipulum dimidium.
Aquae fontanae quantum sufficit.
Coctis leviter, in colatura solve
Mannae . . . . . uncias duas.
Adde deinde
Olei Amygdalarum dulcium
unciam unam.
Misce bene. (*Pie.*)

Cassia cum Manna, Decoctum Mannae purgans s. laxativum s. carminativum, Potio anglica s. laxativa s. anticolica s. Mannae tamarindinata s. salina mannata, Aqua angelica Viennensis s. laxativa, Manna liquida. (GalM. His. Pal. *Au. B. Ra. Sp. T.*)

℞. Mannae . . . . . uncias tres.
Aquae communis . . uncias sex.
Dissolve. (*Ra.*)

℞. Mannae . . . . . uncias duas.
Aquae . . . . . libram unam.
Solutioni adde
Pulpae Cassiae . unciam unam.
Auf zweimal zu nehmen. (*B.*)

℞. Cremoris Tartari drachmas duas.
Aquae bullientis uncias quinque.
Mannae electae . . uncias duas.
Solutionem cola. (*Sp.*)

℞. Cremoris Tartari drachmas duas.
Aquae fontanae . . uncias octo.
Coque et adde
Mannae canaliculatae uncias duas.
Manna vix soluta, vase ab igne remoto infunde Succi Limonum expressi semunciam et cum albumine subacto clarifica, addendo Corticis recentis Limonis frustum, post refrigerationem filtra per linteum. (*T.*)

℞. Pulpae Cassiae . . semunciam.
Salis vegetabilis sesquidrachmam.
Mannae . . . . . uncias duas.
Aquae fontanae uncias quinque.
Solutionem cola. (*Sp.*)

℞. Pulpae Tamarindorum uncias tres.
Mannae . . . . unciam unam.
Aquae Chamomillae uncias novem.
Solutionem cola. (*Au.*)

℞. Mannae . . . . unciam unam.
Natri sulphurici . sesquiunciam.
Aquae . . . . . uncias sex.
Dissolve. (*Au.*)

℞. Cremoris Tartari drachmas duas.
Aquae bullientis . . uncias octo.
Solutioni adde
Mannae . . . . . uncias duas.
Salis vegetabilis sesquidrachmam.
Succi Citri fructûs . . . no. 1.
Infunde totum Cortici Citri et clarificatum albumine cola. (Pal. *Sp.*)

℞. Mannae . . . . uncias duas.
Foliorum Sennae . drachmas sex.
Magnesiae sulphuricae
drachmas duas.
Aquae . . uncias quatuordecim.
Coque leviter ad libras unius remanentiam et cola deinde. (His.)

℞. Sennae . . . . drachmas duas.

Natri sulphurici . . semunciam.
Aquae . . . . . uncias octo.
Coque per sexagesimas aliquot et adde
Mannae . . . uncias quatuor.
Cola. (GalM.)

℞. Aquae . . . . . uncias octo.
Agita cum albumine et adde deinde
Foliorum Sennae . drachmas tres.
Mannae . . . . . uncias tres.
Cremoris Tartari drachmam unam.
Dissolutionem coquendo clarificatam saepius per pannum cola et adde tandem
Aquae Cinnamomi
scrupulum unum.
Auf einmal zu nehmen. (His.)

℞. Mannae . . . . uncias quatuor.
Foliorum Sennae mundatorum
unciam unam.
Cremoris Tartari,
Seminum Anisi,
singulorum semunciam.
Aquae . . . . libras quatuor.
Digere per horam dimidiam, tunc coque parumper et cola.
Gabe, ſechs Unzen. (His.)

Emulsio purgans. (Fer. His. *Au. Ra.*)

℞. Amygdalarum dulcium
drachmas quatuor.
Mannae in lacrymis uncias duas.
Syrupi Florum Persicae
unciam unam.
Infusi Liquiritiae uncias quatuor.
Aquae Florum Aurantiorum
drachmas quatuor.
Fiat emulsio. (*Ra.*)

℞. Emulsionis non saccharatae
uncias sex.
Mannae . . . . . uncias tres.
Solutioni colatae adde
Aquae Cinnamomi vinosae
drachmam unam.
Misce. (His.)

Fer. Emulsionis uncias sex, Mannae uncias duas et Aquae Cinnamomi drachmam unam.

℞. Emulsionis gummosae
uncias novem.
Mannae . . . . sesquiunciam.
Dissolve. (*Au.*)

Serum Lactis mannatum. (*Au. B.*)

℞. Mannae . . . . unciam unam.
Cremoris Tartari . semunciam.
Seri Lactis clarificati uncias sex.
Gabe, alle zwei Stunden ein halbes Glas (*Au*)

℞. Pulpae Tamarindorum,
Mannae, singulorum sesquiunciam.
Seri Lactis . . quantum sufficit ut colaturae libras duae obtineantur. (*B.*)

Potio antihydropica. (Br.)

℞. Succi Iridis . . . uncias tres.
Mannae . . . ℥ sesquiunciam.
Dissolve.

Syrupus Mannae s. de Manna. (Ba. Bor4. Br. Ful. *Pid.*)

℞. Mannae electae . uncias decem.
Aquae fontanae uncias duodecim.
Solutioni colatae adde
Sacchari albi . . libram unam.
Coque ad syrupi consistentiam. (Br.)

Pid. Mannae unc as duas, Aquae viginti et Sacchari libras duas; — Ba. Mannae partem unam, Aquae quatuor et pro quaque parte colaturae Sacchari partem unam cum dimidia; — Ful. Mannae unciam unam, Aquae sesquiunciam et Sacchari drachmas sex; — Bor4. Mannae electae semilibram, Aquae fervidae quantum satis ad colaturam unciarum octodecim; solutioni adde Sacchari albissimi libras duas; unica ebullitione fiat syrupus.

Syrupus e Manna s. Mannae cum Senna s. de Manna laxativus. (Bor. Br. D. Han. HassP. Li. O. Pal. Pol. R. Wir. *Fi. Sp. T.*)

℞. Foliorum Sennae uncias quatuor.
Seminum Foeniculi . semunciam.
Aquae bullientis . . libras duas.
Infunde in vase tecto per horas aliquot, cola exprimendo et unciis septemdecim colaturae adde
Sacchari albi . . . libras duas.
Mannae electae . . semilibram.
Fiat coquendo syrupus. (O.)

R. Sennae uncias quatuor, Foeniculi drachmas duas, Aquae bullientis libras duas, Mannae uncias sex et Sacchari uncias viginti duas; — Bor. Han. HassP. Li. Pal. Sennae uncias quatuor, Foeniculi semunciam, Aquae libras duas et pro unciis octodecim colaturae Sacchari libras duas et Mannae semilibram; — *Fi.* Foliorum Sennae uncias quatuor, Foeniculi drachmas quatuor, Mannae calabrinae uncias sex, Sacchari albi, Aquae bullientis, singulorum libras duas, digestionem horarum sex, additionem albuminum ovorum duorum et additis saccharo et manna coctionem ad syrupi consistentiam.

℞. Foliorum Sennae uncias quatuor.
Seminum Foeniculi,
Zingiberis,
singulorum drachmam unam.
Aquae bullientis . . libras duas.
Post sufficientem digestionem cola exprimendo et colaturae depuratae adde
Mannae Calabrinae . uncias sex.
Sacchari albi uncias viginti duas.

Coque ad syrupi consistentiam. (D.)

℞. Radicis Polypodii . sesquiunciam.
Specierum pro Decocto Florum et Fructuum,
Passularum minorum,
singularum uncias duas.
Aquae bullientis
libras duas cum dimidia.

Infunde per noctem; altero mane coquendo parte tertiâ consumpta, in colatura infunde

Foliorum Sennae uncias quatuor.
Seminum Anisi,
— Foeniculi,
Galangae,
Macidis,
Zingiberis,
singulorum drachmam unam.

Post viginti quatuor horarum digestionem in loco calido cola exprimendo, album ne clarifica et adde

Mannae Calabrinae . uncias sex.
Sacchari albi uncias viginti duas.

Fiat syrupus. (Br. Pal. Wir.)

℞. Radicis Polypodii drachmas sex.
— Iridis Florentinae
semunciam.
Uvarum passarum drachmas tres.
Mellis . . . . uncias quatuor.
Aquae fontanae
uncias viginti quatuor.

Decoque ad unciarum liquidi duodecim remanentiam, in colatura per horas duodecim infunde

Florum quatuor pectoralium
manipulum unum.
Foliorum Sennae mundatorum
sesquiunciam.
Cinnamomi . . semidrachmam.

In colatura dissolve

Mannae Calabrinae . uncias tres.
Sacchari . . . uncias duodecim.

Coque ad syrupi consistentiam. (Sp.)

℞. Sennae mundatae . uncias octo.
Seminum Foeniculi . semunciam.

Infunde

Aquae bullientis, cum Kali subcarbonici drachma una impraegnati
libras decem.

Post horarum sex digestionem liquido adde

Sacchari albi . . . libras octo.
Mannae electae . . libras duas.

Caloris et albuminis ope clarificata ad syrupi consistentiam evaporent, filtrentur etc. (T.)

Marrubium.

Marrubium vulgare, L.; Marienwurzel, weißer Andorn; Marrube blanc (*Gal.*); White horehound (*Ang.*); Gablecnjk bilj (*B.*); Hvid marrube (*D.*); Marrubio blanco (*His.*); Witte andoorn (*Bel.*); Marrobio bianco (*I.*); Szanta biala (*Pol.*); Marrogo branco (*Lus.*); Andorn (*Suec.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fer. Ful. Gal. Gen. Ham Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. Sax. Wir. Würt. WW. *Be. Br. C. Fi. G. M. Pid. Sp.* Z.

4 (Didynamia Gymnospermia, L.; Labiatae, *J.*) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (*Bull.* t. 165. *Blackw.* t. 479. *Plenck.* t. 487. Flor méd. IV. 226.)

Man wendet das Kraut (herba Marrubii albi s. Prassii s. Phrasi) an; es besteht aus einem filzigen, äftigen Stängel mit eirunden, rundlichen, gestielten, gekerbten, oben runzeligen, unten filzigen weißlichen Blättern. Es hat einen starken, durch Trocknen sich verlierenden Geruch und einen bittern, etwas scharfen Geschmack.

Reizend, die Regeln treibend, krampfstillend, fieberwidrig und bisweilen abführend.

Conserva Marrubii albi. (Ams.)

℞. Summitatum Marrubii recentium
contusorum . . partem unam.
Sacchari albi . . . partes tres.

Triturando misce.

Succus Marrubii albi. (Wür.)

℞. Herbae Marrubii recentis
quantum vis.

Contunde in mortario lapideo, aquae pauxillo humectando, exprime fortiter, succum sepone, decantha et in lagenis serva, cuique librae Alcoholis drachmam unam addendo.

Gabe, eine bis zwei Unzen.

Extractum Marrubii albi aquosum. (A. Ams. An. Bor. D. Fer. Han. Hass. HassP. Li. Lus. O. Pol. Sax. *Pid. Vm.*)

℞. Foliorum Marrubii recentium
quantum vis.

Contunde cum Aquae pauxillo et per pannum trajice; sepone, decantha et prope ignem coagulatum iterum cola; ad massae pilularis consistentiam redacto et ab igne remoto adde faeculam ante repositam et iterum vaporando ad aptam spissitudinem redige. (*Vm.*)

℞. Herbae Marrubii partem unam.
Aquae communis . partes octo.

Macera per horas viginti quatuor, tunc per horae quadrantem coque et cola fortiter exprimendo; residuo cum Aquae partibus quatuor cocto, liquores commixti, post horarum viginti quatuor sepositionem ad extracti consistentiam evaporent. (Li. Sax.)

℞. Herbae Marrubii . partem unam.
Aquae bullientis . . partes octo.

Coque leviter per horae quadrantem

et cola exprimendo, residuum cum quatuor partibus Aquae coctum itidem coletur; liquores commixti et post sufficientem sepositionem decanthati leni calore ad extracti consistentiam evaporent. (Bor D. Han. O.)

A. et Pol. Herbam pluribus coctionibus sequentibus penitus extrahere et liquores commixtos et decanthatos in balneo aquae vaporatione inspissare.

HassP. ut extractum Cardui benedicti I. p. 418; — *T.* ut extractum Centaurii minoris I. p. 449.

℞. Herbae Marrubii albi libram unam.
Aquae fontanae . libras decem.

Coque per horas duas, cola exprimendo et liquorem repositum atque per manicam trajectum ita consume, donec non ultra digitis adhaereat. (Ams.)

Hass. Lus. et *Pid.* coquere jubent Herbae partem unam in Aquae sex, colare exprimendo et liquorem decanthatum post horarum viginti quatuor sepositionem vaporare; — An. Coquere Herbae libras duas in Aquae decem per horae quadrantem et decoctum decanthatum vaporare; — Fer. Coquere Herbae partem unam in Aquae tribus, albumine clarificare et colaturam vaporatione inspissare.

Fi. ut extractum Absinthii.

Gabe, von einem Scrupel bis zu einer Drachme.

Extractum Marrubii albi alcoholicum. (Bor4. Ful. Wür.)

℞. Herbae Marrubii albi,
Alcoholis, singulorum libram unam
Aquae communis . . libras octo.

Digere, blando calore, per tres dies, cola exprimendo, repone et decantha liquorem, alcoholem destillatione elice et residuum ad aptam consistentiam consume.

Bor4. ut extractum Absinthii.

Mixtura Marrubii, Potio pectoralis. (*Au.*)

℞. Extracti Marrubii,
— Graminis,
singulorum drachmas duas.
Decocti Taraxaci . uncias decem.
Oxymellis scillitici,
Syrupi Foeniculi,
singulorum uncias duas.

Gabe, alle zwei Stunden ein halbes Glas.

Syrupus de Marrubio s. Marrubii s. Prassii albi. (Gal. His. *T.*)

℞. Foliorum Marrubii albi siccatorum uncias duas.
Aquae . . . . . libras duas.

Infunde et adde colaturae
Sacchari . . . libras quatuor.

Syrupum cola. (His.)

T. Marrubii uncias sex, Aquae bullientis libras quatuor, infunde per horas duodecim et colaturae adde Sacchari pondus duplum.

℞. Foliorum siccatorum Marrubii albi unciam unam.
Aquae destillatae Marrubii albi libras duas.

Digere in balneo aquae, vase tecto, per horas duas, cola, filtra et liquori adde

Sacchari albi . . . . duplum.

Solve in balneo aquae. (Gal.)

GalH. Infusionis partem unam cum tribus Syrupi communis, antea ad globulum cocti, miscendo syrupum parare jubet.

Gabe, eine halbe bis zwei Unzen.

Aqua Marrubii. (Pal. Sar.)

℞. Herbae Marrubii recentis partem unam.
Aquae . . . . partes quatuor.
Destillet dimidia pars.

Mastix.

Mastiche, Resina Mastichis s. Lentisci; Μαστίχη; Maſtix; Mastic (*Gal.*); Mastiche (*Ang.*); Arah, Auluk bagdadic (*Ar.*); Mastix (*D. Suec.*); Almaciga (*His.*); Ramie mustakie (*Duk. Hin.*); Kinneh (*Pe.*); Mastyx (*Pol.*); Almeceda (*Lus.*); Rumie mastiki (*Tam.*); Sakes (*Tc.*).

Ams. An. B. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Han. Hass HassP. His. Li Lon. LonN. Lus. O. Pal. R. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *A. Be. Br. C. Fi. G. M. Par. Pid. Sp. T. Z.*

In Tropfen oder unregelmäßigen, trocknen, zerreiblichen, gelblichen, halbdurchſichtigen Maſſen, gerieben von angenehmem Geruch und gekaut, ſich erweichend, von ſcharfem, gewürzhaften Geſchmack und einem glänzenden, glaſigen Bruche.

Es iſt ein Harz, welches aus Einſchnitten in die Rinde von Pistacia Lentiscus, L, einem Strauche (Dioecia Pentandria, L.; Terebinthaceae, *J.*) des ſüdlichen Europa's ausfließt. (*Blackw.* Herb. t. 195. *Plenck.* t. 710. Düss. off. Pfl. IX. 16. *Bert.* Bild. II. 94. f 2.)

Toniſch, reizend, magenſtärkend.

Pulvis ad fluorem album. (Pal.)

℞. Radicis Iridis Florentinae semunciam.
Cornu Cervi usti,
Gummi Arabici,
Ossis Sepiae,
Coralli albi praeparati,

Crystalli mineralis (?),
Olibani,
Mastichis,
singulorum drachmam unam.
Fiat pulvis. — Gabe, von einer halben Drachme bis zu zwei Scrupel und mehr, in einem passenden Vehikel.

Trochisci masticatorii. (*Au.*)
℞. Mastichis,
Cerae albae,
Zingiberis,
singulorum partes aequales.
Fiant trochisci ponderis drachmae dimidiae.

Massa odontalgica. (B*. *Br**.)
℞. Mastichis,
Sandaracae,
singulorum drachmas duas.
Kino . . . . . grana decem.
Opii . . . . . grana duo.
Olei essentialis Rorismarini
guttas octo.
Spiritus Cochleariae
quantum sufficit.
Fiat massa mollis. (B*.)
*Br** Mastichis, Sandaracae, singulorum drachmas duas, Sanguinis Draconis semidrachmam, Opii grana sex, Olei Rorismarini guttas octo et Spiritus Cochleariae sufficientem quantitatem.
Man füllt damit die angefressenen Zähne aus.

Decoctum mastichinum. (Br.)
℞. Mastichis electi . unciam unam.
Crustae Panis albi semilibram.
Macidis . . . drachmam unam.
Aquae purae . . libras quatuor.
Decoque ad librarum duarum remanentiam, cum Rasura Cornu Cervi clarifica et cola; colaturae adde
Conservae Rosarum uncias quatuor.
Aquae Cinnamomi simplicis
uncias duas.

Aqua mastichina. (Br. Pal. Wir. *Sp.*)
℞. Mastichis . . . uncias quatuor.
Nucis moschatae unciam unam.
Alcoholis . . . libram unam.
Post tres dies digestionis adde
Aquae purae . . libras quatuor.
Destillent librae tres. (Br. Wir. *Sp.*)
Pal. Mastichis uncias quatuor, Macidis duas, Caryophyllorum unam, Cinnamomi dimidiam et Vini generosi libras quatuor.
Magenstärkend. — Gabe, bis zu einer Unze.

Spiritus Mastiches compositus s. matricalis. (Ams. B*. Bor. Bor4. Br. Han. O. Pal. Sax. Wir.)
℞. Mastiches,
Myrrhae,
Olibani, singulorum partem unam.
Alcoholis partes viginti quatuor.
Post horas viginti quatuor macerationis destillent partes duae. (B*. Bor. Bor4. Han. O. Sax.)
Br. Cujusque trium dictarum substantiarum sesquiunciam et Alcoholis libras quatuor.
℞. Mastiches,
Myrrhae,
Olibani,
Succini, singulorum uncias duas.
Alcoholis (0,907) . . libras tres.
Post quatuor dierum digestionem destillet sesquilibra. (Ams.)
Pal. et Wir. Quatuor substantiarum cujusque semunciam et Alcoholis nonaginta sex.
℞. Mastiches . . . uncias quatuor.
Cinnamomi . . . semunciam.
Caryophyllorum,
Nucis moschatae,
singulorum drachmas tres.
Zingiberis,
Galangae,
Cardamomi minoris,
Corticis Winterani,
singulorum drachmas duas.
Alcoholis . . . . libras decem.
Post aliquot dies digestionis adde
Aquae fontanae . . libras duas.
Destillent librae novem. (Br. Wir.)
In Waschungen bei Schwäche und Lähmungen.

Elixir mastichinum s. Mastichis. (Br. Wir.)
℞. Spiritus Mastiches . libras duas.
Aquae fontanae . libram unam.
Sacchari albi . . uncias decem.
Misce.

Syrupus mastichinus s. Mastichis. (Br. Wir.)
℞. Mastichis electi parumper contusi
uncias duas.
Aquae Mastiches uncias duodecim.
Infunde in vase bene clauso, per tres dies, cola deinde et colaturae adde
Sacchari albi . uncias sedecim.

Oleum Mastiches s. mastichinum. (Br. Sar. Wir. *Fi. T. Vm.*)
℞. Mastiches . . . partem unam.
Olei Olivarum . partes quatuor.
Dissolve in balneo aquae. (Sar. *Vm.*)
Br. et Wir. vel cujusque partes aequales vel Mastiches partem unam et quatuor Olei Rosarum praescribunt.
T. Mastiches uncias sex, Olei Rosarum libras duas; — *Fi.* Olei Rosarum libram unam, Mastiches uncias tres, Vini albi generosi uncias qua-

taor; coque ad consumptionem vini et cola.

Ehedem zur Stillung von Erbrechen und Durchfall empfohlen. — Bei Magen- und Verdauungsbeschwerden auf die Magengegend ꝛc. eingerieben. (*T.*)

Liquor ad odontalgiam s. antiodontalgicus. (*Sw.*)

℞. Mastiches . . . . quantum vis.
Essentiae Terebinthinae
quantum sufficit.
Dissolve.

Emplastrum ad dolores dentium s. antiodontalgicum s. mastichinum. (Br. *Pal.*)

℞. Mastiches,
Carannae,
Elemi,
Tacamahacae,
singulorum unciam unam.
Storacis Calamita . semunciam.
Olei Nucis moschatae
scrupulos octo.
Terebinthinae . . semunciam.
Misce. (Pal.)

Br. Mastiches sesquiunciam, Animae semunciam, Elemi, Tacamahacae, singulorum tantidem, Cerae flavae uncias tres, Olei Mastiches semunciam et Terebinthinae drachmas duas.

Tinctura s. Essentia Mastiches s. vulneraria simplex s. mastichina. (Ams. Br. Ful. *Sw.*)

℞. Mastiches electi partem unam.
Alcoholis (0,884) . partes octo.
Infunde per dies septem et cola. (Ams. Ful.)

Br. Mastiches unciam unam et quatuor Alcoholis concentrati; — *Sw.* Mastiches unciam unam et Alcoholis (0,935) libram unam.

Schwach reizend, ehedem besonders bei Beinfraß und Knochenwunden, so wie auch bei hartnäckigen Diarrhöen.

Tinctura Mastiches composita. (*Ca.*)

℞. Mastiches,
Olibani,
Myrrhae, singulorum uncias duas cum dimidia.
Alcoholis . . uncias sexaginta.
Post sufficientem digestionem filtra. — Reizend, bei Schrunden und Frostbeulen der Füße und Hände.

Matricaria.

Matricaria Parthenium, L.; Mutterkraut; Matricaire (*Gal.*); Common fever-few (*Ang.*); Matecnjk, Kzimbaba (*B.*); Matrum (*D.*); Matricaria (*His. I. Lus.*); Maruma ziele (*Pol.*); Matram (*Suec.*).

Ams. An. B. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Fer. Ful. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. His. Li. Lus. O. Pol. Sax. Wir. Würt. *Be. Br. G. M. Pid. Sp.* Z.

♃ (Syngenesia Polygamia Superflua, L.; Syanthereae, *Cass.*) Eine in ganz Europa wachsende Pflanze. (*Hayne* VI. 20. *Bull.* t. 205. *Blackw.* t. 291. *Plenck* t. 618. *Zorn* Ic. pl. t 166.)

Man wendet das Kraut (herba Matricariae s. Parthenii) an; es besteht aus einem gerieften Stängel und abwechselnden, gestielten, gefiederten, in fiederspaltige Läppchen, deren kleinere Fiederchen eingeschnitten und etwas stumpf sind, getheilten Blättern.

Die Spitzen bestehen aus endständigen Sträußen strahliger, in der Mitte gelber, im Umkreise weißer Blüthenköpfchen.

Der Geruch ist stark, durchdringend und unangenehm, verliert sich aber durch Trocknen; der Geschmack ist bitter und gewürzhaft.

Reizend, antihysterisch, die Regeln und Würmer treibend. — Gabe des Pulvers, ein Scrupel bis eine Drachme; des Saftes, eine bis zwei Unzen; des destillirten Wassers, eine bis drei Unzen. — Eine oder zwei Drachmen sind für zwei Pfund Aufguß hinreichend.

Syrupus Matricariae. (*T.*)
ut syrupus Erysimi I. p. 623. paratur.

Extractum Matricariae. (*Fi.*)
ut extractum Absinthii.

Aqua Matricariae. (*Fi. T.*)
℞. Florum Matricariae libras tres.
Aquae communis libras duodecim.
Destillent librae sex. (*Fi.*)
T. ut aquam florum Chamomillae.

Mechoacanna.

Convolvulus Mechoacanna, Röm. et *Schult.*; Mechoacanna; Mechoacan, Jalap blanc, Rhubarbe blanche ou des Indes, Bryone d'Amérique, Scammonée d'Amérique (*Gal.*).

Ams. B. Br. Fer. Gal. His. Wir. Würt. *Be. Br. G. M. Sp.* Z.

♃ (Pentandria Monogynia, L.; Convolvulaceae, *J.*) Eine Pflanze Mexico's und Brasilien's. (*Piso* de med. Bras. p. 93.)

Man wendet die Wurzel (radix Mechoacannae s. Mechoacannae albae s. Jalappae albae) an; sie ist sehr dick, außen aschgrau oder rothbraun, innen weiß. Man verkauft sie in trocknen, weißlichen, etwas weichen und faserigen Stücken. Der Geschmack ist süßlich, aber etwas scharf.

Sie enthält kein Harz, aber einen ihm ähnlichen öligen Stoff und viel Satzmehl.

Ein wenig angewendetes Purgirmittel. — Gabe, von vier Scrupel bis zu zwei Drachmen.

Melilotus.

Zwei Arten dieser Pflanzengattung kommen in den Pharmacopöen in Erwähnung:

Melilotus coeruleus, Lamk.; blauer Steinklee, Siebengezeit; Mélilot bleu, Faux baume du Pérou, Lotier odorant, Trèfle musqué (*Gal.*); Blue melilot trifoil (*Ang.*); Bleauwe melilot (*Bel.*). Gal. Wir. *Sp.*

☉ (Diadelphia Decandria, L.; Leguminosae, *J.*) Eine in Europa wachsende Pflanze. (*Blackw.* Herb. t. 284.)

Man wendet das blühende Kraut (herba Aegyptiaca s. Meliloti coerulei s. Loti odoratae s. urbanae) an; es besteht aus einem ästigen Stängel mit aus drei eirunden, fein sägezähnigen Blättchen bestehenden, an der Basis großen gezähnten Nebenblättern begleiteten Blättern; die blaßblauen Blüthen stehen in den Blattwinkeln auf langen Stielen und bilden Trauben, welche eirunde, gedrängte Aehren zusammensetzen. Es hat einen starken, aber nicht unangenehmen Geruch und einen etwas scharfen Geschmack.

2) *Melilotus officinalis, Lamk.*; Steinklee, Melilotenklee; Mélilot officinal (*Gal.*); Melilot trifoil (*Ang.*); Komonice (*B.*); Amur, Steenklover, Meloten (*D.*); Meliloto (*His. Lus.*); Meliloto, Ghirlandetta, Erba solfanina o vetturina (*I.*); Meloten (*Bel. Suec.*); Komonika swoyska (*Pol.*); Meliloto (*Lus.*).

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. DD. Fenn. Fer. Gal. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Lus. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *Be. Br. Fi. G. M. Pid. Sp.* Z.

☉ Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (*Hayne* II. 31. *Bull.* t. 255. *Blackw.* t. 80. *Plenck* t. 567 Düss. off. Pfl. VII. 13. *Berl.* Bild. VII. 27. f. 1. *Zorn* Ic. pl. t. 204.)

Man wendet das blühende Kraut (herba Meliloti citrinae) an; es besteht aus einem glatten, ästigen Stängel mit eirunden, sägezähnigen Blättern und langen Trauben gelber Blüthen in den Achseln der obern Blätter. Der Geruch ist stark und angenehm, der Geschmack bitter und etwas scharf.

Beide Pflanzen sind erweichend.

Sacculus resolvens. (*Bo.*)

℞. Florum Meliloti pulveratorum unciam unam.
Camphorae . drachmam unam.
Misce.

Oleum volatile Florum Meliloti. (T.)

Ut oleum florum aurantii I. 524.

Oleum Meliloti. (Gal. Sar. *Sw**.)

℞. Florum Meliloti . partem unam.
Olei Olivarum . . . partes sex.
Infunde leni calore per dies tres, cola et filtra. (*Sw**)

Sar. Digerere jubet Florum partem unam in Olei duabus in balneo aquae per tres dies, post refrigerationem exprimere et macerationem repetere; — Gal. Macerare soli exposita per tres dies Florum partem unam in Olei quatuor, operationem ternis sequentibus vicibus repetere et tertia vice per menses tres productam; — T. Florum partem unam, Olei duodecim, flores siccatos tamen in aqua tepida antea mollefactos.

Aeußerlich gegen Scropheln und erstentstandene Frostbeulen.

Emplastrum Meliloti s. Trifolii Meliloti officinalis. (An. B. Bel. Bor. Bor4. D. DD. Ful. Han. Hass. HassP. Li. O. Pal. Pol. R. Sar. Sax. Wir. *Fi. Pid. Sp. Sw. Vm.*)

℞. Cerae flavae,
Colophonii pulverati,
Olei Olivarum,
singulorum partem unam.
Liqua et mixturae semirefrigeratae adde
Pulveris Herbae Meliloti
partes duas.
Misce bene. (Sax. *Sw.*)

Bor. Fenn. Han. Pol. et Suec. Cerae partes duas, Colophonii unam, Olei unam et duas Meliloti pulverati; — Bor4. HassP. Cerae flavae libram unam, Colophonii, Olei, singulorum libram dimidiam, Meliloti libram unam; — O. Cerae uncias quatuordecim, Colophonii, Olei, singulorum uncias sex, Pulveris Meliloti libram unam et Extracti Meliloti unciam unam; — R. Cerae partes tres, Resinae sex, Sevi vervecini quatuor, Olei unam et duodecim pulveris Meliloti; — An. Cerae partes octo, Resinae Pini quatuor, Terebinthinae duas cum dimidia et Pulveris Meliloti quatuor.

℞. Summitatum florescentium Meliloti
partes tres.
Sevi hircini . . partes quatuor.
Coque ad humidi consumptionem, cola et adde
Colophonii . . . . partes sex.
Cerae . . . . partes tres.
Liqua simul.

D. Summitatum florescentium partes quatuor, Sevi hircini quinque, Co-

lophonii octo et Cerae quatuor; — Ful. Summitatum florescentium tres, Sevi duas, Resinae Pini tres et Cerae unam cum dimidia; — *Vm.* Cerae flavae octo, Resinae Pini quatuor, Terebinthinae unam, quatuor Summitatum florescentium, duodecim horas digestionis et additionem Styracis liquidae partis dimidiae.

℞. Emplastri Plumbi,
Cerae flavae,
singulorum libram unam.
Olei Olivarum . . . uncias sex.
Mixturae fusae ac semirefrigeratae adde
Pulveris Meliloti . uncias octo.
Misce bene. (Bel.)

B. eandem ipsam formulam sed Pulveris Meliloti libram unam.

℞. Emplastri citrini . sesquilibram.
Olei Olivarum . libram unam.
Resinae Pini . . . libras sex.
Cerae flavae . . . libras tres.
Gummi Ammoniaci uncias quatuor.
Liquatis post semirefrigerationem sensim adde
Pulveris Herbae florescentis Meliloti libras duas.
— — — Absinthii libram unam.
Misce. (D.)

DD. Sevi vervecini uncias viginti sex, Resinae Pini triginta sex, Cerae flavae octodecim, Olei Napi sex, Gummi Ammoniaci duas, Pulveris Meliloti duodecim et Pulveris Absinthii sex; — Has. et *Pid.* Emplastri citrini sesquilibram, Pulveris Meliloti uncias quinque, Pulveris Radicis Althaeae duas, Gummi Ammoniaci unam et Terebinthinae Venetae duas; — *Fi.* Olei Olivarum, Florum Meliloti recentium, singulorum libras duas, Florum Meliloti sicc. pulv., Terebinthinae, singulorum uncias sex, Sevi vervecini libram unam, Cerae flavae uncias octo, Gummi Ammoniaci, Sagapeni, singulorum sesquiunciam; flores recentes cum oleo infundantur et post repetitam digestionem lege artis reliqua addantur.

℞. Olei Meliloti . . . libras duas.
Sevi hircini . . . libram unam.
Cerae flavae . . . uncias octo.
Terebinthinae . . . uncias sex.
Liquatis adde
Gummi Ammoniaci,
Sagapeni,
singulorum sesquiunciam.
Pulveris Meliloti . . uncias sex.
Misce bene. (Sar.)

Li. Emplastri citrini sesquilibram, Pulveris Meliloti uncias sex et unam Gummi Ammoniaci.

℞. Herbae florentis Meliloti uncias quatuor.
Florum Absinthii,
— Chamomillae,
Baccarum Lauri,
Seminum Apii,
singulorum drachmas sex.
Styracis . . . . . semunciam.
Gummi Ammoniaci unciam unam.
Commisce cum mixtura fusa e
Cerae flavae . . . unciis octo.
Sevi hircini . . unciis quatuor.
Terebinthinae,
Resinae Pini,
singularum sesquiuncia.
Olei Chamomillae unciis duabus.
Misce bene. (Br. Pal. Wir.)

℞. Emplastri Meliloti simplicis libras tres.
Terebinthinae . . . uncias sex.
Liquatis blando igne adde
Pulveris Florum Chamomillae
— — Meliloti,
singulorum uncias tres.
— Radicis Iridis,
— — Althaeae,
singulorum unciam unam.
— Croci . . . semunciam.
— Gummi Ammoniaci,
— Bdellii,
singulorum uncias duas.
— Foenu graeci unciam unam.
Misce. (His.)

Ceratum Meliloti simplex s. Baumèi, Unguentum emplasticum. (*Fi. T.*)

℞. Florum Meliloti,
Cerae flavae,
singulorum libras tres.
Sevi bubuli . . libras quatuor.
Resinae Pini . . . . libras sex.

Flores contusi et cum sevo commixti coquantur ad humidi consumptionem, colatis adde resinam et iterum cola, refrigeratis faeces separa, tum liquefac denuo et ceram adde.

T. Florum libras tres, Sevi bubuli libras quatuor, Resinae tres, Cerae sex.

Emplastrum Meliloti camphoratum. (DD.)

℞. Emplastri Meliloti uncias duas.
Camphorae pulveratae drachmam unam.
Misce sedulò.

Melissa.

Unter diesem Namen finden sich in den Pharmacopöen folgende Pflanzen:

1) *Melissa Calaminta, L.*; Bergmünze; Calament de montagne (*Gal.*); Montain balm (*Ang.*); Plana mata, Poleg,

Natkowe korenj, Marulka hornj (*B.*); Berg calaminth (*Bel.*).

Br. Fer. Gal. Gen. His. Wir. Würt. *Br. G. M. Sp.* Z.

♃ (Didynamia Gymnospermia, L.; Labiatae, J.) Eine Südeuropäische Pflanze. (*Blackw.* t. 166. *Bull.* t. 201. *Plenck* t. 501. *Zorn* Ic. pl. t. 111.)

Man wendet das Kraut (herba Calaminthae s. Calaminthae montanae s. Calmontanae) an; es besteht aus einem behaarten Stängel mit eirunden, ebenfalls behaarten, am Grunde fast herzförmigen, gleichgezähnten, fast stumpfen Blättern. Es hat einen starken gewürzhaften Geruch, welcher sich durch Trocknen sehr vermindert und einen scharfen, gewürzhaften Geschmack.

Reizend, nervenstärkend.

2) *Melissa Nepeta*, *L.*; polevartige Kalamint; Calament des champs, petit Calament (*Gal.*); Field balm (*Ang.*); Veldkalaminth (*Bel.*).

Gal. Würt.

♃ Eine in ganz Europa verbreitete Pflanze. (*Blackw.* Herb. t. 167.)

Man wendet das Kraut (herba Nepetae s. Calaminthae pulegii odore s. Calaminthae agrestis) an; es besteht aus einem etwas behaarten Stängel mit fast rundlichen und glatten, an jedem Rande mit zwei oder drei ungleichen Zähnen versehenen Blättern. Es hat einen gewürzhaften Geruch und Geschmack.

Reizend, nervenstärkend.

3) *Melissa officinalis*, *L.*; Melisse, Melissenkraut, Citronenmelisse, Citronenkraut; Mélisse officinale (*Gal.*); Common balm (*Ang.*); Bucklilulfaristum (*Ar.*); Melissa, Medunka (*B.*); Hiertenfryd (*D.*); Mekka subza (*Duk.*); Torongil (*His.*); Melissa officinale, Erba Cedronella (*I.*); Citronenkruid (*Bel.*); Badrunjbuyeh (*P.*); Melisce cytrynowa (*Pol.*); Herva cidreira (*Lus.*); Citron meliss (*Suec.*).

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. Has-P. His. Li. Lus. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Würt. WW. *A. Be. Br. G. M. Pid. Sp.* Z.

♃ Eine im mittägigen Europa wachsende Pflanze. (*Hayne* VI. 32. *Blackw.* t. 27. *Plenck* t. 500. *Zorn* Ic. pl. t. 134.)

Man wendet das Kraut (herba Melissae citrinae s. citratae s. hortensis s. Cedronellae) an; es besteht aus einem vierseitigen, ästigen, fast glatten Stängel mit gestielten, eirunden, am Grunde schwach ausgerandeten, am Rande gekerbten Blättern. Es hat einen angenehmen, citronenartigen Geruch und einen gewürzhaften, etwas scharfen Geschmack.

4) *Dracocephalum Moldavicum*, *L.*; Türkische Melisse; Melisse de Moldavie, Moldavique (*Gal.*); Moldavian mint (*Ang.*).

Br. Gal. Li. Wir. *Be. M. Sp.*

⊙ (Didynamia Gymnospermia, L.; Labiatae, J.) Eine in der Moldau und in Siberien wachsende Pflanze. (*Zorn* Ic. pl. t. 294.)

Man wendet das Kraut (herba Melissae turcicae s. Cedronellae) an; es besteht aus einem vierkantigen, glatten, ästigen Stängel mit eirundlanzettigen, fast glatten, gekerbten Blättern. Es hat einen gewürzhaften, durchdringenden, sehr angenehmen Geruch.

Beide letztere Pflanzen sind reizend und werden zu den krampfstillenden Mitteln gezählt.

Species pro thea. (HassP. *Huf.*)

℞. Herbae Melissae unciam unam.
Foeniculi . . . drachmas tres.
Liquiritiae . . drachmas duas.
Concisa misce.

Conserva Melissae. (R. *Fi.*)

℞. Foliorum Melissae recentium contusorum . . . partem unam.
Sacchari albi . . . partes duas.
Misce exacte et in loco frigido serva.

Fi. ut Conservam Cochleariae I. p. 545; — *T.* Foliorum et Sacchari, singulorum pondus aequale, contunde et pulpam per crinium trajice, quae cum libris duabus Sacchari in Aquae dimidio pondere soluti et coquendo vaporati commisceatur.

Cataplasma aromaticum. (GalM. *Br.*)

℞. Herbae Melissae . . uncias sex.
Florum Chamomillae uncias tres.
Baccarum Juniperi uncias quatuor.
Coque in
Aquae Vitae sufficiente quantitate ad pastae mollis consistentiam. (*Br.*)

GalM. coquere jubet Farinae Hordei et Cerealis, singularum partes centum in Vini rubri centum, sub finem addendo Pulveris aromatici partem tertiam.

Extractum Melissae. (Fer. Sar.)

℞. Herbae Melissae partem unam.
Aquae . . . . . partes tres.
Coque, cola exprimendo, colaturam albumine clarifica et probe inspissa. (Fer.)

℞. Herbae Melissae recentis et contusae libras octo.

Digere in alembico per tres dies, destillatione in balneo aquae deinde uncias duas circiter extrahe, residuo Aquae triplum infunde, coctione trientes duos consume et liquorem clarificatum et

colatum vaporando ad electuarii consistentiam redige eique tepido aquam destillatam adde. (Sar.)

Infusum Melissae. (GalM. *Ra.*)

℞. Foliorum Melissae semunciam.
Aquae bullientis . libras duas.
Infunde et cola. (*Ra.*)

℞. Herbae siccae Melissae,
Liquiritiae rasae, singularum drachmas duas cum dimidia.
Aquae bullientis
sufficientem quantitatem ut colaturae libras duas obtineas. (GalM.)

Gewürzhaft, schwach reizend, bei nicht entzündlichen Koliken und Verdauungsbeschwerden von Magenschwäche empfohlen.

Tisana carminativa. (*Ca.*)

℞. Foliorum Melissae drachmas duas.
Anisi,
Foeniculi,
Coriandri,
singulorum semidrachmam.
Aquae bullientis . . libras duas.
Infunde per horae quadrantem, cola et adde
Sacchari albi
sufficientem quantitatem.

Syrupus Melissae. (Wir.)

℞. Foliorum siccatorum Melissae
uncias quatuor.
Aquae destillatae Melissae
libram unam.
Digere in vase tecto per dies duos, exprime et adde
Sacchari albi . uncias sedecim.
Ebulliant semel.

Essentia Melissae composita. (*Vm.*)

℞. Foliorum Melissae partes duas.
— Rutae,
— Pulegii,
Corticis Citri recentis, singulorum partem unam cum dimidia.
Cinnamomi . . partem unam.
Spiritus Melissae
. partes viginti quatuor.
Infunde frigidè per plures dies, cola exprimendo et filtra.

Tinctura Melissae. (An. *Vm.*)

℞. Herbae Melissae partem unam.
Alcoholis (20°) . . partes octo.
Post tres dies infusionis filtra. — Reizend.

Oleum Melissae aethereum, Aethereolеum Melissae. (Br. Fer. Han. Pal. R. Wir. Wür. *Pid. Sw.*)

℞. Herbae Melissae recentis
quantum vis.
Aquae . . . quantum sufficit.
Destillent et oleum servetur. (Fer. R.)

Sw. Herbae partem unam et quatuor Aquae; — Han. Herbae unam et octo Aquae.

℞. Herbae Melissae recentis
partes viginti quinque.
Aquae partes septuaginta quinque.
Salis culinaris . . . partes tres.
Destillent. (Br. Pal. Wir. *Pid.*)

℞. Herbae Melissae recentis
quantum vis.
Aquae destillatae Melissae
quantum sufficit.
Destillent. (Wür.)

Aqua Melissae. (A. Ams. An. Ba. Bor. Bor4. Br. D. Fer. Ful. Gal. Gen. Hass. HassP. Li. O. Pal. Pol. Sar. Sax. Wir. WW. *Br. Fi. Pid. T. Vm.*)

℞. Herbae Melissae recentis
partem unam.
Aquae . . . . quantum sufficit.
Post horas viginti quatuor infusionis destillent partes decem. (Ams. Bor. O. Pal.)

Bor4. Herbae libras duas, Aquae quantum sufficit; destillando libras viginti elice; — HassP. Melissae libras tres, Aquae sufficientem quantitatem; destillent libras viginti quatuor; — D. et GalF. Herbae partem unam et Aquae sufficientem quantitatem; destillent partes viginti; — Han. Herbae partem unam et Aquae quantum sufficit; destillent partes tres; — Gen. Herbae partem unam et Aquae sufficientem quantitatem; destillent partes sex; — Gal. Pal. *Fi. T.* Herbae partem unam et quatuor Aquae; destillent partes duae; — An. Herbae partem unam et quinque Aquae; destillent partes quatuor; — Wür. et *Br.* Herbae partem unam et sex Aquae; destillent trientes duo; — Hass. et *Pid.* Herbae partem unam et octo Aquae; destillet dimidia pars; — A. Herbae unam et duodecim Aquae; destillent partes quatuor; — Sax. Herbae partem unam et Aquae quindecim; destillent trientes duo; — Ba. Herbae partem unam et sedecim Aquae; destillet quarta pars.

℞. Herbae Melissae recentis
partem unam.
Aquae . . . . partes quatuor.
Destillet dimidia pars atque destillatio repetatur supra novam herbam. (Sar.)

℞. Herbae Melissae recentis
partes tres.
Sacculo e tela confecto inclusam medio cucurbitae suspende continentis
Aquae . . . partes duodecim ita ut liquidum attingere non possit; destillent partes sex. (Ful. Li.)

℞. Herbae Melissae florescentis
partem unam.
Vini albi . . . . partes quatuor.
Destillet pars dimidia. (Br. Wir.)
Vm. Herbae florescentis partes decem, Aquae Vitae partem dimidiam et Aquae partes centum; destillent partes quadraginta.

Aqua Melissae spirituosa. (Li.)

℞. Aquae destillatae Melissae
partes duas.
Essentiae Melissae partem unam.
Misce.

Aqua Melissae antihysterica. (Wir.)

℞. Foliorum Melissae recentium
libram unam.
Baccarum Lauri,
Seminum Cumini,
singulorum unciam unam.
Myrrhae . . . . . semunciam.
Castorei . . . . drachmas duas.
Vini albi generosi libras duodecim.
Post sufficientem digestionem destillet dimidia pars.

Spiritus Melissae. (An. Br. Ful. Gal. Li. Lus. Pal. R. Sar. Sax. Wir. Wür. *Pid. T. Vm.*)

℞. Herbae Melissae partem unam.
Alcoholis (20°) . . partes duas.
Aquae . . . quantum sufficit.
Destillet spiritus (28°) indicans. (An.)
Vm. Herbae partem unam, Alcoholis tres et sex Aquae; destillent partes duae cum dimidia.

℞. Herbae Melissae partem unam.
Aquae Melissae . . partes duas.
Alcoholis . . . . partes octo.
Post horarum viginti quatuor macerationem destillent partes sex. (R.)
Gal. Herbae partes duodecim, Aquae Melissae destillatae tantidem et Alcoholis (22°) triginta sex; destillent partes triginta.

℞. Herbae Melissae
partem unam cum dimidia.
Aquae Vitae . . partes decem.
Post horas duodecim destillet dimidia pars. (Lus.)
Br. Pal. Sax. Wir. et *Pid.* Herbae partem unam et quatuor Aquae Vitae; — Ful. et Li. Herbae unam et sex Aquae Vitae; — *T.* Melissae libras duas, Spiritus Vini 32° B. libras octo; destillando libras quinque circiter elice.

℞. Herbae Melissae recentis
partem unam.
Alcoholis . . . partes quatuor.
Post viginti quatuor horarum digestionem destillent in balneo aquae ferè ad siccum; productum cum nova herba digere et destillationi subjice. (Sar.)
Wür. Herbae sesquilibram et sex Alcoholis; destillent iterum supra Herbae uncias tres.

Aqua aromatica, Spiritus aromaticus s. Melissae magistralis officinalis, Alcohol Melissae compositus, Aqua Melissae composita s. Carmelitana s. Carmelitarum s. Melissae spirituosa composita, Spiritus s. Alcohol Melissae compositus. (A. Ams. B. Bel. Br. D. Fer. Ful. Gal. GalM. Han. HassP. His. Lus. Pal. Sar. Wir. *Br. Ca. Fi. Huf. Sp. Sw. Vm.*)

℞. Herbae Melissae recentis
sesquilibram.
Corticis Citri recentis
uncias quatuor.
Nucis moschatae,
Coriandri, singulorum uncias duas,
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
singulorum unciam unam.
Alcoholis . . . . . libras sex.
Aquae Melissae . . libras tres.
Post dierum trium digestionem destillent librae sex. (Br. D. Sar. Wir.)

℞. Herbae Melissae uncias duodecim.
Corticis Citri . . . uncias duas.
Nucis moschatae unciam unam.
Coriandri . . . uncias quatuor.
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
singulorum unciam unam.
Radicis Angelicae . semunciam.
Alcoholis uncias sexaginta quatuor.
Infunde per aliquot dies et destillando uncias octoginta, octo elice. (Fer. *Sp.*)
Han. Melissae uncias octodecim, Corticis Citri quatuor, Nucis moschatae, Radicis Angelicae, singularum uncias tres, Caryophyllorum, Cinnamomi, singulorum unciam unam, Alcoholis libras sex, Aquae Melissae libras tres et tres dies digestionis; destillent librae septem; — *Br.* Melissae libras duas, Corticis Citri uncias quatuor, Nucis moschatae uncias duas, Coriandri uncias octo, Cinnamomi, Caryophyllorum, singulorum semunciam, Alcoholis uncias centum viginti et tres digestionis dies; destillent in balneo aquae uncias centum viginti; — *Fi.* Melissae, Corticum Limonum, Nucis moschatae, Coriandri, easdem quantitates ut *Br.* sed Alcoholis libras duodecim, Cinnamomi, Caryophyllorum, Radicis Angelicae, singulorum unciam unam, Aquae libras tres et post trium dierum digestionem, destillationem librarum decem; — Ful. Melissae uncias sedecim,

Corticis Citri quatuor, Cinnamomi duas, Nucis moschatae unam, Caryophyllorum drachmas duas, Vini albi libras octo et viginti quatuor horas digestionis; destillent librae quatuor; — Lus. Melissae libras duas, Corticis Citri uncias quatuor, Cinnamomi uncias duas, Nucis moschatae unam, Caryophyllorum drachmas duas, Aquae Vitae libras decem et tres dies macerationis; destillent librae quinque; — HASP. Melissae recentis libras duas, Corticum Citri recentium uncias quatuor, Nucum moschatarum, Radicis Angelicae, singulorum uncias tres, Caryophyllorum, Cassiae cinnamomeae, singulorum unciam unam, Spiritus Vini rectificati libras sex, Aquae Melissae libras tres; post trium dierum macerationem destillent librae septem; — Ams. B. et Bel. Melissae uncias quatuor, Corticis Citri, Nucis moschatae, Coriandri, singulorum unciam unam, Caryophyllorum, Cinnamomi, singulorum semunciam, Aquae Vitae libras quinque et tres dies digestionis; destillent librae tres; — His. Melissae uncias octo, Corticis Citri, Corticis Aurantii, singulorum uncias duas, Nucis moschatae, Coriandri, singulorum unciam unam, Cinnamomi semunciam, Aquae Vitae libras quatuor et macerationis horas viginti quatuor; destillet dimidia pars; — *Siw.* Nucis moschatae unciam unam, Coriandri uncias quatuor, Cinnamomi, Radicis Angelicae, singulorum sesquiunciam, Caryophyllorum unciam unam, Corticis Citri uncias duas, Aquae Melissae libras duas, Alcoholis libras quatuor et octo dies digestionis; destillent; — A. Melissae libras duas, Corticum fructuum Citri decem, Radicis Angelicae, Cinnamomi, singulorum uncias tres, Coriandri uncias sex, Alcoholis (0,910) libras undecim et Aquae fontanae libras sex; destillent librae decem.

℞. Herbae Melissae,
— Menthae piperitae,
— Salviae,
— Rorismarini,
Florum Lavandulae,
Foeniculi, singulorum uncias tres.
Radicis Angelicae . uncias duas.
— Calami . uncias quatuor.
Alcoholis . . . libras quatuor.
Aquae sufficientem quantitatem.

Post horas viginti quatuor macerationis destillent librae duodecim. (B^a. *Huf.*)

℞. Florum Rosarum rubrarum,
— Rorismarini,
singulorum uncias quatuor.
Florum Lavandulae,
— Liliorum Convallium,
singulorum manipulos tres.
Herbae Majoranae,
— Melissae,
singularum manipulum unum.
Cardamomi minoris,
Caryophyllorum,
Macidis,
Cubebarum,
singulorum unciam unam.
Cinnamomi . . . uncias duas.
Spiritus Cerasorum nigrorum
octarios sex.

Post decem dies digestionis destillent. (Pal.)

℞. Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Nucis moschatae,
Anisi,
Coriandri,
singulorum partem unam.
Hyssopi,
Majoranae,
Rorismarini,
Salviae,
Thymi, singulorum partes duas.
Corticis Citri recentis,
Radicis Angelicae,
singulorum partes quatuor.
Melissae recentis partes duodecim.
Aquae Vitae partes centum nonaginta duas.
— purae partes quingentas septuaginta sex.

Destillent partes centum viginti octo. (*Vm.*)

℞. 1) Melissae . . . partes viginti.
Angelicae . . partes quinque.
Alcoholis (22°)
partes ducentas quinquaginta.

2) Cinnamomi . partes quinque.
Caryophyllorum,
Nucis moschatae,
singulorum partes tres.
Alcoholis (22°)
partes centum et decem.

3) Anisi . . . . . partes duas.
Coriandri . . partes quinque.
Corticis Citri siccati
partem unam.
Alcoholis (22°) partes octoginta.

4) Rorismarini,
Majoranae,
Hyssopi,
Thymi,
singulorum partes duas.
Salviae . . . partes quatuor.
Alcoholis (22°)
partes centum viginti.

Destillent seorsim in aquae balneo, tunc productis quatuor commixtis adde Aquae ponderis totius mixturae partem

decimam et in balneo aquae destillatione quatuor partes quintas elice. (GalM.)

℞. Cinnamomi,
Caryophyllorum integrorum,
Nucis moschatae,
Anisi,
Coriandri,
Corticis siccati Citri,
singulorum partem unam.
Alcoholis (22°) . . partes mille.

Macera harum substantiarum quamque seorsim per dies duos vel tres in Alcoholis partibus nonaginta sex; destillent deinde in balneo aquae et quodque productum seorsim excipe. Praeterea per duos dies in Alcoholis eadem ipsa quantitate infunde et quamque seorsim destillationi subjice

Herbae Angelicae integrae,
— florentis Rorismarini,
— — Majoranae,
— — Hyssopi,
— — Thymi,
— — Salviae,
singularum partem unam.

Macera praeterea et destillationi subjice

Foliorum Melissae recentium partem unam.

Recipe deinde urceolos tres, quorum primo infundas

Spiritus Cinnamomi,
— Coriandri, singulorum partes tres cum dimidia.
— Caryophyllorum,
— Nucis moschatae,
singulorum partes tres.
— Anisi . . . partes duas.
— Corticis Citri partem quartam

secundo

— Angelicae partes decem.
— Rorismarini . partes sex.
— Majoranae,
— Thymi,
singulorum partes septem.
— Hyssopi . . partes octo.
— Salviae partes quindecim cum dimidia.

Spiritu Melissae solo tertio urceolo intromisso, commisce contenti urceoli primi partes quinque, quinque secundi et quinque cum dimidia tertii, omnia retortae infunde, adde totius partem decimam Aquae fontanae et Sacchari pulverati partem octogesimam, et destillationem ad quintae partis remanentiam continua, quod in excipulum transiit excipiendo. (Gal. *Ca.*)

T. Aquarum spirituosarum Cinnamomi, Caryophyllorum, Nucum Moschatarum, Coriandri, Anisi, Citri, singularum uncias quatuor, lagenae immissas Aquae spirituosae Angelicae, Rorismarini, Majoranae, Hyssopi, Thymi, Salviae alii lagenae ingestas; in retortam vitream amplam tubulatam intromissis (singulis 30° B. indicantibus) infunde Aquae spirituosae simplicis Melissae libras duas, addendo Aquae pluvialis vel destillatae uncias duodecim et Sacchari albi raffinati uncias duas; destillent librae quinque cum dimidia; in lagenis smiri obturatis per tempus aliquot in mixtura e glacie contusa et sale communi immersa tene *).

Aqua dentifricia. (Pie.)

℞. Alcoholis . . . uncias viginti.
Spiritus Cinnamomi,
— Lavandulae,
— Citri,
Aquae Melissae compositae,
singulorum drachmas quinque.
Misce.

Acetum odoratum s. bezoardicum s. odoriferum s. aromaticum. (B*. Br. Ful.)

℞. Herbae Levistici . uncias duas.
Foliorum Melissae,
— Rutae,
singulorum uncias quatuor.
Juglandium viridium concisorum libras duas.
Fructuum Citri recentium contusorum . . . . libram unam.
Aceti . . . . . libras decem.

Post horas duodecim digestionis destillent ferè ad siccum. (Br.)

℞. Aceti . . . . . uncias duas.
Spiritus Melissae . semunciam.
Olei essentialis Citri,
— — Lavandulae,
singulorum guttas decem.
— — Caryophyllorum guttas quatuor.
Misce. (B*. Ful.)

Melittis.

Melittis Melissophyllum, *L.*; Wanzenmelisse; Melitte à feuilles de mélisse (*Gal.*); Bastard balm (*Ang.*); Vild hiertens fryd (*D*); Melissebladig kruisbloem (*Bel.*).

*) Das Eintauchen in eine kältende Mischung ist nämlich das wirksamste Mittel, den brenzlichen Geruch schnell zu benehmen. (*T.*)

Gal. Wir. Würz. *M. Sp.*

(Didynamia Gymnospermia, L.; Labiatae, J.) Eine in Europa sehr gemeine Pflanze. (*Jacq.* Fl Aut t. 26.)

Man wendet das Kraut (herba Melissophylli s. Lamii montani s. Melissae humilis) an; es besteht aus einem vierseitigen, behaarten Stängel mit gestielten, eirundlänglichen, spitzigen, gekerbten Blättern. Es hat einen unangenehmen, beim Trocknen angenehm gewürzhaft werdenden Geruch und einen etwas bittern Geschmack.

Reizend, ehedem als ein Mittel, Gries abzuführen und die Regeln zu befördern, betrachtet.

Meloë.

In der Medicin benutzt man zwei Käfer dieser Gattung:

1) *Meloë majalis, Oliv.;* Maikäfer, Maiwurm; Meloë de mai (*Gal.*); Oil beetle (*Ang.*); Oliebille (*D.*); Carralejas, Aradejos (*His.*); Meyworm (*Bel.*); Majbagge (*Suec.*).

Fer. Ful. Han. Sax. Wir. *Br. G.*

Ein zu der Abtheilung der Heteromeren (Trachelides Cantharidiae, *Lat.*) gehöriger, in Europa gemeiner Käfer. (*Leach* Trans. Soc. Linn. XI. VI. 1. 2. *Panz.* X. 13.) Der Körper ist bronzirt und kupferroth.

2) *Meloë Proscarabaeus, L.;* Meloë proscarabée (*Gal.*)

Br. D. Fer. Ful. Han. His. R. Sax. Wir. *G Sp.*

Ein Insect (Vermis majalis s. Scarabaeus mutuarius), (*Leach.* l. c. VII 6. 7. *Panz.* X. 12) von violettschwarzer Farbe, chagrinartig und glänzend.

Electuarium antilyssicum s. ad rabiem. (B*. Ful. Wir)

℞. Meloum absque capitibus no 24.
Theriacae . . . . uncias duas.
Ligni Taxi . . drachmas duas.
Radicis Serpentariae Virginicae drachmam unam
Fungi querni (bédégnar de frêne) grana viginti.
Mellis in qua insecta sunt suffocata . . . quantum sufficit.
Fiat electuarium. (Wir.)

℞. Meloës . . . . . no. 1
Mellis in cujus libra una insecta octoginta sunt suffocata quantum sufficit
ut fiat pulpa.
Theriacae . grana quadraginta.
Olei Meloum infusi . guttas sex
Ligni Ebeni parvam quantitatem
Roob Sambuci quantum sufficit.
Misce. (B*.)

Dieses Mittel genoß nur bis zum Jahr 1782 einigen Ruhm als gegen die Wuth wirksam. Friedrich II. kaufte das Geheimniß und seit der Zeit ist nicht mehr davon die Rede. Auch würden die Maikäfer nichts gegen diese Krankheit ausrichten, wohl aber könnten sie, wegen ihrer fast blasenziehenden Schärfe, äußerlich in Einreibungen nützlich seyn; auch wendet man sie in Schweden mit Erfolg gegen Rheumatismen an.

Sp's. Oleum Scarabaeorum. Scarabaeorum stercorariorum uncias octo, Olei Lauri sedecim, coque ad humidi usque consumptionem — wird für nervenstärkend und auflösend gehalten.

Potio antilyssica s. ad rabiem. (B*. *Au.*)

℞. Meloum . . . . . no. 8.
Theriacae Andromachae semunciam.
Salis Cornu Cervi drachmas duas.
Camphorae . drachmam unam.
Spiritus Mindereri . uncias octo.

Auch Selle's Ansehen konnte dieser Potion keinen bleibenden Credit erhalten.

Mentha.

Unter den Arten dieser Gattung findet man besonders folgende neun in den Pharmacopöen angezeigt:

1) *Mentha gentilis, L.;* Gartenmünze, Gartenbalsam; Menthe apparente, Baume des jardins (*Gal.*).

Gal. *Be. G. Sp.*

4 (Didynamia Gymnospermia, L.; Labiatae, J.) Eine Europäische Pflanze. (*Oed.* Fl. Dan. t. 736 *Schk.* t. 158.)

Man wendet das Kraut (herba Menthae balsaminae an; es besteht aus einem etwas behaarten, sehr ästigen Stängel mit eirunden, gestielten und gezähnten Blättern. Es hat einen angenehmen Geruch und einen etwas scharfen und bittern Geschmack.

2 *Mentha aquatica, L.;* Wassermünze, Bachmünze; Menthe aquatique (*Gal.*); Watermint (*Ang.*); Czerwena mata (*B.*); Hestermynte (*D.*); Yerba buena dos rios (*His.*); Watermint (*Bel.*); Menta acquatica (*I.*).

A Fer. Gal. GalM. WW. *G. Sp.* Z.

4 Eine Pflanze Europa's. (*Blackw.* Herba t. 32.)

Man wendet das Kraut (herba Menthae aquaticae s. rubrae s. Balsami palustri) an; es besteht aus glatten Stängeln mit ebenfalls glatten, gestielten, eirundherzförmigen, gezähnten Blättern. Der Geruch ist nicht sehr angenehm, aber stark, der Geschmack bitter und etwas scharf.

3) *Mentha arvensis, L.;* Ackermünze; Menthe des champs, Pouliot thym (*Gal.*); Corn mint (*Ang.*).

Gal.

4 Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (*Oed.* Fl. Dan. t. 512.)

Man wendet das Kraut (herba Menthae equinae s sylvestris) an; es besteht aus einem viereckigen, schwachen, ästigen Stängel mit gegenüberstehenden, eirunden, spitzigen, gestielten, stumpfzähnigen, graulichen Blättern. Es hat einen unangenehmen Geruch und einen bittern, etwas scharfen Geschmack.

4) *Mentha crispa*, *L.*; Krausemünze, Blumenkopfkrausemünze; Menthe crépue (*Gal.*); Carted mint (*Ang.*); Kaderawa mata, Bolssam zahradny (*B.*); Krusemynte (*D.*); Menta rizada (*His.*); Kruizenmunt (*Bel.*); Menta crispa (*I.*); Faka (*Jav.*); Fodor mentha (*M.*); Mienta kedzierzawa (*Pol.*); Hortel: vulgar (*Lus.*); Miata (*R.*); Krusmynta (*Suec.*).

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. Li. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. *Be. Br. G M. Pid. Sp.* Z.

4 Eine Europäische Pflanze. (*Blackw.* t 290. *Plenck.* t. 467. Fl. méd. t. 232)

Man wendet das Kraut (herba Menthae crispae) an; es besteht aus filzigen Stängeln, mit eirunden oder rundlichen, oben runzligen, unten weißfilzigen, ungleich großgezähnten Blättern. Der Geruch ist stark, balsamisch, eigenthümlich und nicht angenehm; der Geschmack brennend, gewürzhaft und etwas bitter.

5) *Mentha sativa*, *L.*; zahme Münze, Frauenmünze; Menthe cultivée (*Gal.*); Nana, Hibbuk (*Ar.*); Pudina (*Duk. Pe.*); Menta romana (*I.*); Widdatilam (*Tam.*).

Du. His. *A. Par.*

4 Eine Europäische Pflanze. (*Oed.* Fl. Dan. t 794.)

Man gebraucht das Kraut (herba Menthae verticillatae s. crispae verticillatae); es besteht aus einem einfachen oder nur wenig ästigen, glatten Stängel mit eirunden, spitzigen, gezähnten, gestielten Blättern. Geruch und Geschmack ähneln dem der Krausemünze.

6) *Mentha rotundifolia*, *L.*; rundblättrige Münze; Menthe à feuilles rondes, Baume sauvage (*Gal.*); Mastranzo (*His.*).

Gal. His.

4 Eine Europäische Pflanze.

Man benutzt das Kraut (herba Menthae sylvestris folio rotundiore); es besteht aus einem filzigen Stängel mit sitzenden, eirunden oder rundlichen, oben runzligen, unten weißfilzigen, gezähnten Blättern. Es hat einen starken und angenehmen Geruch.

7) *Mentha piperita*, *L.*; Pfeffermünze; Menthe poivrée (*Gal*); Peppermint (*Ang.*); Peprowa mata (*B*); Pebermynte (*D.*); Verhabuena de sapor de pimienta (*His.*); Peperminte (*Bel.*); Mienta p eprzna (*Pol.*); Hortela apimentada (*Lus.*); Peparmynta (*Suec.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *Be. Br. C. Fi. G. M. Par. Pid. Sp.* Z.

4 Eine in ganz Europa verbreitete, wahrscheinlich aber ursprünglich in England einheimische Pflanze. (*Blackw.* t. 291. *Plenck.* t 468. *Bert.* Bild. IV. 42. f. 2. Fl. méd. t. 233.)

Das Kraut (herba Menthae piperitae s piperitidis) besteht aus einem ästigen, etwas behaarten Stängel mit gestielten, eirunden, spitzigen oder lanzettigen, gezähnten, glatten, oben dunkelgrünen Blättern. Es hat einen gewürzhaften, durchdringenden, sehr angenehmen Geruch und einen balsamischen, beißenden, brennenden, kampherartigen Geschmack, und läßt dabei zugleich ein Gefühl von Kälte im Munde zurück.

8) *Mentha sylvestris*, *L.*; Roßmünze; Menthe sauvage (*Gal.*).

Gal. *Be. G. M. Sp.*

4 Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (*Zorn* Ic. pl. t. 854.)

Man wendet das Kraut (herba Menthae sylvestris s. long foliae) an; es ist filzig und hat einen mit sitzenden, länglichen lanzettigen, ungleich gezähnten, weißlichen Blättern besetzten Stängel. Der Geruch ist sehr stark und angenehm, der Geschmack bitter.

9) *Mentha viridis*, *L.*; grüne Münze; Menthe verde, Baume vert (*Gal.*).

Am. Fer. Gen. Lon. LonN. Sax. *B. C. Fi. G.*

4 Eine Europäische Pflanze. (*Blackw.* Herb. t. 290.)

Man gebraucht das blühende Kraut (herba et flores Menthastri). Es besteht aus einem glatten Stängel mit lanzettigen, sitzenden, weitgezähnten Blättern und purpurrothen, wirtelförmig stehenden, eine lange, endständige Aehre bildenden Blüthen. Der Geruch ist angenehm und gewürzhaft.

Alle diese Pflanzen sind mehr oder weniger reizend; die wirksamste unter allen ist die Pfeffermünze. — Gabe des Pulvers, von einem Scrupel bis zur halben Drachme.

Species cephalicae s. nervinae externae.
(HassP. *Li.*)

℞. Herbae Menthae crispae,
— Majoranae,
— Origani,
— Serpylli,
singularum uncias tres.

Florum Chamomillae,
Florum Lavandulae,
Baccarum Lauri,
— Juniperi,
Seminum Carvi,
singulorum sesquiunciam.

HassP. Herbae Menthae pip., Majoranae, Rorismarini, Serpylli, Florum Lavandulae, singulorum uncias duas. Caryophyllorum, Cubebarum, singulorum unciam unam

Conserva Menthae s. foliorum Menthae crispae, piperitae et viridis. (Ams An. B. Bel. Ful. Gen. Lus. Pal. R. Sax. Wir. Wür. *Fi. Sw. T. Vm.*)

℞. Foliorum Menthae recentium contusorum . . . partem unam.
Sacchari albi . . . partes duas.

Contere et in loco frigido serva. (B. Bel. Ful. Lus. Pal. R. Wir. Wür. *Sw.*)

Ams. et Gen. Menthae partem unam et tres Sacchari; — Sar. Cujusque singulorum partes aequales.

℞. Herbae Menthae recentis
partem unam.
Sacchari . . . . . partes duas.

Contunde herbam, pulpam cum saccharo contere et in balneo aquae calefac ad solutionem sacchari usque. (*Vm.*)

T. ut conservam Melissae.

℞. Foliorum Menthae pulveratorum
drachmam unam.
Sacchari albi drachmas quinque.
Aquae purae . . drachmas duas.
Misce. (*Au.*)

℞. Menthae . . . . libram unam.
Sacchari albi . . . libras tres.

Mentha cum sacchari libra una in mortario contusa, pulpam per cribrum trajice et cum reliquo saccharo ad mellis consistentiam cocto et adhuc tepido commisce. (*Vi.*)

Sacculus aromaticus. (*Au.*)

℞. Florum Chamomillae Romanae,
Menthae crispae,
Rutae,
Calami, singulorum uncias tres.
Camphorae . . . drachmas sex.

Fiat pulvis grossiusculus. — Mit warmem Branntwein befeuchtet, auf den Kopf aufzuschlagen.

Infusum Menthae. (DD. GalM. RC. *Ra.*)

℞. Herbae Menthae piperitae vel aquaticae siccatae,
Liquiritiae rasae,
singulorum semunciam.

Aquae bullientis quantum sufficit ut colaturae octarius unus (litre) obtineatur; cola. (GalM.)

℞. Foliorum Menthae . semunciam
Aquae bullientis . . libras duas.

Infunde. (*Ra.*)

DD. Menthae drachmam unam et Aquae uncias duodecim; — RC. Menthae unciam unam, Aquae bullientis libram unam; stent per horam in vase clauso, tunc colentur; interdum adduntur Aetheris sulphurici alcohol. drachmae duae vel Tincturae aromaticae vel Calami semuncia.

Schwach reizend, in Fällen, wo man etwas reizend auf den Magen einwirken will, auch bei sogenannten nervösen Coliken empfohlen.

Infusum Menthae compositum (B°. Du. C.)

℞. Foliorum Menthae communis siccatorum . . . drachmas duas.

Aquae bullientis quantum sufficit ut unciae sex colaturae obtineantur; digere per horam dim diam in vase tecto, post refrigerationem cola et colaturae adde

Sacchari albi . . drachmas duas.
Olei Menthae communis
guttas tres.
Tincturae Cardamomi compositae
semunciam.

Misce. — Ein sehr angenehmes magenstärkendes und die Ausdünstung beförderndes Mittel. — Gabe, einen bis zwei Löffel.

Syrupus Menthae s. Menthae crispae. (Ams. An. B. Bor4. Br. Gal. Han. His. Pal. Sar. Wir. *T.*)

℞. Foliorum Menthae crispae siccatorum . . . . . uncias duas.
Aquae . . . . . libras duas.

Infunde et colaturae adde
Sacchari albi . . libras quatuor.
Syrupum cola. (His. Sar.)

Han. infundere jubet Menthae uncias octo in Aquae libris tribus et in colatura unciarum viginti solvere Sacchari libras quatuor; — Bor4. Menthae uncias duas, Aquae ferventis quantum sufficit et ad colaturam unciarum tredecim Sacchari alb libras duas.

℞. Foliorum Menthae crispae siccatorum . . . . . unciam unam.
Aquae Menthae crispae destillatae
libras duas.

Digere in balneo aquae per duas horas in vase tecto; cola, filtra et liquori adde

Sacchari albi . . . . . duplum.

Liqua in balneo aquae. (Gal. *T.*)

Br. et Wir. Menthae uncias quatuor, Aquae destillatae libram unam, duos dies digestionis et Sacchari uncias sedecim ut fiat brevi coctione syrupus.

℞. Succi Menthae crispae sepositione depurati,
Sacchari albi,
singulorum libras tres.

Coque. (Pal.)

Sar. Loco sacchari Syrupum communem.

℞. Herbae Menthae siccatae semilibram.
Aquae purae . . libras quinque.
Macera per horas duodecim, tunc destillando liquidi uncias quatuor elice, in quibus Sacchari unciae octo solvantur. Residuo expresso et colato adde
Sacchari albi
libras duas et uncias quatuor.
Coque ad consistentiam requisitam et syrupos refrigeratos commisce. (Ams.)

℞. Summitatum Menthae florescentium siccatarum uncias quatuor.
Aquae . . . . . libras tres.
Infunde in vase tecto per horas duodecim, cola leviter exprimendo, sepone, filtra et adde
Sacchari albi . . libras quatuor.
Clarificata ad requisitam consistentiam evaporent, syrupo refrigerato adde alium praeparatum cum
Aquae Menthae crispae libra una.
Sacchari albi . . unciis viginti.
Serva. (An.)

B. infundere jubet Herbae siccatae uncias quatuor in Aquae libris quatuor per viginti quatuor horas, destillando deinde elicere liquidi uncias tres et in illo solvere Sacchari uncias sex, residuum exprimere, colaturae addere Sacchari libras duas cum dimidia, leni calore syrupum parare et refrigeratum cum praecedente commiscere.
Gabe, eine halbe bis zwei Unzen.

Syrupus Menthae piperitae s. piperitidis s. de Mentha piperita. (B. Bel. Gal. *F. T.*)

℞. Summitatum siccatarum Menthae piperitae . . unciam unam.
Aquae destillatae Menthae piperitae libras duas.
Digere in balneo aquae per horas viginti quatuor in vase tecto; cola, filtra et liquori adde
Sacchari albi . . . . duplum.
Dissolve in balneo aquae et post refrigerationem ver pannum cola. (Gal. *T.*)
Fi. infundere jubet per horas duas, caeterum ut Gal.; — GalH. syrupum parare jubet miscendo infusionis partem unam cum tribus Sacchari communis antea ad globulum usque cocti.

℞. Summitatum Menthae piperitae uncias quatuor.
Aquae . . . . . sesquilibram.
Digere in vase clauso per tres dies, exprime et sepositione depuratis atque colatis adde
Aquae Menthae piperitae sesquilibram.
Sacchari albi . . . libras tres.
Fiat leni calore syrupus. (Bel.)

℞. Herbae Menthae piperitae siccatae uncias quatuor.
Aquae . . . . libras quatuor.
Digere in vase tecto per horas viginti quatuor, destillatione liquidi uncias tres elice, cum quibus et cum
Sacchari . . . . . unciis sex leni calore syrupum para. Residuo expresso colaturae adde
Sacchari albi
libras duas cum dimidia.
Fiat syrupus, qui refrigeratus cum praecedenti commisceatur. (B.)

Syrupus Menthae viridis. (*Fi.*)

Ut syrupus Menthae piperitae paratur.

Syrupus Menthae piperitae vinosus. (*Vm.*)

℞. Aquae Menthae piperitae vinosae partes quinque.
Sacchari albi . . partes novem.
Liqua in balneo aquae tepido et in vase tecto.

Tinctura s. Essentia Menthae piperitae. (Am. An. Br. HassP. *C.*)

℞. Herbae Menthae piperitae partem unam.
Alcoholis (20°) . . partes octo.
Post tres dies macerationis filtra. (An.)
HassP. Eadem ut An. Summitatum et Spiritus quantitates, calore 24 ad 30° per dies sex digerere, tincturam refrigeratam exprimere et filtrare per chartam bibulam jubet; habeat pondus unciarum viginti.

℞. Summitatum florescentium Menthae piperitae uncias quatuor.
Spiritus Vini rectificati libras duas.
Post sufficientem digestionem cola exprimendo et colaturam infunde
Herbae Menthae piperitae florescentis . . . . unciis duabus.
Digere iterum per aliquot tempus, cola exprimendo et filtra. (Br.)

℞. Olei Menthae piperitae drachmas duas.
Alcoholis . . . octarium unum.
Post tres dies digestionis filtra. — Reizend.

Tinctura Menthae viridis. (Am. *C.*)

℞. Olei Menthae viridis drachmas duas.
Alcoholis . . . octarium unum.
Dissolve. — Reizend.

Oleum Menthae infusum. (Br. O. Sar. Sax. Wir. *T.*)

℞. Herbae Menthae partem unam.

Olei Olivarum . . partes octo.
Post aliquot dies digestionis exprime. (Sax.)

T. Summitatum uncias quindecim, Olei Olivarum libras quinque; macera solis calore per 3 vel 4 dies, filtra, exprime et oleo filtrato aliam similem summitatum quantitatem addendo, operationem bis repete, supremo per mensem macerationem protrahendo etc.

℞. Herbae Menthae partem unam.
Olei Olivarum . . partes tres.
Digere per dies quatuor in loco calido, exprime, operationem cum nova herba repete et filtra. (O.)

Sar. Herbae partem unam et duos Olei.

℞. Herbae Menthae,
Olei Olivarum,
singulorum partes aequales.
Coque lente ad humidi consumptionem et exprime. (Br. Wir.)

Magenstärkend, blähungtreibend.

Oleum Menthae aethereum, Aethereoleum Menthae.

℞. Herbae Menthae recentis
quantum vis.
Aquae fontanae quantum sufficit.
Destillando oleum quod supernatat, collige. (Am. Ams. B. Bel. Ed. Fenn. Fer. Gen. Lon. LonN. Lus. R. Suec. *Br. C.*)

Pul. et Li. Herbae partem unam et tres Aquae; — An. Herbae tres et decem Aquae; — Gal. Herbae quinque et septem Aquae; — D. Herbae unam et Aquae sex; — Bor. Bor4. Han. HassP. His. O. Pol. Sax. *Fi.* Herbae unam et octo Aquae; — Ba. Herbae unam et novem Aquae; — A. Herbae unam et duodecim Aquae; — *Sw* Herbae unam et Aquae quatuor; — *T.* ut oleum florum Aurantii.

℞. Herbae Menthae
partes viginti quinque
Aquae partes septuaginta quinque.
Salis culinaris . . . partes tres.
Destillent. (Br. Hass. Pal. Sar. Wir. *Pid.*)

℞. Herbae Menthae . quantum vis.
Aquae Menthae destillatae
quantitatem necessariam.
Destillent. (Wür.)

Oleum Menthae sativae indicatum est a Du. et *T.*; *Oleum Menthae viridis* ab Am. Gen. Lon. LonN. *C. Fi. Sw. T.*; *Oleum Menthae crispae* ab A. Ams. An. B. Ba. Bor. Bor4. Br. D. Ful. Han. HassP. Lus. O. Pal. R. Sax. Wir. Wür. *Pid. Sw. T*; *Oleum Menthae piperitae* denique ab A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. (venale) ponderis sp. = 0,920) D. Du. Ed. Fenn. Ful. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pal. Pol. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. *Br. C. Pid.* et *Sw.*

Gabe, zwei bis sechs Tropfen.

Oleum Menthae crispae terebinthinatum. (Bor4.)

℞. Herbae Menthae crispae
libras triginta.
Olei Terebinthinae libras duas.
Aquae fontanae . quantum satis.
Fiat lege artis destillatio et oleum separetur.

Elaeosaccharum s. Oleosaccharum Menthae piperitae. (A. Bor. BorC. Bor4. D. Han. O. RC. Wir. *Br*. Fi.*)

℞. Sacchari albi . . unciam unam.
Olei essentialis Menthae piperitae
guttas octo.
Tritura simul. (D. *Br**.)

Bor. BorC. Han. O. et RC. Sacchari semunciam et Olei guttas duodecim (Bor4. duplum adhibet); — A. Sacchari drachmam unam et Olei grana tria; — *Fi.* Sacchari drachmam unam, Olei guttas duas ad tres; — Wir. Sacchari unciam unam, Olei guttas sedecim; — HassP. Sacchari drachmas duas, Olei guttas quatuor. (Eodem modo paratur *Elaeosaccharum Menthae crispae.* HassP.)

Rotulae s. Morsuli s. Trochisci Menthae piperitae. (A. B*. Ba. Bor4. Ful. Gal. Han. Hass. HassP. Li. O. Sax. Wir. *T.*)

℞. Sacchari albi,
Aquae Menthae piperitae,
singulorum uncias duas.
Coque ad electuarii mollis consistentiam, adde elaeosaccharum praeparatum ex
Sacchari albi . unciis quatuor.
Olei essentialis Menthae piperitae
semidrachma.
Mixturam guttatim instilla tabulae marmoreae politae et guttas post concretionem leni calore supra cribrum per plures horas sicca. (Gal.)

Li. et Wir. Sacchari drachmas quatuordecim cum dimidia, Aquae Menthae semidrachmam et grana quindecim et Elaeosaccharum praeparatum cum Sacchari sesquidrachma et Olei guttis decem; — Sax. Sacchari quantitatem arbitrariam, Aquae Menthae quartam circiter partem et Elaeosacchari talem quantitatem ut librae duae massae totius Olei essentialis drachmas circiter duas contineant; — O. Sacchari semilibram, Aquae Menthae sufficientem quantitatem et Elaeosac-

charum praeparatum cum Sacchari semidrachma et Olei guttis triginta; — A. Sacchari unciam unam, Aquae Menthae sufficientem quantitatem et Olei essentialis grana viginti quatuor; — T. Sacchari cribrati, Aquae Menthae piperitae, singulorum uncias sex, coque mite calore ad pennam; syrupo adde Sacchari grossiuscule pulv. libram unam et Olei Menthae piperitae sesquidrachmam.

℞. Sacchari albi . . semilibram.
Aquae destillatae unciam unam.
Calefac in tantum, donec gutta refrigeratione solida fiat; massae semirefrigeratae adde
Olei essentialis Menthae semidrachmam.
Fiant rotulae. (Hass.)

Han. Sacchari uncias quatuor, Aquae sufficientem quantitatem et Olei guttas triginta sex; — Ba. Sacchari et Elaeosacchari Menthae, singulorum partes aequales coquere, paullum Aquae Menthae piperitae addendo.

HassP. Sacchari albissimi pulv. quantum vis; sartagini cupreae, stanno probe obductae, rostratae ingesto ad misce Aquae Menthae pip. quantum satis ut fiat massa spissitudinis unguenti, cui, igni admotae sub continua agitatione probe calefactae et liquatae, ingere Sacchari albiss. pulv. quantum satis ut guttulae exemtae indurescant, tunc cuilibet unciae sacchari adhibiti admisce Olei Menthae pip. dest. guttas duodecim, quo facto l. a. cito fiant rotulae etc.

℞. Sacchari ad plumam cocti uncias sex.
Pulveris Herbae Menthae piperitae drachmas sex.
Mixtis bene, massae semirefrigeratae adde
Olei essentialis Menthae piperitae guttas triginta.
Fiant rotulae triginta. (Ful.)

℞. Sacchari pulverati unciam unam.
Olei Menthae piperitae guttas sex.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae quantitatem sufficientem.
Fiant trochisci. (Ful.)

Fer. Olei semidrachmam, Sacchari uncias sex et mucilaginis Gummi Arabici cum Aqua Menthae parati quantitatem sufficientem.

℞. Ichthyocollae drachmam unam.
Aquae . . . . . uncias tres.
Solutioni adde
Elaeosacchari Menthae piperitae libram unam.
Fiant trochisci. (Bs.)

℞. Rotularum Sacchari uncias quatuor.
Immitte in vas vitreum, antea
Aetheris acetici . guttis triginta et
Olei Menthae piperitae guttis duodecim
probe mixtis agitatione intus obductum. Tunc vas bene agitetur ut rotulae perfecte humectentur. (Bor4.)

Aqua Menthae crispae. (A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Fenn. Fer. Han. Hass. HassP. Li. Lus. O. Pal. Pol. R RC. Sar. Sax. Suec. Wür. *Br. Pid. Sw. T. Vm.*)

℞. Herbae Menthae crispae recentis partem unam.
Aquae . . . quantum sufficit.
Post horas viginti quatuor digestionis destillent partes decem. (Ams. B. Bel. *Sw.*)

Bor. D. O. et Pal. Herbae partem unam et Aquae sufficientem quantitatem; destillent partes decem; — Han. Herbae partes octo et Aquae quantum sufficit; destillent partes viginti quatuor; — Fenn. et Suec. Herbae partes quatuor et Aquae sufficientem quantitatem; destillent partes sex; — Lus. Herbae partes sex et Aquae quantum sufficit; destillent partes octo; — Fer. et Pal. Herbae partem unam et Aquae quatuor; destillent partes duae; — An. Herbae partem unam et Aquae quinque; destillent partes quatuor; — Wür. et *Br.* Herbae partem unam et sex Aquae; destillent partes duae; — Hass. R. et *Pid.* Herbae partem unam et octo Aquae; destillent partes quatuor; — A. Herbae partem unam et duodecim Aquae; destillent partes quatuor; — Sax. Herbae partem unam et Aquae quindecim; destillent partes decem; — Ba. Herbae partem unam et Aquae sedecim; destillent partes quatuor; — Du. Herbae sesquilibram et Aquae sufficientem quantitatem; destillent octarii octo; — *T.* ut aquam florum Aurantiorum; — Bor4. Herbae libras duas, Aquae quantum sufficit; destillent librae viginti; — HassP. Herbae libras duas cum dimidia, Aquae quantum sufficit; destillent librae viginti quatuor; — RC. Herbae florentis libras duas vel siccatae unam, Aquae quantum satis ad prohibendum empyreuma; destillent librae decem.

℞. Herbae Menthae crispae partem unam.
Aquae . . . . partes quatuor.
Parte quarta destillata productum supra novam herbam cohoba. (Sar.)

℞. Herbae Menthae crispae recentis partes decem.
Aquae Vitae . partem dimidiam.
— purae partes centum sexaginta.
Destillent partes quadraginta. (*Vm.*)

Br. Herbae partem unam et Vini albi quatuor; destillet pars una cum dimidia.

℞. Elaeosacchari Menthae crispae semunciam.
Aquae fontanae . libram unam.
Misce (RC.)

Aqua Menthae piperitae. (A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. *D. Du.* Ed. Fenn. Ful Gal. Gen. Hau. Hass. HassP. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wür. *C. Fi. Pid. Sw. T. Vm.*)

℞. Herbae recentis Menthae piperitae partem unam.
Aquae sufficientem quantitatem.
Post horas viginti quatuor macerationis destillent partes decem. (Ams. B. Bel. D. *Sw.*)

Am. Du. Lon. et LonN. Herbae sesquilibram et Aquae sufficientem quantitatem; destillent partes (octarii) octo (LonN. Herbae siccatae sesquilibram vel recentis duplum vel Olei drachmas tres); — Bor. Han. O. et Pol. Herbae partem unam et Aquae quantum sufficit; destillent partes septem; — Bor4. Herbae libras duas, Aquae quantitatem sufficientem; destillent libras quatuordecim; — HassP. ut aquam Menthae crispae; — Gen. Herbae partem unam et Aquae sufficientem quantitatem; destillent partes sex; — Fenn. et Suec. Herbae partes duas et Aquae quantum sufficit; destillent partes tres; — Lus. Herbae partes tres et Aquae sufficientem quantitatem; destillent partes quatuor; — Gal. *Fi.* Herbae partem unam et Aquae quatuor; destillent partes duae (macerationem per horas sex *Fi.*); — An. Herbae partem unam et Aquae quinque; destillent partes quatuor; — A. Br. Wür. et *Pid.* Herbae partem unam et sex Aquae; destillent partes duae; — Hass. et R. Herbae unam et octo Aquae; destillent partes quatuor; — Sax. Herbae partem unam et Aquae quindecim; destillent partes decem; — Ba. Herbae partem unam et Aquae sedecim; destillent partes octo; — RC ut aquam Menthae crispae; — *T.* ut aquam florum Aurantiorum.

℞. Herbae Menthae piperitae recentis partes tres.
In sacculum immitte medio cucurbitae Aquae partes duodecim continentis ita ut liquidum attingere non possit, suspensum, quo facto partes decem destillent. (Ful. Li.)

℞. Herbae Menthae piperitae partes decem.
Aquae Vitae partem dimidiam.
— purae partes centum sexaginta.
Destillent partes quadraginta. (*Vm.*)

Ed. et *C.* miscere jubent Herbae libram unam cum Aquae quantitate ad prohibendum empyreuma sufficiente, destillando libras decem elicere et producto addere Aquae Vitae uncias quinque.

℞. Elaeosacchari Menthae piperitae drachmam unam
Aquae de tillatae uncias octo.
Tere ut solvatur. (BorC.)

℞. Olei essentialis Menthae partem unam.
Sacchari,
Alcoholis (22°),
singulorum partes tres.
Aquae partes mille et ducentas.
Dissolve. (Gal.)

Gabe, eine bis vier Unzen.

Aqua Menthae viridis. (Am. B*. Lon. LonN. *Fi. Sw.*)

℞. Herbae florentis Menthae viridis libras tres.
Aquae sufficientem quantitatem ad prohibendum empyreuma. Post sufficientem digestionem destillent octarii decem. (Am. B*.)

Lon. Herbae sesquilibram et Aquae sufficientem quantitatem; destillent octarii octo; LonN. ut aquam Menthae piperitae; — *Sw.* Herbae partem unam et Aquae sufficientem quantitatem; destillent partes decem; — *Fi.* ut aquam Menthae piperitae.

Aqua Menthae spirituosa s. vinosa s. alcoholica, Spiritus Menthae.

℞. Herbae Menthae recentis partem unam.
Alcoholis (29°) partes quatuor.
Destillet spiritus 28° indicans. (An.)

Bel. Herbae partem unam et sedecim Alcoholis; destillet spiritus 16°; — Br. Pal. et Wir. Herbae partem unam et quatuor Alcoholis; destillet dimidia pars; — Ams. Herbae partes duas et novem Alcoholis; destillent; — Lus. Herbae partem unam cum dimidia et decem Alcoholis; destillent partes quinque; — *Sw.* Herbae partem unam et Alcoholis quatuordecim; destillent partes quindecim (?); — *Br.* Herbae libram unam et uncias decem et octo Alcoholis; — Fer. Herbae partem

unam cum dimidia et octo Alcoholis; destillent partes sex; — *T.* ut spiritum lavandulae.

℞. Herbae Menthae recentis partem unam.
Alcoholis (0,910) partes quatuor cum dimidia.
Aquae . . . . . partes sex.

Post horas viginti quatuor macerationis destillent partes quatuor. (Au.)

Ed. Lon. LonN. et *C.* Herbae partem unam cum dimidia, Aquae V tae novem et Aquae sufficientem quantitatem; destillent partes novem; — *Vm* Herbae partem unam, Alcoholis tres et sex Aquae; destillent partes duae cum dimidia; — Bor. Bor4. Han. O. et Pol. Herbae partem unam, Alcoholis unam cum dimidia et Aquae sufficientem quantitatem; destillent partes sex; — HassP. Herbae libram unam, Spiritus rectificati libras duas, Aquae quantum satis; destillent librae decem; — *Fi.* Herbae libram unam, Alcoholis 22° septem, Aquae quatuor; destillent librae septem; — Ba. Herbae partem unam, Alcoholis duas cum dimidia et sedecim Aquae: destillent partes octo.

℞. Herbae Menthae recentis partem unam.
Alcoholis . . . partes quatuor.

Post horas viginti quatuor digestionis destillent fere ad siccum. Macera supra novam herbam et iterum destilla. (Sar.)

Wür. Herbae sesquilibram; Alcoholis decem et producti cohobationem supra tres uncias herbae novae; — *Sw.* Herbae partes duodecim, Alcoholis sex et duas Aquae; destillent partes sex, productum cum Aquae partibus duabus infunde Herbae recentis duodecim et destillando partes sex abstrahe.

℞. Herbae Menthae recentis libras duas.
Alcoholis,
Aquae,
singulorum partium aequalium quantum sufficit ut librae octo producti obtineantur, cui adde
Aquae communis,
Sacchari albi,
singulorum uncias duas.
Serva. (Hass. *Pid.*)

℞. Herbae Menthae florescentis partes duodecim.
Alcoholis (22°) partes triginta sex.
Aquae Menthae destillatae partes duodecim.

Post quatuor dies infusionis destillent in balneo aquae partes triginta. (Gal.)

R. Herbae partem dimidiam, Alcoholis quatuor, Aquae Menthae unam et viginti quatuor horas infusionis; destillent partes tres.

℞. Olei Menthae pondere scrupulos sex cum semisse.
Spiritus rectificati octarios quatuor cum semisse.
Aquae . . . . quantum satis ad prohibendum empyreuma; destillet lento igne congius. (LonN.)

℞. Aquae Menthae . libram unam.
Alcoholis . . . unciam unam.
Misce. (*Br.*)

Spiritum Menthae viridis habent Lon. LonN. *C. Fi. Sw.* et *T.*; *Spiritum Menthae crispae:* Ams. An. B. Br. Gal. Li. Lus. R. et *Sw.*; *Spiritum Menthae piperitae:* Ams. An. B. Ba. Bor. Bor4. Br Ed. Gal. Han. Hass. HassP. Lon. LonN. Lus. O. Pal. ol. Sar. Wir. Wür. *Br. C. Fi. Pid. Sw. T.* et *Vm.*

Aqua stomachica s. Menthae composita. (Wir. *Sp.*)

℞. Herbae Menthae crispae recentis uncias tres.
Galangae,
Nucis moschatae,
Cinnamomi,
singulorum unciam unam.
Vini generosi . . . libras octo.
Destillet dimidia pars. (Wir.)

℞. Herbae recentis Menthae uncias viginti quatuor.
— — Absinthii uncias tres.
— — Basilici,
— — Pulegii, singularum uncias duas.
— — Rorismarini,
Florum Lavandulae,
singulorum drachmas duas.
Cinnamomi . . . semunciam.
Caryophyllorum,
Coriandri,
singulorum drachmam unam.
Alcoholis . . . uncias sedecim.
Aquae Menthae uncias sexaginta.
Destillent fere ad siccum. (*Sp.*)

Gabe, eine halbe bis eine Unze.

Spiritus Menthae saccharatus, Potio carminativa, Julep de Mentha. (*Sa. Sm. Sw. Vm.*)

℞. Spiritus Menthae piperitae uncias septuaginta quatuor.
— Sacchari uncias duodecim.
Tincturae Menthae piperitae drachmas tres.

Mixta post aliquot dies filtrentur. (*Vm.*)

℞. Aquae Menthae . . uncias sex.
Spiritus Menthae piperitae,
Syrupi Menthae piperitae,
singulorum unciam unam.

Olei essentialis Menthae guttas sex.
Sacchari . . . . semunciam.
Misce. (*Vm.*)

℞. Aquae Menthae . uncias octo.
Spiritus Menthae sesquiunciam.
Syrupi Sacchari . . semunciam.
Misce. (*Sa.*)

Sw. Aquae Menthae viridis uncias octo, Tincturae et Syrupi Menthae, singulorum unciam unam.
Löffelweiſe.

Potio stomachica. (*Sm.*)

℞. Aquae Menthae crispae uncias quatuor.
— — piperitae,
— Cinnamomi hordeatae,
Syrupi Capitum Papaveris, singulorum unciam unam.

Aqua ad tormina infantum, Potio antispasmodica. (*Sm. Sp.*)

℞. Aquae Menthae,
— Chamomillae, singularum uncias duas.
Syrupi Rhoeados,
— Chamomillae, singulorum semunciam.
Misce. (*Sp.*)

℞. Olei essentialis Cinnamomi guttas duas.
— Menthae piperitae guttas tres.
Spiritus Menthae piperitae unciam unam.
Syrupus Althaeae uncias tres.
Aquae destillatae Menthae piperitae uncias quatuor.
Misce (*Sm.*)
Löffelweiſe.

Mercurialis.

Mercurialis annua, L.; jähriges Bingelkraut; Mercuriale annuelle (*Gal.*); Annual mercury (*Aug.*); Merkuryalis, neb pluna bazolicka (*B.*); Bingelurt (*D.*); Jaarliks bingelkruid (*Bel*); Mercorella (*I.*); Mercuryasez (*Pol.*); Bingelaert (*Suec*).

Ams. An Bel. Br. Gal. Gen. Hs. Wir. Wür. *Be. Br. G. M. Sp.* Z.

☉ (Dioecia Enneandria, L.; Euphorbiaceae; *J*) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (*Blackw.* t. 162 *Schk* t. 332. *Pleuck* t. 717. *Hayne* V. 11. *Zorn* 10 pl. t. 103. 104.)

Man wendet das Kraut (herba Mercurialis) an; es beſteht aus einem äſtigen, glatten Stängel mit eirunden, lanzettigen, gezähnten, hellgrünen Blättern. Es hat keinen Geruch, aber einen ſchleimigen etwas ſalzigen Geſchmack.

Es enthält, nach Feneulle, einen bittern, leicht purgirenden Stoff, Chlorophyll oder Pflanzengrün, Eiweiß, einen fetten Stoff, flüchtiges Oel, pectiſche Säure, Salze ꝛc.

Clyster s. Enema purgans. (*Ra.*)

℞. Herbae Mercurialis semunciam.
Aquae . . . . . libram unam.
Coque et cola.

Decoctum Mercurialis. (*Sa.*)

℞. Foliorum Sennae drachmas sex.
Herbae Mercurialis manipulum unum cum dimidio.
Aquae sufficientem quantitatem ut colaturae sesquilibra obtineatur.

Post semihoram ebullitionis in vase tecto adde

Mellis pectoralis . uncias duas.
Misce.

Mel mercuriale s. Mercurialis annuae. (An. Gal. Pal. Sar. Wir. *Sp. T. Vm.*)

℞. Succi Mercurialis,
Mellis electi, singulorum partes aequales.

Coque despumando, ad syrupi consistentiam et per pannum cola. (Gal. Sar. *T.*)

An. Pal. et Wir. Mellis partes duas et tres Succi; — *Sp.* Succi et Mellis ut antea; — *Vm.* Succi unam et Mellis unam cum dimidia.

Ehedem in Klyſtir angewendet. Mit Nutzen bei Blähungskolik, Hyſterismus ꝛc. — Gabe, eine bis zwei Unzen in einem erweichenden Decoct.

Syrupus Mercurialis s. prophylacticus s. longae vitae, Mellitis Mercurialis composita. (Gal. Wir. *Sp.*)

℞. Succi Mercurialis libras quatuor.
— Boraginis,
— Buglossi, singulorum libram unam.
Mellis albi . . . . libras sex.
Coque et despuma; tunc

℞. Gentianae . . . uncias duas.
Radicis Iridis nostratis uncias tres.
Vini albi . . . . sesquilibram.

Macera per horas viginti quatuor et exprime; colaturam cum succis et melle mixtam coque blando igne ad syrupi consistentiam et cola.

Sp eundem agendi modum indicat, praescribendo tamen Succi Mercurialis uncias octoginta sex, Succi Boraginis viginti quatuor, Succi Buglossi tantidem, Mellis uncias triginta duas, Gentianae uncias quatuor, Iridis uncias octo et Vini uncias quadraginta octo; — Gal. Succi Mercurialis libras quatuor, Succi Boraginis et Buglossi, singulorum unam, Mellis libras sex, Gentianae uncias duas, Iridis quatuor et Vini libras duas.

Purgirend, magenſtärkend, emmenagogiſch.

Mercurius.

Mercurius vivus, *Argentum vivum*, *Hydrargyrum*, *Hydrargyrum virgineum*, *Hydrargyrus*; Queckſilber, lebendiges Queckſilber; Mercure, Vif-argent (*Gal.*); Mercury, Quicksilver (*Ang.*); Abuk, Zibakh (*Ar.*); Chug-yin (*Ch.*); Quecksolv (*D.*); Azogue, Mercurio (*His. Lus.*); Para, Parah (*Hin. Duk.*): Kwikzilva (*Bel.*); Argento vivo, Mercurio (*I.*); Rassa (*Ma.*); Seemab (*Pe.*); Parada, Rasa, Sutam (*Sa.*); Quicksilfver (*Suec.*); Rasam (*Tam. Tel.*).

A. Am. Ams. Au. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. WW. *C. Fi. Par. T.*

Das käufliche Queckſilber kann zu medicinischen Zwecken erſt dann benutzt werden, wenn es von beigemiſchten fremden Subſtanzen gereinigt worden iſt. Man nennt es dann:

Mercurius vivus depuratus s. rectificatus, *Hydrargyrum purificatum s. depuratum s. purum*, *Hydrargyrus purificatus*. Nicht alle Pharmacopöen geben das dazu anzuwendende Verfahren an.

Ba. Fer. Gen. Han. His. Lus. O. R. Suec. Wir. *Br. Pid.* et *Sw.* destillare jubent mercurium in retorta communicante cum recipiente pro dimidia parte Aqua repleto; — Fenn. et Hass. eundem agendi modum adhibent, in retortam tamen immittunt mixturam e metalli libris tribus et Sulphuris uncia una; — Bor4. Hydrargyri libram unam, cum Ferri limati tantum ut superficies obtecta sit in retorta igne sensim sed non nimis aucto destillationi subjicere et partes novem abstrahere; — LonN. mercurium in retorta ferrea destillare jubet; — RC. in retorta ferrea pro dimidio metallo repleto tuboque ferreo verticaliter erecto, dein recurvato instructa atque cum recipiente vitreo capaciori ad dimidium Aqua frigida repleto sic conjuncta ut orificium colli superficiei aquae immersum sit, destillare; — Am Ams. Ed. Lon. Sar. et *C.* Terere Mercurii partes sex cum Limaturae Ferri una et mixturam destillationi subjicere; — *Br.* Metallum cum Kali subcarbonico vel Calce viva destillare et trajicere deinde per pellem caprae; — Li. In recipiente pro dimidia parte Aqua repleto destillare et per horas duodecim digerere in Acidi nitrici Aquae partibus tribus diluti et deinde bene abluere; — Gen Destillationem solam indicat; — idem et *T.*

Sax. Destillare jubet mixturam ex Aethiopis mineralis et Calcis vivae, singulorum partibus aequalibus; — Ful. liquefacere jubet Sulphuris in baculis uncias sex in mortario ferreo, addere per vices Mercurii libras duas et post illorum intimam conjunctionem massam nigram inde productam pulveratam cum Calcis vivae pulveratae unciis octodecim mixtam in retortam immittere, atque productum in excipulo Aqua pro parte dimidia repleto recipere; — Fer. Gal. His. Pol. *T.* et *Vm.* Cinnabarem cum Limaturae Ferri parte dimidia vel partes aequales eorum destillare; — *Fi.* Mercurii calefacti libras tres affundere Sulphuri in baculis in crucibulo in fusione existenti, cum spathula ferrea agitando et, tunc massae per momentum refrigeratae et pulveratae addere Limaturae Ferri uncias viginti, destillare etc. (*Mercurius redivivus Cinnabaris.*); — HassP. Mercurii vivi venalis uncias decem, Mercurii nitrosi crystallisati inter parandum mercurium solub. Hahn. ex merc. venali obtenti unciam unam, Aquae destillatae uncias quatuor; mercurius nitrosus in aqua destill. solutus cum mercurio per horas duas vase idoneo subinde agitando coquitur, liquor defunditur et merc. cum Aq. dest. abluitur.

Idt et *Chevallier* Mercurium in retortam liquatoriam pro duobus trientibus solum eo replendam immittere et hanc in furnum, operculo tectum collocare, cui tubus ferreus, in fine nodulo linteo humefacto, cujus una extremitas patinae profundae (Terrine) Aqua repletae immergit, instructus adaptatus est; operatione peracta, Aqua decanthatur et metallum chartae josephinae ope desiccatum per pellem caprinam trajicitur.

Professor G. *Franchi* metallum in lagena epistomio et smiri obturata et parietibus valde resistentibus praedita cum Acido sulphurico per longum tempus agitando et concutiendo saepius, tenere, acidum decanthare et metallum residuum cum multa Aqua ablutum et siccatum per chartam filtrare. (Ein ſehr wohlfeiles Verfahren *T.*)

Das metalliſche Queckſilber in Subſtanz wird in nur ſehr wenigen Präparaten angewendet, welche an ſich ſelbſt ſchon wenig gebräuchlich ſind. In dieſer Geſtalt bringt es keine Wirkung auf den thieriſchen Organismus hervor, die ausgenommen, welche von ſeiner Schwere abhängig iſt, und mit Unrecht halten es Viele für ein Gift. Ganz

anders ist sein Verhalten in einem sehr getheilten Zustande. Es ist dann eins der kräftigsten Reizmittel, welche man kennt, und kann selbst giftig werden, entweder durch seine Menge oder durch die Dauer seiner Wirkung, obgleich es im letzteren Falle eine Reihe pathologischer Erscheinungen hervorzubringen pflegt, welche allmälig den Leidenden zum Tode führen.

Obgleich es genugsam erwiesen ist, daß das Quecksilber auf dem Wege der Einsaugung in den Kreislauf kömmt, so weiß man doch nicht, ob seine Wirkungen von einer unmittelbaren Einwirkung auf diejenigen Organe, in deren Gewebe es durch das Blut geführt wird, oder einzig von der sympathischen Reaction der mittelst nervöser Connexe oder ähnlichen Baues mit denjenigen, auf deren Oberfläche man es anbringt, abhängig ist; doch scheint letztere Meinung bis jetzt die wahrscheinlichste. Zu ihren Gunsten spricht die unendliche Mannichfaltigkeit der Wirkungen des Quecksilbers nach den äußern Umständen, der Constitution oder dem Zustande des Subjects, nach der Natur des Präparats, der Gabe ꝛc.; eine Mannichfaltigkeit, welche es zugleich den krampfstillenden, harn und Regeln treibenden, reizenden, purgirenden, Speichel- und Schweißaussonderung befördernden Mitteln zuzählen ließ, je nachdem man es nämlich diesen oder jenen Ab- oder Aussonderungsproceß bethätigen sah.

Das Quecksilber ist auf tausendfache Weise von den Aerzten verändert worden, und die Pharmaceuten haben diese Veränderungen noch vermehrt, welche in der That eine große Menge ganz oder doch fast ungerathlicher Präparate anführen.

Metallisches Quecksilber.

§. I. Präparate, in denen die Wirkung des Quecksilbers nicht oder doch auf keine merkliche Weise durch andere Substanzen modificirt ist.

A. Quecksilber in Substanz.

Potio Mercurii vivi s. mercurialis. (*B.*)

℞. Mercurii purificati uncias duas ad quatuor.

Divide in doses octo. — Alle zwei Stunden eine Gabe, bei volvulus.

Brera hat einem Kranken das Quecksilber bis zu sechs und zwanzig Unzen gegeben; es bewirkte zwar keine Heilung, erleichterte aber beträchtlich.

Aqua Mercurii vivi cocta s. mercurialis simplex. (Ful. *Br. Fi. T.*)

℞. Mercurii . . . . libras duas.
Aquae communis libras quatuor.

Coque in retorta per horas duas et decantha.

T. Mercurii libram unam, Aquae pluvialis libras duas, coquere per horam unam, (*Fi.*) per duas.

Wurmwidrig — Man wendet es, allein oder mit Zucker versetzt, bei Kindern gegen Maden und Spulwürmer an. — Gabe, ein- bis sechsjährigen, eine halbe bis drei Unzen.

Decoctum Hydrargyri s. Mercurii. (Wür.)

℞. Mercurii purificati uncias duas.
Aquae Tanaceti . libram unam.

Coque in olla fictili tecta, metallum saepius baculo agitando; decantha et adde aquae
Syrupi Florum Persicae unciam unam.

Wurmwidrig.

Decoctum anthelminticum Rosensteinii. (*Au. Pid.*)

℞. Radicis Graminis . semunciam.
Corticis Aurantiorum semidrachmam.
Cinnamomi . . semiscrupulum.
Aquae fontanae . . libras octo.

Coque ad trium quadrantium consumptionem, cola et adde
Mercurii . . . . uncias duas.

Coque iterum in vase fictili, agitando saepius baculi ope, tunc lente decantha.

Bei Wurmbeschwerden der Kinder in der Gabe von acht Unzen bis zu einem Pfund, allein oder mit Milch, empfohlen.

Emplastrum resolvens s. fundans. (*Bo.*)

℞. Emplastri diabotani uncias duas.
Succi Solani nigri drachmas duas.
Cum Vitello ovi unius tritis adde
Amalgamatis Mercurii et Plumbi partium aequalium drachmas duas.
Cetacei . . . sesquidrachmam.

B. Quecksilber mittelst Schleim zertheilt.

Mucilago mercurialis Plenkii s. Gummi Arabici mercurialis. (Sax. Wir. *Br.*)

℞. Mercurii purificati drachmam unam.
Gummi Arabici drachmas duas.
Aquae communis cochlearia duo.

Agita mixturam in mortario pistilli vitrei ope, donec metallum disparuerit. (*Br.*)

Sax. et Wir. Mercurii drachmam unam, Gummi semunciam et Aquae sufficientem quantitatem. — Enthält um die Hälfte weniger Quecksilber, als der vorige.

Reizend, revulsiv, wegen letzterer Wirkung er bisweilen als schwächend betrachtet worden ist; denn man hat ihn bei entzündlicher Ruhr und einigen andern entzündlichen Krankheiten empfohlen. Auch hat man ihn äußerlich bei sogenannter venerischer Gonorrhöe, Augen- und Halsentzündung angewendet. Eben so hat man sich desselben auch gegen große Ascariden bedient. Innerlich giebt man ihn vermischt z. B. mit acht Unzen Aqua Fumariae und einer halben Unze Syrup, zu einem oder zwei Löffel Morgens und Abends.

Syrupus Hydrargyri s. Mercurii s. mercurialis s. de Mercurio et Gummi s. Mercurii gummosus, Mercurius gummosus Plenkii. (B*. Fer. Ful. Gal. Hass. Li. *Fi. Sa. Sp. T. Vm.*)

℞. Mercurii purificati drachmam unam.
Gummi Arabici pulverati drachmas tres.
Tritura ad extinctionem usque et adde deinde
Syrupi Capitum Papaveris semunciam.
Tritura iterum in mortario marmoreo et in mucilaginem redige. (B*. Fer. Gal. Hass. Li *Fi. Sp.*)

T. Mercurii drachmas duas cum triplici pondere Gummi aliquot guttis Aquae Menthae vel Florum Aurantii additis triturando in mucilaginem redacti ad extinctionem terere et addere Syrupi Diacodii unciam unam.

℞. Mucilaginis Gummi Arabici drachmas sex.
Mercurii . . drachmam unam.
Tritura ad extinctionem metalli usque et adde
Syrupi Sacchari uncias quatuor.
Misce bene. (Ful.)

℞. Mercurii . . . semidrachmam.
Gummi Arabici sesquidrachmam.
Aquae . . . . cochlear unum.
Tritura ad metalli extinctionem usque et adde deinde
Syrupi Violarum . uncias duas.
Aquae Florum Sambuci unciam unam.
Misce bene. (*Sa.*)

℞. Gummi Arabici . drachmas tres.
Aquae drachmas septem cum dimidia.
Fiat mucilago, cui adde
Unguenti mercurialis cum Butyro Cacao parati sesquidrachmam.
Tere simul bene et sensim admisce intime
Syrupi Sacchari . . uncias sex.
Serva. (*Vm.*)

Wenn man diesen Syrup anwendet, muß man ihn so geben daß der Kranke drei bis sechs oder acht Gran Quecksilber täglich bekommt. Die letztere Formel unterscheidet sich kaum von der des folgenden Präparats.

Conditum hydrargyro-unguinosum, Marmelada mercurialis, Linimentum mercuriale. (*Sw. Vm.*)

℞. Unguenti Mercurialis cum Butyro Cacao parati . drachmas tres.
Mucilaginis Gummi Arabici drachmas sex.
Misce ut fiat emulsio, cui sensim adde
Mellis albi . . uncias quatuor.

Ein Präparat, welches bei unterdrückter hitziger Harnröhrenentzündung durch Mißbrauch oder unzeitigen Gebrauch von Purgirmitteln empfohlen worden ist. — Gabe, zwei bis vier Kaffeelöffel.

Syrupus mercurialis gummosus de Lagneau. (*Ca.*)

℞. Mercurii . . scrupulum unum.
Gummi Arabici . unciam unam.
Syrupi Cichorii compositi quantitatem sufficientem.
Tritura in mortario vitreo ad perfectam metalli extinctionem usque et adde
Syrupi Cichorii compositi sesquiunciam.

Anwendung, wie bei'm vorhergehenden.

Mixtura Mercurii gummosa s. mercurialis, Potio mercurialis Plenkii. (Br. Lus. Sar.)

℞. Mercurii . . drachmam unam.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae semunciam.
Tritura ad extinctionem et adde
Syrupi Sacchari . unciam unam.
Aquae destillatae . uncias octo.
Misce bene. (Lus.)

℞. Mercurii . . drachmam unam.
Gummi Arabici drachmas duas.
Syrupi Sacchari . . semunciam.
Tritura ad extinctionem metalli et adde
Aquae Menthae . . uncias sex.
— Juniperi compositae unciam unam.
Misce exacte. (*Sa.*)

℞. Gummi Arabici . drachmas tres.
Adsperge in mortario marmoreo Aquae pauxillum ut mucilaginis consistentiam adipiscatur, cui adde
Mercurii . . drachmam unam.
Tritura ad perfectam extinctionem et adde sensim continuè terendo
Syrupi kermesini . semunciam.
Aquae Fumariae . . uncias octo.
Misce bene. (Br.)

Die Anwendungsweise siehe oben unter Mucilago mercurialis.

Ein in Rücksicht der Wirkung ähnliches Präparat ist Schlesinger's *Solutio Hydrargyri gummosi.*

℞. Mercurii . . . . grana decem.
Cetacei . . . . semidrachmam.
Vitelli Ovi . . . . . no. 1.
Syrupi Althaeae . unciam unam.
Aquae destillatae . uncias duas.
Misce triturando. (*Au.*)

Mixtura mercurialis balsamica. (Br.)

℞. Balsami Copaivae,
Gummi Arabici,
singulorum semidrachmam.
Mercurii . . drachmam unam.
Tritura ad extinctionem metalli et adde
Syrupi kermesini,
Aquae Fumariae,
singulorum uncias duas.
Misce bene. — Besonders bei Harnröhrenentzündung empfohlen.

Lac mercuriale Plenkii. (B*. *Sm.*)

℞. Mercurii . . drachmam unam.
Gummi Arabici drachmas quatuor.
Syrupi Capitum Papaveris
quantum sufficit
ut fiat mucilago. Post longam trituram in mortario adde sensim
Lactis vaccini bullientis
uncias octo.

In Waschungen bei sogenannter gonorrhoischer Augenentzündung, in Bädern bei Phimosis von Geschwüren auf der Eichel und in Gurgelwasser bei sogenannter syphilitischer Bräune.

Injectio hydrargyrica s. mercurialis simplex. (*Sw.*)

℞. Unguenti mercurialis
drachmas duas.
Mucilaginis Gummi Arabici
semunciam.
Tritura ut fiat emulsio, cui sensim adde
Aquae . . . . . uncias tres.

Bei chronischem Tripper. — Man spritzt vier Mal täglich zwei Drachmen ein.

Injectio mercurialis Plenkii. (*Sp.*)

℞. Mercurii . . drachmam unam.
Gummi Arabici . drachmas tres.
Syrupi Capitum Papaveris
semunciam.
Tritura ad extinctionem et adde
Aquae fontanae uncias duodecim.
— Rutae . . . uncias duas.

Bei Gonorrhöe und habituellem weißen Fluß.

Einfacher ist folgende Injection Hufeland's.

℞. Mercurii . . drachmam unam.
Gummi Arabici . . semunciam.
Syrupi Opii
sufficientem quantitatem.
Tere mercurium cum gummi, syrupum sensim addendo, donec omnia in mucilaginem sint conversa. (*Au.*)

Gargarisma mercuriale Plenkii. (*Sp.*)

℞. Mercurii . . . semidrachmam.
Gummi Arabici . drachmas tres.
Syrupi Capitum Papaveris
semunciam.
Mercurii dulcis . . . grana sex.
Tritura ad extinctionem et adde
Decocti e Herbae Clematitis erectae semuncia cum Aqua
uncias viginti sex.
Mellis rosati . . unciam unam.
Essentiae Myrrhae
drachmam unam.

Bei sogenannten syphilitischen Bräunen und Nasengeschwüren gepriesen.

Trochisci Mercurii saccharini s. de Lagneau. (*Ca.*)

℞. Sacchari pulverati uncias decem.
Mercurii . . . . uncias duas.
Gummi Arabici . unciam unam.
Vanillae ! . . drachmam unam.

Fiant l. a. trochisci centum septuaginta sex. — Eine jede enthält zwei Gran Quecksilber.

Trochisci Mercurii saccharati s. saccharini. (*Sy.*)

℞. Mercurii . . . unciam unam.
Sacchari crystallisati (Candis)
uncias duas.
Tritura cum Aquae guttis aliquot ad metalli perfectam extinctionem et adde
Mucilaginis Gummi Arabici
quantum sufficit.

Fiant trochisci granorum sex, quibus si necesse est, aliquot guttae Olei essentialis Juniperi vel Florum Aurantiorum addantur.

Pilulae mercuriales Plenkii s. Hydrargyri gummosae. (An. Bel. *Au. Sy. Vm.*)

℞. Mercurii gummosi partem unam.
Micae Panis
partem unam cum dimidia.
Mellis albi . . quantum sufficit
ut fiat massa pilularis. (*Vm.*)

℞. Mercurii . . drachmam unam.
Gummi Arabici,
Mellis, singulorum drachmas duas.
Pulveris Liquiritiae . semunciam.

Fiant pilulae trium granorum. (*Au.*)

℞. Mercurii . . scrupulum unum.
Amyli . . . drachmam unam.

Mucilaginis Gummi Arabici
quantum sufficit.
Tritura ad perfectam extinctionem usque et adde
Pulveris Liquiritiae
quantum sufficit
ut fiat massa in pilulas viginti dividenda. (*Sy.*)

℞. Mercurii . . drachmam unam.
Gummi Arabici pulverati
drachmas tres.
Syrupi Rhei
sufficientem quantitatem.
Tritura in mortario marmoreo ad perfectam metalli extinctionem et adde
Micae Panis albi . semunciam.
Fiat massa pilularis. (An. Bel.)

Pilulae mercuriales Plenkii compositae s. antisyphiliticae Plenkii. (Fer. Gal. *Br. Ca. Fi. Pie. T. Vm.*)

℞. Mercurii gummosi . partes tres.
Extracti Cicutae . partem unam.
Pulveris Liquiritiae
quantum sufficit
ut fiat massa pilularis. (*Vm.*)

℞. Mercurii purissimi,
Extracti Cicutae,
singulorum drachmam unam.
Mucilaginis Gummi Arabici
drachmas sex.
Radicis Liquiritiae pulveratae
quantum sufficit.
Mercurio cum mucilagine ad extinctionem trito adde liquiritiam ut fiat massa pilularis, in 288 pilulas dividenda. (*Fi.*)

T Ingredientium dictorum, singuli duplum ut fiant pilulae pondere trium vel quatuor granorum.

℞. Mercurii . . drachmam unam.
Gummi Arabici . drachmas sex.
Tritura ad extinctionem metalli et adde
Extracti Cicutae drachmam unam.
Fiant pilulae granorum duorum. (Fer. Gal. *Br. Ca. Pie*)
Gabe, vier bis ſechs Pillen.

Pilulae mercuriales cum Opio. (Fi)

℞. Mercurii . . . unciam unam.
Gummi Arabici pulverati
uncias duas.
Agita in mortario marmoreo, Aquam addendo ut extinguatur mercurius et pasta fiat mollis, cui adde
Opii puri pulverati scrupulos octo.
Radicis Liquiritiae pulveratae
unciam unam.
Fiat cum Aquae sufficiente quantitate massa in 240 pilulas dividenda. — Gabe, ein bis zwei Stück täglich.

C. Queckſilber mittelſt zuckerartiger Subſtanzen zertheilt.

Mercurius saccharatus, Hydrargyrum saccharatum, Aethiops saccharatus, Oxydum Hydrargyri saccharatum, Saccharum Mercurii vermifugum s. anthelminticum s. mercuriale. (Fer. Ful. Han. His. Li. Sar. Wür. *Ca. Fi. Sp. T. Vm.*)

℞. Mercurii . . . . partem unam.
Sacchari albi . . . partes duas.
Tritura ad perfectam metalli extinctionem usque. (Han. Sar. *Sp. Vm.*)

Ful. Li. et *Ca.* Saccharum crystallisatum (Candis) flavum adhibere jubent.

℞. Mercurii . . partem unam.
Sacchari albi . . . partes duas.
Aquae . . . . quantum sufficit
ut fiat pasta mollis, quam ad perfectam metalli usque extinctionem tere. (His.)

℞. Mercurii,
Sacchari albi,
singulorum semunciam.
Olei essentialis Tanaceti
guttas viginti sex.
Tritura ad perfectam metalli extinctionem. (Wür.)

℞. Mercurii,
Sacchari albi,
singulorum semunciam.
Cremoris Tartari scrupulos duos.
Tritura ad perfectam metalli usque extinctionem. (Fer. *Fi.*)

T. duplicem quantitatem ingredientium indicat.

Dieſes Präparat wird bei Kindern und zarten Perſonen, welche an Syphilis leiden, empfohlen. — Man giebt es in Chocolate oder in Kaffee.

Mel hydrargyratum s. mercuriale. (B*. *Sw. Sy.*)

℞. Mercurii,
Mellis despumati,
singulorum unciam unam.
Tritura ad extinctionem usque.

Potio anodyna s. leniens Andryi. (*Ca.*)

℞. Aquae Florum Aurantiorum
uncias duas.
— Rosarum,
Syrupi Capitum Papaveris,
singulorum unciam unam.
Mercurii . . . . drachmas sex.
Terendo mercurium in syrupo extingue et massam deinde cum aquis commisce. — Bei Cardialgie, Gaſtrodynie und krampfhaftem Erbrechen. — Gabe, ein Löffel Morgens und Abends.

Boli coerulei. (*Au. E. Sa.*)

℞. Mercurii . . . . grana decem.

Conservae Rosarum
scrupulum unum.
Tritura ad extinctionem usque.

Boli e Mercurio glycyrrhizato. (*Au. Sy.*)
℞. Mercurii . . . grana decem.
Extracti Liquiritiae mollis
scrupulum unum.
Tritura ad extinctionem.

Pilulae Hydrargyri s. coeruleae. (Am. B*. Du. Ed. Gen. Lon. LonN. Suec. *Br. C. Ca. E. Ra. Vm.*)
℞ Mercurii,
Conservae Cynorrhodi,
singulorum drachmam unam.
Trituratis ad extinctionem, fiant cum pulvere Liquiritiae, pilulae triginta sex aequales. (*Ra.*)
Gen. Mercurii partem unam et duas Conservae Rosarum.
℞. Mercurii,
Conservae Rosarum,
singulorum drachmam unam.
Tritura cum Mucilaginis Gummi Arabici parva quantitate ad extinctionem usque et adde
Amyli pulverati . . uncias duas.
Fiant pilulae quadraginta octo. (Ed. *Br Ca E. Vm.*)
℞. Mercurii . . . drachmas duas
Conservae Rosarum drachmas tres.
Extingue mercurium et adde
Pulveris Liquiritiae
drachmam unam.
Fiat massa pilularis. (Am. B*. Du. *Lon LonN. Br. C.*)
℞. Mercurii,
Conservae Rosarum,
singulorum drachmas duas.
Sacchari albi . drachmam unam.
Post extinctionem metalli adde
Pulveris Amyli,
— Succi Liquiritiae,
singulorum semidrachmam.
Aquae . . parvam quantitatem.
Fiant pilulae ducentae octoginta octo. (Suec.)
Von den Pillen der ersten Formel enthält jede zwei Gran Queckſilber; die der zweiten je eine anderthalb und von denen der letzten jede bloß einen halben Gran.

Pilulae Mercurii melliti s. Mellis hydrargyrati. (His.)
℞. Mercurii,
Mellis, singulorum unciam unam.
Post metalli extinctionem adde
Micae Panis albi recentis
uncias duas.
Fiat massa pilularis.
℞. Mercurii . . . . uncias duas.
Mellis uncias duas cum dimidia.
Tritura ad extinctionem et adde
Pulveris Liquiritiae sesquiunciam.
Fiat massa pilularis.

Pilulae Mercurii glycyrrhizati. (Lus. *Sy.*)
℞. Mercurii,
Mellis, singulorum unciam unam.
Extracti Liquiritiae uncias duas.
Fiat massa pilularis. (*Sy.*)
℞. Mercurii,
Extracti Liquiritiae,
singulorum partes octo.
Pulveris Liquiritiae partem unam.
Fiat massa pilularis. (*Sy.*)
Lus. Mercurii partes duas, Extracti tantidem et unam Pulveris.

Pulvis anthelminticus s. vermifugus. (Wür.)
℞. Radicis Jalappae . semunciam.
— Valerianae,
— Filicis Mariae,
Mercurii saccharati,
singulorum drachmas duas.
Ferri sulphurici exsiccati
scrupulos duos.
Elaeosacchari Tanaceti semunciam.
Fiat pulvis subtilissimus.

D. Queckſilber mittelſt erdiger Subſtanzen zertheilt.

Mercurius alcalisatus s. cum Creta, Aethiops alcalisatus. (Du. Ful. Lon. LonN. Wir. Wür. *Pid.*)
℞. Mercurii . . . . partes tres.
Cretae praeparatae partes quinque.
Tritura ad perfectam usque metalli extinctionem. (Lon. LonN.)
Ful. Wir. Wür. et *Pid.* loco cretae Oculos Cancrorum praeparatos, caeterum easdem quantitates secundum Wir.; Ful. Wür. et *Pid.* Mercurii unam et duas Oculorum Cancrorum.
℞. Mercurii,
Mannae, singulorum unciam unam.
Cretae praeparatae . semunciam.
Tritura mercurium cum manna et guttis aliquot Aquae ad perfectam usque extinctionem; adde Mannae drachmam unam, continue triturando; mixtione perfecta massae infunde Aquae octarium unum, sepone per aliquot tempus et liquidum decantha; ablutione bis repetita, sedimentum humidum adhuc cum reliqua creta commisce et totum super charta josephina sicca. (Du.)

Mercurius alcalisatus s. cum Magnesia. (Du. Li.)
℞. Mercurii . . . . semunciam.
Magnesiae albae . unciam unam.
Tritura ad perfectam metalli extinctionem. (Li.)
Du. eundem pulverem quam pro

praeparatione mercurii alcalisati indicat.

Dieſes und das folgende Präparat ſind die beſten, welche man anwenden kann, wenn man metalliſches Queckſilber zu geben die Abſicht hat.

Boli mercuriales. (*Sa.*)

℞. Mercurii alcalisati semidrachmam.
Conservae Rosarum
scrupulum unum.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.

Topicum detersivum. (*Bo.*)

℞. Mercurii,
Cretae albae,
singulorum semunciam.
Post extinctionem metalli adde
Mellis rosati . . . uncias duas.

Fouquet wendete dieſes Präparat auf veneriſche Geſchwüre an.

Liquor resolvens. (*Sm.*)

℞. Mercurii . . . semidrachmam.
Calcis vivae . . drachmas duas.

Tritura ad perfectam extinctionem usque et mixturam lagenae ingere repletae Aqua in solutione tenente
Saponis grisei drachmas quatuor.

Dieſer Liquor gilt als ein kräftiges Auflöſungsmittel bei kalten und ſchmerzloſen Geſchwülſten, beſonders bei Anſchwellungen der Schilddrüſe. — Man läßt ihn erwärmen und tränkt Compreſſen damit.

E. Queckſilber, mittelſt fetter und harziger Körper zertheilt.

Injectio hydrargyro-terebinthinata. (*Sw*.*)

℞. Mercurii,
Terebinthinae,
singulorum drachmas duas.

Tritura per horam unam et adde deinde
Axungiae . . . semidrachmam.
Fiat cum
Mucilaginis Gummi Arabici
drachmis duabus,
Aquae . . . . . unciis tribus
emulsio. — Bei hartnäckigen Ausflüſſen aus der Harnröhre empfohlen. — Man ſpritzt davon zwei Drachmen täglich dreimal ein.

Pilulae Mercurii terebinthinati. (*Sw*, Sy.*)

℞. Mercurii . . . partes quatuor.
Terebinthinae . . partem unam.

Post extinctionem metalli fiat cum
Mucilaginis spissi Gummi Arabici
partibus duabus
emulsio, cui adde deinde
Panis albi biscocti (Biscuit) pulverati quantitatem sufficientem ut fiant pilulae quinque granorum. (*Sw*.*)

℞. Mercurii . . . unciam unam.
Terebinthinae Venetae
sesquidrachmam.

Metallum extingue addendo si necesse, Essentiae Terebinthinae guttas aliquot; fiant cum
Pulveris Liquiritiae
sufficiente quantitate pilulae octoginta. (*Sy.*)

Sw.* praeterea: Mercurii, Terebinthinae, singulorum drachmas duas et post extinctionem, sufficientem quantitatem mixturae e Pulveris Liquiritiae et Radicis Althaeae, singulorum partibus aequalibus.

Pilulae mercuriales. (Fer *Pie.*)

℞. Mercurii . . . unciam unam.
Terebinthinae . quantum sufficit ad extinctionem metalli; adde
Pulveris Succini,
— Liquiritiae,
singulorum drachmas duas.
Syrupi Althaeae
sufficientem quantitatem ut fiant pilulae quatuor granorum. (*Pie.*)

℞. Mercurii . . . unciam unam.
Balsami Meccaënsis sesquiunciam.

Trituratis ad metalli extinctionem exacte admisce
Massae Pilularum cum Opio
drachmam unam.
Fiat massa pilularis. (Fer.)
Gabe, acht bis zwölf Gran.

Unguentum mercuriale s. mercuriale cinereum Hydrargyri s. Hydrargyri cinereum s. Hydrargyri sine et cum Terebinthina s. Neapolitanum. (A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonV. Lus. O. Pol. R. RC. Sar. Sax. Suec. Wir. Würt. *B. Br. C. Ca. Fi. Pid. Ra. Sp. Sw. Sy. T. Vm.*)

Da es eine lange und mühevolle Arbeit iſt, das Queckſilber gänzlich zu zertheilen, ſo hat man, um dieſe zu beſchleunigen, verſchiedene Mittel vorgeſchlagen, welche auf ſieben zurückgeführt werden können, nämlich:

1) Zuſatz von Terpentin;
2) von etwas alter Queckſilberſalbe;
3) von einer kleinen Menge oxygenirter Salbe.
4) Verfahren Dufilho's. Man bringt das Queckſilber in eine Flaſche mit

gewölbtem spitzzulaufenden Grunde, füllt letztere zur Hälfte mit reinem Wasser, schüttelt sie einige Zeitlang, indem man die Oeffnung mit dem Daumen zuhält, läßt dann die Kügelchen sich setzen, gießt das Wasser ab und schüttet das Queckſilber auf das Fett; zwanzig Minuten sind zu seiner Zertheilung hinreichend. Bompois bediente sich, nach Fée, eines ähnlichen Verfahrens, welches darin besteht, daß er acht Unzen Queckſilber und sechs Unzen zerlassenen Schmeer mit zwei Unzen Baumöl in eine Flasche von einem Litre Gehalt einträgt, letztere dann verpfropft und so lange schüttelt, bis das Gemisch die Consistenz eines Zuckersyrups angenommen; hierauf das Ganze in einen Mörser gießt und es eine halbe Stunde lang stark zusammenreibt.

5) Verfahren Dumesnil's. Man thut vier Unzen Fett, ein Pfund Queckſilber und eine Unze süßes Mandelöl in einen Mörser und schüttelt ihn eine Viertelstunde lang gelinde um, welches zur gänzlichen Zertheilung des Metalls hinreichend ist.

6) Verfahren Planche's. Man reibt das Queckſilber mit Eieröl zusammen und setzt dann das Fett, wie gewöhnlich, hinzu.

7) Verfahren Hernandez's. Man erwärmt den Mörser, um das Fett zu zerlassen, setzt dann das Queckſilber hinzu und reibt es zusammen, bis zum völligen Erkalten. Das Hessische Dispensatorium giebt schon ein ähnliches Verfahren an; man läßt nämlich das Fett am Feuer schmelzen und setzt es dann zurück, hierauf thut man, wenn es kalt zu werden anfängt, das Queckſilber hinzu, und reibt es zusammen.

Unter medicinischem Gesichtspuncte betrachtet, macht es wenig Unterschied, welches Verfahren der Apotheker befolgt. Nur muß er bedenken, daß durch Zusatz von alter Salbe, von Terpentin und von oxygenirter Salbe die Salbe einen unangenehmen Geruch bekommt, und daß diejenige, zu welcher Terpentin genommen wird, einen schmutzigen Ueberzug auf der Haut zurückläßt.

Uebrigens bringt die Salbe, wenn sie, wie es so häufig zu geschehen pflegt, ranzig ist, gern rothlaufartige Entzündungen auf der Haut hervor, die freilich den allgemeinen Wirkungen, welche man von ihr erwartet, nicht hinderlich sind, da man die Bemerkung gemacht hat, daß sie, je älter, desto wirksamer ist, welche aber doch bisweilen Unbequemlichkeiten und Beschwerden veranlassen.

Außerdem ist die Kenntniß der Verhältnisse des Queckſilbers und seines Excipiens vorzüglich dem Arzte wünschenswerth. Diese Verhältnisse bieten aber eine fast unendliche Mannichfaltigkeit dar. Mehrere Pharmacopöen geben nur eine einzige, andere dagegen führen zwei und selbst drei an. Sehr allgemein, jedoch nicht immer, führen die Salben, welche die geringste Menge Queckſilber enthalten, den Namen *Unguentum griseum. Unguentum neapolitanum* wird ohne Unterschied zur Bezeichnung beider gebraucht, obgleich, streng genommen, nur die am wenigsten queckſilberhaltigen so genannt werden sollten.

Da die Untersuchungen der neuern Pharmaceuten über die wirksamsten Verfahrungsweisen, das Queckſilber zu verdünnen und innig mit dem Fett zu mischen, alles das unnütz machen, was früher in dieser Hinsicht gethan worden ist, so wollen wir das in den verschiedenen Pharmacopöen angezeigte Verfahren übergehen und uns nur darauf beschränken, die Zusammensetzung der in denselben erwähnten Queckſilbersalben kennen zu lehren. Aus diesem Gesichtspuncte kann man, nach dem Verhältniß des Queckſilbers zu den fetten, ihm als Excipiens dienenden Körpern, zehn Abtheilungen aufstellen. Es kömmt nämlich das Queckſilber vor:

1) Im Verhältniß von 1 zu 1:

An. Ba. Bel. Du. Gal. GalM. Gen. Hass. *Be. Br. Ca Ra. Sp.* Mercurii et Axungiae Porci praeparatae et lotae, singulorum unciam unam.

Fenn. Suec. Mercurii uncias duas, Axungiae Porci et Sevi Hirci, singulorum unciam unam.

Lon. Mercurii libras duas, Axungiae uncias viginti tres et Sevi vervecini unciam unam; — Fer. *Fi.* Mercurii libram unam, Axungiae uncias novem et Sevi uncias tres; — *T.* Mercurii uncias quadraginta, Axungiae triginta et Sevi decem.

Siv. Mercurii uncias quatuor, Axungiae tres cum dimidia et Unguenti mercurialis semunciam.

Sy. Mercurii uncias duas, Sevi vervecini semunciam et Butyri Cacao sesquiunciam.

Die letztere Salbe ist etwas stärker, als die vorhergehenden, wie auch die von *Vm.* vorgeschriebene:

Mercurii partes sedecim, Unguenti mercurialis partem unam.

Die folgenden sind dagegen etwas schwächer.

Sar. Mercurii partem unam, Terebinthinae quantitatem non determinatam sed quae ad metalli extinctionem sufficiat, Axungiae partem unam.

Am. *C.* Mercurii partes tres, Sevi partem unam et Axungiae partes tres.

GalH. et *Ca.* Mercurii unciam unam, Olei Ovorum recentis guttas viginti, Butyri Cacao in Olei Amygdalarum

dulcium pauxillo liquefacti unciam unam.

Dieses Verfahren, welches Planche angiebt, liefert eine sehr wohlriechende Salbe, welche, obgleich von größerer Consistenz als die gewöhnliche, sich doch leicht auf der Haut ausbreitet. Man bringt das Queckſilber und das Eieröl in einen kleinen, sehr weiten marmornen Mörſer und reibt es eine Viertelſtunde lang zuſammen, andererſeits erwärmt man einen Porcellanmörſer und deſſen Keule und thut die Cacaobutter hinein; ſobald ſie flüſſig iſt, ſetzt man das durch das Eieröl zertheilte Queckſilber hinzu, indem man den Mörſer inſoweit warm erhält, daß die Butter in einem gewiſſen Grad flüſſig bleibt; man läßt dann den Mörſer allmälig erkalten, indem man das Reiben noch eine Viertelſtunde lang fortſetzt.

2) Im Verhältniß von 1 zu 2.

Du. His. Lon. LonN. R. Sax. *Sw.* Mercurii partem unam et duas Axungiae. (Mercurii libras duas, Adipis uncias viginti tres, Sevi unam Lon. LonN.)

Bor. Han. Pol. Mercurii libram unam, Sevi vervecini uncias octo, Axungiae Porci sedecim et Olei Citri drachmam unam; — Bor4. et HassP. Oleum Citri omittunt: ut mercurius citrus aboleatur, eum una cum sevo et portiuncula ejusdem unguenti, prius praeparati et nondum corrupti terere licet (HassP.) — Ed. Mercurii partem unam, Sevi vervecini et Axungiae, singulorum unam; praeterea Unguenta duo alia indicat: unum cum duplo alterum cum triplo Mercurii; — BorC. O. Mercurii partes duodecim, Sevi vervecini octo et sedecim Axungiae; — Ful. Mercurii semunciam, Sevi vervecini drachmam unam et Axungiae uncias duas; — Ba. Mercurii partes tres, Sevi vervecini duas et quatuor Axungiae; — Ams. Mercurii semilibram, Sevi tantidem et Axungiae sesquilibram.

Br. Wir. Mercurii uncias quatuor, Terebinthinae sesquiunciam, Axungiae Porci uncias decem et Olei essentialis Lavandulae drachmam unam.

3) Im Verhältniß von 2 zu 5.

Sax. Mercurii partes quatuor, Terebinthinae quantum satis ad extinguendum et Axungiae Porci partes decem.

4) Im Verhältniß von 1 zu 3:

Am. Ed. *C* Mercurii e protochlorureto calcis ope praecipitati partem unam et tres Axungiae; — *Pid.* Mercurii uncias duas, Terebinthinae drachmas quinque, Axungiae uncias quinque et Olei Olivarum semidrachmam; — Wür. Mercurii unciam unam, Terebinthinae semunciam et Axungiae uncias tres; — RC. Mercurii unciam unam, Terebinthinae semunciam, Unguenti simplicis vel Adipis suillae drachmas quatuordecim.

5) Im Verhältniß von 1 zu 4:

D. Lus. Mercurii, Sevi, singulorum unciam unam et tres Axungiae; — A. Mercurii uncias tres, Terebinthinae semunciam et Cerati citrini libram unam; — B. Bel. Mercurii partes duas, Unguenti oxygenati unam, Axungiae sex et unam Olei.

6) Im Verhältniß von 2 zu 9:

Han. HassP. Li. Mercurii uncias quatuor, Terebinthinae duas et Axungiae sedecim. (*Unguentum mitius.* HassP.)

7. Im Verhältniß von 1 zu 6:

Gen. *Ra.* Mercurii unciam unam et sex Axungiae; — *Vm.* Mercurii partes duas, unam Terebinthinae et Axungiae duodecim; — *Fi.* Mercurii uncias duas, Axungiae libram unam. (*Unguentum mitius.*)

Lon. LonN. *Unguentum mitius;* Unguenti mercurialis communis partem unam et duas Axungiae.

8) Im Verhältniß von 1 zu 8:

Gal. GalM. Unguenti mercurialis unciam unam et tres Axungiae; — *T.* Unguenti mercurialis uncias decem, Sevi tantidem et Axungiae viginti.

9) Im Verhältniß von 1 zu 10:

An. Unguenti mercurialis uncias tres et Axungiae libram unam.

10) Im Verhältniß von 1 zu 16:

Ed. Unguenti mercurialis partem unam et tres Axungiae.

Nimmt man zu dieſen zahlreichen, heutzutage ſich findenden Verſchiedenheiten noch die bereits in Vergeſſenheit gekommenen hinzu, ſo iſt leicht einzuſehen, mit welcher Vorſicht man bei Leſung älterer ſowohl als neuerer Abhandlungen über ſyphilitiſche Krankheiten zu Werke gehen muſſe, wenn man rückſichtlich des Mercurs als Heilmittel derſelben, richtige Schlüſſe daraus ziehen will. Wendet man heutzutage eine Salbe, aus gleichen Theilen Queckſilber und Fett bereitet, an, ſo reibt man gewöhnlich jedesmal eine halbe bis eine Drachme ein, wenn dieß täglich, und eine bis zwei Drachmen, wenn es bloß einen Tag um den andern geſchieht. Selten reibt man mehr ein, und es iſt auch gefährlich, dieß zu thun.

Ceratum mercuriale. (*Ra.*)

℞. Unguenti mercurialis uncias quatuor.

Cerati simplicis . uncias decem.
Misce triturando.
Besonders zum Verbinden syphilitischer Geschwüre empfohlen.

Unguentum s. Pomatum mercuriale oxygenatum. (*Vm.*)

℞. Unguenti mercurialis partem unam.
— oxygenati . . partes duas.
Ung. oxygenato liquefacto leni calore momento quo ut concrescat in eo est, ung. merc. admisce.

Unguentum digestivum mercuriale. (*Ra.*)

℞. Unguenti mercurialis,
— digestivi simplicis,
singulorum uncias quatuor.
Terendo misce. — Zum Verbinden venerischer atonischer Geschwüre empfohlen.

Balsamum mercuriale Plenkii. (*Sp.*)

℞. Mercurii . . . drachmas duas.
Terebinthinae drachmam unam.
Tritura ad disparitionem globulorum usque et adde
Axungiae Porci . . drachmas sex.
Balsami Arcaei drachmas novem.
Mercurii dulcis grana viginti tria.
Von Plenk zum Verbinden venerischer Geschwüre gerühmt.

Unguentum antiarthriticum. (*Sw**.)

℞. Unguenti mercurialis drachmam unam.
— Althaeae . drachmas tres.
Misce. — Man reibt mit einer Drachme von dieser Salbe Abends die von Gicht befallenen Theile ein; auch soll sie bei chronischer Leberentzündung in Einreibungen auf die Lebergegend, unter Zusatz von einer halben Drachme Kampfer, von Nutzen seyn.

Unguentum s. Pomatum mercuriale Sanchezii. (*Sm.*)

℞. Mercurii . . . uncias quatuor.
Mellis Narbonnensis drachmas quatuor.
Post extinctionem metalli adde
Camphorae pulveratae drachmas quatuor.
Butyri Cacao . . . uncias octo.
Tritura per horas septuaginta. — In Einreibungen. — Gabe, von zwei Drachmen bis zu einer Unze.
E. Unguentum mercuriale camphoratum ex Unguenti simplicis uncia una et Camphorae drachma una indicat.

Pilulae Unguenti mercurialis. (GalH. *Ra.*)

℞. Unguenti mercurialis unciam unam.
Amyli vel Pulveris Radicis Althaeae sufficientem quantitatem ut fiat pasta homogenea. (GalH.)
Ra. parare jubet cum Unguenti drachmis duabus et Pulveris Liquiritiae sufficiente quantitate massam in centum quadraginta quatuor pilulas dividendam.

Pilulae de Sédillot. (*Bo. Ca. Pie. Ra.*)

℞. Unguenti mercurialis uncias tres.
Saponis medicinalis uncias duas.
Amyli vel Pulveris Liquiritiae unciam unam.
Fiant pilulae quatuor ad sex granorum.
Lagneau hat diese Formel folgendermaaßen verändert:
℞. Unguenti mercurialis cum Butyro Cacao parati . . semunciam.
Sacchari pulverati drachmas duas.
Mucilaginis Gummi Arabici quantum sufficit
ut fiat massa in centum quadraginta quatuor pilulas dividenda; addi possunt Saponis drachmae duae vel tres.
Ein unannehmliches Präparat, welches auch, besonders wegen des darin unbestimmt vertheilten Queckſilbers, zu verwerfen ist; die Pastillen Lagneau's oder die Plenck'schen Pillen sind, hinsichtlich ihrer Annehmlichkeit und der genauern Bestimmung des darin enthaltenen Queckſilbers weit vorzuziehen; man könnte den letztern nöthigenfalls durch Zusatz von Seife eine purgirende Wirkung mittheilen.

Unguentum pediculorum s. Sabadillae cum Mercurio s. de Staphysagria s. de Staphysagria compositum. (Br. Han. O. Pal. Sar. Wir. *Fi. Sp.*)

℞. Mercurii . . . sesquiunciam.
Axungiae Porci . sesquilibram.
Post extinctionem metalli mixturae adde
Staphysagriae pulveratae uncias quatuor.
Misce bene. (Sar.)

℞. Mercurii . . . . uncias duas.
Terebinthinae . . unciam unam.
Tritura ad extinctionem metalli usque et adde
Axungiae Porci . . libras tres.
Olei Lauri . . . . semilibram.
Pulveris Sabadillae uncias duas.
— Radicis Hellebori nigri unciam unam.
Misce intime. (O.)

℞. Unguenti mercurialis uncias octodecim.
Pulveris Sabadillae,
— Staphysagriae,
singulorum uncias duas.
— Hellebori albi unciam unam.
Olei Lauri . . . uncias novem.
— Lavandulae unciam unam.

Misce. (*Sp.*)
℞. Saponis Veneti . . uncias tres.
Solve in Aqua et solutionem coque cum
Axungiae Porci . . libras tribus ad humidi consumptionem usque; adde deinde
Olei Lauri . . . . uncias sex.
Pulveris Seminum Staphysagriae uncias duas.
— Radicis Hellebori albi unciam unam.
Mercurii cum Terebinthinae uncia una ad extinctionem triti unciam unam.
Misce sedulo. (Br. Han. Pal. Wir.)

Fi. Seminum Staphysagriae, Saponis Veneti, singulorum uncias duas, Mercurii puri sesquiunciam, Terebinthinae quantum sufficit, Axungiae Porci uncias tres.

Emplastrum vel Unguentum Juchii. (*Vm.*)
℞. Mercurii . . . . . partes tres.
Terebinthinae . . partem unam.
Tritura ad extinctionem et adde sensim
Sevi vervecini . partem unam, et tunc mixturam ex
Terebinthinae . . . parte una.
Cetacei parte una cum dimidia,
Cerae flavae . partibus quinque, liquatis et semiconcretis.

Emplastrum Hydrargyri s. ex Hydrargyro s. hydrargyricum s. mercuriale s. mercuriale resolvens.

1) Ohne Blei. (Ba. Ful. Li. Lus. Sax.)
℞. Mercurii . . . . partes tres.
Terebinthinae . partem unam.
Tere ad extinctionem metalli, tunc ad perfectam refrigerationem usque tritura cum mixtura liquefacta et semirefrigerata ex
Sevi vervecini partibus duabus cum dimidia.
Cerae flavae partibus quinque cum dimidia.
Serva. (Ba.)
℞. Mercurii cum parte tertia Terebinthinae extincti . partes sex.
Tritura cum mixtura liquata nec adhuc refrigerata e
Cerae flavae . partibus decem.
Cetacei . . . . partibus tribus.
Sevi vervecini . partibus duabus.
Misce. (Sax.)
℞. Emplastri Cerae . libram unam.
Mercurii in Terebinthinae uncia una extincti . . . . uncias tres.
Misce triturando. (Li.)
Ful. et Lus. Mercurii partem unam cum Terebinthina extinctam et Emplastri Cicutae vel alius partes sedecim.

2) Mit Blei. (Am. Ams. An. B. Bel. Bor. Bor4. D. DD. Ed. Fenn. Fer. Hass. HassP. His. Lon. LonN. Pal. R. Suec. Wir. Wür. *B. C. Pid. Sp. Sw. Vm.*)
℞. Emplastri simplicis libram unam.
Liquato lente adde
Unguenti mercurialis uncias tres.
Misce exacte. (Fer.)
℞. Mercurii . . . . uncias tres.
Olei sulphurati drachmam unam.
Tritura ad extinctionem et adde sensim
Emplastri Diachyli simplicis liquati libram unam.
Misce bene. (Lon. LonN. *B. C.*)
℞. Mercurii . . . . partes tres.
Resinae Pini,
Olei Olivarum,
singulorum partem unam.
Liquatis resinae et oleo et mixtis antequam refrixerint, adde mercurium et ad extinctionem metalli usque tritura; adde sensim
Emplastri Diachyli simplicis fusi partes sex
et continuè agitando misce. (Am. B. Ed. *C.*)
℞. Mercurii . . . uncias quatuor.
Terebinthinae Venetae semunciam.
Tritura ad extinctionem et adde sensim
Emplastri diachyli simplicis fusi uncias duodecim.
Misce triturando. (DD.)
Hass. et *Pid.* Mercurii, Terebinthinae, singulorum uncias tres et Emplastri libram unam; — R. Mercurii uncias tres, Terebinthinae sesquiunciam et Emplastri libram unam; — *Sw.* Mercurii uncias octo, Terebinthinae drachmas tres et unam libram Emplastri; — D. et Wür. Mercurii cum Terebinthina ad disparitionem triti sesquiunciam et Emplastri libram unam.
℞. Mercurii . . . . uncias tres.
Axungiae Porci . sesquiunciam.
Sevi vervecini . . semunciam.
Tritura ad disparitionem globulorum metalli usque et adde sensim mixturam liquefactam ex
Emplastri diachyli simplicis libra una.
Cerae flavae . . unciis tribus.
Misce bene. (Ams.)
℞. Mercurii . . . uncias quatuor.
Unguenti mercurialis,
Terebinthinae Venetae,
singulorum unciam unam.
Tritura ad extinctionem metalli usque, tunc adde mixturam liquatam ex
Emplastri diachyli gummosi libra una.

Cerae flavae . . . uncia una.
Misce in mortario leviter calefacto. (An. Bel.)

℞. Mercurii . . . unciam unam.
Terebinthinae communis drachmas tres.
Post extinctionem metalli adde
Emplastri diachyli simplicis uncias duas,
Cerae flavae . . . semunciam
simul liquata. (Fenn. Suec.)

Bor. Bor4. Han. O. Pol. Mercurii uncias octo, Terebinthinae uncias quatuor, Emplastri libras duas et Cerae semilibram; — HassP. singulorum cujusque partem dimidiam indicat.

℞. Mercurii . . partes duodecim.
Terebinthinae Venetae partes tres.
Post extinctionem metalli tritura cum
Styracis liquidae partibus duabus.
Tunc adde
Olei Lauri
partem unam cum dimidia.
Mortario in aquam fervidam collocato, adde sensim
Emplastri diachyli simplicis partes quadraginta octo,
Cerae flavae . . . partes tres
liquata et bene mixta. (*Vm.*)

Sw. Mercur i uncias viginti, Terebinthinae quinque, Styracis tres, Olei Lauri duas cum dimidia, Emplastri septuaginta et Cerae unam cum dimidia.

℞. Mercurii . . . . libram unam.
Terebinthinae . uncias quatuor.
Tritura ad extinctionem et adde
Emplastri fusi de Vigo . libras sex et uncias octo.
Misce bene. (His.)

Wir. Emplastro de Vigo simplici addere jubet Mercurii in Terebinthina extincti sesquiunciam; — *Sp.* unciam unam; — Pal. uncias quatuor.

℞. Mercurii . . . . uncias tres.
Terebinthinae . . sesquiunciam.
Metallo extincto adde
Emplastri diabotani fusi libram unam.
Misce bene. (His.)

Reizend, auflösend und schmelzend. Man wendet es auf schmerzlose Geschwülste von Anschwellung der Lymphdrüsen an. Die zahlreichen Verschiedenheiten hinsichtlich des Mengenverhältnisses des darin enthaltenen Quecksilbers sind weniger wichtig als diejenigen in Betreff der Salbenform, können aber demungeachtet auf seine Wirkungsweise nicht ganz ohne Einfluß seyn. Die vorletzte Formel giebt das berühmte *Emplastrum de Vigo cum Mercurio*, welches sich von den andern nur durch seine große Complication und deßwegen durch die weit geringere Wirksamkeit unterscheidet, indem das Quecksilber in demselben durch eine abentheuerliche Zusammenhäufung ganz verschiedenartiger Ingredienzen gleichsam erstickt ist.

Cereoli mercuriales. (*Vm.*)

℞. Emplastri mercurialis fusi partes tres.
Cerae flavae liquatae partem unam.
Misce bene, ut fiant cereoli.

Emplastrum Ammoniaci s. de Ammoniaco cum Mercurio s. mercuriale gummosum s. ammoniaco-mercuriale.

1) Ohne Blei. (Du. Lon. LonN. *Br. C. Ca. Sp. Vm.*)

℞. Mercurii . . . . uncias tres.
Terebinthinae
Post disparitionem globulorum adde
Gummi Ammoniaci liquati libram unam.
Misce bene. (Du.)

℞. Mercurii . . . . uncias tres.
Balsami Sulphuris Rulandi (Olei sulphurat.) drachmam unam.
Trituratis ad disparitionem globulorum usque adde
Gummi Ammoniaci liquati libram unam.
Misce. (Lon. LonN. *Br. C. Ca.*)

Vm. Mercurii partes novem, Balsami unam et Gummi triginta sex.

℞. Mercurii . . . . uncias tres.
Balsami Sulphuris Rulandi drachmam unam.
Post extinctionem metalli adde
Gummi Ammoniaci liquati uncias duodecim.
Terebinthinae . . . uncias tres.
Misce. (*Sp.*)

2) Mit Blei. (Br. Gal. GalM. Sar. Wir.)

℞. Mercurii . . . . uncias octo.
Terebinthinae Venetae unciam unam
Styracis liquidae . semunciam.
Trituratis ad globulorum usque disparitionem adde
Emplastri diachyli simplicis libram unam
antea liquati et cum
Gummi Ammoniaci pulverati semilibra
mixti. Misce bene. (Br. Sar. Wir.)

℞. Mercurii
partes trecentas octoginta.
Terebinthinae purae
partes sexaginta quatuor.
Styracis liquidae
partes centum nonaginta duas,

Trituratis in mortario ferreo ad extinctionem metalli
℞. Emplastri diachyli simplicis
partes ducentas quinquaginta.
Cerae flavae,
Resinae Pini, singularum partes
octoginta quatuor.
Liqua et mixturae semirefrigeratae adde mixturam ex
Pulveris Gummi Ammoniaci,
— Bdellii,
— Olibani,
— Myrrhae,
singulorum partes viginti
et deinde
Pulveris Croci partes duodecim
et supremò mercurium extinctum; misce intime, addendo antequam penitus refrixerit
Olei essentialis Lavandulae
partes octo.
Serva. (Gal.)

℞. Mercurii partes nonaginta quinque.
Styracis liquidae
partes quadraginta octo.
Tritura ad extinctionem usque. Seorsim et simul liqua
Emplastri diachyli simplicis
partes trecentas duodecim.
Cerae flavae . . partes sedecim.
Mixturae adde
Terebinthinae purae,
Resinae purae,
singularum partes sedecim.
Gummi Ammoniaci,
Olibani,
Myrrhae,
singulorum partes quinque.
Admisce deinde
Pulveris Croci . . . partes tres
et massam mercurialem jam antea praeparatam. (GalM.)

Von dieſem Pflaſter gilt das ſchon bei'm Mercurialpflaſter Bemerkte.

Ceratum de ranis cum Mercurio reformatum s. mercuriale. (*Fi. T.*)

℞. Cerati diachyli simplicis
libram unam.
Mercurii . drachmas duodecim.
Terebinthinae quantum sufficit.
Fiat secundum artem ceratum.

T. Cerati libram unam et Unguenti mercurialis uncias tres, omissa terebinthina.

Emplastrum ad bubones venereos.

℞. Mercurii . . . drachmas duas.
Florum Sulphuris . uncias duas.
Tritis ad disparitionem globulorum usque adde
Plumbi acetici crystallisati
drachmas tres.
Mixta exacte subige cum mixtura liquata et semirefrigerata ex
Emplastri Ammoniaci,
— Mel loti,
— Cumini,
— Galbani,
— Sagapeni,
singulorum semuncia.

Emplastrum resolvens e quatuor fundantibus s. ex mixtis quatuor, quae dicuntur resolventia. (Gal. *B. Ca.*)

℞. Emplastri mercurialis,
— Diachyli gummosi,
— Cicutae,
— Saponis,
singulorum partes aequales.
Liquata inter me misce. (Gal. *Ca.*)
B. hoc emplastrum: *Emplastrum resolvens compositum* appellans, emplastrum saponis omittit.

Reizend, ſchmelzend, reifmachend.

Emplastrum Hydrargyri cum Conio s. resolvens cum Mercurio. (DD.)

℞. Emplastri Hydrargyri,
— Conii,
singulorum semuncium.
Malaxentur.

Emplastrum Hydrargyri s. Mercurii cum Conio et Opio. (DD.)

℞. Emplastri mercurialis cum Conio
neciam unam.
Opii pulveratu . semidrachmam.
Misce intime.

Axungia antipsorica. (*Vm.*)

℞. Peroxydi Plumbi
partes undecim cum dimidia.
Mercurii . partes novemdecim.
Tritura, guttas aliquot Aquae addendo; post extinctionem cum massa siccata intime commisce
Axungiae Porci
partes triginta octo.

Unguentum mundificans Stahlii. (Wir. *Sp.*)

℞. Mercurii,
Plumbi, singulorum unciam unam.
Plumbo liquato adde mercurium et mixta tritura cum
Tripelae . . . . uncia una.
Pulverem deinde bene misce cum
Unguenti albi camphorati
unciis octo.

Bei pſoriſchen Hautkrankheiten empfohlen, beſonders trocknen und prurigindſen.

Emplastrum resolvens. (*Sm.*)

℞. Emplastri de Vigo cum Mercurio
unciam unam.
— Cicutae cum Gummi Ammoniaco . drachmas quatuor.
Mercurii . . . grana triginta.

Minii . . . . drachmas duas.
Styracis liquidae
quantitatem sufficientem.
Fiat emplastrum.

§. II. Präparate, in denen die Wirkung des Queckſilbers mehr oder weniger durch andere Subſtanzen modificirt iſt.

A. Durch Ammoniak.

Linimentum mercuriale ammoniacale, Sapo mercurialis volatilis. (*Ra. Vm.*)

℞. Unguenti mercurialis
partem unam.
Ammoniaci liquidi concentrati
partes duas.
Tere in mortario et in vase bene obturato serva. (*Vm.*)

℞. Unguenti mercurialis (e partibus aequalibus),
Ammonii liquidi,
singulorum drachmam unam.
Olei Olivarum . unciam unam
Contere. (*Ra.*)

Reizend, in Einreibungen zur Auflöſung veneriſcher Leiſtenbeulen empfohlen.

Linimentum Hydrargyri s. mercuriale ammoniacale camphoratum. (Lon. Lon.N. *C.*)

℞. Unguenti mercurialis (e partibus aequalibus),
Axungiae praeparatae,
singulorum uncias quatuor.
Camphorae . . . unciam unam.
Alcoholis (0,835) partem quantitatem (minima quindecim).
Ammoniaci liquidi uncias quatuor.
Triturate camphorae cum alcohole, cum axungia et cum unguento sensim adde ammonium.

B. Durch Arſenik.

Aethiops auripigmentalis. (Br.)

℞. Mercurii . . . . partem unam.
Auripigmenti . . . partes duas.
Tritura ad perfectam metalli extinctionem usque.

C. Durch Kampher.

Unguentum mercuriale camphoratum s. ad blennorrhagiam cordatam. (*B. Br. Sy.*)

℞. Mercurii,
Axungiae Porci,
singulorum partem unam.
Tritura ad disparitionem globulorum et pro unciis duabus mixturae adde Camphorae semunciam. (*Br.*)

℞. pro uncia una Unguenti cinerei Camphorae semunciam; — *B.* Unguenti duplicis et Camphorae, singulorum partes aequales.

Bei Tripper mit chorda in Einreibungen längs der Harnröhre.

Unguentum resolvens, Pomatum mercuriale saponaceum. (*Sy.*)

℞. Unguenti cinerei . unciam unam.
Saponis nigri . drachmas duas.
Camphorae . drachmam unam.
Tritura simul. — Bei Knochenhautentzündungen und Anſchwellungen des Nebenhoden.

D. Durch Eiſen.

Aethiops graphiticus, Graphites hydrargyratus. (B^a. *Sa. Vm.*)

℞. Mercurii . . . partem unam.
Graphitae pulveratae partes duas.
Tritura ad perfectam globulorum disparitionem usque.

Wurde gegen Flechten geprieſen. — Gabe, zehen Gran.

Electuarium resolvens antiherpeticum. (*B.*)

℞. Aethiopis graphitici drachmas duas.
Rhei . . . . . semidrachmam.
Extracti Cichorii . semunciam.
Mellis despumati
sufficientem quantitatem.
Misce.

E. Durch Opium.

Linimentum mercuriale opiaceum s. antivenereum. (*Sm.*)

℞. Unguenti mercurialis (e partibus aequalibus) scrupulos quatuor.
Olei Amygdalarum dulcium
uncias duas.
Laudani liquidi Sydenhami
drachmam unam.
Misce bene. — Bei ſehr entzündlichen Eichelgeſchwüren, in Bädern oder Einſpritzungen, je nach dem Zuſtande der Vorhaut, zwei oder drei Mal täglich.

Unguentum s. Pomatum mercuriale opiaceum. (*P. Ra.*)

℞. Unguenti mercurialis grana decem.
Opii . . . . . granum unum.
Misce. (*B.*)

℞. Pomati mercurialis,
Cerati opiacei,
singulorum partes aequales.
Misce bene. (*Ra.*)

Chauſſier verordnete oft zwei oder drei Einreibungen täglich auf den Unterleib aus einer Drachme der letztern Salbe gegen das Ende der Bauchfellentzündung als ein die Entzündung beendigendes Mittel.

Unguentum mercuriale opiatum. (*Ra.*)

℞. Unguenti mercurialis (partes aequales) . . . uncias quatuor.

Opii crudi pulverati uncias duas.
Zum Verbinden heftigſchmerzender veneriſcher Geſchwüre.

F. Durch purgirende Subſtanzen.

Saccharum mercuriale compositum. (Br.)

℞. Mercurii . . . . semunciam.
Sacchari albi . . . uncias duas.
Post perfectam metalli disparitionem adde
Pulveris Radicis Jalappae semunciam.
Misce bene.

Pilulae purgativae. (E.)

℞. Massae Pilularum caerulearum scrupulum unum.
Pulveris Aloës grana viginti quinque.
Fiant pilulae quindecim. — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden.

Pilulae Bellostii.

℞. Mercurii . partes nonaginta sex.
Mellis albi partes ducentas quinquaginta.
Tritura donec globuli disparuerint et adde
Pulveris Agarici albi,
— Aloës Socotrinae,
singulorum partes sedecim.
— Scammonei partes sexaginta quatuor.
— Piperis albi partes duodecim.
Misce fiant pilulae in pulvere e Mechoacannae et Jalappae Alcoholis ope extractarum partibus aequalis circumvolvendae. (GalF. GalH.)

Dieß iſt die eigentliche Formel dieſer Pillen, welche zu gleicher Zeit als antiſyphilitiſches und als Purgirmittel berühmt ſind. Sie ſind auf ſehr vielfach verſchiedene Weiſe verändert worden, und daher hat man eine Menge *Pilulae mercuriales, neapolitanae, antivenereae*, welche ſich nur durch die Wahl und die Gabe der dazu genommenen Purgirmittel von einander unterſcheiden.

℞. Mercurii . . . partes quatuor.
Mellis . . . partes quadraginta.
Tritura ad extinctionem usque et adde
Aloës Socotrinae,
Agarici albi,
singulorum partes octo.
Macidis,
Cinnamomi,
singulorum partem unam.
Fiant pilulae trium granorum. (GalM.)

Dieſe Formel hat Aehnlichkeit mit der Belloſtiſchen. Die folgende iſt eine Abänderung der berüchtigten Pillen von Barossa durch Lemery, nach welchen, wie bekannt, die Belloſte'ſchen gemodelt ſind.

℞. Mercurii . . . . drachmas sex.
Terebinthinae . quantum sufficit ad extinguendum metallum; adde
Pulveris Aloës . . drachmas sex.
— Agarici albi semunciam.
— Rhei . drachmam unam.
Fiat massa pilularis. (*Sp.*)

℞. Mercurii,
Terebinthinae Venetae,
singulorum unciam unam.
Tritura ad globulorum disparitionem et adde
Scammonei,
Rhei,
Jalappae pulveratae,
singulorum unciam unam.
Mellis depurati sufficientem quantitatem ut fiat massa pilularis. (Fer.)

Fl. T. Mercurii uncias duas, caeterum ut Fer.

℞. Mercurii,
Scammonei,
singulorum unciam unam.
Cremoris Tartari,
Resinae Jalappae,
Rhei, singulorum semunciam.
Syrupi Sacchari sufficientem quantitatem.
Mercurio cum tartaro et syrupi pauxillo extincto adde reliqua, ut fiant pilulae granorum quatuor. (Gen.)

Den Belloſtiſchen ähnlich ſind auch die *Pilulae mercuriales purgativae:*

℞. Mercurii . . . partes quatuor.
Mellis . quantitatem sufficientem ad metalli extinctionem; adde
Pulveris Cinnamomi,
— Macidis,
singulorum partem unam.
— Aloës,
— Scammonei,
singulorum partes octo.
Mellis . . . . quantum sufficit ut fiat massa in pilulas granorum quatuor dividenda. (Gal. *Vm.*)

Ihnen nahe verwandt ſind auch die *Pilulae neapolitanae.*

℞. Mercurii . . . . drachmas sex.
Mellis Narbonnensis quantum sufficit ad extinctionem metalli; adde
Pulveris Aloës Socotrinae drachmas quatuor.
— Rhei . . drachmas tres.
— Scammonei drachmas duas.
— Agarici albi drachmam unam.
— Sassafras,
— Cinnamomi,

Pulveris Macidis,
singulorum scrupulum unum.
Misce bene. (*Ca. Pie.*)

Baumé hat die Bellosteʃche Formel auf folgende Weiſe verbeſſert:

℞. Mercurii,
Cremoris Tartari,
singulorum unciam unam.
Trituratis cum Mellis pauxillo ad disparitionem metalli adde
Pulveris Scammonei,
— Jalappae,
singulorum unciam unam.
Mellis despumati quantum sufficit ut fiat massa pilularis. (An. *Sp.*)

Ra. Mercurii uncias tres, Cremoris Tartari grana decem, Scammonei, Jalappae, singulorum drachmas tres et Syrupi sufficientem quantitatem; — *Vm.* Mercurii partes quatuor, Cremoris Tartari duas, Syrupi Sacchari quantum sufficit ad extinctionem metalli, Gummi Arabici partem unam, Jalappae, Scammonei, singulorum quatuor et Syrupi satis ut fiat massa pilularis.

℞. Mercurii,
Scammonei,
singulorum unciam unam.
Sacchari . . . drachmas duas.
Tritura ad disparitionem metalli usque, humectando cum Vini albi pauxillo et adde
Pulveris Jalappae unciam unam.
Misce bene. (*Ca.*)

℞. Mercurii . . . drachmas duas.
Terebinthinae Venetae
quantum sufficit ad extinctionem metalli; adde
Pulveris Scammonei,
— Jalappae,
— Gummi Guttae,
singulorum drachmas duas.
Syrupi Rhamni cathartici
quantum sufficit ut fiat massa pilularis. (*Sa.*)

℞. Mercurii . . . . uncias duas.
Mannae in lacrymis unciam unam.
Pulveris Jalappae uncias quatuor.
Terebinthinae,
Florum Sulphuris,
Gummi Guttae pulverati
singulorum drachmas duas.
Syrupi Rhamni cathartici
quantum sufficit ut fiat massa in pilulas granorum quatuor dividenda. (*Ca.*)

℞. Mercurii . . . . semunciam.
Mucilaginis Gummi Arabici
unciam unam.
Tritura ad perfectam globulorum disparitionem et adde
Extracti Ligni Guajaci,
Pulveris Aloës Socotrinae,
Pulveris Jalappae,
singulorum semunciam.
Syrupi Rhei
quantitatem sufficientem ut fiat massa homogenea. (Sar.)

℞. Mercurii . . . unciam unam.
Sacchari albi . . . semunciam.
Tritura ad perfectam metalli extinctionem, Oxymellis quantitatem sufficientem adspergendo et adde tunc pedetentim
Pulveris Scammonei,
— Jalappae,
singulorum unciam unam.
Oxymellis . . quantum sufficit et sub finem
Kali nitrici . . drachmam unam.
Camphorae . . . . grana sex.
Fiant pilulae granorum decem. (*Pie.*)

Begreiflicherweiſe iſt die Gabe nicht bei allen dieſen Pillen dieſelbe. Sie iſt nach der Wirkſamkeit der damit verbundenen Purgirmittel verſchieden. Die der Lemery'ſchen Pillen iſt eine Drachme, die der Baumé'ſchen eine halbe Drachme.

Pilulae contra taeniam. (*Bo.*)

℞. Mercurii . . . . sesquiunciam.
Axungiae Porci . unciam unam.
Post extinctionem metalli adde
Pulveris Aloës Socotrinae
quantum sufficit ut fiat massa in pilulas granorum quatuor dividenda.

Pilulae ad gonorrhoeam. (*Bo, Pie.*)

℞. Aethiopis mineralis sesquiunciam.
Pulveris Rhei,
— Myrrhae,
singulorum drachmas duas.
Syrupi Cichorii compositi
quantitatem sufficientem.
Fiant pilulae granorum sex. — Barbeyrac ließ davon Morgens zweimal die Woche, zwei oder drei Monate lang nehmen.

Pulvis vermifugus mercurialis. (Gal. Ham.)

℞. Aethiopis mineralis,
Pulveris Radicis Jalappae, singulorum drachmam unam.
— — Valerianae sylvestris . . . . drachmas duas.
Misce. (Ham.)

℞. Aethiopis mineralis,
Pulveris cornachini,
singulorum partes aequales.
Tritura simul in mortario. (Gal.)

Pilulae antiscrophulosae s. ad scrophulas s. Oxydi Antimonii et Sulphureti Mercurii. (Gal.)

℞. Aethiopis mineralis,

Pulveris Scammonei,
singulorum uncias duas.
Oxydi albi Antimonii,
Asellorum praeparatorum,
Saponis amygdalini,
singulorum drachmas tres.
Extracti Liquiritiae vel Syrupi Quinque Radicum
quantitatem sufficientem.
Fiant pilulae granorum quatuor.

Tabellae anthelminticae. (Ful.)

℞. Aethiopis antimonialis,
Pulveris Radicis Jalapae,
singulorum drachmas tres.
— Florum Tanaceti
unciam unam.
— Cinnamomi
drachmas duas.
Sacchari albi cum Aquae unciis quatuor ad requisitam, ut fiant tabellae, spissitudinem cocti
uncias octo.
Fiant tabellae. — Gabe, eine bis sechs Drachmen.

Opiatum aperiens et purgans. (*Bo.*)

℞. Aethiopis mineralis semunciam
Electuarii lenitivi unciam unam.
Pulveris Sennae,
— Rhei,
— Jalapae,
— Asellorum,
singulorum drachmas duas.
— Scammonei
drachmam unam.
— Magnesiae sulphuricae
semunciam.
Syrupi Quinque Radicum
quantitatem sufficientem.
Bei Unterleibsverstopfungen und Wassersucht. — Gabe, Morgens nüchtern eine Drachme.

G. Durch China.

Electuarium anthelminticum Heisteri. (Br. *Ca. Sp.*)

℞. Mercurii . . . . semunciam.
Gummi Arabici . unciam unam.
Aquae quantitatem sufficientem.
Tritura ad perfectam metalli in mucilagine disparitionem et adde tunc
Chinae subtilissime pulveratae
unciam unam.
Syrupi Menthae quantum sufficit ut mixtura consistentiam electuarii mollis obtineat

Die Gabe ist nach dem Alter verschieden. Gewöhnlich giebt man Morgens und Abends einen Kaffeelöffel.

H. Durch Schwefel.

Aethiops mineralis, Sulphuretum Hydrargyri nigrum s. simplex, Hydrargyrus sulphuratus niger s. cum Sulphure, Hydrargyrum sulphuratum nigrum, Mercurius cum Sulphure, Pulvis hypnoticus, Aethiops narcoticus; mineralischer Mohr. (A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fer. Gal. Han. His Lon. LonN. O. Pal. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. *Br. C. Fi. Par. Sp. T. Vm*)

℞. Mercurii,
Florum Sulphuris lotorum,
singulorum partes aequales.
Tritura in mortario marmoreo pistilli vitrei ope ad perfectam globulorum usque disparitionem et donec in pulverem nigerrimum sit conversum. (A. Ams. An. B. Bel. Bor. Bor4. D. Du. Ed. Fer. Han. Lon. Lus. O. Pol. Sax. *C. Fi. Sw. T.*)

An. et Bor4. ut trituratio facilior reddatur, Aquae pauxillum addere jubent; — LonN. Mercurii uncias quadraginta, Florum Sulphuris uncias octo; hydrargyrum cum sulphure ad ignem liquefacto misce et quam primum intumescat massa, vas ab igne remove et fortiter tege ne fiat inflammatio; deinde in pulverem tere et sublima. (*T.* cujusque partes aequales.)

Destouches mixturae inter operationem Kali hydrosulphuratam, *Geiger* Ammonium hydrothionicum adspergere jubent.

℞. Mercurii . . . . partes duas.
Florum Sulphuris lotorum
partem unam.
Fac ut supra dictum. (A. Gal. His. R. *Br*. Sp.*)

Br. Pal. et Wir. Mercurii partes tres et duas Sulphuris; — Sar. Mercurii duas et Sulphuris unam cum dimidia.

Vm. quatuor hujus nominis praeparata habet, nimirum: 1) *Aethiopem mineralem s. Sulphuretum Mercurii triturat um*, triturando in mortario marmoreo pistilli magni ope per horae quadrantem Sulphuris in baculis partem unam cum dimidia et Mercurii novemdecim; 2) *Aethiopem mineralem Harrisii*, e Mercurii et Sulphuris singulorum pro arbitrio, triturando mercurium cum sulphuris parte duodecima ad extinctionem, tunc alteram partem duodecimam et postremo successive reliquum sulphur addendo; 3) *Aethiopem mineralem oxydulatum s. Sulphuretum Mercurii oxydulatum* (Sulfure de mercure à oxidule) triturando Sulphuris in baculis partem unam cum dimidia, Mercurii novem cum dimidia et Oxydi Mercurii rubri decem et quadrantem; 4. *Aethiopem mineralem trituratum duplum s. Supersulphuretum*

Mercurii, triturando partes novem Mercurii et Sulphuris in baculis unam cum dimidia obtentum.

In *Giornale di Chimica Fisica* etc. *di Pavia* Decad. II. T. 6. p. 497 sequens agendi modus indicatur: Mercurii purificati libram unam et Acidi sulphurici destillationis ope purificati libras tres in retorta balnei vaporis calori expone, massam ad siccum ferè redactam et refrigeratam, retorta fractâ, a fragmentis vitri mundatam in mortario porphyreo tritura, Florum Sulphuris uncias undecim admiscendo. Mixturam deinde in amplo catino fictili interne vitreato tracta cum Solutione aquosa Hepatis Sulphuris filtrata, in parvis partiunculis addenda et massam continue agitando, quae vivaciter effervescens colorem albo-cinereum et deinde ob curum accipit; sepone tunc per aliquot momenta et liquidum decantha; massae obscurae, quae subsedit, alium quantitatem Hydrosulphatis sulphurati alcalini in excessu infunde, continue agitando et caloris mitis ope, donec pulchrum colorem nigrum acceperit. Repone, liquidum decantha et materiam pulverulentam residuam cum Aqua repetite ablue, donec haec saporis expers evadat. Exstillet aethiops obtentus supra filtrum chartaceum et levi calore siccatus, trituretur. — Loco Sulphatis mercurialis Nitras Deutoxydi Mercurii ad siccum quasi redactus adhiberi potest triturando et bene miscendo cum Florum Sulphuris talibus dosibus ut sit pondus ejus pro mercurio ut 10 ad 12. Adhibetur deinde kali sulphuratum ut antea; — Etiam Sublimatus corrosivus (12 unc. in Aq calidae suff. quant. et cum Flor. Sulph. unc. $7\frac{1}{2}$ mixt.) eodem modo per kali antea dictum tractatur. (*T.*)

Der mineralische Mohr ist nicht, wie man lange Zeit geglaubt, eine Verbindung von Queckſilber und Schwefel, sondern ein bloſses Gemeng beider. Martius hat ihn bereitet, indem er ein Gemeng von Schwefel und Queckſilber in einer Flaſche vierzehen Tage lang dem Mechanismus einer Sägemühle ausſetzte.

Reizend, gegen Syphilis und Würmer, aber nie allein angewendet.

Pulvis ad strumam s. antistrumalis. (*Sm.*)

℞. Aethiopis mineralis drachmas quatuor.
Oculorum Cancri praeparatorum uncias duas.
Succini pulverati unciam unam.
Misce et in doses sexaginta quatuor divide. — Man nimmt anfangs täglich ein, dann zwei Stück in einem Glaſe Zukkerwaſſer.

Pulvis contra vermes s. vermifugus. (*Sp.*)

℞. Aethiopis mineralis drachmas duas.
Pulveris Helmintochorti semunciam.
Olei essentialis Absinthii semiscrupulum.

Fuller empfahl dieſes Pulver bei Kindern; er gab davon Morgens und Abends eine Meſſerſpitze voll, was jedoch zu unbeſtimmt iſt, da ein Kind auf jede Gabe nur zwei bis höchſtens vier Gran Mohr erhalten darf.

Rotulae contra vermes. (Fer. Wir. *Fi.*)

℞. Aethiopis mineralis,
Seminum Cinae,
Helmintochorti,
Cinnamomi,
singulorum scrupulos duos.
Sacchari albi in Aqua Rosarum soluti et ad consistentiam tabulati cocti . . uncias quatuor.
Fiant rotulae. (Wir.)

℞. Chocolatae . uncias quindecim.
Aethiopis mineralis drachmas sex.
Seminum Cinae . unciam unam.
Fiant rotulae septuaginta duae. (Fer.)

Fi. Chocolatae uncias tredecim, Aethiopis et Seminum ut Fer. sed in rotulas centum octoginta dividenda.

Opiatum vermifugum. (*Pie.*)

℞. Aethiopis mineralis,
Seminum Hyperici,
— Rutae,
— Absinthii,
— Tanaceti,
singulorum semunciam.
Syrupi Absinthii sufficientem quantitatem.

Chirac gab Morgens und Abends eine halbe Drachme und ließ dann eine Abkochung der Wurzel des männlichen Farrnkrauts trinken.

Electuarium alterans. (*Sa. Sw.*)

℞. Aethiopis mineralis,
Resinae Guajaci,
singulorum semunciam.
Pulpae Prunorum unciam unam.
Syrupi simplicis quantum sufficit.

Bei scabies und andern Hautkrankheiten empfohlen. — Gabe, eine Drachme täglich zwei Mal.

Unguentum mundificans. (Wür.)

℞. Aethiopis mineralis unciam unam.
Axungiae Porci . . uncias tres.

Misce triturando.

Unguentum e Sulphure hydrargyrato s. aethiopicum s. Mercurii sulphurati. (*Sw*. Vm.*)

℞. Florum Sulphuris lotorum partem unam.
Unguenti mercurialis partes duas.
Diu contritis adde sensim
Axungiae Porci partes quindecim.
Misce bene. (*Vm.*)

Sw.* Sulphuris partem unam, Unguenti et Axungiae, singulorum duas.

In Einreibungen bei Krätze von Nutzen.

Unguentum antipsoricum. (*Sw*.*)

℞. Aethiopis mineralis unciam unam.
Saponis viridis . . semunciam.
Misce triturando et adde
Cerati camphorati sesquiunciam.

Bei hartnäckiger Krätze empfohlen. — Es muß ebenso, wie die beiden vorhergehenden, mit Vorsicht angewendet werden.

Ceratum antipsoricum. (*Vm.*)

℞. Aethiopis mineralis partes quatuor.
Sulphureti Plumbi praeparati partem unam.
Commisce in mortario et adde
Cerati prope ignem mollefacti partes sedecim.
Tritura sedulo.

Pilulae resolventes. (*Sm.*)

℞. Aethiopis mineralis scrupulum unum.
Extracti Taraxaci drachmas tres.
Gummi Ammoniaci drachmas duas.
Scillae pulveratae semidrachmam.
Syrupi cujuslibet sufficientem quantitatem.
Fiant pilulae granorum trium.

Finke pries diese Pillen bei Wassersucht von Verstopfung der Unterleibseingeweide. — Gabe, fünf Stück täglich drei Mal.

Pilulae antiherpeticae. (*Bo.*)

℞. Mercurii . . . . uncias duas.
Florum Sulphuris,
Kali sulphurici,
singulorum semunciam.
Camphorae . . semidrachmam.
Tritura ad disparitionem globulorum et adde
Resinae Guajaci unciam unam.
Balsami Peruviani drachmas duas.
Syrupi Dianthi quantum sufficit.
Fiant pilulae quatuor granorum. — Von Barthez als schmelzend und Ausdünstung befördernd, bei Flechten und andern Hautkrankheiten empfohlen. — Gabe, Morgens nüchtern drei Stück auf einmal.

K. Durch Schwefel und Spießglanz.

Aethiops antimonialis s. antimonialis Huxhami, Sulphuretum Hydrargyri et Stibii s. stibiatum s. Hydrargyri nigrum et Stibii s. Hydrargyri stibiatum, Hydrargyrum stibiato - sulphuratum, Spießglanzmohr. (A. Ams. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. Fer. Ful. Gen. Han. Hass. HassP. Li. Lus. O. R. Sar. Sax. Wir. Würr. *Br*. Ca. Fi. Pid. Sa. Sp. Sw. T. Vm.*)

℞. Mercurii . . . uncias quatuor.
Antimonii crudi praeparati uncias tres.
Sulphuris . . . . uncias duas.
Tritura ad perfectam extinctionem metalli usque. (Ams. B. Bel. Fenn. Hass. *Ca. Fi. Pid. T.*)

Gen. Hass. Li. et *Pid.* guttas aliquot Aquae addere jubent.

Li. Mercurii Antimonii, singulorum unciam unam, Sulphuris semunciam; — Bor. Bor4. Han. HassP. Pol. Sax. et *Sw.* Mercurii, Sulphuris, singulorum unciam unam et duas Antimonii (laevigati) Bor4. aqua humectata modico calore terere jubet; — HassP. item et aquam adhibet; — *Vm.* Mercurii partes novem cum dimidia, Antimonii quinque cum dimidia et Sulphuris unam cum dimidia.

℞. Mercurii,
Antimonii crudi praeparati,
singulorum partes aequales.
Tritura. (A. Ba. R.)

Br. D. O Sar. Wir. *Br*. Sp.* et *Sw.* Antimonii partes duas et unam Mercurii.

℞. Mercurii partes tres cum dimidia.
Kermetis mineralis partem unam.
Tritura ad extinctionem usque. (*Vm.*)

Vm. praeterea Mercurii partes duas et tres Sulphuris Antimonii aurati; — Lus. Mercurii partem unam cum dimidia et unam Sulphuris aurati; — Fer. Mercurii partem unam cum dimidia et unam Kermetis mineralis.

℞. Aethiopis mineralis (sec. Giornal. d. Chim. praep.) uncias quinque.
Oxydi Antimonii via humida parati unciam unam.
Contere bene in mortario vitreo vel porcellaneo. (*T.*)

Der Spießglanzmohr ist ebenfalls nur ein Gemeng, welches metallisches Quecksilber sehr zertheilt enthält. — Gabe, sechs bis zwanzig Gran.

Pulvis ex Aethiope antimoniali s. ex Hydrargyro stibiato-sulphurato. (BorC. WW. *Au.*)

℞. Aethiopis antimonialis grana sex.
Pulveris Radicis Liquiritiae grana decem.
Misce bene. (WW.)

Borc. et *Au.* Aethiopis grana quinque et quindecim Liquiritiae.
Alle vier Stunden.

Pulvis ad herpetem. (Ham.)
℞. Aethiopis antimonialis,
— mineralis,
singulorum semidrachmam.
Pulveris Resinae Guajaci,
— Radicis Liquiritiae,
— Magnesiae,
singulorum drachmam unam.
Misce intime.

Pulvis purificans. (*Huf.*)
℞. Resinae Guajaci semidrachmam.
Aethiopis antimonialis,
Magnesiae subcarbonicae,
singulorum semiscrupulum.
Elaeosacchari Foeniculi
semidrachmam.
Gabe, für einen Erwachſenen in vier und zwanzig Stunden; Kindern von ſieben Jahren die Hälfte, von vier Jahren ein Drittel.

Pulvis Hydrargyri stibiato-sulphurati cum Cicuta s. aethiopicus. (*Au. Vm.*)
℞. Aethiopis antimonialis,
Faeculae siccae Cicutae,
Magnesiae subcarbonicae,
Sacchari albi,
singulorum partes aequales.
Misce triturando. — Gabe, vier bis ſechszehn Gran. — Von Hufeland bei chroniſchen Exanthemen der Kinder empfohlen. Es muß aber lange Zeit fortgebraucht werden.

Pilulae aethiopicae s. Mercurii sulphurato-stibiati. (*Sy.*)
℞. Mercurii . . . uncias quatuor.
Antimonii crudi . . uncias tres.
Sulphuris . . . . uncias duas.
Tritura ad perfectam disparitionem globulorum usque et adde
Mellis sufficientem quantitatem ut fiat massa in pilulas quinque granorum dividenda.

Pilulae aethiopicae compositae. (D. Ham. Lus. Wir. Wür. *Au. Sp. Vm.*)
℞. Aethiopis antimonialis
unciam; unam.
Extracti Guajaci pulverati
semunciam.
Mellis . . . . quantum sufficit ut fiat massa pilularis. (Lus.)
℞. Aethiopis antimonialis,
Resinae Guajaci,
singulorum drachmam unam.
Extracti Dulcamarae
drachmas duas.
Syrupi Sacchari
sufficientem quantitatem.
Fiant pilulae granorum duorum. (*Au.*)
℞. Aethiopis mineralis,
Pulveris Reguli Antimonii medicinalis,
— Resinae Guajaci,
singulorum semunciam.
Extracti Sarsaparillae
unciam unam.
Fiat massa pilularis. (Wir. *Sp.*)
℞. Mercurii . . . drachmas sex.
Mellis . . . . . semunciam.
Tritura ad perfectam metalli extinctionem et adde tunc
Pulveris Sulphuris Antimonii aurati,
— Resinae Guajaci,
singulorum semunciam.
Mucilaginis Gummi Arabici
quantitatem sufficientem ut fiat massa homogenea. (Wür.)
℞. Mercurii . . . . . partes tres.
Sulphuris Antimonii aurati,
Mellis albi,
singulorum partes duas.
Post extinctionem metalli adde
Pulveris Gummi Arabici
partem unam.
— Resinae Guajaci partes duas.
Syrupi Sacchari
sufficientem quantitatem ut fiat massa pilularis. (*Vm.*)
℞. Mercurii . . . drachmas sex.
Sulphuris aurati Antimonii
semunciam.
Tritura ad globulorum disparitionem et adde
Saponis Hispanici,
Pulveris Resinae Guajaci,
singulorum semunciam.
Syrupi Sacchari quantum sufficit ut fiat massa pilularis. (D.)
℞. Aethiopis antimonialis,
— mineralis,
singulorum drachmam unam.
Extracti Cicutae sesquidrachmam.
Pulveris Herbae Cicutae
semidrachmam.
Fiant pilulae granorum duorum. (Ham.)
Dieſe und die vorhergehenden Pillen ſind als reinigend und ſchmelzend in Ruf. Man empfiehlt ſie beſonders bei Krätze, Waſſerſucht und bösartigen Geſchwüren. — Gabe, bis zu einer halben Drachme.

Pilulae Baldingeri. (*Sm.*)
℞. Mercurii . . drachmam unam.
Antimonii crudi scrupulos quatuor.
Florum Sulphuris scrupulos duos.
Opii puri . . scrupulum unum.
Misce exacte triturando cum
Syrupi Althaeae
sufficiente quantitate ut fiant pilulae centum quinquaginta.

Hurham empfahl diese durch Waldinger veränderten Pillen bei venerischen Knochenschmerzen und weißem Fluß, bei Kopfgrind, Scropheln, Krätze. — Gabe, fünf bis sechs Stück täglich.

Pilulae diaphoreticae. (*Pie.*)

℞. Aethiopis antimonialis,
Resinae Guajaci,
singulorum semunciam.
Saponis albi,
Extracti Dulcamarae,
singulorum unciam unam.
Conservae Fumariae,
Syrupi quinque Radicum aperientium, singulorum sufficientem quantitatem.

Gabe, vier Stück Morgens und Abends.

Boli in necrosi syphilitica s. antivenerei. (*B.*)

℞. Mercurii praecipitati rubri
granum unum.
Aethiopis antimonialis
grana quadraginta octo.
Roob Sambuci,
Pulveris Liquiritiae, singulorum
sufficientem quantitatem.

Fiant boli octo. — Gabe, Morgens und Abends ein Stück.

Electuarium purificans. (*Sm.*)

℞. Mercurii,
Antimonii crudi,
singulorum semunciam.
Resinae Guajaci unciam unam.

Post extinctionem metalli adde Roob Sambuci eum Aquae Sambuci destillatae tertia parte diluti sufficientem quantitatem ut fiat electuarium.

Von Herrenschwand bei syphilitischen Hautkrankheiten gepriesen. — Gabe, zweimal täglich eine Drachme, indem man mit einem Scrupel anfängt und allmälig steigt.

Electuarium antiherpeticum s. ad herpetem. (*Bo.*)

℞. Mercurii . . scrupulum unum.
Florum sulphuris,
Reguli Antimonii,
singulorum semunciam.
Extracti Dulcamarae,
— Pulsatillae nigricant,
Pulveris Jaceae,
singulorum drachmas duas.
Camphorae . drachmam unam.
Syrupi Fumariae
sufficientem quantitatem.

Bei hartnäckigen, besonders sogenannten scrophulösen und venerischen Flechten gerühmt. — Gabe, eine Drachme Morgens und Abends.

Oxydum Mercurii.

§. I. Mit metallischem Queckſilber gemischt.

Mercurius niger s. solubilis Moscati, *Pulvis cinereus Hydrargyri, Oxydum Hydrargyri nigrum s. cinereum, Oxydum hydrargyrosum, Oxydum hydrargyricum praecipitatum, Oxydulum Hydrargyri nigrum, Hydrargyrum oxydulatum. nigrum.* (A. Am. B. Bor. Ed. Fenn. Fer. Lon. LonN. Suec. *Bo. C. Fi. Par. Sw. T.*)

℞. Mercurii dulcis pulverati
partem unam.
Solutionis Kali caustici,
singulorum partes tres.
Aquae destillatae
partes sex (libram unam).

Coque, subinde agitando, per horam; pulverem Aqua frigida bene lotum, blando calore sicca. (A. Fenn. Fer. *Fi. T.*)

Bo. Natrum causticum et *Sw*. Barytam causticam adhibent.

Bor. recipere jubet Mercurium dulcem praecipitatum, adhuc ex praeparatione humidum, in loco frigido et obscuro macerare cum sufficiente quantitate Solutionis Kali caustici, et pulverem cum Aqua saepius lotum siccare.

℞. Mercurii dulcis pulverati
partem unam.
Aquae Calcis . . partes viginti.

Coque, continue agitando per horam, liquorem decantha, et magna aequali Aquae Calcis quantitate infusa coque; pulverem cum Aqua calida bene lotum lente sicca. (B.)

Ed et *C.* Mercurii dulcis semunciam, Aquae Calcis libras quinque semel per horae quadrantem ebullire jubent; — Am. Lon. et LonN. Mercurii dulcis unciam unam et Aquae Calcis octarios octo

Reizend, Speichelfluß und Purgiren bewirkend. — Gabe, von einem achtel bis zu zwei Gran.

Pulvis Mercurii Moscati. (*Au.*)

℞. Mercurii solubilis Moscati
grana tria.
Sacchari . . . sesquidrachmam.
Opii . . . . . grana duo.

Fiant doses sex. — Gabe, ein Stück Morgens und Abends.

Boli resolventes. (*B.*)

℞. Natri subcarbonici scrupulos duos.
Mercurii dulcis . . grana sex.
Roob Sambuci,
Pulveris Liquiritiae, singulorum
quantitatem sufficientem

Fiant boli sex. — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden.

℞. Mercurii solubilis Moscati
granum unum.
Extracti Cicutae . . grana tria.
— Dulcamarae
sufficientem quantitatem.

Fiant boli tres. — Den Tag über zu nehmen.

Die ersten dieser Bissen werden bei schleichenden Entzündungen, besonders des Bauchfells empfohlen; die andern bei kalten Geschwülsten, scrofulösen oder gichtischen Geschwülsten und Anschwellungen der Eingeweide nach Entzündungen.

Pilulae antivenereae. (Au.)

℞. Mercurii solubilis Moscati drachmam unam.
Micae Panis sufficientem quantitatem
ut fiant pilulae sexaginta. — Gabe, ein Stück täglich.

℞. Mercurii solubilis Moscati grana sex.
Camphorae grana viginti quatuor.
Mucilaginis Gummi Arabici sufficientem quantitatem
ut fiant pilulae duodecim. — Gabe, ein bis zwei Stück täglich.

Boli antisyphilitici stomachici. (B.)

℞. Mercurii solubilis Moscati granum unum ad quatuor.
Extracti Gentianae drachmam unam.
Fiant boli tres. — Den Tag über zu nehmen.

Boli resolventes et antisyphilitici. (B.)

℞. Mercurii solubilis Moscati granum unum cum dimidio.
Extracti Aconiti grana duodecim.
Fiant boli quatuor. — Gabe, ein Stück alle drei Stunden.

Pilulae antiarthriticae s. ad arthritidem. (Au.)

℞. Mercurii solubilis Moscati grana decem.
Opii puri,
Extracti Cicutae,
singulorum grana quinque.
Sulphuris Antimonii aurati scrupulum unum.
Resinae Guajaci drachmam unam.
Balsami Copaivae sufficientem quantitatem.
Fiant pilulae ponderis grani unius. — Gabe, zwei bis vier Stück alle zwei Stunden.

Pilulae resolventes. (Au.)

℞. Mercurii solubilis Moscati scrupulum unum.
Extracti Millefolii drachmas duas.
— Hyoscyami scrupulos duos.
Rhei pulveratae scrupulum unum.
Fiant pilulae granorum duorum. — Gabe, funfzehen Stück täglich, auf drei Mal, bei Drüsenanschwellungen.

Pilulae mercuriales Moscati. (Bo. Ca.)

℞. Mercurii solubilis Moscati scrupulos duos.
Extracti Opii gummosi grana duodecim.
— mollis Chinae drachmas duas.
Misce ut fiant pilulae viginti.

Jeromel schlägt statt der Plenck'schen Pillen folgende Formel vor, welche der eben angegebenen ähnlich ist:

℞. Mercurii solubilis Moscati drachmam unam.
Pulveris Radicis Althaeae drachmas quatuor.
Extracti Cicutae drachmam unam.
Fiant pilulae ponderis gran. duorum.

Trochisci cum Oxydo Mercurii nigri et Saccharo aromatisati Swediaur. (Fi. T.)

℞. Mercurii Moscati unciam unam.
Olei volatilis Citri guttas viginti.
Sacchari albi pulver. uncias duas.
Fiat cum Mucilagine Gummi Arabici pasta in trochiscos 288 dividenda. (*Fi.*)

T. Sacchari uncias quatuor et Mucilaginem Tragacanthae, caeterum ut *Fi.*, ut fiant trochisci octo circiter granorum. — Von ersteren enthält jede zwei, von letzteren jede ungefähr einen Gran merc. solub.

Aqua nigra s. Hydrargyri muriatici mitis nigra s. mercurialis nigra, Lotio Hydrargyri. (B*. DD. *Au. E. Sw. Sy. Vm.*)

℞. Mercurii dulcis pulverati grana sedecim.
Aquae Calcis . uncias quatuor.
Misce triturando. (DD.)

B*. et *Au.* Mercurii dulcis drachmas duas et Aquae Calcis libram unam; — *Vm.* Mercurii dulcis scrupulos duos et Aquae Calcis uncias viginti octo; — *E. Sw.* et *Sy.* Mercurii dulcis drachmam unam et Aquae Calcis uncias quatuor.

In Waschungen, besonders von den Engländern, bei sogenannter venerischer Krätze, altem weißen Fluß und bisweilen auch zum Verbinden venerischer Geschwüre.

Injectio vaginalis cum Mercurio s. mercurialis. (Au. B.)

℞. Mercurii dulcis . semidrachmam.
Gummi Arabici drachmam unam.
Aquae Calcis . . sesquiunciam.
— Plantaginis . uncias tres.

Dreimal täglich bei Blennorrhöe mit etwas örtlicher Anschwellung. (*B.*)

Au. Mercurii dulcis, Gummi Arabici, singulorum drachmam unam, Aquae purae et Aquae Calcis, singularum uncias duas.

Mercurius solubilis Moretti. (Gal. *Ca. Sw.*)

℞. Mercurii . . . uncias quinque.
Acidi sulphurici concentrati uncias sex.

Immitte in retortam, vitream supra balneum arenae et adaptato recipiente destillationem, igne sensim aucto, continua donec nulli amplius vapores evolvantur; vasibus tunc refrigeratis, sal e retorta desumptum tritura in mortario vitreo cum

Mercurii . . . unciis quinque

ad perfectam combinationem usque. Coque deinde massam cum

Kali caustici in Aqua dissoluti quantitate sufficiente.

Totum filtro immitte et iterum cum kali coque, donec praecipitatum in Acido acetico penitus dissolvatur, quod deinde cum Aqua pura bene ablutum in loco umbroso siccetur. (*Ca.*)

*Sw**. fere eundem agendi modum indicat, Natrum causticum tamen indicando.

Dieser ist die folgende Formel ähnlich:

℞. Protonitratis Mercurii partem unam.
Aquae destillatae partes sedecim.

Solutioni sensim infunde

Kali puri liquidi quantitatem sufficientem

vel tantum, donec nihil amplius praecipitetur; pulverem cum Aqua ablutum sicca. (Gal.)

Gabe, wie bei'm Moscatischen Quecksilber, von welchem es sich im Grunde nicht unterscheidet. Ehedem betrachtete man beide als Protoxyde des Quecksilbers; Guibourt hat aber erwiesen, daß sie bloß ein Gemisch von sehr zertheiltem Quecksilber mit rothem Oxyd sind.

Unguentum ad scabiem s. antipsoricum. (*Sw**.)

℞. Mercurii praecipitati rubri,
Mercurii, singulorum partem unam.
Sulphuris praecipitati partes sedecim.

Tritura ad disparitionem globulorum et adde

Axungiae . partes triginta duas.

Obgleich diese Salbe in der Krätze nicht sehr zu empfehlen ist, so verdient sie doch den Vorzug vor der Double- und Planche'schen, von denen später die Rede seyn wird. — Gabe, zwei Drachmen bis eine Unze, je nach dem Alter des Kranken, Abends in Einreibung.

Unguentum Hydrargyri griseum. (*Sw. Sy.*)

℞. Mercurii praecipitati rubri partem unam.
Mercurii . . . . . partes tres.

Trituratis ad extinctionem metalli adde

Axungiae Porci . . partes octo.

Misce bene. (*Sw.*)

Sy. Oxydi partem unam, Metalli et Axungiae, singulorum quadraginta octo.

Man glaubte, durch diese Mischung den Uebergang des Quecksilbers in den Zustand des Protoxyds zu beschleunigen; dieß findet freilich nicht statt, jedoch ist die Salbe etwas wirksamer als die gewöhnliche Quecksilbersalbe.

Unguentum griseum camphoratum. (*Au.*)

℞. Unguenti grisei drachmam unam.
— albi camphorati drachmas tres.

Lentin empfahl diese Salbe in Einreibungen bei sogenannten asthenischen Rheumatismen.

§. II. Im Zustande der Reinheit.

Dieß ist das Oxydum Mercurii rubrum, Deutoxydum oder Peroxydum Mercurii genannt, als man das Metall für zweier Oxydationsgrade fähig hielt.

Li. führt es in der Materia medica auf, giebt aber noch außerdem das Bereitungsverfahren an.

A. Im Zustande des Hydrats.

℞. Solutionis Sublimati corrosivi aquosae . . . . . quantum vis.
— Potassae causticae sufficientem quantitatem.

Hanc illi infunde, donec nihil amplius praecipitetur; pulverem ablutum sicca. (Suec.)

Aqua muriatico-mercurialis rubra s. phagedaenica, Liquor Muriatis deutoxydo hydrargyro-calcarei, Lotio Hydrargyri lutea, Solutio Muriatis Calcis hydrargyrata. (Ams. An. Ba. DD. Fer GalH. GalM. Han. His. R. Sar. Wir. Würz. *Br. E. Fi. Sp. Sw. Sy. T. Vm.*)

℞. Sublimati corrosivi grana decem.
Aquae Calcis . uncias quatuor.

Tritura sublimatum, aquam sensim addendo. (An. DD.)

Han. R. et Wir. Sublimati grana viginti quatuor et Aquae Calcis uncias sedecim; — GalM. Sublimati grana novemdecim et Aquae Calcis octarium unum; — *Sp.* Sublimati semidrachmam et Aquae Calcis uncias duodecim; — Ams. et Würz. Sublimati semidrachmam et Aquae Calcis libram unam; — *Vm.* Sublimati drachmam unam et Aquae Calcis uncias triginta duas; — Ba. Sublimati drachmas duas et Aquae Calcis uncias duodecim; — His. Sublimati granum unum ad tria et Aquae Calcis unciam unam; — Fer. *Fi.* Sublimati grana viginti et Aquae Calcis libram unam.

Bor4. Sublimati grana viginti quatuor, Aquae Calcariae uncias sedecim; — HassP. Sublimati grana duo, Aquae Calcis sesquiunciam.

℞. Sublimati corrosivi
partem unam cum quadrante.
Aquae partes trecentas septuaginta quinque.
Solutioni adde
Aquae Calcis . . . partes mille.
Misce bene. (GalH.)

Br. Sublimati scrupulum unum in Aquae quantitate sufficiente solvere et addere Aquae Calcis uncias sedecim; — *T.* Sublimati grana octo, Aquae destillatae drachmas tres, Aquae Calcis secundae recentis uncias quatuor.

℞. Sublimati corrosivi
drachmam unam.
Aquae Calcis . . libram unam.
Solutioni adde
Aquae Vitae . . uncias quatuor.
Misce bene. (Wir.)

Siw. et *Sy.* Sublimati grana triginta ad sexaginta, Aquae libras duas et Aquae Vitae semilibram.

Dieses Präparat besteht aus einer sehr verdünnten Auflösung des salzsauren Kalks, durch einen Niederschlag getrübt, welcher sich, wenn er eine gelbe Farbe hat, als Hydrat des Queckſilberdeutoxyds und wenn er eine rothe oder besser ziegelrothe Farbe hat, als ein Gemisch des Deutochlorür mit dem Deutoxyd verhält.

℞. Sublimati corrosivi
drachmam unam.
Aquae Calcis primae libras duas.
Tritura. (Sar.)

Da die aqua calcis prima etwas Kali enthält, so findet sich hier in der Flüssigkeit salzsaures Kali vor.

℞. Sublimati corrosivi
scrupulum unum.
Kali subcarbonici drachmam unam.
Tritura in mortario vitreo, sensim addendo
Aquae destillatae . libram unam.
Misce bene. (His.)

Dieses Präparat kömmt dem vorhergehenden nahe, unterscheidet sich aber dadurch, daß das aufgelöſte Salz bloß hydrochlorsaures Kali und der Niederschlag kohlensäuerliches Queckſilber ist.

Dieses Wasser, welchem man sehr unpassend den Namen Aqua phagedaenica beilegt, indem es in der That eine einfache wässerige Auflösung des Aetzsublimats ist, wird als Waschmittel gegen venerische, scrophulöse oder andre Geschwüre von fressendem und bösartigem Character angewendet. Es muß vor der Anwendung umgeschüttelt werden, um den Bodensatz in demselben gleichmäßig zu vertheilen, von welchem es, wenn nicht die ganze, doch wenigstens den größten Theil seiner Wirksamkeit hat.

Aqua aloëtica mercurialis. (Ful. *Sp.*)

℞. Sublimati corrosivi semidrachmam.
Aquae Calcis . uncias duodecim.
Solutioni adde
Pulveris Aloës . . drachmas sex.
Mellis rosati . . sesquiunciam.
Misce. (*Sp.*)

Ful. Sublimati scrupulum unum, Aquae Calcis libram unam, Salis Ammoniaci grana duodecim et Extracti Aloës gummosi grana decem.

Gebraucht wie das vorhergehende zum Verbinden von Geschwüren, aber wirksamer und reizender.

Aqua cosmetica. (*Vm.*)

℞. Amygdalarum amararum contusarum . . . . . uncias sex.
Decocti Carnis bubulae et vitulinae concentrati
uncias sexaginta quatuor.
Fiat emulsio, cui adde mixturam ex
Sublimati corrosivi . semuncia.
Succi Citri . . . unciis decem.
Liquoris concentrati Kali subcarbonici . . . . . semuncia.
Commisce sensim cum
Albumnis subacti . . unciis sex.
Colatis per pannum adde deinde
Camphorae cum Mucilaginis Gummi Arabici semidrachma in emulsionem redactae semidrachmam.

Dieses Präparat, dessen fortwährender Gebrauch Gefahr bringen würde, muß, so wie alle vermeintliche mercurielle Schönheitsmittel, verworfen werden.

B. Mittelst des Feuers bereitet.

Hydrargyrus calcinatus, Hydrargyri Oxydum rubrum, Calx Hydrargyri rubra, Arcanum corallinum, Praecipitatum per se.

℞. Mercurii . . . . quantum vis.

In retortam fundi latioris et plani immitte ita, ut stratum quatuor linearum crassitiem formet; collum prope lampadem extrahe; tunc vase balneo arenae imposito, coque metallum, donec ferè penitus in pulverem rubrum sit conversum. (Du. Fer. Gal. Lon. LonN. Wür. *Br. C. Siw. T. Vm.*)

C. Mittelst Salpetersäure bereitet.

Hydrargyrus nitratus ruber, Hydrargyrum oxydatum rubrum s. rubrum praeparatum, Hydrargyri nitrici Oxydum, Mercurius ruber s. corallinus s. corrosivus ruber s. praecipitatus s. nitratus ruber s. praecipitatus ruber praeparatus s. calcinatus ruber, Praecipitatus ruber, Oxydum Hydrargyri s. Hydrargyri completum s. rubrum s. rubrum per Acidum nitricum s. nitratum

s. nitratum ruhrum s. nitricum, Oxydum hydrargyricum s. hydrargyricum praeparatum, Panacea Mercurii rubra, Pulvis Joannis s. Johannis s. Johannis de Vigo s. de Vigonis s. principis, Oxodes Hydrargyri rubrum, Hyperoxodes Hydrargyri, Deutoxydum s. Peroxydum Hydrargyri.

℞. Mercurii . . . . quantum vis.
Acidi nitrici (32°)
sufficientem quantitatem
ut omne metallum solvatur; intromitte in retortam fundo plano praeditam et in arenam tepidam impositam, superfunde acidum et parumper calefac; dissolutione peracta, igne aucto liquor ad siccum evaporet; ignem deinde ita auge ut vapores nitrosi solum evolvantur et massa pulchrum colorem rubrum acceperit, quam post refrigerationem serva. (A. Ams. B. Bel. Bor. Br. D. Ed. Fenn. Ful. Gal. Gen. Han. Hass. His. Li. Lus. O. Pal. Pol. R. Sar. Sax. Wir. *Br. Pid. Sp. Sw. Vm.*)

Bor4. Mercurii in Acidi nitrici quantitate sufficiente soluti libram unam in vase idoneo igne primum leni deinde fortiori ad siccum evaporare, tum Mercurii libram unam addendo ad extinctionem usque terere, pulverem in vase fictili non vitreato latioris fundi, interdum spathulâ vitrea movendo prudenter urere jubet, donec colorem rubicundum referat. — Parari potest quoque ex Praecipitato rubro venali si satis purus prostat, coquendo Aquae destillatae sufficiente quantitate, liquorem decanthando et residuum ablutione edulcorando. (Bor4.)

Fi. Mercurii uncias quindecim, Acidi nitrici diluti libras duas et in universum eundem agendi methodum indicat.

℞. Mercurii . . . . partes duas.
Solve coquendo in
Acidi Nitrici . . partibus tribus et solutionem exsicca; sal siccum subtilissime pulveratum cum
Mercurii . . . partibus duabus Aquae pauxillum adspergendo ad extinctionem usque contere; in cucurbita vitrea latioris fundi, agglutinato alembico et adaptato excipulo Aquae uncias aliquot continente etc. torreatur massa igne lento sensim aucto, donec cucurbitae collum pelluceat ac massa colorem atro-rubrum acquirat. Haec refrigerata squamas splendentes rubras exhibet, quae protracta calcinatione, donec loco vaporum nitrosorum Gas Oxygenium emittere incipiat, dein coctione in
Aquae destillatae partibus decem digestione tandem calida per horas aliquot cum
Lixivii caustici diluti
parva quantitate ab omni Mercurio nitroso, si forte adhaereat, exacte liberetur. Pulvis remanens repetita aquae destillatae calidae affusione probe elotus et in filtro siccatus servetur. (HassP.)

Lon. LonN. Mercurii libras tres, Acidi nitrici sesquilibram, Aquae destillatae octarios duos misce et coque, donec liquetur mercurius et aquâ consumpta materia alba restet, quae in pulverem trita in vas aliud quam minime profundum conjice leni et tunc aucto igne adhibito, donec vapor ruber prodire cessaverit.

Paissé hat folgendes Verfahren kennen gelehrt, welches nach dem der Holländischen Fabrikanten gemodelt ist und für das beste gehalten wird:

℞. Mercurii . . . libras centum.
Acidi nitrici (pond. 1,3 ad 1,37)
libras centum quadraginta.
Dissolve balnei arenae caloris ope, destillatione evapora et simulac formatio gasis nitrosi decompositionem nitratis indicat, recipiente remoto, per horas octo circiter calore modico sed constante usus continua, donec fomes modo extinctus denuo ignem capiat in retortam introductus.

GalH. Ignem jubet non ita augere, donec oxygenium evolvatur, ut Ba. et Paissé, quod sit indicium decompositionis incipientis oxydi.

Ams. Bor. Ed. Han. His. O. Pal. R. Wür. et *C.* operationem proposuerunt duabus vicibus perficere et post evaporationem dissolutionis salinae ad siccum, residuum pulveratum in novo vase calcinare.

B. Digerere jubet productum per horas aliquot cum Aquae calidae partibus decem et Kali liquidi parva quantitate ac pulverem deinde cum Aqua calida repetito abluere. Oxydum hoc modo ab acidi nitrici, vel potius subdeuto-nitratis mercurii, pauxillo quod forte illi adhaeserit liberatum prodit.

℞. Salis mercurialis praecedenti modo obtenti,
Mercurii, singulorum partem unam.
Aquae destillatae
sufficientem quantitatem.
Tritura simul ad perfectam globulorum disparitionem usque et calcina deinde, ut supra, in crucibulo. (An. *Sw.*)

Ba et Fenn. Mercurii partes duas; — Suec. Metalli trientes duos.

T. Paratur decomponendo crystallos Nitratis Mercurii in retortis vitreis vel

in lagenis calori balnei arenae expositis, donec sal colore rubicundo acquisito, vapores nitrosos non amplius exhalet.

RC. Nitratis Hydrargyri liquidi quantum vis in vase vitreo ad siccum coque et pulverem calori moderato expone, donec colorem laete rubrum prae se tulerit.

Reizend, aufregend, in hohem Grade giftig. Doch hat man es ehedem häufig angewendet und benutzt es noch heutzutage bei der Behandlung syphilitischer Krankheiten, sowohl innerlich zu einem halben bis ganzen Gran, als äußerlich in Einreibungen, mit Speichel, zehen Gran auf jede Einreibung.

Pulvis Hydrargyri oxydati rubri. (B*. *Au.*)

℞. Oxydi Mercurii rubri
granum unum.
Antimonii crudi drachmas duas.
Triturata in partes octo aequales divide.

Bei venerischen Uebeln empfohlen. — Gabe, ein Stück auf zweimal, Morgens und Abends, in Wasser. Nöthigenfalls vermehrt man diese Gabe etwas.

Pulvis ex Hydrargyro rubro cum Alumine, Pulvis causticus s. aluminoso-mercurialis s. Supersulphatis Aluminae et Potassae compositus s. escharoticus s. angelicus Sharpii. (B*. BorC. Fer. Ful. RC. *Au. Fi. Sw. Sy.*)

℞. Praecipitati rubri partem unam.
Aluminis crudi . . partes duas.
Triturando misce exacte. (B*. BorC. Fer. Ful. *Au. Sw.*)

Sy. Cujusque partes aequales; — *Fi.* Aluminis usti unciam unam, Praecipitati rubri semunciam.

℞. Praecipitati rubri,
Aluminis calcinati,
singulorum drachmam unam.
Pulveris Sabinae . semunciam.
Misce intime. (B*.)

Gegen Warzen und wildes Fleisch bei Geschwüren.

Pulvis escharoticus. (B*. RC.)

℞. Praecipitati rubri,
Plumbi acetici,
Kali fusi,
Aluminis,
singulorum drachmam unam.
Pulveris Sabinae,
Carbonis lignei,
singulorum drachmas duas.
Misce triturando ut fiat pulvis subtilissimus.

RC. Aluminis usti, Praecipitati rubri, Acetatis Cupri, singulorum partem unam, Foliorum Sabinae vel Rhei palmati vel Calami vel Radicis Colombo partes duas vel Carbonis Ligni tantumdem.

Dieses Präparat dient zu demselben Gebrauch, wie das vorige; es ist aber weit wirksamer.

Collyrium siccum. (*Ra.*)

℞. Oxydi Mercurii rubri
grana decem.
Tutiae . . . . . grana viginti.
Sacchari albi . drachmas duas.
Contere. — Bei Hornhautflecken nach chronischen Augenentzündungen in das Auge zu blasen.

Mercurius praecipitatus viridis. (Wir.)

℞. Mercurii . . . uncias quatuor.
Cupri . . . . . semunciam.

Metallis quoque seorsim in Acidi nitrici sufficiente quantitate dissolutis, solutiones commixtas in lagena balnei arenae ope evapora; residuo infunde Aceti destillati libram unam, digere ad perfectam solutionem usque; tunc destillando aceto elicito massa viridis in retorta residua pulveratur.

Ein heftiges Brech- und Purgirmittel, welches man als specifisch bei venerischen Krankheiten gepriesen und auch äußerlich zur Austrocknung von Geschwüren angewendet hat. Es ist ein fürchterliches Gift.

Bolus ex Hydrargyro oxydato rubro. (*Au. Sy.*)

℞. Praecipitati rubri,
Opii, singulorum granum unum.
Extracti Liquiritiae
quantum sufficit
ut fiat bolus.

Pilulae antivenereae s. syphiliticae s. polychrestae s. Praecipitati rubri. (Ful. Wür. *E. Sa. Sy.*)

℞. Praecipitati rubri . grana octo.
Extracti Liquiritiae
quantum sufficit
ut fiat massa in pilulas duodecim dividenda. (*Sy.*)

℞. Praecipitati rubri . granum unum.
Corallii rubri praeparati grana duo.
Conservae Rosarum
quantum sufficit
ut fiat pilula. (*Sa.*)

℞. Praecipitati rubri . grana tria.
Opii pulverati . granum unum.
Olei Caryophyllorum guttas duas.
Fiant pilulae tres. (*E.*)

℞. Praecipitati rubri,
Opii puri,
singulorum drachmam unam.
Balsami Peruviani quantum sufficit ut fiant pilulae grani unius. (Wür.)

℞. Praecipitati rubri grana decem.

Sulphuris Antimonii aurati,
Asae foetidae,
singulorum grana viginti.
Opii . . . . . grana quinque.
Syrupi Capitum Papaveris
quantum sufficit
ut fiat massa pilularis. (Ful.)

Nach jeder der drei ersten Formeln höchstens eine Pille, nach den letztern zwei bis acht Gran. Sie gelten für schmelzend und krampfstillend, welche letztere Eigenschaft auch den vorhergehenden zugeschrieben wird.

Mel mercuriale. (*Sw**.)

℞. Praecipitati rubri,
Sacchari albi,
singulorum scrupulum unum.
Triturandis simul, sensim adde
Mellis albi spississimi uncias tres.

Zum Verbinden mancher syphilitischen Geschwüre empfohlen.

Balsamum ophthalmicum rubrum, Unguentum Deutoxydi Hydrargyri nitrati s. Hydrargyri nitrico-oxydi s. Hydrargyri rubri s. ex Hydrargyro oxydato rubro s. Mercurii s. Hydrargyri rubrum s. ophthalmicum rubrum s. Oxydi Hydrargyri rubri s. Oxydi Hydrargyri rubrum Tittmanni s. Oxydi hydrargyrici nitrati s. Subnitratis hydrargyrici, Pomatum de Praecipitato rubro, Butyrum cum Oxydo Mercurii rubro, Unguentum cathaereticum s. corrodens, Ceratum mercuriale, Unguentum s. Pomatum antipsoricum s. Lugdunense (Lyon) *s. ophthalmicum Pelletani.* (Am. Ams. B. Bel. Bor. BorC. Bor4. D.Ed. Ham. Han. HassP. Lon. LonN. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. WW. *Au. Bo. Br. C Ca. Fi. Huf. Ra. Sp. Vm.*)

℞. Praecipitati rubri partem unam.
Axungiae Porci
partes triginta duas.
Misce triturando. (B. Bel. *Au.*)

Am. Ed et *C.* Oxydi partem unam et octo Axungiae; — Han. HassP. Oxydi unam et decem Axungiae; — Ams. Oxydi unam et Axungiae quadraginta octo; — *Huf.* Oxydi unam et Axungiae triginta sex; — *Au.* Oxydi granum unum ad quatuor et Olei Juglandium drachmas duas.

℞. Praecipitati rubri partem unam,
Butyri recentis blando igne liquefacti . . . . . partes octo.
Triturando exacte misce. (D. Suec.)

Fi. Praecipitati partem unam et tres Butyri; — RC. Praecipitati unam et quatuor Butyri.

℞. Praecipitati rubri . partes octo.
Axungiae Porci partes octoginta.
Olei essentialis Citri
partem unam.
Misce sedulo. (Bor.)

℞. Praecipitati rubri pulverati
partem unam.
Axungiae praeparatae partes sex.
Cerae albae . . . partes duas.
Tere oxydum cum reliquis liquatis. (Lon. LonN.)

Bor4. Praecipitati grana decem, Unguenti simplicis unciam unam; — BorC. Praecipitati partem unam, Butyri recentis quatuor et Cerae flavae duas; — *Vm.* Oxydi partem unam, Butyri duodecim, Cerae flavae sex (*Balsamum ophthalmicum citrinum s. flavum*); — *Ra.* Oxydi partem unam cum dimidia, Cerae albae quatuor et Butyri viginti quatuor; — R. Oxydi grana septemdecim, Butyri drachmas tres et Cerae albae grana quadraginta quinque; — Sax. Oxydi partem unam, Butyri novem et Cerae albae tres; — *Sp.* Oxydi drachmas duas et grana quindecim, Butyri uncias tres et Cerae albae drachmas sex; — Han. et O. Oxydi partem unam, Butyri et Cerae albae, singulorum duas.

℞. Praecipitati rubri partem unam.
Cerae albae . . . partes tres.
Olei Olivarum . . partes octo.
Cerae cum oleo contritae oxydum admisce et tere. (*Br.*) (*Ceratum mercuriale*).

Planche (*Br**.): Oxydi partem unam, Cerae albae quatuor et octo Olei (*Pomatum antipsoricum*); — Würz. Praecipitati partem unam et sex Cerati communis; — Pal. Oxydi partem unam et Cerati decem.

℞. Oxydi rubri Mercurii
partem unam.
Unguenti rosati . . partes octo.
Misce sedulo. (*Ra.*)

Bo. et *Ca.* Oxydi partem unam et duas Unguenti rosati.

℞. Praecipitati rubri grana decem.
Camphorae . . . . grana sex.
Butyri recentis drachmas duas.
Contere. (*Au.*)

Diese Salbe, deren Stärke wegen des so abwechselnden Verhältnisses des Oxyds zum Fett, von 1 zu 2 bis 1 zu 48, so verschieden ist, wird als Reizmittel bei chronischen Leiden der Augenlider und des Augapfels, wenn keine Entzündung mehr vorhanden oder nur wenig davon bemerkbar ist, angewendet. Man bringt davon, zweimal täglich, einen bis zwei Gran in den innern Augenwinkel. Double empfiehlt die Salbe von Planche gegen Krätze; man theilt die Gabe in zehen Theile, wovon man Abends bei'm Schlafengehen einen Theil bei'm Feuer einreibt. Eine Salbe aber, in welcher der Präcipitat zu einem Dreizehentheil enthalten ist, ist sicher-

lich ein wenig zu empfehlendes und selbst gefährliches Mittel gegen krätzige Uebel.

Unguentum ophthalmicum Richteri. (Han.)

℞. Praecipitati rubri partem unam.
Butyri Cacao,
Axungiae Porci ablutae,
singulorum partes tres.

Butyro et axungiae post liquationem mixtis et semirefrigeratis oxydum terendo admisce.

Unguentum escharoticum. (E.)

℞. Praecipitati rubri drachmam unam.
Terebinthinae Venetae
unciam unam.

Triturando commisce.

Unguentum antivenereum. (*Au.*)

℞. Praecipitati rubri grana quinque.
Unguenti Praecipitati gri ei
drachmam unam.

Auf einmal einzureiben. — Der bis zum hinlänglichen Speichelfluß fortgesetzte Gebrauch dieser Salbe, der gleichzeitige Aufenthalt im Bett in einem warmen Zimmer und ein strenges wässeriges Regim während mehrerer Wochen ist die Methode, welche Louvrier und Ruft zur gründlichen Heilung der Syphilis anpreisen.

Unguentum fuscum, Unguentum Picis cum Oxydo Mercurii rubro s. mercuriale Baeckingii. (GalM. *Ra. Sa. Sm. Sy.*)

℞. Praecipitati rubri partem unam.
Unguenti basilici . . partes sex.
Misce exacte. (*Sa.*)

Sy. Oxydi partem unam et decem Unguenti; — *Sm.* Oxydi unam et duodecim Unguenti; — GalM. Oxydi unam et Unguenti sedecim; — *Ra.* Oxydi unam et Unguenti quadraginta octo.

Zum Verbinden schmerzloser, besonders venerischer Geschwüre, um die Vitalität der Gewebe zu bethätigen. Man muß, ohne sich an eine dieser so verschiedenen Formeln zu binden, mit einer sehr schwachen Salbe anfangen, deren Stärke man, je nach der Wirkung, auf welche man sorgfältig Acht haben muß, vermehrt oder vermindert.

Unguentum mercuriale. (*Sm.*)

℞. Praecipitati rubri,
Camphorae pulveratae,
singulorum drachmam unam.
Butyri recentis uncias quatuor.
Cerae virgineae drachmas tres.

Oxydo cum cera in butyro liquata trito camphoram adde. — Bei Entzündungen der Eichel auf diese alle Abende beim Schlafengehen vierzehen Tage lang eingerieben. Ein unfehlbares Mittel, diese leichte Krankheit, welche bei Reinlichkeit in wenigen Tagen von selbst aufhört, langwierig zu machen.

Balsamum ophthalmicum. (*Vm.*)

℞. Oxydi Mercurii rubri
partes quatuor.
Cinnabaris . . . . partes duas.
Camphorae . . . partem unam.
Cerati albi
partes nonaginta quatuor.

Terendo misce. — Dieser Balsam hat viel Aehnlichkeit mit der vorhergehenden Salbe.

Unguentum stimulans s. Elemi cum Alumine. (*Au.*)

℞. Unguenti Elemi . . semunciam.
— Styracis drachmas duas.
Balsami Peruviani semidrachmam.
Praecipitati rubri grana quindecim.
Aluminis calcinati grana quinque.
Olei Hyperici quantum sufficit.

Michaelis hat diese Salbe zum Verbinden übelaussehender Geschwüre empfohlen.

Unguentum ad ulcera lymphatica s. scrophulosa (*Sw**.)

℞. Praecipitati rubri partem unam.
Emplastri Cicutae,
Unguenti basilici,
singulorum partes quadraginta.

Misce exacte.

Unguentum ad ulcera venerea. (*Sw**.)

℞. Praecipitati rubri partem unam.
Unguenti mercurialis
partes quatuor.
— basilici partes triginta duas.

Misce exactissime.

Unguentum suppurativum. (*Sw**.)

℞. Praecipitati rubri partem unam.
Tritura cum Olei camphorati guttis aliquot et adde deinde
Balsami Arcaei partes duodecim.
Unguenti basilici
partes quadraginta octo.

Misce bene.

Balsamum ophthalmicum Yveanum s. de St. Yves, Balsamum mercuriale, Unguentum Hydrargyri rubrum. (Br. Ful. Han. Hass. HassP. Li. R. Sax. Wür. *Au. Ca. Pid. Pie. Sp. Vm.*)

℞. Praecipitati rubri partes quinque.
Florum Zinci . . partes duas.
Mixta cum
Butyri recentis partibus viginti,
Cerae flavae . partibus decem
simul liquatis tritura et misce. (Li.)

Ful. Oxydi Mercurii partes quindecim, Oxydi Zinci sex, Butyri sexaginta et Cerae triginta.

℞. Praecipitati rubri partes triginta.
Florum Zinci partes duodecim.
Camphorae in Oleo Ovorum dissolutae . . . partes novem.
Cerae albae
partes quadraginta octo.
Butyri recentis partes ducentas quadraginta octo.
Ceram et butyrum simul liquata et mixta fere refrigerata cum pulveribus tritura. (Br. Han. Hass. R. Wür. *Ca. Pid. Pie. Sp.*)

HassP. Butyri unciam unam, Cerae scrupulos quatuor, Mercurii calcinati rubri scrupulos duos cum dimidio, Florum Zinci scrupulum unum, Camphorae in Oleo Ovorum solutae grana quindecim; — *Vm.* Praecipitati partes tres, Oxydi Zinci tantidem, Camphorae cum Oleo Amygdalarum dulcium triturtae unam, Cerae sedecim et Butyri nonaginta sex.

℞. Unguenti Praecipitati rubri simplicis
partes sexaginta.
Florum Zinci . . . partes duas.
Camphorae . . . partem unam.
Misce bene. (Sax.)

Sp. Unguenti partes nonaginta sex, Oxydi Zinci tres et duas Camphorae; — *Au.* Praecipitati rubri grana quinque, Tutiae quatuor, Camphorae duas et Butyri recentis drachmas duas, vel: Praecipitati grana quatuor, Oxydi Zinci decem, Extracti Opii tantidem et Axungiae drachmas duas.

Diese Salbe iſt von der einfachen rothen Queckſilberſalbe nur wenig verſchieden, doch ſoll ſie bei ſtattfindender Entzündung ihr vorzuziehen ſeyn. Sie gilt für austrocknend, auflöſend, kühlend und ſtärkend. Sicher iſt ſie ſehr reizend.

Unguentum ophthalmicum Dupuytrenii. (*Ra.*)

℞. Oxydi Mercurii rubri
partem unam.
Sulphatis Zinci . . partes duas.
Axungiae Porci
partes nonaginta sex.

Bei chroniſchen und rebelliſchen ſogenannten ſcrophulöſen Augenentzündungen. Man ſtreicht ſie leicht auf den Rand der Augenlider.

Unguentum rubrum. (*Vm.*)

℞. Oxydi Mercurii rubri,
Minii pulverati,
singulorum partem unam.
Axungiae . . . partes octo.
Axungiam cum oxydis, pro parvis partiunculis addendo, contere.

Unguentum Joerdensii. (Bo. *Au.*)

℞. Oxydi Mercurii rubri
partem unam.
Butyri recentis . partes sedecim.
Misce bene et adde
Subacetatis Plumbi liquidi
partes sex.
Tere, donec omne liquidum disparuerit.

Unguentum Rustii. (*Au.*)

℞. Praecipitati rubri
grana quatuor ad sex.
Butyri recentis . drachmas duas.
Subacetatis Plumbi liquidi,
Laudani Sydenhami,
singulorum semidrachmam.

Unguentum Regentii. (Gal. GalM. *Pie.*)

℞. Butyri recentis cum Aqua Rosarum loti . . . . . 4,05.
Camphorae,
Praecipitati rubri,
Acetatis Plumbi, singulorum 0,25.
Tritura diu ut fiat unguentum. (Gal.)

GalM. Praecipitati, Camphorae, Acetatis Plumbi crystallisati, singulorum partem unam et Axungiae bene lotae octodecim; — *Pie.* Praecipitati, Acetatis Plumbi, singulorum partes viginti, Camphorae unam et Butyri Aqua Rosarum loti septuaginta.

Unguentum s. Pomatum Desaulti. (*Ca. Pie. Ra.*)

℞. Praecipitati rubri,
Acetatis Plumbi crystallisati,
Aluminis calcinati,
Tutiae, singulorum semunciam.
Sublimati corrosivi granum unum.
Axungiae lotae . . uncias tres.
Misce triturando. (*Ra.*)

Pie. Praecipitati, Acetatis, Aluminis, Tutiae, singulorum drachmas quatuor, Sublimati grana quadraginta octo et Axungiae uncias tres; — *Ca.* Praecipitati rubri, Lithargyri, Tutiae, Aluminis calcinati, singulorum drachmam unam, Sublimati grana duodecim et Cerati non loti vel Unguenti rosati sufficientem quantitatem.

Dieſe Salbe iſt gegen Flechtenübel und chroniſche Augenlidercntzündungen berühmt. Sie unterſcheidet ſich von den vorigen nur durch die ſtärkere Reizwirkung.

Unguentum s. Pomatum Bellii. (*Bo.*)

℞. Praecipitati rubri,
Calaminae praeparatae,
singulorum sesquidrachmam.
Lithargyri praeparati
drachmam unam.
Tutiae praeparatae semidrachmam.
Cinnabaris pulverati
scrupulum unum.
Axungiae Porci . . uncias duas.
Trituratis sedulo adde

Balsami Peruviani
guttas quindecim.

Unguentum ophthalmicum. (Au.)

℞. Praecipitati rubri
grana decem ad viginti.
Butyri recentis . drachmas tres.
Aeruginis . grana sex ad octo.
Boli albae,
Opii, singulorum scrupulum unum.
Misce triturando. — Benedict empfiehlt sie bei'm Flügelfell (pterygium).

℞. Praecipitati rubri . grana sex.
Aeruginis . . . grana decem.
Tutiae grana duodecim ad quatuordecim.
Butyri recentis . . semunciam.
Contere.

Ceratum detergens s mercuriale Falckii. (Wir. *Ca. Pid. Vm.*)

℞. Praecipitati rubri porphyrisati
semunciam.
Mercurii dulcis porphyrisati
uncias duas.
Acetatis Plumbi porphyrisati
unciam unam.
Commisce intime cum mixtura liquata e
Cerae albae . . unciis quatuor.
Olei Olivarum . . . unciis sex.
Adde deinde
Olei essentialis Lavandulae
semidrachmam.
Misce bene. (*Pid.*)

Wür. eandem formulam omisso tamen oleo Lavandulae; — *Ca.* loco olivarum Oleum Juglandis adhibet, Cerae unciam tantum unam praescribens.

℞. Oxydi Mercurii rubri
partem dimidiam.
Acetatis Plumbi crystallisati
partem unam.
Olei Olivarum . . . partes sex.
Cerae flavae . . partem unam.
Tritis seorsim oxydo et sale cum olei pauxillo adde reliquum olei et cerae prope ignem lenem liquefactae et miscellae primum sal deinde oxydum admisce. (*Vm.*)

Reizend, austrocknend, zum Verbinden syphilitischer Geschwüre. Man wendet es in Einreibung oder auf Charpie gestrichen an.

Unguentum Falckii. (Ca.)

℞. Praecipitati rubri drachmas duas.
Amalgamatis e Stanni et Mercurii partibus aequalibus
drachmas quatuor,
Unguenti rosati . unciam unam.
Triturat s adde
Olei essentialis Menthae piperitae
guttas viginti.

Gegen Hämorrhoidalknoten empfohlen.

Cereoli Falckii. (Hass. *Pid.*)

℞. Terebinthinae Venetae
drachmam unam,
Laccae pulveratae semidrachmam.
Liquatis prope ignem adde
Emplastri mercurialis uncias duas.
Mercurii dulcis pulverati
drachmas duas.
Praecipitati rubri porphyrisati
scrupulos duos.
Misce bene agitando ut fiant cereoli.

Sulphuretum Mercurii.

§. I. Sulphuretum nigrum.

Ba. Fer. Li. Suec. *Vm.*

Man hat es lange Zeit unter dem Namen *Aethiops mineralis* mit einer Mischung aus Schwefel und sehr zertheiltem Quecksilber verwechselt; allein es unterscheidet sich von dieser durch die sich gleichbleibenden Verhältnisse, und daß man es, nach Seguin, durch gehöriges Erhitzen in einer Röhre, in rothes Schwefelquecksilber (sulfure rouge) verwandeln kann, ohne daß es etwas von seinem Gewichte verliert.

A. Im Zustande der Reinheit.

I. Mittelst Feuer bereitet.

℞. Florum Sulphuris lotorum
partem unam.
Liqua leni igne in olla fictili et sensim adde
Mercurii in cochleari ferreo calefacti . . . . partem unam.
Agita continue, donec massa colorem nigrum uniformem acceperit et post refrigerationem porphyrisa. (Ba. Suec. *Vm.*)

Per. Sulphuris partes tres et duas Mercurii.

II. Durch Fällen (Präcipitation) bereitet. *Aethiops mineralis praecipitatus, superhydrosulphuretum Mercurii.*

℞. Sublimati corrosivi
partes duodecim cum dimidia.
Hydrosulphatis Ferri,
Acidi sulphurici concentrati,
singulorum partes quinque.
Sublimato in aqua fuso, liquori immitte gas ex duabis reliquis substantiis et Aquae quintuplo acidi pondere extricatum; praecipitatum collectum et lotum sicca. (*Vm.*)

℞. Subcarbonatis Potassae
uncias duas.
Florum Sulphuris lotorum
uncias quatuor.
Aquae Calcis . . . libras duas.
Coque in cucurbita vitrea longicolli super arena, donec sulphur sit dissolu-

tum; refrigerata filtra et liquori guttatim instilla solutionem frigidam Mercurii unciarum duarum in Acidi nitrici unciis quatuor; effervescentia cessata liquorem sepone, quod super praecipitato natat decantha et hoc Aqua destillata ablutum blando calore sicca. (Fer. Li. *Vm.*)

Vm. loco subcarbonatis Potassam liquidam praescribit.

B. Mit Schwefelſpießglanz gemiſcht.

Dieſes Präparat war ebenfalls mit dem Aethiops antimonialis verwechſelt worden.

℞. Sulphuris
partem unam cum dimidia.
Potassae causticae fusae,
Sulphureti Antimonii pulverati, singulorum partes quinque cum dimidia.

Coque in Aqua, donec nihil amplius dissolvatur et filtra. Colaturae coctae instilla Nitratis Mercurii in Aqua soluti, quamdiu praecipitatum formatur, quod lotum siccetur. (*Vm.*)

Vm. praeterea proponit 1) loco solutionis nitrat's illum Sublimati corrosivi et liquori subito infundere partes ejus duodecim; 2) liquefacere simul Sulphureti Potassii partes sex et quinque cum dimidia Sulphureti Antimonii, mixturam refrigeratam atque pulveratam cum Aquae pauxillo terere, addere Sublimati corrosivi in Aqua dissoluti partes duodecim vel Mercurii dulcis pulverati viginti et praecipitatum deinde multa Aqua ablutum siccare.

§. II. Sulphuretum rubrum.

Cinnabaris, Sulphuretum Hydrargyri rubrum, Deutosulphuretum Hydrargyri rubrum, Bisulphuretum Hydrargyri; Zinnober; Cinabre (*Gal.*).

A. *Cinnabaris nativa;* natürlicher Zinnober; Cinabre naturel ou natif (*Gal.*).

An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. Ed. Fenn. GalM. Gen. Han. His. Pol. Sax. Wir. Würr. *Sp.* führen ihn unter den natürlichen Arzneimitteln auf. Er darf aber nicht ohne vorgängige Reinigung durch Sublimiren angewendet werden.

B. *Cinnabaris factitia s. artificialis, Hydrargyri Sulphuretum rubrum s. sublimatum.* (Am. An. Ba. Br. Du. Fer. Ful. Gal. Gen. HassP. His. Li. Lon. LonN. Pal. Sar. Sax. Suec. Wir. Würr. *Br. C. Fi. Par. Sp. Sw. T. Vm.*)

℞. Sulphuris sublimati partem unam.
Mercurii . . . partes quinque.

Mercurium sulphuri fuso adde, quam massam, quum intumescit, ab igne remove, vas tegendo ne forte deflagret; tum pulveratam sublima. (Am. Du. Fer. Lon. LonN. Suec. *C.*)

An. Wür. et *T.* Sulphuris partem unam et quatuor Mercurii; — Br. His. Pal. Sar. Wir. et *Fi.* Sulphuris unam et Mercurii tres; — Gen. Sulphuris unam et Mercurii tres cum dimidia; — HassP. Sulphuris uncias duas, Mercurii uncias duodecim; — Ful. Li. Sax. *Br.* et *Sp.* Sulphuris unam et septem Mercurii; — Ba. Sulphuris unam et Mercurii septem cum quinta parte; — Gal. Sulphuris 150 et Mercurii 1,080; — *Sw.* Partes aequales i. e. sublimationem aethiopis sui; — *Sw*.* Sulphuris quatuor et Mercurii viginti quinque.

℞. Sulphuris in baculis partes tres.
Mercurii . partes novemdecim.

Tere ad extinctionem metalli usque et mixturam in retorta in balneo arenae collocata sensim calefaciendo sublima. (*Vm.*)

Vm. praeterea, et modum agendi praemonitum cum iisdem proportionibus indicat.

Reizend, innerlich wenig, aber äußerlich häufig in Räucherungen zu einer oder zwei Drachmen auf einmal, mit Weihrauch angewendet.

Cinnabaris praeparata. (Gal. Li. Sar. Wir. *Sp.*)

Cinnabaris et artificialis et nativa pulverata et porphyrisata multa Aqua abluitur et moleculae subtilissimae sepositione liquoris colliguntur (Li.); vel antequam porphyrisetur et abluatur, sublimationi submittitur. (Sar. Wir. *Sp.*)

Sp. Cremorem Cinnabaris indicat obtinendum coquendo Cinnabarem in Aqua et desumendo pelliculas in superficie liquidi formatas, quae siccatae pulverantur.

Pulvis anthelminticus. (*Au.*)

℞. Sulphureti Mercurii nigri,
Radicis Jalapae,
singulorum drachmam unam.
— Valerianae drachmas duas.

Gabe, ein Kaffeelöffel.

Pulvis antilyssicus. (*Bo.*)

℞. Cinnabaris nativae,
— artificialis, singularum grana viginti quatuor.
Moschi . . . . grana sedecim.

Misce et porphyrisa. — Auf einmal, in einem Löffel Alcohol zu nehmen. — Sicherlich iſt die Hundswuth noch nie dadurch geheilt worden.

Pulvis analepticus s. cardiacus s. cordialis s. nobilis Cellensis s. Cellensis aureus. (8*. Br. O. Wir. *Sp. Sw.*)

℞. Cinnabaris . . . . semunciam.

Sacchari crystallisati (Candis) uncias tres.
Olei Cinnamomi drachmam dimidiam ad unam.
Tritura bene. (B*. Br. O. *Sw.*)

Wir. et *Sp.* Cinnabaris drachmas sex, Sacchari uncias duas et Olei Cinnamomi scrupulos duos.

Reizend, als herz- und magenstärkend sehr berühmt. — Gabe, ein Scrupel.

Pulvis roborans s. confortans Camerarii. (Wir.)

℞. Cinnabaris nativae drachmam unam.
Cornu Cervi usti drachmas quinque.
Dentium Apri,
Ungulae Alces,
Boli Armenae, singulorum semidrachmam.
Terrae sigillatae drachmas duas.
Sardonycis,
Granat,
Hyacinthi,
Sapphiri,
Smaragdi, singulorum grana viginti quinque.
Succini,
Coralli albi,
— rubri,
Margaritarum orientalium,
Aegagropilae occidentalis,
— orientalis, singulorum drachmam unam.

Fiat pulvis subtilissimus. — Ein lächerliches Präparat, welches nöthigenfalls durch das vorhergehende ersetzt werden würde. — Gabe, von einem Scrupel bis zur halben Drachme.

Pulvis cephalicus Camerarii. (Wir.)

℞. Cinnabaris . . semidrachmam.
Crystalli mineralis,
Succini praeparati,
Ungulae Alces, singulorum drachmam unam.
Cornu Alces absque igne praeparati,
— Cervi absque igne praeparati, singulorum drachmas tres.
Cranii Hominis praeparati drachmas sex.
Sacchari albi . . sesquiunciam.

Fiat pulvis. — Nicht weniger lächerlich als das vorige und durch den pulvis analepticus zu ersetzen. — Gabe, von einem halben bis zu drei Scrupel.

Pulvis epilepticus ruber s. ad guttetam s. antiepilepticus. (Sar. Wir. *Bo. Pie.*)

℞. Cinnabaris nativae,
Succini praeparati,
Unicornu marini, singulorum unciam unam.
Radicis Paeoniae,
Corallii rubri, singulorum uncias duas.

Fiat pulvis. (Wir.). — Gabe, von einem halben Scrupel bis zur halben Drachme.

℞. Radicis Paeoniae,
Cornu Cervi,
Succini praeparati, singulorum semunciam.
Castorei . . drachmam unam.
Cinnabaris . . drachmas duas.

Fiat pulvis subtilissimus. (Sar.)

℞. Radicis Paeoniae,
— Valerianae sylvestris, singularum unciam unam.
Seminum Rutae,
Myrrhae,
Castorei,
Succini albi, singulorum semunciam.
Cinnabaris . . . . uncias duas.

Fiat pulvis. (*Bo. Pie.*)

℞. Visci querni,
Cinnabaris,
Ungulae Alces, singulorum drachmas duas.
Cranii Hominis absque igne praeparati . . . . . semunciam.

Fiat pulvis. (Wir.) — Gabe, einen halben Scrupel bei Kindern und von einem Scrupel bis zur halben Drachme bei Erwachsenen.

Pulvis cephalicus ruber, Specificum cephalicum. (Li. Wir. *Sp.*)

℞. Cinnabaris . . . . uncias tres.
Radicis Paeoniae . sesquiunciam.
Cranii Hominis,
Ungulae Alces,
Cornu Cervi absque igne praeparati,
Smaragdi praeparati,
Corallii rubri praeparati, singulorum drachmas duas.
Margaritarum orientalium praeparatarum,
Unicornu marini,
Succini praeparati, singulorum semidrachmam.

Trituratis diu fiat pulvis subtilissimus. (Wir.)

Sp. Cinnabaris uncias tres, Paeoniae sesquiunciam, Smaragdi drachmas duas, Ungulae Alces drachmam unam, Cranii Hominis scrupulos duos, Corallii et Cornu Cervi tantidem et Unicornu, Margaritarum et Succini, singulorum scrupulum unum.

℞. Cinnabaris,
Succini albi,

Unicornu marini,
Dentium Hippopotami,
singulorum semidrachmam.
Cranii Hominis drachmam unam.
Ungulae Alces,
Corallii rubri,
Chrysolithi,
Smaragdi,
Margaritarum praeparatarum,
singulorum scrupulos duos.
Seminum Paeoniae,
Cornu Cervi absque igne parati,
singulorum sesquidrachmam.
Visci querni . . drachmas duas.
Radicis Paeoniae . drachmas sex.
Foliorum Auri . . . . . no. 2.

Fiat pulvis subtilissimus. (Wir.) — Dieses Präparat ist noch lächerlicher als die beiden vorhergehenden. — Gabe, von einem Scrupel bis zur halben Drachme.

Li. hanc formulam correctam ita indicat:

℞. Cinnabaris praeparatae,
Magnesiae albae,
singularum unciam unam.
Pulveris Visci,
— Paeoniae,
singulorum semunciam.

Fiat pulvis subtilissimus. — Gabe, von einem Scrupel bis zur halben Drachme.

Pulvis antispasmodicus s. nitrosus cinnabarinus s. salinus compositus s. temperans ruber s. Stahlii. (Ams. B. Bel. Br. Gal. Li. O. Pal. Wir. *Ca. Fi. Pie. Sa. Sw. Vm.*)

℞. Cinnabaris . . . partem unam.
Nitratis Potassae partes quatuor.
Sulphatis Potassae partem unam.

Misce triturando. (B. Bel.)

Ams. et *Vm.* Cinnabaris partem unam et quatuor cujusque Salium; — *Sw.* Cinnabaris unam, sedecim Nitri et octo Sulphatis; — *Vm.* Cinnabaris unam et Salium, singulorum sedecim; — O. Cinnabaris unam et duodecim cujusque Salium; — *Fi.* Cinnabaris duas et tres Salium; — Gal. *Ca.* et *Pie.* Cinnabaris duas et novem Salium cujusque, — Li. et Wir. Cinnabaris tres et cujusque Salium sedecim.

℞. Cinnabaris . . . partem unam.
Concharum praeparatarum,
Kali nitrici,
— sulphurici,
singulorum partes duas.

Fiat pulvis. (*Vm.*)

Pal. Nitri drachmas sex, Sulphatis, Concharum, singulorum tantidem et tres Cinnabaris.

℞. Cinnabaris . . . partem unam.
Oculorum Cancri . . partes sex.

Misce triturando. (*Sa.*)

℞. Cinnabaris porphyrisati
partes quinque.
Oculorum Cancri,
Corallii rubri praeparati,
singulorum partes octo.
Matris Perlarum praeparatae,
Kali sulphurici,
singulorum partes sedecim.
— nitrici partes triginta duas.

Fiat pulvis tener. (Br. Wir.)

Dieses Pulver ist offenbar reizend; dennoch hat es lange Zeit als ein kühlendes, die Hitze im Blute zu mäßigen und die veränderten Feuchtigkeiten der ersten Wege zu verbessern geeignetes Mittel in Ansehen gestanden. Die Gabe ist wegen der Mannichfaltigkeit seiner Zusammensetzung schwer zu bestimmen; nach der letztern Formel ist sie ein bis zwei Scrupel.

Potio temperans. (*Sm.*)

℞. Pulveris temperantis Stahlii grana
duodecim ad quindecim.
Emulsionis simplicis . uncias sex.
Syrupi Althaeae vel Ribium
unciam unam.
Aquae Florum Aurantii
drachmas quatuor.

Misce.

Im Anfang hitziger Krankheiten empfohlen. Es kann aber in diesem Falle wegen der dadurch bedingten Reizung nur schaden und verdient daher den gegebenen Namen nicht.

Bolus ruber s. cinnabarinus. (*Sa. Sw.*)

℞. Cinnabaris . . scrupulum unum.
Conservae Rosarum grana quatuor.

Fiat bolus. (*Sw.*)

Sar. Conservae Aurantii, Sulphureti mercurialis antimonialis, singulorum drachmam unam, ut fiat pulvis, cui addi potest, si requiritur, Moschi vel Serpentariae Virginicae scrupulus unus.

Diese Bissen sind bei Kopfschmerz und bei veralteten, sogenannten nervösen Affectionen gepriesen worden.

B. Cinnabaris semigranum et Roob Juniperi grana sex, fiat bolus. — Sollen mit Erfolg in einem Fall von Bauchwassersucht, vier Stück täglich, gegeben worden seyn.

Boli diaphoretici. (*Sm.*)

℞. Cinnabaris . scrupulum unum.
Camphorae . . scrupulos duos.
Theriacae . . . . unciam unam.
Syrupi Capilli Veneris vel Dianthi
quantum sufficit

ut fiat massa in bolos viginti quatuor dividenda. — Täglich drei Stück, indem man zugleich einen sehr warmen Aufguß von grünem Thee oder Fliedern trinkt.

Pilulae Conti cinnabarinae. (*Au.*)

℞. Cinnabaris,
Extracti Millefolii,
— Cicutae,
singulorum drachmam unam.

Fiant pilulae granorum duorum — Gabe, ſieben Stück Morgens und Abends, bei veneriſchen Drüſenanſchwellungen.

Trochisci mercuriales. (*Sp.*)

℞. Cinnabaris porphyrisatae
scrupulos duos.
Succini praeparati
scrupulum unum.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae
quantum sufficit
ut fiant trochisci magnitudinis arbitrariae. — Zu Zinnoberräucherungen.

Ceratum rubrum. (*Sw.*)

℞. Cinnabaris . . grana quindecim.
Resinae flavae . . semunciam.
Cerae flav. e,
Axungiae Porci,
singulorum semilibram.

Cinnabarem pulveratum cum reliquis fusis et mixtis commisce. — Reizend, austrocknend, zum Verbinden von Geſchwüren.

Unguentum nigrum. (*Vm.*)

℞. Cinnabaris . . . . partes tres.
Hydrosulphatis Plumbi
partem unam.
Medullae bubulae partes duodecim.

Misce triturando.

Unguentum Sulphureti Hydrargyri sublimati s. cinnabarinum. (*C.*)

℞. Cinnabaris . . . uncias duas.
Lithargyri . . uncias quatuor.
Cefussae . . . . sesquiunciam.
Mercurii dulcis . drachmas duas.

Seorsim pulverata misce et cum mixtura liquata e
Cerae flavae . . . . unciis sex,
Olei Rosarum . . libris duabus intime commisce.

Unguentum s. Pomatum antiherpeticum. (*Sm.*)

℞. Cinnabaris . . drachmam unam.
Camphorae . scrupulum unum.
Cerati communis unciam unam.

Contere. — Von Alibert oft mit Erfolg zum Verbinden von Flechten angewendet; man wiederholt die Anwendung wenigſtens zweimal täglich.

Pomatum s. Unguentum antiherpeticum. (*Ra.*)

℞. Cinnabaris . . sesquidrachmam.
Salis Ammoniaci semidrachmam
Axungiae Porci . . uncias duas.
Trituratis simul adde
Aquae Rosarum drachmam unam.

Beſonders bei Phthiriaſis empfohlen, um das Jucken zu mäßigen und die Erzeugung des Ungeziefers zu mindern.

Electuarium antiarthriticum. (*Ca.*)

℞. Cinnabaris . . . sesquiunciam.
Conservae Rosarum uncias duas.
Resinae Guajaci pulveratae
unciam unam.
Syrupi Zingiberis quantum sufficit.

Bei rheumatiſchen Schmerzen ohne Fieber empfohlen. — Gabe, ein Kaffeelöffel, täglich zweimal.

Electuarium purgans. (*Ra.*)

℞. Sulphureti Mercurii nigri,
Pulveris Jalapae,
singulorum drachmas duas.
Scammonei . drachmam unam.
Scillae,
Resinae Jalapae,
singularum sesquidrachmam.
Syrupi Rhamni
sufficientem quantitatem.

Gabe, eine halbe bis zwei Drachmen. — Von Fouquier bei Waſſerſucht und Kolik von Metall angewendet.

Sparadrap rubrum. (*Vm.*)

℞. Cinnabaris porphyrisatae
partem unam.
Admisce intime mixturae liquatae e
Terebinthinae . . partibus sex.
Cerae albae . partibus duodecim.

Linteum massae immerge, quod tunc laevigetur.

Extractum Opii cinnabarinum, Laudanum cinnabarinum. (His.)

℞. Extracti Opii aquosi drachmas sex.
Croci pulverati,
Cinnabaris porphyrisatae,
singulorum drachmas tres.

Fiat cum Aquae pauxillo massa in trochiscos dividenda.

Protochloruretum Mercurii, Antiquartium, Aquila alba s. mitigata, Calomelanos, Chloretum Hydrargyri, Draco mitigatus, Hydrochloratum Deutoxydi Mercurii, Hydrargyrus muriaticus dulcis s. oxydulatus s. muriatus mitis s. dulcis, Hydrargyrum muriaticum mite, Mercurius dulcis s. muriaticus s. praecipitatus albus s. sublimatus dulcis, Murias Hydrargyri oxydulati s. mitis s. suboxygenatus s. hydrargyrosus mitis s. Oxyduli Hydrargyri mitis, Manna metallorum, Panchymagogum minerale, Panchymagogus Quercetanus, Protochloruretum Hydrargyri, Submurias Hydrargyri s. Hydrargyri mitis s. praecipita-

tus s. sublimatus, Calomel, Calomelas, Murias Mercurii dulcis s. Mercurii suboxygenatus, Panacea mercurialis, Protohydrochloras Mercurii, Submurias Hydrargyri s. Mercurii, Sublimatus dulcis; ſalzſaures Queckſilberoxydul, Calomel. (A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. O. Pal. Pol. R. RC. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. *Br. C. Fi. Par. Pid. Sp. Sw. T. Vm.*)

1) Gewöhnliches Verfahren.

℞. Sublimati corrosivi pulverati partes quatuor.
Mercurii . . . . . partes tres.

Tritura in mortario vitreo, Alcohol s pauxillum addendo, ad perfectam metalli extinctionem usque; pulverem in lagenam intromitte pro triente tantum illo replendam, qua supra ignem collocata cum obturamento primum charta-ceo deinde cum vitreo obturatâ ignis gradatim augeatur et ita nutriatur, donec nihil amplius in fundo vasis restet. Massam sublimatam tunc pulvera et coque cum Aquae destillatae duplo et Hydrochloratis Ammoniaci parte vigesima; liquido decanthato pulverem bis terve Aqua destillata lotum leni calore sicca. (An. B. Bel. Fer. R.)

Bor. Ed. Han. O. RC. Sar. et Sax. easdem proportiones indicant sed Aquam solum ad lavandum praescribunt; — Bor4. Sublimati partes quatuor, Mercurii partes tres, duas sublimationes et digestionem pulveris cum Spiritus Vini alcoholisati sufficiente quantitate (ad separandum sublimatum forte immixtum.), qui tunc filtratione separatur; — Sax. unam tantum, reliqui duas sublimationes jubent; — Br. Pal. Wir. Sublimati et Mercurii, singulorum partes aequales, triturationem cum Alcohole, duas sublimationes successivas, lotionem cum dissolutione bullienti drachmae unius Salis Ammoniaci pro Aquae octario; — Wür. Sublimati et Mercurii partes aequales, triturationem cum Alcohole, unam sublimationem et solam lotionem cum Aqua bulliente; — A. Sublimati uncias quinque et quatuor Mercurii, unam sublimationem et lotionem cum Aqua frigida; — D. Sublimati libram unam, Mercurii uncias novem, duas sublimationes et lotionem cum Aqua bulliente; — Ams. Sublimati libram unam, Mercurii uncias decem cum dimidia, triturationem cum Aquae pauxillo et tres sublimationes absque lotione; — GalM. Sublimati partes viginti quatuor, Mercurii quindecim, triturationem cum Aqua, duas sublimationes et lotionem cum Aqua bulliente; — Lon. Lus. Sublimati libram unam, Mercurii uncias novem, triturationem cum Aqua, duas sublimationes et lotionem cum Aqua bulliente; — Gal. Sublimati 480, Mercurii 320, triturationem cum Aqua, plures sublimationes successivas et lotionem cum Aqua bulliente; — *Sw.* Sublimati uncias quindecim, Mercurii duodecim, triturationem cum Alcohole, duas sublimationes et lotionem cum Aqua bulliente; — Ba. Sublimati partes quatuor, Mercurii duas, sublimationes duas et lotionem cum Alcoholis bullientis partibus quatuor; — *Vm.* Sublimati 12,7, Mercurii 9,5, sublimationem unam absque lotione; — *Br.* Sublimati et Metalli partes aequales, triturationem cum Aqua absque lotione; — His. Sublimati partes octo, Mercurii sex, triturationem cum Aqua, plures sublimationes successivas et lotionem cum Aqua bulliente; — *Sp.* Sublimati uncias triginta duas, Mercurii viginti quatuor et duas sublimationes; — Am. Du. *C.* Sublimati libram unam, Mercurii uncias novem et duas sublimationes successivas.

Hass. et *Pid.* Sublimati libram unam, Mercurii uncias decem et triturationem cum Aqua, post primam sublimationem tamen volunt productum sedulo triturari cum Mercurii uncia una et mixturam denuo sublimari.

Lotio omissa a pluribus pharmacopoeis est alicujus momenti quoad liberationem Mercurii dulcis a parva quantitate sublimati corrosivi semper ei adhaerenti. (GalH.)

2) Verfahren Scheele's.

℞. Mercurii . . . uncias septem.
Acidi nitrici Aqua diluti uncias quinque.

Acidum metallo infunde et sub finem effervescentiae digere leni calore, vas subinde agitando, per horas sex. Ignem deinde ita auge, ut liquidum parumper bulliat; decantha tunc a mercurio non dissoluto et statim misce cum solutione bulliente, antea praeparata de

Salis communis . . unciis quatuor in Aquae libris sex; praecipitatum aqua destillata calida ablue, donec a kali subcarbonico non ultra turbetur, quo facto siccetur. (Du. *C.*)

Das Product iſt eins von denen, welche man gewöhnlich mit dem Namen Praecipitatus albus bezeichnet.

Am. Ams. Bel. Br. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. His. Lus. Pal. ℞. Sar. Suec.

Wir. et *Sw.* ferè eandem formulam.— Die folgende iſt eine Modification derſelben.

℞. Nitratis Mercurii crystallisati,
Mercurii,
singulorum partem unam.
Salis communis dimidium pondus mixturae. Tritura in mortario vitreo ad extinctionem metalli usque et sublima. (*Br.*)

3) Verfahren Hermbſtädt's.

℞. Deutosulphatem Mercurii non ablutum, destillando in retorta ad siccum Mercurii uncias sex et dimidiam et Acidi sulphurici quatuor obtentum.
Mercurii uncias tres cum dimidia.
Trituratis ad extinctionem metalli usque adde deinde
Salis communis
uncias quinque et dimidiam.
Misce bene triturando et sublima. (GalH. *Br. C.*)

Fer. Mercurii partes duodecim, Acidi sulphurici quatuordecim, salis pulverationem cum Mercurii partibus duodecim, mixtionem massae hoc modo obtentae partium octo cum tribus Salis decrepitati et sublimationem; — *Fi.* Mercurii uncias viginti, Acidi sulphurici uncias decem; mercurii unciae decem cum acido sulphurico commixtae in balneo arenae ad siccum destillentur et massa igne vehementer aucto bene exiccetur, retortâ diffractâ massae in mortario marmoreo reliquae decem unciae Mercurii et Salis marini decrepitati tres ponderis octantes addantur, quo facto mixta et subtilissime pulverata in lagena vitrea pro tertia parte replenda in balneo arenae igne per horas quinque nutrito sublimentur etc.; — *T.* Sulphatis Protoxydi Mercurii, Mercurii et Salis communis decrepitati, singulorum uncias viginti, caeterum idem ut GalH. agendi modus.

℞. Mercurii,
Acidi sulphurici,
singulorum uncias quatuor.
Acidum guttatim metallo instilla in retortam vitream ingesto, quae in balneo arenae calefiat, donec mixtura in massam albam sit conversa. Apparatu refrigerato sal pulveratum ad perfectam metalli usque extinctionem tritura cum
Mercurii
unciis duabus cum dimidia.
Adde deinde
Salis marini decrepitati
uncias quatuor et dimidiam.
Mixta calefac pedetentim, donec totum sit sublimatum; productum pulveratum iterum sublima. Massam denuo subtilissime pulveratam coque per horam unam cum dissolutione
Salis Ammoniaci
unciae unius et dimidiae in Aquae destillatae libris quinque; filtrato deinde liquore, pulverem Aqua destillata lotum lente super charta josephina sicca. (Li.)

LonN. Mercurii libras duas cum Acidi sulphurici unciis triginta in vase vitreo coque ad exsiccationem; refrigerata cum Mercurii libris duabus in mortario fictili contere, ut optime misceantur, adde Salis marini sesquilibram et tere ad extinctionem usque, tum sublima, sublimatum in pulverem subtilissimum contere, per cribrum transmitte et cum Ammonii muriatici unciis octo in Aquae destillatae ferventis congio prius liquefacti diligenter misce, sepone ut subsideat pulvis, liquorem effunde et pulverem Aqua destillata fervente saepius ablue, donec Liquore Ammoniae instillato nihil dejiciatur, fiat pulvis subtilissimus.

Das ſalzſaure Queckſilberoxydul iſt ein ſehr gebräuchliches Präparat, beſonders in England, wo es, wie es ſcheint, als eine Art Panacee betrachtet wird. In hohem Grade reizend, wirkt es alterirend, wurmtreibend, krampfſtillend, reinigend, ſchweiß-, harntreibend, als Niesmittel, ſchmelzend, abführend, auflöſend oder die Speichelexcretion befördernd, je nach Verſchiedenheit der Gabe, der Anwendungsweiſe, der ſtattfindenden Umſtände, der Conſtitution des Subjects und der Subſtanzen, mit welchen man es verbindet. Beſonders hat man es geprieſen bei wirklich veneriſchen oder als ſolche betrachteten Krankheiten, bei Scrophelkrankheit, chroniſcher Leberentzündung, convulſiviſchen Krankheiten, rheumatiſchen Schmerzen, veralteten Krankheiten des Hautgewebes und hartnäckiger Verſtopfung.

Im Allgemeinen wirkt es bloß alterirend, d. h. als reizendes oder aufregendes Revulſivmittel, in der Gabe von einem bis fünf Gran; von fünf zu fünfzehen Gran genommen, führt es ab.

Man darf weder Chlor, noch Salpeterſäure, keine Alkalien, keine kohlenſauren Salze oder ihre Schwefelverbindungen, weder Kalkwaſſer, noch Kupfer, und eben ſo wenig Eiſen und Blei damit verbinden, da es dadurch zerſetzt wird.

§. I. Präparate, in denen die Wirkung des ſalzſauren Queckſilberoxyduls durch nichts oder wenigſtens nicht merklich verändert wird.

Pulvis e Mercurio dulci. (DD. *Su. Sy.*)
℞. Mercurii dulcis . . grana duo.

Amyli pulverati scrupulum unum.
Misce. (DD.)

℞. Mercurii dulcis
granum unum ad duo.
Sacchari pulverati
grana quindecim.
Misce. (*Sy.*)

℞. Mercurii dulcis . . grana sex.
Pulveris Amyli grana duodecim.
— Sacchari albi semidrachmam.
Misce bene. (*Sw.*)

Alle diese Pulver können auf eine einzige Gabe angewendet werden. Bei venerischen Krankheiten jüngerer Kinder hat man das Folgende empfohlen:

℞. Mercurii dulcis granum unum.
Sacchari pulverati
scrupulum unum.
Misce sedulo et in partes tres divide per diem sumendas.

Eine Mischung von zwei Drachmen mercurius dulcis mit einer halben Unze Zucker und ebensoviel Weihrauch kann in Räucherungen, eine oder zwei Drachmen auf die Räucherung, in manchen Fällen von venerischen Krankheiten von Nutzen seyn. Eine andere Mischung von vier Gran Calomel und einem halben Scrupel Armenischen Bolus, in vier Theile für den Tag getheilt, ist, nach Clare's und Bracket's Methode, in Einreibungen auf das Zahnfleisch, die innere Fläche der Lippen, die Zunge und den Gaumen vorgeschlagen worden.

Remedium antitaeniosum, Pulvis vermifugus. (*Au.*)

℞. Mercurii dulcis scrupulum unum.
Cornu Cervi calcinati,
Cinnabaris,
singulorum grana decem.

Alle vier oder fünf Stunden Nachmittags zu nehmen, den Abend trinkt man zwei Unzen Süßmandelöl; den folgenden Morgen nimmt man nüchtern, in Syrup, den dritten Theil eines Pulvers aus einer Drachme Farrnkraut, einer halben Drachme Jalappe, ebensoviel Cardebenedicten und thierischer Kohle; wenn der Bandwurm nicht abgeht, so nimmt man nach zwei Stunden das zweite, und zwei Stunden später das letzte Drittel. — Von Beck vorgeschlagen.

Injectio ex Muriate Hydrargyri s. e Mercurio dulci. (*Sy.*)

℞. Mercurii dulcis . . semunciam.
Aquae destillatae . uncias octo.

Bei hitziger Harnröhrenentzündung empfohlen, aber höchstens bei manchen chronischen Harnröhrenentzündungen von Nutzen. Folgende Formel von Lagneau ist vorzüglicher:

℞. Mercurii dulcis porphyrisati
semunciam.
Solutionis Gummi Arabici
uncias duodecim.

Gargarisma antivenereum. (*Sy.*)

℞. Gummi Arabici drachmam unam.
Decocti Hordei uncias quinque.
Solutioni adde
Syrupi Althaeae . sesquiunciam
et tunc admisce, bene agitando
Mercurii dulcis pulverati
grana quindecim.

Enema s. Clyster mercuriale. (*Au.*)

℞. Mercurii dulcis scrupulum unum.
Amyli,
Gummi Arabici,
singulorum semunciam.
Aquae . . . . . uncias octo.
Misce triturando.

Lotio Veratri mercurialis s. antipsorica. (*Au.*)

℞. Decocti Hellebori albi uncias octo.
Mercurii dulcis drachmam unam.
Nitri . . . . drachmas duas.
Salis Ammoniaci . uncias duas.

Ein schlechtes Präparat, welches Wilson als ein vortreffliches antipsoricum gepriesen hat.

Mixtura cum Calomelle. (*Sa.*)

℞. Mercurii dulcis semiscrupulum.
Syrupi Fumariae . uncias duas.
Aquae Fumariae . libram unam.

Halbunzen- oder unzenweise.

Mel e Muriate Hydrargyri s. Hydrargyri s. Mercurii dulcis. (*Sw. Sy.*)

℞. Mercurii dulcis pulverati
drachmam unam ad duas.
Mellis despumati unciam unam.
Misce triturando. — Bei venerischen Halsgeschwüren empfohlen und bei denen der Geschlechtstheile der Salbe vorzuziehen.

Unguentum de Calomelle s. Mercurii dulci. (*Sy.*)

℞. Mercurii dulcis
drachmam unam ad duas.
Cerati albi absque aqua vel Medullae bovinae unciam unam.
Mixtionem per horae quadrantem continua. — Bei venerischen Krankheiten, in Einreibungen auf die Haut oder bloß auf die kranke Stelle derselben aufgeschlagen, anzuwenden.

B. sub eodem nomine indicat pomatum sequens: Mercurii dulcis scrupulos duos, Unguenti basilici unciam unam. — Marryanus rühmte sie bei verschiedenen pustulösen Affectionen der Haut und bei Ausſatz.

Pomatum s. Unguentum antiherpeticum. (*Ra.*)

℞. Mercurii dulcis drachmam unam.
Unguenti Rosarum drachmas tres.

Dieser ähnlich ist das von Dupuytren gebrauchte *Pomatum antiherpeticum anglicum* (*Pie.*): Mercurii dulcis drachmam unam, Axungiae vel Unguenti populei uncias quatuor; — es ist aber weniger wirksam.

Pomatum s. Unguentum antiherpeticum. (*Ra.*)

℞. Mercurii dulcis drachmam unam.
Florum Sulphuris drachmas duas.
Axungiae depuratae unciam unam.

Von Fouquier empfohlen.

Injectio ad carnem luxuriantem urethrae. (*Sm.*)

℞. Mercurii dulcis drachmam unam.
Olei Scorpionum unciam unam.
Balsami tranquilli uncias duas.

Nach dem Urinlassen spritzt man ungefähr einen großen Fingerhut voll von dieser Mischung in die Harnröhre und behält sie wenigstens fünf Minuten lang bei sich. Dieses wiederholt man einen Monat lang täglich dreimal. Diese sonderbare Zusammensetzung, welche gegen Fleischauswüchse der Harnröhre nutzlos ist, da diese selbst nur auf der Einbildung beruhen, könnte in manchen Fällen von chronischer hartnäckiger Harnröhrenentzündung von Nutzen seyn.

Bolus e Muriate Hydrargyri s. Mercurio dulci. (*Sw.*)

℞. Mercurii dulcis
grana quinque ad decem.
Syrupi simplicis
quantitatem sufficientem
ut fiat cum pulvere Lycopodii bolus unus. — Soll bei Wasserkopf von Nutzen seyn.

Boli anthelmintico-tonici. (*B.*)

℞. Mercurii dulcis grana quatuor.
Extracti Absinthii
drachmam unam.

Fiant boli quatuor. — Auf einmal.

℞. Mercurii dulcis grana quatuor.
Extracti Seminis Cinae
drachmam unam.

Fiant boli quatuor. — Alle zwei Stunden ein Stück.

Man empfiehlt sie bei Würmern mit etwas Atonie im Darmcanal.

Boli anthelmintico-nervini. (*B.*)

℞. Mercurii dulcis
grana quatuor ad octo.
Extracti Valerianae scrupulos duos.

Fiant boli quatuor. — Gabe, alle drei Stunden ein Stück, bei Wurmkrankheiten mit nervösen Symptomen.

Pilulae ex Hydrargyro muriatico mitis s. e Mercurio dulci. (DD. WW. *Au. E. Ra.*)

℞. Mercurii dulcis grana duodecim.
Conservae Rosarum
quantum sufficit
ut fiant pilulae duodecim. (Sax.)

℞. Mercurii dulcis,
Extracti Aconiti,
singulorum drachmam unam.
Syrupi Sacchari quantum sufficit
ut fiant pilulae centum viginti. (*Au.*)

℞. Pulveris Mercurii dulcis,
— Micae Panis siccatae,
singulorum semidrachmam.
Aquae sufficientem quantitatem
ut fiant pilulae triginta, lycopodio conspergendae. (DD.)

℞. Mercurii dulcis,
Pulveris Althaeae,
singulorum partes aequales.
Syrupi simplicis quantum sufficit
ut fiant pilulae granorum duorum. (*Ra.*)

℞. Mercurii dulcis grana quindecim.
Succi Liquiritiae pulveratae
sesquidrachmam.
Aquae . . . . . quantum sufficit
ut fiat massa, in pilulas sexaginta dividenda. (WW.)

Die Gabe dieser Pillen ist je nach der bezweckten Wirkung, nach der Constitution und nach ihrer eignen Zusammensetzung verschieden; in den ersten ist ein halber, in den zweiten ein ganzer und in den letzten bloß ein Viertelgran merc. dulc. enthalten.

Pilulae antiictericae. (*Ca.*)

℞. Mercurii dulcis drachmam unam.
Extracti Saponariae
drachmas duas.

Misce ut fiat massa in pilulas sexaginta dividenda. — Zwei Stück täglich drei oder vier Mal.

Pilulae resolventes. (*B.*)

℞. Mercurii dulcis grana quatuor.
Extracti Taraxaci grana octodecim.

Fiant pilulae quatuor. — In vier und zwanzig Stunden bei Unterleibsverstopfungen zu nehmen.

Pilulae antisyphiliticae et resolventes. (*B.*)

℞. Mercurii dulcis grana quatuor.
Extracti Dulcamarae
quantum sufficit
ut fiant pilulae quatuor. — Den Tag über zu nehmen.

Bolus ex Sabina s. emmenagogus. (*Au.*)

℞. Mercurii dulcis . . grana duo.
Extracti Sabinae grana quatuor.
Syrupi Rhoeados
quantitatem sufficientem.

Fiat bolus unus. — Von Perfect

mit Nutzen bei Manie von Amenorrhoe angewendet.

Pilulae alterantes. (*Sa.*)

℞. Mercurii dulcis drachmam unam.
Electuarii Scordii drachmas duas.
Pulveris Liquiritiae
quantum sufficit
ut fiant pilulae septuaginta duae.

Pilulae purgantes. (Am. HassP. *C.*)

℞. Mercurii dulcis semidrachmam.
Saponis Alicantini
scrupulum unum.
Aquae sufficientem quantitatem
ut fiant pilulae quadraginta. (Am. *C.*)

Dieses Präparat muß wegen der Einwirkung der Seife auf das Queckſilber, welches dadurch zerſetzt wird, verworfen werden.

℞. Saponis jalappini . partes octo.
Mercurii dulcis . partem unam.
Tincturae Corticum Aurantiorum
sufficientem quantitatem.

Fiat massa in pilulas ponderis granorum dividenda. — Gabe, für einen Erwachſenen ſechs, zwölf bis achtzehen Stück. (HassP.)

Pilulae de Vigarous. (*Bo. Pie. Sm.*)

℞. Mercurii . . drachmas quatuor.
Sublimati corrosivi
drachmas duas.

Tritura, addendo Succi Citri guttas aliquot, donec metallum sit extinctum et adde deinde
Amyli Tritici . uncias quinque.
Fiat cum Succo Citri massa in pilulas duorum granorum dividenda.

Ein ſchlechtes Präparat, wegen der unſichern Einwirkung des Sublimats und des Calomels auf einander und wegen der Gefahr, den erſtern unzerſetzt zu geben. Vigarous gab anfangs täglich eine Pille und ſtieg allmälig bis zu drei Morgens und Abends.

Boli in pertussi. (*R.*)

℞. Mercurii dulcis grana quatuor.
Extracti Belladonnae grana duo.
Terebinthinae . . . grana sex.
Mellis despumati,
Pulveris Liquiritiae,
singulorum quantum sufficit
ut fiant boli octo. — Gabe, alle zwei Stunden ein Stück für ein Kind von acht bis zehen Jahren.

Pilulae antivenereae. (*Pie.*)

℞. Mercurii,
Sublimati corrosivi,
singulorum semunciam.
Radicis Pyrethri,
Sennae pulveratae,
Agarici albi,
singulorum unciam unam.
Mellis Narbonnensis
quantum sufficit
ut fiant pilulae granorum sex. — Von ihnen gilt daſſelbe, was von den vorhergehenden geſagt wurde.

Rotulae vermifugae. (*Sp.*)

℞. Mercurii dulcis . uncias duas.
Sacchari cum Succo Berberidis ad
aptam consistentiam decocti
uncias quatuor.
Micce ut fiant rotulae.

Trochisci vermifugi Barthezii. (*Bo. Ca. Pie.*)

℞. Mercurii dulcis drachmas duas.
Sacchari albi . . libram unam.
Mucilaginis Gummi Arabici
sufficientem quantitatem
ut fiant trochisci magnitudine monetae francdictae. — Man giebt davon Kindern ein oder zwei, Erwachſenen ſechs oder acht Stück.

Trochisci anthelmintici doctoris Ching. (*Au.*)

℞. Mercurii dulcis drachmas duas.
Sacchari albi . drachmas decem.
Essentiae Croci . guttas viginti.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae
quantum sufficit.
Fiant trochisci centum viginti. — Gabe, zwei oder drei Stück.

Drageae vermifugae. (*Pie.*)

℞. Mercurii dulcis . . semunciam.
Sacchari . . . unciam unam.
Amyli . . . . . semunciam.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae,
Essentiae Bergamottae, singulorum sufficientem quantitatem.
Fiant pilulae centum quadraginta quatuor ovoideae. — Morgens und Abends ein Stück.

§. II. Präparate, in denen die Wirkung des Calomels mehr oder weniger durch fremde Subſtanzen modificirt iſt, nämlich:

A. Durch Aloë.

Opiatum purgans s. purgativum. (*Pie.*)

℞. Mercurii dulcis,
Extracti Aloës,
singulorum semiscrupulum.
Kali subcarbonici . grana duo.
Syrupi Fumariae
sufficientem quantitatem.

Dieses Präparat iſt zu verwerfen, weil das Salz einen Theil des Queckſilbers zerſetzt.

Pilulae anthelminticae. (Ful. Ham. *Au.*)

℞. Mercurii dulcis,
Extracti Aloës gummosi,
singulorum scrupulum unum.
— Juglandis,
Asae foetidae,
singulorum scrupulos quatuor.
Essentiae Tanaceti quantum sufficit ut fiat massa pilularis. (Ful. Ham.)

℞. Mercurii dulcis,
Aloës Socotrinae,
Resinae Jalapae,
singulorum drachmam unam.
Tincturae Rhei quantum sufficit ut fiant pilulae granorum duorum. (*Au.*)

Wurmtreibend, krampfstillend, schmelzend und lavirend. — Gabe, sechs bis zwanzig Gran.

Pilulae anthelminticae purgantes (Ful.)

℞. Mercurii dulcis . . grana tria.
Extracti Aloës gummosi,
— Rhei,
— Tanaceti,
singulorum grana sex.
Tincturae Tanaceti
sufficientem quantitatem.

Auf einmal zu nehmen, für einen Erwachsenen.

Boli drastici. (*Bo. Pie.*)

℞. Mercurii dulcis grana quindecim.
Aloës Socotrinae,
Scammonei Aleppensis,
singulorum grana sex.
Rhei pulveratae grana quindecim.
Pulpae Cassiae
sufficientem quantitatem.

Bei rheumatischen Affectionen und Hüftweh empfohlen, wegen der heilsamen Ableitung, welche sie bisweilen bewirken, indem sie Stuhlausleerungen und Hämorrhoidalfluß hervorrufen.

Pilulae ad variolam s. prophylacticae ad variolam. (*Pie. Sp.*)

℞. Mercurii dulcis,
Extracti Aloës,
singulorum grana duodecim.
Camphorae . . . . grana octo.
Resinae Guajaci grana sedecim.
Fiat massa in pilulas granorum duorum dividenda.

Rosenstein empfiehlt sie als Schutzmittel vor Blattern und als Vorbereitungsmittel zu der Inoculation derselben — Die Gabe ist nach dem Alter des Subjects verschieden.

B. Durch Spießglanzpräparate.

Pulvis alterans Plummeri s. Edinburgensis s. mercurialis antimoniatus s. ex Hydrargyro muriatico mitt cum Sulphure Stibii aurantiaco s. Hydrargyri stibiatus. (B*. Ba. BorC. Br. D. DD. Fer. Ful. GalM. Ham. Han. HassP. Li. R. Wir. *Au. Ca Huf. Ra Sp. T.*)

℞. Mercurii dulcis porphyrisati,
Sulphuris aurati Antimonii,
singulorum partes aequales.
Diu tritura ad obtinendum pulverem subtilissimum. (Ba. Br. D. Fer. Ham. Han. HassP. Li. R. Wir. *Ca. Sp. T.*)

℞. Mercurii dulcis . partem unam.
Sulphuris aurati Antimonii
partes duas.
Misce triturando. (Ful.)

℞. Mercurii dulcis,
Sulphuris aurati Antimonii,
singulorum partem unam.
Sacchari albi . . partes novem.
Tritura simul. (*Ra.*)

Huf. Mercurii dulcis semiscrupulum, Sulphuris aurati tantidem et Sacchari drachmas tres.

℞. Mercurii dulcis,
Sulphuris aurati Antimonii,
singulorum partem unam.
Gummi Arabici . partes decem.
Misce bene terendo. (GalM.)

℞. Mercurii dulcis,
Sulphuris aurati Antimonii,
singulorum partem unam.
Sacchari albi,
Amyli, singulorum partes decem.
Terendo misce intime. (DD.)

℞. Mercurii dulcis,
Sulphuris Antimonii aurati,
singulorum partem unam.
Gummi Arabici partes quinque.
Sacchari albi . . partes octo.
Fiat pulvis subtilissimus. (B*.)

Au. Mercurii dulcis, Sulphuris aurati, singulorum partem unam, Gummi quinque et decem Sacchari.

Obgleich dieses reizende Präparat als schmelzendes, alterirendes und reinigendes Mittel bei Scropheln und venerischen, besonders Hautkrankheiten sehr in Ansehen gestanden, so darf man sich doch nicht sehr darauf verlassen. Die Einwirkung seiner beiden Bestandtheile auf einander macht dasselbe, so wie alle Präparate, zu denen es kommt, zu einem sehr unsichern Mittel. — Gabe, sechs, acht und zehen Gran von gleichen Theilen des Gemisches ohne fremde Substanzen.

Pilulae Plummeri s. alterantes Plummeri simplices s. ex Stibio et Hydrargyro s. ex Hydrargyro muriatico mitt cum Sulphure stibiato aurantiaco s. antiherpeticae s. ex Protochlorureto Mercurii cum Sulphure aurato Antimonii.

(B*. Ful. Gen. Ham. Lus. RC. WW. *Au. Ca. Ra. Sp. Sw.*)

℞. Mercurii dulcis,
Sulphuris aurati Antimonii,
singulorum partes aequales.
Extracti Liquiritiae
quantum sufficit

ut fiat massa in pilulas granorum trium dividenda. (*Sw.*)

Ca. Mercurii dulcis uncias tres, Sulphuris aurati tantidem, Succi Liquiritiae depurati drachmas duas et Mucilaginis Gummi Arabici quantum sufficit ut fiat massa in pilulas granorum sex dividenda; — *Au.* Mercurii dulcis grana quindecim, Sulphuris aurati tantidem et Succi Liquiritiae drachmam unam ut fiant pilulae granorum duorum; — B*. Mercurii dulcis, Sulphuris aurati, singulorum drachmas duas, Extracti Liquiritiae scrupulos quatuor et Mucilaginis Gummi Arabici sufficientem quantitatem; — Ham. Sulphuris aurati semidrachmam, Mercurii dulcis grana quindecim, Extracti Erysimi drachmam unam et Pulveris Liquiritiae quantum satis ut fiat massa in pilulas quadraginta quinque dividenda; — *Sp.* Mercurii dulcis, Sulphuris aurati, singulorum drachmas sex, Extracti Gentianae drachmas quatuor; — RC. Mercurii dulcis, Sulphuris aurati, singulorum partes tres, Extracti Gentianae vel amari, Saponis oleosi, singulorum partem unam et si opus, Syrupi simplicis quantum satis ut fiat massa; — Lus. Mercurii dulcis, Sulphuris aurati, singulorum drachmas sex et Extracti Liquiritiae quatuor; — WW. Mercurii dulcis, Sulphuris aurati, singulorum grana quindecim et Extracti Conii maculati sesquidrachmam ut fiant pilulae sexaginta; — *Ra.* Mercurii dulcis, Sulphuris aurati, singulorum semidrachmam, Extracti Cicutae semunciam et Pulveris Cicutae quantum sufficit ut fiat massa in pilulas triginta sex dividenda; — Gen. Mercurii dulcis, Sulphuris aurati, singulorum scrupulum unum, Roob Sambuci sufficientem quantitatem ut fiant pilulae viginti quatuor.

℞. Mercurii dulcis grana quindecim.
Sulphuris aurati Antimonii
semidrachmam.
Extracti Cicutae drachmas duas.
Balsami Copaivae quantum sufficit

ut fiat massa pilularis. (Ful.)

Pilulae diaphoreticae (*Sm.*): Mercurii dulcis, Kermetis mineralis, singulorum scrupulos duos, Syrupi Capilli Veneris quantum sufficit ut fiat massa in pilulas sexaginta dividenda.

Pilulae resolventes Finkii. (*Sm.*)

℞. Pulveris Plummeri
grana duodecim.
Extracti Taraxaci . . grana tria.
Gummi Ammoniaci . grana duo.
Scillae pulveratae semidrachmam.

Misce ut fiant pilulae trium granorum. — Fünf Stück täglich drei oder vier Mal, und Eichorienthee nachzutrinken. — Besonders nach Wechselfiebern und Anschoppungen in den Eingeweiden des Unterleibs mit Oedem der Füße.

Pulvis alterans s. Plummeri compositus. (Hass. Wür. *Pid.*)

℞. Mercurii dulcis drachmas duas.
Sulphuris aurati Antimonii
drachmam unam.
Resinae Guajaci sesquidrachmam.

Fiat pulvis. (Hass. *Pid.*)

Wür. Trium harum substantiarum partes aequales et resinam cum aequali Sacchari quantitate triturare.

Pulvis basilicus. (*Sa.*)

℞. Mercurii dulcis,
Antimonii diaphoretici abluti,
Scammonei Aleppensis,
Cremoris Tartari,
singulorum grana quinque.

Misce exacte.

Pilulae Plummeri s. Submuriatis Hydrargyri compositae s. resolventes cum Mercurio s. depurantes. (Am. B*. BorC. Hass. Lon. LonN. R. Sar. Wir. Wür. *Au. Pid. Sp. Sw. Vm.*)

℞. Pulveris alterantis simplicis
semunciam.
Resinae Guajaci drachmas quatuor.
Balsami Copaivae quantum sufficit

ut fiat massa, e cujus drachma quaque pilulae duodecim formantur. (Wir.)

℞. Balsami Copaivae partem unam.
Resinae Guajaci partes duodecim.

Contere, addendo sensim

Mercurii dulcis,
Sulphuris aurati Antimonii,
singulorum partes sex.
Alcoholis . . quantum sufficit

ut fiat massa pilularis. (*Vm.*)

℞. Mercurii dulcis,
Sulphuris aurati Antimonii,
singulorum grana quinque.
Succi Liquiritiae drachmam unam.

Fiant pilulae granorum duorum. (*Au.*)

℞. Mercurii dulcis . . grana duo.
Sulphuris aurati Antimonii
drachmam unam.
Resinae Guajaci,
Extracti Gentianae,
singulorum sesquidrachmam.

Commisce bene. (R.)

℞. Mercurii dulcis,
Sulphuris aurati Antimonii,
Resinae Guajaci,
singulorum drachmas duas.
Myrrhae . drachmam unam.
Balsami Tolutani
quantitatem sufficientem.
Fiant pilulae quinque granorum. (*Sw.*)

℞. Mercurii dulcis,
Sulphuris aurati Antimonii,
singulorum partem unam.
Resinae Guajaci . . partes duas.
Trituratis simul adde
Mucilaginis Gummi Arabici
sufficientem quantitatem.
Fiat massa pilularis. (Am. Ed. Lon. C.)

Lond. loco mucilaginis Spiritus rectificati partis quadrantem addit.

℞. Mercurii dulcis,
Sulphuris aurati Antimonii,
singulorum drachmas sex.
Trituratis simul adde
Resinae Guajaci,
Extracti Liquiritiae,
singulorum drachmas tres.
Mucilaginis Gummi Arabici
quantum sufficit
ut fiat massa pilularis. (Wür.)

℞. Mercurii dulcis,
Sulphuris aurati Antimonii,
singulorum scrupulos duos.
Extracti Dulcamarae,
Saponis guajacini,
singulorum semunciam.
Misce ut fiant pilulae granorum duorum. (Bor C.)

℞. Mercurii dulcis,
Sulphuris aurati Antimonii,
Resinae Guajaci,
singulorum partes aequales.
Extracti Fumariae,
Balsami Copaivae,
singulorum quantum sufficit.
Fiant pilulae quatuor granorum. (*Au.*)

℞. Mercurii dulcis drachmas duas.
Sulphuris aurati Antimonii
drachmam unam.
Resinae Guajaci sesquidrachmam.
Alcoholis quantitatem sufficientem.
Fiant pilulae granorum duorum. — Gabe, ein bis vier Stück. (*Au.*)

℞. Saponis guajacini,
Extracti Dulcamarae,
singulorum semunciam.
Mercurii dulcis,
Sulphuris aurati Antimonii,
singulorum scrupulos duos.
Fiant pilulae granorum duorum — Gabe, sieben bis funfzehen Stück, Morgens und Abends. (*Au.*)

℞. Saponis guajacini sesquidrachmam.
Mercurii dulcis,
Sulphuris aurati Antimonii,
Radicis Polygalae Virginicae,
Camphorae,
singulorum grana quindecim.
Aceti scillitici
sufficientem quantitatem.
Fiant pilulae granorum duorum. — Gabe, wie bei den vorhergehenden. (*Au.*)

Pilulae anthelminticae. (*Au.*)

℞. Mercurii dulcis,
Sulphuris aurati Antimonii,
Extracti Rhei compositi,
Asae foetidae,
singulorum drachmam unam.
Fiant pilulae grani unius cum dimidio. — Gabe, Morgens vier Stück und täglich um zwei gestiegen.

Pilulae resolventes. (*Sw.*)

℞. Mercurii dulcis,
Sulphuris aurati Antimonii,
Ferri sulphurici,
Myrrhae,
singulorum drachmam unam.
Syrupi Sacchari
sufficientem quantitatem.
Fiant pilulae trium granorum. — Bei Anschoppungen in den Unterleibseingeweiden nach Wechselfiebern. — Gabe, Morgens und Abends vier Stück.

Pilulae resolventes. (*Sa.*)

℞. Mercurii dulcis sem drachmam.
Sulphuris aurati Antimonii,
Camphorae,
singulorum scrupulum unum.
Resinae Guajaci . . semunciam.
Extracti Pimpinellae albae,
— Cicutae,
singulorum drachmam unam.
Fiant pilulae granorum duorum.

Pilulae antiherpeticae. (*Bo.*)

℞. Mercurii dulcis . grana decem.
Sulphuris aurati Antimonii
grana quinque.
Aethiopis mineralis grana sexaginta.
Extracti Scabiosae grana triginta.
Syrupi Fumariae quantum sufficit ut fiant pilulae quatuor granorum. — Gabe, Morgens nüchtern drei Stück und bis auf sechs Stück täglich auf zwei Mal gestiegen.

Pilulae antivenereae Kaempfii. (*Sm.*)

℞. Mercurii dulcis,
Sulphuris aurati Antimonii,
singulorum scrupulos duos.
Trituratis diu adde deinde
Extracti Saponariae,
Resinae Guajaci,
singulorum scrupulos quatuor.
Camphorae . . semidrachmam.

Commisce cum
Theriacae sufficiente quantitate ut fiat massa in pilulas granorum duorum dividenda. — Gabe, sechs Stück, täglich drei Mal, mit einer starken Abkochung von China-, Kletten- oder Sassaparillwurzel, und allmälig bis auf zehen oder zwölf Gran gestiegen.

Pulvis Hydrargyri stibiatus cum Hyoscyamo s. antispasmodicus. (*Au.*)

℞. Mercurii dulcis,
Extracti Hyoscyami,
singulorum granum unum.
Sulphuris aurati Antimonii
grana tria.
Sacchari . . . semidrachmam.

Morgens und Abends bei entzündlichen, asthenischen und Krampfkrankheiten. — Besonderen Nutzen gewährt es bei Nyctalopie.

Pilulae sthenicae. (*Ca.*)

℞. Mercurii dulcis,
Sulphuris aurati Antimonii,
Opii puri,
singulorum grana decem.
Kermetis mineralis
grana quindecim.
Balsami Peruviani quantum sufficit.

Fiant pilulae grani unius. — Bei Lungenschwindsucht, Wassersuchten und Krämpfen empfohlen. — Gabe, Morgens und Abends ein Stück.

Pilulae Antimonii compositae. (*Br.*)

℞. Mercurii dulcis,
Sulphureti Antimonii abluti,
singulorum drachmas tres.
Extracti Gentianae,
Saponis duri,
singulorum drachmam unam.

Trituratis mercurio et sulphureto adde extractum ut fiat cum sapone mollefacto massa. — Ein schlechtes Präparat.

Pilulae antisyphiliticae. (*Sm.*)

℞. Mercurii dulcis,
Kermetis mineralis,
singulorum drachmas duas.
Resinae Guajaci drachmas quatuor.
Balsami Peruviani quantum sufficit

ut fiat massa cujus drachma quaeque in pilulas duodecim dividatur. — Besonders bei chronischen vermuthlich syphilitischen Hautkrankheiten gepriesen. — Gabe, drei Stück täglich auf drei Mal und allmälig bis auf sechs in vier und zwanzig Stunden gestiegen.

Pilulae resolventes. (*B.*)

℞. Mercurii dulcis . . grana sex.
Kermetis mineralis
grana duodecim.
Roob Sambuci
sufficientem quantitatem.

Fiant pilulae sex. — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden, gegen das Ende von Lungenentzündungen und bei symptomatischem Husten von Würmern bei Kindern.

Pilulae suecicae. (*Ra.*)

℞. Mercurii dulcis sesquidrachmam.
Kermetis mineralis,
Aethiopis mineralis,
singulorum drachmam unam.
Micae Panis . quantum sufficit

ut fiant pilulae centum quadraginta quatuor. — Gegen Syphilis.

Pulvis e Mercurio s. mercurialis. (Gen.)

℞. Mercurii dulcis . . uncias duas.
Pulveris laxantis (e Tartari, Tartari emetici, singulorum drachma una et Sacchari drachmis viginti duabus) . unciam unam.
Magnesiae subcarbonicae
uncias quinque.

Misce.

Tabellae de Mercurio s. mercuriales. (Gen.)

℞. Mercurii dulcis porphyrisati
drachmam unam.
Pulveris laxantis (formula antea dicta) . . . scrupulos duos.
Gummi Arabici drachmas duas.
Sacchari albi . . drachmas tres.
Aquae Florum Aurantiorum
quantum sufficit

ut fiant tabellae septuaginta duae, Oleo Bergamottae aromatizandae. — Jede enthält einen Gran mercurius dulcis.

Pulvis diaphoreticus. (*E.*)

℞. Mercurii dulcis,
Sulphuris aurati Antimonii,
singulorum grana sex.
Resinae Guajaci drachmam unam.

Fiant doses sex. — Gabe, Morgens und Abends bei Hautkrankheiten.

Boli resolventes et incitantes. (*B.*)

℞. Mercurii dulcis grana sedecim.
Kermetis mineralis . grana octo.
Camphorae . . grana triginta.
Roob Sambuci quantum sufficit.

Fiant boli sex. — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden, bei Entzündungen der Eingeweide mit Neigung zu Asthenie.

Pilulae antimoniales compositae s. Mercurii dulcis et Opii compositae. (*Am. C. Sy.*)

℞. Mercurii dulcis semidrachmam.
Opii . . . . grana quindecim.
Tartari stibiati . grana quatuor.
Conservae Cynorrhodi
sufficientem quantitatem

ut fiat massa in pilulas quindecim dividenda. (*Sy.*)

Am. et E. Mercurii dulcis drachmas duas, Opii drachmam unam, Tartari stibiati scrupulum unum et Syrupi Sacchari quantum sufficit ut fiant pilulae sexaginta.

Pilulae Muriatis Hydrargyri oxydulati stibiatae. (RC.)

℞. Tartari emetici grana quindecim.
Mercurii dulcis,
Camphorae cum aliquot guttis Alcoholis in pulverem redactae,
singulorum drachmam unam.
Opii . . . . . semidrachmam.
Mucilaginis Gummi Arabici
quantum satis
ut fiat massa in pilulas sexaginta aequales dividenda. — Rheumatiſche Schmerzen und ſyphilitiſche Knochenſchmerzen. — Gabe, zwei Stück täglich zwei Mal.

Pilulae hydragogae. (*Sw.*)

℞. Mercurii dulcis,
Pulveris Jamesii,
Scammonei,
singulorum grana quinque.
Fiant pilulae tres. — Auf eine Gabe.

Pilulae expectorantes. (*E.*)

℞. Mercurii dulcis
grana viginti quatuor.
Scillae . . . . semidrachmam.
Tartari stibiati . . . grana sex.
Opii . . . . grana octodecim.
Fiant pilulae viginti quatuor. — Gabe, alle Abende ein Stück, bei catarrhaliſchen Affectionen.

Pilulae hydragogae Janini. (*Ca. Hu.*)

℞. Aquae communis . . libras sex.
Jalapae,
Aloës Socotrinae,
Sennae, singularum libram unam
Ferri subcarbonici,
Nitri, singulorum uncias octo cum dimidia.
Agarici,
Mechoacannae,
Rhei,
Scammonei,
Radicis Ericae,
Hermodactylorum, singulorum uncias sex et drachmas duas.
Aethiopis mineralis uncias quinque.
Cremoris Tartari uncias duas et sesquidrachmam.
Turpethi gummosi,
Gummi Guttae,
Trochiscorum Alhandal,
Mercurii dulcis,
Tartari stibiati,
singulorum uncias duas.

Coque sennam et cremorem in aqua per horae quadrantem, cola fortiter exprimendo et liquori in olla ferrea calefacto adde substantias reliquas porphyrisatas et mixtas, agitando continuè, leni igne ut obtineatur massa in pilulas quatuor granorum dividenda, quae in pulvere Jalapae volutae siccentur.

Stark purgirend. — Gabe, nach den Umſtänden, anfangs vier Pillen und bis zum bezweckten Erfolg geſtiegen.

C. Durch Stinkſand.

Pulvis Gratiolae cum Hydrargyro s. vermifugus. (*Au.*)

℞. Herbae Gratiolae scrupulos duos.
Mercurii dulcis . grana quinque.
Asae foetidae . semidrachmam.
Olei Menthae piperitae guttas tres.
Divide in doses sex. — Gabe, ein Stück alle drei Stunden. — Von Hargens gegen Bandwurm geprieſen.

Pilulae anthelminticae. (*Au. Sp. Sw*. Vm.*)

℞. Mercurii dulcis . partem unam.
Asae foetidae . . . partes tres.
Ferri sulphurici . . partes duas.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.
Fiant pilulae. (*Vm.*)

*Sw**. loco syrupi Acetum scilliticum addere et pilulas granorum quatuor parare jubet.

℞. Mercurii dulcis,
Asae foetidae,
Rhei,
Sagapeni,
singulorum drachmam unam.
Tincturae Gentianae
sufficientem quantitatem
ut fiant pilulae grani unius. (*Sp.*)

Gegen Aſcariden und Bandwurm empfohlen. — Gabe, von den erſtern zwei, ſelten drei, zwei Mal täglich.

℞. Extracti Rhei,
— Juglandis,
Asae foetidae,
Mercurii dulcis,
singulorum semidrachmam.
Fiant pilulae grani unius. — Gabe, ein bis vier Stück täglich. (*Au.*)

Boli anthelmintici et antispasmodici. (*B.*)

℞. Mercurii dulcis . . . grana sex.
Asae foetidae . scrupulum unum.
Extracti Valerianae
scrupulos duos.
Fiant boli octo. — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden in Wurmkrankheiten mit Epilepſie, Veitstanz und Krampfkolik.

Pilulae resolventes. (*Sa.*)

℞. Asae foetidae . drachmam unam.

Pulveris Glandium Quercûs,
Aethiopis mineralis, singulorum
granum dimidium.
Mercurii dulcis . grana quinque.
Syrupi Papaveris,
Pulveris Liquiritiae,
singulorum quantum sufficit.
Fiant pilulae granorum duorum.

Pilulae emmenagogae. (*Pie.*)

℞. Extracti Taraxaci,
— Saponariae,
singulorum drachmam unam.
Boracis electi,
Asae foetidae,
singulorum semidrachmam.
Aethiopis mineralis,
Mercurii dulcis,
singulorum grana viginti.
Syrupi Hederae terrestris
sufficientem quantitatem.

D. Durch Copaivabalsam.

Pilulae ad gonorrhoeam. (*Ca. Pie. Ra.*)

℞. Mercurii dulcis drachmam unam.
Conservae Rosarum rubrarum
uncias quatuor.
Sanguinis Draconis . semunciam.
Balsami Copaivae unciam unam.
Fiant pilulae granorum sex. — Bei veralteten Gonorrhöen von Atonie gerühmt. — Gabe, ein, dann zwei und drei Stück, Morgens und Abends, mit eisenhaltigem Wasser zum Getränk.

E. Durch Katechu.

Pilulae adstringentes. (*Sm.*)

℞. Mercurii dulcis scrupulum unum.
Catechu,
Balsami Copaivae,
singulorum drachmas quinque.
Syrupi Consolidae majoris
quantum sufficit
ut fiant pilulae centum quinquaginta. Gabe, vier Stück täglich drei Mal. — Bei verhärtigem weißen Fluß und sogenannten atonischen Blennorrhöen gepriesen.

℞. Mercurii dulcis . . grana octo.
Catechu . . scrupulum unum.
Oculorum Cancrorum
scrupulos duos.
Balsami Copaivae semiscrupulum.
Syrupi Chinae vel Consolidae majoris . . . . quantum sufficit
ut fiant pilulae granorum quatuor. — Von Morand bei Schleimflüssen von Atonie angewendet. — Gabe, ein Stück täglich drei Mal und allmälig bis auf sechs in vier und zwanzig Stunden gestiegen.

℞. Mercurii dulcis scrupulum unum.
Catechu . . . drachmas duas.
Gummi Arabici scrupulos quatuor.
Terebinthinae coctae
quantum sufficit
ut fiant pilulae centum quinquaginta. — Quarin, dessen Formel Sainte-Marie etwas verändert hat, verordnete diese Pillen bei weißem Fluß und Tripper, zu vier Stück täglich drei Mal.

F. Durch Kampher.

Pulvis Hydrargyri cum Camphora s. excitans. (*Au.*)

℞. Mercurii dulcis
grana viginti quatuor.
Camphorae,
Concharum praeparatarum,
singularum scrupulos duos.
Divide in partes octo. — Gabe, täglich drei bis vier, bei Wassersuchten, um die Functionen des absorbirenden Systems zu bethätigen.

Pilulae muriatis Hydrargyri camphoratae s. Muriatis Hydrargyri oxydulati et Camphorae s. Mercurii dulcis et Camphorae s. mercuriales camphoratae. (RC. *Ca. Ra. Vm.*)

℞. Mercurii dulcis granum unum.
Camphorae . . . . grana duo.
Syrupi Sacchari quantum sufficit
ut fiat cum pulvere Liquiritiae pilula. (*Ca.*)

℞. Mercurii dulcis . . grana sex.
Camphorae grana viginti quatuor.
Mucilaginis Gummi Arabici
quantum satis
ut fiat massa in pilulas duodecim aequales dividenda. — Gabe, zwei Stück.
Addi possunt pro rei necessitate: Opii grana duodecim aut Extracti aconiti tantidem aut Extracti Conii grana octodecim aut Extracti Hyoscyami tantidem; — dann giebt man zwei oder drei Stück. (RC.)

℞. Mercurii dulcis drachmas duas.
Camphorae cum guttis quinque Alcoholis triturata
drachmam unam.
Sacchari albi pulverati
drachmas tres.
Mucilaginis Gummi Arabici
quantum sufficit
ut fiant pilulae ducentae quadraginta. (*Ra.*)

℞. Mercurii dulcis . partes octo.
Camphorae cum Alcohole pulveratae . . . . partes quatuor.
Sacchari albi . partes duodecim.
Gummi Tragacanthae
partem unam.
Aquae . . . quantum sufficit.
Fiant pilulae. (*Vm.*)

G. Durch Zimmt.

Boli purgantes et tonici. (*Bo. Pie.*)

℞. Mercurii dulcis,

Cinnamomi,
singulorum grana decem.
Hermodactylorum
drachmam unam.
Syrupi Florum Persicae
quantum sufficit
ut fiant boli decem.

H. Durch Coloquinten.

Pilulae trium diabulorum. (*Ca.*)

℞. Mercurii dulcis . . grana octo.
Trochiscorum Alhandal,
Scammonei Aleppensis,
singulorum grana quatuor.
Syrupi Stoechatis quantum sufficit
ut fiant pilulae quatuor. — Bei Harnröhrenentzündung, zur Linderung und Verminderung der Entzündung gerühmt.

Pilulae mercuriales. (Br. *Sa.*)

℞. Mercurii dulcis . . semunciam.
Extracti panchymagogi
sesquiunciam.
Misce ut fiant pilulae. (Br.)

℞. Mercurii dulcis . . semunciam.
Massae Pilularum Colocynthidis
cum Aloë . . unciam unam.
Syrupi Rhamni
sufficientem quantitatem.
Fiat massa pilularis. (*Sa.*)

I. Durch Spießglanzmohr.

Boli purgantes. (*Pie.*)

℞. Mercurii dulcis grana quindecim.
Aethiopis mineralis grana decem.
Pulpae Cassiae recentis
quantum sufficit.
Morgens nüchtern zu nehmen.

Pilulae antisyphiliticae. (*Sm.*)

℞. Mercurii dulcis,
Aethiopis mineralis,
singulorum drachmam unam.
Farinae Lini in solutione Gummi
Arabici dilutae quantum sufficit
ut fiant pilulae triginta sex. — Im zweiten Stadium der Harnröhrenentzündung. — Gabe, täglich zwei Stück, Morgens und Abends und alle fünf Tage ein Purgirmittel.

Pilulae lac repellentes. (*Bo.*)

℞. Mercurii dulcis semidrachmam.
Aethiopis mineralis
drachmam unam.
Kali sulphurici . . semunciam.
— nitrici . drachmam unam.
Camphorae . . semidrachmam.
Resinae Jalapae scrupulum unum.
Gummi Arabici drachmam unam.
Syrupi Quinque Radicum
quantum sufficit
ut fiant pilulae quatuor granorum. — Morgens und Abends zwei Stück, mehrere Stunden vor und nach der Mahlzeit.

Opiatum antisyphiliticum. (*Pie.*)

℞. Mercurii dulcis
uncias duas cum dimidia.
Aethiopis mineralis uncias duas.
Saponis Veneti . . uncias octo.
Gummi Tragacanthae
quantum sufficit.
Fiat massa homogenea, cui adde
Extracti Boraginis,
— Bugulae,
singulorum uncias tres.
Camphorae . . semidrachmam.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.
Misce sedulo. — Bei venerischen Krankheiten mit Scrophelcomplication. — Eine halbe bis eine Drachme in Pillen oder in einer passenden Flüssigkeit.

J. Durch Eisen.

Murias Hydrargyri ferratus, Mercurius dulcis martiatus, Hydrochloras Mercurii ferratus, Calomelas ferruginosus. (*Ca. Sw.*)

℞. Mercurii dulcis . . partes sex.
Oxydi Ferri nigri partem unam.
Triturata sublima. (*Sw.*)

℞. Mercurii dulcis . . partes tres.
Hydrochloratis Ferri ammoniacalis . . . . . partem unam.
Misce bene triturando. (*Ca. Sw.*)
Von Hartmann in scrophulösen Krankheiten, Lymphgeschwülsten und Wurmbeschwerden empfohlen. — Gabe, zwanzig bis dreißig Gran.

Opiatum purgans et tonicum. (*Pie.*)

℞. Mercurii dulcis,
Pulveris Asellorum,
singulorum drachmas duas.
— Croci Martis aperitivi,
— Chinae,
singulorum semunciam.
Extracti Juniperi
sufficientem quantitatem.
Misce sedulo.

K. Durch Guajacharz.

Pulvis errhinus s. sternutatorius. (*Au.*)

℞. Mercurii dulcis . grana decem.
Camphorae,
Resinae Guajaci,
singularum grana quinque.
Sacchari crystallisati (Candis)
semidrachmam.
Chinae . . . scrupulum unum.
Divide in partes viginti.

℞. Mercurii dulcis scrupulum unum.
Camphorae,
Resinae Guajaci,
singulorum grana decem.

Sacchari crystallisati
scrupulos duos.
Chinae . . . scrupulum unum.
Olei Caryophyllorum guttas duas.
Divide in partes viginti.

℞. Mercurii dulcis scrupulos duos.
Camphorae,
Resinae Guaiaci,
singularum grana decem.
Sacchari crystallisati scrupulos duos.
Chinae,
Radicis Hellebori albi,
singularum grana decem.
Olei Cajeput . . guttas quinque.
Divide in partes viginti. — Alle drei Pulver werden von Kleber bei Amaurose gepriesen.

℞. Mercurii dulcis granum unum.
Sacchari . . . . grana decem.
Tincturae Guajaci ammoniatae
guttam unam.
Misce sedulo.

Pilulae Mercurii dulcis et Guajaci. (BorC.)

℞. Mercurii dulcis scrupulum unum.
Pulveris Succi Liquiritiae,
— Resinae Guajaci, singulorum scrupulos quatuor.
Fiant pilulae octoginta.

Pilulae antiherpeticae. (*Pie.*)

℞. Mercurii dulcis drachmam unam.
Resinae Guajaci drachmas duas.
Syrupi Nymphaeae
quantum sufficit.
Fiant pilulae septuaginta duae. — Morgens und Abends zwei Stück mit einem starken Hopfenaufguß.

Pilulae antisyphiliticae. (*Ca.*)

℞. Mercurii dulcis,
Resinae Guajaci,
singulorum drachmas duas,
Pulveris Radicis Althaeae
uncias quatuor.
Syrupi Cydoniorum
quantum sufficit
ut fiant pilulae granorum quatuor. — Alibert verordnet fünf bis sechs Stück täglich.

Pilulae antirheumaticae. (*Pie.*)

℞. Mercurii dulcis . granum unum.
Pulveris Resinae Guajaci,
— Florum Arnicae,
singulorum grana quatuor.
Fiant pilulae duae. — Von Vigaroux gepriesen; er giebt sie auf einmal.

Pilulae antiarthriticae. (*Pie. Sa.*)

℞. Mercurii dulcis,
Resinae Guajaci,
singulorum drachmam unam.
Saponis medicinalis semunciam.
Extracti Fellis Tauri
drachmas duas.
Ligni Guajaci pulverati
quantum sufficit
ut fiant pilulae granorum quatuor. — Ein Präparat, welches wegen der darin stattfindenden Zersetzung des salzsauern Queckſilberoxyduls zu verwerfen ist. — Gabe, zwei bis vier Pillen auf zwei Mal den Tag über.

Pilulae antiherpeticae. (B.)

℞. Mercurii dulcis,
Extracti Rhois toxicodendri,
singulorum drachmam unam.
Sulphureti Calcis,
Resinae Guajaci,
singulorum drachmas duas.
Tartari stibiati grana duodecim.
Extracti Opii gummosi
grana quindecim.
— Saponariae
quantum sufficit
ut fiant pilulae centum viginti. — Ein schlechtes Präparat wegen Zersetzung des Calomel.

Pilulae mercuriales. (Fer.)

℞. Mercurii dulcis,
Extracti Guajaci,
singulorum unciam unam.
Camphorae . . sesquidrachmam.
Balsami Copaivae quantum sufficit ut fiat massa pilularis. — Gabe, zwölf Gran bis eine halbe Drachme

L. Durch Ammoniakgummi.

Pilulae resolventes. (*Pie.*)

℞. Mercurii dulcis drachmam unam.
Gummi Ammoniaci in Aceti scillitici sufficiente quantitate soluti
semunciam.
Rhei . . . . drachmas duas.
Saponis albi,
Extracti Saponariae,
singulorum unciam unam.
Conservae Inulae,
Syrupi Quinque Radicum,
singulorum quantum sufficit
ut fiant pilulae granorum quatuor. — Aus der früher genannten Ursache zu verwerfen.

M. Durch Gummigutt.

Pulvis vermifugus. (His.)

℞. Mercurii dulcis . grana quinque.
Gummi Guttae
grana sex ad decem.
Gabe, für einen Erwachsenen, Morgens in Syrup zu nehmen.

N. Durch Ipecacuanha.

Pulvis Ipecacuanhae hydrargyratus s. mercurialis. (Suec.)

℞. Mercurii dulcis . partem unam.

Pulveris Radicis Ipecacuanhae partes quatuor.
Tritura simul.

Enema mercuriale s. mannatum. (*Au.*)

℞. Mannae . unciam unam ad duas.
Aquae . . . . . uncias sex.
Olei Ricini cum Vitello Ovi triti unciam unam ad duas.
Mercurii dulcis scrupulum unum.
Ipecacuanhae pulveratae semidrachmam ad drachmam unam.
Loco olei Infusum Jalapae adhiberi potest.

℞. Mercurii dulcis,
Ipecacuanhae pulveratae, singulorum scrupulum unum.
Olei Lini . . . unciam unam.
Infusi Chamomillae uncias octo.
Misce sedulo.

O. Durch Jalape.

Pulvis ad lumbricos s. purgans s. vermifugus s. Jalapae et Muriatis Hydrargyri oxydulati. (DD. RC. Suec. E. *Pie. Ra Sa. Sw. Sy. Vm.*)

℞. Radicis Jalappae . grana viginti.
Mercurii dulcis . grana decem.
Misce. (*Sw. Sy.*)

Suec. Jalapae partes tres et unam Mercurii dulcis; — DD. Jalapae partes sex et Mercurii dulcis unam; — His. Jalapae decem et quinque vel decem Mercurii dulcis; — RC. Jalapae scrupulum unum, Mercurii dulcis grana quinque.

℞. Mercurii dulcis . . grana duo.
Rhei . . . . . grana sex.
Jalapae . . . . grana triginta.
Misce. (*Ra.*)

℞. Mercurii dulcis . . grana octo
Jalapae . . . . grana triginta.
Scammonei . . grana septem.
Sacchari . . . . . semunciam.
Fiat pulvis. (*Pie.*) — In Hühnerbrühe zu nehmen.

Sa. Mercurii dulcis unciam unam, Resinae Jalapae drachmas duas, Scammonei sesquiunciam et Corallii tantidem.

℞. Jalapae . . . . . partes duas.
Rhei,
Santolinae, singularum partes sex.
Kali sulphurici . partem unam.
Mercurii dulcis partem dimidiam.
Misce. (*Vm.*)

℞. Mercurii dulcis,
Jalapae,
Rhei, singulorum grana quinque.
Olei essentialis Cinnamomi guttam unam.
Fiat pulvis. (*His.*)

Gabe, funfzehen oder zwanzig Gran, in Syrup.

Pulvis evacuans s. laxans puerorum. (B*. Br. *Sp.*)

℞. Mercurii dulcis . . semunciam.
Resinae Jalapae,
Amygdalarum dulcium excorticatarum, singularum drachmas duas.
Sacchari albi . . unciam unam.
Antimonii diaphoretici scrupulos duos.
Olei Citri . . . . guttas duas.
Fiat pulvis. (B*. Br.)

Sp. Mercurii dulcis unciam unam, Resinae Jalapae drachmas tres, Amygdalarum dulcium sesquidrachmam, Cinnabaris drachmam unam et Sacchari sesquiunciam.

Gabe, zehen bis zwanzig Gran und mehr.

Pilulae ex Hydrargyro catharticae s. purgantes cum Hydrargyro muriatico miti s. Mercurii dulcis et Jalapae simplices s. purgantes de Calomelle. (DD. *Sw.*)

℞. Mercurii dulcis grana quinque.
Pulveris Radicis Jalapae semidrachmam.
Mucilaginis Gummi Arabici sufficientem quantitatem.
Fiant pilulae quindecim. (DD.) — Auf zwei Mal.

℞. Mercurii dulcis drachmam unam.
Radicis Jalapae pulveratae drachmas duas.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.
Fiant pilulae granorum quatuor. (*Sw.*) — Sechs bis zehen Stück auf einmal.

Trochisci vermifugi. (GalH.)

℞. Mercurii dulcis,
Pulveris Radicis Jalapae, singulorum partes viginti quatuor.
Sacchari albi partes quingentas.
Gummi Tragacanthae partes octo.
Aquae Florum Aurantiorum sufficientem quantitatem.

Trochisci contra vermes s. hermetici s. vermifugi. (Br. *Sp. Sw*. Vm.*)

℞. Mercurii dulcis partes quatuor.
Resinae Jalapae . partem unam.
Sacchari albi . partes sedecim.
Misce exacte et cum Mucilaginis Gummi Arabici sufficiente quantitate fiant massae, in globulos formandae et pulvere Amyli conspergendae, quarum pondus pro quoque aetatis anno pro granis quinque augendum est; quaeque, modulorum ligneorum ope et deprimendo illas, annorum numerum cui pondus respondet indicans. (*Vm.*)

*Sw**. Triturare simul jubet Radicis Jalapae et Gummi Arabici, singulorum drachmas duas, mixturam cum Aquae semuncia diluere, emulsioni huic addere mixturam e Mercurii dulcis drachmis decem, Sacchari albi unciis quatuor et Gummi Tragacanthae sesquidrachma, triturare cum Aquae sufficiente quantitate et massam parare modo praemonito in trochiscos formandam.

℞. Mercurii dulcis drachmas quinque.
Pulveris Cinnamomi
grana quadraginta.
— Resinae Jalapae
grana septuaginta quinque.
Sacchari albi . . sesquiunciam.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae
quantum sufficit
ut fiant trochisci (cujus ponderis?). — Für Kinder, ſo viel Stück als ſie Jahre alt ſind, doch nicht über zehen. (*Sp.*)

℞. Mercurii dulcis,
Pulveris Radicis Jalapae,
singulorum scrupulos duos.
— Seminis Cinae
drachmas duas.
— Sacchari albi
uncias quatuor.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae
quantum sufficit.
Fiat massa, cujus quaeque drachma in decem trochiscos dividatur. (Br.)

Pilulae Hydrargyri jalappinae s. mercuriales s. purgantes s. ex Resina Jalapae s. laxantes s. Saponis compositae s. Mercurii dulcis et Jalapae saponaceae s. mercuriales saponaceae. (B. Bor. BorC. Br. Han. Hass. HassP. O. Pol. WW. *Huf. Ra.*)

℞. Mercurii dulcis,
Resinae Jalapae,
singulorum partem unam.
Saponis medicinalis partes duas.
Fiant pilulae granorum duorum. — Ein oder zwei Stück auf einmal. (Br. *Ra.*)

℞. Mercurii dulcis . unciam unam.
Resinae Jalapae,
Saponis Alicantini,
singulorum sesquiunciam.
Fiant pilulae granorum duorum. — Zwei oder vier Stück auf einmal. (BorC. WW.)

℞. Mercurii dulcis . sesquiunciam.
Resinae Jalapae,
Saponis Alicantini,
singulorum uncias sex.
Essentiae Aurantiorum
quantum sufficit
ut fiat massa pilularis. — Von ſechszehen bis zu dreißig Gran. (Hass.)

℞. Mercurii dulcis . partem unam.
Saponis jalappini partes quinque.
Misce. (O.)

B. Bor. Han. Pol. et *Huf.* Mercurii dulcis partem unam et tres Saponis jalappini; — HassP. ſ. S. 160 Pilulae purgantes.

Keine gute Zuſammenſetzung wegen der Zerſetzung des Queckſilberoxyduls, wie alle folgende, welche Seife enthalten.

Pilulae Jalapae compositae s. Mercurii dulcis et Jalapae saponaceae compositae. (Am. *C.*)

℞. Mercurii dulcis drachmas sex et
scrupulos duos.
Pulveris Jalapae,
— Rhei,
Saponis Alicantini,
singulorum unciam unam.
Tartari stibiati . grana octodecim.
Aquae . . . quantum sufficit
ut fiat massa pilularis.

Pilulae hydragogae. (*Sw.*)

℞. Mercurii dulcis,
Saponis jalapini,
Pulveris Gummi Guttae,
singulorum drachmas duas.
Fiant pilulae granorum quatuor. — Drei bis ſechs auf einmal.

Pilulae cathartico-diureticae. (RC.)

℞. Pulveris Scillae . . grana sex.
— Jalapae . grana decem.
Mercurii dulcis . grana quatuor.
Pulveris aromatici . grana sex.
Fiant cum Syrupo Zingiberis pilulae quatuor granorum, una vice, noctibus alternis propinandae et pulvis Supertartratis Potassae et Stalagmitidis cambogioidis quovis solutus idoneo liquido, mane insequenti exhibendus. — Opii granum unum subinde addi potest.

Pilulae catarrhales s. mercuriales s. purgantes s. laxantes cum Mercurio. (D. Pal. Wir. Sa. *Sp. Sy.*)

℞. Mercurii dulcis . . semunciam.
Resinae Jalapae drachmam unam.
Extracti panchymagogi
unciam unam.
Olei essentialis Aurantiorum
guttas triginta.
Fiat massa pilularis. (D. *Sp.*)

Sa. Mercurii dulcis grana duo, Resinae Jalappae tantidem et Extracti panchymagogi grana sex; — *Sy.* Mercurii dulcis grana quatuor, Resinae Jalapae tantidem et Pilularum Rufi semidrachmam.

℞. Mercurii dulcis,
Scammonei,
Resinae Jalapae,
Extracti panchymagogi,
— catholici,
singulorum drachmam unam.
Tincturae Sassafras quantum sufficit
ut fiant pilulae viginti quinque. —

Gabe, zwei Stück auf einmal; nach zwei Stunden nimmt man eine gleiche Gabe, wenn die erste nicht hinreichend ist.

Pilulae albae. (*Ca.*)

℞. Mercurii dulcis . semidrachmam.
Pulveris Jalapae . . semunciam.
Croci Martis aperitivi
drachmas duas.
Asellorum . . scrupulos duos.
Syrupi Quinque Radicum
quantum sufficit
ut fiant pilulae granorum quatuor. — Von Barthez bei Scropheln empfohlen. — Gabe, zwei Stück täglich.

Boli purgantes. (*Pie.*)

℞. Mercurii dulcis . grana decem.
Resinae Jalapae,
Kali sulphurici,
singulorum grana sex.
Syrupi Cichorii compositi
sufficientem quantitatem.

Chirac machte häufig Gebrauch davon.

Chocolata purgans. (*Bo. Pie.*)

℞. Mercurii dulcis . unciam unam.
Jalapae . . . . sesquiunciam.
Chocolatae simplicis libram unam.
Fiant mor. uli drachmae unius. (*Pie.*)

Bo. Mercurii dulcis drachmam unam, Jalapae drachmas sex et Chocolatae libram unam.

Pilulae laxantes et resolventes (*Ca.*)

℞. Radicis Zingiberis,
Sacchari albi,
singulorum drachmas duas.
Camphorae,
Moschi, singulorum semidrachmam.
Mercurii . . . grana duodecim.
Sublimati,
Turpethi, singulorum grana octo.
Tritura exacte et adde deinde
Extracti Jalapae,
— cathartici,
singulorum drachmas duas.
Asae foetidae,
Kali sulphurici,
singulorum semunciam.
Massae pilularum Rufi,
Galbani,
Extracti Liquiritiae,
singulorum drachmam unam.
Balsami Peruviani semidrachmam.
Elixir proprietatis non acidi
quantum sufficit
ut fiant pilulae quatuor granorum. — Eine unförmliche Zusammensetzung — Sanchez verordnete vier Pillen täglich, indem er allmälig bis auf funfzehen stieg.

Tabellae purgantes. (*Pie.*)

℞. Mercurii dulcis . . semunciam.
Resinae Jalapae scrupulos quatuor.
Scammonei . scrupulos quinque.
Sacchari . . . . . uncias tres.
Gummi Tragacanthae
sufficientem quantitatem.

Erwachsenen eine Drachme, Kindern von einem Scrupel bis zur halben Drachme.

Opiatum neapolitanum. (*Pie.*)

℞. Pulveris Mercurii dulcis,
— Jalapae,
singulorum sesquidrachmam.
— Scammonei scrupulum unum.
— Rhei,
— Sennae,
singulorum drachmas duas.
— Guajaci,
— Sassaparillae,
— Chinae,
singulorum semunciam.
Syrupi Rosarum solutivi
sufficientem quantitatem.
Misce exacte. — Bei chronischen Harnröhrenflüssen. — Gabe, alle zwei Tage, Morgens nüchtern eine bis zwei Drachmen, drei Wochen lang.

Panes (*biscuits*) *purgantes et vermifugi.* (*Pie.*)

℞. Mercurii dulcis . sesquiunciam.
Pulveris Jalapae . . uncias tres.
— Coriandri drachmam unam.
Farinae Tritici . libram unam.
Sacchari albi . . sesquilibram.
Ovorum . . . . . no. 24.
Corticis Citri . . . . . no. 1.
Essentiae Bergamottae
guttas viginti quatuor.
Aquae Florum Aurantiorum
unciam unam.
Fiant panes unciae unius. — Jedes Biscuit enthält funfzehen Gran salzsaures Queckſilberoxydul und dreißig Gran Jalape.

Pomatum s. Unguentum purgans. (Fer.)

℞. Pulveris Jalapae grana quadraginta.
— Scammonei
grana viginti quatuor.
— Mercurii dulcis
grana duodecim.
Succi gastrici animalis cujuslibet
sufficientem quantitatem
ut fiat pasta.

P. Durch Magnesia.

Boli laxantes Chaussieri. (*Ra.*)

℞. Mercurii dulcis . . grana tria.
Sulphatis Magnesiae
grana quatuor.
Syrupi Rhamni quantum sufficit
ut fiat bolus.

Q. Durch Opium.

Pulvis Muriatis hydrargyrosi thebaicus s. Hydrargyri s. Mercurii dulcis cum Opio. (DD. Suec. *Au.*)

℞. Mercurii dulcis . . grana duo.
Pulveris Opii . . granum unum.
— Amyli . scrupulum unum.
Misce bene. (DD. Suec.)

Au. Opii grana duo, Mercurii dulcis

sex et Sacchari drachmam unam, in partes sex dividenda. — Als vortreffliches Mittel gegen Leberentzündung gerühmt.

Collyrium siccum. (*Ra.*)

℞. Mercurii dulcis,
Sacchari pulverati,
singulorum scrupulum unum.
Opii . . . . . grana quatuor.
Tritura simul. — Bei rebellischen, besonders sogenannten syphilitischen Augenentzündungen empfohlen.

Pulvis diaphoreticus. (*E.*)

℞. Mercurii dulcis grana sedecim.
Opii . . . . . grana quatuor.
Ipecacuanhae . . . grana octo.
Fiant doses octo. — Gabe, ein Stück alle Stunden oder zwei Stunden. — Von Chapman bei Ruhr empfohlen.

℞. Opii . . . . . grana tria.
Ipecacuanhae . . . grana sex.
Mercurii dulcis . . sesquigranum.
Nitri . . . . semidrachmam.
Fiant doses sex. — Gabe, ein Stück alle drei oder vier Stunden.

Pulvis expectorans. (*E.*)

℞. Mercurii dulcis . . grana sex.
Opii . . . . . grana tria.
Ipecacuanhae . . . grana sex.
Nitri . . . . drachmam unam.
Fiant doses sex. — Gabe, ein Stück alle zwei oder drei Stunden, in einem Syrup.

Aqua mercurialis balsamica Plenkii. (*Sm.*)

℞. Mercurii dulcis scrupulos duos.
Tincturae Myrrhae
drachmas quatuor.
Laudani liquidi Sydenhami,
Decocti Chinae concentrati,
singulorum unciam unam.
Misce terendo. — Wurde bei schmerzlosen venerischen Geschwüren, wo es die Thätigkeit der Gewebe belebt, einige Mal mit Erfolg gebraucht; man tränkt Charpie damit.

Mixtura antisyphilitica. (*Sm.*)

℞. Mercurii dulcis drachmas duas.
Opii puri . . grana duodecim.
Conservae Rosarum
uncias quatuor.
Misce exacte. — Diese Gabe soll zu einer vollständigen antisyphilitischen Behandlung hinreichend seyn. — Man nimmt sie portionenweise des Morgens in Mandelsyrup mit einer concentrirten Abkochung von Guajac.

Pomatum s. Unguentum antivenereum. (*Pie. Sm.*)

℞. Mercurii dulcis drachmam unam.
Laudani liquidi Sydenhami
drachmas duas.
Cerati Galeni . . unciam unam.
Exacte triturатis adde
Essentiae Rosarum guttam unam.
Als Schutzmittel gegen venerische Uebel, eine Stunde vor dem Beischlaf auf die Eichel eingerieben und selbst als aphrodisiacum mit Unrecht empfohlen.

Pilulae Mercurii dulcis et Opii. (DD. *Sw*. Vm.*)

℞. Mercurii dulcis partes duodecim.
Opii . . . . . partem unam.
Micae Panis partes septemdecim.
Mellis depurati quantum sufficit ut fiant pilulae granorum duorum cum dimidio. (*Vm.*)

Sw.* Mercurii dulcis partes quatuor, Opii unam, Micae Panis tres et Syrupi Sacchari sufficientem quantitatem ut fiant pilulae grani unius; — DD. Calomelanos partes quatuor, Opii unam et quatuor Micae Panis ut fiant pilulae triginta.
Bei venerischen Krankheiten, besonders mit Geschwüren verbundenen, empfohlen.

Pilulae antihydropicae. (*Au.*)

℞. Mercurii dulcis semidrachmam.
Opii . . . . . scrupulum unum.
Rhei pulveratae drachmam unam.
Extracti Quassiae drachmas tres.
Fiant pilulae granorum duorum. — Gabe, neun bis zehen täglich drei Mal.

Pilulae de Leslie. (*Pie.*)

℞. Mercurii dulcis . . grana duo.
Opii . . . . . semigranum.
Misce bene. — Bei Gesichtsschmerz. — Dreimal täglich.

Pilulae purgantes. (*E.*)

℞. Mercurii dulcis grana duodecim.
Pulveris Rhei . . grana viginti.
— Opii . . . granum unum.
Fiant pilulae octo. — Gabe, vier Stück auf einmal. Die übrigen, wenn keine Wirkung erfolgt ist, nach einer Stunde.

Pilulae Pringelii. (Gen.)

℞. Extracti cathartici
scrupulum unum.
Mercurii dulcis grana quinque.
Opii . . . . . sesquigranum.
Fiant pilulae duodecim.

Pilulae aperientes hydrargyratae. (*Sw*.*)

℞. Mercurii dulcis . . . grana sex.
Opii . . . . . grana duo.
Pulveris aperientis sesquiunciam.
Syrupi Sacchari quantum sufficit ut fiant pilulae granorum quinque. — Bei Blennorrhagie und Hodenentzündung.

— Gabe, drei bis vier Stück täglich drei Mal.

Pilulae depurantes. (*Ra.*)

℞. Mercurii dulcis semidrachmam.
Extracti Opii grana octodecim.
— Cicutae drachmas quatuor.
Syrupi Althaeae
sufficientem quantitatem.
Fiant pilulae triginta duae. — Bei Verstopfung zur Linderung der Schmerzen, von Dubois angewendet, und allmälig gestiegen.

Pilulae sialagogae. (*E.*)

℞. Mercurii dulcis,
Camphorae,
singulorum scrupulum unum.
Opii . . . . grana duodecim.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.
Fiant pilulae viginti. — Gabe, ein oder zwei Stück täglich drei Mal.)

R. Durch Blei.

Injectio in gonorrhoea. (*Sa.*)

℞. Gummi Arabici . . semunciam.
Dissolve in
Aquae bullientis unciis duodecim.
Colaturae adde
Mercurii dulcis . drachmas tres.
Plumbi acetici crystallisati
grana quatuor.
Dreimal täglich eine Drachme einzuspritzen, bei Harnröhrenentzündung.

Ceratum exsiccans. (*Vm.*)

℞. Cerae flavae partes quadraginta.
Liqua et adde
Emplastri simplicis,
Terebinthinae coctae,
singulorum partes quinque
et post horum fusionem
Cerussae . . . . partes duas.
Mercurii dulcis . partem unam.
Misce bene.

Candelae s. Cereoli mercuriales. (Pul. *Sp. Sw.*)

℞. Cerae flavae . . . uncias sex.
Liqua et adde
Extracti Saturni . semunciam.
Pulveris Mercurii dulcis
drachmas duas.
Fiant cereoli. — Plenck empfahl sie zur Wiederherstellung des unterdrückten Trippers. Sie sind aber nicht wirksamer als die gewöhnlichen Bougie's.

Unguentum ad tineam. (*E.*)

℞. Mercurii dulcis drachmas duas.
Aluminis calcinati,
Cerussae, singulorum semunciam.
Olei Terebinthinae drachmas duas.
Cerati simplicis . sesquiunciam.
Man legt diese Salbe Abends auf und nimmt sie Morgens wieder weg.

S. Durch Rhabarber.

Pulvis catharticus. (Gen. RC. *E. Sa. Sw.*)

℞. Mercurii dulcis . . partem unam.
Rhei . . . . . partes duas.
Misce triturando. (*Sa. Sw.*)
RC. Rhei palmati scrupulum unum, Mercurii dulcis grana sex. (Pro dosi e melle vel syrupo dandus, alvo coacta vel tribus vicibus, intervallo duarum, trium, quatuor, quinque horarum.)
℞. Mercurii dulcis,
Rhei, singulorum grana decem.
Olei essentialis Cinnamomi
guttam unam.
Misce. (*E.*)
Gabe, zwanzig Gran.
℞. Mercurii dulcis drachmam unam.
Rhei . . . scrupulos quatuor.
Pulveris relaxantis
scrupulum unum.
Misce. (Gen.)

Boli vermifugi. (*Sw.*)

℞. Mercurii dulcis . . grana duo.
Rhei semiscrupulum ad scrupulos duos.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.

Pilulae Werlhofii. (*Sm.*)

℞. Mercurii dulcis scrupulum unum.
Extracti Rhei . drachmas duas.
Syrupi Consolidae majoris
quantum sufficit
ut fiant pilulae septuaginta duae. — Gegen verdächtigen weißen Fluß. — Gabe, Morgens und Abends zwei Stück. — Man muß den Gebrauch lange Zeit fortsetzen.

Mixtura anthelmintica. (*B.*)

℞. Mercurii dulcis . . grana sex.
Tincturae Rhei aquosae
uncias octo.
Syrupi Cichorii compositi
uncias duas.
Löffelweise in sogenannten gastrischen Wurmfiebern.

T. Durch Scammoneum.

Pulvis purgans anthelminticus, hydragogus. (*B. Sw.*)

℞. Mercurii dulcis . partem unam.
Scammonei . . . partes duas.
Misce. (*Sw.*) — Gabe, fünf bis dreißig Gran, alle vier oder fünf Tage.
℞. Mercurii dulcis,
Diagrydii sulphurati,
singulorum grana tria.
Misce. (*B.*) — Für ein Kind von sechs Jahren, indem man um so viele Gran, je nachdem das Kind älter oder jünger ist, steigt oder fällt.

Pulvis resolvens s. digestivus. (*Sm.*)

℞. Mercurii dulcis . . partes tres.
Diagrydii sulphurati partes octo.
Misce. — Von Finke bei Verstopfungen der Unterleibseingeweide empfohlen. — Gabe, zwölf Gran, alle Morgen nüchtern, mehrere Tage hintereinander, in Kalbfleischbrühe.

Pulvis vermifugus. (Wür. *Ca. Sp.*)

℞. Mercurii dulcis grana quinque.
Pulveris Scammonei grana sex.
— Rhei . . grana quatuor.
Misce. (*Sp.*)

Ca. Mercurii dulcis drachmam unam, Rhei, Scammonei, singulorum tantidem et Sacchari drachmas tres.

℞. Mercurii dulcis,
Scammonei,
singulorum grana duodecim.
Gummi Guttae grana quinque.
Misce. (Wür.)

Boli Scammonei compositi Fenn. componuntur e pulveribus modo dictis Conservae Absinthii et Syrupi Sacchari ope in bolos conversis.

Boli anthelmintico-laxantes. (*B. Sp.*)

℞. Mercurii dulcis,
Scammonei,
singulorum grana decem.
Gummi Guttae . . grana sex.
Confectionis hyacinthinae
sufficientem quantitatem
ut fiant boli duo vel tres. (*Sp.*)

Diese Bissen bilden den Grundbestandtheil des berühmten Nuffer'schen Mittels gegen den Bandwurm. Man nimmt sie alle Viertelstunden, nachdem man drei Drachmen gepulverte Farrnkrautwurzel in sechs Unzen Lindenblüthaufguß genommen hat und dazu noch eine oder zwei Tassen Thee trinkt.

℞. Mercurii dulcis . . grana sex.
Diagrydii sulphurati grana octo.
Roob Sambuci quantum sufficit.
Fiant boli quatuor. — Ein Stück alle zwei Stunden. (*B.*)

Trochisci anthelmintici s. hermetici Scretae, Rotulae anthelminticae. (Pal. Wir. *B.*)

℞. Mercurii dulcis . grana decem.
Diagrydii sulphurati
scrupulum unum.
Saponis albi,
Mucilaginis Gummi Arabici,
singulorum drachmam unam.
Fiant trochisci decem. (*B.*)

℞. Mercurii dulcis . sesquiunciam.
Cornu Cervi absque igne praeparati
scrupulos duos.
Cinnamomi,
Diagrydii sulphurati,
singulorum scrupulum unum.
Sacchari albi . . unciam unam.
Conservae Rosarum rubrarum
drachmas duas.
Fiant mucilaginis Gummi Tragacanthae cum Aqua Rosarum parati ope trochisci sexaginta quatuor. (Wir.)

℞. Mercurii dulcis drachmas duas.
Pulveris Herbae Carlinae,
— Seminis Cinae,
— Cornu Cervi usti,
singulorum drachmam unam.
Diagrydii sulphurati
semidrachmam.
Cinnamomi . . semiscrupulum.
Sacchari albi . . unciam unam.
Mucilaginis Gummi Arabici
quantum sufficit.

U. Durch Scille.

Pilulae diureticae. (*E. Par.*)

℞. Mercurii dulcis,
Scillae,
singulorum grana duodecim.
Conservae Rosarum
quantum sufficit.
Fiant pilulae duodecim. — Gabe ein Stück Morgens und Abends. (*E.*)

℞. Mercurii dulcis . . grana sex.
Scillae . . . . grana quatuor.
Foliorum Digitalis grana decem.
Myrrhae . . scrupulum unum.
Asae foetidae . semidrachmam.
Extracti Gentianae
quantum sufficit.
Fiant pilulae quindecim. (*E Par.*) — Gabe, ein Stück Morgens und Abends.

Pilulae scillinae et Muriatis Hydrargyri oxydulati. (RC.)

℞. Mercurii dulcis . partem unam.
Pulveris Scillae . . partes duas.
— aromatici . . partes tres.
Syrupi simplicis quantum satis.
Bei asthenischen Lungenkrankheiten, Wassersucht, Hypochondrie, besonders mit etwas Aloë und Seife. — Gabe, sechs Gran täglich zwei Mal.

Pilulae antihydropicae. (*Pie.*)

℞. Mercurii dulcis
drachmas duas cum dimidia.
Scillae pulveratae
drachmas quatuor.
Oxymellis scillitici
quantum sufficit.
Fiant pilulae centum. — Purgirend, schmelzend, harntreibend. — Gabe, Anfangs Morgens und Abends zwei Stück und allmälig gestiegen. Der Kranke trinkt einen Aufguß von Ruscus aculeatus mit Meerzwiebelsauerhonig.

Unguentum s. Pomatum resolvens. (*Ra.*)

℞. Mercurii dulcis,
Scillae pulveratae,
singulorum semidrachmam.
Axungiae praeparatae
drachmas duas.
Olei Rosarum . guttas quatuor.

Von Dupuytren in Einreibungen bei chronischen Gelenkanschwellungen.

V. Durch Wurmsaamen.

Pulvis vermifugus. (*Au. Sw.*)

℞. Mercurii dulcis semidrachmam.
Rhei . . . . . uncias duas.
Seminis Cinae . . semunciam.
Fiat pulvis subtilissimus. (*Sw.*)

Au. Mercurii dulcis, Rhei, Seminis Cinae, singulorum grana sex et Olei Cinnamomi guttas duas; — vel: Seminis Cinae grana quindecim, Rhei duodecim, Aloës sex, Mercurii dulcis tres et unum Ipecacuanhae, ut fiant doses tres. — Ein Stück des Morgens, einem dreijährigen Kinde.

Bolus vermifugus. (*Ra.*)

℞. Mercurii dulcis . . grana duo,
Seminis Cinae . . grana octo.
Camphorae . . . . grana sex.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.

Electuarium vermifugum. (*Sw*.*)

℞. Mercurii dulcis semiscrupulum.
Pulveris Rhei,
— Seminis Cinae,
— Radicis Valerianae,
singulorum drachmas duas.
Conservae Absinthii sesquiunciam.
Oxymellis scillitici
quantum sufficit.

Bei Epilepsie mit Wurmcomplication empfohlen. — Gabe, zwei Drachmen bis eine halbe Unze nach dem Alter und den Kräften des Kranken.

Electuarium anthelminticum s. anthelminticum Vogleri. (*Br. Ca. Fi. Sw.*)

℞. Mercurii dulcis
grana sex ad duodecim.
Pulveris Seminis Cinae
drachmas duas.
— Jalappae drachmam unam.
— Cinnamomi semidrachmam.
Syrupi Florum Persicae
quantum sufficit.

Morgens in befeuchteter Oblate zu nehmen. — Gabe, den zwölften Theil dieser Masse für Kinder von zwei bis vier Jahren, den achten für fünf- bis achtjährige, den vierten Theil und mehr für Erwachsene. Man trinkt darauf eine Tasse von einem bittern Aufguß.

Fi. Seminis Cinae pulverati drachmas duas, Radicis Jalappae unam, Mercurii dulcis grana duodecim, Syrupi Cinnamomi quantum sufficit. — Gabe, eine bis zwei Drachmen.

W. Durch Terpentin.

Injectio Muriatis Hydrargyri camphorata, Collyrium Fernandezii. (*His.*)

℞. Mercurii dulcis semiscrupulum.
Aluminis,
Aetheris sulphurici alcoholisati,
Camphorae,
singulorum scrupulum unum.
Terebinthinae . . semunciam.
Vitellorum Ovorum . . no. 2.

Misce terendo in mortario vitreo et cola exprimendo.

Opiatum adstringens. (*Sm.*)

℞. Terebinthinae Venetae
drachmas quatuor.
Rhei . . . . . drachmas tres.
Mercurii dulcis semiscrupulum.
Syrupi Consolidae majoris
quantum sufficit.

Gabe, ein Scrupel, täglich drei Mal, am Ende von Blennorrhagie.

Deuto-chloruretum Mercurii, Hydrargyrus muriatus s. muriatus corrosivus, Hydrargyrum muriaticum corrosivum, Hydrargyrus corrosivus albus, Hydrargyri Oxymurias s. Permurias, Mercurius muriatus s. sublimatus corrosivus, Murias Hydrargyri corrosivus s. oxygenatus sublimatione s. praecipitatione paratus, Murias hydrargyricum corrosivum, Murias oxygenatus Hydrargyri sublimatus, Supermurias Hydrargyri, Murias Hydrargyri basi Oxydi imperfecti, Perchloruretum s. Bichloruretum s. Bichloretum Mercurii, Murias superoxygenatus, Oxymurias, Deutomurias s. Deutohydrochloras Hydrargyri; Quecksilbersublimat, salzsaures Quecksilberoxyd. (A. Am. Ams. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. D. DD. Du. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen Ham. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RG. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. *Br. C. Fi. Par. Pid. Sp. Sw. T. Vin.*)

1) Alte Verfahrungsweise.

℞. Mercurii . . . partes quatuor.
Acidi nitrici . quantum sufficit
ad solutionem metalli, qua peracta, liquor ad siccum evaporet et massae pulveratae addantur
Salis communis decrepitati,
Vitrioli viridis ad alborem calcinati, singulorum partes quinque.

Misce bene triturando et in lagenam, pro dimidio inde replendam immissa lente calefac in balneo arenae, orifi-

cium lagenae non prius obturando, quam vapores aquosi et acidi enasci cessaverint; tunc illâ occlusâ ignis pedetentim augeatur; evaporatione finita, lagenam frange et massam albam a scoriis separa. (Ams. B. Bel. Br Gen. Sar. Wir. Wiir. *Br. Pid. Sp. Sw.*)

2) Verfahren Runkel's.

℞. Mercurii . . uncias duodecim.
Acidi sulphurici concentrati uncias viginti.

Destillent ad siccum; residuo in mortario vitreo pulverato adde
Salis Ammoniaci pulverati pondus suo aequale.

Tritura bene et mixta in lagenam ad dimidium circiter replendam ingere in balneum arenae igne lento et blando calefacto collocandam; quae quamdiu vapores aquosi et acidi evolvuntur aperta, deinde obturamento chartaceo occludatur et ignis sensim augeatur. Operatione finitâ, lagenam rumpe et massam albam sublimatam ab omni impuritate, faciei internae adhaerente separa. (A. Am. Ba. D. DD. Du. Ed. Fenn. Ham. His. Li. Lus. O. R. Sax. Suec. Wir. *C. Sw.*)

Bor. Bor4. loco salis ammoniaci Natrum muriaticum siccum adhibent. (Praeterea quoque Sublimatum venalem indicat Bor4.); — Lon. LonN. RC. Mercurii *pondere* libras duas, Acidi sulphurici *pondere* uncias triginta, Natri muriatici siccati libras quatuor.

℞. Mercurii . . . partes quatuor.
Acidi sulphurici (66°) partes quinque.

Coque ad partium quinque remanentiam. Recipe deinde hujus
Deutosulphatis Mercurii acidi,
Salis marini pulverati,
Oxydi nigri Mangani,
singulorum partes aequales et misce. Post aliquot dies immitte in unam vel plures retortas fundi latioris, ad tertiam partem usque repletas et ad collum balneo arenae immersas; orificio olla parva inversa tecto, calefac pedetentim, donec massa tota sit sublimata. (GalM.)

Gal. Sulphatis, Salis marini, singulorum partes quadringentas octoginta, Oxydi quadringentas quinquaginta; — GalH. partem quartam postremi sufficere dicit, quod nonnisi eo utatur, ut in deutosulphatem mutetur protosulphas, qui in sale primùm obtento adesse posset. — HassP. Mercurii uncias decem, Salis communis sicci uncias octo, Mangani oxydati uncias sex; tritis ad extinctionem usque adde Olei Vitrioli Anglici uncias undecim, celeriter agitando etc.; — *T.* Salis communis siccati vel decrepitati libras quatuor, Oxydi Mangani libram unam, Sulphatis Mercurii ex Mercurii libris quatuor et Acidi sulphurici concentrati quantum sufficit coquendo parati. — Fer. dissolvere jubet Mercurii uncias sex in Acidi sulphurici aequali quantitate, solutionem ad siccum evaporare, residuum cum Salis communis pondere suo aequali terere et mixturam sublimationi subjicere; — *Vi.* Mercurii libras duas, Acidi sulphurici libras duas cum dimidia, Salis marini siccati libras quatuor, caeterum destillationem ad siccum et sublimationem residui cum sale marino in retorta vitrea pro tertia parte replenda.

3) ℞. Oxydi Mercurii rubri partes decem cum quadrante.
Acidi nitrici quantum sufficit ad oxydi dissolutionem. Evaporatis ad siccum residuum tere cum
Salis communis partibus quinque et mixturam sublimationi subjice. (*Vm.*)

4) ℞. Mercurii . . libram unam.
Acidi nitrici quantum sufficit ut metallum caloris ope solvatur. Liquori infunde solutionem calidam ex Salis communis sesquilibra in Aquae sufficiente quantitate, vapores rubri evoluti evitando; praecipitatum abundans primo exortum statim redissolvitur. Mixtura refrigerata sepositione demittit crystallos prismaticas, quibus separatis, liquor supernatans ad cuticulam evaporatus denuo crystallisationi subjiciatur. (Pul.)

5) ℞. Oxydi Mercurii rubri quantum vis.
Acidi hydrochlorici quantum sufficit ad solutionem. Evaporata in vase vitreo ad crystallisandum reponantur. (An. *Sw*. T. Vm.*)

Der Aetzsublimat, eins der heftigsten Gifte, welche man kennt, wird innerlich als Reizmittel und äußerlich als cathaereticum und in einigen Künsten zur Erhaltung thierischer Stoffe angewendet, welche dadurch der Fäulniß widerstehen, indem sie die Härte des Holzes bekommen. Besonders genoß und genießt er als Mittel gegen Syphilis einen großen Ruhm. Die Engländer sehen es als ausgemacht an, daß man in dieser Eigenschaft nicht auf ihn rechnen könne und überlassen daher fast allgemein seine Anwendung den Quacksalbern. Doch verdient er weder einen solchen rücksichtslosen Tadel, noch die übertriebenen Lobeserhebungen van Swieten's. Mit Geschick angewendet, wird er ein heroisches

Arzneimittel, welches unter vielen Umständen von Nutzen ist, obgleich er, einer rohen Empirie und einer blinden Routine überlassen, allerdings großen Schaden stiften kann.

Alkalien, kohlensäuerliche Salze und alkalische Schwefelsalze, Brechweinstein, essigsaures Blei, salpetersaures Silber Eiweiß, Kleber, Blei, flüchtige Oele, Aufgüsse und Abkochungen adstringirender Pflanzen zersetzen ihn und dürfen daher nicht mit ihm verbunden werden. Ja Boullay behauptet sogar, alle vegetabilische und animalische Stoffe haben die Eigenschaft, nach einer für einen jeden derselben verschiedenen Zeit ihn zu zersetzen; es sey daher nützlich zu wissen, wie es sich mit einigen sehr allgemein in Gebrauch gezogenen Mitteln verhalte, in denen, nach der Absicht ihrer Erfinder, der Sublimat die Hauptrolle spielen sollte.

Gabe ein Sechszehentheil, ein Achtel, ein Viertel oder ein halber Gran.

§. II. Präparate, in denen die Wirkung des Sublimats nicht oder wenigstens nicht merklich, durch einen fremden Stoff verändert ist.

Aqua divina Fernelii s. phagedaenica, Liquor mercurialis s. Muriatis Hydrargyri s. Hydrargyri muriatici corrosivi, Liquor Deutochlorureti Mercurii, Deutohydrochloras Mercurii, Solutio Sublimati corrosivi aquosa. (Ams. B. Ba. BorC. DD. Fer. Ham. Hass. Li. Sax. WW. *Ca. Fi. Pid. Sa. Sw.*)

℞. Sublimati corrosivi
drachmam unam.
Aquae destillatae libram unam.
Triturando in mortario lapideo fiat dissolutio. (Ams.)

B. et Fer. Sublimati drachmam unam et Aquae libras duas; — Bor. DD. Sax. WW. et *Sa.* Sublimati granum unum et Aquae unciam unam; — *Sw.* Sublimati grana viginti ad triginta et Aquae libras duas; — Han. Sublimati scrupulum unum et Aquae uncias duodecim; — Li. Sublimati scrupulum unum et Aquae sesquilibram; — Hass. et *Pid.* Sublimati grana quadraginta quatuor et Aquae libram unam; — Ba. Sublimati partem unam et Aquae viginti quatuor; — WW. Sublimati grana decem et Aquae uncias quatuor; — *Ca.* Sublimati grana duodecim ad octodecim et Aquae libras duas.

Die meisten dieser Auflösungen werden äußerlich, in Waschungen, besonders gegen Krätze angewendet; einige jedoch, z. B. die von Ba., werden als Reagentien angeführt.

Man erinnere sich, daß der Sublimat zu seiner Auflösung bei gewöhnlicher Temperatur ungefähr zwanzig Theile und vom kochenden Wasser das Dreifache seines Gewichts erfordert.

Hass. *Liquor Mercurii sublimati corrosivi*: Sublimati drachma dimidia, Aquae destillatae drachmae decem — ut reagens.

Collyrium ex Muriate Hydrargyri oxygenato, Aqua ophthalmica mercurialis. (Ful. *Sw.*)

℞. Sublimati corrosivi granum unum.
Aquae destillatae . . uncias sex.
Dissolve. (Ful.)

Sw. Sublimati semigranum ad granum unum et Aquae uncias quatuor.

Gilt als austrocknend, auflösend und antisyphilitisch.

Lotio Hydrargyri s. mercurialis. (Gen. *Au.*)

℞. Sublimati corrosivi
scrupulum unum.
Aquae destillatae uncias duodecim.
Acidi hydrochlorici
guttas viginti quatuor.
Misce. (Gen.)

Au. solutionem Sublimati granorum trium in Aquae purae vel Rosarum libris duabus.

℞. Sublimati corrosivi drachmas duas.
Aeruginis . . . . grana sex.
Aquae . . . . . libras duas.

Besonders bei hartnäckiger tinea empfohlen (*Au.*)

℞. Sublimati corrosivi drachmas duas.
Praecipitati rubri . grana decem.
Spiritus Angelicae,
— Rorismarini,
singulorum drachmas duas.
Aquae . . . . octarios duos.

Gegen Krätze empfohlen. (*Au.*)

Clyster s. Enema mercuriale. (*Au.*)

℞. Sublimati corrosivi . grana sex.
Infusi Seminum Lini uncias octo.

Gegen Ascariden von Nutzen.

Injectio mercurialis. (*Au.*)

℞. Sublimati corrosivi granum unum.
Aquae bullientis . unciam unam.

Gegen weißen Fluß. — Augustin empfiehlt, nach Monteggia, bei habituellem Tripper einen Gran Sublimat in vier Unzen Wasser aufgelöst.

Lotio mercurialis Aliberti, Aqua rubra. (*Ra.*)

℞. Sublimati corrosivi
drachmam unam.

Aquae destillatae libram unam.
Alcannae . . quantum sufficit ad colorandum.

Man taucht Leinwand oder einen Schwamm in diese Flüssigkeit und badet die mit entzündlichen, besonders venerischen Flechten behafteten Theile damit.

Aqua ophthalmica mercurialis, Collyrium mercuriale. (*Au. Huf.*)

℞. Sublimati corrosivi semigranum.
Aquae Rosarum . . uncias tres.
Solutioni adde
Mucilaginis Seminum Cydoniorum drachmam unam.
Aquae Laurocerasi destillatae guttas triginta.
Misce (*Huf.*)

Au. mixturam solutionis Sublimati corrosivi guttae unius et Aquae destillatae unciarum quatuor.

Balneum antisyphiliticum. (*Ra.*)

℞. Sublimati corrosivi grana sex ad duodecim.
Aquae destillatae . libras octo.
— communis (30°) libras ducentas.

Man kann auch zwei Drachmen bis eine Unze Sublimat und zweihundert Pfund Wasser nehmen. — Diese Bäder, welche man in einer hölzernen Badewanne nehmen muß, sind ungeachtet der pomphaften Lobeserhebungen, welche man von ihnen macht, sehr gefährlich.

Solutio Sublimati, Potio cum Deutochlorureto Mercurii s. antisyphilitica. (GalM. Gen. *E.*)

℞. Solutionis Sublimati corrosivi partes decem.
Gummi Arabici . partem unam.
Aquae destillatae partes centum.
Dissolve gummi in aqua et adde solutionem. (GalM.)

℞. Sublimati corrosivi . grana duo.
Aquae purae . . . uncias sex.
Spiritus Cinnamomi,
Syrupi Sacchari,
singulorum unciam unam.
Misce. (*E.*)

℞. Sublimati corrosivi . grana octo.
Aquae destillatae uncias quindecim.
Acidi hydrochlorici guttas duodecim.
Syrupi Papaveris . unciam unam.
Misce (Gen.)

Gabe, einen oder zwei Löffel, zwei oder drei Mal täglich.

Gargarisma in ulceribus venereis s. mercuriale s. antisyphiliticum. (*Au. B. Ra. Sy.*)

℞. Sublimati corrosivi . grana sex.
Decocti Hordei . libram unam.
Mellis rosati . . . uncias duas.
Misce bene. (*Sy.*)

Ra. Sublimati granum unum ad duo in Aquae Althaeae unciis sex vel Sublimati grana duo, Aquae destillatae uncias quatuor et Syrupi Mellis semunciam; — *B.* Sublimati granum unum, Decocti Hordei libram unam et Mellis rosati semunciam.

Clyster s. Enema antisyphiliticum. (*Ra.*)

℞. Sublimati corrosivi . grana duo.
Aquae destillatae . uncias duas.
Decocti Seminis Lini libram unam.

Bei syphilitischen Affectionen des rectum oder wenn der Kranke den Sublimat nicht durch den Magen verträgt.

Injectio in necrosi syphilitica s. detergens. (*B.*)

℞. Sublimati corrosivi . grana duo.
Decocti Hordei . libram unam.
Tincturae Myrrhae drachmam unam.
Misce.

Aqua phagedaenica composita. (*Vm.*)

℞. Aquae phagedaenicae uncias sex.
Extracti Myrrhae drachmam unam.
Mixtis et dilutis adde
Tincturae Myrrhae . semunciam.

Aqua phagedaenica Pideritii. (*Pid.*)

℞. Aquae phagedaenicae uncias sex.
Essentiae Croci . . semunciam.
Solutionis Myrrhae drachmam unam.
Sief albi Rhazis . unciam unam.

Dieses Wasser muß verworfen werden, von welchem das vorige nur eine weniger den Regeln der Chemie zuwiderlaufende obgleich für sich schon nicht zu empfehlende Abänderung ist.

Liquor Hydrargyri oxymuriati s. Swietenii s. syphiliticus Turneri s. Swietenii, Murias Hydrargyri spirituosus liquidus, Solutio Mercurii corrosivi s. Muriatis Hydrargyri oxygenati s. alcoholica Sublimati corrosivi, Aqua Swietenii. (Am. An. B*. DD. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Lon. LonN. Sax. Wür. *C. Ca. E. Fi. Sp. Sw. T. Vm.*)

℞. Sublimati corrosivi grana duodecim.
Spiritus Frumenti bis rectificati libras duas.
Dissolve terendo in mortario. (An. Wür. *Sp. Sw. Vm.*)

DD. Sublimati granum unum et Aquae Vitae uncias quatuor; — Sax. Sublimati grana octo et Aquae Vitae libram unam; — *E.* Sublimati grana duo et Aquae Vitae uncias quatuor.

℞. Sublimati corrosivi . grana octo.
Aquae destillatae uncias quindecim.
Solutioni adde
Alcoholis . . . unciam unam.
Misce bene. (Am. Lon. LonN. *C. Fi. Sw. T.*)

Ra. Sublimati grana sedecim, Aquae libram unam et Alcoholis semidrachmam; — GalM. Sublimati partem unam, Aquae nongentas et Alcoholis (33°) centum; — Gal. Sublimati grana octo, Aquae uncias quatuordecim cum dimidia, et Alcoholis (36°) sesquiunciam; — Fer. Sublimati grana sex, Aquae uncias quatuor et Alcoholis uncias octo; — *Ca* Sublimati grana viginti, Alcoholis (36°) drachmas viginti quinque et Aquae libras duas.

℞. Sublimati corrosivi
scrupulum unum.
Sacchari albi . . . semunciam.
Triturata ad intimam mixtionem usque adde
Aquae Vitae . . uncias decem.
Post dissolutionem filtra. (*Sw**.)

℞. Sublimati corrosivi . grana sex.
Alcoholis . . uncias duodecim.
Dissolve et liquori adde
Syrupi balsamici . sesquiunciam.
Misce bene. (B*. Ful.)

℞. Sublimati corrosivi . grana octo.
Aquae destillatae uncias quindecim.
Acidi hydrochlorici
guttas duodecim.
Syrupi Capitum Papaveris
unciam unam.
Misce. (Gen.)

Nach mehreren Versuchen blieb Van Swieten bei zwölf Gran Sublimat auf zwei Pfund Kornbranntwein. Er gab, Morgens und Abends einen Löffel oder eine halbe Unze von dieser Flüssigkeit, d. h. einen Viertelgran Sublimat, indem er hierauf ein Pfund einer erweichenden Abkochung mit einem Drittheil oder Viertheil Milch versetzt, trinken ließ. Heutzutage läßt man in Frankreich acht Gran Sublimat in einer Drachme Alcohol auflösen und die Auflösung mit zwei und dreißig Unzen destillirtem Wasser verdünnen. Wenn man mit Weglassung des Alcohols, welcher zu nichts nützt, die Verhältnisse der beiden andern Bestandtheile unverändert läßt, so hat man eine Flüssigkeit, welche genau einen Viertelgran auf die Unze enthält, ein Verhältniß, welches sich sehr gut für die Vertheilung und Anwendung des Mittels eignet. Die Formel des Codex gallicus schreibt einen halben Gran auf die Unze vor, was der Practiker nie aus dem Auge verlieren darf, wenn er grobe Fehler vermeiden will. Man läßt Morgens nüchtern einen Löffel oder eine halbe Unze Flüssigkeit, d. h. einen Achtelgran Sublimat, den ersten Tag; den folgenden Tag anderthalb Löffel oder Dreiviertel Unzen, d. h. drei Sechszehntheil; endlich den dritten Tag zwei Löffel oder eine Unze, d. h. einen Viertelgran Sublimat, nehmen und so fort, bis man auf einen halben Gran gekommen ist, eine Quantität, welche man nie überschreiten darf. Oft ist es gut, wenn man die Flüssigkeit auf zwei Mal, Morgens und Abends, nimmt. Man giebt sie in einigen Unzen Gersten-, Leinsaamen- oder Eibischwasser, mit Milch, mit Gummiwasser, mit Looch gummosum oder syrupus Gummi arabici; auch kann man sie einer Pinte Tisane hinzumischen, welche der Kranke den Tag über glasweise trinkt.

Liquor Hydrargyri camphorati s. ad condylomata. (*Au*)

℞. Sublimati corrosivi semidrachmam.
Camphorae . drachmam unam.
Alcoholis . . . unciam unam.

Rust empfiehlt diese Flüssigkeit zur Austrocknung und Zerstörung von Condylomen.

Liquor antisyphiliticus. (Br.)

℞. Sublimati corrosivi
grana duodecim.
Aquae Foeniculi,
Alcoholis, singulorum libram unam.
Julep rosati . . . uncias duas.
Misce sedulo

Gargarisma antisyphiliticum. (*ParC.*)

℞. Liquoris Swietenii . uncias duas.
Mellis rosati . . unciam unam.
Decocti sudorifici . uncias sex.
Misce.

Liquor antivenereus. (*Pie.*)

℞. Sublimati corrosivi grana duodecim.
Camphorae . . . grana quatuor.
Triturata in mortario marmoreo dissolve in
Aquae Vitae . . libris duabus.
In fine adde
Syrupi Rhoeados unciam unam.

Gabe, einen bis zwei Löffel, Morgens und Abends in einem halben Pfund Brustisane oder Kuhmilch.

Solutio Marryati. (B*.)

℞. Sublimati corrosivi,
Acidi hydrochlorici,
singulorum grana decem.
Spiritus Lavandulae compositi
unciam unam.

Gabe, zwanzig Tropfen, Morgens und Abends, in sechs Löffeln weißem Wein oder Eibischwasser.

Solutio Muriatis Hydrargyri oxydati corrodens. (RC.)

℞. Sublimati corrosivi
drachmam unam.

Acidi muriatici concentrati
drachmas duas.
Solve. — Jeder Tropfen enthält einen halben Gran Sublimat, muß also gehörig verdünnt werden. — Aeußerlich bei Condylomen, Warzen, Schrunden, Geschwüren mit Fleischwucherungen.

Mixtura mineralis. (B*.)

℞. Sublimati corrosivi . grana sex.
Aquae destillatae uncias novem.
Solutioni adde
Aquae Cinnamomi vinosae
uncias duas.
Alcoholis rectificati,
Syrupi Althaeae,
singulorum unciam unam.

Tisana Bourguenodi. (Bo.)

℞. Succi Liquiritiae . sesquilibram.
Aquae communis
libras tres cum dimidia.
Solutioni adde
Sublimati corrosivi grana duodecim. dissoluti in
Alcoholis rectificati unciis duabus.
Gabe, zwei Löffel in einer Pinte Wasser.

Syrupus antivenereus St. Ildephont. (*Sm.*)

℞. Sublimati corrosivi
grana quindecim.
Alcoholis . . . drachmas duas.
Tritura, donec bullae evanuerint neque quidquam amplius desideat, infunde deinde in
Syrupi Capilli Veneris
uncias viginti quatuor.
Immitte balneo aquae ut alcohol evaporet.
Gabe, anfangs einen, dann zwei oder drei Eßlöffel in einer Pinte einer starken Eibischabkochung, den Tag über zu trinken. Dieses Mittel, drei Wochen oder einen Monat lang fortgesetzt, mit Milch als einzige Nahrung, heilte oft venerische Krankheiten.

Gargarisma antisyphiliticum. (*Ca.*)

℞. Liquoris Swietenii drachmam unam.
Decocti Hordei . libram unam.
Syrupi Cuisinerii . uncias duas.
Misce.

Aqua caustica ad condylomata s. phagedaenica Grindelii. (B*.)

℞. Sublimati corrosivi semidrachmam.
Camphorae . drachmam unam.
Alcoholis rectificati unciam unam.

Injectio Whately. (*E. Sm.*)

℞. Sublimati corrosivi
drachmam unam.
Alcoholis . . . unciam unam.
Dissolve et hujus solutionis guttas duas ad viginti misce cum
Aquae destillatae unciis quatuor.
Sulphatis Zinci
granis quatuor ad decem.
Bei Blennorrhöe empfohlen. — Gabe, eine Drachme auf einmal. Man wiederholt die Einspritzung dreimal täglich. — Der Sublimat ist darin durch das Zinksalz zersetzt.
E. Sulphatis Zinci grana decem, Sublimati duas et Aquae Rosarum uncias octo.

Tinctura antisyphilitica. (*Au.*)

℞. Sublimati corrosivi
scrupulum unum.
Alcoholis . . . uncias quatuor.
Solutioni adde
Balsami Canadensis,
Resinae Guajaci,
singulorum uncias duas solutas in
Alcoholis . . . unciis quatuor.
Adde
Olei Sassafras . drachmas duas.
Gabe, zehen Tropfen alle Stunden, bei chronischer Gonorrhöe.

Aether mercurialis, Solutio Sublimati corrosivi aethera. (B*. *Fi. T.*)

℞. Sublimati corrosivi grana sedecim.
Aetheris sulphurici unciam unam.
Diese Formel ist von Cheron. — Gabe, vier bis sechs oder zehen bis zwölf Tropfen in Milch, Gummi-, Zuckerwasser; und zwei Drachmen bis eine halbe Unze, äußerlich in Einreibungen in der Nähe der Geburtstheile.
Lange vor Cheron hatte Lafontaine empfohlen, Morgens und Abends in einer Tasse schleimiger Tisane zehen bis zwanzig Tropfen einer Auflösung von vier Gran Sublimat in einer halben Unze Schwefeläther zu nehmen.
Die Flüchtigkeit des Excipiens empfiehlt aber dieses Präparat sehr wenig.

Emulsio Sublimati corrosivi. (B*.)

℞. Sublimati corrosivi . grana duo.
Aetheris sulphurici
drachmam unam.
Solutionem subige cum
Vitellorum Ovorum . . . no. 2
et adde sensim
Aquae Menthae piperitae
uncias quinque.
Syrupi Althaeae . unciam unam.

Syrupus mercurialis Cheroni.

℞. Sacchari albi purificati
sesquilibram.
Aquae destillatae . libram unam.
Saccharo blando calore in aqua soluto, post perfectam refrigerationem adde
Aetheris mercurialis unciam unam.

Unguentum s. Pomatum Cyrilli s. mercuriale corrosivum s. mercuriale aptyalizomenon s. Muriatis Hydrargyri oxygenati; Pomatum Deutochlorureti Mercurii. (B*. Fer. Gal. GalM., RC. Sax. *Bo. Br. Ca. Fi. Huf. T.*)

℞. Sublimati corrosivi pulverati partem unam.
Axungiae praeparatae partes octo.
Diu in mortario vitreo triturata tere deinde supra laminam porphyream. (Fer. Gal. GalM. RC. *Br*. Fi. T*)

Cirillo hatte zuletzt etwas Salmiak zugesetzt, wie sich in Folgendem findet:

℞. Sublimati corrosivi,
Salis Ammoniaci,
singulorum partem unam.
Axungiae . . . partes octo.
Tritura per horas viginti quatuor. (B*. Sax. *Huf.*)

Bo. et *Ca.* Sublimati drachmam unam, Salis Ammoniaci grana decem et Axungiae unciam unam.

Cirillo verschrieb eine Drachme in Einreibungen in die Fußsohlen, Cullerier anfangs nur eine halbe.

Emplastrum corrosivum. (Gen.)

℞. Sublimati corrosivi semidrachmam.
Axungiae Porci . . semunciam.
Cerae albae . . drachmas duas.
Misce.

Unguentum s. Pomatum Cyrilli opiaceum. (*Br*.*)

℞. Sublimati corrosivi partem unam.
Axungiae praeparatae partes octo.
Triturati simul adde
Extracti Opii . . grana decem
Gegen rebellische Tripper in schwachen Einreibungen auf das Mittelfleisch.

Unguentum Hydrargyri cinereum fortius. (Han.)

℞. Sublimati corrosivi scrupulum unum.
Mercurii . . . . . uncias sex.
Sevi vervecini . . uncias duas.
Axungiae Porci uncias quatuor.
Tritura in mortario lapideo ad perfectam metalli extinctionem usque. — Der Sublimat wird in diesem Präparat bald zersetzt und in salzsaures Oxydul umgeändert.

Unguentum Muriatis oxygenati Hydrargyri s. antipsoricum. (H s. *Bo.*)

℞. Sublimati corrosivi partem unam.
Cerussae . . partes quindecim.
Axungiae Porci . partes triginta.
Misce triturando. (*Bo.*)

℞. Butyri recentis uncias quatuor.
Terebinthinae,
Olei Rosarum,
singulorum unciam unam.
Liquatis blando igne adde
Pulveris Cerussae uncias duas cum dimidia.
Sublimati corrosivi,
Aluminis calcinati,
singulorum drachmas duas.
Vitellorum Ovorum . . no. 2.
Succi Citri . . . uncias duas.
Misce bene. — Ein schlechtes Präparat, in welchem der Sublimat bald zersetzt wird und welches daher verworfen werden muß.

Pilulae majores Hoffmanni. (Br. Fer. Ham. Han. Wir. *Au. B. Pie. Ra. Sm. Sp.*)

℞. Sublimati corrosivi grana quindecim.
Aquae destillatae drachmas sex.
Dissolutioni adde
Micae Panis albi drachmas duas cum dimidia.
Misce bene ut fiant pilulae centum viginti. — Jede enthält einen Achtelgran Sublimat, auch kann man sie pulvern und mit Zucker vermischen. (Br. Han. Wir.)

Sp. Sublimati drachmam unam, Aquae quantum sufficit ad solutionem et Micae Panis drachmas novem ut fiant pilulae grani unius (sexcentae), quarum quaeque decimam grani partem continet. — Spielmann verordnet, aus einem unbegreiflichen Irrthum, vier bis fünf Stück täglich dreimal.

℞. Sublimati corrosivi . grana sex.
Soluto in Aquae destillatae sufficiense quantitate adde
Micae Panis,
Sacchari albi,
singulorum quantum satis ut fiant pilulae centum octoginta, quarum quaeque trigesimam grani partem sublimati continet. (Ham. *Au.*)

℞. Sublimati corrosivi scrupulum unum.
Alcoholis . . . drachmas duas.
Farinae Tritici . drachmas tres.
Aquae destillatae quantum sufficit ut fiant pilulae centum sexaginta, quarum quaeque sublimati octavam grani partem continet. (*Ra.*)

Fer. et *B.* Sublimati semigranum, Alcoholis sufficientem ad solutionem quantitatem et Micae Panis quantum sufficit ut fiant pilulae quatuor.

℞. Sublimati corrosivi grana viginti.
Amyli . . . . . semunciam.
Gummi Arabici drachmas duas.
Aquae communis quantum sufficit ut fiant pilulae centum sexaginta. (*Ra.*)

℞. Sublimati corrosivi grana decem.

Sacchari crystallisati (Candis),
Faeculae Solani tuberosi,
singulorum drachmam unam.
Aquae sufficientem quantitatem ut fiat massa in pilulas octoginta dividenda, quarum quaeque sublimati octavam grani partem continet. (*Pie.*)

℞. Sublimati corrosivi
grana duodecim.
Aquae destillatae drachmam unam.
Solutioni adde
Mannae in lacrymis
drachmas duas.
Pulveris Liquiritiae
quantum sufficit ut fiat massa in pilulas nonaginta sex dividenda. (*Sm.*)

Die letztere Formel ist von Pelletan und die beste von allen. Man giebt Morgens und Abends Anfangs ein, dann zwei Stück.

Pilulae Vogleri. (B*.)

℞. Succi Liquiritiae depurati
drachmam unam.
Gummi Tragacanthae
scrupulos duos.
Sublimati corrosivi semiscrupulum.
Misce triturando succum cum gummi, sal in Aquae pauxillo solutum infundendo ut fiat massa in pilulas centum dividenda, quarum quaeque sublimati decimam grani partem continet.

Pilulae Muriatis Hydrargyri oxydati. (RC.)

℞. Sublimati,
Salis Ammoniaci,
singulorum grana decem.
Aquae destillatae drachmam unam.
Pulveris Radicis Liquiritiae vel
Amyli . . . . scrupulos octo.
Mellis . . . drachmam unam.
Fiat massa in octoginta pilulas dividenda. — Gabe, zwei bis vier zwei- oder dreimal täglich, mit schleimigem Trank. Bisweilen mit Zusatz von einem Scrupel Opium oder acht Gran Brechweinstein zu der Masse.

Pilulae sialagogae. (*E.*)

℞. Sublimati corrosivi,
Salis Ammoniaci,
singulorum grana quinque.
Aquae destillatae guttas triginta ad quadraginta.
Conservae Rosarum
scrupulum unum.
Pulveris Liquiritiae
quantum sufficit ut fiant pilulae quadraginta, quarum quaeque sublimati partem grani octavam continet.

Trochisci Muriatis oxygenati Hydrargyri s. escharotici s. escharotici albi. (Gal. GalM., His. *Fi. T.*)

℞. Sublimati corrosivi partem unam.
Amyli . . . . . partes duas.
Mucilaginis Gummi Arabici
quantum sufficit ut fiant trochisci. (Gal. GalM. *Fi.*)
His. Sublimati partes quatuor, Amyli septem et unam Gummi Tragacanthae pulverata Aquae purae ope in massam homogeneam redigere jubet

Chocolata antivenerea.

℞. Sublimati corrosivi grana sedecim.
Spiritus Frumenti quantum sufficit ad solutionem.
Balsami Peruviani liquidi
drachmas quatuor.
Pastae Cacao praeparatae
uncias quatuordecim.
Sacchari pulverati uncias duas.
Librae quaeque in partes triginta duas dividatur. — Gabe, von einem Viertel bis zu zwei Theilen. — Ein schlechtes verwerfliches Präparat.

§. II. Präparate, in denen die Wirkung des Sublimats durch fremde Substanzen mehr oder weniger verändert ist.

A. Durch Eisenhut.

Pilulae Aconiti mercuriales. (*Br*. Pie.*)

℞. Sublimati corrosivi . grana duo.
Extracti Aconiti Napelli
scrupulum unum.
Tritura diu in mortario vitreo ut fiant pilulae viginti. — In chronischen Krankheiten des Lymphsystems, und Flechten, besonders mit Krätz-, Scrophel- und syphilitischer Complication. — Gabe, eine Pille Morgens und Abends, alle zehen Tage um eine gestiegen.

B. Durch Alaun.

Aqua Mercurii vitriolati s. aluminosa. (Ful. *Au.*)

℞. Sublimati corrosivi,
Aluminis,
singulorum drachmas duas.
Aquae communis . libras duas.
Coquendo dimidium consume et filtra. — Ein schlechtes, keine Spur von Sublimat behaltendes Präparat.

C. Durch Spießglanz.

Electuarium antiherpeticum. (*Bo. Pie.*)

℞. Sublimati corrosivi . grana tria.
Antimonii crudi pulverati
semunciam.

Extracti Fumariae unciam unam.
Resinae Guajaci . . semunciam.
Syrupi Corticum Aurantiorum
quantum sufficit.

Jouquet verſchreibt davon eine halbe bis zwei Drachmen täglich. — Ein ſchlechtes Präparat.

D. Durch Schierling.

Pilulae antisyphiliticae. (Pul. E.)

℞. Sublimati corrosivi . grana sex,
Aquae destillatae quantum sufficit ad dissolvendum; adde
Extracti Cicutae drachmam unam.
Pulveris Cicutae quantum sufficit ut fiant pilulae quadraginta octo.

Pilulae antiherpeticae. (*Pie.*)

℞. Sublimati corrosivi grana octo.
Rhei . . . . drachmam unam.
Saponis medicinalis,
Extracti Conii,
singulorum drachmas duas.

Fiant pilulae sexaginta quatuor. — Ein ſchlechtes und verwerfliches Präparat.

Gargarisma Belladonnae cum Hydrargyro s. mercuriale. (*Au.*)

℞. Herbae Belladonnae,
— Cicutae,
singularum manipulum unum.
Seminis Lini . . . . uncias duas.
Sublimati corrosivi
grana sex ad decem.
Aquae . . . . . libras duas.

Coque per momenta aliquot. — Ganter empfiehlt dieſes Gurgelwaſſer bei Halsaffectionen nach Scharlach.

E. Durch Löffelkraut.

Syrupus antiscorbuticus Portali. (GalH. Br. Ca.)

℞. Radicis Gentianae unciam unam.
— Rubiae,
Chinae,
singulorum drachmas quatuor.
Aquae . . . . libras quatuor.

Coque ad librarum liquidi duarum remanentiam, cola et adde
Sacchari albi . . . libras tres.
Albuminis ope clarificata coque ad syrupi consistentiam et cola.

Praeterea

℞. Foliorum Nasturtii aquatici,
— Cochleariae,
singulorum uncias quatuor.
Radicis Armoraciae unciam unam.

Contunde in mortario; in succo expresso et frigide filtrato solve balnei aquae ope
Sacchari albi contusi
uncias viginti duas.

Cola, syrupum cum praemonito commisce et adde
Sublimati corrosivi grana quatuor, antea dissoluti in
Alcoholis . . drachmis duabus.

Bei Hautkrankheiten, Scrophuln, Scorbut und allen ſyphilitiſchen Uebeln. — Gabe, eine bis zwei Unzen in einer paſſenden Tiſane.

F. Durch Copaivabalſam.

Opiatum Pajot-Laforesti.

℞. Sublimati corrosivi,
Pulveris Gummi Kino,
Balsami Copaivae,
singulorum semunciam.
Gummi Arabici pulverati
sesquiunciam.
Sacchari albi pulverati
uncias quinque.
Aquae Menthae quantum sufficit.

Gummi cum aqua in mucilaginem tritis admisce triturando kino, sublimatum et balsamum, micellae Aqua Rosarum leviter humefactae adde sensim saccharum et Aquae Rosarum quantum ad electuarii consistentiam ei praebendam sufficit. — Bei chroniſchen Ausflüſſen aus der Uretra und im Anfange hitziger Harnröhrenentzündung. — Gabe, zwei Drachmen Morgens und Abends. — Man giebt es allein, entweder mit einem Aufguß von Gamander oder mit einer Taſſe eiſenhaltigem Waſſer mit Aetherſyrup verſüßt.

G. Durch Kupfer.

Pulvis causticus Krügeri. (*Ca.*)

℞. Sublimati corrosivi,
Cupri sulphurici,
singulorum grana decem.
Argenti nitrici . . . grana sex.

Ein ſchlechtes Präparat, welches auf veneriſche Auswüchſe empfohlen wird; man befeuchtet ſie damit mittelſt eines Pinſels.

Collyrium siccum. (*Vm.*)

℞. Sublimati corrosivi,
Muriatis Cupri,
singulorum grana quatuor.
Iridis Florentinae semidrachmam.
Sacchari albissimi drachmas duas.
Misce.

H. Durch Guajac.

Elixir balsamicum purificans, Essentia balsami Canadensis mundificans, Tinctura balsamica purificans s. antivenerea Falkii. (Wür. Bo. Pid. Pie. Sp. Vm.)

℞. Sublimati corrosivi
scrupulum unum.
Alcoholis . . . unciam unam.

Dissolve et solutioni adde
Resinae Guajaci,

Balsami Canadensis,
singulorum unciam unam dissoluta in
Alcoholis . . . unciis septem.
Filtra et adde deinde
Olei essentialis Sassafras
drachmas duas.
Misce lagenam agitando. (*Bo. Pie. Sp.*)

℞ Sublimati corrosivi
scrupulum unum.
Alcoholis rectificati uncias quatuor.
Dissolve et liquori adde
Terebinthinae Venetae,
Resinae Guajaci,
singularum unciam unam solutas in
Alcoholis . . . unciis quatuor.
Misce bene et adde
Olei essentialis Sassafras
drachmas duas.
Serva. (Wür.)

Pid. eandem formulam sed loco terebinthinae Balsamum Canadense adhibere jubet.

Van Mons hat dieses Präparat mit Glück vereinfacht:

℞. Sublimati corrosivi
scrupulum unum.
Olei Sassafras . drachmas duas.
Tincturae Resinae Guajaci
uncias octo.
Aquae Vitae . uncias duodecim.
Post dissolutionem filtra.

Ein kräftiges Reizmittel, welches bei vermuthlichen syphilitischen Uebeln und Krankheiten von andern Schärfen empfohlen wird. — Gabe, zehen bis zwanzig Tropfen, Morgens und Abends, in einem passenden Vehikel.

I. Durch Kleber.

Pilulae Taddei.

℞. Amyli Tritici . . libram unam.

Fiat cum Aqua destillata pasta, quae sub aqua, amyli removendi causa maluxetur; gluten per horas viginti quatuor hiberno, per octo vel decem horas aestivo tempore sibi ipsi relictum comprime deinde et agita cum solutione semunciae Saponis amygdalini in Aquae libra una, donec liquor homogeneus evadat, qui per cribrum trajiciatur; Sublimati corrosivi drachmam unam in Aquae sufficiente quantitate dissolve et liquoris glutinosi talem excessum ei tunc infunde, donec flocci exoriri desierint, qui post aliquot horarum repositionem supra linteum recepti et siccati cum Extracto Guajaci vel Juniperi in pastam redigantur in pilulas centum quadraginta quatuor dividendam.

T. Sublimati corrosivi drachmas duas, Aquae destillatae sufficientem quantitatem; solutioni capsulae porcellaneae immissae infunde, continue agitando, excessum glutinis triticei ope solutionis saponis teneri cum Aqua saturatae in emulsionem redacti; praecipitatione peracta miscellam crinio immitte ad separanda coagula sublimati et glutinis, quae collecta et inter manus deinde vero inter diversa strata chartae bibulae compressa, rupta et attenuata denique cum Extracto Graminis in pilulas 288 redigantur. — Jede Pille enthält einen halben Gran.

Taddei preist diese Pillen in venerischen Krankheiten, zu zwei oder drei bis sechs, acht und selbst mehr täglich gegeben; sie sind aber zu verwerfen, weil ihre innere Zusammensetzung noch nicht bekannt ist. Der Sublimat ist darin in zersetztem Zustande vorhanden, außerdem könnte man deren nicht acht nehmen, welche vier Gran Sublimat gleichkommen würden.

J. Durch Gnadenkraut (Gratiola).

Electuarium antisyphiliticum. (*Au. Sy.*)

℞. Sublimati corrosivi . grana tria.
Extracti Gratiolae drachmas tres.
Roob Sambuci . . uncias tres.
Misce. — Stoll verordnete diese Latwerge bei schmerzhaften, von syphilitischem Gift hergeleiteten Geschwülsten.

Mixtura antisyphilitica de Haeni. (*Sm.*)

℞. Sublimati corrosivi . grana tria.
Extracti Gratiolae drachmas duas.
— Aconiti drachmam unam.
Roob Sambuci . . uncias sex.
Misce bene. — Bei chronischer ausgearteter Syphilis empfohlen. — Gabe, ein Kaffeelöffel zwei oder drei Mal täglich, indem man mit der gratiola allmälig bis auf eine halbe Unze steigt.

K. Durch Opium.

Pilulae Sublimati corrosivi cum Opio s. Opii. (BorC. *Au.*)

℞. Sublimati corrosivi grana decem.
Opii purae . . grana quinque.
Aquae calidae . quantum sufficit ad totius solutionem; adde
Micae Panis albi vetusti pulverati
scrupulos sex.
Succi Liquiritiae
scrupulos quatuor.
Misce ut fiant pilulae centum. — Gabe, ein oder zwei Stück Morgens und Abends. (BorC. *Au.*)

℞. Sublimati corrosivi . . grana duo.
Aquae . . . quantum sufficit.
Solutioni adde
Opii . . . . . grana quatuor.

Camphorae . . . . grana octo.
Sacchari . . . semidrachmam.
Micae Panis . quantum sufficit.
Fiant pilulae quadraginta. — Gabe, drei bis fünf, Morgens und Abends. (*Au.*)

Pilulae antivenereae. (*Ra. Sm.*)

℞. Sublimati corrosivi grana quatuor.
Aquae . . . . quantum sufficit ad dissolvendum; liquori adde
Extracti Opii gummosi grana duodecim.
— Chinae scrupulum unum.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.
Fiant pilulae sedecim, quarum quaeque sublimati partem grani quartam continet. (*Sm.*)

Dieſe Pillen ſind von Frank; Dupuytren hat ſie auf folgende Weiſe verändert:

℞. Sublimati corrosivi,
Extracti Opii,
singulorum semigranum.
— Chinae . . grana decem.
Pulveris Chinae quantum sufficit ut fiant pilulae duae. (*Ra.*)

Solutio Sublimati corrosivi alcoholica opiacea. (B*. DD. *Au.*)

℞. Sublimati corrosivi granum unum.
Alcoholis . . . uncias quatuor.
Solutioni adde
Tincturae Opii spirituosae drachmam unam.
Misce bene. (DD.)

℞. Sublimati corrosivi drachmas (?) duas.
Aquae Cinnamomi vinosae unciam unam.
Solutioni adde
Laudani liquidi Sydenhami scrupulum unum.
Misce bene. (B*.)

Au. Sublimati grana quatuor, Aquae Cinnamomi vinosae uncias tres et Tincturae Opii scrupulos duos. — Es iſt ein ungeheueres Mißverhältniß zwiſchen beiden Formeln, die erſte iſt aber der zweiten vorzuziehen.

Liquor Spangenbergii. (*Pie. Sm.*)

℞. Sublimati corrosivi . grana duo.
Tincturae Opii drachmam unam.
Aquae Rosarum uncias quatuor.

Als Waſchmittel nach verdächtigem Beiſchlaf empfohlen.

Injectio mercurialis opiacea. (*Ra.*)

℞. Sublimati corrosivi grana duodecim.
Aquae destillatae . libras duas.
Solutioni adde
Laudani liquidi Sydenhami unciam unam.

Bei Frauen, welche an veneriſchen Geſchwüren leiden.

Litus Hydrargyri, Collutorium mercuriale. (*Au.*)

℞. Sublimati corrosivi . grana sex.
Extracti Cicutae,
— Chamomillae,
singulorum drachmas duas.
Tincturae Opii drachmam unam.
Mellis rosati . . unciam unam.

Von Ruſt empfohlen.

Aqua ophthalmica Conradi s. mercurialis s. Hydrargyri muriatici corrosivi cum Opio, Collyrium ex Hydrargyro muriatico corrosivo. (DD. Han. WW. *Au. Ra. Vm.*)

℞. Sublimati corrosivi granum unum.
Infusi Florum Sambuci uncias quatuor.
Tincturae Opii spirituosae drachmam unam.
Sublimato in infusione soluto adde tincturam (DD.)

℞. Sublimati corrosivi granum unum.
Aquae Florum Sambuci drachmas sex.
Tincturae Opii . guttas decem.
Succi Liquiritiae drachmam unam.
Misce. (*Au.*) — Man giebt dieſe Auflöſung innerlich zu zwanzig Tropfen alle drei Stunden.

℞. Sublimati corrosivi granum unum.
Aquae Rosarum uncias quatuor.
Extracti Opii . . . grana duo.
Misce. (WW.)

Han. et *Vm.* Sublimati granum unum, Aquae Rosarum uncias sex et Laudani liquidi Sydenhami scrupulos duos; — *Ra.* Sublimati granum unum, Gummi Tragacanthae scrupulum unum, Aquae Rosarum uncias quatuor et Laudani liquidi guttas octodecim.

℞. Sublimati corrosivi grana duo.
Extracti Opii . semiscrupulum.
Aquae Rosarum uncias quatuor.
Solutioni adde
Mucilaginis Seminum Cydoniorum semunciam.

Dieſe Formel hat viel Aehnlichkeit mit der vorigen. (*Vm.*)

℞. Aquae Chamomillae unciam unam.
Seminum Cydoniorum grana viginti.
Fiat mucilago, cui adde
Sublimati corrosivi granum unum.
Misce sedulo. (*Au.*)

℞. Sublimati corrosivi granum unum.
Aquae Rosarum . . uncias sex.
Laudani Sydenhami semidrachmam.
Misce. (*Au.*)

Gargarisma mercuriale. (*Ra.*)

℞. Foliorum siccorum Cicutae semunciam.
Aquae . . . . . sesquilibram.
Coque et adde colaturae
Sublimati corrosivi . grana tria.
Laudani liquidi Sydenhami drachmam unam.
Mellis . . . . . uncias duas.

Elixir Weighti. (*Vm.*)

℞. Opii . . . . drachmam unam.
Pimentae . . . drachmas duas.
Serpentariae Virginicae drachmas tres.
Aquae Vitae uncias octoginta duas.

Infunde frigide, post sufficientem extractionem cola exprimendo et colaturae adde

Resinae Guajaci drachmas decem et post hujus solutionem

Sublimati corrosivi semidrachmam.

Dissolve et filtra.

Cereoli mercuriales dissolubiles. (*Au.*)

℞. Sublimati corrosivi grana quatuor.
Extracti Opii drachmam unam.
Aquae . . . . . uncias duas.
Gummi Arabici quantum sufficit

ut fiat solutio spissa, cui repetitò fila gossypina immergantur, post quamque immersionem siccanda. — Hecker empfahl sie bei chronischer Gonorrhoe.

L. Durch Blei.

Trochisci de Minio s. escharotici. (Gal. Sar. Wir. *Ca. Fi. Sp. T. Vm.*)

℞. Sublimati corrosivi partes duas.
Minii . . . . . partem unam.
Micae Panis pulveratae partes quatuor.
Aquae Rosarum quantum sufficit.

Fiant trochisci voluminis et formae grani avenae. (Gal *Sp.*)

Wir. Sublimati partem unam, Minii tantidem, Amyli duas, Micae Panis tantidem et Mucilaginis Gummi Tragacanthae sufficientem quantitatem; — *Vm.* Sublimati partes duas, Minii unam, Micae Panis octo et Aquae sufficientem quantitatem; — Sar. Sublimati, Minii, singulorum drachmam unam, Micae Panis unciam unam et Aquae quantum sufficit; — *Ca.* Sublimati unciam unam, Minii semunciam, Micae Panis uncias sex et Aquae sufficientem quantitatem; — *Fi.* Minii drachmam dimidiam, Sublimati drachmam unam, Micae Panis unciam dimidiam, Aquae Rosarum quantum sufficit; — *T.* Micae Panis uncias tres, Sublimati corrosivi drachmas sex et Aquae Rosarum quantum sufficit.

Injectio hydrargyro-saturnina s. de Plumbo et Mercurio, Solutio hydrargyrata. (*Sw. Sy.*)

℞. Lithargyri . . . unciam unam.
Sublimati corrosivi semidrachmam.
Aceti . . . . uncias quinque.

Digere in loco calido per horas duodecim; vas saepius agitando; partem liquidi limpidam decantha et hujus liquoris drachmis duabus vel quatuor adde

Aquae destillatae uncias quatuor.

Misce bene. (*Sy.*)

℞. Sublimati corrosivi,
Plumbi acetici crystallisati, singulorum semidrachmam.
Aquae Rosarum . libram unam.

Dissolve. (*Sy.*)

℞. Sublimati corrosivi . grana duo.
Aquae purae . uncias sedecim.

Solutioni adde

Plumbi subacetici liquidi guttas triginta.

Misce bene. (*Sy.*)

Sw. Sublimati semigranum, Aquae uncias quatuor et Subacetatis guttas octo; — vel: Sublimati semiscrupulum, Aquae uncias quindecim et Subacetatis drachmas duas; — vel: Sublimati semidrachmam, Subacetatis uncias quinque et cuique drachmae miscellae harum substantiarum simul triturataram Aquae librae unius additionem.

Ein schlechtes Präparat. — Man hat es bei chronischer und selbst bei hitziger Harnröhrenentzündung empfohlen.

Lotio Plumbi composita s. exsiccans. (*Sw.*)

℞. Acetatis Plumbi liquidi,
Sulphatis Zinci, singulorum semunciam.
Sublimati corrosivi grana viginti.
Aquae . . . . . libras duas.

Ein schlechtes Präparat, welches man bei manchen pruriginösen Ausschlägen an dem Scrotum und den Geschlechtstheilen empfohlen hat.

Aqua antiherpetica Cardinalis de Lugnes. (*Bo. Ca. Pie.*)

℞. Sublimati corrosivi sesquidrachmam.
Cerussae . . drachmas quatuor.
Aluminis . . . drachmas tres.
Albuminis Ovi . . . . no. 1.
Aquae Rosarum . . uncias octo.

Commisce bene. (*Pie.*)

Bo. et *Ca.* Sublimati semunciam, Cerussae uncias duas, Aluminis unciam unam et Aquae communis libras duas.

Ein schlechtes Präparat; man tränkt

Compressen damit, welche vorsichtig auf Flechten anzuwenden sind.

Liquor ad condylomata, Aqua caustica, Aqua cathaeretica Plenckii. (Wür. *Au. Ca. Sw. Sy. Vm.*)

℞. Sublimati corrosivi,
Aluminis,
singulorum unciam unam.
Cerussae,
Camphorae,
singulorum drachmam unam.
Alcoholis,
Aceti albi,
singulorum uncias duodecim.
Misce et absque filtratione serva. (Wür. *Vm.*)

Ca. Sublimati drachmas duas, Aluminis, Cerussae, Camphorae, singulorum tantidem, Alcoholis et Aceti, singulorum sesquilibram.

℞. Sublimati corrosivi
drachmam unam.
Aluminis,
Camphorae,
Acetatis Plumbi crystallisati,
singulorum semidrachmam.
Alcoholis,
Aceti, singulorum semunciam.
Misce bene. (*Sy.*)

Au. et *Sw.* omisso plumbo Sublimati drachmam unam, Aluminis, Camphorae, singulorum semidrachmam, Aceti, Alcoholis, singulorum semunciam; — vel: Sublimati uncias duas, Aluminis tantidem, Camphorae drachmas duas, Alcoholis et Aceti, singulorum libras duas.

Ein schlechtes Präparat; man tränkt Plumaceaux damit, welche man auf venerische Auswüchse applicirt. — Das folgende ist noch weniger rationell und muß ganz verworfen werden.

Aqua mercurialis s. Stettinensis ad usus externos. (Br. Wir.)

℞. Florum Granati . . semunciam.
Plumbi acetici crystallisati,
Tartari albi,
singulorum drachmam unam.
Radicis Tormentillae
drachmas duas.
Aluminis saccharati unciam unam.
Sublimati corrosivi,
Ligni Santali rubri,
singulorum drachmam unam.
Alcoholis rectificati
uncias sedecim.
Post sufficientem digestionem cola exprimendo. (Br.)

℞. Cerussae . . . . unciam unam.
Aluminis . . . . drachmas sex.
Lithargyri . . . . semunciam.
Sublimati corrosivi,
Salis Ammoniaci,
singulorum drachmam unam.
Aquae Solani nigri,
— Plantaginis,
— Rosarum,
— Nymphaeae,
singularum uncias quatuor.
Aceti . . . . . semilibram.
Coque leviter et absque colando serva. (Wir.)

Unguentum siccativum. (*Sw.*)

℞. Tutiae praeparatae,
Sublimati corrosivi,
singulorum scrupulum unum.
Oxydi Mercurii rubri,
Acetatis Plumbi,
Aluminis calcinati,
singulorum drachmas duas.
Axungiae Porci uncias quatuor.
Misce triturando.

M. Durch Rhabarber.

Pilulae mercuriales. (GalF. *Ra.*)

℞. Sublimati corrosivi grana quatuor.
Alcoholis . . . guttas aliquot.
Solutioni pedetentim adde
Pulveris Rhei,
— Resinae Guajaci,
singulorum drachmam unam.
Extracti Liquiritiae
quantum sufficit
ut fiant pilulae granorum quinque. (GalF.)

Ra. Sublimati scrupulum unum, Rhei drachmas duas, Saponis medicinalis semunciam, Pulveris Liquiritiae et Syrupi Florum Aurantiorum quantum sufficit ut fiant pilulae centum quadraginta quatuor. — Die letztere Formel ist zu verwerfen.

N. Durch Scammonium.

Pilulae Scammonii hydrargyrosae s. mercuriales s. e Scammonio compositae. (Suec.)

℞. Sublimati corrosivi,
Scammonii,
singulorum grana duodecim.
Gummi Gutti . grana quinque.
Syrupi Sacchari quantum sufficit ut fiant pilulae sex. (!)

Durch Zusatz einer Drachme Rhabarberextract und durch Vertheilung der Masse in vier und zwanzig Pillen würde man ein leichter zu handhabendes und weniger gefährliches Präparat erhalten.

O. Durch Senna.

Pilulae antivenereae Lassónne. (*Sm.*)

℞. Sublimati corrosivi
grana octodecim.

Mercurii dulcis
grana quinquaginta quatuor.
Diu triturati adde
Resinae Guajaci semidrachmam.
Sennae pulveratae
drachmam unam.
Syrupi Dianthi quantum sufficit
ut fiant pilulae duorum granorum. — Gabe, drei Stück täglich, allmälig gestiegen. — Ein schlechtes Präparat.

Iodureta Mercurii.

§. I. Proto-Ioduretum.

Fer. GalH. *Ma. T.*

℞. Protonitratis Mercurii crystallisati
partes centum.
Aquae . . partes quadringentas.
Dissolve, filtra liquorem et ei sensim infunde
Iodureti Potassii in Aqua Acido nitrico acidulata dissoluti
quantum sufficit
ut non amplius enascatur praecipitatum, quod filtro receptum Aqua destillata abluatur, donec a potassa non amplius nigrum praecipitetur, quo facto siccatum a luce tutum serva.

T. Obtinetur reciproca decompositione Hydriotatis Potassae et Nitratis Protoxydi Mercurii.

§. II. Deuto-Ioduretum.

Fer. *Fi. Ma. T*

℞. Sublimati corrosivi
partes septuaginta.
Iodureti Potassii partes centum.
Dissolutis seorsim in Aquae destillatae sufficiente quantitate, liquores filtrati sensim commisceantur; praecipitatum in filtro receptum Aqua destillata ablue, donec saporis expers evadat, quo facto siccatum et pulveratum a luce tutum servetur. (*Ma.*)

℞. Solutionis Hydriodatis Potassae
quantum vis.
Infunde ei guttatim solutionem Sublimati corrosivi, donec nihil amplius praecipitetur; praecipitatum lotum sicca. (Fer. *Fi.*)

T. Solutioni filtratae Hydriodatis Potassae puri unciae dimidiae vel unius in Aquae destillatae sufficiente quantitate solutionem infundere jubet filtratam Sublimati corrosivi cum Aqua destillata paratam.

Die Queckſilberiodüren ſind kräftige Reizmittel, von denen das zweite an Wirkſamkeit ſelbſt den Sublimat übertrifft; man hat ſie beſonders bei der Behandlung veneriſcher Krankheiten mit Scrophelcomplication angewendet. Es bedurfte bisweilen nur einer Berührung von wenigen Augenblicken mit dem Deutoiodüre, um eine ſehr heftige rothlaufartige Hautentzündung hervorzubringen. Man fängt mit einem Sechszehntheil an und ſteigt allmälig bis zu einem Viertelgran.

Solutio Deuto-iodureti Mercurii alcoholica, Alcohol cum Deuto-iodureto Mercurii. (Fer. GalF. GalH. *Fi. Ma.*)

℞. Deuto-iodureti Mercurii
grana viginti.
Alcoholis (36°) . sesquiunciam.
Dissolve. (GalF. GalH. *Ma.*)

Sechs und zwanzig Tropfen enthalten beinahe einen Achtelgran Jodüre.

Fer. Alcoholis unciam unam tantum praescribit; — *Fi.* Alcoholis 36° unciam unam, Deuto-iodureti scrupulum unum. — Zehen Tropfen enthalten einen Sechszehntheilgran Jodüre. — Gabe, zehen, fünfzehen und zwanzig Tropfen in einem Glaſe deſtillirtem Waſſer, da das gemeine reine Waſſer eine Zerſetzung bewirken würde.

Solutio Deutoiodureti Mercurii aetherea. (GalF. *Ma.*)

℞. Deutoiodureti Mercurii
grana viginti.
Aetheris sulphurici sesquiunciam.

Die Gabe iſt etwas geringer als bei der alcoholiſchen Auflöſung.

Pilulae Iodureti Mercurii. (Fer. GalF. GalH. *B. Ma.*)

℞. Proto- vel Deutoiodureti Mercurii
granum unum.
Extracti Liquiritiae
grana duodecim.
Pulveris Liquiritiae
quantum sufficit
ut fiant pilulae octo. (*Ma.*)

GalF. et GalH. loco extracti liquiritiae Extractum Juniperi adhibent.

℞. Deuto- vel Protoiodureti Mercurii
granum unum.
Pulveris Liquiritiae . grana sex.
Roob Sambuci quantum sufficit
ut fiant pilulae octo. (Fer.)

℞. Proto- vel Deutoiodureti Mercurii
granum unum.
Extracti Juniperi grana sedecim.
Pulveris Liquiritiae
quantum sufficit
ut fiant boli octo. (*B.*)

Gabe, Morgens und Abends zwei Stück, bis vier auf die jedesmalige Gabe geſtiegen.

Unguentum s. Pomatum Iodureti Mercurii. (GalH. *B. Ma. Pie. Ra. T.*)

℞. Proto- vel Deutoiodureti Mercurii
grana viginti.
Axungiae praeparatae
sesquiunciam.
Misce triturando. (*Ma.*)

T. Deutoiodureti drachmam unam,

Axungiae praeparatae unciam unam; mercurium extingue in axungiae pondere circiter aequali et adde tunc per vices reliquam axungiam. Paratur quoque extempore.

℞. Deutoiodureti Mercurii grana quindecim.
Axungiae . . . . uncias duas.
Essentiae Bergamottae guttas viginti.
Misce. (*Ra.*)

℞. Protoiodureti Mercurii semidrachmam.
Axungiae . . . sesquiunciam.
Essentiae Bergamottae guttas quindecim.
Misce. (*Ra.*)

Pie. Iodureti grana quindecim, Axungiae unciam unam et Essentiae Caryophyllorum guttas viginti.

Zur Beſchleunigung der Vernarbung ſchmerzloſer Geſchwüre, auch zum Einreiben auf Drüſengeſchwülſte empfohlen. Die mit dem Deutoiodure iſt reizender als die andere, und muß in geringerer Menge angewendet werden.

Cyanuretum Mercurii.

Hydrocyanas s. Prussias Mercurii, Borussias s. Cyanuretum Hydrargyri, Mercurius hydrocyanicus, Hydrargyrium Borussicum s. hydrocyanicum s. bicyanatum; blauſaures Queckſilber. (B*. Bel. Fer. Gal. HassP. *Br*. T. Vm.*)

℞. Coerulei Borussici partes duas.
Oxydi rubri Mercurii partem unam.
Pulverata et bene mixta in capsulam vitream ingere iisque infunde
Aquae purae . . . partes octo.
Coque continuè cum spathula ferrea agitando, donec mixtura flavum colorem acceperit, filtra deinde et residuum ablue cum
Aquae purae . partibus quatuor.
Liquores commixti vaporent, donec guttula, corpori frigido instillata, concrescat; tum ad locum frigidum repone, ut in crystallos abeant, quae nova crystallisatione purificentur. (Bel. Fer. Gal. *T.*)

HassP Coerulei Parisiensis puri partes duas, Oxydi tres, coquere cum Aquae destillatae partibus sedecim per semihoram etc. residuum Aquae destillatae fervida quantitate necessaria eluere et crystallos si flavescentes evadunt, resolutione in Aqua destillata et coctione cum Mercurii calcinati rubri parva quantitate a ferro liberare et nova crystallisatione depurare; — GalH. ab initio Coeruleum borussicum Acido sulphurico vel muriatico tenui lavare jubet, ut alumen separetur, quo neglecto agendum foret cum incerta et variabili Ferrocyanati ferri quantitate

℞. Oxydi rubri Mercurii partes decem.
Coerulei borussici partes septem.
Pulverata seorsim, secundo pauxillum Alcoholis addendo, in retortam immitte cum
Aquae . . . partibus octoginta.
Coque in balneo arenae, donec massa colorem flavescenti viridem acceperit; filtra bis per eandem chartam; residuum Aqua frigida edulcoratum in balneum arenae remitte et tunc ab igne remove; lente in crystallos abeat et nova crystallisatione purificetur. (B*. *Vm.*)

℞. Oxydi rubri Mercurii drachmas duodecim.
Coerulei Borussici . uncias octo.
Aquae destillatae uncias viginti septem.
Porphyrisata seorsim oxydum et sal cum Aquae unciis novem in capsulam porcellaneam immitte, et per semihoram cocta inter continuam agitationem, decantha et filtra; residuo infunde Aquae bullientis unc as octodecim; coque per semihoram et filtra; colaturae commixtae evaporent ad cuticulae usque apparitionem et sepositione in loco frigido in crystallos abeant. (*Br*.*)

Ein fürchterliches Gift, welches man in veneriſchen Krankheiten verſucht hat, das aber ſeiner verderblichen Eigenſchaften wegen, worin es noch über dem Sublimat ſteht, nicht angewendet werden ſollte. Man giebt es wie den letztern, aber in etwas minder ſtarken Gaben. Außerdem hat es nur pharmaceutiſchen Nutzen.

Hydrocyanas Mercurii, Liquor antisyphiliticus Chaussieri. (*Ra.*)

℞. Cyanureti Mercurii grana octo.
Aquae destillatae libram unam.
Jede Unze enthält einen halben Gran Cyanür.

Unguentum Cyanureti Mercurii. (*Ra.*

℞. Cyanureti Mercurii grana sedecim.
Axungiae Porci . unciam unam.
Essentiae Citri guttas quindecim.
Bei ſchuppigen feuchten Flechten mit ſtarker Entzündung und heftigem Jucken empfohlen.

Ammoniuretum Hydrargyri s. Mercurii. (B*. *Br. Fi. Vm.*)

℞. Oxydi rubri Mercurii pulverati partes duas.
Ammoniaci liquidi concentratissimi partem unam.

Agitata vivaciter repone deinde per horas aliquot; agita iterum et sic perge, donec massa adspectum crystallinum prae se ferat, decantha deinde et leviter lotam sicca, pulvera et iterum lotam denuo sicca. (B°. *Vm.*)

℞. Praecipitati (Oxydi albi Mercurii) albi . . . . . quantum vis.
Ammoniaci liquidi quantum sufficit ad dissolutionem praecipitati. (*Br. Fi.*)

Letztere Formel giebt ein ganz von der vorigen verschiedenes Product, nämlich Ammoniumquecksilbersulphat.

Das Ammoniumquecksilber ist äußerlich zur Zertheilung von Grostosen empfohlen worden.

Linimentum Ammoniureti Mercurii. (*Br°.*)

℞. Olei Olivarum drachmas novem
Ammoniureti Mercurii semunciam.
Contere in mortario vitreo. — Dieses Liniment besteht aus Ammoniumquecksilbersulphat.

Boras Hydrargyri, Sal sedativum mercuriale, Mercurius boraxatus. (B°. *Sp. Sw°. Vm.*)

℞. Mercurii,
Acidi nitrici concentrati,
singulorum uncias duas.
Solutione peracta, liquori Aquae partibus quatuor diluto et filtrato infunde sensim solutionem aquosam Subboratis Sodae, donec nullum prodeat amplius praecipitatum, quod lotum siccetur. (*Sp. Sw°. Vm.*)

℞. Mercurii dulcis . . partes 22,2.
Boratis neutralis Sodae — 26,5.
Tritura simul in mortario vitreo; post horae quadrantem adde Aquae parvam, deinde majorem et denique magnam quantitatem; liquido decanthato, praecipitatum bene ablue, donec aqua saporis sit expers et sicca. (B°. *Vm.*)

Dieses Salz kann den mercurius dulcis ersetzen. — Gabe, zwei Gran täglich, allmälig gestiegen.

Carbonas Mercurii. (Fer. *Fi. T. Vm.*)

℞. Dissolutionis Sublimati corrosivi saturatae . . partes quatuor.
Acidi carbonici liquidi partes sedecim.
In lagenam intromissis adde sensim, probe agitando, solutionem ex
Carbonatis neutralis Potassae parte una.
Lagena tunc per quatuordecim vel plures dies in loco frigido relicta, crystallos in superficie liquidi conspicuas leviter ablue et sicca. (*Vm.*)

Man kann hierher die Formel von Pal. zur Bereitung des Turpethum minerale ziehen, wovon man, wenn man sich nach ihr richtet, nicht ein Atom erhält, da nach derselben eine Auflösung des Sublimats durch eine andre von kohlensäuerlichem Kali zersetzt werden soll.

℞. Acetatis Mercurii . quantum vis.
Aquae bullientis quantum sufficit ad dissolvendum; liquori calido adhuc filtrato infunde Ammonium subcarbonicum liquidum, donec praecipitatum edere cessaverit, quod lotum siccetur. (Fer. *Fi. T.*)

Mercurius praecipitatus fuscus s. Wurtzii, Turpethum rubrum. (Li.)

℞. Protonitratis Mercurii liquidi libras duas.
Infunde sensim
Natri subcarbonici liquidi quantitatem sufficientem
donec nullum amplius provocetur praecipitatum, quod separatum et Aqua calida lotum siccetur.

Phosphas Hydrargyri s. Mercurii, Hydrargyrum phosphoratum s. phosphoreum. (B°. Bor. O. *C. Sw. Vm.*)

℞. Nitratis Mercurii . quantum vis.
Infunde sensim
Solutionem aquosam Subphosphatis Sodae . . quantum sufficit ut non amplius prodeat praecipitatum, quod ablutum siccetur. (B°. Bor. O. *Sw. Vm.*)

℞. Sublimati corrosivi quantum vis.
Dissoluto in Aqua calida adde sensim
Solutionis aquosae calidae Subphosphatis Sodae quantum sufficit ut non amplius exoriatur praecipitatum, quod lotum sicca. (*Sw°. Vm.*)

℞. Mercurii dulcis . partem unam.
Subphosphatis Sodae partes duas.
Bene mixtis adde, triturando in mortario vitreo
Aquae calidae . partes quatuor.
Post horam unam liquido decanthato praecipitatum lotum super filtro siccetur. (*Sw°. Vm.*)

C. Solutionem Nitratis Mercurii ope illius Subphosphatis Sodae decomponere jubet.

In England und Deutschland hat dieses Präparat einigen Ruf gegen rebellische und ausgeartete syphilitische Uebel, in Frankreich ist es dagegen wenig in Gebrauch. — Gabe, ein halber oder ganzer Gran, in Pulver mit Zucker und Zimmt. Auch äußerlich in Salbenform. Bowdet glaubt, statt seiner so wie für viele andere ähnliche Präparate die von ihm entdeckte *Phosphas ammoniaco-mercurialis*, welche sehr leicht auflöslich ist, anwenden zu können. Dieses

Präparat kömmt mit dem merc. dulcis und wahrscheinlich mit noch andern Quecksilbersalzen zu dem *Praecipitatus roseus* oder *Rosa mineralis*, welchen man erhält, indem man in eine wässerige Auflösung des salpetersauren Quecksilbers Urin gießt; man verschrieb ihn ehedem als Purgirmittel zu sechs bis zehen Gran.

Subdeutosulphas Hydrargyri s. Mercurii, Calx Mercurii vitriolata, Hydrargyrus vitriolatus, Mercurius vitriolatus s. flavus s. corrosivus flavus s. emeticus flavus s. praecipitatus flavus s. causticus flavus s. luteus, Oxydum Hydrargyri sulphuricum, Sulphas Hydrargyri s. Hydrargyri luteum s. cum excessu Oxydi, Subsulphas Hydrargyri peroxydati s. flavus, Turpethum minerale, Praecipitatus flavus, Sulphas Mercurii oxydulatum; Mineralturpith. (A. Ams. B*. Br. Du. Ed. Fer. Gal. Gen. HassP. Li. Lus. Sar. Wir. Würz. *Br. C. Fi. Sp. Sw. T. Vm.*)

℞. Mercurii . . . . partem unam.
Acidi sulphurici . . partes duas.

Caléfac gradatim, donec massa alba salina prodierit, quâ igne aucto siccata Aqua destillata adspersâ, totum in mortario vitreo trituretur; sepone deinde, liquidum decantha et pulverem in fundo subsidentem Aqua destillata ablue, donec haec saporis expers evadat. (Ams. Gen. Lus. Sar. Wür.)

B*. Mercurii partes duas et Acidi unam cum dimidia; — *Br.* Mercurii tres et Acidi quatuor cum dimidia; — Gal. Mercurii duas et Acidi (66°) duas cum dimidia; — Am. Ed. *C.* et *Sp.* Mercurii duas et tres Acidi; — Du. Mercurii unam et Acidi unam cum dimidia; — Br. Fer. et Wir. Singulorum partes aequales; — *Vm.* Mercurii 190 et Acidi 200; — HassP. Mercurii uncias quatuor, Acidi Vitrioli concentrati uncias quinque in cucurbita calefacere ad ebullitionem acidi et donec massa salina in cucurbita restans sicca appareat, caeterum fere ut Ams. Gen. etc.; — *Fi.* Mercurii libras duas, Acidi sulphurici tres, Aquae destillatae vel pluvialis viginti, acido in retorta vitrea mercurio infuso in balneo arenae ad siccum destillent etc.; — Fluido solutionibus inservienti infunde Spiritum Salis Ammoniaci per Alcali fixum, donec pulvis albus praecipitatur, qui pluries lotum et siccatum praebet *Oxydum album Mercurii* in praeparatione Ammoniureti Mercurii adhibitum. (*Fi.*)

Li. Mercurii uncias quinque, Acidi sulphurici concentrati sex; solutione peracta, sal siccatum et pulveratum in lagenam immitte continentem Aquae bullientis libras duas et Olei Tartari per deliquium unciam unam, tunc praecipitatum separatum sicca.

℞. Acidi sulphurici pondere ipsi aequali diluti . . quantum vis.
Oxydi rubri Mercurii quantum sufficit

ad saturandum acidum. Evaporatae ad siccum et pulveratae massae infunde Aquae bullientis pondus decuplum, agita, sepone, decantha et praecipitatum lotum sicca. (*Vm.*)

T. parare jubet triturando in mortario porphyreo Sulphatem Deutoxydi Mercurii et inter continuam trituration Aquam bullientem affundendo, post aliquot momentorum sepositionem liquidum decanthare, pulveri residuo novam Aquae quantitatem per vices infundere, donec pulchrum colorem flavum acceperit, et siccare.

Ein heftiges Brech- und Purgirmittel, welches man ehedem als Sicherungsmittel gegen Pocken empfahl, heutzutage aber nur noch bei hartnäckigen Exanthemen anwendet, gegen welche es noch für das wirksamste aller Quecksilberpräparate gilt. — Gabe, von einem Viertelgran zwei oder drei Mal täglich, bis zu einem, zwei oder höchstens drei Gran.

Boli emetici. (*Pie. Sa.*)

℞. Turpethi mineralis grana septem.
Conservae Rosarum rubrarum scrupulum unum.

Fiat bolus unus. (*Sa.*)

Pie. Turpethi grana quinque.

Beide Gaben sind zu stark, besonders die erste, drei Gran sind hinreichend. — Besser man verzichtet auf ein solches Brechmittel ganz.

Unguentum Turpethi mineralis s. Sulphatis Hydrargyri s. Oxydi albi Mercurii per Acidum sulphuricum. (B*. *Br. Ca. Ra. Sm. Sw.*)

℞. Turpethi mineralis pulverati partem unam.
Axungiae Porci . . partes octo.

Tritura sal in mortario vitreo, cum axungia lenti calore liquata commisce et ad refrigerationem usque tritura. (*Sm. Sw.*)

Br. Turpethi partem unam et quatuor Axungiae; — *Ca.* et *Ra.* Turpethi unam et sedecim Axungiae.

℞. Turpethi mineralis pulverati partem unam.
Cerati simplicis . partes decem.

Misce bene. (B*.)

Alibert wendet diese Salbe oft an zur Reizung mancher Flechten.

Unguentum s. Pomatum antiherpeticum Cullerieri. (*Pie. Ra.*)

℞. Turpethi mineralis,

Laudani liquidi Sydenhami, singulorum drachmam unam.
Florum Sulphuris lotorum semidrachmam.
Axungiae Porci . unciam unam.
Tritura simul.

Unguentum s. Pomatum antiherpeticum Chevallieri. (GalH.)

℞. Turpethi mineralis drachmas duas.
Calcariae muriaticae drachmas tres.
Olei Amygdalarum dulcium drachmas sex.
Axungiae Porci . . uncias duas.
Misce triturando.

Sulphas Mercurii, Sulphas Protoxydi et Deutoxydi Mercurii. (GalH. *Br. T. Vm.*)

℞. Mercurii . . . . . uncias tres.
Acidi sulphurici uncias quatuor cum dimidia.

Calefac, balnei arenae ope, in retorta, donec vapores acidi sulphurosi prodire coeperint, tunc ab igne remove et massam salinam formatam separatam in lagena vitrea serva. (*Br.*)

Vm. jubet: 1) commiscere Oxydi rubri Mercurii partes decem cum dimidia et Acidi sulphurici quinque, Aqua sensim addita, et commixtione peracta ad perfectam usque siccitatem calefacere; — 2) coquere Mercurii et Acidi partes aequales ad perfectam exsiccationem usque; — 3) calefacere simul Mercurii partes novem cum dimidia et Acidi decem, et massam ad siccum evaporatam adhuc calidam triturare cum Mercurii partibus 4,75.

Dieſe vier Verfahrungsweiſen geben, vielleicht mit Ausnahme der zweiten, ein Deutosulphat mit einer gewiſſen Menge Protosulphat vermiſcht

T. 1) Mercurii partem unam in duplici circiter Acidi sulphurici concentrati pondere coquere et ad siccum redigere — vel 2) Solutioni Nitratis Protoxydi Mercurii infundere parvum excessum Sulphatis Sodae, decanthare et praecipitatum album obtentum in filtro chartaceo exstillare. — Sulphas deutoxydi eodem modo ut 1) sed in proportione ut 1 ad 5 adhibitis mercurio et acido.

Secundum GalH. Protosulphas obtinetur decompositione Protonitratis puri in Aqua Acido nitrico acidulata soluti per sufficientem quantitatem Sulphatis Sodae vel Potassae, praecipitatum sedulo abluendo et a luce tutum siccando. (GalH.)

Beide ſind in der Medicin ungebräuchlich, dienen aber, beſonders das erſte, zu mehreren pharmaceutiſchen Operationen.

Subdeutosulphas ammoniaco-mercurialis, Oxydum album Mercurii per Acidum sulphuricum. (*Br. Fi. Sw.*)

℞. Mercurii . . . . libras duas.
Acidi sulphurici . . libras tres.

Digerendo in balneo aquae dissolve, tunc liquorem Aqua dilue, praecipitatum turpethi mineralis formatum separa et supersulphati mercuriali supernatanti infunde sensim Subcarbonatem Ammoniaci liquidi vel Ammonium causticum liquidum, donec praecipitatum non amplius evadat, quod Aqua destillata bene ablutum leni igne siccetur.

Fi. ſ. vorige Seite. — Dieſes Präparat dient nur zur Bereitung des von Brugnatelli uneigentlich ſogenannten Ammoniuretum Mercurii.

Hyposulphis Mercurii et Potassae, Sulphis sulphuratus Potassae et Mercurii. (*Vm.*)

℞. Hyposulphitis Potassae partes duas cum dimidia.
Oxydi rubri Mercurii partem unam.

Dissolve sal in Aqua bulliente, adde oxydatum pulveratum et agita ad dissolutionem usque; liquorem adhuc calidum filtra, tunc postquam refrixerit, crystallos Aquae frigidae pauxillo ablutas solve in Aquae calidae minima qua potest quantitate, et liquorem novae crystallisationi subjice.

Auf gleiche Weiſe bereitet man die *Hyposulphis Mercurii et Sodae* und die *Hyposulphis Mercurii et Ammonii.*

Sub-Protonitras Mercurii, Hydrargyrum oxydatum nigrum s. oxydulatum nigrum, Oxydulum Hydrargyri Hahnemanni s. salinum s. ammoniacale, Mercurius solubilis Hahnemanni, Calx cinerea Mercurii, Oxydum Hydrargyri cinereum s. nigrum mediante Ammoniae praecipitatum s. ammoniacale s. nitrico-ammoniacale s. salinum s. hydrargyrosum, Oxodes Hydrargyri nigrum, Oxynitras Hydrargyri et Ammoniae, Praecipitatus niger s. solubilis niger, Protoxydum Hydrargyri nitrico-ammoniacale, Sub-Protonitras Hydrargyri et Ammoniae, Hydrargyrum oxydulatum nitrico-ammoniatum, Mercurius praecipitatus niger, Pulvis Hydrargyri cinereus, Turpethum nigrum, Hahnemann'ſches Queckſilber. (A. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. D. Du. Gal. GalM. Ham. Hass. HassP. Li. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Wir. *Br. Ca. Fi. Sw. T. Vm.*)

℞. Acidi nitrici . . uncias quinque.

Infunde in cucurbitam vasi magno Aqua frigida repleto immersam et loco frigido positam; adde

Mercurii purissimi . semunciam.

Metallo dissoluto, iterum unam pri-

mùm, deinde uncias tres cum dimidia adde, balneum, si ut calefiat in eo est, refrigefaciendo. Crystalli si quae oriantur, quae ab acido non dissolvuntur, vaporationi spontaneae subjice et tunc liquorem decantha. Crystallos Aquae destillatae pauxillo ablutas in filtro absque calore sicca, tunc in Aquae destillatae libris quinque dissolve, et solutionem filtratam agitando Ammoniaco satura ac sepone; decantha liquidum supernatans praecipitato, quod Aqua destillata lotum et aëri expositum absque igne siccatum pulvera (Li.)

HassP. fere eodem modo procedit; — RC. Mercurii arbitrariam quantitatem in Acidi nitrici sufficienti intra phialam vasi amplo, aqua fluviali frigida repleto impositam solvere, crystallis Aqua destillata ablutis; solutis et filtratis addere guttatim, saepius agitando, Ammoniae liquidae quantum sufficit ad mercurium penitus praecipitandum, pulverem repetitis vicibus Aqua fervida abluere et absque calore siccare.

Dieß ist das von Hahnemann selbst empfohlene Verfahren; das in allen andern Pharmacopöen angezeigte ist nicht wesentlich davon verschieden.

℞. Mercurii . . . . partes tres.
Acidi nitrici 33° . partes duas

In phialam immissa et in balneo arenae collocata modice calefac et coquendo continua, donec crystalli formari coeperint; ab igne remove, agita ut crystallisatio confusa provocetur, mortario vitreo immitte, triturando, et adde Aquae destillatae parvam quantitatem cum Acidi nitrici pauxillo commixtam; sepone, decantha et eandem operationem cum residuo repete, donec nihil mercurii quod non sit dissolutum, remaneat; liquoribus commixtis guttatim instilla Ammoniacum causticum liquidum, continue agitando; post subsidentiam pulvis pluribus vicibus Aqua lotus et supra filtrum eguttatus in balneo vaporis siccetur. (GalM.)

Das Operativverfahren ist fast überall dasselbe. Du. und Br. nehmen statt des caustischen Kali's eine Auflösung des kohlensäuerlichen Ammoniums.

Stolze hat folgendes Verfahren vorgeschlagen.

℞. Protonitratis Mercurii crystallisati partes octo.
Acidi nitrici (1,250) partem unam.
Aquae destillatae bullientis partes octoginta.
Dissolutioni refrigeratae adde
Ammoniaci liquidi (0,95) partes quatuor.
diluti
Aquae destillatae partibus octo.
Agita, filtra et praecipitatum sicca. (GalF.)

℞. Liquoris Hydrargyri nitrici oxydulati recenter parati quantum placet.
Aquae destillatae quantum satis ut sit P. spec. = 0,01. Mixtis instilla inter continuam agita ionem Liquorem Ammonii caustici Aquae destillatae partibus octo dilutum quamdiu praecipitatum inde natum colore nigro apparet, evitando liquoris perfectam neutralisationem. Sedimentum filtratione separatum Aqua destillata ablue et inter chartam bibulam leni calore loco umbroso sicca. (Bor4.)

T. Nitratem Protoxydi Mercurii in Aqua destillata solvere, liquidum decanthare a materia flava non dissoluta et infundere Ammonium causticum, donec praecipitatum nigrum floccosum oriri cessaverit, filtro imponere, et Aqua communi lavare, donec haec sapore expers evadat, oxydum deinde in loco umbroso vel vaporatorii ope siccare.

Nach Soubeiran ist das, vermittelst des von den meisten Pharmacopöen vorgeschriebenen Verfahrens erhaltene Hahnemann'sche Queckſilber eine Mischung von salpetersäuerlichem Queckſilber mit einer Quantität salpetersauerem Ammoniumqueckſilberoxydul (protonitrate ammoniaco-mercuriel) welche je nach dem befolgten Verfahren verschieden und von der stärkern oder geringern Säuerung des angewendeten Protonitrats abhängig ist und wodurch das Product mehr oder weniger dunkelfarbig und auch mehr oder weniger in Salpetersäure auflöslich wird, indem das salzsäuerliche Salz allein schwarz, das Doppelsalz im Gegentheil weiß ist. Er schließt daher, daß man das Protonitrat in der möglichst kleinsten Menge Säure auflösen müsse, welches auf die Weise geschieht, daß man jedesmal auf das crystallisirte salpetersaure Salz von sehr schwach gesäuertem Wasser eine geringere Menge aufgießt, als zu seiner gänzlichen Auflösung nöthig ist und das Reiben fortsetzt, um die Flüssigkeit vor dem Abgießen gänzlich zu sättigen. Diese Vorsichtsmaaßregeln sind unter chemischem Gesichtspunct sicherlich sehr lobenswerth; aber findet dasselbe in medicinischer Hinsicht statt, was hier den Pharmaceuten allein interessiren muß? Sicher nicht. Den Arzt kümmert es wenig, ob das salpetersäuerliche Queckſilber salpetersaures Ammoniumqueckſilberoxydul (proton trate ammoniaco-mercuriel enthält, um so mehr da dieses chemische Eigenschaften besitzt, welche denen des doppelten Protonitrats sehr ähnlich sind, und alle diese Prä-

parate auf gleiche Weise, d. h. reizend und aufregend, auf den Organismus wirken, daher sich höchstens nur durch einen unbestimmbaren oder unbestimmten Grad in der Reizung, welche sie hervorbringen, von einander unterscheiden.

Das Hahnemann'sche Quecksilber, welches, besonders in Deutschland, einen so großen Ruhm genossen hat, wendet man zu einem Gran mit fünf bis zehen Gran Tragant- oder Süßholzsaftpulver an. — Gewöhnlich setzt man noch einen halben oder einen ganzen Gran Opium hinzu.

Trochisci Hydrargyri s. mercuriales. (*Sw.*)

℞. Mercurii solubilis Hahnemanni unciam unam.
Olei essentialis Aurantii guttas viginti.
Sacchari albi . . uncias duas.
Mucilaginis Gummi Arabici quantum sufficit

ut fiant trochisci decem granorum. — Gabe, ein Stück täglich zwei oder drei Mal.

Bolus ex Hydrargyro, Boli mercuriales. (*Sw.*)

℞. Mercurii solubilis Hahnemanni grana tria.
Extracti Liquiritiae quantum sufficit.
Misce bene.

Pilulae Hydrargyri s. ex Hydrargyro oxydulato nigro s. e Mercurio solubili Hahnemanni. (RC. WW. *Ra. Sw. Sy.*)

℞. Mercurii solubilis Hahnemanni grana quindecim.
Succi Liquiritiae pulverati semunciam.
Syrupi simplicis quantum sufficit

ut fiant pilulae centum et quindecim. (WW.)

RC. *Sw. et Sy.* Mercurii solubilis drachmam unam et Extracti Liquiritiae (vel Mellis RC.) quantum satis ut fiant pilulae granorum quatuor (centum viginti RC.), Cinnamomo (pulvere corticis Cassiae RC.) adspergendae.

℞. Mercurii solubilis Hahnemanni grana viginti.
Gummi Arabici,
Sacchari pulverati,
singulorum semidrachmam.

Fiant pilulae triginta. (*Ra.*)

Pilulae ex Hydrargyro diureticae s. mercuriales diureticae. (*Sw.*)

℞. Mercurii solubilis Hahnemanni semidrachmam.
Conservae Scillae grana viginti ad triginta.
Olei sulphurati . . guttas tres.

Adde triturando

Pulveris Scillae quantum sufficit

ut fiant pilulae granorum quatuor. — Bei sogenannten Schleimkrankheiten der Lunge, Wassersucht, hartnäckigem Catarrh, im Anfang der Phthisis. — Gabe, alle zwei Tage drei bis vier Stück, Abends beim Schlafengehen.

Mel mercuriale. (RC. *Sw.*)

℞. Mercurii solubilis Hahnemanni drachmam unam.
Mellis despumati unciam unam ad duas.

Tritura simul.

RC. Mercurii solubilis drachmas duas, Mellis unciam unam.

Syrupus ex Oxydulo Hydrargyri Hahnemanni s. Mercurio solubili Hahnemanni. (B*.)

℞. Mercurii solubilis Hahnemanni grana viginti.
Gummi Arabici drachmam unam.
Mellis rosati . quantum sufficit.

Tere in mortario marmoreo ut intime mi ceantur et adde

Syrupi Althaeae . . uncias tres.

Gabe, einen Löffel Morgens und Abends.

Protonitras Mercurii, Nitras Protoxydi Mercurii, Calx Mercurii, Hydrargyrum nitricum, Mercurius nitrosus, Nitras Hydrargyri.

§. I. Im festen Zustande.

An. D. Fer. Li. Wir. Wür. *Sw. T. Vm.*

℞. Acidi nitrici 26° . quantum vis.

Infunde in vas, aquâ frigida vel glacie circumdatum et immitte per plures vices

Mercurii sufficientem quantitatem donec crystalli in liquore appareant, quo per horas viginti quatuor seposito, crystalli collectae et ablutae siccentur. (An. D. Fer. His. Li.)

℞. Mercurii . . . . sesquiunciam.
Acidi nitrici . . unciam unam.

Mixta saepius per dies circiter quatuor agita, quo facto vaporatione spontanea quae prodierunt crystalli inter chartam premendo siccentur. (Wir.)

Wür. Digerere jubet in phiala balneo arenae imposita Aquae fortis et Mercurii, singulorum partes aequales et liquorem tunc blando igne evaporare, donec massa alba et sicca remaneat.

℞. Mercurii . . . . partem unam.
Acidi nitrici 28° . partes duas.

Majorem metalli partem caloris levis ope dissolve in acido; liquor tunc evaporatus seponatur ut in crystallos abeat. (Gal.)

Da man bei Befolgung dieses Verfah-

rens viel Deutonitrat erhalten würde, so hat Henry folgendes vorgeschlagen:

℞. Mercurii . . partes ducentas.
Acidi nitrici (25°)
partes centum octoginta.

Stent in solutione, donec vapores nitrosi non amplius appareant; adde deinde

Aquae destillatae calidae
partes centum.

Post levem ebullitionem decantha liquorem, qui statim in crystallos est abiturus. (GalH.)

℞. Ba. Phialam continentem Mercurii partes tres, Acidi nitrici et Aquae destillatae, singularum duas balneo arenae impositam, igne gradatim aucto calefacere, donec vapores aquosi non ultra evolvantur et liquorem deinde crystallisationi subjicere; — *T.* Mercurii libram unam, Acidi nitrici uncias sex et Aquae destillatae vel pluvialis libras duas in retorta, subinde agitando, exponere moderato calori.

Vm. Mercurium in Acido nitrico Aquae bullientis pondere triplo diluto coquere jubet, providendo ut aliquid metalli non dissolutum remaneat, decanthare deinde et crystallisationi subjicere.

§. II. Im flüssigen Zustande.

Liquor Hydrargyri nitrici s. Hydrargyri nitrici oxydulati, Nitras Hydrargyri s. Oxyduli Hydrargyri liquidus, Liquor Nitratis Hydrargyri s. hydrargyrosi s. Bellostii, Protonitras Hydrargyri solutus, Liquor Mercurii nitrosi frigore paratus, Aqua mercurialis s. mercurialis salina s. ad gangraenam, Mercurius nitrosus alior. (Ams. An. B. Bor. Bor4. Br. D. Gal. GalM. Han. HassP. O. Pal. RC. *Br. Fi. Pie. Ra. Sp. T.*)

℞. Mercurii . partes centum viginti.
Acidi nitrici 33°
partes centum quinquaginta.

Dissolve blando calore et solutioni infunde

Aquae destillatae partes nongentas.

Post aliquot dies cola et serva. (Gal. GalM.)

Han. duplicem agendi modum indicat: 1) Mercurii, Acidi nitrici, Aquae destillatae, singulorum unciam unam in phialam introducere Aquae frigidae immergendam et illic relinquere, donec bullae non amplius exoriantur, solutionem hoc modo obtentam in lagena bene obturata super Mercurii metallici pauxillo servare et addere Acidi nitrici guttas aliquot, si pulveris flavescentis aliquantulum separari coeperit; 2) recipere Mercurii unciam unam et duas Acidi nitrici vel quantum satis ad dissolvendum blandi caloris ope metallum; — RC. Mercurii quantum vis, Acidi quantum satis.

An. et Br. Mercurii uncias duas dissolvere in Acidi sex et salis unciam unam liquefacere in Aquae destillatae libris tribus; — *Sp.* Metallum dissolvere in Acidi nitrici pondere aequali et drachmam unam salis obtenti in Aquae unciis duabus; — O. dissolvere Metalli unciam unam in Acidi nitrici sufficiente quantitate et addere Aquae sufficientem quantitatem ad obtinendas liquidi uncias quatuor; — Bor. et Pol. eodem modo procedere sed Aquae satis addere ad obtinendas uncias quinque; — Ams. Calide in Acido dissolvere Mercurii quantum solvi potest et liquori addere Aquae calidae partes duodecim; — Bor4. Mercurii uncias quatuor, Acidi nitrici duas, Aquae destillatae drachmis tribus dilutas, vas loco frigido et si necesse est, in aliud, Aqua frigida repletum positum separatur quamdiu crystalli enascuntur, quarum a liquore et Mercurio separatarum et inter chartam bibulam albam premendo absque calore siccatarum partibus octo inter terendum adde Acidi nitrici partem unam et tum Aquae destillatae fervidae quantum sufficit ut p. spec. solutionis sit = 1,100 — 1,110, quae filtrata super mercurio depurato servetur; — HassP. Mercurii, Acidi et Aquae destillatae, singulorum unciam unam (si hujus liquoris pars una cum duabus Aquae destillatae miscetur, habes *Liquorem Mercurii nitrosi dilutum, frigore paratum*: ut reagens. HassP.); — B. Li. et *Pie.* dissolvere blandi caloris ope drachmam unam Mercurii in Acidi duabus et addere deinde Aquae fontanae uncias duodecim; — D. Dissolvere Salis crystallisati drachmas duas in Aquae destillatae uncia una; — *Fi. T.* Salis unciam unam, Aquae destillatae libras tres.

Dieses Präparat war einige Zeit lang unter dem Namen *Remedium Ducis d'Antin* und *Remedium capucinorum* zu zwei oder drei Tropfen in einem Glase lauwarmen Wassers oder eines Brust- oder schweißtreibenden Tranks gegeben, berühmt, heutzutage ist es fast ungebräuchlich, man wendet es nur noch selten bei chronischen venerischen Geschwüren an. Nach Bor4. 5 Tropfen. Das trockne Salz ist in letztern Zeiten als ein sehr wirksames cathaereticum gegen dieselben Uebel empfohlen worden.

Liquor mercurialis. (Pic.)

℞. Mercurii,
Acidi nitrici,
singulorum unciam unam.
Dissolve et adde
Aquae Plantaginis . libras duas.
— Rosarum,
Laccae,
singulorum quantum sufficit.

In Waschungen und Bähungen bei alten und atonischen Geschwüren, Pusteln, Schwämmchen und Flechten, welche man von venerischem Gift abhängig glaubt.

Lotio mercurialis Manry. (Ra.)

℞. Mercurii . . . drachmas duas.
Acidi nitrici . . uncias quatuor.
Dissolve et adde
Aquae purae . . libras decem.

In Waschungen bei Krätze. — Gabe, eine halbe Unze Morgens und Abends. — Ein bequemes, wohlfeiles und die Wäsche nicht beschmutzendes Präparat. Man hat es auch bei prurigo formicans und gegen phthiriasis nützlich befunden. Man kann auf das Litre zwei Drachmen Kampher zusetzen, wodurch es weniger reizend wird.

Aqua grisea s. grysea Gohlii s. ad synoviam. (B*. Br. Hass. Pal. Sar. Wir. *Ca. Pid. Sp. Vm.*)

℞. Mercurii,
Acidi nitrici,
singulorum unciam unam.

Dissolve blando calore metallum in acido et adde liquori decoctum praeparatum cum Aquae libris quinque ad quatuor redactis, in quibus coquuntur

Radicis Chelidonii majoris,
— Aristolochiae rotundae,
Herbae Rutae,
— Scordii,
Petalorum Rosarum rubrarum,
singulorum uncia una.

Misce bene. (B*. Br. Pal. Sar. Wir.)

Sp. Dissolutioni Mercurii unciae unius in Acidi nitrici aequali quantitate addere jubet decoctum e Radicis Chelidonii semuncia, Aristolochiae rotundae, Solani nigri, Rutae et Rosarum pallentium, singulorum uncia una cum Aquae libris decem ad octo redactis paratum.

℞. Mercurii . . . unciam unam.
Acidi nitrici . . . uncias duas.

Dissolve leni calore et cuilibet liquidi semunciae adde succum expressum vel decoctum maxime saturatum e

Radicis Chelidonii majoris,
— Aristolochiae rotundae,
singularum libra una.

Misce sedulo. (Hass. *Ca. Pid.*)

℞. Protonitratis Mercurii liquidi concentrati . . . partem unam.
Succi Chelidonii majoris depurati
partes duodecim.

Misce. (*Vm.*)

Dieses Wasser hat Aehnlichkeit mit den vorigen, ist aber schwächer. — Man wandte es ehedem sehr häufig in Waschungen bei venerischen Geschwüren an.

Syrupus Belleti mercurialis. (B*. GalH. *Au. Ca.*)

℞. Protonitratis Mercurii
partes triginta.
Aquae leviter acidulatae
partes ducentas.
Dissolve et liquori adde
Syrupi communis partes ter mille

quibus magis concentratis adde deinde

Aetheris nitrici alcoholisati
partes decem.

Serva. (GalH.)

Ca. dissolvere jubet, secundum *Bouillon-Lagrange*, Nitratis Mercurii sesquidrachmam in Aquae quam minima quantitate et liquorem miscere cum Syrupi communis frigidi libra una et Aetheris nitrici rectificati semidrachma, in lagena, qua servatur, agitando; — B*. secundum *Virey* Acetatis Mercurii drachmam unam in Aquae destillatae pauxillo solvere, addere Aetheris nitrici drachmas duas et tunc Syrupi Gummi, e Gummi uncia una et Syrupi communis libra una parati libram unam; — *Au.* miscere jubet Nitratis liquidi sesquidrachmam, Liquoris Hoffmanni semidrachmam et Syrupi Sacchari uncias sedecim.

Dieser Syrup ist von dem Belletschen sehr verschieden, welcher nur aus einem zuckerhaltigen Salpeteräther ohne ein Atom Quecksilber bestand. Uebrigens ist dieses, so wie alle ätherischen Quecksilberpräparate, ein unsicheres und in seinen Wirkungen sich nicht gleichbleibendes Mittel, da es eine so große Neigung hat sich zu zersetzen. Der Arzt darf es also nicht anwenden, um so weniger, da er es leicht durch eine auf der Stelle bereitete Mischung von einigen Tropfen Quecksilbersalpeterflüssigkeit in drei oder vier Unzen mit Aethersyrup versüßtem Wasser ersetzen kann.

Pilulae ex Hydrargyro nitrico s. Zelleri. (*Au. Sm.*)

℞. Protonitratis Mercurii
grana decem.
Succi Liquiritiae
grana quadraginta.

Misce ut fiant pilulae sexaginta. (*Sm.*)

Au. Nitratis crystallisati grana decem et Micae Panis grana centum nonaginta ut fiant pilulae granorum duorum.

Gegen Syphilis. — Gabe, ein bis zwei

Stück in vier und zwanzig Stunden und allmälig bis auf sechs täglich gestiegen.

Potus mercurialis Belleti. (*B.*)

℞. Syrupi Belleti,
Aquae destillatae,
singulorum semunciam.

Morgens zu nehmen, bei Rhachitis und Scropheln.

Unguentum ad scabiem s. citrinum s. Hydrargyri citrinum s. Hydrargyri compositum s. Hydrargyri nitrati s. Nitratis Hydrargyri s. Nitratis hydrargyrici s. mercuriale citrinum s. mercuriale citrinum Baumé s. Supernitratis Hydrargyri, Adeps Nitrate Hydrargyri medicatus, Balsamum mercuriale. (A. Am. Ams. An. B. Bel. Bor. Bor4. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. O. Pol. Suec. *Br. C. Ca. Fi. Pid. Sa. Sp. Sw. Sy. T. Vm.*)

℞. Mercurii,
Acidi nitrici,
singulorum unciam unam.

Dissolve metallum in acido caloris balnei arenae ope; liquori adde

Olei Olivarum . . uncias quatuor.
Axungiae Porci . . uncias octo

ut fiat unguentum. (*Sa. Sy.*)

Du. et *Sw.* Mercurii unciam unam, Acidi duas, Olei libram unam et Axungiae uncias quatuor; — Am. Ed. RC. et *C.* Metalli partem unam, Acidi duas, Olei (Olivarum vel Napi RC.) novem et tres Axungiae. — *Unguentum mitius* harum trium (excepta RC) pharmacopoearum triplum Olei et Axungiae continet; — Lon. LonN. Metalli unciam unam, Acidi fluidrachmas undecim, Olei fluiduncias quatuor et Axungiae uncias sex.

℞. Mercurii partes sexaginta quatuor.
Acidi nitrici (32°)
partes nonaginta sex.

Solutioni refrigeratae adde

Axungiae liquatae . partes mille per vices et sub continua trituratione infusas. (Gal.)

His. Mercurii et Acidi, singulorum partem unam et decem Axungiae; — A. Ams. Bor. Bor4. D. Fenn. Ful. Ham. Han. Hass. HassP, Li. O. Suec. *Br.* et *Pid.* Metalli unam, duas Acidi (vel quantum requiritur Bor4.) et duodecim Axungiae; — An. et *Sp.* Metalli tres, Acidi quatuor, et Axungiae triginta duas; — *Vm.* Metalli partem unam, Acidi quantum satis ad dissolvendum et Axungiae partes quindecim; — Gen. Mercurii uncias duas, Acidi quantum satis ad dissolvendum et Axungiae libras duas; — Fer. *T.* Metalli unciam unam, Acidi quantum satis ad dissolvendum et Axungiae libram unam; — *Fi.* Axungiae uncias octo, caeterum ut Fer.

℞. Protonitratis Mercurii liquidi
partem unam.

Calefac et adde pedetentim

Axungiae Porci liquatae
partes quatuor.

Tere ad refrigerationem usque. (Pol.)

B. et Bel. Liquoris mercurialis partes tres et sedecim Axungiae.

Die Zusammensetzung der gelben Salbe ist nicht genau bekannt; man weiß nur, daß die durch das Salz und das Fett bewirkte Zersetzung je nach der Menge der angewendeten Säure, nach dem Grade ihrer Stärke und besonders nach dem Alter der Salbe verschieden ist; frisch besteht sie aus oxygenirter Salbe, aus salpetersaurem Quecksilberoxydul und aus sehr zertheiltem Quecksilber; es scheint aber, daß in dem Maaße, wie sie älter wird, das salpetersaure Oxydul ganz zerstört wird und sich in essigsaures Quecksilber verwandelt.

Reizend, auflösend, austrocknend, schweißtreibend, gegen Syphilis, psora; sie wird bei Hautkrankheiten häufig angewendet. Im Allgemeinen sorgt man, sie durch Zusatz einer der bereits in ihr enthaltenen gleichen Menge Fett zu verdünnen.

Unguentum Duboisi. (*Ra.*)

℞. Protonitratis Mercurii
drachmas duas.
Unguenti Cucumerum
semunciam.

Misce sedulo. — Bei leichten Flechten in Einreibungen auf die kranken Theile.

Unguentum s. Pomatum saturno-mercuriale. (*Au. Vm.*)

℞. Mercurii . . . partes quatuor.
Plumbi . . . partem dimidiam.

Soluta seorsim metalla, quodque in

Acidi nitrici 34°
sufficiente quantitate

misce cum

Olei Amygdalarum dulcium
partibus viginti quatuor.
Axungiae Porci
partibus quadraginta octo

primò solutionem mercurialem deinde plumbicam; tere bene et refrigerationis momento modulis chartaceis infunde. (*Vm.*)

℞. Unguenti citrini drachmas duas.
— saturnini . drachmas sex.

Misce triturando. (*Au.*)

Von Armstrong bei tinea favosa empfohlen.

Cereoli mercuriales. (*Sw.*)

℞. Cerae flavae . . . uncias sex.
Olei Olivarum . unciam unam.

Liquatis adde
Protonitratis Mercurii liquidi
drachmas duas.
Misce sedulo ut fiant cereoli.

Pomatum s. Unguentum ad tineam. (E.)

℞. Unguenti citrini . . semunciam.
— Picis liquidae
unciam unam.
Misce triturando.

Deutonitras Mercurii, Nitras Deutoxydi Mercurii. (B. Bel *T. Vm.*)

1) Im festen Zustande.

℞. Oxydi rubri Mercurii quantum vis.
Acidi nitrici quantum sufficit ad solvendum blandi caloris ope oxydum; liquidum deinde decantha et forti vaporationi subjice ut oriantur crystalli. (*Vm.*)

T. Mercurium rubrum cum Acidi nitrici diluti quantum ad perfectam solutionem sufficit, coquere et addere per vices Acidum nitricum 36° B., donec solutio salis marini vel Acidum hydrochloricum non amplius ab illo turbetur; vel: conjungere statim Acidum nitricum dilutum cum Oxydo rubro.

2) Im flüssigen Zustande.

Liquor Hydrargyri nitrici oxydati, Mercurius nitrosus, Liquor Nitratis hydrargyrici.

℞. Oxydi rubri Mercurii partes tres.
Acidi nitrici puri, dimidio Aquae diluti . . . . . partes sex.
Solve leni calore, oxydum sensim acido addendo et liquorem serva. (Bel.)

B. Oxydi partes tres et quatuor Acidi, producto addere Aquae purae partes duodecim (*Aqua mercurialis*); — Bor4. Oxydi rubri unciam unam, Acidi nitrici quantum sufficit, Aquae destillatae tantum ut pondus totius sit unciarum octo. P. sp. = 1,175—1,185: — *Vm.* conterere jubet Oxydi rubri partes tres et Aquae tantidem, miscellam leviter calefacere, addere Acidi nitrici quantum sufficit ad dissolutionem et liquidum post horas viginti quatuor decanthare.

Die Aqua mercurialis dieser letztern Pharmacopöen unterscheidet sich demnach von der der vorhergehenden in Betreff der chemischen Zusammensetzung, aber die Einwirkung auf die lebenden Gewebe ist ganz oder fast dieselbe.

Protonitras Ammoniaci et Mercurii. (*Sw. Sy.*)

℞. Acidi nitrici Aqua diluti,
libram unam.
Infunde ei sensim
Ammonii subcarbonici liquidi
uncias septem.
Effervescentia cessata adde
Mercurii . . . . uncias octo.
Metallo balnei vaporis ope dissoluto liquor ad crystallisationis punctum usque evaporet.

Guttulae albae Wardii, Solutio Nitratis Hydrargyri ammoniacalis. (B*. *Sw. Sy.*)

℞. Protonitratis Mercurii et Ammoniaci . . . . unciam unam.
Aquae Rosarum . . uncias tres.
Dissolve.

Ein in England berühmtes Präparat. — Gabe, zwei oder drei Tropfen in einer Gersten-, Grütze- oder Sassaparillabkochung.

Unguentum Nitratis Mercurii et Ammoniae. (B*.)

℞. Nitratis Mercurii et Ammoniae, Oxydi Zinci,
singulorum partem unam.
Axungiae Porci partes quatuor.
Misce triturando.

Protoiodas Mercurii. (B*. *Vm.*)

℞. Protonitratis Mercurii quantum vis.
Iodatis Potassae quantum sufficit.
Nitrato adde iodatum pro partiunculis sed celeriter; praecipitatum lotum sicca.

Deutoiodas Mercurii. (*Vm.*)

℞. Sublimati corrosivi partes 12,7.
Iodatis Potassae . . partes 15,6.
Dissolutis seorsim, solutiones calefactas in lagena commisce et agita; decantha et praecipitatum lotum sicca.

Hydrochloras Mercurii et Ammoniae.

§. I. Im festen Zustand, aber im Wasser auflöslich und crystallisirbar.

Sal Alembroth s. sapientiae s. vitae s. scientiae. (An. Bel. Gal. *Fi. T. Vm.*)

℞. Sublimati corrosivi,
Salis Ammoniaci,
singulorum partes aequales.
Sublima. (Gal.)

Nach Soubeiran erhält man auf diese Weise bloß eine sehr veränderliche Mischung von Sublimat und Salmiak. Er empfiehlt daher, mit Ferrarini, Taddei (*Fi. T.*, gleiche Theile von beiden in Wasser aufzulösen, die Flüssigkeit abzudampfen und sie crystallisiren zu lassen, jedoch nicht zu vergessen, daß die Verbindung nicht sogleich stattfindet, und daß die anfangs sich bildenden Crystalle eine Mischung von sal alembroth und einer größern oder gerin-

gern Menge Salmiak sind. Nach ihm besteht das sal Alembroth aus einem Atom hydrochlorsaurem Quecksilber und vier Atomen hydrochlorsaurem Ammoniak

℞. Praecipitati albi quantum vis.
Acidi hydrochlorici
quantum sufficit
ad solvendum blandi caloris ope; vaporata leni igne ad locum frigidum sepone ut in crystallos abeant, quae cum Aquae frigidae pauxillo abluantur. (Am. Bel. *Vm.*)

Das letztere Präparat führt den Namen *Murias hydrargyro-ammoniacale acerimum* und *Hydrargyrus muriatus ammoniacalis fortior.*

§. II. Im festen, aber im Wasser unauflöslichen Zustande.

Calx Hydrargyri alba, Hydrargyrum praecipitatum album s. ammoniato-muriaticum s. bichloratum cum Oxydo et Ammonio muriatico s. oxydatum muriaticum ammoniatum s. muriaticum praecipitatum, Hydrochloretum Ammonii cum Oxydo hydrargyrico, Mercurius cosmeticus s. praecipitatus albus, Murias Oxydi Hydrargyri ammoniacalis s. hydrargyro-ammoniacalis s. hydrargyro-ammoniacalis insolubilis s. Ammoniacae superhydrargyricus, Praecipitatus albus, Submurias ammoniaco-hydrargyricus s. Hydrargyri ammoniatus s. praecipitatus, Lac mercuriale; weißer Präcipitat (Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. D. Du Fer. Ful. Han. Huss HassP. Lon LonN. Lus. O. Pol. Sax. Suec. Wür. *Br. C. Fi. Sw. T. Vm.*)

1) ℞. Sublimati corrosivi,
Salis Ammoniaci,
singulorum uncias octo.
Dissolve in
Aquae destillatae bullientis
libris octo.
Filtra liquorem et ei pedetentim infunde Natrum subcarbonicum liquidum (Natr. carb. crudum in Aq. dest. suff. quant. solutum), donec praecipitatum non amplius oriatur, quod Aqua frigidâ lotum in loco umbroso siccetur. (Bel, Bor. Bor4. Han. HassP. O. Pol. *Sw.*)

Reliquae pharmacopoeae, a quibus hic agendi modus indicatur, Kali subcarbonicum praescribunt; sed An. B. Fer. Lus. Sax. Suec. *Fi.* et *T.* Sublimati et Salis Ammoniaci partes aequales; Ba. Salis unam et duas Sublimati; Am. Lon. LonN. et *C.* Sublimati semilibram et Salis uncias quatuor (Liquoris Potassae Subcarbonatis octarium dimidium, Aquae destillatae octarios quatuor Lon. LonN.); *Vm.* Sublimati partem unam et Salis unam cum dimidia indicant.

2) ℞. Sublimati corrosivi quantum vis.
Aquae calidae quantum sufficit ad dissolutionem; liquori infunde Ammoniacum, donec non amplius oriatur praecipitatum, quod Aqua destillata ablutum siccetur. (*Sw. Vm.*)

3) ℞. Mercurii,
Acidi nitrici,
singulorum uncias octo.
Soluto metallo, adde
Aquae destillatae libras quatuor.
Liquori deinde infunde solutionem filtratam e
Salis Ammoniaci unciis duabus,
Kali subcarbonici uncia una
in Aquae destillatae libris quatuor, donec nihil amplius praecipitetur; pulverem in filtro receptum bene ablue et sicca. (Huss.)

Ful. dissolvere jubet Mercurii uncias sex in Acidi nitrici duodecim, liquori addere Aquae destillatae uncias septuaginta duas, mixturae infundere dissolutionem Salis Ammoniaci unciarum duodecim in Aquae destillatae uncias viginti quatuor et instillare deinde Kali subcarbonicum liquidum, donec non amplius oriatur praecipitatum.

℞. Nitratis Mercurii uncias octo.
Dissolve in
Aquae destillatae
sufficiente quantitate
et filtra. Solutioni adde
Salis Ammoniaci in Aqua soluti
uncias quatuor.
Liquori deinde sensim instilla
Solutionis Natri subcarbonici aquosae sufficientem quantitatem vel tantum, donec non amplius oriatur praecipitatum, quod lotum siccetur. (D.)

℞. Liquoris a Mercurio dulci secundum methodum Scheelii praeparato decanthati quantum vis.
Infunde Ammonium liquidum, donec praecipitatum oriri cessaverit, quod Aqua frigida ablue. (Ams. Du. et *C.*)

f. Loco sublimati corrosivi Sulphas Mercurii adhiberi potest, ad cujus solutionem Aqua, in qua Salis Ammoniaci pondus aequale solutum est, sumitur. (!)

Soubeiran sieht den weißen Präcipitat als eine Mischung von einem Atom Quecksilberdeutochlorür und drei Atomen Ammoniumquecksilberoxydul (mercuriate d'ammoniaque), das heißt, als eine Zusammensetzung an, in welcher das Quecksilberoxyd die Rolle einer Säure spielt. Guibourt hatte es schon als eine Mi-

schung von Queckſilberdeutochlorür und von Ammonium mit dem Deutoxyd des Queckſilbers (ammoniure de deutoxide de mercure) angeſprochen.

§. III. Im flüſſigen Zuſtande.

Aqua mercurialis composita, *Liquor Muriatis hydrargyro-ammoniacalis s. Hydrargyri ammoniati*, *Mixtura s. Solutio mercurialis*, *Murias hydrargyro-ammoniacalis solutus*, *Liquor Mercurii s. ammoniaco-mercurialis*. (A. B. Bor. Bor4. Gal. Han. Lus. O. Pol. Suec. RC. *Au. Sw. Sy. Vm.*)

℞. Sublimati corrosivi grana sedecim.
Salis Ammoniaci drachmam unam.
Aquae destillatae libras quatuor.
Dissolve et filtra. (A.)

Vm. Sublimati grana viginti sex, Salis decem et Aquae libras quatuor; — B. Sublimati drachmam unam, Salis tantidem et duas libras Aquae; — Lus. Sublimati scrupulum unum, Salis semiscrupulum et Aquae libram unam; — *Sw.* Sublimati, Salis, singulorum drachmam unam et Aquae libras quatuor; — *Sy.* Sublimati grana sexaginta quatuor, Salis Ammoniaci drachmam unam et Aquae uncias quatuor; — *Au.* Sublimati grana sex, Salis duodecim et unam libram Aquae; — RC. Sublimati grana octodecim, Salis Ammoniaci drachmam unam, Aquae destillatae libram unam. (*Aqua phagedaenica s. Solutio Muriatis Hydrargyri oxydati et Ammoniae fortior* RC. — Aquae vel Alcoholis diluti quantitate triplici sumta habes *Solutionem dilutiorem.*)

Solutio Muriatis Hydrargyri oxydati corrodens RC.: Sublimati drachmam unam, Salis Ammoniaci drachmas duas, Alcoholis diluti unciam unam.

℞. Sublimati corrosivi grana sedecim.
Aquae purae . uncias quatuor.
Dissolve et praecipita
Ammoniaci liquidi
sufficiente quantitate.
Redissolve praecipitatum
Acidi hydrochlorici
quantitatis sufficientis
ope et serva. (*Vm.*)

℞. Salis Alembroth crystallisati
grana decem.
Aquae destillatae uncias decem.
Dissolve et adde
Syrupi communis . uncias duas.
Misce bene. (*Vm.*)

℞. Sublimati corrosivi
grana viginti quatuor.
Aquae . . . . uncias quatuor.
Dissolve, filtra et liquori instilla
Ammonii liquidi quantum sufficit
decompositionem completam. Adde
Acidi hydrochlorici quantum satis
ad redissolvendum praecipitatum et
tunc
Aquae . . . uncias octodecim.
Mellis rosati . . unciam unam.
Post horam unam cola. (*Vm.*)

℞. Sublimati corrosivi,
Salis Ammoniaci, singulorum grana viginti quatuor.
Aquae destillatae . libras duas.
Solutioni adde
Mellis rosati . . unciam unam.
Misce bene. (Bor. Han. O. Pol.)

Bor4 Mel rosatum omittit.

Fenn. et Suec. Sublimati grana sex, Salis Ammoniaci tantidem, Aquae calidae unciam unam, Aquae destillatae uncias novem ad diluendam solutionem et Syrupi communis uncias duas.

Hierher gehört auch der *Liquor van Swietenii* von RC.: Sublimati grana sex, Salis Ammoniaci duodecim, Aquae destillatae vel Alcoholis diluti libra una.

Ehedem gab man den weißen Präcipitat innerlich von einem bis zu drei Gran; heutzutage wendet man ihn bloß äußerlich an. Das Sal Alembroth, sowohl fest, als besonders flüſſig, wird sehr allgemein gebraucht. Doch sollten sich die Practiker deſſelben, wegen der veränderlichen Zusammensetzung, nicht bedienen. Man hat zwar im Allgemeinen, wenn man den Salmiak mit dem Sublimat verbindet, keinen andern Zweck als die Auflöslichkeit des letztern zu begünstigen; allein obgleich die gegenseitige Einwirkung beider Salze auf einander nicht auf der Stelle so vollständig einzutreten scheint, daß sich nicht wenigstens noch ein Theil Salmiak verflüchtigen könnte, so ist doch soviel sicher, daß sie nach einiger Zeit Statt hat, und daß dann der mit dieser Eigenthümlichkeit unbekannte Arzt etwas Anderes verschreibt, als was er zu geben die Absicht hatte. Dieß ist ohne Zweifel eine der Ursachen, warum die Urtheile über den Sublimat so verschieden ausgefallen sind. Soubeiran empfiehlt mit Recht, die Mischung aus beiden Salzen nicht zu lange in den Apotheken vorräthig zu halten weil, man möge dieß auch für noch so vortheilhaft ausgeben, nothwendig nach einiger Zeit, wegen der Schwere, immer unzersetzter Sublimat sich findet, und zwar im Verhältniß immer stärker im Grunde, als an der Oberfläche der Flasche. Er ist daher der Meinung, daß man die Mischung erst in dem Augenblick, wo sie aufgelöst werden soll, vornehmen müsse, und giebt gleichen Verhältnißtheilen jedes Ingrediens den Vorzug, weil ein schwacher Ueberschuß von Salmiak nicht schaden könne.

Aqua caustica ad condylomata, Mixtura gummosa ex Hydrargyro muriatico s. Sublimato corrosivo. (DD. WW.)

℞. Sublimati corrosivi,
Salis Ammoniaci,
singulorum drachmam unam.
Aquae destillatae . uncias duas.
Dissolve in mortario vitreo et adde
Gummi Arabici pulverati
drachmas duas.

Aeußerlich angewendet.

Injectio adstringens. (*E.*)

℞. Sublimati corrosivi . grana tria.
Salis Ammoniaci
granum unum vel duo.
Aquae . . . . uncias quatuor.

Bei chronischer Gonorrhoe empfohlen.

Solutio Veikardi. (*Br*. Ca.*)

℞. Sublimati corrosivi,
Salis Ammoniaci,
singulorum grana quatuor.
Aquae destillatae . uncias duas.
Laudani liquidi Sydenhami
guttas triginta sex.
Olei essentialis Cinnamomi
gutt am unam.

Bei der Behandlung venerischer Krankheiten empfohlen. — Gabe, dreißig bis vierzig Tropfen, Morgens und Abends, in Milch oder Gummiwasser.

Looch antisyphiliticum, Linctus antisyphiliticus. (*Sio*.*)

℞. Hydrochloratis Mercurii et Ammoniae . . . semidrachmam.
Opii . . . . . grana quatuor.
Sacchari . . scrupulos quatuor.
Triturata simul adde
Mellis albi . . uncias quatuor.

Gabe, zwei Drachmen, zwei- oder dreimal täglich.

Aqua mercurialis, Mercurius liquidus. (*Sp.*)

℞. Cerussae . . . unciam unam.
Lithargyri . . . . semunciam.
Aceti . . . . . uncias sex.

Coque ad oxydorum usque solutionem et liquori adde
Aluminis . . . drachmas sex.
Sublimati corrosivi,
Salis Ammoniaci,
singulorum drachmam unam.
Aquae fontanae uncias duodecim.
— Rosarum uncias quatuor.

Serva absque colando. — In einer Menge Hautkrankheiten empfohlen. — Verwerflich.

Syrupus antisyphiliticus s. depurativus Larreyi. (*Br. Ca.*)

℞. Radicis Sassaparillae scissae et concisae . . . . libras duas,
Aquae . . . . . libras decem.

Macerata per horas duodecim coque per duas et cola; residuum coquatur bis cum Aquae aequali quantitate et qualibet vice colatur; colaturas tres conjunctas sepone; praeterea

℞. Petalorum siccorum Rosarum rubrarum . . . . semunciam.
Foliorum Sennae mundatorum
uncias duas.
Seminum Anisi drachmas duas.
Aquae bullientis . sesquilibram.
Succi Boraginis calide depurati
semilibram.

Infunde in balneo aquae, vase tecto, per horas duodecim, cola deinde cum expressione et sepone; interea decoctum sassaparillae ad librarum sex remanentiam evaporet, cui deinde addentur praeter infusum antea dictum

Sacchari albi,
Mellis albi,
singulorum librae quatuor.

Syrupum Albumin bus Ovorum clarificatum bullientem cola per manicam et coquendo probe inspissatum refrigerare fac. Tunc

℞. Hujus Syrupi
libras duas cum dimidia.
Salis Ammoniaci,
Sublimati corrosivi,
Extracti Opii,
singulorum grana decem.
Liquoris Hoffmanni
quantum sufficit.

Dissolve opium in Aquae parva quantitate et syrupo adde solutionem; tritura sales cum Aetheris sufficiente ad dissolvendum quantitate; adde sensim, continuè triturando, omnem syrupum et serva in lagenis bene obturatis.

Reizend, alterirend, gegen Syphilis und Flechten. —. Gabe, eine Unze Morgens nüchtern, in einer Tasse Sassaparillabkochung.

Liquor muriatico-hydrargyro-cupricus ammoniacalis. (*Vm.*)

℞. Hydrochloratis Mercurii et Ammoniae,
— Cupri et Ammoniae,
singulorum sesquidrachmam.

Dissolutis seorsim in
Aquae . . . . . unciis tribus solutiones admisce et filtra.

Aqua phagedaenica alba. (*Vm.*)

℞. Salis Alembroth crystallisati
scrupulos duos.
Aquae Calcis uncias viginti octo.

Aqua phagedaenica alba composita. (*Vm.*)

℞. Aquae phagedaenicae albae
partes viginti quatuor.

Mellis rosati . . partem unam.
Misce bene.

Unguentum ad scabiem Zelleri s. mercuriale album s. mercuriale album Werlhofii s. Hydrargyri album s. Hydrargyri albi s. mundificans Zelleri s. Muriatis Hydrargyri ammoniacalis s. rosatum compositum. (Am. Ams. B. Bor. BorC. Bor4. Br. Du. Fer. Ful. Ham. Hass. HassP. His. Lon. LonN. Lus. Pal. Pol. Sax. Wir. *Br. C. Ca. Huf. Pid. Sw. Sy. Vm.*)

℞. Praecipitati albi . partem unam.
Axungiae praeparatae
partes octo ad sedecim.
Misce triturando. (*Sw. Sy.*)

Vm. Praecipitati partem unam et quatuor Axungiae; — B. et *Huf.* Praecipitati unam et octo Axungiae; — Bor4. Praecipitati unam et Adipis novem; — Am. Ams. Lon LonN. et *C.* Praecipitati unam et Axungiae duodecim.

℞. Praecipitati albi . partem unam.
Cerati albi . . . . partes octo.
Contere. (Pol.)

Du. Praecipitati partem unam cum dimidia et Cerati duodecim.

℞. Praecipitati albi partem unam.
Unguenti rosati (s. pomadini HassP.)
partes octo.
Misce terendo. (Fer. Ful. Hass. HassP. His. Sax. *Ca. Pid.*)

Br. Praecipitati partem unam et duodecim Adipis; — Pal. Wir. et *Sp.* Praecipitati unam et Axungiae septem.

℞. Praecipitati albi . . partes tres.
Unguenti rosati
partes viginti quatuor.
Olei Lavandulae partem unam.
Tritura simul. (Lus.)

Bor. BorC. Br. et Han. Praecipitati partes sedecim, Axungiae centum viginti octo et Olei Citri unam.

Reizend, als Schönheitsmittel betrachtet und gegen faſt alle Hautkrankheiten geprieſen. — Man verſchreibt dieſe Salbe mit einem Achtelgran Sublimat, zu einer halben und ganzen Drachme auf jede Einreibung.

Pomatum s. Unguentum antiherpeticum. (*E. Ra.*)

℞. Praecipitati albi sesquidrachmam.
Camphorae . scrupulum unum.
Axungiae lotae . . uncias duas.
Misce triturando. (*Ra.*) — Beſonders bei puſtulöſen Flechten, wenn die Entzündung gemindert iſt.

℞. Praecipitati albi grana quindecim.
Nitri . . . . . semidrachmam.
Florum Sulphuris
drachmam unam.
Axungiae Porci . . uncias duas.
Misce triturando. (*E.*)

Unguentum s. Pomatum contra s. ad tineam. (*Pie.*)

℞. Praecipitati albi semidrachmam.
Baccarum Juniperi pulveratarum
drachmam unam.
Unguenti rosati . unciam unam.
Misce exacte cum Olei Lauri pauxillo.

Pomatum s. Unguentum Jadelotii. (*Ra.*)

℞. Praecipitati albi drachmas duas.
Camphorae . . . . grana octo.
Tutiae praeparatae
grana quindecim.
Butyri recentis . drachmas duas.
— Cacao . . semidrachmam.
Contere bene. — Bei ſogenannter ſcrophulöſer Augenentzündung in Einreibungen auf den Rand der Augenlider, alle zwei oder drei Tage, Abends bei'm Schlafengehen.

Unguentum s. Pomatum Janini s. ophthalmicum Janini. (Fer. *Bo. Ca. Fi. T.*)

℞. Praecipitati albi drachmam unam.
Tutiae,
Boli Armenae,
singularum drachmas duas.
Axungiae cum Aqua Rosarum lotae
semunciam.
Misce exacte.

Fi. Praecipitati semidrachmam, Florum Zinci, Boli Armenae, singulorum drachmam unam, Axungiae drachmas duas; — *T.* Boli Armenae vel rubrae, Carbonatis Zinci, singulorum semunciam, Praecipitati drachmas duas, Axungiae purae unciam unam.
Gebrauch wie bei'm vorigen.

Unguentum antipsoricum. (Pal. Wir.)

℞. Terebinthinae cum Aqua Rosarum
lotae uncias duas et dimidiam.
Dissolve in
Vitellis Ovorum . . . . no. 3.
Solutioni adde
Butyri recentis . . uncias sex.
Olei Lauri . . . unciam unam.
Styracis liquidae . semunciam.
Praecipitati albi drachmas duas.
Cerussae pulveratae unciam unam.
Misce sedulo. — Gabe, eine Drachme auf einmal, in Einreibungen. — Ein ſchlechtes Präparat.

Pilulae specificae s. mercuriales ammoniacales. (Am. B*. Fenn. Gen. Lus. Sueo. WW. *Bo. Br. C. Fi. Sa. Sm. Sw. Vm.*)

℞. Sublimati corrosivi grana decem.
Arrowroot . . scrupulum unum.

Solutionis Salis Ammoniaci aquosae quantum sufficit.
Fiat massa. (Am. C.)
Mit Unrecht nennt Am. diese Pillen *Pilulae Hydrargyri Oxymuriatis*. Die Formel selbst ist schlecht und muß verworfen werden.

℞. Sublimati corrosivi,
Salis Ammoniaci,
singulorum grana quindecim.
Aquae destillatae calidae
quantum sufficit
ut sales solvantur. Solutioni adde
Pulveris Radicis Althaeae
drachmas tres.
Mellis depurati drachmas duas.
Fiat massa in centum viginti pilulas dividenda. (Lus. WW.) Jede Pille enthält einen Achtelgran Sublimat.

℞. Sublimati corrosivi,
Salis Ammoniaci,
singulorum scrupulum unum.
Dissolutis in Aqua calida adde
Sacchari albi pulverati
scrupulum unum.
Micae Panis triticei drachmas duas.
Fiant pilulae centum sexaginta. (Fenn. Suec.) Sie enthalten dieselbe Quantität Sublimat, wie die vorigen. — *Br.* führt ähnliche an unter dem Namen *Specificum Genevense*.

℞. Aquae destillatae drachmas duas.
Salis Ammoniaci quantum sufficit ad saturandam aquam. Adde
Sublimati corrosivi grana viginti.
Micae Panis quantum sufficit ut fiant pilulae octoginta. (*Sa.*) — Jede enthält einen Viertelgran Sublimat.

℞. Salis Ammoniaci sesquidrachmam.
Aquae destillatae semunciam.
In solutione dissolve
Sublimati corrosivi semidrachmam.
Fiant cum Micae Panis albi sufficiente quantitate pilulae ducentae octoginta octo. (Gen. *Fi.*)

B*. *Sa. Sm.* geben eine andere Formel, welche sich nur durch die Gabe des Sublimats unterscheidet, und nach welcher die Pillen einen halben Gran Sublimat enthalten. Sie führen den Namen *Pilulae antivenereae Swédiaur*.

℞. Sublimati corrosivi
grana duodecim.
Salis Ammoniaci semunciam.
Syrupi Sassaparillae,
Pulveris Sassaparillae,
singulorum quantum sufficit ut fiant pilulae ducentae et quadraginta. (*Bo.*)
Jede enthält nur einen Zwanzigtheilgran Sublimat.

℞. Salis Alembroth drachmam unam.
Panis biscocti pulverati (Biscuit)
unciam unam.
Syrupi Sacchari quantum sufficit ut fiant pilulae centum viginti. (*Sw**.)
Jede enthält einen halben Gran Sublimat.

Vm. Sacchari scrupulum unum, Salis Alembroth scrupulos duos, Micae Panis drachmas duas et Syrupi Sacchari quantum sufficit.
Die Gabe und Anwendungsweise sind dieselben, wie für die Pilulae majores Hoffmanni, welche ihnen vorzuziehen sind.

Pilulae mercuriales Noltii. (*Vm.*)
℞. Salis Alembroth grana duodecim.
Opii . . . . . grana novem.
Succi Liquiritiae quantum sufficit ut fiat massa pilularis.

Pulvis escharoticus. (*Sm.*)
℞. Praecipitati albi . . grana sex.
Magnesiae subcarbonicae
scrupulum unum.
Sabinae pulveratae
drachmam unam.
Ein wenig wirksames cathaereticum.

Oxalas Hydrargyri s. Mercurii. (8*. *Br.*)
℞. Solutionis aquosae Nitratis Mercurii frigide paratae et Aqua dilutae quantum vis.
Infunde
Solutionis concentratae Acidi oxalici . sufficientem quantitatem vel donec non amplius exoriatur praecipitatum, quod Aqua destillata ablutum in loco umbroso siccetur.
Anwendungsweise wie beim salzsauren Quecksilberoxydul. Man hat dieses Salz nur wenig angewendet, jedoch ist es gegen venerische Krankheiten versucht worden.

Protoacetas Mercurii, Acetas Hydrargyri s. hydrargyrosus, Hydrargyrus acetatis, Hydrargyrum acetatum s. aceticum, Mercurius aceticus s. acetatus, Oxyacetas Mercurii, Sal Mercurii acetosus s. mercuriatus acetosus, Sperma Mercurii, Terra foliata Mercurii s. mercurialis. (An. B. Ba. Bor. Bor4. Br. Du Ed. Fer. Gal. Han. Lus. Pal. Wir. *Br. C. Fi. Sp. Sw. T. Vm.*)
℞. Mercurii . . . . libram unam.
Acidi nitrici Aqua diluti
libras duas,
Dissolve metallum balnei aquae ope in acido, et liquori deinde sensim adde solutionis aquosae Kali subcarbonici quantum satis ad praecipitandum omne oxydum, quod Aqua pura ablutum et leni calore siccatum, dissolve in Aceti destillatae sufficiente quantitate, liquorem filtra et ad cuticulam usque evaporatum crystallisationi subjice. (B.)

Lus. et *Sp.* Oxydum Potassae causticae ope praecipitare jubent.

Garot tractare jubet cum Oxydo acetico in quatuor gradibus densitatis et bulliente Hydratem Protoxydi Marcurii obtentum decomponendo Sodae causticae ope Protonitratem a Deutonitrate liberum.

℞. Mercurii,
Acidi nitrici Aqua diluti,
singulorum uncias tres.

Cessatâ effervescentia digere super arena calida ut metallum solvatur; liquorem statim commisce cum
Aquae bullientis partibus (?) octo in solutione tenentis
Acetatis Potassae . uncias tres.

Trajice celerrime per telam duplicem et refrigeratione in crystallos concrescere fac. (Du. Fer. *Vm.*)

Fi. Mercurii, Acidi diluti ut antea, Kali acetici sesquiunciam, Aquae destillatae calidae libram unam et uncias tres; solutioni mercurii in acido adde solutionem kali in aqua destillata, praecipitatum cum Aqua frigida ablue, solve in Aquae dictae libris duabus, coque paullulum, et post horae quadrantis sepositionem, liquorem decantha, qui refrigeratus crystallos praebet; — Gal. Protonitratis Mercurii partem unam, Aquae destillatae sex, et Acetatis Potassae liquidi quantum satis ad praecipitationem liquoris perfectam; — Ed. et *C.* Mercurii uncias tres, Acidi nitrici Aqua diluti quatuor cum dimidia, Acetatis Potassae tres et Aquae bullientis libras octo; — Bor. Acetatis Potassae liquidi uncias quinque, Aquae bullientis libras quatuor ad dilutionem et Nitratis Mercurii liquidi uncias quatuor; — Bor4. Liquoris Hydrargyri nitrici oxydulati quantum vis, Aquae partibus quatuor diluto admisce Liquorem Kali acetici, quamdiu praecipitatum crystallinum producitur, quod filtro separatum et Aqua frigida destillata ablutum loco umbroso sicca; — *T.* Solutioni aquosae crystallorum Nitratis Protoxydi Mercurii infundere liquorem Kali acetici donec praecipitatio cessaverit; — *Br.* Mercurii, Acidi nitrici tenuis, singulorum semilibram et Acetatis Potassae uncias octo in Aquae destillatae calidae libris duabus cum dimidia solutae.

Garot empfiehlt folgendes Verfahren, welches am meisten geeignet seyn soll, ein gleichförmiges Product zu geben:

℞. Protonitratis Mercurii crystallisati
partes septem.
Aquae destillatae partes sexaginta.
Acidi nitrici . . partem unam.
Dissolve sal in acido; praeterea solve
Acetatis Sodae crystallisati
partes quinque
in Aquae destillatae partibus sexaginta et solutiones commisce.

Außerdem giebt es noch zwei andere Verfahrungsweisen:

℞. Mercurii dulcis,
Dissolutionis Potassae causticae,
singulorum uncias duas.
Tritura in mortario lapideo et adde
Aquae destillatae uncias quatuor.
Coque per horae quadrantem continue agitando; residuum Aqua destillata ablue, donec ab Argento nitrico non amplius turbetur; sicca deinde lenis caloris ope et coque cum
Aceti destillati unciis triginta sex per horae tres quadrantes; liquorem bullientem filtra et refrigeratione in crystallos concrescere fac. (Han. *Vm.*)

℞. Oxydi Mercurii rubri partes 9,75.
Mercurii . . . partes novem.

Contere, subinde Aceti aliquantulum addendo, ad perfectam metalli extinctionem usque; satura deinde cum Aceto destillato calido, filtra subito et crystallisationi subjice. (*Vm.*)

Dieses Verfahren giebt ein Gemisch des Proto- mit dem Deutonitrat.

Solutio Acetatis Mercurii. (B*.)

℞. Proto-Acetatis Mercurii
grana decem ad duodecim.
Aquae Rosarum uncias quinque.
Dissolve. — Als Waschmittel bei manchen Hautkrankheiten empfohlen.

Syrupus mercurialis. (*Vm.*)

℞. Protoacetatis Mercurii
partem unam.
Alcoholis minimum quod possit ad solvendum sal ope caloris; solutioni adde
Syrupi Sacchari
partes quadraginta octo.
Misce bene.

Linimentum hydrargyro-acetosum. (B*. *Vm.*)

℞. Protonitratis Mercurii
partem unam.
Axungiae Porci . . partes sex.
Olei Olivarum . . partes duas.

Sal cum axungiae pauxillo in pulverem tere, et si homogenea redd.ta est miscella adde sensim quod restat axungiae et oleum. (*Vm.*)

B*. Salis scrupulos duos ad drachmam et Olei Olivarum unciam unam.

Von einigen Aerzten gegen Flechten angewendet.

Drageae s. Pilulae Keyseri, *Trochisci*

ex Acetate Mercurii. (*Ca. E. Sy. T. Vm.*)

℞. Mercurii . . . unciam unam.
Acidi nitrici . quantum sufficit ad metalli solutionem. Adde
Acetatis Potassae dissoluti
quantum sufficit
ut omnis mercurius praecipitetur; praecipitatum cum Manna vel Melle et Liquiritiae pulvere contere, ut fiant trochisci. (*Sy.*)

℞. Acetatis Mercurii
partem unam cum dimidia.
Amyli,
Gummi Arabici,
singulorum partem dimidiam.
Sacchari albi . . partes septem.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.
Fiat massa pilularis. (*Vm.*)

℞. Acetatis Mercurii,
Mannae electae,
Gummi Arabici,
singulorum scrupulum unum.
Aquae Rosarum quantum sufficit ut fiant pilulae viginti. (*E.*)

℞. Acetatis Mercurii . uncias duas.
Sacchari . . . . . uncias sex.
Gummi Arabici . unciam unam.
Pulveris Althaeae,
— Amyli,
singulorum semunciam.
Mucilaginis Gummi Arabici
quantum satis
ut fiant pilulae grani unius Saccharo conspergendae. (*Ca.*)

T. Quantitates Acetatis, Mannae vel Mucilaginis et Sacchari non indicat sed monet pilulas, quarum quaeque 3 ad 4 grana salis dicti continet, pulvere Amyli esse conspergendas et tres ad quatuor pro die propinandas.

Gabe, zwei Stück Morgens und Abends, allmälig bis auf fünf und zwanzig Stück und mehr auf die Gabe gestiegen. Sie waren lange in Ansehen, heutzutage aber nicht mehr: doch können sie von Nutzen seyn.

Deuto-Acetas Mercurii. (Fer. *Sw*.*)

℞. Oxydi Mercurii rubri uncias duas.
Acidi acetici . . uncias septem vel quantum ad oxydi dissolutionem modici caloris ope sufficit; liquor lente ad siccum evaporet.

Liquor hydrargyro-aceticus. (*Vm.*)

℞. Oxydi Mercurii rubri
partes decem.
Acidi acetici concentrati
partes quinque cum dimidia.
Oxydo in lagenam immisso acidum infunde, agita et quum totum album est redditum, in balneo aquae tepido calefac ad perfectam liquefactionem usque, massam crystallinam albam dissolve deinde in
Alcoholis rectificati
partibus sexaginta.
Filtra et serva.

Tartras Mercurii, Tartras Protoxydi Mercurii, Hydrargyrum tartarisatum, Tartarus mercurialis, Pulvis Constantini s. mercurialis argentosus, Mercurius tartarisatus. (B*. *Sw.*)

℞. Oxydi nigri Mercurii quantum vis.
Acidi tartarici quantum necesse est.
Coque simul ad perfectam oxydi solutionem usque; evaporent deinde ad gradum necessarium ut liquor refrigeratione in crystallos concrescat.

Gabe, ein bis zwei Gran zweimal täglich.

Tartras Mercurii et Potassae. (B. Fer. Gal. *Ca. Fi. Sp. Sw. T. Vm.*)

℞. Solutionis Mercurii in Acido nitrico saturatae et bullientis
quantum vis.
Guttatim instilla solutionem aquosam saturatam et bullientem Tartratis Potassae neutralis, donec non amplius enascatur praecipitatum, quod, liquore decanthato, binis sequentibus vicibus Aquae frigidae pauxillo ablutum, in Aquae bullientis sufficiente quantitate solve et liquorem ut in crystallos concrescat, ad locum frigidum repone. (B. Gal. *Sw. Vm.*)

T. Solutioni Crystallorum Nitratis Mercurii in Aquae destillatae unciis tribus infundere jubet solutionem aquosam Tartratis Potassae, donec praecipitatum non amplius promoveatur, quod repetito Aqua frigida lotum siccetur.

℞. Oxydi Mercurii e Nitrate per Potassam praecipitati et bene loti
uncias duas.
Cremoris Tartari uncias quatuor.
Tritura simul per horas quatuor, tum coque cum
Aquae destillatae
unciis quadraginta octo.
Liquor ad cuticulam evaporatus in crystallos concrescat (*Sp.*)

℞. Carbonatis Mercurii (ammoniacalis?) . . . . unciam unam.
Cremoris Tartari . . uncias sex.
Tere in mortario et pulveri infunde
Aquae bullientis libras quatuor.
Solutio evaporata in crystallos concrescat. (Fer. *Fi. T.*)

Solutio nondum evaporata *Aquam s. Liquorem vegeto-mineralem de Pressavin* praebet.

Vm. Terere jubet Oxydi Mercurii par-

tes 10,25 et Cremoris Tartari 19,5; miscellae infundere Aquae bullientis quantum satis ad perfectam solutionem, calefacere deinde per horae quadrantem ad ebullitionem usque, colare et crystallisationi subjicere. — Praeterea: 1) triturare simul Sublimati corrosivi partes 12,7 et Tartraris Potassae neutralis 23, mixta terere cum Aquae frigidae sufficiente quantitate, ut hydrochloras potassae exacte separetur, residuum in Aqua bulliente dissolvere, liquorem calefacere, filtrare et crystallisationi subjicere; 2) solutionem saturatam Sublimati corrosivi decomponere Tartratis Potassae et Sodae ope; 3) triturare simul Oxydi Mercurii partes 10,25 et Tartratis neutralis Potassae partes 23; potassam lotione liberatam separare, residuum dissolvere et liquorem crystallisationi subjicere.

℞. Mercurii uncias duodecim cum dimidia.
Oxydi rubri Mercurii unciam unam et drachmas quinque cum dimidia.
Cremoris Tartari unciam unam et drachmas duas cum dimidia.
Aquae . . . . quantum sufficit ut fiat pasta, cui per longum tempus in mortario cineri calido imposito triturátae Aquam bullientem quantum satis ad solutionem adde; liquor filtratus ad cuticulae apparitionem usque evaporet. (*Ca.*)

Sw et Vm.* eundem agendi modum indicant sed *Sw*.*: Mercurii partes quinque cum dimidia, Oxydi partes sex, Cremoris Tartari partes viginti septem; — *Vm.* Mercurii partes novem cum dimidia, Oxydi partes decem cum quadrante, Cremoris Tartari partes novemdecim et dimidiam; — *Vm.* praeterea proposuit: 1) terere simul Mercurii dulcis partes 22,2 et Tartratis Potassae 23, Aquam instillare, calefacere, Aqua bulliente addita solutionem conficere, filtrare et crystallisationi subjicere; 2) triturare ad extinctionem usque Sublimati corrosivi partes 12,7, Mercurii 9,5, et addere deinde Cremoris Tartari partes 23; 3) Sulphatem parare ex Oxydi rubri Mercurii 9,5 et Acidi sulphurici concentrati 10, terere hoc sal cum metalli 9,5, massam humectare cum Aquae decem, miscere eam cum Tartratis neutralis Potassae 23, totum in Aqua calida dissolvere et sal mercuriale crystallisatione separare.

Dieſes Doppelſalz bildet die Baſis des *Liquor vegeto-mineralis Pressavin*, welchen man bereitet, indem man Queckſilber in Salpeterſäure auflöſ't, es durch ein Alcali niederſchlägt, den Niederſchlag mit beſtillirtem Eſſig behandelt, ihn durch Zuſatz von Cremor tartari wieder fällt und ihn mit Waſſer warm auflöſ't. (*Vm.*)

Dieſes Salz iſt von dem vorhergehenden nur wenig verſchieden; es war einige Zeit berühmt und kann unter denſelben Umſtänden angewendet werden.

Syrupus Tartratis Mercurii. (*Bo. Pie.*)

℞. Stipitum Dulcamarae libras duas cum dimidia.
Aquae . . . quantum sufficit.
Coque et decocto adde
Sacchari . . . . libras decem.
Coque syrupum ad globulum usque et pro octario adde momento quo eo uti vis
Liquoris vegeto-mineralis de Pressavin . . . uncias duodecim.
Misce exacte.

℞. Corticis Mezerei . uncias duas.
Aquae . . . quantum sufficit.
Decoctioni adde
Sacchari albi . . . libras tres.
Fac deinde ut antea. — Gabe, zwei bis vier Unzen täglich, auf zwei Mal.

Oleo-Margaras Mercurii, Sapo Hydrargyri s. Mercurii s. mercurialis. (B*. R. *Au. Bo. Sw. Sy. Vm.*)

℞. Saponis albi . . partem unam.
Dissolve in Aquae partibus quatuordecim: liquori instilla solutionem maxime dilutam Protonitratis Mercurii, donec praecipitatum non amplius enascatur; calefac ut magma bene coeat, decantha liquidum et praecipitatum Aqua tepida ablutum commisce cum Aquae 80° R. partibus octo ac pedetentim adde Kali causticum liquidum ad perfectum dissolutionem usque; evaporet deinde, donec liquor digitis non amplius adhaereat.

Aeußerlich zur Auflöſung von Bubonen. Auch hat man dieſes Präparat bei Rheumatismen und chroniſchen Exanthemen empfohlen.

Sapo mercurialis Chaussieri. (*Ca.*)

℞. Unguenti mercurialis (partes aequales) uncias tres cum dimidia.
Tritura in mortario vitreo sensim superfundendo
Natri caustici liquidi uncias tres donec miscella magnam acquisiverit tenacitatem; tum in modulo effusam sicca. — Wie das vorige gebraucht.

Unguentum Praecipitati viridis. (*Sw*.*)

℞. Sublimati corrosivi partes duas.
Hydrochloratis Cupri partem unam.
Salibus seorsim in Aqua solutis, mis-

ce solutiones et iis infunde solutionem Saponis albi; praecipitatum filtro receptum lavando edulcora. — Zum Verbinden venerischer Geschwüre empfohlen. Es ist eine seifenartige Verbindung des Quecksilbers mit Kupfer.

Mesembryanthemum.

Mesembryanthemum crystallinum, L.; Eiskraut, Eispflanze, Mittagsblume; Glaciale, Cristalline (*Gal.*); Ice plant, Diamont fig. Marigold (*Ang.*); Isplante (*D*); Hierba de la plata (*His.*); Yskruid (*Bel.*); Erba cristallina (*I.*); Agelada (*Lus.*); Isaert (*Suec.*).

An. R. Ba. Ful. *M.*

⊙ (Icosandria Pentagynia, L; Ficoideae, *J.*) Eine Pflanze des Archipels. (*Dill.* Elth. 231. t. 180. f. 221. *Plenck.* t. 397.)

Das Kraut, welches man anwendet, besteht aus einem ästigen Stängel mit kleinen, eirunden, wellenförmigen, entgegengesetzten oder abwechselnden Blättern, welche so wie ersterer überall mit sehr großen glänzenden Krystallblasen bedeckt sind. Es hat einen faden, etwas widerlichen Geschmack.

Kühlend, auflösend, bei convulsivischem Husten und Dysurie, so wie als specifisch harntreibendes Mittel gepriesen. — Gabe, vom Saft, ein Löffel alle zwei Stunden.

Conserva Mesembryanthemi crystallini. (Ful.)

℞. Herbae Mesembryanthemi crystallini recentis contusae et cribratae . . . . . partem unam.
Sacchari albi . . . partes duas.
Misce triturando.

Linctus s. Looch Mesembryanthemi crystallini. (B*. *Au.*)

℞. Succi Herbae Mesembryanthemi crystallini,
Syrupi Musci albi querni,
singulorum unciam unam.
Misce. — Gabe, ein halber Löffel täglich sechs Mal, bei convulsivischem Husten der Kinder.

Syrupus Mesembryanthemi crystallini. (Ba.)

℞. Succi expressi Herbae recentis Mesembryanthemi, ebullitione depurati et despumati partem unam.
Sacchari
partem unam cum dimidia.
Fiat syrupus.

Mespilus.

Zwei Arten dieser Pflanzengattung finden sich in den Pharmacopöen angeführt:

1) *Mespilus Germanica, L.*; Mispelbaum; Néflier d'Allemagne (*Gal.*); Dutenmedlar (*Ang.*); Mispeltrae (*D.*); Mispero (*His.*); Mispelboom (*Bel.*); Misplik (*Pol.*); Nespereira (*Lus.*); Mespleltraed (*Suec.*).

Ams. Gal. His. Wir. *Be. M. Sp.*

Ein Baum (Icosandria Pentagynia, L.; Rosaceae, *J.*), welcher auf den Europäischen Gebirgen wächst. (*Blackw.* t. 154. *Plenck.* t. 393. *Bert.* Bild. V. 87. fig. 2. *Nouv. Duh.* IV. 38.)

Man wendet die Frucht und den Saamen an.

Die Frucht, Mispel (fructus Mespili) ist rundlich, platt gedrückt, fleischig, an der Spitze genabelt, und enthält mehrere einsaamige Fächer. Ihr Geschmack ist herbe und zusammenziehend, wird aber, wenn sie durch Liegen weich geworden und daher in einem der Fäulniß nahe stehenden Zustand (blossissement) gekommen sind, süß, weinig und sehr angenehm.

Der Saame ist knochig, sehr hart und länglich.

Die Frucht ist etwas adstringirend und der Saame gilt als harntreibend.

2) *Mespilus Oxyacantha, Cand.*; Weißdorn; Aubepine, Epine blanche (*Gal.*); White hawthorn (*Ang.*); Hagetorn (*D.*); Espino majuolo (*His.*); Haagdorn (*Bel.*); Bianco spino (*I.*); Boldak (*Pol.*); Espinheiro alvar (*Lus.*); Hagtorn (*Suec.*).

Gal. His. *Sp.*

Ein Strauch (Icosandria Digynia, L.; Rosaceae, *J.*), welcher in ganz Europa gemein ist. (*Blackw.* t. 149. *Schk.* t. 132. *Jacq.* Fl. Austr. III. t. 292. f 2.)

Man wendet die Blüthen (flores Oxyacanthae s. Spinae albae) an; sie sind weiß, groß und in Sträuße vereinigt. Sie haben einen angenehmen Geruch, welcher durch Trocknen sich fast ganz verliert. Der Geschmack ist schwach styptisch.

Mit lauwarmem Wasser aufgegossen, werden sie bisweilen als Hausmittel gegen Husten gebraucht. Die Materia medica verliert an ihnen nichts.

Meum.

Ligusticum Meum, Ro.; Bärwurz, Hundspetersilie, Herzwurzel, Mutterwurz, Bärenfenchel; Meum (*Gal.*); Common signel (*Ang.*); Keprnjk (*B.*); Biaerne dild (*D.*); Meo (*His. I.*); Beerwortel (*Bel.*); Olesnik (*Pol*); Bjaern dill (*Suec.*).

An. Bel Br. Fer Gal. His. Wir. Wür. *Be. Br. G. M. Sp.* Z.

♃ (Pentandria Digynia, L.; Umbelliferae, *J.*) Eine in Europa wachsende Pflanze. (*Blackw.* t. 525. *Plenck.* t. 201. *Hayne* VII. t. 12. *Zorn* Ic. pl. t. 499.)

Man wendet die Wurzel (radix Mei s. Mei athamantici s. Anethi s. Foeniculi ursini) an; sie ist sechs bis acht Zoll lang, fingersdick, runzlig, außen schwärzlichgrau, innen weiß. Sie hat einen starken balsa-

miſchen Geruch und einen gewürzhaften, brennenden Geſchmack.

Reizend, harntreibend, Bruſtmittel, aber wenig gebraucht.

Millefolium.

Achillea Millefolium, *L.*; Schaafgarbe; Millefeuille commune (*Gal.*); Commøn milfoil (*Ang.*); Kjebrjcek (*B*); Kaellike, Harhaens, Jordhumble (*D.*); Millefolia, Milenrama (*His.*); Gemeene duizendblad (*Bel.*); Millefoglio (*I.*); Tysiacznik (*Pol.*); Milem rama (*Lus.*); Daellika (*Suec.*).

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His Li. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. *Be. Br. Fi. G. M. Pid. Sp.* Z.

♃ (Syngenesia Polygamia Superflua, *L.*; Synantherèae, *Cass.*) Eine Europäiſche Pflanze. (*Blackw.* t. 18. *Schk.* t. 255. *Plenck.* t 631. *Düss.* off. Pfl. I. t. 21. *Zorn* Ic. pl. t. 29.)

Man wendet das Kraut und die blühenden Spitzen an.

Das Kraut (herba Millefolii s. Achilleae vulgaris) beſteht aus langen, behaarten, doppelt gefiederten, in viele linienförmige Fiedern getheilten Blättern. Es hat einen angenehmen Geruch und einen bittern, gewürzhaften, etwas adſtringirenden Geſchmack.

Die Spitzen (summitates vel flores Millefolii) bilden endſtändige, aus dicht ſtehenden weißen oder purpurrothen Blüthen zuſammengeſetzte Sträuße. Sie haben einen etwas unangenehmen, ſchwach gewürzhaften Geruch, und einen bittern, etwas ſcharfen, balſamiſchen Geſchmack.

Reizend, toniſch, krampfſtillend, Wundmittel, bei Hyſterie, Blähungs- und Hämorrhoidalcolik angewendet. Man giebt den ausgedrückten Saft zu einigen Unzen.

Species contra sputum sanguinis s. adstringentes. (Pal.)

℞. Millefolii purpureo-florescentis uncias novem.
Herbae Tormentillae cum radice,
— Pimpinellae albae e tota planta,
— Plantaginis,
— Virgaureae,
Florum Rosarum rubrarum,
singulorum sesquiunciam.
Concisa misce.

Succus Millefolii. (Hass. *T.*)

℞. Herbae recentis Millefolii quantum vis.

Contunde in mortario lapideo, Aquae pauxillum adspergendo; exprime fortiter, succum sepone, decantha et in lagenis serva.

Extractum Millefolii aquosum. (A. An. Ba. Bor. Bor4. D. Han. Hass. HassP. O. Pal. Sax. Suec. Wir. *Pid. T. Vm.*)

℞. Foliorum recentium Millefolii quantum vis.

Contunde cum Aquae paux llo et per pannum cola; sepone, decantha et prope ignem coagulatum iterum cola; tunc ad massae pilularis consistentiam evaporatum ab igne remove, faeculam antea repositam commisce et iterum ad aptam spissitudinem usque vaporando consume. (*Vm.*)

℞. Herbae Millefolii libram unam.
Aquae frigidae . libras duodecim.

Macera per horas quadraginta octo, subinde agitando; cola et colaturâ ad librarum duarum circiter remanentiam consumtâ, liquorem refrigeratum cola et vaporando in balneo aquae, ad consistentiam requisitam consume. (Han.)

℞. Foliorum recentium Millefolii,
Aquae frigidae,
singulorum partem unam.

Macera per horas duodecim et adde
Aquae bullientis duplum pondus massae totius. Post refrigerationem colatum et albumine clarificatum igni impone et liquorem, quum spissescere coeperit, per pannum trajectum, continuè agitando, probe consume. (*Vm.*)

℞. Herbae Millefolii . libram unam.
Aquae fontanae . . libras sex.

Digere per horas quatuor, tunc parumper coctum cola exprimendo et colaturam ad extracti spissitudinem consume. (Li. Pal. Wir.)

℞. Herbae Millefolii partem unam.
Aquae communis . partes octo.

Infunde per horas quatuor, tunc coque per quadrantem et cola fortiter exprimendo. Residuo cum Aquae partibus quatuor cocto, liquores commisce, qui per horas viginti quatuor sepositi ad requisitam consistentiam evaporent. (Sax.)

℞. Herbae Millefolii libram unam.
Aquae communis . . libras sex.

Coque per horam unam, cola exprimendo et colaturam decanthatam post horarum viginti quatuor sepositionem blando igne consume. (Hass. *Pid.*)

Ba. Herbae partem unam, Aquae duodecim et quadrantem horae ebullitionis; — Au Herbae unam, Aquae decem et ebullitionem per horae quadrantem.

℞. Herbae Millefolii partem unam.
Aquae bullientis . partes octo.

Coque leviter per horae quadrantem et cola exprimendo. Residuum cum Aquae partibus quatuor coctum itidem

coletur; liquores tunc commixti et post sufficientem sepositionem decanthati ad extracti consistentiam evaporent. (Bor. D. Han. O.)

Bor. Millefolii quantum vis, Aquae fervidae decuplum, post 36 horarum sepositionem liquorem exprimendo separa; residuum cum Aquae fervidae quintuplo infunde et post refrigerationem exprime, liquores decanthando colandoque depurati et commixti primo lenissimo calore ad tertiam partem tunc in balneo vaporis ad justam extracti spissitudinem evaporent; — T. summitatum siccatarum libram unam, Aquae bullientis libras octo, 24 horarum infusionem et evaporationem ad extracti consistentiam; — A. Herbam florescentem pluribus sequentibus bullitionibus penitus extrahere, liquores commiscere et decanthatos in balneo aquae consumere; — Suec. coquere eam parumper cum Aquae duplo, exprimere, residuum cum nova Aqua decoquere et liquores commixtos in balneo aquae inspissare; — HassP. ut extractum cardui benedicti.

Extractum Millefolii alcoholicum. (Ful. Pol. Wür.)

℞. Herbae Millefolii,
Alcoholis, singulorum libras duas.
Aquae communis libras novem.

Digere per horas duodecim, cola exprimendo et Alcohole destillando separato, residuum ad requisitam consistentiam evaporet. (Pol.)

Ful. et Wür. Herbae libram unam, Alcoholis tantidem, octo Aquae et tres dies infusionis.

Syrupus Millefolii s. de Millefolio. (Gal.)

℞. Foliorum recentium Millefolii semilibram.
Aquae bullientis . . libras tres.

Infunde per horas duodecim, filtra et liquori adde
Sacchari albi . . . . duplum.

Gabe, eine halbe bis zwei Unzen.

Tisana haemastatica. (*Pie.*)

℞. Caudae vulpinae,
Millefolii,
Foliorum Plantaginis,
— Polygoni,
— Urticae,
singulorum manipulum unum.
Aquae . . . . . octarios tres.

Tertiam partem coquendo consume.

Linctus s. Looch pectoralis. (Br.)

℞. Herbae Millefolii,
Herbae Hederae terrestris, singularum uncias duas cum dimidia.
— Hyssopi,
Stipitum Dulcamarae,
singularum unciam unam.
Aquae bullientis . . libras tres.

Post horas duodecim infusionis decoque lente ad dimidii remanentiam; exprime fortiter et adde
Mellis depumati . libras tres.
Aceti . . . . libram unam.

Decoque blando igne ad mellis consistentiam.

Mixtura Millefolii, Potio excitans. (*Au.*)

℞. Extracti Millefolii . semunciam.
Aquae Menthae piperitae uncias octo.
Elaeosacchari Menthae semunciam.

Gabe, ein Löffel, vier Mal täglich.

Tinctura s. Essentia Millefolii. (Br. Ful. HassP. Li. Pal. Wir.)

℞. Herbae Millefolii . uncias tres.
Alcoholis . . . uncias sedecim.

Digere per tres dies, cola exprimendo et cum colatura infunde
Herbae Millefolii . uncias duas.

Post sufficientem digestionem cola exprimendo et filtra. (Br. Pal. Wir.)

Ful. et Li. Herbae florescentis partem unam, Alcoholis octo et octo dies digestionis? — HassP. Herbae uncias quatuor, Spiritus Vini rectificati libras duas, digere per dies sex; tincturae expressae et filtratae pondus sit unciarum viginti.

Reizend, ehedem gegen Hämorrhoiden, Mutterblutflüsse und Nierensteinschmerzen empfohlen. — Gabe, funfzig bis siebenzig Tropfen.

Oleum Millefolii aethereum, Aetheroleum Millefolii. (Br. Ful. Sax. Wir.)

℞. Summitatum florescentium Millefolii . . . . partem unam.
Aquae . . . . . partes tres.

Destillando elicitum oleum separetur. (Ful.)

Sax. Herbae partem unam et octo Aquae; — Br. et Wir. Herbae viginti quinque, Aquae septuaginta quinque, Salis communis tres et tres dies digestionis.

Gabe, funfzehen Tropfen bis eine halbe Drachme.

Aqua Millefolii. (Han. *Vm.*)

℞. Herbae florescentis Millefolii libras duas.
Aquae purae . quantum sufficit.

Destillent librae duodecim. (Han.)

℞. Herbae florescentis Millefolii partes quinque.
Aquae Vitae partis quadrantem.

Aquae purae . partes sexaginta.
Destillent partes viginti. (*Vm.*)
Gabe, zwei bis vier Unzen.

Spiritus aromaticus s. vulnerarius s. Millefolii s. Rorismarini compositus. (Fenn. Suec. *Vm.*)

℞. Summitatum Millefolii
sesquilibram.
— Rorismarini
— Thymi,
singularum semilibram.
Alcoholis,
Aquae, singulorum libras octo.
Destillent librae octo. (Fenn.)

Suec. Rorismarini sesquilibram, Millefolii, Thymi, singulorum libram unam et Aquae Vitae Frumenti purificatae libras sedecim.

℞. Millefolii florescentis partes tres.
Artemisiae,
Matricariae,
Serpylli, singulorum partem unam.
Aquae Vitae . partes sedecim.
— purae
partes quadraginta octo.
Destillent partes sedecim. (*Vm.*)

Aqua pontificalis s. vulneraria Romana s. Succorum vegetabilium vulneraria, Balsamum vulnerarium vegetabile, Liquor vulnerarius vegetabilis Dippelii, Spiritus aromaticus s. vulnerarius acidus, Spiritus Millefolii s. Rorismarini acetatus. (B*. Fenn. His. Suec. Wir. *Vm.*)

℞. Herbae Nummulariae,
— Betonicae,
— Chaerophylli,
— Plantaginis,
— Aristolochiae Clematidis,
singularum uncias duas.
— Saniculae,
— Verbasci,
— Sedi majoris,
— Sedi minoris,
— Pervincae,
— Pimpinellae albae,
singularum uncias tres.
Foliorum Quercus,
Summitatum Millefolii,
singulorum uncias duas.
Contunde, exprime fortiter succum, qui cum
Aceti . aequali suae quantitate.
Salis culinaris . . unciis quatuor destillet. Productum serva. (Wir.)

℞. Succi Millefolii,
— Betonicae,
— Origani,
— Pimpinellae albae,
— Sedi majoris,
— Saniculae,
Succi Verbenae,
singulorum uncias sex.
— Mari . . . uncias tres.
Kali subcarbonici,
Salis culinaris,
singulorum uncias sex.
Cremoris Tartari uncias quatuor.
Aloës Socotrinae . unciam unam.
Aceti destillati . . libram unam.
Dissolve aloën in aceto, sal in succo betonicae, kali in succis verbenae et millefolii, cremorem in succo pimpinellae; liquores commixtos digere per tres dies et destillando ad siccum redige; productum cum residuo pulverato dilue et novam destillationem institue, quod tertio est repetendum (His.)

B*. Succorum Origani, Saniculae, Betonicae, Verbenae, Sedi majoris, Pimpinellae albae et Millefolii, singulorum uncias sex, Succi Mari tres, Subcarbonatis, Salis marini, singulorum uncias sex, Cremoris Tartari quatuor, Aceti libram unam et Aloës sesquunciam; post tres dies digestionis destillet tertia pars.

℞. Spiritus Millefolii compositi
partes duas.
Aceti . . . . . partem unam.
Misce (Fenn. Suec. *Vm.*)

Reizend, als Auflösungsmittel bei Quetschungen und Ekchymosen betrachtet, auch als adstringirendes Mittel bei innern Blutflüssen, und zur Verminderung der Schweiße Schwindsüchtiger gebraucht. — Gabe, vierzig Tropfen und mehr. — Man könnte statt des Weinessigs auch Alcohol nehmen.

Millepedes.

Oniscus Asellus, L.: Kellerwurm, Kelleresel; Cloporte ordinaire (*Gal.*); Haters, Chesbug (*Ang.*); Skukketrold (*D.*); Galminha, Encarrucha (*His.*); Pssebedden (*Bel*); Centogambo, Millepiede, Porcelletto (*I.*); Stonog (*Pol.*); Centopea (*Lus.*); Gruesugga (*Suec.*).

Ams. B. Ba. Bor. Br. Fer. Ful. Gal. Gen. Han. HassP. His. Li. O. Pol. R. Sax. Wir. *A. Fi. G. Sp.*

Der gemeine Kellerwurm gehört in die Classe der Crustaceen (Isopoda, Oniscides; *Latr.*) und ist allenthalben sehr gemein (*Panz. Faun. Germ. fasc. IX. 21.*); er ist aschgrau, glatt, mit schwarzen und gelblichen Flecken.

Die Kellerwürmer gelten für eröffnend, schmelzend und harntreibend. Ehedem schätzte man sie sehr gegen Wassersucht und Asthma. — Gabe des Pulvers, 1 Scrupel bis 1 Drachme, des ausgepreßten Saftes, eine halbe Unze. Ful. verordnet in muris non sub trabibus collectos.

Millepedes praeparati. (*Fi.*)

℞. Millepedum . . . quantum vis.
Lava in bono vino et mortuos in balneo vaporis sicca, tunc denuo, tertio vel quarta vice cum novo vino lava et sicca.

Conserva Millepedum. (B*. Ful. Li. Wir.)

℞. Millepedum viventium
libram unam.
Sacchari albi
libras duas cum dimidia.
Contere. (B*. Li. Wir.)
Ful. Millepedum partem unam et duas Sacchari.
Gabe, eine bis zwei Drachmen.

Jus Millepedum. (*Au.*)

℞. Millepedum . drachmam unam.
Aquae aromaticae . semunciam.
Jussis Carnis . . uncias novem.
Harntreibend.

Infusum Millepedum. (Sar.)

℞. Millepedum viventium contusorum
drachmas sex.
Aquae purae . . . uncias tres.
Alcoholis . . . unciam unam.
Post macerationem per horam unam cola, fortiter exprimendo. — Harntreibend.

Syrupus Millepedum. (*Ca.*)

℞. Sacchari . . uncias duodecim.
Radicis Asparagi,
— Liquiritiae,
Uvarum passarum,
Foliorum Parietariae,
Mannae,
singulorum drachmas duas.
Fiat syrupus, tunc
℞. Succi Boraginis,
— Buglossi,
singulorum uncias duas.
Millepedum contusorum
sesquiunciam.
Commisce, filtra et pro unciis quatuor liquoris adde
Sacchari . . . . semilibram.
Solve in balneo aquae et syrupum cum praecedente commisce.
Bei Husten und Keuchhusten empfohlen.

Vinum diureticum. (*Ca. Sm. Sp.*)

℞. Millepedum viventium
unciam unam.
Contunde et infunde sensim
Vini albi novi aciduli uncias sex.
Cola exprimendo. (*Ca. Sm.*)
Sp. Millepedum unciam unam, Sacchari tantidem et quatuor Vini.

Liquor diureticus. (*Pie.*)

℞. Millepedum . . no. 30 ad 40.
Baccarum Alkekengi no. 20 ad 30.
— Juniperi . . . . no. 6.
Contunde in mortario marmoreo, sensim affundendo
Vini albi sufficientem quantitatem.
Cola exprimendo.

Tinctura s. Essentia Millepedum. (Br.)

℞. Millepedum bene siccatorum
semunciam.
Spiritus Vini rectificati uncias sex.
Post sufficientem extractionem cola exprimendo et filtra.

Momordica.

Zwei Arten dieser Pflanzengattung finden sich in den Pharmacopöen angezeigt:

1) *Momordica Balsamina, L.*; Balsamapfel, Wunderapfel; Balsamine, Pomme de merveille (*Gal.*); Balsamappel (*Ang.*); Balsamaeple (*D.*); Momordica (*His. I.*); Balsam appel (*Bel.*).

Br. Fer. Gal. *Br. Sp.*

2) (Monoecia Monadelphia, L.; Cucurbitaceae, J.) Eine Pflanze Ostindien's. (*Blackw.* t. 539 a b. *Knorr.* del. I. t. B. 3. *Zorn* Ic. pl. t. 45.)

Man wendet die Frucht (fructus Momordicae s. Pomum hierosolymitanum) an; sie ist beerenartig, fast von der Größe eines Taubenei's, von pomeranzen- oder scharlachrother Farbe.

Ehedem galt sie als Wundmittel; heutzutage bedient man sich ihrer nicht mehr.

2) *Momordica Elaterium, L.*; Eselsgurke, Eselskürbis, Springgurke, Spritzgurke; Elaterium, Concombre sauvage (*Gal.*); Squirting concombre (*Ang.*); Strikawa aneb plana tykwice (*B.*); Cohombrillo amargo (*His.*); Ezelskomkommers (*Bel.*).

Br. Du. Ed. Fer. Gal. Gen. His. Lon. LonN. Sax. Suec. Wir. *Be. Br. C. G. M. Par. Sa. Sp. Z.*

⊙ Eine Südeuropäische Pflanze. (*Blackw.* t. 108. *Plenck* t. 698. *Bull.* t. 81. *Schk.* t. 313. *Hayne* VIII. 45. *Zorn* Ic. pl. t. 144.)

Man wendet die Wurzel und die Frucht an.

Die Wurzel (radix Cucumeris agrestis s. asinini s. Momordicae Elaterii) ist zwei bis drei Zoll dick, einen Fuß lang, und hat einen unangenehmen Geruch und einen widerlichen, brennenden Geschmack.

Die Frucht ist eine eirundlängliche, grüne Beere, welche man halbreif abnimmt. Diese Frucht enthält, nach *Paris*, einen eigenthümlichen Stoff, das Elatin oder Elaterin (Elatinum, Elaterinum), in welchem die Wirksamkeit liegt.

Ein sehr heftiges drastisches Purgirmittel, welches ehedem bei chronischer Wasser-

sucht gebraucht wurde, heutzutage aber nicht mehr angewendet wird.

Succus Elaterii. (His. Sar.)

℞. Fructuum Elaterii nondum penitus maturorum . . quantum vis.

Seminibus separatis, reliquum contunde in mortario lapideo, exprime succum, sepone, decantha et partem limpidam serva.

Elaterium, Inspissamentum Cucumeris agrestis, Extractum fructus Momordicae Elaterii. (Br. Du. Han. His. Lon. LonN. Sar. Wir. Würt. *Sp. Sw. T. Vm.*)

℞. Fructuum Elaterii maturorum quantum vis.

Petiolis apicis cultri ope, seminum separandorum causa remotis, contunde pericarpia in mortario pistillo ligneo, Aquam pedetentim addendo; pulpam per cribrum trajice et blando igne ad extracti consistentiam vaporando consume. (Gal. Sar. Wir. Würt. *Sp. Sw. Vm.*)

Han. His. Lon. et LonN. succum expressum seponere jubent ut subsideat liquidum supernatantem rejicere et sedimentum leni calore consumere; — Du. hocce blando igne inter duo lintea siccare; — *Br.* praecipitationem digestionis in balneo aquae ope juvare; — *T.* ut extractum cichorii.

Ein heftiges, ehedem bei Wassersuchten sehr gebräuchliches Purgirmittel. Man setzte es zu andern wassertreibenden Mitteln. Gabe, drei oder vier Gran.

Faecula Cucumeris agrestis. (Gen. *Vm.*)

℞. Fructuum viridium Elaterii quantum vis.

Contunde cum pistillo ligneo in mortario vitreo et exprime succum, residuum cum Aquae pauxillo contusum itidem exprime; mixtos liquores sepone, decantha, igni impone ut coagulet faecula, remove deinde, cola, faeculam bene lava et blando calore siccatam pulvera.

Pilulae hydragogae. (*Sa.*)

℞. Extracti Elaterii . grana decem.
— Gentianae drachmas tres.

Fiant pilulae quatuor granorum.

Pilulae ex Elaterio s. Elaterii compositae. (Suec.)

℞. Gummi Ammoniaci uncias duas;
Aloës Socotrinae,
Gummi Guttae,
singulorum drachmas duas.
Extracti Elaterii semidrachmam.
Tincturae Absinthii quantum sufficit.

Fiant pilulae sexcentae et quindecim.

Oleum Momordicae. (Br. Sar. Wir. Würt.)

℞. Fructuum maturorum Elaterii partem unam.
Olei Olivarum . . partes duas.

Digere per dies duos in balneo aquae et exprime; post refrigerationem maceratio repetatur. (Sar.)

Br. et Wir. digerere super cinere calido jubent Fructuum partem unam, Olei Lini partem unam cum dimidia, coquere tunc lente per horam unam ad consumptionem humidi usque et denique digestionem atque coctionem cum novorum fructuum aequali quantitate repetere; — Würt. Coquere lente ad humidi usque consumptionem Fructuum maturorum partem unam in Olei Olivarum duabus.

Bei aufgesprungenen Brustwarzen, Hämorrhoidalschmerzen und Frostbeulen empfohlen.

Oleum Conyzae vel Momordicae compositum. (His.)

℞. Foliorum Conyzae majoris,
— Laureolae,
— Momordicae,
— Calaminthae,
— Rorismarini,
— Majoranae,
— Thymi,
— Rutae,
— Lauri,
— Sabinae,
— Salviae,
singulorum uncias quatuor.
Radicis Bryoniae,
— Ari,
— Momordicae,
singulorum uncias duas.
Olei Olivarum . . libras decem.

Macera per dies quatuor, tunc coque lente ad humidi usque consumptionem et cola cum expressione.

Solutio Elaterii, Mixtura hydragoga. (*Au. E. Huf.*)

℞. Extracti Elaterii granum unum.
Aetheris nitrici . . uncias duas.
Tincturae Scillae,
Oxymellis Colchici,
singulorum semunciam.
Syrupi Sacchari . . unciam unam.

Gabe, ein Löffel vier oder fünf Mal täglich in etwas Wasser. (*Au. E.*)

℞. Extracti Elaterii granum unum.
Aquae Petroselini . uncias sex.
Aetheris nitrici . drachmas duas.
Oxymellis scillitici,
Syrupi Rhamni,
singulorum semunciam.
Roob Juniperi . unciam unam.

Tincturae aromaticae drachmam unam.

Gabe, zwei Löffel alle zwei oder drei Stunden.

Monarda.

Monarda punctata, *L.*; punctirte Monarde; Monarde ponctuée (*Gal.*); Mountain balm (*Ang.*).

Am. *C.*

⊙ (Diandria Monogynia, L.; Labiatae, *J.*) Eine in Nordamerica einheimische Pflanze. (*Pluk.* Alm. t. 24. fig. 1.)

Das Kraut, welches man anwendet, besteht aus einem filzigen, weißlichen Stängel mit schmalen, spitzigen und überall mit vielen glänzenden Haaren bedeckten Blättern.

Wahrscheinlich wirkt es als Reizmittel.

Oleum Monardae aethereum, *Aethereoleum Monardae.* (Am. *C.*)

℞. Herbae Monardae quantum vis.
Aquae . . . . quantum sufficit ut herba obtegatur. Destillent.

Moringa.

Moringa oleifera, *Lamk.*; gemeine Behennuß; *Ben oléifere* (*Gal.*).

Br. Gal. Ful. Li. Wir. *G. Sp.*

Ein Baum (Hexandria Monogynia, L.; Leguminosae, *J.*) Malabar's. (*Blackw.* t. 386. *Plenck* t 318. *Descourt.* Fl. méd. d'Ant. t. 27. Fl. méd. III. 63.)

Man wendet die Wurzel und den Saamen an.

Die Wurzel (radix Moringae) besteht in Stücken von verschiedener Dicke, von gelblicher Farbe, harzigem Bruche und gewürzhaftem Geruch und Geschmack.

Man ist noch nicht ganz sicher, ob sie wirklich von dieser Pflanze kommt.

Ein fast ungebräuchliches Wurmmittel.

Der Saame, Ben-Nuß (nux Beu s. Been, Balanus myrepsica. Glans unguentaria), ist eine einförmige Nuß mit drei häutigen Flügeln, welche unter einer harten, knorpeligen Rinde eine weißliche Mandel enthält.

Oleum Been s. balatinum. (Ful. Gal. Li. *Br. T.*)

℞. Nucum Been excorticatarum quantum vis.

Contunde pistilli lignei ope in mortario marmoreo; pastam in succo e tela confecto inclusam, exprime frigide et oleum cola. (Ful. Gal. *Be.*)

Li, saccum pastam continentem super Aqua bulliente suspendere, ita ut aquoso vapore imbibatur et tuno prelo submittere jubet.

Erweichend, die Haut röthend, krampfstillend, wurmtreibend, aber wenig in Gebrauch.

Morphium.

Morphina, *Morpheum*, *Morphinum*; Morphin, Morphium; Morphine (*Gal.*).

B*. Bor4. Fer. Gal. *Fi. T.*

1) Sertürner's Methode.

℞. Extracti Opii partes quingentas.
Aquae quantitatem sufficientem ut solutio frigida indicet 8° Ar. Infunde ei
Ammoniaci liquidi 22° quantitatem sufficientem vel satis ut parvus ejus sit excessus; praecipitatum quod enascitur gelatinosum, separa, crystallos in fundo ortas filtro recipe et siccatas in Acido sulphurico 66° calido et antea Aquae octo partibus diluto solve, liquori infunde Ammonium, praecipitatum quod enascitur exsumendo et Alcohole 22° ablutum in Alcohole 36° bulliente solvendo; solutionem colatam crystallisationi subjice. (Gal.)

2) Hottot's Methode.

℞. Opii . . . . . quantum vis.
Macerationes plures perfice, liquores commixtos ad 2° Ar. usque inspissa, liquido tepido Ammoniacum (causticum) adde ita ut sit ejus parvus excessus, praecipitatum glutinosum inde formatum filtra, infunde frigidè Ammoniaci liquidi novam quantitatem in excessu et praecipitatum in panno e tela arctioris texturae confecto receptum et Alcohole 20° ablutum sicca, pulvera et Alcohole 36° bulliente, parva Carbonis animalis proportione mixto tracta. (GalH. *T.*)

3) Robiquet's Verfahren.

℞. Opii puri concisi partes trecentas.
Aquae communis . partes mille.
Macera per dies quinque, cola et colaturae adde
Magnesiae calcinatae partes quindecim.
Coque per sexagesimas decem, filtra, sedimentum Aqua frigida ablue, sicca et blandi caloris ope in Alcoholis 22° quantitate sufficiente macera; quod restat, cum Alcohole frigido ejusdem gradus ablue, sedimentum per momenta aliquot in Alcohole 32° bulliente tenens et liquore colato crystallos refrigeratione inde enatas in Alcohole 36° bulliente solve et solutionem crystallisationi subjice. (B*. Fer. Gal. *T.*)

Fi. Opii libram unam, Aquae com-

munis libras tres, Alcoholis dictorum trium graduum quantum sufficit et Magnesiae purae grana decem, caeterum ut antea procedere jubet.

4) Verfahren Winkler's.

℞. Opii . . . . . partes tres.
Aceti . . . . . partem unam.
Aquae destillatae . partes octo.

Post aliquot dies digestionis materiam? separatam pluribus vicibus Aquâ cum Aceto mixta ablue, liquoribus conjunctis Ammonium infunde, praecipitatum filtro receptum per aliquot dies cum Aethere alcoholisato tracta; a liquido supernatante morphinam a materiis simul cum ea praecipitatis separa, dissolve in Alcohole bulliente 36° et liquorem refrigeratione in crystallos abire fac.

5) ℞. Opii pulverati uncias quatuor.
Digere leni calore cum
Aquae destillatae
unciis triginta duabus,
Acidi muriatici . . uncia una
mixtis per horas sex, saepius agitando, et decantha. Residuum ter simili modo digeratur. Liquoribus obtentis adde
Natri muriatici uncias sedecim.

Sale soluto et materiis sepositione perfecte praecipitatis, filtratis admisce
Liquorem Ammonii caustici
quamdiu praecipitatum efficitur et miscellam per biduum sepone. Praecipitatum ope filtri separatum Aqua destillata frigida ablutum et siccatum digere cum
Spiritus Vini alcoholisati
partibus decem
quoties hic ab illo aliquid solvit. Tincturae ferventes filtratae sepositione et destillatione in crystallos redigantur; has Spiritu Vini rectificatissimo frigido ablutas leni calore in
Acidi muriatici Aquae destillatae
partibus quatuor diluti
sufficiente quantitate
solve. Liquor post refrigerationem in massam crystallinam abeat; hanc linteo inclusam exprime ut ab heteroge neis depuretur. Residuum solvatur in
Aquae destillatae fervidae
sufficiente quantitate
et liquorem refrigeratum cum
Liquore Ammonii caustico
ad perfectam morphii praecipitationem usque misce. Praecipitatum in
Spiritus Vini alcoholisati
quantitate sufficiente
solutum lege artis in crystallos redige. (Borá.)

Man wendet das Morphin nicht leicht an, weil es im Waſſer zu ſchwer auflöslich iſt.

Potio narcotica. (*B.*)

℞. Morphini . . . . semigranum.
Aquae destillatae unciam unam.
Syrupi Papaveris albi
drachmam unam.

Abends bei'm Schlafengehen.

Injectio leniens. (*B.*)

℞. Olei Amygdalarum dulcium,
— Liliorum,
singulorum semunciam.
Morphini . . . grana duo.

Gegen Ohrſchmerzen, Schmerzen bei hitziger Blennorrhagie und Tenesmus bei Hämorrhoidalkolik.

℞ Olei Chamomillae,
— Papaveris,
singulorum unciam unam.
Vitelli Ovi . . . . . no. 1.
Morphini . . . . grana duo.

Zur Stillung von Ohrenzwang.

Sulphas Morphini s. Morphinae. (Fer. GalH. *Ma. T.*)

℞. Morphii puri . uncias quatuor.

Dissolve in Alcohole vel in Aqua destillata dilue et caute adde
Acidi sulphurici Aquae pondere
. aequali diluti quantum sufficit ad saturandum alcali. Filtra, lente vapora et crystallisationi subjice. — Gabe, von einem Viertel- bis zu einem ganzen Gran in Potion oder in Pillen.

Syrupus Sulphatis Morphii. (Fer. GalP. *Ma.*)

℞. Morphii sulphurici grana quatuor.

Dissolve in Aqua Acido sulphurico leviter acidulata et commisce cum
Syrupi communis tepidi libra una.

Kaffeelöffelweiſe.

Pilulae deprimentes s. lenientes. (*B.*)

℞. Morphii sulphurici granum unum.
Olei Olivarum quantum sufficit ad solvendum; adde
Ipecacuanhae . . grana tria.
Fabarum Sti. Ignatii grana duo.
Micae Panis,
Mellis,
singulorum quantum sufficit.

Fiant pilulae sex. — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden.

Boli lenientes s deprimentes. (*B.*)

℞. Morphii sulphurici . grana duo.
Olei Amygdalarum dulcium
quantum sufficit
ad solvendum sal; adde
Ferri sulphurici grana quatuor.
Micae Panis,
Mellis,
singulorum quantum sufficit

Fiant boli octo. — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden.

℞. Morphii sulphurici granum unum.
Ipecacuanhae . . . grana tria.
Olei Amygdalarum dulcium guttas duodecim.
Extracti Aconiti . . grana sex.
Pulveris Liquiritiae,
Mellis,
singulorum quantum sufficit.
Fiant boli sex. — Gabe, ein Stück alle drei Stunden.

Acetas Morphii s. Morphei s. Morphinae. (B*.Bor4. Fer. GalH. *Fi. Ma. T.*)

℞. Morphii . . . . quantum vis.
Dilue in Aqua destillata et adde
Acidi acetici 10° quantum sufficit ad neutralisandum alcali. Solutio ad siccum evaporet.

Bor4. Morphii (sec. formulam Bor4.) quantum vis, Aceti concentrati Aquae destillatae quantitate aequali diluti sufficientem quantitatem ut liquor perfecte neuter appareat; qui filtratus leni igne ad siccum evaporet. Residuum in pulverem redactum caute serva; — *Fi.* Morphii partes quatuor, Aquae destillatae partes octo, Acidi acetici quantum sufficit; evaporent primum ad syrupi consistentiam, tunc solis vel lenis evaporatorii caloris ope, donec in massam salinam abierint, quae pulveretur; — *T.* Morphii grammata (danari*) sex Aquae destillatae modicam quantitatem et Aceti radicalis quantum satis ad saturandum, caeterum ut antea.

Gabe, ein Viertel, bis einen ganzen Gran.

Hierher gehören eigentlich die unter Opium (§ Auszug durch Essigsäure) angegebenen Präparate, bei welchen mehr oder weniger unreines Morphin die Basis ausmacht.

Solutio Acetatis Morphii s. Morphii acetici. (*E.*)

℞. Acetatis Morphii grana sedecim.
Aquae . . . drachmas sex.
Acidi acetici . . drachmas duas.
Gabe, sechs bis vier und zwanzig Tropfen.

Guttae lenientes s. deprimentes. (Fer. GalH. *Bo. Ca. E. Ma. Ra.*)

℞. Morphii acetici grana sedecim.
Acidi acetici . . guttas quatuor.
Aquae destillatae unciam unam.
Alcoholis . . drachmam unam.
Gabe, sechs bis zwölf Tropfen, in einem lindernden Trank.

Bolus anticatarrhalis. (*Ca. Pie.*)

℞. Butyri Cacao drachmam unam.
Gummi Tragacanthae,
Croci,
Mellis Narbonnensis,
singulorum semidrachmam.
Extracti Liquiritiae,
Balsami Sulphuris anisati,
singulorum grana octodecim.
Extracti Hyoscyami albi grana sex.
Morphii acetici . . grana duo.
Fiant boli triginta sex. — Gabe, ein Stück alle zwei oder drei Stunden.

Pilulae lenientes. (*B. Ca.*)

℞. Morphii acetici granum unum.
Conservae Florum Aurantiorum grana sedecim.
Fiant pilulae octo. — Gabe, ein oder zwei Stück alle sechs Stunden bei Nervenschmerzen und Krebs. Man kann bis auf drei Gran essigsaures Morphium steigen, muß jedoch sorgfältig den Erfolg beobachten. (*Ca.*)

℞. Morphii acetici granum unum.
Digitalis purpureae grana octo.
Micae Panis,
Mellis,
singulorum quantum sufficit ut fiant pilulae sex. — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden.

℞. Morphii acetici granum unum.
Sulphuris Antimonii aurati grana duo.
Extracti Aconiti grana quatuor.
Pulveris Liquiritiae,
Mellis,
singulorum quantum sufficit ut fiant pilulae octo. — Gabe, ein Stück alle drei Stunden. (*B.*)

Pilulae leviter emmenagogae deprimentes. (*B.*)

℞. Morphii acetici granum unum.
Olei Olivarum . guttas decem.
Solutioni adde
Ipecacuanhae . . . grana duo.
Extracti Hyoscyami grana quatuor.
Micae Panis,
Mellis,
singulorum quantum sufficit ut fiant pilulae sex. — Gabe, ein Stück alle drei Stunden, bei Amenorrhoe von übermäßiger Sensibilität des Uterus.

Boli lenientes. (*h.*)

℞. Morphii acetici granum unum.
Olei Olivarum . guttas decem.
Solutioni adde
Micae Panis,
Mellis,
singulorum quantum sufficit.
Fiant boli sex. — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden.

Haustus sedans narcoticus, Potio leniens. (*B.*)

℞. Infusi Chamomillae uncias quinque.

*) Ein Danaro beträgt 21,57 Gran.

Extracti Lactucae virosae grana decem.
Guttarum lenientium viginti.
Syrupi Althaeae . . semunciam.
Allmälig zu nehmen.

Syrupus Morphii acetici. (Fer. GalF. GalH. *Bo. Ca. Ma.*)

℞. Syrupi Sacchari clarificati libram unam.
Morphii acetici . grana quatuor.
Dissolve sal in Aquae Acidi acetici guttis aliquot acidulatae semidrachma, filtra et cum syrupo tepido commisce.
Kaffeelöffelweise.

Julep lenions s. sedans.

℞. Syrupi Morphii acetici unciam unam.
Infusi Hederae terrestris uncias quatuor.
Misce.

Emulsio sedativa simplex. (*B.*)

℞. Emulsionis Gummi Arabici uncias octo.
Syrupi Morphii acetici unciam unam.
Allmälig zu nehmen.

Citras Morphini, Morphium citricum. (*Ma. Par.*)

℞. Morphii puri . grana sedecim.
Acidi citrici crystallisati grana octo.
Dissolve totum in
Aquae destillatae . . uncia una.
Colora solutionem cum
Tincturae Coccionellae alcoholicae drachmis duabus.
Misce bene. (*Ma.*)

Porter hoc sal parat conterendo Opii crudi uncias quatuor cum Acidi citrici crystallisati duabus, addendo deinde Aquae bullientis uncias sedecim et liquorem post horas viginti quatuor macerationis filtrando. (*Par.*)

Nutzen, der des essigsauren Morphins.

Morrhua.

Gadus Morrhua, L.; Stockfisch, Kabeljau; Morhue (*Gal.*).

Bor4. HassP.

Ein in den Nordmeeren sehr häufiger Fisch. (*Bloch* Pisc. t. 64. *Bert.* Bild I. 36. fig. 1)

Man gebraucht den Thran, welchen man von der Leber dieses Fisches (Oleum Jecoris s. Jecoris Aselli) erhält, und welcher entweder von freien Stücken ausfließt und dann eine helle goldgelbe Farbe, eine etwas dickliche Consistenz, einen schwachen Fischgeruch und einen ähnlichen Geschmack besitzt, oder aus der gebrühten Leber gewonnen wird und dann dunkel, undurchsichtig, ersterem an Consistenz zwar ähnlich, aber durch den etwas brenzlichen Geruch und Geschmack verschieden ist. Letzterer wird vorzüglich angewendet. Man empfiehlt ihn besonders bei hartnäckiger Gicht, gichtischen Contracturen ꝛc. — Gabe, löffelweise.

Morus.

Morus nigra, L.; Maulbeerbaum; Mûrier noir (*Gal.*); Mulberry tree (*Ang.*); Marusse (*B.*); Morbaertrae (*D.*); Moras (*His.*); Moerbezieboom (*Bel.*); Gelso (*I.*); Amoreira (*Lus.*); Mulbaetstraed (*Suec.*).

A. Ams. An. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Fer. Gal. Han. HassP. His. Li Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. *Be. Br. C. G. M. Sp.* Z.

Ein Baum (Monoecia Tetrandria, L.; Urticeae, *J.*), welcher ursprünglich in Persien einheimisch seyn soll und in Europa cultivirt wird. (*Blackw.* t. 126. *Plenck* t. 663. *Schk.* t. 290. *Nouv. Duh.* IV. t. 22.)

Man wendet die Früchte, Maulbeeren (baccae Mori), mûres (*Gal.*), an. Es sind Beeren, aus vielen von dem fleischig und saftig gewordenen Kelche umgebenen und mit einander verwachsenen kleinen Achenien gebildet, wovon jedes einen Saamen enthält; sie sind eirund, länglich, ziemlich groß, schwärzlichpurpurroth und haben einen süßen Geschmack.

Succus Mororum. (Br. Gal. His. Pal. Sax. Suec. Wir.)

℞. Fructuum Mori maturorum quantum vis.
Contritis inter manus, massam ad locum frigidum sepone, donec liquor clarus supernatet et cola exprimendo. Succum depuratum in lagenis longicollibus, strato olei obtectum serva.

Roob Mororum s. Succus Mororum inspissatus (A. B*. Br. D. GalF. Li. Lus. Pal Sar. Sax. Wir. *Sw.* T.)

℞. Fructuum Mori maturorum quantum vis.
Tritis in mortario lapideo, massam per dies duos in cavam sepone in vase fictili tecto, exprime deinde fortiter, ad locum frigidum sepone ut succus subsideat, qui per pannum colatus, sub continua agitatione ad mellis consistentiam usque evaporet. (B*. Lus.)

T. Succi baccarum ad syrupi consistentiam evaporati libram unam et Saccharo albi uncias tres.

℞. Succi Mororum depurati partes quatuor

Sacchari albi , . partem unam.
Coque ad mellis consistentiam. (Br. D. Li. Wir. *Sw.*)

Sar. Succi libras quinque et unam Mellis despumati, vel duas Succi et unam Sacchari; — Pal. Sacchari unam et quinque Succi; — A. Sacchari unam et novem Succi; — Sax. Sacchari unam et sedecim Succi; — GalF. Succi unam et Sacchari duas.

Besonders äußerlich, als austrocknendes Mittel, bei Schwämmchen.

Mel Fructuum Mororum. (His.)

℞. Succi Mororum nigrorum libram unam.
Mellis . . . . . libras duas.
Aquae . . . quantum sufficit
Coque ad syrupi spissi consistentiam et cola.

Gabe, eine bis zwei Unzen.

Syrupus Mororum s. de Moris s. Mori nigrae. (Ams. An. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Gal. Gen. Han. HassP. Lon. LonN. O. Pal. Pol. Wir. Wür. *C. Sw. Vm.*)

℞. Mororum nigrorum non penitus maturorum,
Sacchari albi,
singulorum partes aequales.
Misce leviter agitando et supra ignem lenem colloca, coque parumper et per cribrum sericeum trajice. (Gal.)

Vm. Calefacere simul jubet absque ebullitione Mororum rubrorum et Sacchari, singulorum partes aequales, massam calidam supra cribrum effundere, leviter exprimere, colare per linteum et colaturae addere Sacchari quantum satis ut syrupi consistentiam adipscatur.

℞. Succi Mororum expressi, colati et sepositione depurati uncias sedecim.
Sacchari albi libras duas cum dimidia.
Fiat blando calore syrupus. (Ams. Bel.)

Br. D. Pal. Wir. et Wür. Succi uncias decem, Sacchari sedecim; — An. Succi libras quatuor et sex Sacchari; — Bor. Bor4. Han. HassP. O. et ol. Succi uncias viginti et Sacchari libras tres; — *Sw.* Succi uncias sedecim et Sacchari libras tres; — Lon. LonN. et *C.* Succi octarium unum et libras duas Sacchari; — Gen. Succi sesquilibram et Sacchari libras duas cum dimidia.

Magnes sequentem agendi modum proposuit:

℞. Fructuum Mori nondum maturorum,
Baccarum Rubi paene maturorum,
singulorum partes aequales.
Contunde leviter pistilli lignei ope in mortario marmoreo, immitte vasi apto argenteo cum Aquae destillatae parte quinquagesima; coque per aliquot momenta, per crinium trajice absque expressione et per duos ad tres dies sepone ut subsideant; decantha, in lagenas Succi partem circiter decimam ponderis Mororum nigrorum integrorum et bene maturorum continentes, quas obturatas et Aquae immersas per horae quadrantem calefac et remotas serva. Tunc

℞. Succi hujus depurati ac filtrati libram unam.
Sacchari in massis libram unam et uncias decem.
Fiat leni calore solutio extemporanea.

Vm. proposuit solvere balnei aquae ope Sacchari partes tredecim in Succi saliti octo. — Gabe, eine bis vier Unzen.

Moschus.

Bisam, Moschus; Musc (*Gal.*); Musk (*Ang.*), Mischk (*Ar. Duk. Pe.*); Rutta wucla (*Cy.*); Desmer (*D.*); Almizele (*His.*); Kustowrie (*Hin.*); Muscus (*Bel.*); Moschio (*I.*); Dedes (*Ja.*); Jebat (*Mal.*); Pizmo (*Pol.*); Misca (*Lus.*); Casturi (*Sa. Tam. Tel.*); Desman, Mysk (*Sa.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor C. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *A. Br. C. Fi. G. Par. Pid. Sa. Sp.*

Ein ziemlich derber und körniger bräunlichschwarzer Stoff von bitterem gewürzhaften Geschmack und von sehr starkem Geruch, welcher von den Wänden einer vor der Vorhaut des Moschus moschiferus, L., eines wiederkäuenden Säugethieres Asien's (*Schreber* Säugth. CCXLII. A. B.) liegenden Tasche abgesondert wird.

Der Moschus enthält, nach Blondeau und Guibourt, Ammoniak, Elain, Stearin, Cholesterin, ein flüchtiges Oel, Gallerte, Eiweiß, eine unbestimmte Säure ꝛc. Er zersetzt salpetersaures Silber, schwefelsaures Eisen, Aetzsublimat, den Aufguß der gelben China.

Reizend, flüchtig, krampfstillend, besonders bei Hysterie, Epilepsie, Keuchhusten, Wasserscheu, Starrkrampf empfohlen. — Gabe, zwanzig bis dreißig Tropfen.

Pulvis Moschi opiatus. (*Au.*)

℞. Moschi . . grana triginta duo.
Opii . . . . . grana quatuor.

Sacchari . . drachmam unam.
Divide in partes duodecim. — Gabe, ſtündlich oder öfter ein Stück.

Pulvis aphrodisiacus. (*Pie.*)
℞. Cinnamomi . . . semunciam.
Zingiberis,
Nucis moschatae,
Piperis longi,
singulorum drachmam unam.
Moschi . . . scrupulum unum.
Sacchari albi . uncias quatuor.

Boli antispasmodici. (*Bo. Ca. E. Sa. Sm. Sw.*)
℞. Moschi grana decem ad quindecim.
Conservae Corticis Aurantii semidrachmam.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.
Addere potes si necesse, Camphorae grana octo. (*Sw.*)
Sa. Moschi semiscrupulum, Conservae dictae semidrachmam et Syrupum Sacchari.
℞. Moschi . . . . grana decem.
Cinnabaris . . grana quinque.
Conservae Florum Aurantiorum quantum sufficit.
Fiant unus vel duo boli. (*Ca. Sm.*)
℞. Moschi,
Nitri, singulorum . . grana sex.
Camphorae . . grana quatuor.
Conservae Valerianae quantum sufficit.
Fiant boli quatuor. (*Bo.*)

Pulvis Moschi. (Sar.)
℞. Moschi . . . . grana quatuor.
Sacchari Lactis . . grana octo.
Misce. — Auf eine Gabe.

Pulvis Moschi compositus s. alexipharmacus sinicus s. antilyssicus Tunchinensis s. Tunquinensis. (B*. GalH. Hass. R. Wir. Wür. *Au. Ca. Pid. Sp. Vm.*)
℞. Moschi . . . . grana sedecim.
Cinnabaris . . grana duodecim.
Misce. (B*. Wir.) — Die Chineſen nehmen dieſe Gabe in einem Löffel Branntwein als Mittel gegen die Wuth.
Sp. Moschi partem unam et duas Cinnabaris; — Piderit hat dieſe Formel auf folgende Weiſe verändert:
℞. Moschi . . . . grana sedecim.
Radicis Valerianae scrupulum unum.
Camphorae . . . . grana sex.
Fiat pulvis. (B*. GalH. Hass. R. Wir. *Au. Ca. Pid.*)
Vm. Moschi partes octo, Valerianae decem et Camphorae tres.
℞. Moschi . . . drachmam unam.
Florum Zinci grana viginti quatuor.
Sacchari . . . drachmas duas.
Misce triturando. (Wür.)
℞. Moschi . . . grana quindecim.
Camphorae . . grana quinque.
Syrupi Sacchari quantum sufficit ut fiat bolus unus. (*E.*)
℞. Moschi,
Ammonii subcarbonici,
singulorum semiscrupulum,
Conservae Rosarum quantum sufficit.
Fiat bolus unus. (*E.*)

Emplastrum moschatum. (*Au.*)
℞. Cerae albae,
Cetacei, singulorum semunciam.
Camphorae . . semidrachmam.
Castorei,
Moschi,
singulorum scrupulum unum.
Olei Cajeput . . guttas decem.
Liquefiant. — Gegen Zahnſchmerzen.

Pilulae Moschi s. antispasmodicae s. antihystericae s. emmenagogae s. ad putredinem nosocomialem. (B*. *Au. B. Ra. Sm.*)
℞. Moschi . . . drachmas duas.
Florum Zinci drachmam unam.
Fiant pilulae triginta. (*Ra.*) — Bei allen ſogenannten nervöſen Krankheiten anwendbar
℞. Moschi . . . . . semigranum.
Asae foetidae . . . grana duo.
Fiat pilula una. (*Ra.*)
Au. Moschi drachmas duas et sex Asae ut fiant pilulae granorum duorum, — Gabe, vierzig bis ſechzig Stück täglich zwei Mal.
℞. Moschi . . . granum unum.
Asae foetidae,
Gummi Ammoniaci,
singulorum grana duo.
Pulveris Valerianae grana octo.
Syrupi Sacchari quantum sufficit ut fiant pilulae duae. (*Ra.*)
℞. Moschi . . . grana quindecim.
Nitri,
Asae foetidae,
singulorum scrupulos duos.
Extracti Chinae,
— Catechu,
singulorum drachmas duas.
Fiant pilulae granorum sex. (*Ra.*)
℞. Moschi . . . . . grana octo.
Ammonii subcarbonici oleosi grana quinque.
Mucilaginis Gummi Arabici quantum sufficit.
Fiat massa pilularis. (B*.) — Nach White's Beiſpiel hat Lentin dieſe Pillen mit Erfolg gegen Sphacelus gebraucht. Dupuytren wendet die folgenden gegen Hoſpitalfäulniß an.

℞. Camphorae grana viginti quatuor.
Moschi .. . . . . grana octo.
Extracti Opii . . . grana duo.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.
Fiat massa pilularis. (*Ra.*)
℞. Moschi,
Ambrae griseae,
singulorum scrupulum unum.
Opii purificati . . . grana tria.
Balsami Peruviani quantum sufficit.
Fiant pilulae viginti quatuor. (*Sm.*)— Gabe, sechs Stück täglich auf drei Mal.
℞. Moschi . . . semiscrupulum.
Camphorae . scrupulum unum.
Gummi Ammoniaci
scrupulos duos.
Opii purificati . grana quatuor.
Fiant pilulae granorum quatuor. (*Sm.*) — Gabe, drei oder vier Stück täglich, bei Hysterie und Hypochondrie.
℞. Moschi . grana viginti quatuor.
Extracti Opii . grana duodecim.
— Valerianae
grana viginti quatuor.
Fiant pilulae sedecim. (*Ra.*)
℞. Moschi . . . grana duodecim.
Roob Juniperi quantum sufficit.
Fiant pilulae novem. — Gabe, stündlich ein Stück. (*B.*)
℞. Moschi . . . . grana octo.
Salis volatilis Cornu Cervi
grana quinque.
Mucilaginis Gummi Arabici
quantum sufficit.
Fiat pilula una. (*Au.*)
℞. Extracti Myrrhae aquosi
drachmam unam.
— Aloës aquosi semidrachmam.
Camphorae . . . grana decem.
Moschi . . . . grana viginti.
Balsami Peruviani quantum sufficit.
Fiant pilulae. (*Pie.*) — Barthez verordnete sie als emmenagogisch, zu vier und zwanzig Gran täglich, auf drei Mal, mit Rautenabkochung.
℞. Radicis Colombo semidrachmam.
Kali subcarbonici
scrupulum unum.
Extracti Opii gummosi grana duo.
— Hyoscyami albi,
Ambrae griseae,
singulorum grana sex.
Moschi . . . . grana quatuor.
Olei essentialis Menthae
scrupulum unum.
Syrupi Florum Aurantii
quantum sufficit.
Fiant pilulae viginti quinque. (*Bo.*) — Gabe, drei Stück alle zwei Stunden.

Tabellae aphrodisiacae s. vitae. (*Bo. Pie Sm.*)

℞. Confectionis Alchermes
drachmas duas.
Ambrae griseae,
Moschi,
singulorum drachmam unam.
Sacchari . . . . libram unam.
Fiant tabellae ponderis scrupuli unius. — Gabe, drei Stück täglich auf drei Mal. Diese Täfelchen können Gefahr bringen, besonders wenn sie außerdem Cantharidenpulver enthalten.

Globuli moschati. (Br. Ful. Li. Pal. Wir. *Sp.*)

℞. Sacchari albi . . . uncias sex.
Amyli . . . . drachmas duas.
Iridis Florentinae drachmam unam.
Moschi . . . . . grana duo.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae
quantum sufficit.
Fiant globuli diversae magnitudinis ab illa seminis pisi ad illam globuli sclopetae usque. — Si massae Laccae pictoriae unciam dimidiam addas, habes *Globulos moschatos rubros.* (Wir.) Man gebrauchte sie ehedem als Stuhlzäpfchen.

Trochisci Galliae moschatae s. aliptae moschatae s. moschati. (Wir.)

℞. Ambrae griseae . drachmas tres.
Ligni Aloës, drachmas quinque.
Moschi . . . drachmam unam.
Sacchari albi . . unciam unam.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae
quantum sufficit
ut fiant trochisci. — Man setzt sie Pulvern und andern Präparaten als Aroma hinzu.
℞. Storacis Calamita uncias quatuor.
Ladani,
Benzoës, singulorum unciam unam.
Ligni Aloës . . drachmas sex.
Sacchari albi . . sesquiunciam.
Moschi . . scrupulum unum.
Ambrae griseae drachmam unam.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae
cum Aqua Rosarum paratae
quantum sat's.
Fiant trochisci. — Man wendet sie nur zu Räucherungen an; ehedem gab man sie auch gegen Asthma, bei Kindern zu einem, zwei oder drei Gran.

Trochisci Mogolici. (*Ca.*)

℞. Sacchari uncias tres cum dimidia.
Gummi Arabici . unciam unam.
Extracti Opii sicci
drachmas septem.
Caryophyllorum,
Macidis,
Nucis moschatae, singulorum drachmas duas cum dimidia.
Moschi . . . grana quinque.
Aquae Rosarum quantum sufficit.
Fiant trochisci granorum sex. — Reizend, magenstärkend. — Gabe, zwei Stück Abends beim Schlafengehen.

Lapis de Goa. (Wir.)

℞. Corallii albi,
— rubri,
Bezoar orientalis,
singulorum unciam unam.
Margaritarum orientalium,
Hyacinthi praeparati,
Topazii,
Sapphiri,
Rubini, singulorum semunciam.
Smaragdi,
Moschi,
Ambrae griseae,
singulorum drachmas duas.
Poliorum Auri . . . . no. 40.
Gelatinae Cornu Cervi
quantum sufficit

ut fiat pasta, in globulos ovales formanda, qui siccati polliendo nitentes reddantur.

Dieſes lächerliche Präparat kam aus Indien und wurde von den Jeſuiten einige Zeit lang geheim gehalten; es ſollte gegen Krämpfe und Epilepſie wirkſam ſeyn. — Gabe, von einem halben bis zu einem ganzen Scrupel und bis zur halben Drachme.

Mixtura moschata s. Moschi, Julapium Moschi s. moschatum s. antihystericum, Potio antispasmodica. (Am. B°. Han. His. Lon. LonN. Lus. *Au. B. Br. C. Ca. E. Pie. Ra. Sa. Sw.*)

℞. Moschi . . . grana duodecim.
Sacchari . . . drachmas duas.
Aquae . . . . . uncias duas.
Misce. (*Ra.*)

Han. Moschi grana duodecim, Sacchari drachmam unam et Aquae Rosarum uncias sex.

℞. Moschi . . . scrupulos duos.
Aquae Rosarum . . uncias sex.
Gummi Arabici,
Sacchari albi,
singulorum drachmam unam.

Tritura moschum cum saccharo, deinde cum gummi et aquam sensim adde. (Am. B°. Lus. *Br. C. E.*)

Lon. LonN. Moschi drachmam unam, Sacchari, Gummi Arabici, singulorum tantidem et Aquae Rosarum uncias sex.

℞. Moschi . . . . scrupulos duos.
Gummi Arabici in Aqua dissoluti
drachmam unam.
Spiritus Juniperi compositi
unciam unam.
Syrupi Sacchari . drachmas tres.
Aquae Menthae viridis
uncias quinque.
Misce. (*Sw.*)

Sa. Moschi scrupulos duos, Mucilaginis drachmam unam, Spiritus Juniperi compositi semunciam, Syrupi drachmas tres et Aquae Pulegii uncias quinque.

℞. Camphorae . . semidrachmam.
Moschi . grana viginti quinque.
Sacchari albi,
Mucilaginis Gummi Tragacanthae,
singulorum drachmam unam.
Aceti . . . . . semunciam.
Aquae Lactucae . . uncias sex.
Syrupi Limonum unciam unam.
Misce. (*Pie.*)

℞. Moschi . . . . . grana sex.
Sacchari . . drachmam unam.
Contere et adde
Aquae Rosarum,
— Melissae,
singularum uncias duas.
Syrupi Aetheris . unciam unam.
Misce bene. (*Pie.*)

℞. Aquae Rosarum . . uncias sex.
— Cinnamomi hordeatae,
— Paeoniae compositae,
Syrupi Dianthi,
singulorum uncias duas.
Aquae Florum Aurantiorum
unciam unam.
Confectionis Alchermes
drachmam unam.
Croci . . . scrupulum unum.
Moschi,
Ambrae griseae,
Ammonii subcarbonici,
singulorum grana duo.
Essentiae Caryophyllorum
guttam unam.
Misce. (*Ca. Pie.*)

℞. Florum Aurantii,
Caryophyllorum,
Croci,
singulorum scrupulum unum.
Aquae . . . . libram unam.

Infunde per horam unam et colaturae adde
Moschi,
Ambrae griseae,
singulorum grana duo.
Ammonii subcarbonici
granum unum.
Confectionis Alchermes
drachmas duas.
Syrupi Sacchari . sesquiunciam.
Misce bene. (His.)

℞. Camphorae . . drachmas duas.
Moschi . . scrupulum unum.
Salis volatilis Cornu Cervi
grana sedecim.
Syrupi Corticum Aurantiorum
unciam unam.
Aquae Citri . . . uncias tres.

Stündlich löffelweiſe zu nehmen. (*B.*)

℞. Aquae Menthae piperitae,
— Citri,
singularum uncias duas.

Moschi . . . . . grana octo.
Liquoris Hoffmanni,
Spiritus Cornu Cervi succinati,
singulorum semidrachmam.
Laudani Sydenhami guttas viginti.
Allmälig zu nehmen. (*B.*)

℞. Moschi . . . grana duodecim.
Aquae Menthae piperitae
uncias tres.
Syrupi Corticum Aurantiorum
unciam unam.
Gabe, stündlich ein Kaffeelöffel. (*B.*)

℞. Aquae Melissae,
— Cinnamomi,
singularum uncias duas.
Camphorae . scrupulum unum.
Moschi,
Salis volatilis Cornu Cervi,
singulorum grana quindecim.
Syrupi Narcotini . unciam unam.
Allmälig zu nehmen. (*B.*)

℞. Moschi . . . scrupulum unum.
Sacchari albi . drachmas duas.
Mucilaginis Gummi Arabici
semunciam.
Aquae Cinnamomi,
— Menthae piperitae,
singularum uncias duas.
— aromaticae drachmas duas.
Löffelweise zu nehmen (*Au.*)

℞. Moschi . . scrupulum unum.
Sacchari . . drachmam unam.
Aquae Rosarum . . uncias octo.
Aetheris sulphurici drachmas duas.
Olei Cajeput . . guttas viginti.
Löffelweise zu nehmen. (*Au.*)

℞. Moschi . . . . . grana sex.
Sacchari . . drachmam unam.
Liquoris Ammonii succinici
guttas sexaginta.
Laudani Sydenhami guttas viginti.
Aquae Florum Sambuci
uncias quinque.
Syrupi Amygdalarum unciam unam.
Stündlich löffelweise zu nehmen. (*Au.*)

Clyster s. Enema antispasmodicum. (*E. Pie. Sw.*)

℞. Moschi . . . grana duodecim.
Sacchari . . . scrupulos duos.
Gummi Arabici sesquiscrupulum.
Ammoniaci liquidi guttas triginta.
Aquae Seminis Lini uncias quatuor.
Misce. (*E.*)

℞. Infusi Valerianae uncias quatuor
Moschi . . . drachmam unam.
Misce et adde, si necesse est, Tincturae sedativae guttas quadraginta ad sexaginta. (*Pie. Sw.*)

Oleum Moschi. (*T.*)

℞. Moschi . . . . uncias duas.
Olei Olivarum . libram unam.
Macera calore 25—30° Cent. in lagena vitrea, filtra leviter exprimendo, et sepositione in vase clauso clarificatum post dies aliquot decantha.

Tinctura Moschi vinosa. (B*.)

℞. Moschi pulverati unciam unam.
Vini Hispanici . . uncias sex.
Tritura moschum cum una uncia vini ad dissolutionem usque, adde deinde liquoris quod restat et post macerationem per horas viginti quatuor in lagena bene obturata filtra.
Krampfstillend.

Tinctura s. Essentia Moschi s. moschata. (Am. B* Bor4. DD. Du. Gal. Han. HassP. RC. *C. T.*)

℞. Moschi . . . . partem unam.
Alcoholis (22°) partes quatuor.
Post sex dies digestionis filtra. (DD. Gal.)

Am. B*. Du. et *C.* Moschi drachmas duas, Alcoholis (0,930) octarium unum et octo dies digestionis; — Han. Moschi drachmas duas et Spiritus rectificati uncias octo; — Bor4. Moschi drachmam unam, Spiritus Vini alcoholisati uncias sex et digestionem per octiduum; — HassP. Moschi drachmam unam, Spiritus Vini rectificati unciam unam, macera per septimanam; pondus tincturae filtratae unciam unam aequet; — *T.* Moschi scrupulos quatuor, Alcoholis 30° B. uncias duas; — RC. Moschi drachmas duas, Alcoholis libram unam.
Gabe, dreißig bis sechszig Tropfen täglich mehrmals.

Tinctura Moschi aetherea. (Gal.)

℞. Moschi . . . . drachmas duas.
Aetheris sulphurici (46°)
unciam unam.
Macera per duos dies et liquorem alio vasi infunde.

Balsamum Lectorense s. de Leictour s. de Vinceguère s. de Condom. (*Sp.*)

℞. Camphorae,
Croci, singulorum drachmam unam.
Moschi,
Ambrae,
singulorum semidrachmam.
Petrolei albi,
Olei essentialis Lavandulae,
— — Terebinthinae,
— — baccarum Juniperi,
— — Caryophyllorum,
singulorum unciam unam.
— — Macidis,
— — Nucis moschatae,
singulorum drachmas duas.

Olei essentialis Benzoës semunciam.
Infunde et oleum si requiritur, decantha.
Schmerzstillend, nervenstärkend, balsamisch.

Pulvis sternutatorius albus, Oleosaccharum cephalicum. (Wir.)

℞. Sacchari albi . uncias duodecim.
Ambrae griseae,
Moschi, singulorum semiscrupulum.
Olei essentialis Cinnamomi,
— — Caryophyllorum, singulorum guttas quindecim
— — Anisi,
— — Rorismarini,
— — Lavandulae,
— — Majoranae, singulorum semidrachmam.
— — Ligni Rhodii,
— — Succini,
singulorum scrupulum unum.
Dissolve ambram in oleis et moschum in Olei Rosarum parva quantitate, tunc omnia cum saccharo commisce.

℞. Olei essentialis Majoranae,
— — Caryophyllorum,
— — Ligni Rhodii, singulorum guttas tres.
— — Cinnamomi,
— — Citri,
— — Foeniculi,
— — Lavandulae,
singulorum guttas duas.
Moschi . . . . . grana tria.
Sacchari albi
uncias tres cum dimidia.
Misce exacte. —

Als Niesemittel, so wie bei krampfhaften Affectionen und Lähmungen der Zunge angewendet. — Gabe, von einem Scrupel bis zur halben Drachme.

Mungos.

Ophiorrhiza Mungos, L.; Indische Schlangenwurz; Mungos (*Gal.*); Indian snake root (*Ang.*); Mendi, Wal ekaweriya (*Cy.*); Slangerod (*D.*); Raiz de serpiente (*His.*); Ostindische Schlangenwortel (*Bel.*); Radice di serpe (*I.*); Kajo ular (*Jav.*); Colubrina (*Lus.*); Ormrot (*Suec.*).

Br. His. Wir. *A. M. Sp.*

♃ (Pentandria Monogynia, L.; Gentianeae, *J.*) Eine Indische Pflanze. (*Plenck.* Pl. med. t. 90.)

Man wendet die Wurzel (radix Mungos s. serpentum) an; sie ist einfach, gewunden, geringelt, hat eine runzlige, poröse Rinde und keinen Geruch, aber einen sehr bittern Geschmack.

Ehemals betrachtete man sie als specificum gegen den Biß giftiger Thiere und demnach als ein Gegengift.

Muscari.

Muscari ambrosiacum; Muskatenhyacinth; Muscari odorant, Jacinthe musquée (*Gal.*); Muskeerende hyacinth (*Bel.*).

A. Fer.

♃ (Hexandria Monogynia, L.; Asphodeleae, *J.*) Eine in der Levante einheimische Pflanze. (*Kniph.* Bot. orig. cent. 10. t. 52.)

Die Wurzel, welche man anwendet, ist dick und bitter. Sie gilt für ein Brechmittel.

Myristica.

Myristica aromatica, Mur.; Muskatbaum; Muscadier (*Gal.*).

Ein Baum (Dioecia Monadelphia, L.; Myristiceae; *Cand.*), welcher auf den Molucken wächst. (*Blackw.* t. 353. *Plenck.* t. 425. *Lam.* Ill. t. 832. 833. *Hayne* IX. 12. Fl. méd. VI. 242.)

Man wendet den Saamen und dessen Umschlag (arillus) an.

Der Saame führt den Namen Nux moschata s. Myristica; Muskatnuß; Noix muscade (*Gal.*); Nutmeg (*Ang.*); Jowzalteib (*Ar.*); Musskatowa kulku (*B.*); Bu-wah-pa (*Ba.*); Jayaphala (*Ne.*); Jatipullum, Sadikka (*Cy.*); Muskad (*D.*); Japhul (*Duk.*); Nuez de especia (*His.*); Jaiphul (*Hin.*); Nooten moskaat (*Hol.*); Noce moscada (*I.*); Wohpala (*Jav.*); Japhul (*Mah.*); Buahpala (*Mal.*); Noz moscada (*Lus.*); Jatiphala (*Sa.*); Muskot (*Suec.*); Jadikai (*Tam.*); Jajikaia (*Tel.*); Gasori (*Tern.*)

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bord. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pal. R. Sax. Suec. Wir. Wür. *A. Be. Br. C. Fi. G. M. Par. Pid. Sa. Sp. Z.*

Ein eirundlänglicher, etwas abgerundeter, mit einem röthlichen Fellchen bedeckter, weißlicher, an der Spitze mit braunen Puncten besprengter Kern, welcher ein weißes, öliges Fleisch besitzt. Er steckt in einer harten, dünnen, braunen oder schwärzlichen, zerbrechlichen, überall unregelmäßig gefurchten Schaale. Der Geruch ist sehr angenehm, der Geschmack brennend, gewürzhaft und etwas fettig.

Der Umschlag oder die zwischen der Nuß und der Schaale liegende Hülle

Macis s. Floris Macidis; Muskatenblüthen; Macis, Fleurs de muscade (*Gal.*); Mace (*Ang.*); Talzuffur (*Ar.*); Bunga

pala (*Ba.*); Wassawasie (*Cy.*); Jawatrie (*Duk. Hin.*); Macias (*His.*); Kambang pala (*Ja.*); Bunga hua pala (*Mal.*); Bezhaz (*Pe.*); Flor de noamoscida (*Lus.*); Jadiputrie (*Tam.*); Japatri (*Tel.*).

Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. Hs. Li. Lus. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. *A. Be. Br. Fi. G. M. Pid. Sa. Sp.*

ist eine lappige, gleichsam netzartige, dünne, knorplige, halbdurchsichtige, safrangelbe Haut von muskatnußähnlichem Geruch und Geschmack

Ein kräftiges Reizmittel, welches aber mehr in der Küche als in der Medicin angewendet wird. — Gabe des Pulvers, zehen Gran bis ein Scrupel. Die Muskatblüthen sind weit weniger wirksam als die Nuß.

Pulvis antihectico-scrophulosus s. ex baccis Lauri compositus s. Nucum moschatarum compositus. (B*.)

℞. Pulveris Nucis moschatae,
— Baccarum Lauri tostarum,
— Cornu Cervi calcinati,
singulorum unciam unam.
— Radicis Liquiritiae
uncias tres.

Gabe, ein halber Kaffeelöffel, zweimal täglich, für Kinder von einem Jahre, zwei- und vierjährigen einen ganzen Löffel.

Bolus aromaticus. (*Sa.*)

℞. Nucis moschatae scrupulum unum.
Diascordii . . . scrupulos duos.
Syrupi Papaveris quantum sufficit.
Misce bene.

Spiritus Nucis moschatae s. Myristicae aromaticae. (Ed. Du. Li. Lon. LonN. *C*)

℞. Nucis moschatae . uncias duas.
Aquae Vitae
libras novem (congium).

Post duos dies (unum Lon.) macerationis adde

Aquae . . . . quantum sufficit ad prohibendum empyreuma; destillent librae novem (congius). (Du. Ed. Lon. *C.*)

Li. Nucis uucias duas, Alcoholis libras quatuor, Aquae tantidem et horas viginti quatuor macerationis; destillent librae quatuor.

Spiritus Nucis moschatae compositus. (*Vm.*)

℞. Nucis moschatae . partes duas.
Corticis Citri,
— Aurantii,
Melissae,
Menthae crispae,
singulorum partem unam.
Aquae Vitae
partes sexaginta quatuor.
— purae partes centum nonaginta duas.

Destillent partes octoginta.

Aqua aromatica spirituosa. (Ful.)

℞. Nucis moschatae,
Cardamomi minoris,
Corticis Aurantii,
Zingiberis,
Kali subcarbonici,
singulorum unciam unam.
Aquae Vitae . . . . libras sex.
— purae . . . libras duas.

Post horas viginti quatuor digestionis destillent in balneo aquae libras quatuor.

Reizend, krampfstillend, blähungtreibend, magenstärkend. — Gabe, vierzig bis sechszig Tropfen.

Syrupus Nucistae. (Wir.)

℞. Nucis moschatae pulveratae
uncias duas.
Vini Burgundici . libram unam.

Digere in vase tecto per dies tres, cola exprimendo et in colatura solve

Sacchari albi . uncias sedecim.

Blähungtreibend, magenstärkend.

Syrupus Macidis. (*T.*)

Ut syrupus Cinnamomi paratur.

Tinctura s. Essentia Macidis s. Macis. (Br. Han. HassP. Pal. Sax. *T.*)

℞. Macidis . . . . partem unam.
Spiritus Vini rectificati
partes decem.

Digere blando calore per dies octo, cola exprimendo et filtra. (Sax.)

Br. Macidis partes tres et Spiritus sedecim; — Han. Macidis uncias quinque et Spiritus libras duas; — HassP. *T.* Macidis uncias quatuor, Spiritus libras duas.

℞. Macidis . . . uncias quatuor.
Liquoris Kali subcarbonici
uncias duas.

Digere ad completam desiccationem usque, residuo infunde

Spiritus Vini rectificati libras duas.

Post sufficientem digestionem destillent in balneo arenae, pluribus vicibus cohobentur nec unquam ad siccum destillata; productum infunde supra

Macidis quantitatem arbitrariam.

Post aliquot tempus filtra. (Pal.)

Reizend, magenstärkend, auf den Uterus und gegen Kolik wirkend. — Gabe, dreißig Tropfen und mehr.

Oleum Nucistae s. Nucis moschatae, Oleum aethereo-pingue nucleorum My-

ristícae moschatae, Oleum s. Balsamum Nucistae expressum.

1) Wie man es im Handel findet: (Bor4. D. Du. HassP. Lon. LonN. O. Wir.)

2) Eigens bereitet. (A. Ba. Bor. Br. D. Fer. Ful. Gal. Hass. His. O. Pal. Sax. Wir. *Br. Pid. Sw. T. Vm.*)

℞. Nucis moschatae raspatae quantum vis.

Tritura in mortario marmoreo calefacto ut fiat pasta mollis, quam sacco e crinibus confecto inter duas laminas stanneas calidas comprime; oleum defunde et per linteum trajice. (Fer. His. *T. Vm.*)

℞. Nucis moschatae . quantum vis.

Contunde in mortario marmoreo leviter calefacto, tum sacco e crine confecto inclusam, vapori aquae bullientis expone, prelo submitte inter laminas stanneas calefactas et oleum super igne liqua. (Ba. Bor. Br. D. Ful. Hass. O. Pal. Wir. *Br. Pid. Sw.*)

℞. Nucis Moschatae quantum vis.

Contunde lente in mortario, tere deinde supra lapidem calefactum, coque in Aqua, donec oleum supernatet, quod, refrigeratione concretum collige. (Gal.)

Reizend, magenstärkend, schmerzstillend, krampfwidrig, blähungtreibend. — Gabe, ein oder zwei Gran für Kinder, anderthalb Scrupel für Erwachsene.

Oleum Nucistae aethereum, Aethereoleum Nucistae. (An. Br. Hass. His. Pal. R. Sax. Wür. *Br. Pid. T. Vm.*)

℞. Nucis moschatae . quantum vis.
Aquae . . . quantum sufficit.

Post tres dies infusionis destillent et oleum separetur. (R. (*Br.*)

Wür. Nucis partem unam, et quatuor Aquae; — *Vm.* Nucis unam et octo Aquae; — An. Nucis tres et decem Aquae; — His. Nucis unam et quadraginta Aquae; — Sar. Nucis libram unam, Aquae octo et Salis uncias tres; — Br. Hass. Pal. et *Pid.* Nucis libram unam, Aquae octo et uncias duas Salis; — *T.* ut oleum Coriandri.

Gabe, vier bis zwölf Tropfen.

Oleum Macidis aethereum, Aethereoleum Macidis. (Ba. Bor. Bor4. Br. D. Ful. Han. HassP. Pal. Pol. R. Sax. Wir. Wür. *T. Vm.*)

℞. Macidis . . . . quantum vis.
Aquae purae . quantum sufficit.

Post sufficientem infusionem destillent. (R.)

Sax. et Wür. Macidis partem unam et quatuor Aquae; — D. et Ful. Macidis unam et Aquae sex; — Bor. Han. et Pal. Macidis unam et octo Aquae; — Ba. Macidis unam et Aquae novem; — *Vm.* Macidis unam et decem Aquae; — Pal. et Wir. Macidis libras duas, Aquae sedecim et Salis uncias quatuor; — Bor4. oleum venale; — HassP. Macidis, Salis, singulorum libras duas, Aquae sedecim; post macerationem per horas duodecim destillentur; — *T.* ut oleum Cinnamomi l. 385

Gabe, vier bis zwölf Tropfen.

Elaeosaccharum s. Oleosaccharum Macidis. (Br. HassP. Pal. Wir.)

℞. Olei essentialis Macidis guttas sedecim.
Sacchari albi . unciam unam.

Tritura exacte.

HassP. Sacchari drachmas duas, Olei Macidis guttas quatuor.

Balsamum Nucistae. (Br. Sax. Wir.)

℞. Olei Nucis moschatae expressi drachmas duas.
— essentialis Nucis moschatae scrupulos duos.

Commisce triturando.

Magenstärkend, kopf- und nervenstärkend.

Mixtura contra diarrhoeam s. antidiarrhoeica. (*Pie.*)

℞. Balsami Nucistae drachmam unam.
Theriacae . . drachmas duas.
Olei essentialis Cumini guttas sex.

Auf die Nabelgegend, dem Magenpflaster ähnlich, aufzulegen.

Linimentum excitans. (B*.)

℞. Olei essentialis nucis moschatae,
— . — . Caryophyllorum,
singulorum semidrachmam.
Spiritus Juniperi . unciás duas.

Sparadrap ad corpus conditum involvendum. (*Sp.*)

℞. Cerae albae uncias centum viginti octo.

Liquatae et semirefrigeratae adde

Olei Nucis moschatae expressi uncias octo.
— essentialis Citri,
— — Neroli,
— — Lavandulae,
— — Thymi,
singulorum uncias quatuor.
Ambrae griseae grana quindecim.
Moschi . . . . . grana octo.
Zibethi . . . . grana quatuor.

Mixturam supra linteum extende.

Myrobalanus.

Myrobalani; Myrobalanen; Myrobalan (*Gal.*).

Br. Gal. His. Wir. *Br. G. M. Sp.*

Man nennt so vier verschiedene Arten von Früchten:

1) *Myrobalani belliricae*; Bellirische Myrobalanen; Myrobolans bellirics (*Gal.*); Beleyluj (*Ar.*); Bullu (*Cy.*); Bulla (*Duk*); Mirobolanos belliricos (*His.*); Beheyra (*Hin.*); Beleyleh (*Pe.*); Bahira (*Sa.*); Tanikai (*Tam.*).

Es sind eirunde, fast kugelige, olivengroße, dunkelgraulichgelbe Steinfrüchte mit fünf undeutlichen Rippen, welche einen knochigen, dicken, fünfseitigen, unregelmäßigen, am Grunde breiten und stumpfen, oben spitzigen Kern enthalten.

Sie kommen von Myrobalanus bellirica, *Gärtn.* (Decandria Monogynia, L.; Myrobalaneae, *J.*), einem Ostindischen Baume, (*Roxb.* Corom. t. 198)

2) *Myrobalani chebulae*; große schwarzbraune Myrobalanen; Myrobolans chebules (*Gal.*); Helelije kabuli (*Ar.*); Aralu (*Cy*); Huldah (*Duk.*); Mirobolanos quebulos (*His.*); Har, Hara (*Hin.*); Hetileh kelan (*Pe*); Haritaka (*Sa.*); Kadukai (*Tam.*); Carakaia (*Tel.*).

Es sind eirundlängliche, an beiden Enden dünnere, schwärzlichbraune, mit fünf Furchen, welche mit eben so viel Rippen abwechseln, versehene Steinfrüchte, welche unter einem harten, brüchigen, harzglänzenden Fleische einen knochigen, fünfseitigen Kern und in demselben einen eirunden länglichen, spitzigen Saamen enthält.

Myrobalani indicae s. nigrae; Indische Myrobalanen; Myrobolans indiques ou noirs (*Gal.*); Myrobolanos indicos (*His.*);

werden diese Früchte genannt, wenn sie weniger vorgerückt, schon vor der vollkommenen Reife eintrocknen, und wahrscheinlich von irgend einem Insect gestochen sind. Sie sind nußgroß, dunkelschwarz, hart, derb und zeigen kaum eine Spur von Kern, an dessen Stelle man eine kleine Höhle bemerkt. Ihr Geschmack ist bitter und adstringirend.

Diese Früchte kommen von Myrobalanus Chebula, *Gärtn.*, einem Ostindischen Baume. (*Gärtn.* de fruct. et sem. t. t. 97. *Lamk.* Enc. méth. t. 849. f. 4.)

3) *Myrobalani citrinae s. flavae*; gelbe Myrobalanen; Myroboians citrins (*Gal.*); Mirobolanos citrinos (*His*)

Es sind längliche, eiförmige, etwas birnförmige, blaßgelbe, sehr verschiedeneckige und zwischen den Ecken runzlige Steinfrüchte, gleichen inwendig den vorigen sehr, sind aber nur eine Spielart davon.

Sie kommen von Myrobalanus citrina, *Gärtn.*, einem Baume Ostindien's. (*Lamk.* Enc. méth. t. 849.)

4) *Myrobalani emblicae*; aschfarbene Myrobalanen; Myrobolans emblics (*Gal.*); Hac min-san, Cay-boung-ngot (*Co.*); Awusadanelli (*Cy.*); Aunla (*Cy.*); Mirobalonos emblicos (*His.*); Anola, Amlej, Aunwerd, Aongra (*Hin.*); Amleh (*Pe.*); Amalaka (*Sa.*); Nelli kai (*Tam.*); Wusoherikaia (*Tel.*).

Es sind beerenförmige dreiknöpfige, rundliche Kapseln von der Größe eines großen Gallapfels, schwärzlichgrau, mit sechs außen in Rippen erhobenen Klappen und welche inwendig ein dreiiges Fleisch mit weißlichen, eckigen Saamen enthalten. Sie besitzen einen sauern und adstringirenden Geschmack.

Sie kommen von Phyllanthus emblica (Monoecia Triandria, L.; Euphorbiaceae, *J.*), einem Baume Malabar's. (*Rheede* Mal. I. 31. *Blackw.* t. 400. 401. *Plenck* t. 659.)

Alle diese Früchte sind heutzutage nicht mehr in Gebrauch; ehedem wurden sie den Purgirmitteln beigezählt. — Gabe des Pulvers, von einer halben Drachme bis zu einer halben Unze.

Myrrha.

Gummi Myrrhae, *Myrrha rubra*; *Σμύρνα*; Myrrhe, Myrrhengummi, Myrrhenschleimharz; Myrrhe (*Gal*); Myrrh (*Ang.*); Murr (*Ar.*); Madu (*Ba.*); Myrrcha (*B.*); Myrrho (*D.*); Hira bol (*Duk.*); Mirra (*His. I.*); Bol (*Hin.*); Madu (*Jav.*); Manisan lebah (*Mal.*); Mirra (*Pol.*); Myrrha (*Lus.*); Vola (*Sa.*); Myrra (*Suec.*); Valatipolum, Palendra bolum, Villey bolum (*Tam*); Balintra bolum (*Tel.*).

A. Am. Ams An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *A. Be. Br. C. Fi. G. M. Par. Pid. Pa. Sp. T. Z.*

In Körnern, deren Farbe vom Braungelben zum Rothen abwechselt, halbdurchsichtig, leicht brechend, mit harzigem Bruche, von angenehmem Geruch und bitterm, etwas gewürzhaftem Geschmack.

Es ist der verdickte Saft, welcher auf Einschnitte aus einer auf der Ostküste Africa's wachsenden Pflanze, welche nach Forskal eine Art Amyris (Amyris Kataf, *Forsk.*), nach Bruce eine Art Mimosa ist, ausfließt.

Tonisch, aufregend. — Gabe des Pulvers, von zehen Gran bis zu einer Drachme.

Extractum Myrrhae gummosum s. aquosum. (A. Ams. An. Ba Bel. Bor. Bor4. Br. Fer. Ful. Gal. Han. Hass. HassP. Li. O. Pal. Pol. Sar. Sax. Wir. Wür. *Fi. Pid. T. Vm.*)

℞. Myrrhae electae . partem unam,

Aquae purae . . partes quatuor.
Digere in loco calido et vase tecto, tunc sepone ad locum frigidum per horas viginti quatuor; decantha, cola et leni igne ad aptam consistentiam consume. (A. Ams. An. Ba. Bel. Bor. Bor4. Han. O. Pol. Sax.)

Br. et *Vm.* Myrrhae partem unam et octo Aquae; — Fer. Ful. Hass. Li. Wür. et *Pid.* Myrrhae unam et Aquae sex; — Gal. Singulorum amborum quantum sufficit; — *Fi. T.* Myrrhae uncias sex, Aquae bullientis libras tres, digestionem leni balnei vaporis calore, duorum dierum sepultionem, decanthationem et evaporationem ad extracti consistentiam; — Hass P. Myrrhae partem unam, Aquae duodecim.

℞. Myrrhae,
Limaturae Ligni,
singularum partem unam.

Mixtas coque cum Aquae pondere earum aequali; submitte deinde prelo d. Real et quod profluit, ad extracti consistentiam usque inspissa. (*Vm.*)

℞. Myrrhae electae . quantum vis.
Pulveratam bis, cum Aquae partibus quatuor quaque vice, contere; emulsiones commisce et lente, agitando continuè, vaporando ad extracti consistentiam consume. (*Vm.*)

℞. Myrrhae electae . semilibram.
Liquoris Kali subcarbonici
unciam unam.

Misce bene cum spathula lignea et sepone in cavam, per dies quatuordecim; tunc massae infunde Aquam calidam et agitatam sepone; liquorem decantha; residuo novam Aquam calidam infunde, donec non amplius coloretur; colaturae commixtae lente ad extracti consistentiam evaporent. (O. Pal. Sar. Wir.)

Gabe, vier bis zehen Gran täglich mehrmals.

Extractum Myrrhae resinosum. (Sar.)

℞. Myrrhae electae . quantum vis.
Tracta cum Alcohole rectificato, tinoturam cola, destilla alcoholem in aquae balneo et residuum ad extracti consistentiam consume.

Extractum Myrrhae graminatum s. compositum. (*Sw**.)

℞. Myrrhae electae . uncias duas.
Gummi Arabici . drachmas duas.
Pulverata cum Aquae sufficiente quantitate in emulsionem redige et in hoc liquore solve
Extracti Graminis uncias quatuor.

Bei Lungenschwindsucht und Gebärmuttergeschwüren empfohlen. — Gabe, eine bis zwei Drachmen in Wasser, zwei oder drei Mal täglich.

Saccharum Myrrhae s. myrrhatum, Elaeosaccharum s. Oleosaccharum Myrrhae. (B*. Ful Li. Wür. *Au. Pid. Sp.*)

℞. Extracti Myrrhae gummosi
partem unam.
Sacchari albi . partes quatuor.
Misce exacte. (Ful, Wür. *Pid.*)

B*. et *Sp.* Extracti partem unam et Sacchari albi octo; — Li. Extracti unam et Sacchari Lactis quatuor; — *Au.* Extracti unam et tres Sacchari Lactis.

Magenstärkend. — Gabe, von einem Scrupel bis zur halben Drachme.

Pulvis Myrrhae compositus, Pulvis ad ulcera tendinum s. emmenagogus s. balsamicus. (Ams. B. Lus. *Au. Bo. Sw.*)

℞. Myrrhae,
Mastichis,
singulorum partes aequales.
Misce ut fiat pulvis. (*Sw.*) — Bei Knochenfraß und Entblößung der Sehnen. Eine gesunde chirurgische Praxis verwirft es.

℞. Myrrhae . . . . semunciam.
Opopanacis,
Sagapeni,
Castorei,
singulorum drachmas duas.
Olei Menthae,
— Rutae,
singulorum guttas quatuor.
Fiat pulvis. (Ams. B.) — Diese Formel hat viel Aehnlichkeit mit der zu den Trochisci Myrrhae.

℞. Myrrhae,
Sabinae,
Rutae,
Castorei, singulorum unciam unam.
Pulverata misce. (Lus.)

℞. Myrrhae . . . semidrachmam.
Olibani,
Mastichis,
singulorum drachmam unam.
Sarcocollae . drachmas duas.
Colophonii . . . semunciam.
Fiat pulvis. (*Bo.*)

℞. Myrrhae . . grana duodecim.
Croci . . . . . grana tria.
Olei Caryophyllorum
guttam unam.
Fiat pulvis. (*Au.*)

℞. Boracis . . . grana quindecim.
Myrrhae,
Sabinae, singularum grana quinque.
Croci . . . . . grana tria.
Castorei . . . . . grana duo.
Olei Succini . . guttam unam.
Fiat pulvis. (*Au.*)

℞. Myrrhae . . . . . grana duo.

Florum Sulphuris grana quinque.
Sacchari albi . . grana decem.
Alle zwei Stunden zu nehmen. (*Au.*)

℞. Extracti Myrrhae aquosi
sesquigranum
— Opii . . semigranum
Sacchari albi . . grana decem.
Alle zwei Stunden zu nehmen. (*Au.*)

℞. Extracti Myrrhae aquosi
grana duo ad quatuor.
— Digitalis purpureae,
— Hyoscyami,
singulorum semigranum
Sacchari Lactis . grana decem.
Alle drei Stunden zu nehmen. (*An.*)

Diese Pulver werden äußerlich zur Stillung von Blutflüssen angewendet, innerlich als emmenagoga oder gegen chronische Brustleiden, besonders Schleimschwindsucht.

Sperniola Crolbii. (Pal. Wir.)

℞. Myrrhae electae,
Olibani, singulorum drachmas duas.
Croci . . . . sem drachmam
Fiat pulvis subtilissimus, cui bis terve Aqua destillata seminis ranae adsperso et tunc siccato in fine adde
Camphorae . . drachmas tres.
Misce. (Wir.)

Pal. vicies vel tricies Aquâ Ranorum imbibere jubet.

Adstringirend, gegen Blutflüsse zu gebrauchen.

Boli Myrrhae. (*Sa.*)

℞. Pulveris Myrrhae,
Conservae Aurantiorum,
singulorum scrupulum unum.
Salis Absinthii drachmas quinque.
Syrupi simplicis quantum sufficit.
Fiat massa.

℞. Cetacei . . . scrupulos duos.
Myrrhae . . . scrupulum unum,
Syrupi Sacchari quantum sufficit.
Misce sedulo.

Pilulae balsamicae. (Pul. Ham. Li.)

℞. Extracti Rhei compositi
scrupulos quatuor.
— Myrrhae scrupulos duos
Fiant pilulae granorum duorum. (Ham.)

℞. Extracti aquosi Myrrhae,
— — Pini,
— — Saponariae,
Gummi Hederae pulverati,
singulorum drachmas sex.
Misce. (Li.)

℞. Saponis Alicantini,
Extracti aquosi Myrrhae,
— — Pini,
singulorum semunciam.
Balsami Copaivae quantum sufficit.
Fiat massa pilularis. (Sul.)

Gabe, zehen bis zwanzig Gran.

Pilulae gummi resinosae. (RC.)

℞. Asae foetidae,
Myrrhae, singulorum partes octo.
Olei Succini . . partem unam.
Fiat cum syrupo simplici massa. — Gabe, zehen Gran bis zwei Scrupel bei Schlafengehen oder öfter. — Krampfstillend, emmenagogisch.

Pilulae balsamicae martiales. (Ham.)

℞. Massae Pilularum balsamicarum (formula Ham.) drachmas tres.
Limaturae Ferri porphyrisatae
drachmam unam.
Fiant pilulae granorum duorum.

Pilulae stomachicae. (*Sm.*)

℞. Myrrhae . . drachmas quatuor.
Extracti Centaurii minoris
drachmas duas.
Balsami Peruviani scrupulos duos.
Fiant pilulae ponderis trium granorum — Gabe, zwölf Stück täglich, auf drei Mal.

Pilulae Myrrhae amarae cum Ammoniaco. (*Au.*)

℞. Myrrhae,
Gummi Ammoniaci,
Extracti Cardui benedicti,
— Absinthii,
singulorum drachmas duas.
Acidi succinici drachmam unam.
Terebinthinae Venetae
drachmas tres.
Pulveris Rhei . quantum sufficit.
Fiant pilulae granorum duorum. — Gabe, sechs bis zwölf Stück alle drei Stunden oder zweimal täglich, bei Verstopfung und Hypochondrie.

Pilulae Myrrhae cum Arnica s. adstringentes. (*Au.*)

℞. Extracti Myrrhae drachmas duas.
— Florum Arnicae
drachmam unam.
Acidi benzoici . scrupulos duos.
Balsami Copaivae scrupulum unum.
Succi Liquiritiae quantum sufficit.
Fiant pilulae granorum duorum. — Gabe, sechs Stück alle zwei oder drei Stunden, bei chronischer Cohorthöe.

Pilulae roborantes. (*Pie.*)

℞. Myrrhae . . drachmas quatuor.
Galbani,
Extracti Trifolii,
Catechu,
singulorum drachmas duas.
Syrupi Corticis Aurantiorum (bigarades) . . quantum sufficit.
Fiant pilulae granorum trium. —

Tissot verordnete sie gegen beginnende Rückenmarksschwindsucht; er gab täglich ein und zwanzig Stück auf drei Mal und ließ dann drei Unzen einer Abkochung von zwei Unzen China, einer Unze Kaperwurzelrinde, zwei Drachmen Zimmt und einer halben Unze Eisenfeile in zwei und einem halben Pfund Wasser geben.

Electuarium s. Opiatum detergens. (*Bo. Sp.*)

℞. Myrrhae,
Olibani,
singulorum drachmam unam.
Mellis . . . . . uncias duas.
Misce. (*Bo.*)

℞. Myrrhae,
Olibani, singulorum semunciam.
Cetacei . . . . drachmas duas.
Tere cum Vitello Ovi et adde
Pulveris Radicis Liquiritiae
quantum sufficit.
Misce. (*Sp.*)

Am Ende von Peripneumonie zur Erleichterung des Auswurfs empfohlen. — Gabe, eine Drachme in einem Glase warmer Brusttisane.

Theriaca officinalis s. pauperum, Electuarium pro pecoribus, Theriaca diatessaron, Species diapentes. (Ams. Ful. Sar. *Fi. Sp. T. Vm.*)

℞. Radicis Gentianae,
— Aristolochiae rotundae,
Baccarum Lauri,
Myrrhae, singulorum uncias duas.
Mellis despumati
uncias viginti quatuor.
Misce sedulo. (Ams. Sar. *Sp Vm.*)

Fi. Quatuor priorum substantiarum et Summitatum Centaurii minoris, singulorum partes aequales absque melle.

℞. Roob Juniperi . uncias quatuor.
Myrrhae in Vino Hispanico dissolutae,
Pulveris Radicis Angelicae,
— — Aristolochiae longae,
— — Inulae,
singulorum uncias duas.
Syrupi Corticum Aurantiorum,
— Papaveris alb.,
singulorum uncias octo.
Misce bene (Ful.)

Magenstärkend, schweißtreibend, blähungtreibend, die Menstruation befördernd, giftwidrig. — Gabe, von einer Drachme bis zur halben Unze.

Linimentum gingivale mundificans. (Ful.)

℞. Extracti Myrrhae aquosi,
Spiritus Salis dulcificati,
singulorum drachmas duas.
Mellis rosati . . . uncias duas.
Misce.

Electuarium ad gingivas s. gingivale. (*Sp.*)

℞. Radicis Tormentillae
sesquidrachmam.
— Caryophyllatae
drachmam unam.
— Iridis Florentinae
semidrachmam.
Herbae Salviae,
— Abrotani,
— Rutae,
Florum Aquilegiae,
Rosarum rubrarum,
— Balaustiorum,
singulorum drachmam unam.
Seminum Cochleariae,
— Aquilegiae,
singulorum sesquidrachmam.
Mumiae Aegyptiacae,
Myrrhae,
singulorum drachmam unam.
Mastichis,
Laccae, singulorum drachmas duas.
Sanguinis Draconis
sesquidrachmam.
Alumin. calcinati semidrachmam.
Mellis rosati . quantum sufficit.
Misce sedulò.

Potassidum Myrrhae, Balsamum Myrrhae. (*Sw*. Vm.*)

℞. Myrrhae pulveratae partes octo.
Potassae causticae fusae
partem unam.

Contere, adde sensim Aquae tantum ut totum possit colari, subsidere fac, decantha et lente ad consistentiam balsami consume. (*Vm.*)

*Sw**. Lixivii Saponariorum uncias duas et Myrrhae unciam unam.

Aeußerlich, bei Scropheln und Drüsenanschwellungen.

Unguentum Myrrhae. (*Au. Vm.*)

℞. Balsami Myrrhae partem unam.
Cerati prope ignem mollefacti
partes octo.
Triturando commisce. (*Vm.*)

℞. Vitellorum Ovorum . . no. 2.
Butyri recentis . . uncias tres.
Myrrhae,
Cetacei, singulorum drachmas duas.
Liquatis et colatis adde
Balsami Peruviani semidrachmam.
Misce. (*Au.*)

Man hat diese Salbe empfohlen, um den Blatternarben die Empfindlichkeit zu benehmen.

Emplastrum sulphuratum s. diasulphuris Rulandi. (*B*. Bz.* Ful. Pal. Wir. *Pid. Sp.*)

℞. Florum Sulphuris . unciam unam.

Olei Olivarum . uncias quatuor.
Cerae flavae . uncias quinque.
Liquatis lente adde
Pulveris Myrrhae uncias decem.
Misce bene. (Gal.)

℞. Balsami Sulphuris terebinthinati,
Cerae flavae,
Colophonii, singulorum uncias sex.
Pulveris Myrrhae uncias octodecim.
Liqua et commisce. (B*. Pal. Wir.)

Sp. Balsami, Colophonii, singulorum uncias sex, Cerae uncias duas et novem Myrrhae; — *Pid.* Balsami uncias tres, Colophonii drachmas tres, Cerae semunciam et Myrrhae uncias quatuor.

Reizend, auflösend, schmelzend.

Liquor s. Liquamen Myrrhae, Oleum Myrrhae s. Myrrhae per deliquium, Myrrha liquida, Tinctura Myrrhae aquosa, Solutio Myrrhae. (Bor. Bor4. Br. D. Fer. Ful. Hass. HassP. His. Li. Lus. Pal. Wir. Würr. *Li. Pid. Sp. Sw.*)

℞. Ovum . . . . . no. 1.

In Aqua bulliente induratum transverse concide, et vitello exempto Myrrham pulveratam immitte, utrasque partes dimidias filo consue, in sacco e tela confecto inclusas in cavam sepone et in vase supposito liquidum defluentem excipe. (Br. His. Pal. Wir. Würr. *Sp.*)

℞. Myrrhae pulveratae quantum vis.
Albuminis Ovi cocti
pondus duplum.

Fiat terendo cum aquae calidae pauxillo pasta, quae in sacco e tela confecto ad locum humidum ponatur etc. (*Fi.*) cuique unciae liquoris spiritus vini uncia una addatur, ne putrefiat.

℞. Myrrhae . . . partem unam.
Aquae destillatae partes quatuor.

Digere in balneo aquae et per linteum trajice. (Bor. Ham. O. Pol. Sax. *Vm.*)

Han. Myrrhae partem unam et Aquae duas; — Bor4. Extracti Myrrhae unciam unam, Aquae destillatae uncias quinque; solve et liquorem post decanthationem cola; — HassP. Extracti partes tres, Aquae destillatae fervidae octo.

℞. Extracti Myrrhae aquosi
drachmas duas.
Olei Cerae . . . . semunciam.

Terendo solve. (*Pid.*)

℞. Myrrhae . . . drachmas tres.
Hydromellis . . . semunciam.

Dissolve. (Lus.)

D. Myrrhae quantum fieri potest in Hydromelle solvere jubet; — Ful. Myrrhae drachmas duas et Hydromellis semunciam.

℞. Extracti Myrrhae aquosi
drachmas duas.
Mellis . . . drachmam unam.
Aquae . . . . drachmas tres.

Tritura ad perfectam solutionem usque. (Fer. Hass. Li.)

Fi. Aquae unciam unam.

Balsamisch, fäulnißwidrig, zum Verbinden mancher Geschwüre.

Solutio s. Essentia Myrrhae alcalisata; Liquor Myrrhae alcalisatus. (*Sw.*)

℞. Myrrhae . . . . uncias duas.
Aquae bullientis . uncias octo.
Natri subcarbonici
drachmam unam.

Digere in balneo aquae per duos dies, saepius agitando et cola. — Gabe, eine Unze, täglich mehrmals.

Liquor stimulans et vulnerarius. (*Sm.*)

℞. Calcis vivae . . . uncias duas.
Myrrhae . . unciam unam.

Tere in mortario marmoreo, sensim addendo
Aquae . . . . . libras duas.

Digere per dies aliquot et decantha. Zum Einspritzen bei fistulösen Geschwüren.

Tinctura s. Essentia s. Solutio alcoholica Myrrhae. (A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Ful. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pal. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Würr. *Br. C. Fi. Pid. Sw. T. Vm.*)

℞. Myrrhae electae partem unam.
Alcoholis 22° . partes quatuor.

Digere per tres dies (aliquot) et cola. (Gal.)

Ams. Myrrhae partem unam et Alcoholis (0,884) octo; — *Br.* Myrrhae unam et Alcoholis (0,935) octo; — *Sw.* Myrrhae unam et Alcoholis (0,935) sex; — Ba. Myrrhae partem unam et Alcoholis (0,900) sex; — An. B. et Bel. Myrrhae partem unam et Alcoholis (20°) octo; — A. Myrrhae unam et Alcoholis (0,850) octo; — *Fi.* Myrrhae uncias duas et Alcoholis (30°) libram unam; — *T.* Myrrhae uncias quatuor, Alcoholis 25° B. libras duas; — Ful. HassP. et Lus. Myrrhae partem unam et octo Alcoholis; — Bor. Bor4. D. DD. Fenn. Han. O. Pal. R. Suec. Wir. et *Vm.* Myrrhae partem unam et Alcoholis sex; — Hass. Sax. et *Pid.* Myrrhae partem unam et Alcoholis quinque; — LonN. Myrrhae uncias quatuor, Spiritus rectificati octarios tres; macera per dies quatuordecim.

℞. Myrrhae . . . . uncias tres.
Alcoholis (0,835) uncias viginti.

Aquae . . . . uncias decem.
Post octo dies digestionis filtra. (Am. Ed. His. RC.)

Du. Myrrhae uncias tres, Alcoholis (0,930) se quioctarium et Spiritus rectificati (0,840) semioctarium; — Lon. Myrrhae uncias quatuor, Spiritus rectificati octarios duos, Aquae octarium unum, macera per dies quatuordecim.

℞. Myrrhae . . . . uncias tres.
Camphorae . . drachmas duas.
Aquae destillatae . uncias tres.
Contere, sicca, pulvera et digere cum
Alcoholis . . . libris duabus.
Post sex dies filtra. (Li.)

Reizend, emmenagogisch, wurmtreibend. — Gabe, dreißig bis funfzig Tropfen. — Man bedient sich dieser Tinctur auch bisweilen, um die Oberfläche atonischer Geschwüre zu reizen, sie war in dieser Hinsicht jedoch mehr bei den Alten in Gebrauch *Linctus ad gingivas, Liquor ad ulcera faucium, Collutorium detergens.* (DD. *Au. Sy.*)

℞. Essentiae Myrrhae partem unam.
Mellis crudi . . partes quatuor.
Misce. (DD.)

Sy. Tincturae Myrrhae unciam unam et Mellis cuprati semunciam.

℞. Herbae Salviae . . semunciam.
Aquae bullientis quantum sufficit ut decocti unciae sex obtineantur. Colaturae adde
Tincturae Myrrhae drachmas duas.
Mellis rosati . . . uncias duas.
Misce. (*Au.*)

℞. Aquae Salviae,
— Cochleariae,
Tincturae Myrrhae,
— Aurantii fructuum viridium, singularum drachmas duas.
Aquae Rabelii sesquidrachmam.
Mellis rosati . . unciam unam.
Misce (*Au.*)

Gargarisma detergens. (Fer. *Fi.*)

℞. Extracti Myrrhae . semunciam.
Decocti Chinae . . uncias octo.
Misce.

Lotio phagedaenica. (*E.*)

℞. Tincturae Myrrhae,
Aquae Calcis,
singularum unciam unam.

Von Kirkland gegen luxurirendes Fleisch empfohlen.

Injectio detergens. (*Au. B.*)

℞. Decocti Hordei . . . libras duas.
Tincturae Myrrhae drachmam unam.

Bei chronischem Schnupfen mit Ausfluß aus den Stirnhöhlen. (*B.*)

℞. Aquae . . . . uncias sex.
Colae Piscium quantum sufficit ut fiat mucilago spissa. Adde.
Liquoris Myrrhae drachmam unam.

Bei Blasengeschwüren empfohlen. (*Au.*)

℞. Plumbi acetici drachmam unam.
Aquae . . . . . uncias sex.
Solutioni adde
Liquoris Myrrhae . uncias duas.
Tincturae Opii . unciam unam.

Bei chronischen Gonorrhöen gebräuchlich. (*Au.*)

Tinctura s. Essentia s. Solutio s. Mixtura Myrrhae alcalisata. (Br. Hass. Sar. Wir. *Pid.*)

℞. Myrrhae electae . . semidrachmam.
Kali subcarbonici . uncias octo.
Aquae fontanae . . sesquidrachmam.

Post sex vel octo dies digestionis evaporent in balneo aquae ad mellis consistentiam; residuo infunde
Alcoholis . . . uncias viginti.
Digere et filtra. (Br. Wir. *Pid.*)

Sa. Myrrhae uncias duas, Subcarbonatis liquidi semunciam et Alcoholis quantum satis ut mixtura exsiccata trium vel quatuor digitorum crassitiem tegatur; — Hass. Myrrhae semidrachmam, Potassae liquidae quantum satis et Alcoholis uncias viginti.

Reizend, kräftiger als die einfache Tinctur. — Man wandte sie ehedem, aber wegen der durch das Alcali verursachten Schmerzen, selten an.

Tinctura Myrrhae cum Aqua Rabelii. (*T.*)

℞. Myrrhae electae pulv.
unciam unam.
Aquae Rabelii . uncias quatuor.
Digere agitando per dies quatuor et filtra. Zu Einspritzungen, Waschungen ꝛc. bei Fistelgeschwüren.

Elixir Myrrhae. (Wir.)

℞. Essentiae Myrrhae . uncias octo.
— Castorei . uncias sedecim.
Extracti Sabinae unciam unam.
Post sufficientem digestionem filtra.

Reizend, besonders bei Unregelmäßigkeiten in der Menstruation und Gebärmutterkrankheiten empfohlen. — Gabe, vierzig bis funfzig Tropfen.

Acetum Myrrhae. (Wür.)

℞. Myrrhae pulveratae unciam unam.
Aceti boni . . . . semilibram.
Digere per aliquot dies in loco blanda temperatura gaudente, tunc per horam in balneo aquae et cola.

Oleum Myrrhae. (Bor4. Wir.)

℞. Myrrhae electae . partem unam.
Arenae lotae
partem unam cum dimidia.
Destillent in cucurbita vitrea ex arena; oleum a liquore simul prodeunte separa et rectifica.

Bor4. Myrrhae libras duas, Aquae fontanae octuplum; fiat destillatio e vesica destillatoria, quamdiu oleum ab

empyreumate liberum prodit; oleum limpidum collige.

Aqua Myrrhae (Wir. *Sp.*)

℞. Myrrhae pulveratae uncias octo.
Aquae fontanae . . libras sex.

Digere in loco calido per tres dies et lenta destillatione libras quatuor abstrahe.

Bei Brust- und Magenbeschwerden, so wie bei solchen von unregelmäßiger Menstruation empfohlen. — Gabe, eine Unze.

Myrtus.

Myrtus communis, L.; Myrthe, Myrte; Myrte commun (*Gal.*); Myrtle (*Ang.*); Arajan (*His.*); Myrtus (*Bel.*); Myrto, Mirto (*I.*); Marta (*Lus*)

Br. Fer. Gal. Hs. Lus. Wir. *Be. Br. M. Sp.*

Ein Strauch (Icosandria Monogynia, L.; Myrteae, *J.*) des südlichen Europa's. (*Blackw.* t. 114. *Plenck.* t. 374. *Zorn* Ic. pl. t. 169.)

Man wendet die Blätter und die Früchte an.

Die Blätter (folia Myrti s. Baeticae sylvestris) sind eirund oder lanzettförmig, glatt, schön grün und überall mit halbdurchsichtigen Drüsenpuncten bestreut. Sie haben, besonders gerieben, einen angenehmen Geruch und einen bittern gewürzhaften, etwas styptischen Geschmack.

Die Früchte sind kugelige, dunkelblaue, fast schwärzliche Beeren von sehr starkem gewürzhaften Geruch und adstringirendem bittern Geschmack.

Adstringirend, aber wenig gebraucht

Oleum myrtinum. (His. Sar.)

℞. Baccarum Myrti contusarum libras duas.
Foliorum Myrti concisorum manipulos duos.
Olei Olivarum . libras quatuor.
Aceti . . . . . libram unam.

Coque ad humidi consumptionem et cola. (Sar.)

℞. Foliorum et Florum Myrti partem unam.
Olei Olivarum . . partes tres.

Post tres vel quatuor dies digestionis coque ad humidi consumptionem et cola exprimendo.

Syrupus de Myrto. (Gal. Sar.)

℞. Florum Myrti . unciam unam.
Aquae destillatae Myrti libras duas.

Digere in balneo aquae per horas duas, vase clauso; cola, filtra et colaturae adde

Sacchari albi . . . . duplum.

Solve in aquae balneo. (Gal.)

Sar. miscere jubet succi depurati et Syrupi communis, ad globum cocti, singulorum partes aequales et blande igne, spatula lignea continue agitando, syrupum parare.

Myxa.

Cordia Myxa, L.; schwarze Brustbeere, Sebestenbaum; Sebestier (*Gal.*); Lebuck (*Ar.*); Buhuarie (*Bel.*); Lolu (*Cy.*); Mochayet (*Eg.*); Lesura (*Hin.*); Kendal (*Jav.*); Bukam padaruka (*Sa.*); Vidi marum (*Tam.*); Nekra (*Tel.*).

Br. Gal Pal. Wir. *A. Bc. G. M. Sp.*

Ein Baum (Pentandria Monogynia, L.; Borragineae, *J.*) Aegyptens. (*Rheede* Hort. Mal. 4. t. 37. *Lam.* Ill. t. 96. f. 3. *Blackw.* t. 398. *Plenck* t. 116. Fl. méd. VI. 322.)

Man wendet die Früchte, Sebesten, schwarze Brustbeeren (fructus Myxae s. Sebestenae) an; es sind glatte, eirunde, gespitzte, schwarze Steinfrüchte von der Gestalt und Größe einer kleinen Pflaume, welche ein röthliches, geruchloses, saftiges Fleisch von süßem und schleimigem Geschmack enthalten, welches einen tief gefurchten Kern umgiebt.

N.

Naphtha.

Naphtha; Naphthe (*Gal.*).

Br. D. Fer. Gal. Sax. Wir. *Fl. G.*

Ein flüssiges, durchsichtiges, weißes, schwach gelbliches, etwas fettig anzufühlendes Erdharz, welches viel leichter als Wasser, außerordentlich brennbar ist, einen starken, aber nicht unangenehmen Geruch verbreitet und, unter Ausstoßen eines sehr dicken Rauchs, mit bläulicher Flamme brennt.

Reizend.

Narcissus.

Narcissus Pseudo-Narcissus, L.; gemeine Narcisse; Narcisse sauvage ou des prés, Faux Narcisse (*Gal.*); Common affodil narcissus (*Ang.*); Gaal narcisse (*D.*); Narcisso silvestre (*His.*); Geele narcis (*Bel.*); Narcisso giallo (*I.*); Paesklilja (*Suec.*).

Fer. Gal.

♃ (Hexandria Monogynia, L.; Nar-

cisseae, J.) Eine in Europa gemeine Pflanze. (*Orfila* méd. lég. t. 2. *Bull.* t. 389. *Red.* Lil. vol. III. 158.)

Man wendet die Zwiebel und die Blüthen an.

Die Wurzel oder Zwiebel ist klebrig und von etwas scharfem Geschmack.

Die Blüthen sind gelb.

Die Wurzel bewirkt Purgiren und Erbrechen — Gabe, zwei Drachmen. — Die Blüthen sind krampfstillend; Gabe, vier und zwanzig Gran.

Extractum Narcissi pratensis. (Gal. *Sw*. Vm.*)

℞. Florum recentium Narcissi pratensis libram unam.
Aquae . . . . . libras duas.

Infunde frigide per horas duodecim et cola absque expressione; residuo eandem Aquae fervidae quantitatem infunde et itidem cola; liquoribus commixtis et albumine clarificatis, colatura ad extracti consistentiam evaporet. (*Vm.*)

Sw.* digerere jubet Florum siccatorum partem unam in Aquae tepidae octo et colaturam clarificatam vaporando consumere; — Gal. Macerare Florum libram unam in Aquae quatuor per horas viginti quatuor, operationem cum residuo et nova Aqua repetere et liquores commixtos in balneo Aquae consumere.

Reizend, Ekel erregend, Auswurf befördernd und krampfstillend; bei Keuchhusten, convulsivem Asthma und Convulsionen empfohlen. — Gabe, vier bis zwanzig Gran, je nach dem Alter.

Acetum Pseudo-Narcissi. (*Sm*. Vm.*)

℞. Florum Narcissi pratensis recentium partem unam.
Aceti albi . . . . partes octo.

Infunde blando calore per aliquot horas, cola absque expressione et filtra.

Zur Bereitung des Oxymel Narcissi angewendet.

Oxymel Narcissi pratensis. (*Sw*, Vm.*)

℞. Aceti Narcissi pratensis partem unam.
Mellis albi . . partes quatuor.

Dissolve frigide.

Etwas Brechen erregend, Auswurf befördernd, beruhigend, bei Keuchhusten und convulsivischem Asthma. — Gabe, ein oder zwei Kaffeelöffel, drei oder vier Mal täglich.

Narcotina.

Narcotinum; Narcotine; Narcotine. *Gall. Fl. T.*

℞. Residui Opii Aqua penitus extracti quantum vis.

Siccatum et grossiuscule pulveratum frigide cum Acido hydrochlorico (4°) vel Acido pyroacetico (4 vel 5°) infunde; cola exprimendo; liquori filtrato Ammoniacum in excessu infunde; praecipitatum cum Aqua frigida lotum digere in Alcohole bulliente (36°); solutionem refrigerare fac et crystallos Carbonis animalis ope purifica.

Fi. sec. Derosne Opium pluribus cum Aqua frigida macerationibus extrahere, quamdiu fluidum colorem praebet, liquores commixtos deinde ad extracti consistentiam consumere, aetherem infundere et decanthare; aetherem deinde destillatione separare etc.; — *T.* ut *Fi.* sed narcotinum e de tillatione aetherea obtentum cum Aqua Acido hydrochlorico acidulata tractare, Acido ut saturetur Ammoniacum addere et praecipitatum in Alcohole solutum per carbonem animalem filtrare, evaporandoque in crystallos cogere.

Betäubend, schwächend und giftig, nach Orfila, in hohen Gaben kräftig aufregend, nach Magendie, narkotisch, nach Brera.

Injectio narcotica. (*Ca.*)

℞. Decocti Lactucae virosae libram unam.
Extracti Belladonnae sesquidrachmam.
Narcotinae . . . . grana sex.

Bei Neuralgien der Harnröhre und der Scheide empfohlen.

Boli e Narcotina. (*B.*)

℞. Narcotinae purae . grana duo.
Olei Amygdalarum dulcium guttas sex.
Micae Panis,
Mellis,
singulorum quantum sufficit.

Fiant boli octo. — Gabe, ein Stück alle drei Stunden.

Mixtura incitans et sedans, Potio leniens. (*B.*)

℞. Narcotinae purae drachmam unam.
Aquae Citri . . . uncias tres.

Löffelweise zu nehmen.

Nardus.

Zwei Pflanzen sind unter diesem Namen in der Medicin gebräuchlich:

1) *Valeriana Celtica, L.*; Nardenbaldrian, Alpenbaldrian; Nard celtique (*Gal.*); Espicanardo celtico (*His.*).

A. Ams. An. Br. Fer. Gal. His. Pal. Wir. Wür. *Be. Br. G. M. Sp.*

♃ (Triandria Monogynia, L.; Valerianeae, *J.*) Eine auf den Alpen wachsende Pflanze. (*Plenck* t. 29. *Jacq.* Coll. t. I. p. 24.)

Die Wurzel (radix Valerianae Celticae s. Spicae Celticae s. alpinae s. Nardus Celtica) besteht aus langen, mit dünnen gelblichen Schuppen bedeckten Fäserchen. Sie hat einen starken und angenehmen Geruch und einen scharfen, bittern, gewürzhaften Geschmack.

Tonisch, magenstärkend, harntreibend.

2) *Spica Nardus*; Nardenbartgras, Spiknardenmannsbart; Nard des Indes, Spicu nard (*Gal.*); Spikenard (*Ang.*); Spike narde (*D.*); Nardo de Indias, Espica nardo (*His.*); Spikenard (*Bel.*); Spigo nardo, Nardo indiano (*I.*); Nardo indiano (*Lus.*); Spikenarde (*Suec.*); Sukku-naru-pilla (*Tam.*).

An. Br. Fer. Gal. His. Wir. *A. Be. Fi. G. M. Sp.*

Man wendet unter diesem Namen (Spica Indica s. Spica Nardus s. Nardus Indica) die untern, von den Rippen der Wurzelblätter umgebenen Enden der Stängel an, an welchen meist noch ein Theil der Wurzel hängt, welche aus einem kleinen röthlichbraunen Köpfchen besteht, woran viele knotige harte Fäden sitzen. Der Geruch ist angenehm; der Geschmack bitter, scharf und gewürzhaft.

Sprengel leitet (nach *W. Jones* Asiat. research. IV. p. 109.) die Indische Narde von Viola Jatamarensis her, welcher Meinung Guibourt beitritt. Sehr allgemein glaubt man auch, sie komme von Andropogon Nardus, L., ♃ (Polygamia Monoecia, L.; Gramineae, *J.*) einer Pflanze Ostindien's (*Rumph.* Amb. 4. 22. t. 6). Auch Ainslie bezieht sie, nach Rottler, auf diese Pflanze, aber mit, wie es scheint, gegründetem Zweifel.

Reizend, nervenstärkend.

Pulvis Nardi Celticae compositus. (Wür.)

℞. Nardi Celticae . . semunciam.
Zinci sulphurici scrupulum unum.
Fiat pulvis.

Essentia Spicae Indicae. (Wir.)

℞. Nardi Indicae . . sesquiunciam.
Alcoholis uncias sex vel septem.
Post sufficientem extractionem cola exprimendo et filtra.

Reizend, als Gegengift betrachtet, Blähungen, Harn und Menstruation treibend. — Gabe, vierzig bis sechzig Tropfen.

Nasturtium.

Wir fassen unter dieser Benennung folgende Pflanzen zusammen:

1) *Tropaeolum majus, L.*; Indianische Kresse, Capucinerkresse; Capucine, Cresson des Indes, Cresson du Mexique (*Gal.*); Indian cress (*Ang.*); Indiansk karse (*D.*); Capuchinos (*His.*); Spaensche kers (*Bel.*); Capucino (*I.*); Mastracco da Paro (*Lus.*); Indianisk kresse (*Suec.*).

Br. Gal. Wir. *Be. M. Sp.*

⊙ (Octandria Monogynia, L.; Tropaeoleae, *Cand.*) Eine Südamericanische Pflanze. (*Curt.* Bot. Mag. t. 23. Fl. méd. II. 96.)

Man wendet das Kraut und die Blüthen an.

Das Kraut (herba Nasturtii Indici s. Cardami majoris) besteht aus einem walzigen, glatten Stängel mit abwechselnden, ebenen, rundlichen, in fünf oberflächliche Lappen getheilten, schildförmigen, langgestielten Blättern.

Die fünfblättrigen Blüthen sind orangegelb oder ponceauroth.

Geschmack und Geruch sind stark und dem der Kresse ähnlich.

Reizend, als antiscorbutisch betrachtet.

2) *Thlaspi sativum, Cand.*; Gartenkresse, Sommerkresse; Cresson Alénois, Cresson des jardins (*Gal.*); Common cress (*Ang.*); Hausekerse (*D.*); Nastuerco (*His.*) Tuinkers (*Bel.*); Crescione (*I.*); Nasturoga (*Lus.*); Traegardskress (*Suec.*).

An. B. Br. Gal. GalM. Gen. His. *Be. G. M Pid. Sp.*

⊙ (Tetradynamia Siliculosa, L.; Cruciferae, *J.*) Eine Europäische Pflanze. (*Blackw.* t. 28. *Plenck* t. 514. *Hayne* VI. t. 11. *Zorn* Ic. pl. t. 16.)

Man wendet das Kraut und den Saamen an.

Das Kraut (herba Nasturtii hortensis) besteht aus einem ästigen Stängel mit abwechselnden, gestielten, langgestreckten, glatten, vielspaltigen Blättern.

Die Saamen sind länglich, glatt und braun.

Die Pflanze riecht, wenn man sie reibt, schwach, aber angenehm; der Geschmack ist etwas bitter und scharf.

Reizend, antiscorbutisch.

3) *Sisymbrium Nasturtium, L.*; Wasserkresse, Brunnenkresse; Cresson de fontaine (*Gal.*); Common watercress (*Ang.*); Kiericha wodnj neb potocnj (*B.*); Wandkarse (*D.*); Berro (*His.*); Waterkres (*Bel.*); Nasturzio, Crescione, Agretto (*I.*); Rzezucha (*Pol.*); Agrices (*Lus.*); Kiaellkrassa (*Suec.*).

Ams. An. B. Ba. Bel. Br. D. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Hass. His. Li. Lus. R. RC. Sax. Wir, Wür. *Be. Br. C. Fi. G. M. Pid. Sp. T. Z.*

♂ oder ♃ (Tetradynamia Siliquosa,

L.; Cruciferae, J.) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (Fl. Dan. t. 690. *Blackw.* t. 260. *Plenck* t. 525. *Hayne* V. t. 32. Düss. off. Pfl. VI. t. 6. Fl. méd. III. 138.)

Das Kraut (herba Nasturtii aquatici) besteht aus einem röhrigen, glatten, walzigen, ästigen Stängel mit abwechselnden, unpaarig gefiederten, grünen, saftigen, glatten, aus fünf bis sechs sitzenden, ganzen, rundlichen oder eirunden Blättchen, wovon das am Ende befindliche am längsten und fast lanzettförmig ist, zusammengesetzten Blättern. Es hat einen starken, beißenden Geruch und einen etwas scharfen und bittern Geschmack.

Reizend, antiscorbutisch.

4) *Spilanthus oleraceus*, *L.*; falsche Fleckblume; Cresson de Para (*Gal.*); Speat leav'd spilanthus (*Ang.*).

Per. Gal. *Fi. G.*

⊙ (Syngenesia Polygamia Aequalis, L.; Synantereae, *Cass.*) Eine Pflanze Südamerica's. (*Jacq.* Hort. Vind. t. 135.)

Man wendet das Kraut (herba Spilanthi) an; es besteht aus saftigen Stängeln mit fast herzförmigen, gestielten und gezähnten Blättern. Es hat einen scharfen und brennenden Geschmack und reizt die Speichelabsonderung.

Reizend, antiscorbutisch.

5) *Cardamine pratensis*, *L.*; Wasserkresse, Wiesenkresse; Cresson des prés (*Gal.*); Cuckow flower (*Ang.*); Engekasse, Vildkasse, Giogeblomster (*D.*); Koekkesbloem (*Bel*).

Br. D. Du. Ed. Gal. Gen. His. Lon. LonN. Wir. Wür. *Bc. C. G. M. Sp.*

4 (Tetradynamia Siliquosa, L.; Cruciferae, J.) Eine in ganz Europa sehr gemeine Pflanze. (*Blackw.* t. 223. *Plenck* t. 517. *Hayne* V. t. 30. *Zorn* Ic. pl. t 51.)

Die Blüthen (flores Cardamines s. Nasturtii pratensis s. Cuculi) sind sehr groß, etwas purpurroth, geruchlos und bilden einen schlaffen, am Ende des Stängels stehenden Strauß. Man nimmt nur die stumpfen, eirunden, länglichen, mit schmalen Nägeln versehenen, weißen oder purpurroth geaderten Blätter. Ihr Geschmack ist scharf, bitter und dem der gemeinen Kresse ähnlich.

Reizend, antiscorbutisch.

Conserva Nasturtii. (Ful. R. Sax. *Fi. T.*)

℞. Foliorum recentium Nasturtii partem unam.
Sacchari albi . . . partes duas.
Contunde folia et cum saccharo exacte misce. (Ful. R.)

Sax. *Fi.* Foliorum contusorum partem unam et Sacchari tres; — *T.* Folia cum Sacchari albi pondere aequali contundere, per crinium trajicere et commiscere jubet cum Sacchari libris duabus in Aquae parte dimidia soluti et ad aptam consistentiam evaporati.

Conserva antiscorbutica. (*Sa.*)

℞. Conservae Nasturtii aquatici . . . uncias quinque.
Salis polychresti Glaseri drachmam unam.
Misce.

Aqua Nasturtii aquatici. (Pal. Sar.)

℞. Herbae contusae Nasturtii aquatici partem unam.
Aquae . . . . . partes duas.
Destillent trientes duo. (Sar.)

Pal. Herbae partem unam et tres Aquae; destillet dimidia pars.

Spiritus Nasturtii aquatici. (Sar.)

℞. Nasturtii aquatici,
Succi Nasturtii,
Aquae fontanae, singulorum libras sex.
Alcoholis . . . . libras duas.
Destillet dimidia pars; producto adde
Herbae recentis Nasturtii libras tres.
Destillent in balneo aquae.

Succus Nasturtii aquatici. (Hass. Sar. Wür. *T.*)

℞. Herbae recentis Nasturtii aquatici quantum vis.
Contunde in mortario lapideo, exprime fortiter, succum sepone, decantha et in lagenis serva (Hass. Sar.)

Wür cuique librae succi addit Alcoholis drachmam unam.

Gabe, eine bis zwei Unzen.

Extractum Nasturtii. (Sar. *Fi.*)

℞. Herbae recentis et contusae Nasturtii . . . . . libras octo.
Macera per tres dies in alembico, abstrahe deinde destillationis in balneo aquae ope uncias circiter duas; residuo Aquae triplum infunde; post sex horas digestionis decoque ad tertiae partis remanentiam, clarifica et cola liquorem, cui ad electuarii consistentiam evaporato et nonnisi tepido aquam destillatam adde.

Fi. ut extractum cichorii.

Syrupus de Nasturtio. (Gal. *Fi.*)

℞. Succi Nasturtii aquatici colati libram unam.
Sacchari albi . . . libras duas.
Fiat in balneo aquae, vase tecto, syrupus, qui post refrigerationem coletur. — Gabe, eine bis drei Unzen.

Syrupus celotyrbicus Foresti. (Wir. *Sp.*)

℞. Succi Nasturtii aquatici,

Succi Beccabungae,
singulorum semilibram.
— Fumariae,
— Lupuli,
singulorum uncias tres.
Misce et coque cum
Sacchari albi . uncis sedecim.
Syrupo adde
Aquae Nasturtii vel Cochleariae
unciam unam ad duas.

Elixir odontalgicum et antiscorbuticum.

℞. Foliorum recentium et contusorum Spilanthi uncias quatuor.
Alcoholis (33°) . libram unam.
Digere per dies duodecim et filtra.
Reizend als antiscorbutisch betrachtet. — Gabe, einen halben Löffel in einem Aufguß der saponaria oder dulcamara.

Nerium.

Nerium Oleander, L.; Rosenlorbeer; Laurier rose (*Gal.*); Common rosebay (*Ang.*).

Fer. Gal.

Ein Strauch (Pentandria Monogynia, L.; Apocyneae, *J.*), welcher angeblich im Orient zu Hause und im südlichen Europa naturalisirt ist. (*Blackw.* Herb. t. 531. *Plenck* t. 128.)

Man wendet die Blätter (folia Nerii s. Rhododaphnis s. Rosaginis) an; sie sind lang, lanzettig, spitzig, steif, ledrig und sehr dunkelgrün. Sie haben einen etwas bittern Geschmack.

Man hält sie für narkotisch. — Den Aufguß hat man bei Flechten, das Pulver, mit Fett gemischt, gegen Krätze angewendet.

Nicotiana.

Man wendet in der Medicin zwei Arten dieser Pflanzengattung an:

1) *Nicotiana Tabacum, L.*; Toback, Tabak; Tabac ordinaire (*Gal.*); Tabak (*D. Suec.*); Tobacco (*Ang.*); Bujjerbhang (*Ar*); Tambacco (*Ba. Jap.*); Petinne *B.*); Youly (*Caramb.*); Sangyen (*C*); Dunkola (*Cy.*); Tumbaku (*Duk. Hin*); Tabaco (*His. Lus.*); Tabak (*Bel. Pol.*); Nicoziana, Erba di s. Croce, Tabacco (*I*); Tambracu (*Mal.*); Quauryetl (*Men.*); Dhumrapatra (*Sa.*); Poghei elieg (*Tam*); Tamer (*Tart.*); Poghako (*Tel*).

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. Has-P. His. Li. Lon. LouN. Lus. O. Pol R. RC. Sax. Suec. Wir. Würt. *A. Be. Br. C. Fi. G. M. Par. Pid. Sp. T. Z.*

⊙ (Pentandria Monogynia, L.; Solanaeae, *J.*) Eine ursprünglich in Südamerica? einheimische Pflanze. (*Bull.* t. 285. *Blackw.* t. 146. *Plenck* t. 99. *Big.* Am. med. Bot. t. 40. *Bert.* Bild. 1. 35. Fl. méd. VI. 326.)

Man wendet die Blätter (herba Tabaci s. Nicotianae) an; sie sind sehr groß, sitzend, am Grunde etwas herablaufend, eirundlanzettig, spitzig, ganz und fast glatt, frisch grün, getrocknet gelbbraun. Der Geruch ist stark und unangenehm; der Geschmack scharf, widerlich und betäubend.

Sie enthalten, nach *Vauquelin*, einen eigenthümlichen crystallinischen Stoff, Nicotianin oder Nicotin (*Nicotianinum, Nicotinum, Nicotianina*), welchen Hermbstädt für sich darzustellen gelungen ist.

2) *Nicotiana rustica, L.*; Bauerntaback; Tabac rustique (*Gal.*)

Gal.

⊙ Eine ursprünglich in America wachsende Pflanze. (*Blackw.* Herb. t. 437. *Bert.* Bild. I. 35.)

Man wendet die Blätter (folia Nicotianae rusticae s. minoris) an; sie sind eirund, ganz, stumpf und etwas herzförmig.

Auch sie enthalten Nicotianin.

Heftig reizend, in hohen Gaben giftig, Brechen, blutige Stühle, Nervenzufälle, wie Schwindel und Schlafsucht, beschleunigten Puls, Schweiß- und Urinabsonderung ꝛc. erregend. Sie werden, wie bekannt, als Nies- und Kaumittel, außerdem aber bei chronischen Catarrhen und Wassersucht angewendet. In Klystir dienen sie gegen Ascariden und um die Thätigkeit im Dickdarm aufzuregen, was besonders in Fällen von Scheintod und Schlagfluß von Nutzen ist; auch werden sie äußerlich gegen Kopfgrind und Krätze angewendet. — Gabe des Pulvers, von einem halben bis zu fünf Gran.

Pulvis sternutatorius. (Hass. *Pid.*)

℞. Foliorum Nicotianae,
— Majoranae,
Florum Lavandulae,
singulorum unciam unam.
Fiat pulvis subtilissimus.

Pulvis cephalicus. (*Bo.*)

℞. Nicotianae raspatae semunciam.
Pulveris Majoranae,
— Convallariae majalis,
— Mari,
singulorum semidrachmam.
— Hippocastani,
singulorum drachmam unam.
Misce.

Pilulae Nicotianae. (Suec. *Au. Vm.*)

℞. Extracti Nicotianae
drachmam unam.
— Liquiritiae unciam unam.
Aceti scillitici quantum sufficit.

Fiant pilulae centum octoginta. (Suec.)

Vm. loco extracti Radicem Liquiritiae et quidem aequalem extracto Nicotianae quantitatem praescribit.

℞. Extracti Nicotianae partem unam.
— Liquiritiae,
Succi Liquiritiae,
singulorum partes tres.
Pulveris Liquiritiae partes duas.
Fiat massa pilularis. (*Vm.*)

℞. Pulveris Foliorum Nicotianae Virginicae,
Conservae Rosarum,
singulorum drachmam unam.
Mucilaginis Gummi Arabici
quantum sufficit.
Fiant pilulae sexaginta. — Gabe, ein bis drei Stück, zwei oder drei Mal täglich. — Diese Pillen gelten für harntreibend und als gegen Wassersucht nützlich.

Extractum Tabaci s. Nicotianae. (Fenn. Ful. HassP. Sax. Suec. Wür. *Vm.*)

℞. Foliorum recentium Nicotianae
quantum vis.
Contunde in mortario lapideo; exprime succum, qui statim in balneo aquae ad consistentiam requisitam evaporet. (Wür.)

HassP. ut extractum calendulae, hyoscyami etc.

℞. Foliorum recentium Nicotianae
quantum vis.
Contunde in mortario et exprime succum; vaporando consume absque despumatione, donec quarta Pulveris Foliorum siccatorum Nicotianae pars sufficiat ad extracti consistentiam ei praebendam. (Fenn.)

℞. Foliorum Nicotianae,
Aquae frigidae,
singulorum partem unam.
Macera per horas duodecim, adde tunc
Aqnae bullientis . . . duplum ponderis totius massae; post refrigerationem cola, albuminis ope clarifica, igni impone et quum liquor spissescere coeperit, per pannum cola atque, continuè agitando, probe consume. (Sax. *Vm.*)

℞. Foliorum Nicotianae partem unam.
Aquae communis . partes duas.
Coque parumper blando igne et cola exprimendo; residuum cum nova Aqua coctum itidem cola; liquores commixtos in balneo aquae ad aptam consistentiam vaporando consume. (Suec.)

Ful. coquere jubet Nicotianae libram unam in octo Aquae et exprimere, massam in Aqua frigida macerare, iterum exprimere et colaturas commixtas evaporare,

Gabe, drei bis sechs Gran.

Extractum Nicotianae mitigatum. (Br. Han. Li. Wir. *Vm.*)

℞. Foliorum Nicotianae quantum vis.
Pluribus in Aqua frigida infusionibus totum principium saporis acris extrahe; residuo Aquae bullientis pondus duplum infunde, post refrigerationem exprime et albumine clarificatum ad extracti consistentiam consume. (*Vm.*)

Br. Li. et *Vm.* infundere et tunc coquere jubent Foliorum ab acore liberatorum libram unam in Aquae libris decem ad dimidium consumtis.

Reizend, bei Asthma empfohlen. — Gabe, ein Gran, drei oder vier Mal täglich.

Decoctum Tabaci s. Nicotianae. (*Sw.*)

℞. Foliorum siccatorum Nicotianae
drachmas duas ad quatuor.
Aquae bullientis . libram unam.
Coque per aliquot momenta, digere deinde per horam unam et cola.

In Klystir, bei Ileus, hartnäckiger Verstopfung und Ascariden. — Von Justamond auch in Waschungen bei tinea empfohlen, wo es aber mit vieler Vorsicht angewendet werden muß, indem es sonst Ekel und Erbrechen hervorbringt.

Aqua antipsorica. (Fer. *Fi.*)

℞. Foliorum siccatorum Nicotianae
libras duas.
Aquae . . . libras quindecim.
Coque per horam unam, adde
Natri subcarbonici uncias quatuor.
Post horas viginti quatuor cola. — Gabe vier Unzen auf jede Einreibung.

Infusum Tabaci s. Nicotianae Tabaci. (Am. B*. Lon. LonN. RC. *C. Fi. T.*)

℞. Foliorum Nicotianae
drachmam unam.
Aquae bullientis octarium unum.
Macera in vase leviter tecto per horam unam et cola. (Am. Lon. LonN. *C. Fi.*)

T. Foliorum drachmam unam, Aquae bullientis libram unam.

℞. Foliorum Nicotianae
drachmas duas.
Aquae bullientis uncias quatuor.
Infunde in balneo aquae per horas quatuor, cola exprimendo et adde
Alcoholis . . . unciam unam.
Misce bene. (B*. RC.)

Reizend, bei Asthma und Brustwassersucht gerühmt. — Gabe, zwanzig bis vierzig Tropfen.

Fowler: Nicotianae Virginicae unciam unam, digere in balneo aquae per horam unam cum Aquae bullien-

tis libra una, cola cum expressione et colaturae unciarum quatuordecim adde Alcoholis uncias duas. — Bei Asthma und Dysurie, Erwachsenen zu sechzig bis hundert Tropfen. — *Marryat*: Nicotianae uncias duas, infunde cum Aquae fontanae unciis sedecim, colaturae adde Potassae liquidae drachmam unam. — Gegen Kopfgrind; man läßt die Haare abschneiden und wäscht die Geschwüre mit diesem Wasser, während man zu gleicher Zeit Morgens und Abends den Kopf mit einer Salbe aus einer Unze Basilicumsalbe und einer bis zwei Drachmen mercurius dulcis einreibt.

Syrupus Nicotianae s. de Nicotiana. (B*. Br. Ful. Li. Wir. *Bo. Pie. Sp.*)

℞. Succi Foliorum Nicotianae libras duas.
Hydromellis simplicis sesquilibram.
Oxymellis simplicis uncias quatuor.

Digere per dies duos vel tres in balneo aquae vel loco modice calido; liquorem clarum decantha, sepone per horas viginti quatuor et post depurationem adde

Sacchari albi . . . libras tres.

Fiat syrupus. (Wir.)

Br. eundem agendi modum sed decoctum e Foliorum Nicotianae unciis sex in Aquae fontanae libris sex ad duas redigendis praescribit.

B*. et *Sp.* Succi Nicotianae uncias quadraginta octo, Oxymellis quatuor, Hydromellis duodecim et Sacchari quadraginta octo; — *B.* et *Pie.* Succi uncias tres, Oxymellis quatuor, Hydromellis unam et duas Sacchari.

℞. Foliorum siccatorum Nicotianae semunciam.
Aquae . . . . . uncias sex.

Coque per horam et decoctum rejice; residuo adde

Radicis Liquiritiae unciam unam.
Aquae bullientis uncias duodecim.

Coque per aliquot tempus ad consumptionem partis quartae circiter usque, cola exprimendo et colaturae adde

Meliis despumati . uncias octo.

Coque ad consistentiam syrupi. (Ful. Li.)

Clyster s. Enema irritans s. Nicotianae s. tabacinus. (B*. GalM. RC. *E. Fi. Ra.*)

℞. Foliorum Nicotianae drachmam unam.
Aquae bullient's quantum sufficit ut unciae octo colaturae obtineantur. (B*. *E.*)

RC. Foliorum semunciam, Aquae bullientis uncias decem, infunde per horae quadrantem et cola.

℞. Foliorum Nicotianae unciam unam.
Aquae . . . . . libras duas,
Coque leviter et colaturae adde
Tartari stibiati grana duodecim.
Dissolve. (GalM. *Ra.*)

℞. Foliorum siccorum Nicotianae sesquidrachmam.
Magnesiae sulphuricae drachmas duas.
Aquae communis quantum satis.

Coque leviter per horae quadrantem, colaturae unciarum octo sal adde. (*Fi.*)

Lotio Nicotianae, Fomentatio exitans. (*Au. Ra.*)

℞. Foliorum Nicotianae uncias duas.
Aquae . . . . . libram unam.

Coque et cola. — Marryat und Riemann rühmen diese Flüssigkeit in Waschungen gegen Kopfgrind.

Guttulae diureticae. (Ham.)

℞. Foliorum Nicotianae drachmam unam.
Aquae bullientis quantum sufficit ut infusionis uncia una obtineatur; colaturae adde
Aquae Cinnamomi vinosae semunciam.

Cataplasma vomitivum s. Cataplasma Nicotianae. (RC. *E.*)

℞. Foliorum Nicotianae unciam unam.
Aquae . . . . quantum sufficit ut fiat cataplasma. (*E.*)

RC. Foliorum Nicotianae unciam unam, Acidi acetici impuri, vel Aquae ferventis quantum satis ut fiat cataplasma.

Man wendet es auf die Magengegend an, wenn man ein Brechmittel durch den Mund nicht beibringen kann, außerdem bei Flechten.

Vinum Tabaci s. Nicotianae s. Nicotianae Tabaci. (Am. B*. Ed. Lus. RC. *Au. C. Sw. Vm.*)

℞. Foliorum Nicotianae partem unam.
Vini albi Hispanici partes duodecim.

Post octo dies macerationis filtra. (Am. B*. Ed. Lus. RC. *Au. E. Sw.*)

Vm. Nicotianae drachmas duas et Vini uncias triginta.

Ein kräftiges, bei Wassersuchten empfohlenes Reizmittel. — Gabe, fünf bis dreißig Tropfen (eine halbe bis anderthalb Drachmen RC.) in einem schicklichen Vehikel.

Tinctura Nicotianae. (*Au. Huf.*)

℞. Foliorum Nicotianae uncias duas.
Alcoholis . . . libram unam.

Post tres dies infusionis cola. (*Huf.*)

Au. Nicotianae Virginicae unciam unam et Aquae Vitae libram unam.

Nux vomica.

Brechnuß, Krähenaugen; Noix vomique (*Gal.*); Palson nut, vomiting nut (*Ang.*); Khanek-ulkeb (*Ar.*); Matin (*C.*); Kodakadduruatta (*Cy.*); Braeknaede (*D.*); Kuehla (*Duk. Hin.*); Nuez vomica (*His.*); Breeknoeten (*Bel.*); Fungo di Levante, Noce vomica (*I.*); Noz vomica (*Lus.*); Culaka, Cutaka, Vescha mustibijum (*Sa.*); Recefkaka (*Suec*); Yettie cottay (*Tam.*); Muscadi, Mustighenza (*Tel.*).

Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Fenn. Fer. Ful. Gal. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. WW. *A. Be. Br. C. Fi. G. M. Par. Sp.*

Ein platter, runblicher, knopfförmiger Saame, von faſt einem halben Zoll im Durchmeſſer auf eine bis zwei Linien Dicke, grau, an der Oberfläche etwas wollig, in der Mitte genabelt, von gleichſam hornartiger Beſchaffenheit und ohne Geruch. Der Geſchmack iſt bitter, ſcharf und etwas widerlich.

Er kommt von Strychnos Nux vomica, L.; gemeines Krähenauge; Vomiquier (*Gal.*), einem Baume (Pentandria Monogynia, L.; Apocyneae, *J.*) Oſtindiens. (*Blackw.* t. 395. *Plenck* t. 117. *Lam.* Ill. t. 119. *Hayne* I. t. 17. *Bert.* Bild. I. 84. fig. 1. Fl. méd. V. 249.)

Nach Pelletier und Caventou enthält er Strychnin und Igaſurſäure. Auch findet man Brucin darin.

Eins der kräftigſten Reizmittel, in etwas beträchtlicher Gabe ein Gift, welches krampfhafte und tetaniſche Contractionen hervorruft. Man wendet es bei Lähmung an. — Gabe des Pulvers, vier bis funfzehen Gran.

Pulvis Nucis vomicae. (*Au.*)

℞. Nucis vomicae . . grana tria.
Gummi Arabici,
Sacchari albi,
singulorum semiscrupulum.

Hufeland empfiehlt dieſes Pulver bei Ruhr. — Man verſchreibt täglich drei Stück.

Pilulae nervosum et musculare systema vellicantes s. stimulantes. (*B. E.*)

℞. Nucis vomicae . semidrachmam.
Conservae Rosarum
quantum sufficit.

Fiant pilulae decem. — Gabe ein Stück zwei oder drei Mal täglich. (*E*)

℞. Nucis vomicae
granum unum ad sex.
Sacchari albi . semiscrupulum.
Roob Sambuci quantum sufficit.

Fiant pilulae sex. — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden. (*B.*)

Bei Lähmungen, Epilepſie, Veitstanz, Hypochondrie, Hyſterie, Melancholie.

Extractum Nucis vomicae aquosum. (Au. B. Ba. Bor4. Hass. Sax. Wir. *Sw.*)

℞. Nucis vomicae raspatae libram unam.
Aquae bullientis . . libras octo.

Digere per horas viginti quatuor, tum coque per horae quadrantem et cola; residuum per quadrantem horae coquatur cum Aquae libris quatuor, quo colato, liquores commixti et post-sepositionem decanthati ad extracti consistentiam evaporent. (Au.)

B*. Ba. Hass. Sax. Wir. et *Sw.* fere eundem modum agendi nimirum coquere Nucem vomicam in Aqua nova, donec nullum amplius accipiat amaritiem, et decocta conjuncta evaporare; — Bor4 ut extractum cascarillae.

Reizend, giftig, bei Lähmung empfohlen. — Gabe, zwei bis zwanzig Gran, zwei oder drei Mal täglich und mit Vorſicht geſtiegen.

Extractum Nucis vomicae alcoholicum. (Bel. Bor4. Fer. Gal. Han. HassP. Sax. *Ca. Ma. Pia. Vm.*)

℞. Nucis vomicae raspatae
partem unam.
Alcoholis (22°) partes quatuor.

Calefac in vase tecto per horas viginti quatuor et cola exprimendo; residuum digere cum

Alcoholis (12°) partibus tribus.

Cola exprimendo; liquoribus commixtis, quarta pars in balneo aquae destillet; quod remanet ad extracti consistentiam evaporet. (Fer. Gal.)

℞. Nucis vomicae raspatae quantum vis.
Alcoholis (22°) quantum sufficit.

Digere, Alcoholem novum subinde sumendo donec neque colorem neque saporem accipiat; tincturas commixtas et filtratas destillatione ad quintam partem redige et quod remanet in balneo aquae consume. (Bel. Gal. Han. HassP. Sax. *Pia. Vm.*)

Bor4 destillatione ad quartam partem redigere et tunc ad consistentiam extracti spissioris balnei vaporis ope consumere jubet.

℞. Nucis vomicae raspatae quantum vis.

Alcohole, temperaturae quam maxime fieri potest, frigida penitus extracta, tinctura lente ad extracti consistentiam evaporet. (*Ca. Ma.*)

Reizend, giftig, bei Lähmungen jeder Gattung empfohlen. — Man giebt es in Pillen, deren jede einen Gran Extract enthält, indem man mit einer oder zwei anfängt und damit jeden Tag bis zum gewünſchten Erfolg ſteigt. Auf dieſe Weiſe hat man die Gabe bis auf vier und zwanzig und dreißig Gran täglich erhöht, bis man tetaniſche Wirkungen erhielt; aber vier bis ſechs Gran ſind in den meiſten Fällen ausreichend. Dieß gilt von dem mit

vierziggradigem Alcohol bereiteten Extract; das mit schwächerem Alcohol bereitete ist schwächer und enthält viele gummöse Theile.

Extractum Nucis vomicae siccum. (*Ma.*)

℞. Tincturae Nucis vomicae alcoholicae . . . . . quantum vis.
Filtra et in patinis evapora.

Man muß es so gesättigt als möglich und mit sechsundbreißiggradigem Alcohol bereitet nehmen. — Gabe, ein bis zehen Gran allmälig.

Pilulae anthelminticae. (B*.)

℞. Gummi Ammoniaci,
Saponis Veneti,
Resinae Jalappae,
singulorum scrupulum unum.
Extracti Nucis vomicae alcoholici semiscrupulum.
Essentiae Succini quantum sufficit.
Fiant pilulae grani unius. — Gabe, zwölf Stück in der Woche.

Pilulae excitantes. (*Bo.*)

℞. Extracti Nucis vomicae resinosi,
Conservae Tiliae,
singulorum semidrachmam.
Fiant pilulae granorum duorum. — Bei Lähmung empfohlen. — Gabe, Morgens nüchtern, ein Stück und alle Wochen um ein Stück gestiegen.

Niemann hat mit Erfolg bei sogenannter spasmodischer Cardialgie eingranige Pillen gegeben, welche aus einem Theil Brechnußextract und fünf Theilen Stinkasand bestanden.

Emulsio cum Nuce vomica, Solutio Extracti Nucis vomicae. (B*. *Au.*)

℞. Extracti Nucis vomicae grana decem.
Mucilaginis Gummi Arabici unciam unam.
Aquae fontanae . . uncias sex.

Von Hufeland bei Ruhr gerühmt. — Gabe, zwei Löffel alle zwei Stunden. — Man kann eine Unze Althee- oder Mandelsyrup zusetzen.

Decoctum Cucumerum cum extracto Nucis vomicae. (*Au.*)

℞. Extracti Nucis vomicae semidrachmam.
Decocti Cucumerum uncias sex.
Olei Lini cum Vitello Ovi contriti unciam unam.
Mellis . . . . . semunciam.

Gabe, zwei Löffel alle zwei Stunden. — Von Händel als ein vortreffliches Mittel in allen Stadien des Trippers empfohlen.

Tinctura Strychnos s. Nucis vomicae s. Nucum vomicarum. (B*. Fer. Gal. Li. Sax. *Bo. E. Fi. Huf. Ma. Pie. Sw. T. Vm.*)

℞. Nucis vomicae raspatae partem unam.
Alcoholis Aqua diluti partes octo.

Infunde frigide per tres dies, tunc digere in balneo aquae per horas sex; cola exprimendo et filtra. (B*. *Vm.*)

Sw. Nucis vomicae sesquiunciam et Alcoholis (0,935) libras duas; — Sax. Nucis vomicae partem unam et quinque Spiritus rectificati; — B*. secundum *Wiel*, Nucis partem unam et quatuor Spiritus rectificati; — Gal. et Li. Nucis partem unam et quatuor Alcoholis (22°); — *Huf.* Nucis partem unam et sex Alcoholis; — *T.* Nucis vomicae uncias duas, Alcoholis (36°) libras duas; digere per octo vel decem dies calore 25 ad 30° C.

℞. Extracti sicci Nucis vomicae grana tria.
Alcoholis (36°) . unciam unam.
Dissolve. (Fer. GalF. *Bo. E. Fi. Ma. Pie.*)

Diese Tinctur, welche anfangs unter dem Namen *Guttae uterinae Reginae Hispanicae* bekannt war, ist ein sehr kräftiges Reizmittel. Man giebt die von Van Mons zu vierzig bis achtzig Tropfen, die von Magendie ebenfalls tropfenweise in irgend einem Trank. Die Indicationen sind dieselben wie für das alcoholische Extract. Man bedient sich derselben auch äußerlich in Einreibungen, bei Lähmungen und Atrophie einzelner Theile.

Guttae amarae. (*Ca.*)

℞. Spiritus Absinthii . libras duas.
Nucis Vomicae . libram unam.
Kali subcarbonici liquidi semunciam.
Fulignis puri drachmam unam.

Post dies quatuordecim infusionis in balneo aquae exprime et filtra. — Gabe, einen bis höchstens acht Tropfen in einem Glase eines bittern Aufgusses, gegen Windcolik.

Nymphaea.

Zwei Arten dieser Pflanzengattung sind in der Medicin in Gebrauch:

1) *Nymphaea alba, L.*; weiße Seerose, Seeblume, Wasserlilie, Wasserrose, Haarwurz; Nénuphar blanc (*Gal.*); White waterlily (*Ang.*); Seeblomster (*D.*); Nenufar blanco (*His.*); Witte plompen (*Bel.*); Nenufaro bianco (*I.*); Wodna lilia (*Pol.*); Nymphaea branca (*Lus.*); Sjaeblad (*Suec.*).

Br. Fer. Gal. Gen. His. Wir. *Be. Br. Fi. G. M. Sp.*

4 (Polyandria Polygynia, L.; Nymphaeaceae, J.) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (Fl. Dan. t. 602. *Blackw.* t. 498 499. f. 2. *Plenck* t. 429. *Hayne* IV. t. 35. *Schk.* t. 142. Fl. méd. V. 247.)

Man wendet die Wurzel und die Blüthen an.

Die Wurzel (radix Nymphaeae albae s. Nenufaris) ist sehr lang, walzig, dick, knotig, fleischig, außen braun, innen gelblichweiß. Ihr Gewebe ist schwammig, der Geschmack bitterlich und etwas styptisch

Die Blüthen haben einen angenehmen Geruch, welcher sich durch Trocknen verliert Sie enthalten viel geschmackloſen Schleim.

Die Wurzel enthält viel Satzmehl und ist sehr nährend, ungeachtet sie nach dem Glauben des großen Haufens kühlende Eigenschaften besitzen soll. Die Blüthen zählte man ehedem zu den schmerzstillenden und beruhigenden Mitteln.

2) *Nymphaea lutea, L.*; gelbe Seeblume; Nénuphar jaune (*Gal.*).

Gal.

4 Eine Pflanze Europa's. (*Hayne* IV. t. 56. *Blackw.* Herb. t. 491.)

Die Wurzel hat Aehnlichkeit mit der der vorigen. Die Blüthen sind gelb.

Species diamargaritae frigidae. (Wir.)

℞. Margaritarum orientalium drachmas sex.
Corallii albi,
— rubri,
Florum Boraginis,
— Nymphaeae albae,
— Rosarum rubrarum,
Granorum Kermes,
Ligni Aloës,
— Santali albi,
— citrini,
singulorum drachmas duas.

Fiat pulvis. — Man empfahl es ehedem bei Schwindsucht und in der Convalescenz von sogenannten bösartigen Fiebern. — Gabe, ein bis zwei Scrupel.

Species de gemmis frigidae. (Wir.)

℞. Eboris philosophice praeparati unciam unam.
Margaritarum orientalium praeparatarum . . . drachmas sex.
Corallii albi,
— rubri,
singulorum semunciam.
Hyacinthi,
Smaragdi,
Sapphiri,
Granati,
Santali albi,
— citrini,
— rubri,
singulorum drachmas tres.
Florum Boraginis,
— Buglossi,
— Nymphaeae,
singulorum drachmas duas.
— Rosarum drachmas tres.

Misce ut fiat pulvis, cui adde
Foliorum Auri . . . . no. 20.

Ehedem bei Schwindsucht zur Verminderung der Nachtschweiße empfohlen. — Gabe, von einem Scrupel bis zur halben Drachme.

Conserva Nymphaeae. (Sar.)

℞. Petalorum Nymphaeae contusorum et cum Sacchari pauxillo in pulpam redactorum partem unam.
Sacchari clarificati . partes tres.
Ebulliant.

Aqua Nymphaeae. (Gal. Pal. Sar.)

℞. Florum Nymphaeae partem unam.
Aquae . . . . partes quatuor.
Post horas sex infusionis destillet dimidia pars.

Infusum Florum Nymphaeae. (Sar.)

℞. Florum recentium Nymphaeae libras duas.
Aquae bullientis . libras octo.
Digere per octo horas et cola leviter exprimendo; operationem bis cum novis floribus repete.

Syrupus Nymphaeae s. de Floribus Nymphaeae albae. (Gal. His.)

℞. Petalorum recentium Nymphaeae albae . . . . libram unam.
Aquae bullientis libras quatuor.
Infunde per horae quadrantem et cola leviter exprimendo; colaturae adde
Sacchari albi . . . libras sex.
Fiat syrupus. (His.)

Gal. infundere per horas duodecim jubet Petalorum libras quatuor in Aquae libris octo, colare et leviter exprimere, liquorem per aliquot horas reponere, tunc decanthare, addere Sacchari albi duplum et balnei aquae calore syrupum parare.

Potio antispasmodica. (*Pic.*)

℞. Emulsionis levis uncias quatuor.
Syrupi Nymphaeae . semunciam.
— Succini . drachmas duas.

O.

Oesypus.

Wollfett; Suint (*Gal.*); Yelk of wool (*Ang.*); Hisopo humedo (*His.*).

Ein öligs extractiver Stoff von üblem Geruch, welcher in der Schaafwolle steckt.

Das Wollfett enthält, nach Vauquelin, einen fetten thierischen Stoff und kohlensauren Kalk mit etwas essigsaurem und salzsaurem Kali.

Es kommt mit zu einigen Pflastern. — Die Spanische Pharmacopöe läßt es durch Kochen mit einer hinlänglichen Menge Wasser reinigen, so daß man eine dicke Flüssigkeit erhält, welche man durch ein Seidensieb seiht und dann bis zur Consistenz eines weichen Extracts abdampft.

Olea.

Olivarum Oleum; Baumöl, Olivenöl; Huile d'olive (*Gal.*); Oil of olive (*Ang.*); Bomolie (*D.*); Aceyte comun (*His*); Olyfoly (*Bel.*); Azeite (*Lus.*); Bomolja (*Suec.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. WW. *Be. C. M. Par. Sa. Sp. T.*

Ein fettes, flüssiges, fast weißes, gelbliches oder grünliches, geruchloses und sehr süß schmeckendes Oel. Es ist das leichteste aller fetten Oele und wird als Nahrungsgegenstand am meisten geschätzt. Die grüne Farbe desselben kommt vom Chlorophyll, die gelbliche, von einem vegetabilischen Stoffe, dessen Farbe erst sichtbar wird, wenn er der Luft ausgesetzt ist und sein Geruch rührt von einem andern eigenthümlichen Stoffe her.

Man erhält es durch Auspressen, Abkochung oder Gährung der Früchte des Oelbaums, Olea Europaea, L., eines Baums (Diandria Monogynia, L.; Jasmineae, J.) des südlichen Europa's (*Blackw.* t. 199 u. 213. *Plenck.* t. 11. Dict. d. Sc. nat. cah. 6. *Bert.* Bild. I. 27. f. 1. *Zorn.* Ic. pl. t. 369.) welcher aus Kleinasien seinen Ursprung herzuleiten scheint.

Potio oleosa. (*Ra.*)

℞. Potionis gummosae uncias quatuor.
Olei Olivarum . . semunciam.
Auf eine einzige Gabe.

Emulsio oleosa. (WW.)

℞. Olei Olivarum . unciam unam.
Vitelli Ovi . . . . . no. 1.
Subige et adde
Aquae . . . . : uncias septem.
Misce bene.

Clysma oleosum. (*B. Sw.*)

℞. Decocti emollientis uncias novem.
Olei Olivarum . . uncias tres.
Mell's . . . . unciam unam.
Addi potest Natri sulphurici vel Salis communis semuncia. (*Sw.*)

℞. Decocti Hordei,
Olei Olivarum,
singulorum uncias quatuor.
Misce. (*B.*)

Oleum laterum s. de lateribus s. philosophorum s. olivarum empyreumaticum. (Br. Pal. Sar. Wir. *T.*)

℞. Laterum contusorum quantum vis.
Oleo Olivarum bene impraegnatos in cucurbita vitrea, in arenae balneo collocata destilla, igne gradatim aucto; oleum a phlegmate simul transeunte separa et nova destillatione cum cinere rectifica.

Reizend, ehedem für auflösend, schmelzend und fäulnißwidrig gehalten. Man bedient sich desselben auch zur Reinigung von Geschwüren.

Oleae Gummi

s. Resina s. Balsamum; Oelbaumharz; Gomme d'Olivier (*Gal.*).

Gal. *Fr.*

In gelblichen Massen von etwas scharfem Geschmack und Vanillegeruch.

Ein Balsam, welcher in heißen Ländern aus verschiedenen wilden Oelbäumen ausfließt.

Er besteht nach Pelletier aus Harz, etwas Benzoësäure und einem besondern Stoff, Olivile genannt.

Wird als adstringirend und reinigend betrachtet.

Oleum Palmae.

Palmae sebaceum; Palmöl; Huile de palme (*Gal.*).

Ams. Br. Ed. Gal. Suec. *Be. M. Sp.*

Ein steifes, butterartiges, goldgelbes Oel von einem Veilchengeruch und einem sehr süßen Geschmack.

Es kömmt von Cocos butyracea, L., Butterbaum, Cocotier du Brésil, einem Baume Südamerica's und Africa's (*Pis.* Ind. res. nat. et med. p. 215.), oder, nach Jacquin, von Elaïs Guineensis. (*Jacq.* Stirp. Am. 860. t. 257. *Bert.* Bild. II. 51. f. 2.)

Es zeichnet sich durch nichts vor andern fetten Oelen aus und man macht fast keinen Gebrauch davon.

Olibanum.

Thus, Thus verum, Gummi Olibani; Κέδρος; Weihrauch; Oliban, Encens (*Gal.*); Incense (*Ang.*); Luban (*Ar. Mal.*); Kadidlo (*B.*); Virok (*D.*); Avul cundur (*Duk.*); Inciensa (*His.*); Kundir zuchir (*Hin.*); Wierook (*Bel.*); Incenso, Olibano, Cedro fenicio (*I.*); Incenso (*Lus.*); Kadzidlo biale (*Pol.*); Wirach (*Suec.*); Labaniya (*Syr.*); Paringhi sambrani (*Tam.*).

Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. Du. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *A. Be. Br. C. Fi. G. M. Par. Pid. Sa. Sp. T. Z.*

Ein Gummiharz in länglichen, unregelmäßigen, erbsengroßen und mehr gesonderten, oder aneinanderklebenden oder je zwei und zwei zusammenhängenden Tropfen, in welchem letztern Falle man es Encens mâle oder Encens femelle genannt hat, indem man den Vergleich von der Aehnlichkeit seiner Form mit Brustwarzen oder Testikeln hernahm. Es ist trocken, brüchig, halbdurchsichtig, blaßgelb und außen mit einem mehligen Staub überzogen. Im Munde wird es weich und klebt an den Zähnen. Der Geruch ist balsamisch, besonders wenn man es verbrennt; der Geschmack etwas brennend und bitter. Die schönsten Stücke nennt man Olibanum electum (Encens choisi, *Gal.*), die unreinern Olibanum in sortis (Oliban en sorte, *Gal.*).

Man kennt die Pflanze, von welcher der Weihrauch kömmt, noch nicht genau. Juniperus Lycia, Phoenicea und thurifera sind es wahrscheinlich nicht, obgleich viele Schriftsteller ihn davon herleiten. Colebrooke meint, er komme von Libanus thurifera, einem auf den Gebirgen Indien's wachsenden Baume (Decandria Monogynia, L.; Terebinthaceae, *J.*). Andere halten die Pflanze für eine Art Amyris. (A. Kataf, *Forsk.*)

Reizend, als harntreibend und Wundmittel angesehen. — Gabe, eine halbe Drachme. — Häufiger wendet man ihn in Räucherungen an als innerlich.

Pulvis Olibani compositus. (B*.)

℞. Pulveris Olibani,
— Corticum Aurantiorum, singulorum grana decem.
— Corticum Quercus grana quinque.

Misce. — Heberden rühmte es bei weißem Fluß. — Gabe, alle drei Stunden zugleich mit einer Abkochung von Eichenrinde als Getränk und als Einspritzung. Wahrscheinlich wirkt hier mehr die Eichenrinde.

Species fumales pro suffimento. (Ful.)

℞. Olibani,
Baccarum Juniperi,
singulorum uncias quatuor.
Succini,
Cascarillae,
singulorum unciam unam.
Florum Tanaceti . uncias duas.

Bei sogenannten kalten Rheumatismen empfohlen.

Pulvis pro suffimento. (RC.)

℞. Olibani,
Succini, singulorum partes tres.
Florum Lavandulae partem unam.
Misce.

Pilulae balsamicae. (*Au. Sa.*)

℞. Extracti Cascarillae drachmas duas.
Succi Liquiritiae,
Olibani, singulorum drachmas quinque.
Croci . . . scrupulos quatuor.
Balsami Peruviani scrupulum unum.

Fiant pilulae granorum duorum. (*Au.*)

℞. Olibani,
Gummi Arabici,
Succi Liquiritiae,
singulorum drachmas duas.
Balsami Peruviani quantum sufficit.

Fiant pilulae quatuor. (*Sa.*)

Gabe, vier bis acht Stück, täglich zwei Mal, bei sogenanntem asthenischen Blutspeien. — Von Reil empfohlen.

Haustus ex Olibano, Potio excitans. (*Au. Sw.*)

℞. Olibani,
Sacchari albi,
singulorum semidrachmam.
Aquae . . . drachmas decem.
Tincturae Corticum Aurantiorum drachmas duas.

Misce. (*Sw.*)

℞. Olibani . . . semidrachmam.
Mellis . . . quantum sufficit.
Aquae alexiteriae simplicis sesquiunciam.
— spirituosae Piperis Jamaicensis,
Syrupi balsamici,
singulorum drachmas duas.

Misce. (*Sw.*)

Zweimal täglich bei weißem Fluß.

Ononis.

Resta bovis; Arrête-boeuf (*Gal.*).

In den Pharmacopöen sind zwei Arten dieser Pflanzengattung angezeigt:

1) *Ononis Arvensis, L.;* Ackerhauhechel; Bugrane des champs (*Gal.*).

An. Br. Gal. Wür.

♃ (Diadelphia Decandria, L.; Leguminosae, J.) Eine in ganz Europa wachsende Pflanze. (*All.* Flor. Pedem. I. p. 317. t. 41. fig. 1.)

Die Wurzel hat viel Aehnlichkeit mit der der folgenden Art.

2) *Ononis spinosa, L.*; stachelige Hauhechel, Ochsenbrechhauhechel, Ochsenbrechwurzel; Bugrane épineuse (*Gal.*), Thorne'd rest harrow (*Ang.*); Ossenbrecke (*Bel.*); Anonide, Arresta bove, Barbonaccia, Bonaga (*I.*); Wilzyny (*Pol.*).

A. Ams. Bor. Bor4. D. Fer. Gal. GalM. Gen. Han. HassP. His. Li. Pal. Sax. Wir. *Br. Fi. G. M. Sp.*

Eine Pflanze, welche in ganz Europa wächst. (*Blackw.* t. 301. f. 1. *Plenck* t. 553. Düss. off. Pfl. VII. t. 19. *Zorn* Ic. pl. t. 132.)

Man wendet die Wurzel (radix Ononidis s. Restae bovis) an; sie ist kleinen Fingers dick und stärker, rund, sehr klebrig, außen dunkelbraun, inwendig weißlich, geruchlos und von schleimigem Geschmack.

Beide Wurzeln werden als harntreibend angesehen.

Aqua Ononidis. (Sar.)

℞. Herbae recentis Ononidis contusae partem unam.
Aquae . . . . . partes duas.
Destillent trientes duo.

Apozema aperiens et tonicum. (*Bo. Pie.*)

℞. Radicis Ononidis unciam unam.
— Eryngii . . . semunciam.
Cascarillae,
Foliorum Cichorii,
— Taraxaci,
singulorum manipulum dimidium.
Aquae . . . . quantum sufficit ut coquendo colaturae vitrum unum obtineatur, cui adde
Natri sulphurici drachmam unam.
Salis Ammoniaci grana quindecim.
Syrupi Cichorii compositi unciam unam.
Tartari chalybaeati scrupulum unum.
Misce bene. (*Bo.*)

Pie. Tartarum chalybaeatum et sal ammoniacum omittit.

Bei viertägigem Fieber, Morgens nüchtern, zehen oder zwölf Tage hintereinander.

Onosma.

Onosma echioides, L.; natterköpfige Lotwurzel; Orcanette jaune (*Gal.*); Smalt yellow alcanet (*Ang.*); Wolowy gazyk cerweny (*B.*).

Gal. *Br.* Z.

♃ (Pentandria Monogynia, L.; Borragineae, J.) Eine Südeuropäische Pflanze. (*Jacq.* Aust. t. 295. *Schk.* t. 31. *Plenck* t. 81.)

Man wendet die Wurzel an, deren Rinde einen gelbfärbenden Stoff enthält. — Adstringirend.

Wir bringen hier zwei unter Alcanna (s. Anchusa tinctoria) übergangene Präparate bei:

Unguentum rubrum potabile. (Pal. Wir. *Sp.*)

℞. Radicis Alcannae libram unam.
Vini rubri . . . . semilibram.

Post aliquot dies frigidae macerationis adde
Butyri recentis . . libras sex.

Coque ad humidi consumptionem usque et cola cum expressione

Unguentum rubrum ad labia oris, Ceratum labiale. (Wir. *T.*)

℞. Radicis Alcannae sesquiunciam.
Cerae albae . . drachmas sex.
Olei Amygdalarum dulcium uncias duas.
Vini rubri . . . . uncias tres.

Radicem concisam in vino macera, adde oleum et coque lente ad humidi consumptionem usque, in fine ceram addendo; exprime et massam Aquae Rosarum infunde; post refrigerationem liqua blando igne, adde Olei Cinnamomi guttas decem et in capsulas charta ceas infunde.

T. Cerae flavae uncias duas cum dimidia, Olei Olivarum uncias quatuor, Radicis Alcannae frustum, per aliquot tempus in balneo aquae relinquere et mixturae jam concrescenti aliquot guttas Olei de Cedro addere.

Ophioglossum.

Ophioglossum vulgatum, L.; Schlangenzunge; Ophioglosse, Langue de serpent (*Gal.*); Adders tongue (*Ang.*); Slangetunge (*D.*); Lingua de sierpe (*His.*); Natertong (*Bel.*); Lingua di serpente (*Lus.*); Laeke tunga (*Suec.*).

Gal. Wir. *Sp.*

⊙ oder ♃ (Cryptogamia, L.; Filices, J.) Eine Pflanze, welche man in ganz Europa antrifft. (*Blackw.* t. 16. *Moris.* III. t. 5. f. 1. *Oed.* Fl. Dan. t. 147.)

Man wendet das Kraut (herba Ophioglossi s. Echioglossi s. Linguae serpentariae) an; es besteht aus umfassendem, eirunden, stumpfen, ganzen, glatten, rippenlosen Laub und hat keinen Geruch, aber einen schleimigen und süßlichen Geschmack.

Ehedem hielt man es für ein Wundmittel.

Opium.

Opium thebaicum, *Succus thebaicus*, *Meconium*; Mohnsaft, Opium (*Gal.*); Opium (*Ang. Pol.*); Ufiun (*Ar. Mal.*); Hapium (*Ba*); Abim (*Cy.*); Afim (*Duk.*); Opio (*His. I. Lus.*); Ufim (*Hin.*); Turk heulzap (*Bel.*); Apium (*Ja.*); Carappa (*Mal.*); Schirik, Haskasch (*Pe.*); Apagnum (*Sa.*); Apini (*Tam. Tel*); Madjun (*Tu.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Würt. WW. *A. Be. Br. C. Fi. M. Par. Pid. Sa. Sp T.*

Ein fester verhärteter Saft, welcher zum Theil auf Einschnitte aus den noch nicht reifen Kapseln des Mohns (Papaver somniferum und officinale) (*Hayne* VI. 40. *Blackw.* t. 482. 483. *Plenck* t. 417. Düss. off. Pfl. VII. t. 24. X. t. 3. *Lamk.* Ill. t. 451. *Bert.* Bild. I. 99. f. 1.) ausfließt, zum Theil aber auch durch Auspressen der zerstampften Pflanze gewonnen wird.

Man unterscheidet im Handel zwei Sörten Opium, das Türkische und das Indische. Das erstere besteht in runden, gleichartigen, trocknen, derben, schweren, undurchsichtigen, dunkelbraunen (röthlichbraunen) Kuchen von glänzendem Bruche, welche einen ekelerregenden, bittern, scharfen, etwas brennenden Geschmack und einen unangenehmen, ganz eigenthümlichen Geruch besitzen. Das zweite ist bei weitem nicht so consistent, bisweilen auch flüssig wie Pech und stets zähe. Es hat eine weit dunklere Farbe, einen ekelhafteren, weniger bittern Geschmack und einen etwas brenzlichen Geruch.

Es ist weit weniger geschätzt und weniger theuer als das andere.

Ungeachtet man sich seit einigen Jahren viel mit Untersuchung der chemischen Zusammensezzung des Opiums beschäftigt hat, so scheint es doch, als sey man noch zu keinem vollständigen Resultate gekommen; wenigstens bleiben wohl noch manche Bestandtheile darin zu entdecken, deren Gegenwart man bis jezt nur vermuthet. Die wichtigsten der bis jezt bekannten sind die Narcotine, Narcotin, Opian und ein organisches Alkali, welches Serturner entdeckte, die Morphine oder das Morphin, Morphium, welches sich darin mit einer ebenfalls eigenthümlichen Säure, der Mekonsäure, Mohnsäure, vorfindet.

Man hat viel über die Wirkung des Opiums gestritten; Manche halten es für ein kräftiges Reizmittel, Andere für ein unmittelbar beruhigendes, nie reizendes Mittel. Das Wahre ist, daß es in einer bestimmten Gabe, welche für jedes Individuum verschieden ist, eine reizende Wirkung hervorbringt; in stärkerer Gabe aber beruhigend wirkt, geschehe dieß nun durch einfache Revulsion oder durch unmittelbare Einwirkung auf das Nervensystem, was noch ein Räthsel ist; und daß es in noch höherer Gabe endlich Vergiftung zu Wege bringt. Die Perser, Türken, Chinesen. Syrier, Malaien, welche große Mengen davon auf einmal verzehren, empfinden davon ähnliche Wirkungen, als die Liebhaber geistiger Getränke in unsern Gegenden.

Da das Opium oft mit fremden Stoffen verunreinigt ist, so schreiben mehrere Pharmacopöen (Ams. An. Du. Gal. *Sw.*) eine Reinigung desselben vor. Einige (Ams. An. et Gal.) lassen es in kochendem Wasser erweichen, den Brei durch Leinwand drücken und es dann bis zur erforderlichen Consistenz abdampfen. Die übrigen (Du. *Sw.*) lassen es in Weingeist auflösen, die Flüssigkeit filtriren, destilliren, um den Alcohol zu trennen, und sie dann gehörig abdampfen. *Fi. u. T.* lassen, außer dem letztangegebenen Verfahren noch den Satz mit Regenwasser digeriren ꝛc. Das auf diese Weise gereinigte Opium führt den Namen *Opium depuratum s. colatum*, *Extractum Opii siccum*. Ehedem nannte man es rohes Opium (*Opium brutum s. crudum*), Opium brut ou cru (*Gal.*).

§. 1. Präparate, welche nur einen Theil der Bestandtheile des Opiums mit oder ohne das zu ihrer Ausziehung bereitete Menstruum enthalten.

A. Auszug durch Destillation.

Aqua Opii. (B*. Bor4. Sax. *Su*. Vm.*)

℞. Opii crudi . . . partem unam.
Aquae communis partes decem.
Destillet liquidi pars dimidia. (B*. Sax.)

Bor4. Opii puri unciam unam, Aquae fontanae quantum satis ut destillando unciae sex obtineantur; — *Sw*.* destillare jubet partes sex mixturae ex Opii parte una et duodecim Aquae; — *Vm.* Opium in Aquae partibus sex dissolvere et liquorem ad siccum usque destillare.

Man kennt noch nicht die Zusammensezzung dieses destillirten Wassers, in welchem man das sogenannte giftige oder betäubende Princip des Opiums sucht und welches nach manchen Schriftstellern mit mächtigen narkotischen Kräften begabt seyn soll, das aber wahrscheinlich nicht viel Arzneikräfte besitzt. — Gabe, zwei bis sechs Drachmen mit Zuckersyrup.

B. Auszug durch Essigsäure.

Acetum Opii s. opiaceum, Tinctura Opii acetosa. (*Vm.*)

℞. Opii concisi . . partem unam.
Alcoholis . . . . partes sex.

Macera per horas viginti quatuor in balneo aquae tepido. Adde deinde

Aceti albi . . . . partes sex.

Stent in maceratione frigida per plures dies; tum colata cum expressione filtrentur.

Guttae nigrae, Essentia nigra anglica. (Am. B*. GalP. *C. Pal. Vm.*)

℞. Opii . . . . . semilibram.
Aceti Vini . . . octarios tres.
Nucis moschatae contusae sesquiunciam.
Croci . . . . . semunciam.

Coque ad aptam consistentiam usque et adde

Sacchari albi . uncias quatuor.
Fermenti Cerevisiae unciam unam.

Stent in digestione per septem septimanas, tunc aëri exponentur, donec syrupus sit perfectus, qui colatus in lagenas infundatur addito Sacchari pauxillo. (Am. B*. GalP. *C.*)

Vm. miscere jubet Opii partes sex, Sacchari albi tres, Nucis moschatae unam cum dimidia, Croci unam et Aceti Pomorum quadraginta octo, addere Fermenti Cerevisiae partem unam, infundere in vas planum et tectum et mixturam actioni aëris sicci relinquere, donec liquor supernatans syrupi consistentiam acquisiverit, tum decanthatum servare.

Dieses bei den Engländern unter dem Namen *black drops* oder *quaker's black drops* sehr berühmte Präparat verdankt seine Wirkung wahrscheinlich dem während der Operation gebildeten essigsauren Morphin.

Man findet schon etwas Aehnliches in dem Formular der Republik Genua (1791) unter dem Namen *Aethiops vegetabilis* (*Opium torrefactum, Pulvis stagnoticus. Fi.*). ℞. Opii quantum vis; crucibulo vitreato immittatur; sub agitatione adspergatur pluries vinum album; refrigefactum et pulveratum comburatur simulque denuo humectetur vino; ad dimidium pondus redacto addatur acetum acerrimum, dein siccatur massa. Es mußte etwas Morphin frei werden, welches sich endlich mit der Essigsäure verband.

Extractum Opii acetosum. (*Pie.*)

℞. Opii concisi . . unciam unam.
Aceti destillati octarium unum.

Digere per horas quadraginta octo ex arenae balneo, subinde agitando; decanthata et filtrata ad massae pilularis consistentiam evaporent.

Laudanum de Lalouette. (*Pie.*)

℞. Extracti Opii acetosi drachmas sex.
Vini Hispanici . uncias decem.
Aquae Vitae . . . uncias duas.

Eine Drachme der Auflösung enthält vier Gran Extract.

Laudanum nepentes Quercetani s. opiatum. (*Fi. T.*)

℞. Opii concisi . . . uncias duas.
Aceti . . . . . libras duas.

Digere et cola pluries ad extractionem usque; liquores commixtos ad extracti consistentiam consume. Tunc recipe

Extracti hujus . . uncias duas.
— Croci . . unciam unam.
Oculorum Cancri praep. drachmas duas.
Boli albae porph. drachmam unam.

Fiat pasta, quae evaporatorii vel aëris ope evaporet. (*T.*)

Fi. Oculorum Cancri drachmas sex.

Mixtura Sylvii. (*Pie.*)

℞. Opii . . . . . grana duo.
Aceti destillati . . . semunciam.
Aquae Plantaginis . uncias sex.
Syrupi Papaveris albi unciam unam.

Bei Blutspeien mit Krämpfen empfohlen. — Löffelweise.

Collutorium antiodontalgicum. (B*.)

℞. Radicis Ptarmicae drachmas duas.
Salis Ammoniaci drachmam unam.
Opii puri . . . . grana duo.
Aquae Salviae destillatae,
Aceti, singulorum uncias duas.

Post unam horam digestionis in balneo aquae cola. — Von Mayr vorgeschlagen.

Topicum leniens s. sedativum. (*Bo.*)

℞. Foliorum Hyoscyami,
Petalorum Rhoeados, singulorum unciam unam.
Opii in Aceti sufficiente quantitate soluti . . . . . grana sex.

Contunde simul ut fiat pasta. — Gegen heftigen Kopfschmerz auf den Kopf zu schlagen.

C. Auszug durch Wein.

Tinctura Opii vinosa s. simplex s. thebaica genuina. (Ams. Bel. D. Han. Hass. Li. Suec. *Pid. Sw. Vm.*)

℞. Opii . . . . partem unam.
Vini Hispanici partes duodecim.

Post tres dies filtra. (D.)

Vm. Vinum Maderanum et infusionem per mensem; — Hass. *Pid.* et *Sw.* Opii partem unam, Vini Hispanici octo et digestionem blando calore per unum vel duos dies; — Suec. Opii partem unam, Vini albi sex et octo dies frigidae macerationis.

℞. Opii . . . . . partem unam.
Vini Malacensis . . partes octo.

Aquae Vitae (0,907) partes duas.
Post duos dies digestionis cola. (Ams. Bel. Han.)

Li. Opii uncias duas, Aquae Vitae quatuor et Vini albi libram unam.

Vinum opiaceum. (Gal M.)

℞. Tincturae Opii . . grana decem.
Vini rubri . . . unciam unam.
Misce.

Fomentatio leniens. (*Pie.*)

℞. Opii concisi . . unciam unam.
Vini rubri vel albi sesquioctarium.
Coquendo dimidium consume. — Bei gichtischen Schmerzen, Rheumatismen und Koliken von Nutzen. — Man tränkt Stücke Flanell damit.

Extractum Opii vinosum, Laudanum opiatum. (Gal. Hass. *Pid. T. Vm.*)

℞. Opii crudi . . . quantum vis.
Vini albi . . quantum sufficit.
Digere in balneo aquae, cola fortiter exprimendo, sepone, decantha et balnei aquae ope ad extracti consistentiam consume. (Gal.)

Hass. et *Pid.* Vini duodecuplum Opii pondus indicant.

℞. Opii in frustula minora concisi partem unam.
Vini Maderani . . . partes sex.
Macera frigide per plures dies et cola exprimendo; macerationem residui repete cum aequali quantitate novi Vini et colaturas commixtas blando calore, continuè agitando, consume. (*Vm.*)

T. Opii uncias quatuor, Vini albi generosi libras duas, post dies duos digestionis loco tepido filtra per telam cum expressione, faeces digere cum dimidia Vini antea adhibiti parte; liquores commixti et sepositione clarificati ad extracti consistentiam evaporent.

Dieses Extract enthält mehr Narcotin und Harz, als das wässerige Extract, ausserdem enthält es aber auch noch alle Elemente des Weins, den Alcohol ausgenommen, wodurch es noch schlechter wird; denn da die Quantität dieser Stoffe je nach der Weinsorte verschieden und stets unbekannt ist, so kann man nicht genau wissen, wie viel Opium jedesmal in einer bestimmten Dosis Extract enthalten ist.

Syrupus opiatus s. Opii vinosus. (Bor. Pol. *Sw. Vm.*)

℞. Opii . . . . . partem unam.
Vini Maderani partes duodecim.
Infunde per dies duos, blando calore, cola fortiter exprimendo et adde
Sacchari albi . . partes viginti.
Solve blandi caloris ope et commisce cum
Syrupi communis
partibus centum sexaginta.
Serva. (*Vm.*)

℞. Extracti Opii
grana viginti quinque.
Vini Malacensis . unciam unam.
Dissolve et adde
Syrupi Liquiritiae
uncias viginti quatuor.
Serva. (Bor.)

Pol. loco syrupi liquiritiae illum Althaeae, et *Sw.* Syrupum Sacchari.

Tinctura vinosa Opii et aromatica, Vinum Opii, Vinum aromaticum opiaceum, Vinum aromo-opiaceum. (Am. Ed. Lon. *Br. C.*)

℞. Extracti Opii . . unciam unam.
Cinnamomi contusi,
Caryophyllorum contusorum,
singulorum drachmam unam.
Vini albi Hispanici uncias sedecim.
Macera per octo dies et cola. (Ed. Lon. *C.*)

Am. Opii uncias duas; — Br. Opii uncias duas, Cinnamomi, Caryophyllorum, singulorum drachmam unam et Vini libram unam.

℞. Extracti Opii pulverati
uncias duas.
Aquae Cinnamomi uncias decem.
Alcoholis . . . . uncias duas.
Vini albi . . . uncias quatuor.
Digere, subinde agitando, per sex dies et filtra. (*Br.*)

Laudanum liquidum s. crocatum s. compositum, Tinctura Opii vinosa crocata. (Ful. R. Sax.)

℞. Opii pulverati . partem unam.
Croci . . . partem dimidiam.
Vini Hispanici . partes novem.
Stent in maceratione per tres dies, leni calore et colentur. — Eine Drachme enthält ungefähr zehen Gran Opium.

Vinum Opii crocatum, Elixir Papaveris, Essentia Papaveris. (Fenn. Suec. *Vm.*)

℞. Opii,
Croci,
singulorum drachmas quinque.
Succi Liquiritiae sesquiunciam.
Vini Maderani . uncias triginta.
Digere frigidè, decantha et filtra. (*Vm.*)

Fenn. Opii, Croci, singulorum scrupulos quinque, Succi Liquiritiae semunciam et Vini Hispanici uncias decem; — Suec. Succi Liquiritiae, Croci, Opii, singulorum scrupulos quinque et Vini uncias decem.

Laudanum liquidum Sydenhami s. compositum, Tinctura laudanum s. anodyna s. Opii crocata s. vinosa Opii Sydenhami, Vinum Opii aromaticum s. crocato-opiatum s. Opii compositum s. paregoricum. (Ams. B. Bor. Bor. D.

Fer. Gal. Han. HassP. His. Li. Pal. Sar. *Ca. Fi. Sw. T. Vm.*)

℞. Opii . . . . . unciam unam.
Croci . . . . . semunciam.
Cinnamomi . drachmam unam.
Vini Malacensis . uncias novem.

Post tres dies digestionis cola. (Li.)

— Eine Drachme enthält ungefähr zehen Gran Opium.

℞. Opii . . . . . uncias duas.
Croci . . . . . unciam unam.
Cinnamomi . . drachmas duas.
Alcoholis . . . . uncias tres.
Vini Hispanici . libram unam.

Post aliquot dies digestionis exprime et filtra. (Fer. *Fi.*)

℞. Opii concisi . . . uncias duas.
Croci . . . . . unciam unam.
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
singulorum drachmam unam.
Vini Malacensis . libram unam.

Digere leni calore per dies quatuordecim, subinde agitando; cola fortiter exprimendo et filtra. (Ams. B. Ba. Br. Gal. His. Pal. Sax. Wir. *Ca. Sp. Sw.*)

D. Croci semunciam; — HassP. Croci drachmas sex et Vinum Hispanicum; — Bor. Han. et Pal. Opii uncias quatuor, Croci sesquiunciam, Caryophyllorum, Cinnamomi (Cassiae cinnamomeae), singulorum drachmas duas, Vini Malacensis libras duas; — Bor. Vini uncias triginta octo. Pond. sp. 1,045 — 1,055.

Sar. Opii semunciam, Croci drachmas duas, Cinnamomi semidrachmam, Caryophyllorum tantidem et Vini Maderani uncias quatuor cum dimidia.

Letztere Formel enthält demnach etwas mehr Opium, als die übrigen, von denen zwanzig Tropfen, d. h. fünfzehen Gran, einen Gran Opium enthalten.

℞. Cinnamomi,
Caryophyllorum,
singulorum partem unam.
Croci . . . . . partes octo.
Vini Maderani partes centum nonaginta duas.

Infunde per horas viginti quatuor in balneo aquae tepido, cola exprimendo, in colatura infunde frigide et absque agitatione
Opii . . . . . partes sedecim.

Post dies decem vel quatuordecim decantha et filtra. (*Vm.*)

℞. Croci . . . . . semunciam.
Cinnamomi pulverati,
Caryophyllorum,
singulorum drachmam unam.
Vini Hispanici . . uncias octo.

Digere, subinde agitando, per tres dies; in colatura dissolve
Opii depurati . . unciam unam.

Post horas viginti quatuor digestionis filtra. Residuo aromatico infunde
Vini Hispanici . uncias quatuor.

Post sufficientem digestionem fortiter exprime; in colatura digere residuum operationis et post filtrationem utrumque vinum commisce. (An. Bel.)

℞. Opii puri . . . uncias quatuor.

Digere evaporatorii calore per tres dies in Alcoholis diluti 20° B.; interea digere
Croci . . . . . sesquiunciam.
Cinnamomi . . . semunciam
in
Alcoholis 20° B. . unciis decem.

Digere totum per tres dies, filtra per linteum exprimendo, deinde per chartam etc. (*T.*)

Es ist Jedermann bekannt, welchen Ruf dieser Opiumwein genossen hat und noch genießt. Merkwürdig sind Sydenham's eigene Worte darüber: Hanc nostram praeparationem Laudani officinarum solido anteferendam virtutibus quidem non obcenseo, sed formam saltem commodiorem et majorem dosis certitudinem eidem antepono. Keiner der andern Erfinder neuer Präparate hat die Bescheidenheit dieses Englischen Arztes.

Cataplasma anodynum. (*Ca.*)

℞. Farinae Seminis Lini,
— Hordei,
singularum libram unam.
Decocti Capitum Papaveris
quantum sufficit.

Coque ad requisitam consistentiam et cataplasmati infunde
Laudani liquidi Sydenhami drachmam unam vel duas.

Bei Entzündungen mit heftigen Schmerzen.

Cataplasma ad cancrum. (Ful. *Vm.*)

℞. Pulpae Carotae radicum flavarum partes viginti quatuor.
Faeculae Cicutae viridis siccatae
partes quatuor.
Laudani liquidi Sydenhami
partem unam.

Contere in mortario. (*Vm.*)

℞. Roob Dauci . . libram unam.
Pulveris Cicutae . uncias duas.
Laudani liquidi Sydenhami
drachmas tres.

Commisce bene. (Ful.)

Als Verbesserungsmittel des Geruchs und um die Schmerzen bei offenem Krebs zu stillen, gepriesen.

Clyster sedativum. (*Sy.*)

℞. Laudani liquidi Sydenhami guttas quadraginta ad sexaginta.
Olei Olivarum vel Lini
uncias quatuor.

Misce agitando.

Linimentum narcoticum s. opiaceum. (*ParC. Ra.*)

℞. Laudani liquidi Sydenhami partem unam.
Olei Olivarum . . partes octo.
Commisce. (*Ra.*)

ParC. Laudani partem unam et Olei Amygdalarum dulcium sedecim.

Ceratum opiaceum. (*Ra.*)

℞. Laudani liquidi Sydenhami unciam unam.
Cerati Galeni . . libram unam.
Misce terendo.

Unguentum s. Pomatum opiaceum. (*Sm.*)

℞. Laudani liquidi Sydenhami drachmas duas ad quatuor.
Cerati Galeni . . uncias duas.
Farinae Tritici quantum sufficit ad spissum reddendam miscellam.

Man bringt diese Salbe mittelst feiner Leinwand auf Brandflecken. — Ein sehr starker wässeriger Aufguß des Opiums würde vorzuziehen seyn.

Linimentum narcoticum. (*Ra.*)

℞. Laudani liquidi Sydenhami partem unam.
Balsami tranquilli partes triginta duas.
Commisce bene.

℞. Laudani liquidi . partem unam.
Balsami tranquilli partes quatuor.
— Fioravanti . partes octo.
Misce exacte.

Linimentum sedans, Pomatum ad haemorrhoides s. antihaemorrhoidale. (*Pie. Sm.*)

℞. Laudani liquidi Sydenhami drachmas quatuor.
Unguenti populei . uncias duas.
Vitellorum Ovorum recentium no. 2.
Tritura simul. (*Sm.*)

℞. Unguenti populei . semunciam.
Opii crudi in Vino albo dissoluti grana quindecim.
Concharum praeparatarum semidrachmam.
Vitelli Ovi . . . . . unius.
Olei Liliorum quantum sufficit.
Misce bene. (*Pie.*)

Besonders zur Stillung von Hämorrhoidalschmerzen empfohlen.

Unguentum antiophthalmicum. (*Pie. Sm.*)

℞. Laudani liquidi Sydenhami drachmam unam.
Albuminum Ovorum recentium no. 2.
Aquae Rosarum,
Aquae Plantaginis, singularum quantum sufficit.
Subige bene.

Linimentum opiato-camphoratum s. opiaceum camphoratum. (*Ra.*)

℞. Laudani liquidi Sydenhami semunciam.
Camphorae . . drachmas duas.
Olei Amygdalarum dulcium uncias duas.

Linimentum anodynum. (Ful. *Ca. Pie.*)

℞. Laudani liquidi Sydenhami,
Camphorae,
singulorum partem unam.
Unguenti Althaeae partes sedecim.
Misce triturando.

Linimentum antispasmodicum. (Ham.)

℞. Laudani liquidi Sydenhami,
Tincturae Cantharidum,
singulorum drachmas duas.
Camphorae . drachmam unam.
Olei Hyoscyami . unciam unam.

Linimentum opiaceum et saponatum s. opiato-saponaceum. (Ful. *Ra.*)

℞. Laudani liquidi Sydenhami drachmam unam ad duas.
Saponis albi . . . semunciam.
Olei Olivarum uncias quatuor.
Commisce. (*Ra.*)

℞. Balsami Saponis . uncias duas.
Laudani liquidi drachmam unam.
Misce triturando. (Ful.)

Als beruhigend, lindernd und auflösend empfohlen.

Pilulae lenientes s. sedantes et bechicae. (*Pie.*)

℞. Laudani liquidi Sydenhami guttas viginti.
Gummi Ammoniaci scrupulum unum.
Fiant pilulae quatuor. — Gabe, zwei Stück und mehr.

Pilulae narcoticae. (*Pie.*)

℞. Sacchari crystallisati unciam unam.
Cinnamomi . . drachmas duas.
Piperis,
Laudani liquidi Sydenhami,
singulorum drachmam unam.
Coriandri . . . scrupulos duos.
Croci . . . . semidrachmam.
Moschi . . . . semiscrupulum.
Syrupi Capitum Paveris quantum sufficit.

Diese Pillen gelten als beruhigend und schweißtreibend — Gabe, von einem halben Scrupel bis zur halben Drachme.

Julapium lenieus s. sedativum. (*Bo. Pie. Ra.*)

℞. Laudani liquidi Sydenhami guttas duodecim.
Aquae . . . . unciam unam.
Syrupi . . . . drachmas duas.
Auf eine einzige Gabe. (*Ra.*)

℞. Julapii gummosi uncias quatuor.
Laudani liquidi semidrachmam.
Misce bene. (*Ra.*)

℞. Syrupi Limonum unciam unam.
Laudani liquidi guttas quindecim ad viginti.
Tincturae Ipecacuanhae aquosae cochlear majus unum vel duo.
a
Aquae Florum Aurantiorum uncias duas.
Misce sedulo. (*Bo. Pie.*)

Clyster sedativum. (*Sy.*)

℞. Amyli . . . sesquidrachmam.
Adde sensim, continue triturando,
Aquae bullientis . . semilibram.
Coque leviter et colaturae adde
Laudani liquidi Sydenhami drachmam unam.

Injectio leniens s. deprimens. (*Ra.*)

℞. Laudani liquidi Sydenhami drachmam unam.
Decocti Seminis Lini libram unam.
Commisce.

Mixtura anodyna, Haustus anodynus. (Gen. *Bo. Pie. Sm.*)

℞. Laudani liquidi Sydenhami scrupulos duos.
Aquae Cinnamomi simplicis uncias sex.
Misce. (*Pie. Sm.*)

℞. Laudani liquidi drachmam unam.
Aquae Cinnamomi hordeatae uncias sex.
Syrupi Capitum Papaveris unciam unam.
Misce. (*Bo.*)

Barthez verschrieb diese Mixtur bei sogenanntem krampfhaften Magenschmerz. — Gabe, ein Eßlöffel, vor der Mahlzeit zu nehmen.

℞. Laudani liquidi guttas octodecim.
Pulveris relaxantis . grana tria.
Aquae fontanae . unciam unam.
Syrupi Limonum drachmam unam.
Misce sedulo. (Gen.)

Mixtura opiacea. (*Sa.*)

℞. Laudani liquidi Sydenhami semidrachmam.
Aquae Menthae piperitae uncias sex.
Syrupi Sacchari unciam unam.
Löffelweise.

Potio paregorica. (*Sa.*)

℞. Laudani liquidi Sydenhami guttas duodecim.
Aquae Rhoeados unciam unam.
Syrupi Capitum Papaveris sesquiunciam.
Auf zwei oder drei Mal zu nehmen.

Haustus tonicus adstringens, Potio tonica adstringens. (*B.*)

℞. Radicis Colombo drachmas duas.
Aquae bullientis quantum sufficit ad infusionem unciarum octo, quarum colaturae adde
Laudani liquidi Sydenhami semidrachmam.
Aetheris sulphurici guttas viginti.
Bei Verdauungsbeschwerden allmälig zu nehmen

℞. Cascarillae,
Colombo,
singulorum drachmas duas,
Aquae bullientis quantum sufficit ad unciarum septem infusionem; colaturae adde
Laudani liquidi Sydenhami,
Aetheris sulphurici,
singulorum guttas viginti.
Bei chronischer Diarrhoe allmälig zu nehmen.

Potio antihaemorrhagica. (*Sm.*)

℞. Laudani liquidi Sydenhami guttas quindecim.
Tincturae Cinnamomi drachmas quatuor ad unciam unam.
Syrupi Consolidae majoris uncias duas.
Aquae communis uncias quatuor.
Gegen Mutterblutflüsse von Atonie. — Gabe, einen Löffel alle Viertel-, alle zwei oder alle Stunden, je nach der Beschaffenheit des Falls.

Potio hypnotica. (*Pie.*)

℞. Laudani liquidi Sydenhami guttas quinque.
Syrupi Nymphaeae uncias duas.
Aquae Florum Tiliae,
— — Aurantii,
singulorum uncias duas.
Auf zwei Mal zu nehmen.

Aqua aromatica cum Opio, Potio leniens. (*Au. Pie.*)

℞. Laudani liquidi Sydenhami guttas duodecim.
Syrupi Capitum Papaveris unciam unam.
Aquae Lactucae . sesquiunciam.
— Florum Aurantiorum semiunciam.
Auf zwei Mal zu nehmen. (*Pie.*)

℞. Aquae Cinnamomi uncium unam.
— Melissae . . uncias duas.
Tincturae Castorei guttas viginti.
Laudani liquidi Sydenhami
guttas decem.
Syrupi Opii . . . semunciam.
Löffelweise. — Pressavin rühmte diesen Trank besonders bei Mutterkolik. (*Au.*)

Potio carminativa. (*Sm.*)

℞. Laudani liquidi Sydenhami
guttas decem.
Aquae Cinnamomi simplicis
unciam unam.
Emulsionis simplicis uncias sex.
Von de Haen bei Windkolik empfohlen. — Gabe, ein Löffel alle Viertelstunden.

Looch s. Linctus leniens. (*Ra.*)

℞. Laudani liquidi Sydenhami
guttas quindecim ad triginta.
Aquae Florum Aurantiorum
drachmas duas.
Looch simplicis uncias quinque.
Löffelweise, in größern oder geringern Zwischenräumen und nöthigenfalls auf einmal.

Looch contra tussim. (*Sa.*)

℞. Laudani liquidi Sydenhami
semidrachmam.
Olei Amygdalarum dulcium
unciam unam.
Vitellorum Ovi drachmas duas.
Tritura in mortario vitreo et mixtis adde
Syrupi Althaeae . . uncias tres.
Löffelweise zu nehmen.

Mixtura sedativo - narcotica pectoralis, Potio pectoralis. (*B.*)

℞. Emulsionis gummosae uncias sex.
Laudani liquidi Sydenhami
guttas quindecim.
Syrupi Papaveris,
— Althaeae,
singulorum unciam unam.
Allmälig bei convulsivischem Husten zu nehmen.

Emulsio narcotica. (*Pie.*)

℞. Seminum quatuor frigidorum majorum . . . . unciam unam.
Tere sensim affundendo
Aquae fontanae . . uncias sex.
Emulsioni adde
Syrupi Papaveris
drachmas quatuor ad sex.
Laudani liquidi Sydenhami
guttas decem ad duodecim.
Abends zu nehmen.

Potio antiperiodica. (*Au. Pie.*)

℞. Laudani liquidi Sydenhami,
Aetheris sulphurici,
singulorum guttas duodecim.
Aquae Florum Aurantiorum,
— — Tiliae,
singulorum semunciam.
Dieser Trank soll, vor dem Anfall des Wechselfiebers gegeben, diesen gewöhnlich verhüten. (*Pie.*)

℞. Laudani liquidi Sydenhami
guttas quindecim.
Tincturae Ipecacuanhae
guttas quadraginta.
Liquoris Ammonii acetici
semunciam.
Aquae Rosarum . unciam unam.
Sacchari albi . drachmas duas.
Gabe, ein Kaffeelöffel. — Wytt rühmte diese Potion bei periodischen Kopfschmerzen von Gastricismus oder Unterdrückung eines Blutflusses.

Mixtura antilethargica. (*Ca. Pie.*)

℞. Laudani liquidi Sydenhami
semidrachmam.
Aetheris sulphurici drachmas sex.
Aquae Menthae piperitae
uncias sex.
Viertelstündlich kaffeelöffelweise.

Mixtura opiato - aetherea. (*Au.*)

℞. Laudani liquidi Sydenhami
guttas viginti.
Liquoris Hoffmanni
drachmam unam.
Aquae Menthae uncias quatuor.
Gabe, ein Löffel alle fünf bis sechs Minuten bis zum Aufhören des Krampfes, bei eingeklemmtem Bruche. — Von Van Gescher empfohlen.

Mixtura sedativa. (*Sw.*)

℞. Laudani liquidi Sydenhami
semidrachmam.
Aetheris sulphurici drachmas duas.
Aquae Menthae piperitae
uncias sex.
— Bryoniae compositae
uncias duas.
Syrupi Papaveris unciam unam.
Gabe, ein halber bis ein Löffel alle Stunden.

Potio leniens s. deprimens. (*Ra.*)

℞. Laudani liquidi Sydenhami,
Aetheris sulphurici,
singulorum guttas quindecim.
Aquae Florum Aurantiorum
uncias tres.
Infusi Florum Tiliae
uncias quinque.
Syrupi Capilli Veneris
uncias duas.
Löffelweise zu nehmen.

Mixtura opiato-antidysenterica, Potio antidysenterica. (*Au.*)

℞. Aquae Menthae piperitae uncias tres.
Aetheris sulphurici guttas sedecim.
Laudani liquidi Sydenhami guttas triginta.
Olei essentialis Chamomillae guttas sex.
Sacchari albi . drachmas duas.
Gummi Arabici drachmam unam.
Extracti Cascarillae scrupulum unum.
Catechu . . . . grana sex.
Pulveris Cinnamomi semidrachmam.

Gabe, alle Stunden ein Löffel. — Von Bucking gerühmt.

D. Auszug durch Alcohol.

Tinctura Opii s. sedativa s. Opii simplex s. thebaica s. alcoholica s. extracti Opii s. officinalis Opii spirituosa, Laudanum liquidum, Alcohol opiatus s. cum Opio. (Am. An. BorC Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Lon. LonN. Lus. RC. *Br. C. Fi. Sw. Vm. T.*

℞. Opii puri . . . unciam unam.
Alcoholis (15°) . . uncias octo.

Triturata in mortario marmoreo digere per horas viginti quatuor, subinde agitando; decantha liquorem limpidum et sedimento superfunde Alcoholis (15°) uncias quatuor; post duos dies digestionis cola et colaturas mixtas filtra. (An.)

RC. Opii unciam unam, Alcoholis diluti libram unam, solve terendo et digere per dies septem.

℞. Extracti Opii aquosi partem unam.
Alcoholis (22°) partes duodecim.

Dissolve in lagena bene obturata et cola. (*Gal.*)

GalM Opii partem unam et Alcoholis undecim; — D. et DD. Opii unam et Alcoholis quadraginta octo; — *Br.* et *Vm.* Opii unam et octo Alcoholis; — Lon. LonN. Opii uncias duas cum dimidia et Alcoholis (0,930) octarios duos; — Am Ed. *Br. C.* et *Sw.* Opii unciam unam et Alcoholis (0,935) libram unam; — Du. Opii drachmas decem et Alcoholis (0,930) octarium unum; *Fi.* Extracti Opii sicci drachmas decem, Alcoholis 25° uncias sedecim; — *T.* Extracti sicci unciam unam, Alcoholis diluti 22° B. libram unam.

℞. Opii purificati drachmam unam.
Alcoholis . . . . libram unam.
Aquae . . . . . libras duas.

Dissolve et filtra. (Lus.)

BorC. Opii semunciam, Alcoholis et Aquae, singulorum uncias tres; — Fer. Extracti Opii sicci drachmas decem, Alcoholis uncias decem et Aquae sex; — Bor4. Opii uncias quatuor, Spiritus Vini rectificati, Aquae destillatae, singulorum uncias novemdecim, digere, donec opium quantum fieri potest, solutum sit; tum quantum ponderis evaporatione amiserit, Spiritum Vini rectificatum addendo restitue, exprime et post subsidentiam filtra. P. spec. = 0,955 — 0,965.

Der Opiumgehalt dieser Tinctur ist je nach den verschiedenen Formeln sehr verschieden; nach der von Gal. enthalten vier und zwanzig Tropfen, welche = zwölf Gran, einen Gran Opium.

Extractum Opii alcoholicum. (An. B. Fer. GalM. Lus.)

℞. Opii crudi . . . quantum vis.
Alcoholis (25°) . quantum sufficit ad dissolutionem succi; filtra liquorem et Aquae destillatae quantitatem sufficientem affundendo praecipita; denuo filtrata blando igne ad extracti consistentiam evaporent. (An.)

℞. Opii . . . . . libram unam.
Alcoholis . . . quantum sufficit ad dissolvendum; digere in vase clauso, leni igne, subinde agitando; filtra et tincturam destillationi subjice, donec extracti consistentiam acceperit. (Lus.)

℞. Opii crudi . . . uncias duas.
Alcoholis . . uncias quatuor.

Digere, blando calore, per duos dies, cola exprimendo et filtra; residuum cum Aquae unciis quatuor tritum cola itidem exprimendo; filtra et liquores commixtos vaporatione ad extracti consistentiam consume. (B.)

℞. Opii concisi . . partem unam.
Aquae purae . . . partes duas.

Stent per horas duodecim in infusione, in vase clauso, subinde agitata et fortiter expressa colentur; residuum infunde in Aquae parte una, tunc in Alcoholis (12°) parte una, sepone, cola et liquores commixtos in balneo aquae ad extracti consistentiam usque consume. (Fer. GalM.)

Dieses Extract wird heutzutage fast nicht mehr angewendet; es enthält mehr Narcotin und Harz als das mit kaltem Wasser bereitete.

Tinctura antispasmodica Christiani (Chretien). (*Bo. Pie.*)

℞. Opii . grana quadraginta octo.
Aquae Vitae (20°) uncias quatuor.

Macera per tres vel quatuor dies.

Bei Mangel oder beschwerlicher monatlicher Reinigung, sogenannter krampfhafter

Strangurie, Hysterie, nervöser Kolik, rheumatischen Schmerzen, Cardialgie und Wechselfiebern empfohlen. In Einreibungen zu einer Unze täglich zwei oder drei Mal. Man wendet sie bald trüb bald filtrirt an.

Laudanum opiatum Rousseau s. Rousseavii, Solutio Opii alcoholisata, Gutae abbatis Rousseau, Vinum opiatum per fermentationem praeparatum. (An. Gal. *Ca. T. Vm.*)

℞. Mellis albi . . uncias duodecim.
Aquae calidae . . libras tres.
Melle liquato, liquorem ad locum calidum repone; simulac fermentare coepit, adde
Opii electi . . uncias quatuor antea dissoluti in
Aquae . . . unciis duodecim.

Stent fermentationi subjecta per mensem in loco temperatura 24° R. gaudente, cola deinde et filtra liquorem, qui ad remanentiam unciarum decem evaporet; cola deinde denuo, adde Alcoholis (20°) uncias quatuor cum dimidia et serva. (Gal. *Ca.*)

T. Aquae calidae libras duas, Mellis optimi uncias sex, Fermenti Cerevisiae scrupulos duos, Extracti Opii uncias duas in Aquae calidae unciis sex soluti; post triginta vel quadraginta dierum fermentationem evaporent ad remanentiam unciarum sex, quae colata misce exacte cum Alcoholis 34° B. unciis duabus.

℞. Extracti Opii . . partem unam.
Aquae Vitae hydromellatae
partes octo.

Misce et post nonnullos dies sepositionis filtra. (*Vm.*)

Das Rousseau'sche Laudanum ist concentrirter als das Sydenham'sche. Zwanzig Tropfen oder zwei und zwanzig Gran enthalten drei Gran Opium und sieben Tropfen beinahe einen Gran. Man kann auf dasselbe das anwenden, was weiter unten von den nach Deyeux's und Langelot's Verfahren bereiteten Opiumextracten gesagt werden wird. Doch muß man die Formel von Van Mons ausnehmen, welche ganz als einfache Opiumtinctur zu betrachten ist. Aber ob sie gleich den Fehler nicht hat, daß die durch die Gährung entstehenden Veränderungen unberechenbar sind, so hat sie doch den, daß sie einen Alcohol von unbestimmter und unendlich veränderlicher Stärke vorschreibt. Man muß sie daher verwerfen, und es wäre klug, dieß mit den eigentlich sogenannten Rousseauschen Tropfen ebenfalls zu thun.

Cataplasma sedans s. sedativum. (*Sw.*)

℞. Cataplasmatis emollientis
quantum sufficit.
Adde
Tincturae Opii
unciam unam vel duas
et commisce bene.

Injectio sedativa s. sedans. (*Sw.*)

℞. Tincturae Opii
guttas quinquaginta.
Aquae destillatae uncias quatuor.

In gewissen Fällen von chronischem Tripper empfohlen.

Solutio hypnotica s. sedativa. (*Sw.*)

℞. Extracti Opii aquosi
drachmam unam.
Aquae destillatae
. drachmas quatuor.
Alcoholis . . semidrachmam.
Misce triturando.

Vier oder fünf Tropfen enthalten einen Gran Opium — Mit Unrecht setzt Swediaur dieses Präparat den schwarzen Tropfen der Engländer an die Seite; diese enthalten, wie aus der Zusammensetzung zu ersehen ist, essigsaures Morphium.

Clyster s. Enema anodynum s. sedativum. (RC. *E. Sa. Sw.*)

℞. Tincturae Opii guttas quadraginta.
Infusi Seminum Lini uncias sex.
Adduntur si necesse est, unciae duae Olei Olivarum. (*Sa.*)

E. Tincturae drachmam unam et Infusionis Seminum Lini uncias sex; — RC. Clysteris Amyli *) vel Infusi Seminum Lini sine Glyzyrrhiza uncias quatuor, Tincturae Opii guttas quinquaginta.

℞. Amyli . . . sesquidrachmam.
Aquae bullientis . . uncias sex.
Dissolve et adde
Tincturae Opii drachmam unam.
Misce. (*Sw.*)

Gargarisma opiaceum. (GalM. *Au.*)

℞. Tincturae Opii . partem unam.
Decocti Radicis Althaeae
partes ducentas.
Misce. (GalM.)

Au. Tincturae drachmam unam et Aquae uncias decem. — Vogel hat dieses Gurgelwasser bei Bräune gerühmt.

Clyster antispasmodicum. (*Sw.*)

℞. Tincturae Opii
guttas quinque ad decem.
Infusi Valerianae . uncias tres.

*) Amyli semuncia, Aquae ferventis semilibra, Olei Lini vel Olivarum vel Butyri semuncia.

Für Kinder.

Syrupus alcoholicus Opii. (Suec.)

℞. Tincturae Opii . guttas sedecim.
Syrupi Sacchari . unciam unam.
Misce exacte.

Collutorium opiatum. (GalM.)

℞. Tincturae Opii . partem unam.
Syrupi Mellis . . partes viginti.

Collyrium anodynum. (Gal.)

℞. Laudani Rousseau . guttas sex.
Gummi Arabici . . semunciam.
Aquae Rosarum . . uncias duas.

Linimentum opiatum. (GalM.)

℞. Tincturae Opii partes quatuor.
Olei Olivarum . partes triginta.

Linimentum excitans. (*E.*)

℞. Olei Succini rectificati
drachmas duas.
— Olivarum . . semunciam.
Tincturae Opii drachmas duas.
Aquae Vitae . . . uncias duas.

Man macht damit bei Keuchhusten Einreibungen zwischen den Schultern.

Unguentum emolliens et sedans. (*B.*)

℞. Linimenti e Cetaceo uncias duas.
Tincturae Opii drachmam unam.

Morgens und Abends auf Hämorrhoidalgeschwülste einzureiben.

Fomentatio leniens s. sedans. (B*.)

℞. Tincturae Opii . partem unam.
Olei Succini rectificati partes duas.

Bei Gesichtsschmerz in Einreibungen nützlich befunden.

Potio sedans s. leniens. (*B. E.*)

℞. Tincturae Opii guttas quindecim ad viginti quinque.
Syrupi Papaveris drachmas duas.
Spiritus Cinnamomi
drachmam unam.
Aquae . . . . sesquiunciam.
Misce. (*E.*)

℞. Liquoris Hoffmanni drachmas tres.
Tincturae Opii guttas octoginta.
Aquae Cinnamomi . uncias sex.

Gabe, stündlich einen Löffel. (*E.*)

℞. Aetheris sulphurici drachmas duas.
Sacchari,
Gummi Arabici,
singulorum sesquidrachmam.
Tincturae Opii guttas sexaginta.
Aquae Cinnamomi . uncias duas.

Gabe, ein Kaffeelöffel voll. (*E.*)

℞. Infusi Rosarum . . uncias sex.
Tincturae Opii . guttas viginti.
Syrupi Corticum Aurantiorum
unciam unam.

Auf[illegible]mal, alle drei Stunden zu nehmen, bei sogenanntem passiven Blutspeien mit Husten. (B.)

Potio absorbens. (*E.*)

℞. Cretae praeparatae drachmas tres.
Sacchari,
Gummi Arabici,
singulorum sesquidrachmam.
Tincturae Opii guttas sexaginta.
— Kino drachmas duas.
Aquae Menthae . . uncias sex.

Gabe, alle zwei Stunden einen Löffel, bei Diarrhöe.

Haustus s. Mixtura s. Potio adstringens. (B.)

℞. Corticis Simarubae semunciam.
Aquae . . . quantum sufficit ad obtinendas decocti uncias octo.
Colaturae adde
Emulsionis gummosae uncias duas.
Tincturae Opii . guttas viginti.

Allmälig zu nehmen, bei Diarrhöe mit Atonie.

℞. Corticis Simarubae . semunciam.
Aquae . . . quantum sufficit ad obtinendas decocti uncias octo, quarum colaturae addantur
Tincturae Opii scrupulus unus.
Alcoholis . . . . uncia una.
Aquae Cinnamomi . semuncia.

Allmälig zu nehmen, in Fällen wo Atonie mit Torpor verbunden zu seyn scheint.

℞. Seminum Cannabis unciam unam.
Aquae . . . quantum sufficit ut colaturae libra una obtineatur, cui adde
Extracti Arnicae drachmam unam.
Catechu . . . scrupulum unum.
Syrupi Corticum Aurantiorum,
— Althaeae,
singulorum unciam unam.

Allmälig zu nehmen, bei Blutharnen und andern, wahrscheinlich passiven Blutflüssen.

℞. Corticis Simarubae . semunciam.
Ligni Quassiae drachmas duas.
Aquae . . . quantum sufficit ut uncias octo colaturae obtineas, quibus post semihoram ebullitionis addantur
Extracti Gentianae drachma una.
Tincturae Opii . semidrachma.

Gabe, vier Löffel, alle zwei Stunden, bei vermuthlich atonischer Ruhr und Diarrhöe.

Tinctura Opii simplex s. sedativa s. hypnotica s. thebaica s. alcoholica aromatica, Alcohol cum Opio aromaticum s. Opii dilutum, Laudanum liquidum. (Ba. Bor. Fenn. Ful. Gen. HassP. Pol. Sax. Suec. Wür. *Fi. Siv. T.*)

℞. Opii minutim concisi
partem unam.

Aquae Cinnamomi simplicis,
Alcoholis, singulorum partes tres.
Post solutionem cola. (Bor. HassP. Pol. Sax.) — Jede Drachme dieser Tinctur enthält zehen Gran Opium.

Penn. et Gen. Opii partem unam, Aquae Cinnamomi quinque et quinque Alcoholis; — Ba. Opii unam, Aquae Cinnamomi duas et quatuor Alcoholis; — Suec. Opii unam, Aquae Cinnamomi quatuor et sex Alcoholis; — *T.* Opii puri uncias tres, Aquae Cinnamomi lactiginosae uncias quindecim, Alcoholis diluti 24° B. uncias novem, digere per septimanam et filtra.

Sw. duas formulas indicat, nimirum: Opii drachmam unam, Alcoholis uncias decem et Aquae Cinnamomi uncias viginti; et: Opii uncias duas, Aquae Cinnamomi decem et sex Alcoholis. — Die erstere enthält einen Gran Opium auf die halbe Unze Tinctur; die andere, welche auch *Fi.* anführt, etwa vier auf die halbe Drachme.

℞. Opii purificati . semidrachmam.
Alcoholis concentrati
uncias decem.
Aquae Florum Chamomillae
uncias viginti.
Post sufficientem digestionem filtra. (Wür.)

℞. Opii . . . . . partem unam.
Aquae Florum Chamomillae
partes sex.
— Cinnamomi vinosae
partes duas.
Post tres dies digestionis filtra.

Mixtura opiacea. (*Sa.*)

℞. Opii crudi . . . granum unum.
Aquae aromaticae cujuslibet
unciam unam.
Solutioni adde
Aquae Cinnamomi vinosae
uncias duas.

Essentia anodyna officinalis. (Pal. Wir. *Sp. Vm.*)

℞. Extracti Opii aquosi unciam unam.
Aquae Cinnamomi vinosae
uncias novem.
Post sufficientem digestionem filtra. — Gabe, fünf, zehen, funfzehen und zwanzig Tropfen. — Ein Scrupel enthält zwei Gran Opium.

Tinctura Opii Reccardi, Tinctura thebaica Bambergi, Vinum Opii. (B*. Ham. Han. LonN. O. *Ca. Vm.*)

℞. Opii . . . . . uncias duas.
Caryophyllorum drachmam unam.
Aquae Cinnamomi uncias octo.
— Vitae . . uncias quatuor.
Stent loco calido in digestione per sex dies, tum cum expressione colata filtrentur.

Eine Drachme enthält zehen Gran Opium, was auf zehen Tropfen einen Gran beträgt. Hierher gehört auch das *Vinum Opii* von LonN. Extracti Opii unciam unam, Cinnamomi, Caryophyllorum, singulorum drachmam unam, Spiritus tenuioris fluiduncias sex, Aquae destillatae fluiduncias decem; macera per dies octo et cola.

Mixtura sedans et aromatica. (*Sw.*)

℞. Aquae Menthae piperitae
uncias quinque.
Alcoholis Nucis moschatae
unciam unam.
Electuarii aromatici
drachmas duas.
Tincturae Opii aromaticae
drachmam unam ad duas.
Sacchari albi . . drachmas tres.
Bei Cardialgie. — Gabe, alle halbe oder ganze Stunden drei Löffel.

Potio sedans s. hypnotica. (*Sw.*)

℞. Tincturae Opii aromaticae
guttas viginti.
Aquae Menthae crispae
unciam unam.
— Florum Aurantiorum
drachmas duas.
Bei'm Schlafengehen zu geben.

Mixtura anticathartica. (*Sw**.)

℞. Gummi Arabici . drachmas tres.
Syrupi Papaveris . sesquiunciam.
Aquae Chamomillae Romanae
uncias sex.
— Cinnamomi unciam unam.
Tincturae Opii aromaticae
scrupulum unum.
Gabe, alle Viertelstunden einen Löffel.

Tinctura vinosa Opii anticolica s. alcoholica Opii composita. (His.)

℞. Opii . . . . . uncias duas.
Radicis Zedoariae unciam unam.
— Carlinae,
— Galangae,
singularum semunciam.
— Calami,
Corticis siccati Aurantiorum,
— — Citri,
Seminum Anisi,
— Carvi,
Florum Chamomillae,
singulorum drachmas duas.
Macidis . . . drachmam unam.
Caryophyllorum,
Baccarum Lauri,
— Juniperi,
singulorum semidrachmam.
Alcoholis . . . . libras tres.

Post dies octo macerationis filtra. — Gabe, zwei Scrupel.

Essentia anodyna Ludovici. (Wir.)

℞. Extracti Opii aquosi unciam unam.
Aquae apoplecticae spirituosae uncias octo.

Gabe, sieben bis zwölf und funfzehen Tropfen. — Eine Drachme enthält sechs und einen halben Gran Opium.

Tinctura alcoholica Opii s. Opii crocea, Elixir paregoricum. (Hie.)

℞. Opii . . . . . uncias duas.
Croci . . . . . semunciam.
Cinnamomi . . drachmas duas.
Alcoholis,
Aquae,
singulorum uncias duodecim.

Digere per dies octo et filtra. — Diese Tinctur hat viel Aehnlichkeit mit dem Sydenham'schen Laudanum. — Ein Scrupel enthält zwei Gran Opium.

Tinctura antispasmodica Christiani (Chrestien). (*Bo.*)

℞. Opii crudi . drachmam unam.
Camphorae . drachmas quatuor.
Aquae Vitae . . libram unam.

Macera per tres vel quatuor dies et tunc filtra. — Aeußerlich bei rheumatischen Beschwerden, Wechselfiebern mit rheumatischen Schmerzen complicirt, bei retentio urinae, Amenorrhoe ꝛc. gerühmt. — Im letzteren Falle macht man Einreibungen auf die Schenkelfläche.

Tinctura Opii camphorata, Elixir paregoricum Ph. Dub. (RC.)

℞. Opii,
Camphorae,
Olei destillati Anisi,
singulorum drachmam unam.
Alcoholis diluti . . libras duas.

Digere per quatriduum. — Eine halbe Unze enthält ungefähr einen Gran Opium. — Gabe, dreißig Tropfen bis eine und zwei Drachmen. — Mit der dreifachen Quantität tinct. Scillae als ein vortreffliches Mittel bei Husten und Catarrh empfohlen.

Linimentum sedativum camphoratum. (*Siv.*)

℞. Tincturae Opii aromaticae drachmam unam vel duas.
Camphorae . drachmam unam.
Linimenti saponacei sesquiunciam.

In Einreibungen und Bähungen auf den Unterleib, bei Kolik.

Linimentum anodynum. (*Au. Su.*)

℞. Linimenti saponacei uncias duas.
Tincturae Opii . . semunciam.
Misce. (*Sa.*)

Au. Linimenti et Tincturae, singulorum partes aequales.

In denselben Fällen von Nutzen, wie das vorige. — Lind will durch Einreibungen mit diesem Liniment mehrmals das Wechselfieber geheilt haben.

Linimentum camphoratum opiaceum. (GalM.)

℞. Tincturae Opii . . partes duas.
Camphorae . . partem unam.
Olei Olivarum partes quindecim.

Tinctura antispasmodica Dumasii. (*Pie.*)

℞. Opii . . . grana quadraginta.
Camphorae,
Succini,
singulorum semidrachmam.
Alcoholis . . . . uncias sex.

In Einreibungen auf die Wirbelsäule, die Ober- und Unterschenkel.

Tinctura Opii ammoniata, Elixir paregoricum Ph. Edinb. (RC.)

℞. Opii . . . . . drachmas duas.
Olei destillati Anisi semidrachmam.
Alcoholis ammoniati uncias sedecim.

Macera frigide per septimanam et per chartam cola. — Eine Drachme (oder 100 Tropfen) enthalten ungefähr einen Gran Opium. — Gabe, dreißig Tropfen bis anderthalb Drachmen.

Tinctura Opii ammoniacalis s. anodyna volatilis s. alcoholica Opii ammoniacalis et camphorata s. antispasmodica camphorata, Elixir paregoricum, Spiritus ammoniacatus. (Lus. *Au. Su*. Vm.*)

℞. Camphorae Alcohole humectatae partem unam.
Opii pulverati . . partes duas.
Alcoholis ammoniacalis partes viginti quatuor.

Post plures dies macerationis filtra. (*Su*. Vm.*)

Lus. Opii drachmam unam, Camphorae scrupulos duos, Tincturae aromaticae ammoniacalis uncias quatuor et Alcoholis libram unam.

℞. Aquae Vitae . . unciam unam.
Alcoholis ammoniacalis semunciam.
Opii . . . . . scrupulos duos.
Camphorae . scrupulum unum.

Post tres dies digestionis cola. (*Au.*)

Bei Hysterie und convulsivischen Krankheiten empfohlen. — Gabe, eine halbe bis zwei Drachmen in einem syrupartigen Vehikel. — Bicat empfahl diese Tinctur

bei Kopfschmerz, Zahnschmerz und Migräne; man reibt sie in die Hände ein und hält diese vor die Nase.

Laudanum liquidum Warneri, Tinctura Opii ammoniacata. (D. *Vm.*)

℞. Opii puri,
Saponis Alicantini,
singulorum drachmas sex.
Nucis moschatae drachmam unam.
Camphorae . . drachmas duas.
Croci . . . grana quadraginta.
Alcoholis ammoniacalis
uncias novem.

Digere per dies decem, subinde agitando, et tunc decantha. (D.) — Eine Drachme enthält fünf und einen halben Gran Opium.

℞. Opii . . . . . sesquiunciam.
Nucis moschatae drachmas duas.
Croci . . . . scrupulos duos.
Alcoholis ammoniacalis
uncias octodecim.

Macera et adde deinde
Saponis albi . . sesquiunciam.
Camphorae . . . semunciam.

Liquor filtratur prout eo uti proposuisti. (*Vm.*)

Linimentum Saponis compositum s. camphoratum s. anodynum s. spirituosum anodynum, Balsamum anodynum s. arthriticum s. thebaicum, Linimentum s. Tinctura Saponis et Opii, Tinctura alcoholica Opii saponacea. (Am. B*. Ed. Gen. His. Wür. *Au. C. Pie. Ra. Sp. Vm.*)

℞. Saponis raspati uncias quatuor.
Alcoholis . . . . libras duas.
Digere per tres dies, cola et adde
Opii . . . . . unciam unam.
Camphorae . . . . uncias duas.
Olei essentialis Rorismarini
semunciam.

Agita bene. (B*. Ed. *C.*)

Am. Saponis uncias duodecim, Olei Rorismarini drachmas duas et Alcoholis octarios octo.

℞. Opii . . . . . drachmam unam.
Saponis albi Hispanici
uncias quinque.
Alcoholis uncias viginti quatuor.

Digere per tres dies, in colatura dissolve
Camphorae . . . uncias duas.
Olei essentialis Rorismarini
semunciam.

Serva. (*Sp.*)

Wür. Opii drachmas duas, Saponis unciam unam, Camphorae drachmas tres, Olei essentialis semidrachmam et Alcoholis uncias novem; — Gen. Opii unciam unam, Saponis uncias quinque, Camphorae uncias duas, Olei Rorismarini semunciam et Alcoholis sesquilibram; — *Au.* Opii drachmam unam, Saponis unciam unam, Camphorae semidrachmam, Olei Rorismarini drachmam unam et Alcoholis quantum sufficit ad omnia solvenda.

℞. Opii . . . . . semunciam.
Camphorae . . . drachmas sex.
Saponis albi . . . semunciam.
Croci . . . drachmam unam.
Alcoholis . . . . sesquilibram.

Digere per septem dies et cola. (His. *Pie.*)

℞. Croci . . . . . partem unam.
Alcoholis partes quadraginta duas.

Digere in balneo aquae tepido et adde
Opii concisi . . . partes duas.

Post sufficientem digestionem adde
Saponis albi rasi partes quatuor.

Solutione peracta exprime fortiter et filtra. (*Vm.*)

℞. Opii . . . . . unciam unam.
Spiritus Rorismarini
uncias viginti quatuor.

Post aliquot dies macerationis cola exprimendo, filtra et in colatura dissolve
Camphorae . . drachmas tres.
Saponis e medulla praeparati
uncias sex.

Post sepositionem decantha. (*Vm.*)

℞. Opii . . . . drachmam unam.
Saponis albi plane sicci
semunciam.
Alcoholis . . . uncias quatuor.

Digere per tres dies, cola et adde
Camphorae . . drachmas duas.

Agita bene. (*Ra.*)

Gabe, dreißig, vierzig oder funfzig Tropfen in Wein. — In Einreibungen äußerlich, bei Gichtschmerzen. — Dieser Balsam unterscheidet sich von dem Opodeldoc nur durch das in ihm enthaltene Opium.

Balsamum somniferum. (Wir.)

℞. Unguenti populei,
Olei Myristicae expressi,
singulorum unciam unam.
Opii in Alcohole dissoluti
drachmam unam.
Olei Ligni Rhodii guttas sedecim.
Misce bene.

Tinctura Opii benzoica s. Camphorae composita s. Opii camphorata s. sedativa camphorata, Elixir paregoricum, Tinctura alcoholica Opii et Acidi benzoici camphorata, Elixir antiasthmaticum. (Am.B*. Bor.Bor4. D.Du. Ed.GalF. Han. Li. Lon. LonN. Sax. Suec. *Bo. Br. C. Ca. Pie. Sw. Vm.*)

℞. Opii duri pulverati,

Acidi benzoici,
singulorum drachmam unam.
Camphorae . . scrupulos duos.
Alcoholis (0,930) octarios duos.
Digere per dies quatuordecim et filtra. (GalF. Lon. LonN. *C. Pie.*)

℞. Opii,
Acidi benzoici,
singulorum drachmam unam.
Camphorae . . scrupulos duos.
Alcoholis (0,935)
libras duas cum dimidia.
Post septem dies digestionis filtra. (Ed.)

℞. Opii,
Acidi benzoici,
singulorum drachmam unam.
Camphorae . . scrupulos duos.
Olei essentialis Anisi
drachmam unam.
Alcoholis (0, 930) (Spirit. rectif.)
octarios duos.
Digere per dies septem (quatuordecim) et filtra. (B*. Du. Li. *Bo. Br. Pie. Sw.*)

Bor. Bor4. Han. quatuor priorum singulorum drachmam unam, digere per tres dies (Bor4.); — D. Suec. et *Vm.* Olei Anisi semidrachmam; — *Ca.* Opii drachmam unam, Acidi benzoici tantidem, Camphorae grana viginti sex, Olei Anisi scrupulos duos et Alcoholis (24°) uncias viginti tres.

℞. Opii,
Acidi benzoici,
Camphorae,
Olei essentialis Anisi,
singulorum partem dimidiam.
Alcoholis partes nonaginta sex.
Post sufficientem digestionem cola. (Sax.)

℞. Opii,
Acidi benzoici,
Olei essentialis Anisi,
singulorum drachmam unam.
Extracti Liquiritiae semunciam.
Mellis despumati . uncias duas.
Camphorae . . scrupulos duos.
Alcoholis (0,930) . octarios duos.
Stent in digestione per dies decem, tunc colentur. (Am. B*. C.)

Besonders bei Asthma empfohlen. — Gabe, Erwachsenen zwanzig bis hundert, Kindern fünf bis zwanzig Tropfen.

Tinctura Benzoatis Ammoniae composita, Alcohol cum Benzoate Ammoniae compositum, Tinctura Opii ammoniata, Tinctura alcoholica Opii et Benzoatis Ammoniae, Elixir paregoricum. (Am. An. Bel. Ed. GalF. GalH. *C. Ca. Pie. Vm.*)

℞. Opii . . . . drachmas duas.
Croci,
Acidi benzoici,
singulorum drachmas tres.
Olei essentialis Anisi
semidrachmam.
Alcoholis ammoniacalis
uncias sedecim.
Post septem dies digestionis filtra. (Ed. GalF. GalH. *C. Ca. Pie.*)

Am. Opii, Acidi benzoici, Olei Anisi, singulorum drachmam unam, Extracti Liquiritiae semunciam, Mellis despumati uncias duas, Camphorae scrupulos duos et Aquae Vitae octarios duos.

℞. Croci . . . . . drachmas sex.
Alcoholis ammoniacalis
uncias triginta duas.
Infunde frigide per duos dies et adde
Opii concisi . . . semunciam.
Infunde denuo per aliquot dies et adde
Acidi benzoici . drachmas sex.
Olei essentialis Anisi
drachmam unam.
Exprime et filtra. (*Vm.*)

℞. Croci . . . drachmas quinque.
Tincturae aromaticae ammoniatae
uncias quatuor.
Post dies duos digestionis cola et in colatura solve
Acidi benzoici scrupulos quinque.
Opii depurati . drachmas duas.
Stent in digestione per duos dies, tunc colentur et filtrentur; residuo infunde
Tincturae aromaticae ammoniatae
uncias duas.
Digere per horas viginti quatuor, cola et in colatura solve quod in filtro remansit. Post horas duodecim filtra. Colaturis commixtis adde
Olei essentialis Anisi
guttas triginta duas.
Serva. (An. Bel.)

℞. Opii sicci . . . drachmas duas.
Acidi benzoici . . semunciam.
Alcoholis ammoniacalis
libram unam.
Post quinque dies digestionis filtra. (*Ca. Pie.*)

Besonders bei Asthma und Keuchhusten empfohlen. — Gabe, dreißig bis vierzig Tropfen in einem passenden Trank.

Elixir sudoriferum s. sudoriferum Lettsomi, Tinctura Opii benzoica composita. (*Au.*)

℞. Ipecacuanhae,
Balsami Tolutani,
singulorum semunciam.
Acidi benzoici,
Opii,
Croci, singulorum drachmas duas.
Camphorae . scrupulos quatuor.

Olei essentialis Anisi
drachmam unam.
Alcoholis . . . . libras duas.
Post sufficientem digestionem cola. — Gabe, fünf bis dreißig Tropfen, allmälig gestiegen, bei'm Keuchhusten.

Epithema antiarthriticum. (*Bo.*)

℞. Aquae Reginae Hungariae
uncias octo.
Spiritus Salis Ammoniaci
semunciam.
Camphorae . . drachmas duas.
Opii . . . . . semidrachmam.
Saponis Veneti . sesquiunciam.
Misce. — Man wendet es warm, mittelst feiner Leinwand an und erneuert es alle Stunden.

Tinctura stibiata. (*Au.*)

℞. Liquoris Ammonii succinici,
Elixir paregorici,
singulorum drachmas duas.
Laudani liquidi Sydenhami,
Vini stibiati,
singulorum drachmam unam.
Gabe, zwanzig bis vierzig Tropfen, alle zwei Stunden, bei'm Keuchhusten. — Von Jahn gepriesen.

Elixir antiasthmaticum Lemort. (*Vm.*)

℞. Acidi benzoici,
Opii, singulorum drachmam unam.
Kali subcarbonici unciam unam.
Mellis Narbonnensis,
Liquiritiae rasae,
singulorum uncias quatuor.
Olei essentialis Anisi
semidrachmam.
Camphorae . . scrupulos duos.
Aquae Vitae
uncias triginta quatuor.
Digere in aqua vitae primò crocum, deinde opium, liquiritiam, adde sal et cola post aliquot dies, et exprime; in colatura dissolve sensim acidum, oleum camphoram et mel; post subsidentiam cola per pannum et supra sedimentum rectifica donec liquor perfecte limpidus sit redditus.

Linimentum sedans aethereum. (*Sw*.*)

℞. Tincturae Opii aromaticae
drachmas sex.
Aetheris sulphurici drachmas duas.
Misce. — Bei Ischurie und krampfhaften oder rheumatischen Schmerzen empfohlen.

Mixtura sedans. (*Sw.*)

℞. Aquae . . . . . uncias sex.
Tincturae Opii aromaticae,
Aetheris sulphurici,
singulorum drachmas sex.
Syrupi Sacchari . unciam unam.
Gabe, stündlich oder alle zwei Stunden einen Eßlöffel.

Mixtura acida anodyna, Guttae anodynae acidae. (Ful. Ham.)

℞. Tincturae Opii scrupulos duos.
Acidi sulphurici scrupulum unum.
Aquae destillatae . uncias sex.
Syrupi Violarum unciam unam.
Misce. (Ful.)

℞. Essentiae Aurantiorum
semunciam.
Acidi sulphurici drachmam unam.
Tincturae Opii semidrachmam.
Misce bene. (Ham.)
Nutzen und Gabe wie bei'm vorhergehenden.

Tinctura foetida pyro-oleosa s. vermifuga. (*Au.*)

℞. Asae foetidae drachmam unam.
Opii,
Salis volatilis Cornu Cervi,
singulorum drachmas duas.
Tincturae Castorei uncias duas.
Rosenstein empfiehlt diese Tinctur gegen Kopfgrind — Gabe, dreißig bis vierzig Tropfen in Wein oder Branntwein.

E. Auszug durch Wasser.

Infusum Opii aquosum. (*Br*. Ra.*)

℞. Opii electi . . . unciam unam.
Aquae destillatae . uncias octo.
Alcoholis (36°) . . semunciam.
Infunde opium in aqua per duos vel tres dies temperatura communi et a radiis solis tutum; filtra, adde alcoholem et serva in lagunculis bene obturatis.
Chaussier gebraucht diesen Aufguß statt des Laudanum liquidum Sydenhami. — Gabe, innerlich sechszehn bis vier und zwanzig oder dreißig Tropfen in einem Tranke; äußerlich funfzig bis achtzig Tropfen in zwei Unzen Malvenblüthaufguß.

Extractum Opii s. Opii gummosum s. aquosum s. thebaicum, Laudanum opiatum s. simplex, Opium colatum s. depuratum s. gummosum. (A. Ba. Bel. Bor. Bor4.Br. D.Du. Fer. Ful. Gal. GalM. Han. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pal. Pol. Sax. Suec. Wir. *Br. C. Fi. Sa. Sp. Sw. T. Vm.*)

℞. Opii concisi . . partem unam.
Aquae frigidae . partes quatuor.
Digere in evaporatorio per dies duos, vas subinde agitando; cola, sepone per duos dies, filtra ut pellicula removeatur odoris virosi, et lentissimo igne dimidium consume; sepone deinde per duos dies in evaporatorium, filtra ite-

rum ut pellicula eodem modo semoveatur, cola et ad extracti consistentiam consume. (Gal.)

℞. Opii concisi . . . semilibram.
Aquae frigidae . . octarios tres.

Macera opium in aquae pauxillo ut mollescat; adde sensim aquam reliquam, tritura totum ut bene commisceantur, tunc sepone et colata ad extracti consistentiam consume. (Lon.)

Lon⁂. Opii uncias sedecim, Aquae congium unum.

℞. Opii grossiuscule pulverati quantum vis.

Tritura cum Aquae frigidae pauxillo, donec haec fusca sit reddita; sepone deinde et tunc decantha; operationem repete donec aqua colorem accipere desiit; liquores commixti in balneo aquae ad extracti consistentiam evaporent. (Fer. Ful. Li.)

℞. Opii crudi . . . quantum vis.

Malaxa sub aquae tenuissimo filo donec nihil amplius dissolvatur et cola; albumine clarificatum ignis vehementis ope vapore et quum liquor spissescere incipit, cola iterum et denique ad extracti consistentiam requisitam consume. (Bel.)

℞. Opii in frusta minora concisi partem unam.
Aquae frigidae . . partes tres.

Macera per tres dies absque agitatione et decantha; residuo infunde Aquae partes duas et post aliquot tempus decantha; quae operatio adhuc semel repetatur; liquores commixtos cola et albumine clarificatos levi bullitione evapora et praecipitatum prout formatum decantha. (*Vm.*)

℞. Opii concisi . . . quantum vis.
Aquae frigidae quantum sufficit.

Macera per horas duodecim, tunc digere leni calore per tempus aequale et cola; cum residuo eodem modo age, donec aqua non amplius coloretur; liquores commixti in balneo aquae ad electuarii spissi consistentiam evaporent; quo in Aqua frigida dissoluto, liquorem sepone, cola et denique ad extracti consistentiam consume. (Suec.)

℞. Opii concisi . . uncias quatuor.
Aquae communis cum Succi Citri libra dimidia acidulatae libras quatuor.

Post solutionem filtra et in balneo aquae ad extracti consistentiam consume. (Br. Pal. Wir.)

℞. Opii . . . . . uncias duas
Aquae bullientis . libram unam.

Dissolve, liquorem calidum cola, adde Aquae frigidae libram unam, per dies duos aëri expone, filtra, tunc vaporando, primum leni igne tunc in balneo aquae ad extracti consistentiam usque consume. (*Br. Fi.*)

℞. Opii uncias sex, Aquae bullientis libras tres et Aquae frigidae tantidem.

℞. Opii grossiuscule pulverati partem unam.
Aquae . . . . partes quatuor.

Digere per dies duos, blando calore, saepius agitando, liquorem decantha et cola, qui tunc in balneo aquae ad aptam consistentiam evaporet. (A. Bor. D. Han. His. Lus. O. Pal. Sax. *Sa. Sp. Sw.*)

Bor4. ad massae pilularis consistentiam evaporare et tunc leni calore exsiccare, ut pulverari queat, jubet; — GalM. infusione ad finem perducta liquorem per horas viginti quatuor sepositum filtrare, dimidium ebullitione consumere, iterum seponere et post novam colationem, evaporationem in balneo aquae perficere; — Ba. digerere per horas viginti quatuor, cum residuo eandem operationem repetere, Aquae novae partem quartam sumendo et colaturas commixtas consumere; — HassP. Opii uncias quatuor, Aquae destillatae libram unam in olla murrhina ad opii solutionem tenere saepius agitando, colare, residuum Aquâ destillata abluere, colare, et sepositione clarificatum ad electuarii consistentiam evaporare, massam remanentem in Aquae frigidae partibus tribus solvere et fluidum filtratum in balneo aquae ad siccum evaporare.

℞. Opii . . . . . uncias duas.
Aquae bullientis octarium unum.

Tritura per sexagesimas decem, sepone parumper et decantha liquorem; residuum denuo bis cum eadem Aquae quantitate per idem tempus tritura; liquores commixtos per duos dies in vase aperto aëri expone, cola et lente ad extracti consistentiam consume. (Du. *C.*)

Das heutzutage allgemein angenommene Verfahren hat mit dem von Gal. Aehnlichkeit; es besteht darin, daß man das Opium, je nach seiner Consistenz, zerschnitten oder geraspelt in kaltem Wasser einweicht, bis es aufgelöst ist, die Flüssigkeiten durchseiht, sie bis zur Hälfte abdampft, erkalten läßt, und, um das Harz zu trennen, welches sich zum Theil als Sediment scheidet, filtrirt, die klargewordene Flüssigkeit abdampft, sie, nachdem sie erkaltet ist, wieder filtrirt und das bis zur Honigdicke abgedampfte Extract endlich mit kaltem destillirten Wasser verdünnt und es wiederum bis zur Pillenmasse abdampft.

Das so gewonnene Extract enthält meconsaures Morphium, eine kleine Menge Narcotin, färbenden Stoff, etwas Harz,

Schleimharz und Satzmehl. — Gabe, einen halben bis drei Gran.

Sal essentiale s. Extractum siccum Opii. (Gal.)

℞. Opii concisi . . . libras duas.
Aquae frigidae libras duodecim.

Macera per horas viginti quatuor, subinde agitando, et cola; residuum itidem maceratum cum Aquae partibus octo, colatur. Colaturis mixtis et in balneo aquae ad syrupi consistentiam evaporatis, hujus supremi lineas circiter duas patinis infunde et tunc in furno vel balneo aquae ad siccum usque consume et squamas separa.

Extractum Opii aquosum Narcotina privatum. (Fer. Gal F. T.)

℞. Extracti Opii gummosi
quantum vis.

Aquae pauxillo dilutum cum Aethere depurato in lagenam immitte et mixturam saepius agita; post certum tempus decantha, novum aetherem affunde, donec quod decanthatur vaporando sedimentum non amplius relinquit, extractum deinde ad massae pilularis consistentiam consume.

Dieß ist das Verfahren Alph. Leroy's, welches Robiquet wieder in Erinnerung gebracht hat. Dublanc schlägt, indem er es für unzureichend erklärt, folgendes vor:

℞. Extracti aquosi Opii frigide parati
partes trecentas.
Aquae destillatae
partes centum quinquaginta.

Dissolve; solutioni in retortam immissae superfunde
Aetheris puri . partes bis mille.

Destilla, lente calefaciendo, Aetheris partes circiter ducentas; apparatu depromto aetherem supernatantem decantha; extractum adhuc calidum cum aethere destillato ablutum et vaporatione concentratum in Aqua destillata dissolve et denuo ad aptam consistentiam evapora.

So bereitet, enthält das Opiumextract kein Atom Narcotin.

Extractum Opii Diestii. (Gal.)

℞. Opii . . . . . libram unam.
Aquae communis libras quatuor.

Coque leviter per horam dimidiam et cola; residuum bis coquatur cum Aquae aequali quantitate et decoctum tria conjuncta colentur; mixturam in cucurbitam stanneam, balneo arenae lampadis ope calefacto impone, ita ut per sex mensium spatium lente coquatur, subinde Aquae destillatae pauxillum addendo et in alia vasa transmittendo ut sedimentum separetur; post sex menses refrigeratum et per pannum colatum evaporet in balneo aquae ad consistentiam massae pilularis.

Dieses Verfahren ist mit Recht verlassen worden, da es vor den andern schneller zum Ziele führenden keinen wirklichen Nutzen voraus hat.

Extractum Opii per fermentationem. (Gal. *Ca. T.*)

℞. Opii concisi . . quantum vis.
Aquae,
Fermenti Cerevisiae,
singularum quantum sufficit.

Fermentationi in temperatura apta expone et liquorem, simulac clarus est, Aqua dilue; filtra, tunc coque donec omnis odor virosus evanuerit et denique ad extracti spissi consistentiam consume.

T. Fermenti uncias duas, Aquae libras tres, Opii uncias sex, post fermentationem Aquae novae tantidem etc.

Dieses Verfahren, welches von Deyeux herrührt, ist nicht genau, da die Veränderungen, welche hier mit dem Opium vorgehen, mehr oder weniger groß seyn müssen, je nachdem die Gährung mehr oder weniger vollständig erfolgt ist. Uebrigens hat man sich noch gar nicht darum bekümmert, worin sie eigentlich bestehen.

Extractum Opii cydoniatum Langelotti. (*Sp.*)

℞. Opii electi . . uncias duodecim.

Dissolve in mixtura e
Succi Cydoniorum,
Aquae fontanae,
singulorum unciis sexaginta.

Stent in digestione per dies aliquot in loco calido, tunc colentur; colaturae adde
Sacchari albi . uncias quatuor.

Massam fermentationi subjice per plures menses duranti, subinde spatulae ligneae ope agitando; postquam omnis fermentationis motio desiit, cola per linteum et ad extracti consistentiam consume.

Man kann von diesem Extract, und mit noch größerem Rechte, das sagen, was von dem vorigen galt. Es enthält sehr wahrscheinlich essigsaures Morphin.

Laudanum opiatum, Extractum Opii crocatum. (Br. His. Pal. Sar. Wir.)

℞. Extracti Opii aquosi uncias duas.
— Croci,
Opobalsami,
singulorum semidrachmam.

Misce bene. (Pal. Wir.)

Br. Pulverem pro Extracti Croci jubet:

℞. Extracti Opii aquosi uncias duas.

Extracti Croci . unciam unam.
Matris Perlarum praeparatae,
Hyacinthi praeparati,
Corallii praeparati,
singulorum sesquidrachmam.
Terrae sigillatae drachmam unam.
Bezoar . . scrupulos quatuor.
Rasurae Cornu Cervi
scrupulos duos.

Pulverata Aquae pauxilli ope in pastam redige, de qua trochisci formentur. (His.)

℞. Extracti Opii,
— Croci,
singulorum unciam unam.
Pulveris Succini albi drachmas sex.
— Castorei . drachmas tres.

Extractis cum Alcoholis pauxillo dilutis pulveres admisce. (Sar.)

Extractum anodynum. (Wir.)

℞. Extracti Opii aquosi
drachmas tres.
— Cardui benedicti
drachmas quinque.
— Calami,
— Angelicae,
singulorum unciam unam.
Olei essentialis Caryophyllorum
guttas decem.

Misce bene. — Jede Drachme enthält sieben und einen halben Gran Opium.

Laudanum antihystericum. (Wir.)

℞. Extracti Opii . . . semunciam.
— Castorei drachmam unam.
— Croci . scrupulum unum.
Olei essentialis Macidis,
— — Menthae,
— — Rutae,
singulorum guttas sex.

Misce, ut fiat massa pilularis. — Man hat dieses Präparat bei hysterischer Kolik, um die Krämpfe zu stillen, empfohlen. — Gabe, einen bis zwei Gran.

Laudanum diureticum s. urinarium s. urinarium Micheli, Extractum Opii glyzyrrhizatum. (His. Wir. *Fi.*)

℞. Extracti Opii aquosi
drachmas duas.
Succi Liquiritiae sesquiunciam.
Trochiscorum Alkekengi,
Terebinthinae Venetae,
singulorum semunciam.
Camphorae . drachmam unam.
Croci . . . scrupulos quatuor.
Gummi Tragacanthae,
Mastichis,
singulorum semidrachmam.

Extractum opii et succum liquiritiae in mortario cum Aquae pauxillo diluta in massam malleam redige et iis admisce triturando terebinthinam; adde deinde trochiscos, mastichem, gummi, camphoram et crocum pulverata; fiat massa in trochiscos dividenda.

Fi. Gummi Tragacanthae, Mastichis, singulorum semunciam, caeterum ut antea.

Man hat dieses Präparat bei Nierencolik, Ischurie und Strangurie empfohlen — Dreizehen Gran enthalten einen Gran Opium.

Laudanum opiatum cydoniatum, Extractum Opii cydoniatum. (Pal. Wir. *Bo.*)

℞. Opii concisi . . . semilibram.
Succi Cydoniorum recens expressi
libras sex.

Digere blando calore, decantha, filtra et liquori evaporato adde
Olei essentialis Cinnamomi,
— — Caryophyllorum,
— — Macidis,
singulorum semiscrupulum.

Misce bene. (Pal. Wir.)

℞. Opii crudi pulverati
uncias quatuor.
Succi Cydoniorum recens expressi
libras quatuor.

Post tres septimanas digestionis adde
Caryophyllorum,
Nucis moschatae,
singulorum unciam unam.

Calefac leviter, tum in digestione relinque per dies septem et adde
Croci . . . . unciam unam.
Sacchari albi . uncias quatuor.

Post horas viginti quatuor filtra; evaporata in balneo aquae ad tertiae partis remanentiam serva. (*Bo.*)

Dieses Präparat, welches heutzutage nicht mehr gehalten werden darf, unterscheidet sich von dem wässerigen Opiumextract durch die mit dem Quittensaft hineinkommenden Unreinigkeiten und durch den Zusatz der Gewürze. Ehedem zählte man es zu den schwach adstringirenden Krampfmitteln und hielt es für nützlich bei Erbrechen, Durchfall, Schluchzen, besonders um die Schmerzen zu stillen. — Gabe, Erwachsenen einen Gran, Kindern ein Zehntheil, Zwölftheil oder ein Zwanzigtheil Gran. Dieses gilt besonders von dem Präpart der zweiten Formel, da das der ersteren auf zehen Tropfen einen Gran Opium enthält.

Pilulae sedativae s. hypnoticae. (*Ra. Sw. Sy. Vm.*)

℞. Extracti Opii aquosi
quantum placet.

Fiant pilulae grani unius. — Gabe, eine oder mehrere, je nach der Indication.

℞. Extracti Opii . . . grana tria.
Camphorae . . . . grana sex.
Syrupi Sacchari quantum suffiecit.

Fiant pilulae sex. (*Ra. Sy. Vm.*)

℞. Extracti Opii . granum unum.

Camphorae . . . . grana sex.
Nitri . . . . . grana quatuor.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.
Fiat pilula una. (*Ra.*)

Pilulae pectorales opiaceae. (Ful.)

℞. Succi Liquiritiae sesquiunciam.
Extracti Opii . . . semunciam.
Syrupi Capitum Papaveris
quantum sufficit.

Gabe, zwei bis sechs Gran.

Pilulae balsamicae cum Opio. (*Au.*)

℞. Extracti Opii . semidrachmam.
Balsami Peruviani
sesquidrachmam.
Myrrhae . . . drachmas tres.

Fiant pilulae grani unius. — Gabe, stündlich zwei oder drei Stück mit tinctura Opii abwechselnd. — Von Marcus empfohlen.

Bolus ad diarrhoeam. (*Sm.*)

℞. Opii gummosi . granum unum.
Pimentae,
Cassiae ligneae,
Croci, singulorum grana quatuor.
Conservae Cynorrhodi
quantum sufficit.

Tabellae Opii. (*Vm.*)

℞. Extracti Opii frigide parati
partem unam.
Sacchari albi
partes sexaginta quatuor.

Saccharum blando calore fusum cum extracto commisce ut fiat massa in tabellas sex granorum dividenda.

Morsuli pectorales. (Fer.)

℞. Mucilaginis Lichinis Islandici,
— Gummi Arabici,
singulorum libram unam.
Sacchari . . . . . libras duas.
Opii . . . . sesquidrachmam.

Fiant morsuli granorum viginti quatuor. — Gabe, zehen Stück täglich.

Pulvis anodynus. (Ham. Wir. *Ca. Pie.*)

℞. Extracti Opii . . . grana duo.
Specierum diatragacanthae
uncias duas.

Misce bene. (*Pie.*)

℞. Extracti Opii aquosi
drachmam unam.
Corallii rubri praeparati
drachmas duas.

Misce. (Wir.)

℞. Opii,
Ligni Santali rubri,
singulorum scrupulum unum.
Corallii rubri praeparati
scrupulos quatuor.

Misce. (Wir.)

Cataplasma cum Opio s. anodynum. (*Au.*)

℞. Farinae Seminis Lini
uncias quatuor.
Aquae . . . quantum sufficit
ut fiat cataplasma, cui adde
Opii . . . . semidrachmam.

Linimentum opiaceum. (*Ra.*)

℞. Infusi Opii aquosi
drachmas quatuor.
Olei Olivarum . . uncias duas.

Subige bene.

Sy.'s Clyster sedans hat viel Aehnlichkeit mit diesem Liniment: Extracti Opii aquosi grana duo vel tria, Olei Olivarum vel Lini uncias quatuor.

Sw. Linimentum sedativum; Extracti Opii drachmam unam triturare primò cum Aquae calidae pauxillo deinde cum Cerati ordinarii drachmis tribus ad octo.

Auch gehört hierher das folgende *Unguentum sedativum.* (*Sw.*)

℞. Extracti Opii drachmam unam.

Tritura cum Aquae bullientis pauxillo et adde deinde, continue terendo,
Axungiae in mortario calido fusae
unciam unam.

Alle drei Präparate dienen zur Beseitigung von örtlichen Schmerzen.

Collyrium opiaceum. (*Ra.*)

℞. Extracti Opii gummosi
semidrachmam.
Aquae . . . . libram unam.

Dissolve.

Ra. praeterea Extracti grana duo et Aquae uncias quatuor.

Sicher muß die Kraft dieses Augenwassers je nach den Indicationen verschieden seyn.

Fomentatio narcotica, Solutio sedativa. (*Ra. Sw.*)

℞. Extracti Opii
drachmas duas ad quatuor.
Aquae calidae . libram unam.

Contere. — In Bähungen bei pruriginösen Hautkrankheiten.

Gargarisma sedativum. (*Sw.*)

℞. Extracti Opii
drachmam unam ad duas.
Aquae bullientis . libram unam.

Misce triturando et adde
Alcoholis . . . unciam unam.

Bei schmerzhaften Zungen- und Halsgeschwüren, bei rheumatischen Zahn- oder Ohrenschmerzen und sogenanntem nervösen Kopfweh von Nutzen.

Clyster opiaceum. (*Sp. Sw.*)

℞. Seminis Lini contusi unciam unam.

Aquae bullientis . . uncias sex.
Post horam unam infusionis cola et in colatura solve
Extracti Opii . . . grana duo.

Injectio sedativa. (*Ca.*)

℞. Extracti Opii . grana sedecim.
Infusi Seminis Lini libram unam.

Syrupus Opii s. de Opio s. opiatus s. thebaicus s. sedativus s. hypnoticus. (An. Du. Fer. Gal. GalM. His *C. Sw*. T. Vm.*)

℞. Extracti Opii cum Aqua frigida parati drachmas tres et grana sexaginta.
Aquae . . . . . uncias duas.
Dissolve et adde
Syrupi Sacchari libras novem et uncias novem cum dimidia.
Misce, coque per momenta aliquot et per pannum cola. (Gal.)

GalM. Extracti partem unam, Aquae quatuor et Syrupi sexcentas; — An. Opii puri in Aquae panxillo soluti unciam unam et Syrupi bullientis uncias quindecim, misce; — His. Extracti scrupulum unum, Aquae uncias tres et Syrupi libram unam ad consistentiam requisitam coquere; — Du. et *C.* Extracti grana octodecim, Aquae calidae uncias octo et Sacchari uncias viginti novem in solutione solvendas; — Fer. Extracti drachmas tres, Sacchari libras quatuor et Aquae libras duas cum dimidia; — *T.* Extracti semidrachmam, Aquae drachmas duas, Sacchari clarificati uncias novemdecim, calefac ad ebullitionem usque et absque despumatione syrupum adhuc bullientem per telam linteam filtra.

℞. Extracti Opii frigide parati partem unam.
Syrupi Sacchari partes quadringentas octoginta.
Commisce sensim, triturando in mortario marmoreo pistilli magni ope. (*Vm.*)

℞. Opii minutim concisi sesquiunciam.
Aquae . . . uncias octodecim.
Macera frigide ad perfectam solutionem usque, cola et partibus octo colaturae adde
Sacchari albi partes quindecim.
Solve in balneo aquae. (*Sw*.*)

Gabe, von zwei bis vier Drachmen, zweis oder mehrmals täglich.

Injectio Lactis opiata s. anodyna s. opiacea. (*E.*)

℞. Lactis recens obtenti uncias sex.
Syrupi Opii . . unciam unam
Commisce.

Potio narcotica. (*ParC.*)

℞. Syrupi Opii . . . semunciam.
Aquae Tiliae . . . uncias tres.
— Florum Aurantii unciam unam.
Misce.

Syrupus Opii emulsivus. (*Vm.*)

℞. Gummi Arabici . partem unam.
Opii . . . . . partes duas.
Tritura ut fiat cum
Aquae communis partibus quadraginta sex emulsio. Sepone et in liquore decanthato, blando igne, solve
Sacchari albi partes ducentas triginta sex.

Clyster leniens s. opiatum. (*E. Fi.*)

℞. Opii . . . . . grana duo.
Mucilaginis Gummi Arabici semunciam.
Lactis tepidi . . . uncias sex.
Fi. Opii granum unum, Gummi Arabici pulverati drachmam unam, Lactis vaccini uncias septem.

Haustus opiatus, Potio leniens. (*Au.*)

℞. Opii . . . . . granum unum.
Aquae . . . . unciam unam.
Dissolve. — Auf einmal, für einen Erwachsenen.

℞. Aquae purae . . semunciam.
— aromaticae,
Syrupi Opii,
singulorum drachmas duas.
Tincturae Opii . guttas decem.
Gabe, ein Kaffeelöffel.

Pomatum s. Unguentum leniens s. sedativum. (*Pie.*)

℞. Axungiae . . . . uncias tres.
Syrupi Opii . . unciam unam.
Essentiae Rosarum guttas quatuor.
Bei Entzündungen der Haut im Munde passend.

Syrupus pectoralis. (*Ca.*)

℞. Sennae,
Radicis Liquiritiae, singulorum uncias novem et drachmas tres.
Chinae electae uncias sex et drachmas tres.
Anisi viridis . uncias quinque.
Florum Sambuci . uncias tres et drachmam unam.
Summitatum Centaurii minoris sesquiunciam.
Ipecacuanhae drachmas quinque.
Aquae . . . quantum sufficit.
Coque per longum tempus et colaturae adde
Sacchari albi . . . libras octo.

Extracti Opii gummosi drachmas quatuor cum dimidia.

Gabe, einen halben Kaffeelöffel bis einen Eßlöffel, in einer halben Taſſe Pfopthee.

Syrupus pectoralis Maloeti. (GalH. *Bo. Ca. Pie.*)

℞. Jujubarum,
Dactylorum,
Passularum minorum,
singularum unciam unam.
Aquae . . . . quantum sufficit.
Coque, sub finem addendo
Capilli Veneris Canadensis
drachmas quatuor,
Liquiritiae . . drachmas duas.
Cola leviter exprimendo et adde
Sacchari crudi albi libras duas.
Fiat syrupus, cui adde
Extracti Opii cum Aquae pauxillo diluti . . . . . grana sex.
Coque leviter et cola. — Gabe, eine Unze in einer Taſſe Bruſtthee.

Infectio leniens. (*Ra.*)

℞. Capitum Papaveris . . no. 2.
Stipitum Solani nigri
drachmam unam.
Aquae communis libram unam.
Coque et colaturae adde
Extracti Opii
grana decem ad viginti.

Mixtura ad dysenteriam. (*Sw**.)

℞. Opii . . . grana duo ad tria.
Syrupi Papaveris unciam unam.
Aquae Chamomillae Romanae uncias sex.

Gabe, einen halben bis einen Löffel alle Viertelſtunden.

Collyrium narcoticum. (*Ca.*)

℞. Infusi Foliorum Hyoscyami semilibram.
Extracti Belladonnae grana octo.
— Opii . grana quatuor.

Potio febrifuga. (*Bo.*)

℞. Aquae destillatae Menthae,
— Florum Aurantiorum,
— Valerianae,
singularum uncias duas.
Tincturae Castorei,
— Succini,
— Asae foetidae, singularum guttas viginti quinque.
Theriacae . drachmam unam.
Opii gummosi . sesquigranum.
Ammoniaci liquidi
guttas duodecim.
Syrupi Corticum Aurantiorum
unciam unam.

In zwei gleichen Doſen, am Tage des Anfalls, die eine vor, die andre eine Stunde nach denſelben zu nehmen. Man will damit Wechſelfieber geheilt haben, die der China widerſtanden hatten.

Syrupus Opii succinatus s. Karabe. (An. GalH. *Ca.*)

℞. Syrupi Opii . . libram unam.
Acidi succinici in Aqua dissoluti
scrupulum unum.
Misce exacte. (An.)
Ca. Acidi scrupulos duos.
℞. Syrupi Opii . . libram unam.
Spiritus Succini scrupulos duos.
Misce. (GalH.) —

Gabe, eine halbe bis eine Unze in einer Potion.

Pomatum s. Unguentum ad haemorrhoides s. antihaemorrhoidale. (*Pie.*)

℞. Extracti Opii in Aquae pauxillo dissoluti . . . semidrachmam.
Cochlearum calcinatarum
drachmam unam.
Unguenti populei uncias quatuor.
Cum Vitello Ovi unius subige.

Linimentum anodynum. (*Ra.*)

℞. Extracti Opii gummosi
drachmas tres.
Unguenti Althaeae unciam unam.
Balsami tranquilli,
Olei Amygdalarum dulcium,
singulorum uncias duas.

Dieſe Salbe wurde von Boyer angewendet.

Mixtura sedativa. (*Sw.*)

℞. Aquae Florum Aurantiorum uncias sex.
Extracti Opii . . . grana tria.
Aetheris sulphurici
drachmam unam.
Sacchari albi . . semunciam.

Löffelweiſe alle Stunden oder zwei Stunden.

Collyrium anodynum s. leniens s. sedans. (Ful. *E. Vm.*)

℞. Mucilaginis Cydoniorum unciam unam.
Extracti Opii aquosi granum unum.
Camphorae cum gutta una Olei tritae . . . . . grana duo.
Aquae Rosarum . . uncias duas.

Extractum et camphoram mixta cum mucilaginis parte una in emulsionem redige, cui alternatim adde mucilaginem et aquam rosarum. (Ful. *Vm.*)

E. Opii granum unum, Camphorae quinque et Mucilaginis Gummi Arabici unciam unam.

Looch s. Linctus compositus. (*Ra.*)

℞. Looch albi . . uncias quatuor.

Extracti Opii . granum unum.
— Cinnae grana quatuor.
Camphorae . . . . grana sex.
Bei Bronchitis mit heftigem Husten und vieler Schleimabsonderung.

§. II. Präparate, welche das Opium unzerfällt, roh oder gereinigt, enthalten.

A. Präparate, in denen die Wirkung des Opiums gar nicht, oder wenigstens nicht merklich, durch fremde Substanzen verändert ist.

Pulvis opiatus s. thebaicus s. Cretae compositus cum Opio s. Cornu Cervi usti cum Opio s. anodynus. (Bor. DD. Ed. Gen. Han. Lon. LonN. Suec. WW. *Br. C. E. Vm.*)

℞. Opii puri . . . partem unam.
Sacchari pulverati partes viginti.
Misce. (DD. WW.)

Gen. Opii partem unam et Sacchari viginti tres.

℞. Opii . . . . . partem unam.
Pulveris gummosi partes novem.
Misce exacte. (Bor. Han.)

℞. Opii . . . . . partem unam.
Sacchari albi . . partes duas.
Pulveratis adde
Pulveris gummosi partes duodecim.
Misce. (Suec.)

℞. Opii . . . . . partem unam.
Cornu Cervi calcinati
partes novem.
Pulvera. (*Br.*)

Lon. LonN. Opii partem unam, Cornu Cervi usti octo et unam Coccionellae.

℞. Opii . . . . . partem unam.
Calcariae subcarbonicae praeparatae . . . . . partes novem.
Contere. (Ed.)

℞. Opii . . . . . partem unam.
Pulveris Cretae compositi
partes triginta novem.
Misce bene. (Lon. LonN. *C. Vm.*)

℞. Cretae praeparatae
sesquidrachmam.
Cinnamomi . drachmam unam.
Piperis longi . . . grana octo.
Opii . . . . . grana sex.
Fiant doses duodecim. (*E.*)

Pilulae opiatae s. ex Opio s. anodynae. (Am. BorC. DD. Ed. Fer. Han. WW. *Au. Br. O. E. Sa. Vm.*)

℞. Pulveris Opii . . grana decem.
— Succi Liquiritiae
drachmam unam.
Fiant pilulae octoginta, quarum quatuor opii granum unum continent. (WW.)

DD. Opii grana decem et Succi Liquiritiae scrupulum unum; — BorC. et *Au.* Opii grana decem et Succi scrupulos quatuor; — Han. et *Br.* Opii partem unam et quatuor Extracti Liquiritiae; — *Sa.* Opii unam et tres Extracti Liquiritiae; — Fer. Opii unam et sex Extracti.

℞. Opii . . . . partes quatuor.
Solve frigide in
Aquae . . . partibus novem.
Solutioni colatae adde
Micae Panis albi partes duodecim.
Sepone per aliquot tempus, tunc cola exprimendo et adde
Amyli . . . . . partes tres.
Sacchari . . . partem unam.
Fiant pilulae. (*Vm.*)

℞. Opii . . . . . partem unam.
Extracti Liquiritiae partes septem.
Mollefactis singulo separatim in Alcohole tenui adde
Pulveris Piperis Jamaicensis
partes quinque.
Fiant pilulae granorum quinque. (Ed. *Br.*)

℞. Opii . . . . drachmam unam.
Saponis . . . grana duodecim.
Aquae . . . quantum sufficit ut fiant pilulae sexaginta. (Am. *C. E.*)

Conditum s. Opiatum antiepilepticum. (*Sw*[+].)

℞. Opii . . . . semidrachmam.
Valerianae . . . sesquiunciam.
Syrupi Papaveris quantum sufficit.
Gabe ein Kaffeelöffel zwei oder drei Mal täglich.

Unguentum s. Pomatum opiatum, Ceratum opiatum. (B. *Ca. E. Pie. Ra. Vm.*)

℞. Opii crudi pulverati
drachmam unam ad duas.
Cerati simplicis uncias quatuor.
Contere. (*Ra.*)

Vm. Opii partem unam et octodecim Cerati.

℞. Olei Olivarum
uncias duas cum dimidia.
Cerae flavae . . . uncias duas.
Liquatis simul adde
Opii crudi . . . . grana duo.
Misce bene. (B.)

℞. Opii crudi . . . grana viginti.
Vitellum Ovi . . . . . no. 1.
Subige et adde
Cerati Galeni . . uncias duas.
Misce triturando. (*Ca. Pie.*)

℞. Opii . . . . . grana quinque.
Rhei . . . . . grana decem.

Cerati simplicis . sesquiunciam.
Misce triturando. (*E.*)

Diese Salbe dient zum Verbinden von Wunden oder zum Einreiben auf Geschwülste, Excoriationen, Pusteln, welche heftige Schmerzen verursachen.

Unguentum opiatum. (*T.*)

℞. Opii crudi subtilissime pulverati unciam unam.
Axungiae praeparatae uncias decem.
Agita in mortario marmoreo ad extinctionem opii usque.

Unguentum sedativo-narcoticum s. narcoticum. (*B.*)

℞. Opii . . . . drachmam unam.
Succi gastrici vitulini quantum sufficit.
Digere leni calore per horas viginti quatuor et adde Axungiae Porci quantum sufficit ut fiat unguentum molle.

In Einreibungen auf die Oberbauchgegend, zu einer halben bis ganzen Drachme täglich, gegen Leibschmerzen, Cardialgie, Krampfkolik, Hysterie und Hypochondrie.

Unguentum anodynum s. antispasmodicum. (Gen. *Pie.*)

℞. Olei Olivarum uncias tres et sesquidrachmam.
Cerae drachmas sex cum dimidia.
Opii crudi bene divisi unciam unam.
Coque per horae quadrantem et cola exprimendo; residuum denuo coquatur in Aquae unciis quatuor ad duas redactis; tunc decoctum cum cerato opiaceo commisce. (*Pie.*)

Gen. Opii drachmam unam, Olei drachmas decem et Cerae flavae semunciam.

Bei nervösen, sogenannten asthenischen Affectionen empfohlen.

Unguentum s. Pomatum leniens. (*Sm.*)

℞. Olei Rosarum,
Axungiae Porci,
Cerae flavae,
singulorum uncias duas.
Leni igne liquatis adde
Opii depurati . drachmam unam.

Trenchin verband schmerzhafte Anschwellungen der Brüste damit und ließ es alle zwölf Stunden erneuern.

Suppositorium sedativum s. leniens. (*E.*)

℞. Opii . . . . . grana duo.
Saponis albi . . grana quatuor.

Man bringt es in den Mastdarm, wenn man kein Klystir geben kann.

Emplastrum Opii. (Ed. Ful. Li. Lon. LonN.)

℞. Emplastri Meliloti partes sedecim.
Lente liquatis, antequam refrigeratae sint, adde
Opii crudi pulverati partem unam.
Misce bene. (Li.)

Ful. Opii partem unam et Emplastri viginti quatuor.

℞. Opii pulverati . . semunciam.
Triturando commisce cum mixtura liquefacta e
Resinae Burgundicae unciis tribus.
Emplastri diachyli gummosi libra una.
Misce sedulo. (Ed. Lon.)

LonN. Aquae octarium addere et coquendo ad emplastri consistentiam redigere jubet.

Unguentum opiatum, Linimentum Opii cum Felle vitulino. (B^a. *Au.*)

℞. Opii pulverati . drachmas duas.
Digere calide per dies duos cum
Fellis vitulini . unciis duabus.
Adde deinde
Axungiae Porci . . uncias duas.
Olei Bergamottae guttas decem.

Von Brera als ein sehr gutes Linderungsmittel empfohlen.

B. Präparate, in denen die Wirkung des Opiums durch Zusatz reizender Substanzen mehr oder weniger verändert, bisweilen selbst ganz versteckt ist.

Trochisci bechici opiati s. opiacei. (Am. W. *C.*)

℞. Opii,
Balsami Peruviani,
singulorum drachmam unam.
Sacchari albi . drachmas duas.
Massae Trochiscorum bechicorum nigrorum . . uncias septem.

Opio cum balsamo et saccharo triturati adde massam in aqua calida mollefactam et trochiscos granorum decem ad quindecim forma. (Wür.)

Am. et *C.* Opii drachmas duas, Tincturae Balsami Tolutani semunciam, Syrupi Balsami Tolutani uncias octo, Extracti Liquiritiae, Gummi Arabici, singulorum uncias quinque ut fiant trochisci granorum decem.

Pilulae antiemeticae. (*Pie.*)

℞. Opii purificati . grana quatuor.
Radicis Colombo scrupulos quatuor.
Olei essentialis Menthae piperitae guttas decem.
Syrupi Caryophyllorum rubrorum quantum sufficit.

Fiant pilulae triginta. — Gabe, sechs Stück täglich, auf drei Mal.

Pulvis Nitri thebaicus s. sedativus s.

antispasmodicus Rosensteinii. (B. Ful. Li. Suec. *Sp.*)

℞. Opii . . . . . partem unam.
Nitri . . . partes quindecim.
Sacchari
partes quadraginta quinque.
Misce simul. (Ful.)

B*. et Suec. Opii partem unam, Nitri undecim et Sacchari quadraginta octo; — *Sp.* Opii unam, Nitri decem et Sacchari quadraginta octo; — Li. Opii unam, Nitri duodecim, et Sacchari quadraginta octo.

Pulvis anodynus. (Ham.)

℞. Opii puri . . . grana quatuor.
Magnesiae stibiatae drachmas duas.
Divide in partes octo. — Bei Rheumatismus empfohlen.

Pulvis antidysentericus. (*Vm.*)

℞. Opii,
Tartari stibiati,
singulorum partem unam.
Gummi Arabici,
Sacchari albi,
singulorum partes octo.
Misce. — Dieses und das vorhergehende Pulver haben, hinsichtlich der Wirkung, Aehnlichkeit mit dem folgenden.

Pulvis adstringens. (*B.*)

℞. Opii,
Ipecacuanhae,
singulorum granum unum.
Cascarillae . . . grana decem.
Drei oder vier Mal täglich, bei rebellischer Diarrhöe von Atonie.

Pilulae e Storace. (Br. Du. Gen. Pal. Sar. Suec. Wir. Würr. *Sp. Sw. Vm.*)

℞. Storacis Calamita . semunciam.
Succi Liquiritiae drachmas tres.
Olibani,
Benzoës,
Mastich s,
Extracti Opii,
singulorum drachmas duas.
Croci . . . drachmam unam.
Essentiae Succini quantum sufficit.
Fiat massa pilularis. (Br. Pal. Wir. *Sp.*)

Sar. Storacis semunciam, Succi Liquiritiae drachmas duas, Olibani, Benzoës, Myrrhae, Extracti Opii, singulorum drachmam unam, Croci scrupulos duos et Syrupi Papaveris quantum sufficit; — *Vm.* Benzoës, Myrrhae, Olibani, Opii, Croci, singulorum partem unam, Succi Liquiritiae partem unam cum dimidia, Storacis partes duas et Syrupi Sacchari quantum sufficit.

℞. Storacis Calamita . uncias duas.
Extracti Liquiritiae,
Croci, singulorum drachmas sex.
Opii . . . drachmas quinque.
Balsami Peruviani quantum sufficit.
Fiat massa pilularis. (Würr.)

℞. Storacis,
Croci,
Extracti Liquiritiae,
singulorum unciam unam
— Opii . drachmas quinque.
Tincturae Myrrhae
quantum sufficit.
Fiat massa pilularis. (*Sw.*)

℞. Storacis . . . drachmas duas.
Succi Liquiritiae drachmas tres.
Opii . . . . drachmam unam.
Vini Hispanici quantum sufficit ut fiat massa pilularis. (Suec.)

Du. Storacis drachmas tres, Croci et Opii, singulorum drachmam unam.

℞. Storacis,
Olibani,
Myrrhae, singulorum semunciam.
Opii,
Croci,
Extracti Liquiritiae,
singulorum drachmam unam.
Syrupi Papaveris quantum sufficit.
Fiat massa pilularis. (Gen.)

Reizend, Brustmittel. — Gabe, vier bis zwölf Gran.

Pulvis alexiterius s. anodynus s. diaphoreticus s. diapnoicus s. sudorificus s. sudorificus Doveri s. Doweri, Pulvis Doveri, Pulvis Ipecacuanhae opiatus s. thebaicus s. Ipecacuanhae et Opii s. compositus s. Ipecacuanhae cum Opio. (Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Würr. WW. *B. Br. C. Ca. E. Ft. Pie. Sa. Sp. Sw. Sy. T. Vm.*)

℞. Pulveris Opii purificati
partem unam.
— Ipecacuanhae partes duas.
— Sacchari albi
partes septem.
Misce bene. (Fer. GalM.)

A. D. et WW. Opii et Ipecacuanhae, singulorum partem unam et octo Sacchari; — DD. Opii et Ipecacuanhae, singulorum unam et viginti Sacchari; — *Pie.* Opii unam, Ipecacuanhae duas et Sacchari octodecim.

℞. Opii purificati,
Ipecacuanhae,
singulorum partem unam.
Kali sulphurici . . partes octo.
Pulverata seorsim commisce. (Am. Ba. Bor. BorG. Du. Ed. Fenn. Han.

HassP. Lon. LonN. Lus. O. Pol. RC. Suec. Wir. *Br. C.*)

Ams. B. Bel. Li. R. Sax. et Wür. Opii, Ipecacuanhae, singulorum partem unam et Kali sulphurici partes novem; — B. Opii, Ipecacuanhae, singulorum unam et decem Kali sulphurici; — Bor. Opii, Ipecacuanhae, singulorum unam, Kali sulphurici sedecim.

℞. Nitri,
Kali sulphurici,
singulorum partes quatuor.

Pulverata et mixta in crucibulum immitte et liqua, massam fluidam in mortarium ferreum infunde et fere refrigeratae adde

Pulveris Opii,
— Ipecacuanhae,
singulorum partem unam.

Fiat pulvis subtilissimus. (Gen. *Ca. Sa Sw. Sy.*)

Ham. et *E.* Salium cujusque partes octo et singularum duarum reliquarum substantiarum partem unam; — *Vm.* Nitri, Sulphatis, Ipecacuanhae, singulorum quatuor et unam Opii; — *An.* Salium, singulorum quatuor, Ipecacuanhae duas et unam Opii; — *His.* Sulphatis quatuor, Nitri sex, Ipecacuanhae unam et unam Opii.

℞. Kali sulphurici,
Nitri, singulorum partes quatuor.

Massae liquatae et refrigeratae adde

Pulveris Extracti Opii,
— Ipecacuanhae,
— Liquiritiae,
singulorum partem unam.

Fiat pulvis. (Gal. *Sp. Fi. T.*)

Sw. Sulphatis partes quatuor, Nitri tres et Pulverum singulorum unam.

Letztere Formel ist die von Dover gegebene.

Das Dover'sche Pulver, meist Ekel und Brechen erregend, wirkt schweißtreibend, wenn der Kranke sich gut bedeckt und warmes Getränk zu sich nimmt. Die Gabe, welche, abgesehen von individuellen und andern zufälligen Umständen, je nach der relativen Menge des Opiums, sehr verschieden ist, beträgt gemeiniglich zehen Gran bis eine halbe Drachme.

Pulvis diaphoreticus et sedativus. (*B.*)

℞. Pulveris Doweri,
— Jamesii,
singulorum grana quatuor.

Alle vier Stunden bei rheumatischen, syphilitischen und hartnäckigen Gichtschmerzen.

Boli sedativi s. diaphoretici. (*B. Sw.*)

℞. Pulveris Doweri grana viginti ad viginti quinque.
Syrupi Zingiberis quantum sufficit.

Morgens zu nehmen. (*Sw.*)

B. Pulveris Doweri grana sedecim et Roob Sambuci quantum satis ut fiant boli quatuor; vel: Pulveris grana duodecim et Extracti Aconiti sex ut fiant boli sex. — Alle zwei Stunden ein Stück.

Pulvis anodynus. (Ham.)

℞. Magnesiae . . drachmam unam.
Florum Zinci . grana sedecim.
Pulveris Ipecacuanhae,
Opii puri,
singulorum drachmas duas.

Misce sedulo. — Dieses Pulver hat viel Aehnlichkeit mit dem Dover'schen.

Mixtura antiodontica. (*Pie.*)

℞. Opii . . grana tria ad quatuor.
Croci . . . . semiscrupulum.
Myrrhae . . . semidrachmam.
Succi Malvae . . . semunciam.
Olei Amygdalarum dulcium
uncias duas.

Pie. praeterea: Camphorae et Opii, singulorum grana duo; Olei Caryophyllorum rubrorum sesquiunciam.

Beide Mixturen werden lauwarm in das Ohr eingespritzt.

Mixtura antiodontalgica. (*Sa.*)

℞. Opii puri . . . . semigranum.
Olei essentialis Caryophyllorum
guttas decem.
Liquoris Hoffmanni
sesquidrachmam.

Gebrauch, wie bei den vorhergehenden.

Unguentum anodynum s. ad haemorrhoides. (Ful. Wür. *Fi.*)

℞. Opii,
Croci,
singulorum scrupulum unum.
Vitellum Ovi . . . . . no. 1.
Unguenti populei,
— nutriti,
singulorum unciam unam.

Misce bene. (Ful.)

Fi. Unguenti nutriti, Unguenti populei, singulorum uncias sex, Opii pulverati drachmas duas, Croci scrupulos duos, Olei Ovorum, scrupulos quatuor; — Wür. Cerati Saturni uncias tres, Unguenti populei tantidem, Opii, Croci, singulorum drachmam unam et Vitellos Ovorum no. 3.

Besonders bei Hämorrhoidalschmerzen empfohlen.

Pilulae Opii saponaceae s. Saponis cum Opio. (Am. Lon. LonN. Wür. *C.*)

℞. Opii pulverati . . semunciam.
Saponis duri . . . uncias duas.

Fiat massa pilularis. (Lon. LonN.)

Am. et *C.* Opii drachmam unam et Saponis Alicantini grana duodecim ut fiant pilulae sexaginta.

℞. Opii purificati,
Pulveris Radicis Liquiritiae,
— — Hellebori albi,
— — — nigri,
singulorum semunciam.
Saponis Starkeyani
quantum sufficit
ut fiat massa pilularis. (Wür.)

Cataplasma antispasmodicum. (*Ca. Pie.*)

℞. Cataplasmatis Farinae Seminis Lini in decocto Capitum Papaveris et Croci decocti uncias quatuor.
Conspergo
Pulveris Opii crudi granis viginti.
— Camphorae semidrachma.

Emplastrum antispasmodicum. (*Au. E. Sa.*)

℞. Emplastri Cumini,
Cerae flavae,
singulorum unciam unam.
Opii,
Camphorae,
singulorum drachmas duas.
Commisce bene. (*Sa.*)

℞. Opii,
Camphorae,
singulorum semidrachmam.
Emplastri Lithargyri
drachmas duas.
Misce. (*E.*)

℞. Opii,
Camphorae,
Saponis albi,
singulorum drachmam unam.
Tincturae thebaicae
quantum sufficit
ut fiat massa mollis. (*E.*)

℞. Opii,
Extracti Hyoscyami,
singulorum drachmas duas.
— Cicutae . . semunciam.
Misce. (*Au.*)

℞. Opii,
Salis volatilis Cornu Cervi,
Camphorae,
singulorum semidrachmam.
Petrolei . . . drachmas duas.
Emplastri de Galbano crocati
unciam unam.
Misce. (*Au.*)

Balsamum antiodontalgicum. (Pal. Wir. *Au. Pie. Sm. Sp. Vm.*)

℞. Opii,
Camphorae,
singulorum scrupulos duos.
Dissolutis in Alcoholis pauxillo adde
Olei essentialis Caryophyllorum
drachmam unam.
Olei essentialis Guajaci
drachmas duas.
— Nucis moschatae expressi
drachmas sex.
Misce bene. (Pal. Wir. Ca. *Pie. Sp. Vm.*)

℞. Opii,
Camphorae,
singulorum scrupulum unum.
Olei Cajeput . drachmam unam.
— Nucis moschatae
drachmas tres.
Misce sedulo. (*Sm.*)

Man bringt ein wenig von diesem Balsam in die Höhle des cariösen Zahns.

Hierher gehört auch die *Sotirella parva*, von Br. und *Sp.* nach Minderer, wozu die Formel folgende ist:

℞. Opii,
Specierum diambrae,
singulorum drachmam unam.
Camphorae,
Croci,
singulorum grana duodecim.
Olei Caryophyllorum
guttas triginta.
— Nucis moschatae
drachmas duas.
Fiat opiatum spissum. — Man bringt ein Kügelchen davon in den schadhaften Zahn.

℞. Opii . . . . semidrachmam.
Extracti Belladonnae,
Camphorae, singulorum grana sex.
Olei Cajeput,
Tincturae Cantharidum,
singulorum guttas octo.
Olei Hyoscyami drachmam unam.
Man bringt ein wenig davon in den schadhaften Zahn. (*Au.*)

℞. Pulveris Mastichis,
— Sandaracae,
singulorum drachmas duas.
Sanguinis Draconis grana decem.
Opii . . . . . grana duo.
Olei Rorismarini . guttas octo.
Spiritus Cochleariae
quantum sufficit.
Man bringt etwas davon auf das schmerzhafte Zahnfleisch. (*Au.*)

Pilulae antispasmodicae. (Ful.)

℞. Opii,
Castorei,
singulorum grana quindecim.
Camphorae . . semidrachmam.
Extracti Valerianae,
— Vulvariae,
singulorum drachmas duas.
Tincturae Millefolii
quantum sufficit.
Gabe, zehen bis zwanzig Gran.

Boli antispasmodici. (*Pie.*)

℞. Opii . . . granum dimidium.
Camphorae . . . . grana tria.
Nitri . . . . . grana decem.
Conservae Rosarum
quantum sufficit.

Auf einmal.

Trochisci Chaussieri. (*Ca.*)

℞. Opii . . . . . grana sex.
Camphorae grana viginti unum.
Sacchari . . . drachmas tres.
Mucilaginis . quantum sufficit
ut fiant trochisci quinquaginta. — Bei Croup und Kehlkopfschwindsucht empfohlen. — Gabe, fünf bis sechs Stück täglich.

Trochisci Chaussieri. (*Ca. Sw.*)

℞. Opii . . . . scrupulum unum.
Camphorae . drachmam unam.
Sacchari . . drachmas novem.
Gummi Tragacanthae
semidrachmam.
Aquae . . . . quantum sufficit
ut fiat massa centum quinquaginta trochiscorum.

Gabe, vier bis sechs Stück täglich.

Pulvis antispasmodicus. (*Sw*.*)

℞. Opii . . . . . semiscrupulum.
Camphorae . . scrupulos duos.
Ammonii subcarbonici
scrupulos quatuor.
Amyli . . . grana quindecim.
Divide in partes octodecim. — Gabe, ein Stück alle Stunden in Münzenwasser.

Balsamum ad cancrum. (*Bo.*)

℞. Opii . . grana viginti quatuor.
Plumbi acetici crystallisati
uncias quatuor.
Camphorae . drachmam unam.
Essentiae Terebinthinae
uncias duodecim.
Digere per duos dies et filtra.

Unguentum Renal. (Pal.)

℞. Opii . . . . scrupulum unum.
Camphorae . . semiscrupulum.
Olei Scorpionum,
Succi Citri,
singulorum semunciam.
Unguenti populei sesquiunciam.
Misce. — Bei Steincolik empfohlen.

Emplastrum anodynum. (Br. *Sp.*)

℞. Emplastri Saponis,
Cerae flavae,
singulorum uncias quatuor.
Liqua et massae semirefrigeratae adde
Olei Tartari foetidi
drachmas quinque.
Opii pulverati . . semunciam.
Camphorae . . drachmas tres, in
Olei Seminum Hyoscyami
drachmis quinque
solutas. — Bei Gelenkkrankheiten empfohlen.

Pilulae orientales. (*Ca.*)

℞. Opii purificati,
Croci,
Cinnamomi,
Nucis moschatae,
Cardamomi minoris,
singulorum partes aequales.
Syrupi Florum Aurantii
quantum sufficit
ut fiant pilulae trium granorum. — Gabe, Abends zwei oder drei Stück.

Pilulae tonicae et hypnoticae. (*Pie.*)

℞. Opii,
Olibani,
Storacis,
Myrrhae,
Succi Liquiritiae,
singulorum scrupulos duos.
Amyli . . . . drachmas duas.
Gummi Tragacanthae,
— Arabici,
singulorum semunciam.

Gabe, ein halber Scrupel bis eine halbe Drachme.

Pilulae ad tussim Schroederi. (*Fi.*)

℞. Opii depurati,
Croci orientalis,
Myrrhae,
singulorum scrupulum unum.
Olibani,
Succi Liquiritiae,
singulorum drachmam unam.
Pulverata cum Syrupo Papaveris albi in massam redige. — Gabe, sechs bis zwölf Gran.

Pilulae de Cynoglosso s. Opii compositae, Catapotia ad catarrhos, Pilulae extracti Opii s. lenientes Mesues. (An. B*. Bel. Br. Gal. GalM. Han. His. Pal. Sar. Wir. *Ca. Pie. Sp. Vm.*)

1) Ohne Bibergeil.

℞. Corticis siccati Radicis Cynoglossi
unciam unam.
Seminum Hyoscyami albi,
Opii, singulorum drachmas duas.
Olibani . . . . drachmas sex.
Croci . . . drachmam unam.
Balsami Peruviani nigri
quantum sufficit.

Misce opium, seorsim pulveratum, cum reliquis substantiis, simul pulveratis et adde sensim balsamum ut fiat massa. (Sar.)

℞. Pulveris Radicis Cynoglossi,
— Seminum Hyoscyami,
— Opii purificati,
singulorum semunciam.
Myrrhae . . . . drachmas sex.
Olibani . . drachmas quinque.
Storacis Calamita,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
singulorum drachmas duas.
Croci . . . . sesquidrachmam.
Syrupi Violarum quantum sufficit ut fiat massa pilularis, cujus drachma quaeque, Opii et Hyoscyami, singulorum grana octo continet. (*Sp.*)

B*. Br. Pal. et Wir. eandem formulam indicant, sed B*. Myrrhae et Olibani, singulorum drachmas duas; — Br. Pal. et Wir. Succi Cynoglossi et Syrupi Violarum quantitatem aequalem.

℞. Pulveris Radicis Cynoglossi,
— Seminum Hyoscyami,
— Opii,
singulorum unciam unam.
— Myrrhae,
— Olibani,
singulorum sesquiunciam.
— Storacis Calamita,
— Caryophyllorum,
— Cinnamomi,
singulorum semunciam.
Syrupi Sacchari quantum sufficit ut fiat massa pilularis. (Han.)

2) **Mit Bibergeil.**

℞. Extracti Opii aquosi
drachmas tres.
Corticis Radicis Cynoglossi
uncias duas.
Croci . . . drachmas quinque.
Castorei . . . . drachmas sex.
Syrupi Sacchari drachmas novem.
Fiat massa, cujus quisque scrupulus Opii grana duo continet. (His)

Dieß iſt die einzige Formel, welche das Schierlingskraut weglaßt.

℞. Radicis Cynoglossi,
Seminum Hyoscyami,
Extracti Opii vinosi,
singulorum partes quatuor.
Castorei,
Croci, singulorum partem unam cum dimidia.
Olibani . . . partes quinque.
Myrrhae . . . . partes sex.
Syrupi Sacchari quantum sufficit ut fiat massa pilularis. (*Vm.*)

℞. Myrrhae . . . . sesquiunciam.
Olibani . . . drachmas decem.
Radicis Cynoglossi,
Seminum Hyoscyami nigri,
Opii, singulorum unciam unam.
Castorei,
Croci, singulorum drachmas tres.
Syrupi Sacchari quantum sufficit ut fiat massa pilularis. (Bel.)

℞. Radicis Cynoglossi,
Seminum Hyoscyami albi,
Opii purificati,
singulorum semunciam.
Myrrhae . . . drachmas sex.
Olibani . . drachmas quinque.
Croci,
Castorei,
singulorum drachmas duas.
Syrupi Violarum,
— Cynoglossi,
singulorum quantum sufficit ut fiat massa pilularis. (Br. Pal. Wir.)

Gal. GalM. *Ca.* et *Pie.* eandem indicant formulam sed loco opii purificati extractum vinosum et loco syruporum dictorum illum Opii, praeterea Croci et Castorei semidrachmam et pondus pilularum granorum quatuor adhibent.

℞. Myrrhae . . . drachmas sex.
Olibani . . drachmas quinque.
Corticis radicis Cynoglossi
semunciam.
Croci,
Castorei,
singulorum sesquidrachmam.
Pulverata seorsim commisce, adde
Seminum Hyoscyami nigri contusorum . . . . semunciam.
et cola totum per cribrum: tum

℞. Opii depurati . . . semunciam.
Aquae destillatae drachmas duas.
Solve blando calore in mortario marmoreo, addendo
Syrupi Opii . . unciam unam.
Admisce pulveres et adde praeterea Syrupi Opii quantum satis ut fiat massa bene subigenda. (An.)

Fi. läßt die radix cynoglossi ganz weg, da ſie durch Trocknen das narkotiſche Princip verliere, und ſubſtituirt ihr die capita Papaveris auf folgende Weiſe:

℞. Opii puri,
Capitum Papaveris albi,
Seminum Hyoscyami albi,
Cinnamomi,
singulorum unciam dimidiam.
Gummi Myrrhae drachmas sex.
Olibani in lacrymis
drachmas quinque.
Storacis in lacrymis,
Caryophyllorum,
singulorum drachmas duas.
Syrupi Succi Violarum
quantum sufficit ut fiat massa pilularis.

Dieſe berühmten Pillen ſind als Beru-

higungsmittel bei Catarrhen, Blutſpeien und Harnſtrenge ſehr in Gebrauch.

Pilulae ad sputum sanguinis Deckers. (Fi.)

℞. Pilularum de Cynoglosso (*Fi.*) drachmas duas.
Laudani nepentes Quercetani grana sex.
Croci orientalis scrupulos duos.
Succi Liquiritiae unciam dimidiam.

Succum liquiritiae in aqua destillata calida solutum cum reliquis conjunge, ut fiat massa, in pilulas sexaginta aequales dividenda. — Gabe, eine bis drei täglich.

Emplastrum contra colicam s. ad tormina ventris. (Sw.)

℞. Emplastri diachyli simplicis uncias duas.
Galbani . . . . unciam unam.
Olei essentialis Carvi drachmas duas.
Liquatis adde
Opii . . . . drachmam unam.

Bei Windcolik, Diarrhoe und Ruhr empfohlen.

Emplastrum anodynum. (Sp.)

℞. Emplastri diapompholigos unciam unam.
Fuliginis . . scrupulos quatuor.
Opii pulverati drachmam unam.
Ammonii subcarbonici scrupulos duos.

Malaxa cum olei Solani sufficiente quantitate. — Decker empfahl es bei Krebs.

Emplastrum odontalgicum. (Br. Sar. Wir.)

℞. Tacamahacae,
Elemi,
Mastichis,
singulorum unciam unam.
Opii . . . . , drachmas duas.
Misce triturando cum
Terebinthinae Venetae drachmis duabus.

Bei Zahn-, Kopfſchmerzen und catarrhaliſchen Ausflüſſen empfohlen. Man ſtreicht es mittelſt eines erwärmten Spatels auf Taffet und bringt es ſo auf die Wangen und die Schläfe.

Hierher kann man auch das *Emplastrum ad tempora* Br. zählen, welches nach folgender Formel bereitet iſt:

℞. Resinae Animae,
— Carannae,
— Elemi,
Mastichis,
Storacis Calamitae,
Succini,
singulorum drachmas duas.
Terebinthinae . drachmas tres.
Opii crudi,
Balsami Peruviani,
singulorum drachmam unam.
Olei Caryophyllorum,
— Succini,
singulorum guttas tres.
Fiat emplastrum. (Br.)

℞. Opii siccati . . unciam unam.
Mastichis,
Sandaracae, singulorum drachmas duas et grana septem.
Sanguinis Draconis semidrachmam.

Pulverata seorsim et commixta humecta cum Olei Rorismarini guttis octo, contunde deinde totum in mortario marmoreo, sensim affundendo Spiritus Cochleariae quantum satis ut massa mollis obtineatur.

Auch gehören hierher noch das *Emplastrum cephalicum*, *Emplastrum opiatum*, welche man bei B. Bel. Bor. Bor4. Han. O. Sax. *Sp. Vm.* findet, und deren Zuſammenſetzung ſehr verſchieden iſt:

℞. Elemi,
Mastichis,
Olibani,
singulorum uncias quatuor.
Benzoës . . . . uncias duas.
Terebinthinae . . . uncias sex.
Liquatis in balneo aquae adde
Balsami Peruviani . semunciam.
Opii pulverati . unciam unam.
Misce bene. (B. Bel. Han. O. Sax.)

Bor. Balsamum Peruvianum omittit; — *Vm.* Balsami Peruviani partem unam, Opii duas, Benzoës quatuor, Elemi, Mastichis, Olibani, Terebinthinae, singulorum octo; — Bor4. Terebinthinae drachmas tres, Elemi, Olei Olivarum Provincialis, singulorum drachmam unam, liquatis adde Mastiches, Olibani, singulorum pulv. drachmas duas, Benzoës drachmam unam, massae homogeneae adde Opii pulv. drachmam dimidiam.

℞. Tacamahacae,
Styracis liquidae,
Mastichis,
Carannae, singulorum partes octo.
Balsami Peruviani partes quatuor.
Opii,
Olei Succini rectificati,
singulorum partem unam.

Pulveribus carannae, mastichis et tacamahacae in mortario calefacto mixtis adde subigendo styracem et balsamum, tunc opium et oleum. (*Vm.*)

Vm. praeterea Opii partem unam, Balsami Peruviani duas, Benzoës, Terebinthinae, singulorum tantidem, Ele-

mi, Olibani et Tacamahacae, singulorum quatuor; — *Sp.* Tacamahacae, Carannae, Storacis Calamitae, Mastichis, singulorum unciam unam, Terebinthinae drachmas duas, Opii scrupulos quatuor, Balsami Peruviani semunciam et Olei Succini drachmam unam.

Unguentum hypnoticum. (Wir.)

℞. Unguenti alabastrini,
— rosati,
singulorum semunciam.
— populei . uncias duas.
Olei Hyoscyami . . semunciam.
— Juglandis sesquidrachmam.
Opii in Aqua Rosarum soluti
drachmam unam.
Croci . . . . semidrachmam.
Cerae albae . . . semunciam.

Diese Salbe wurde ehedem auf die Schläfe und die Handwurzeln, auf Leinwand gestrichen, aufgelegt.

Emplastrum regale. (Wir.)

℞. Cerae flavae . . sesquilibram.
Resinae Pini . . . semilibram.
Liquatis blando igne, liquorem cola et massae paullo refrigeratae adde
Pulveris Tacamahacae,
— Elemi,
— Olibani,
— Sanguinis Draconis,
singulorum unciam unam.
Adde deinde
Gummi Ammoniaci,
Galbani,
Opopanacis,
Bdellii,
Asae foetidae,
Resinae Hederae,
singulorum unciam unam.
Extracti Opii,
— Croci,
singulorum drachmas duas.

Solve totum in aceto vini, cola exprimendo; calefac ad mellis consistentiam usque et adde, continuè agitando,
Terebinthinae Venetae libram unam.
Gummi Tragacanthae uncias decem.
Castorei . . . . semunciam.
Ammonii subcarbonici
sesquiunciam.

Ehedem besonders bei Oedem empfohlen.

Trochisci Succini s. de Karabe. (Wir.)

℞. Opii,
Croci,
Myrrhae, singulorum drachmam unam et grana quindecim.
Cornu Cervi usti,
Corallii rubri,
Gummi Arabici,
— Tragacanthae,
Mastichis,
Laccae,
Succi Acaciae,
— Hypocistidis,
Balaustiorum,
Seminum Papaveris nigri,
singulorum drachmas duas.
Succini . . . . drachmas sex.
Mucilaginis Psyllii quantum sufficit ut fiat massa in trochiscos dividenda.

— Mesue empfahl diese Trochisken bei Blutflüssen, besonders bei Blutspeien und Mutterblutfluß, eben so bei Durchfall und übermäßigem Hämorrhoidalfluß. Jede Drachme enthält drei Gran Opium. Jetzt sind sie in Vergessenheit gekommen.

Pilulae antidysentericae. (Lus.)

℞. Opii,
Extracti Catechu,
— Bistortae,
— Angelicae,
— Contrayervae,
— Calami,
— Tormentillae,
— Zedoariae,
— Millefolii,
— Scordii,
— Corticis Granati,
— Rosarum rubrarum,
— Balaustiorum,
— Croci,
— Myrrhae,
— Rhei,
singulorum drachmas duas.
Olei Nucis moschatae
drachmas tres.
— Macidis . drachmam unam.
Balsami Peruviani
drachmas tres cum dimidia.
Olei Juniperi . drachmas duas.

Fiat massa pilularis. — Gabe, vier bis acht Gran, drei bis vier Mal täglich, für Erwachsene.

Electuarium mithridaticum, Antidotus mithridatica Damocratis. (Pal. Sar. Wir. *Sp.*)

℞. Myrrhae electae,
Croci,
Agarici,
Zingiberis,
Cinnamomi,
Nardi Indicae,
Olibani,
Seminum Thlaspi,
singulorum uncias decem.
— Dauci . uncias septem.
— Foeniculi,
— Anisi,
— Petroselini, singulorum uncias quinque.
— Seselios,

Seminum Hyperici, singulorum uncias duas cum dimidia.
Herbae Schoenanthi uncias octo.
— Pulegii,
— Scordii,
singularum uncias septem.
Radicis Costi Arabici,
— Gentianae,
singularum uncias octo.
— Calami,
— Asari,
— Valerianae,
singularum uncias tres.
— Mei
uncias duas cum dimidia.
Storacis,
Piperis longi, singulorum uncias octo.
— albi . . uncias septem.
Castorei uncias duas cum dimidia.
Succi Acaciae,
— Hypocistidis,
Malabathri, singulorum uncias octo.
Carpobalsami . . uncias septem.
Gummi Arabici,
Opii,
Cardamomi minoris,
Petalorum Rosarum rubrarum,
singulorum uncias quinque.
Trochiscorum cypheos
uncias septem.
Pulveratis et mixtis adde
Galbani,
Opopanacis, singulorum uncias octo.
Bdellii . . . . uncias quinque.
Sagapeni . . . . uncias tres.
Dilue in
Vini Hispanici
unciis quadraginta octo.
Commisce cum
Mellis unciis octingentis sexaginta antea tritis cum
Opobalsami,
Terebinthinae,
singulorum unciis octo.
Misce exacte. (*Sp.*) — Diese Formel ist aus Galen entlehnt.

℞. Radicis Aristolochiae rotundae,
— Valerianae, singularum uncias quatuor cum dimidia.
— Calami uncias quinque et drachmas tres.
— Gentianae uncias septem cum dimidia.
— Mei uncias tres et drachmas sex.
— Zingiberis
uncias quindecim.
Herbae Dictamni Cretici
uncias septem cum dimidia.
— Polii montani,
— Scordii Cretici,
singularum uncias decem cum dimidia.
Malabathri (Foliorum Indorum)
uncias duodecim.
Florum Hyperici
uncias tres cum dimidia.
— Stoechadis Arabicae
uncias duodecim.
— Rosarum rubrarum,
Nardi Celticae, singulorum uncias septem cum dimidia.
— Indicae uncias quindecim.
Schoenanthi . uncias tredecim.
Seminum Thlaspios
uncias quindecim.
— Seseleos uncias duodecim.
— Dauci Cretici
uncias decem cum dimidia.
— Petroselini Macedonici,
— Foeniculi, singulorum uncias septem cum dimidia.
— Anisi
uncias quatuor cum dimidia.
Baccarum Juniperi unciam unam.
Piperis longi . uncias duodecim.
— albi,
Carpobalsami, singulorum uncias decem cum dimidia.
Cardamomi minoris
uncias septem cum dimidia.
Croci . . . uncias quindecim.
Cinnamomi uncias quindecim cum dimidia.
Costi Arabicae uncias duodecim.
Cassiae ligneae
uncias decem cum dimidia.
Trochiscorum Agarici
uncias quindecim.
Castorei . . . uncias duodecim.
Scinci marini
uncias tres cum dimidia.
Myrrhae electae uncias sedecim.
Olibani . . . uncias quindecim.
Bdellii uncias decem cum dimidia.
Gummi Arabici
uncias septem cum dimidia.
Pulverata misce et cribra; tunc in Vini boni libris octo dissolve
Galbani,
Opopanacis,
singulorum uncias duodecim.
Sagapeni
uncias quatuor cum dimidia.
Succi Hypocistidis uncias duodecim.
— Acaciae . uncias quatuor.
Opii electi
uncias septem cum dimidia.
Solutionem misce cum
Mellis despumati
libris centum et sedecim.
Pulverem sensim, agitando continuè, admisce. Miscellae deinde infunde
Storacis in granis uncias duodecim dissolutae in

Terebinthinae claras
unciis quatuordecim.
Adde denique
Opobalsami . uncias duodecim.
Agita denuo per horas aliquot et in vase amplo fermentationi subjice. (Wir.)

Bei der folgenden Formel sind die Ingredienzen der Latwerge eben so classificirt wie beim Theriak.

1. Classe. Anisi . drachmas duas cum dimidia.
Zingiberis drachmas decem.
Macidis,
Caryophyllorum,
singulorum semunciam.
Gentianae drachmas quinque.
Pondus totius est unciarum tres et sesquidrachma.

2. Classe. Scordii Cretici
drachmas septem.
Nardi Celticae,
Seminum Petroselini, singulorum drachmas quinque.
Piperis longi unciam unam.
Pondus totum uncias tres et drachmam unam aequat.

3. Classe. Polii montani
drachmas septem.
Seminum Foeniculi
drachmas quinque.
Valerianae drachmas duas cum dimidia.
Pondus totum unciam unam et drachmas sex cum dimidia aequat.

4. Classe. Cinnamomi drachmas decem.
Zedoariae,
Seseleos,
singulorum unciam unam.
Rosarum rubrarum
drachmas quinque.
Pondus totum uncias tres et septem drachmas aequat.

5. Classe. Dictamni Cretici
drachmas quinque.
Cassiae ligneae,
Cubebarum,
Piperis albi, singulorum drachmas septem.
Seminum Thlaspios
drachmas decem.
Pondus totius quatuor uncias cum dimidia aequat.

6. Classe. Seminum Dauci
drachmas septem.
Cardamomi minoris
drachmas quinque.
Calami,
Aristolochiae rotundae,
Angelicae,
Hyperici, singulorum drachmas duas cum dimidia.
Pondus totum uncias duas et drachmas sex cum dimidia aequat.

Quaque harum sex miscellarum seorsim pulverata, pulvera seorsim quamque substantiarum sequentium:
Myrrhae,
Olibani,
Agarici,
Croci, singulorum drachmas decem.
Castorei . unciam unam.
Bdellii . drachmas septem.
Scinci marini concisi drachmas duas cum dimidia.
Recipe tunc
Nardi Indicae,
Schoenanthi, . singulorum drachmas decem.
Stoechadis Arabicae
unciam unam.
Minutim concisa imbibe Mucilagine Gummi Tragacanthae tunc sicca et pulvera.
Praeterea pulvera
Trochiscorum cypheos
drachmas septem
vel eorum ingredientium proportionem aequalem.
Dissolve deinde
Opii,
Gummi Arabici, singulorum drachmas quinque.
Succi Hypocistidis
unciam unam.
— Acaciae drachmas duas cum dimidia
in Vini Cretici sufficiente quantitate; adde
Mellis despumati . triplum ponderis totius, cum
Terebinthinae claras
uncia una
triti. Commisce sensim pulveres et adde denique
Storacis . unciam unam,
in Oleo Nucis moschatae et Vino dissoluti, et fermentationi subjice. (Pal.)

℞. Castorei,
Croci,
Olei Nucis moschatae,
Succini,
Terebinthinae Cypriae,
Galbani,
Myrrhae,
Gummi Arabici,
singulorum sesquiunciam.
Calami aromatici,
Costi Arabici,
Aristolochiae rotundae,
Valerianae,
Zedoariae,
singulorum unciam unam.
Foliorum Dictamni Cretici,
— Marrubii albi,
— Rutae,

Foliorum Serpylli,
— Pulegii,
Florum Junci odorati,
— Chamomillae,
— Polii montani,
— Stoechadis Arabicae,
— Tanaceti,
Seminum Ammi,
— Danci,
— Cardamomi minoris,
Cubebarum,
singulorum drachmas decem.
Opii electi . . drachmas sex.
Mellis albi . . triplum totius.
Vini Maderani quantum sufficit.

Opium in vino dissolutum melli calefacto adde, mixturae oleum nucis moschatae cum terebinthina liquatum tepidum infunde; pulveres cribri ope commisce et denique croco pulverato vino diluto addito, massam fermentationi subjice. (Sar.)

Dieſes Präparat, deſſen Erfindung man dem Mithridat, König in Pontus, zuſchreibt, von welchem Pompejus das Recept mit nach Rom brachte und welches Damocrates beſang, wurde gleich anfangs als giftwidrig, magenſtärkend, ſtärkend, ſchmerzſtillend, mit Einem Worte, als eine Panacee betrachtet. Alle neue Pharmacopöen laſſen es weg. Nach der Formel von Wir. enthält jede Unze drei Gran Opium und vier Gran Safran.

Julapium mithridaticum. (*Sa.*)

℞. Electuarii mithridatici
drachmas duas.
Julapii communis absque saccharo
uncias quinque.
Misce.

Theriaca, Electuarium theriacale magnum s. Opii compositum s. aromatico-opiatum s. opiatum s. thebaicum, Theriaca Andromachi, Confectio Opii, Electuarium opiatum polypharmacon. (Ams. Au. B. Ba. Bor. Bor4. Br. D. Ed. Fer. Gal. GalM. Gen. Han. HassP. Hi. Lon. LonN. Lus. O. Pal. Pol. R. Sar. Sax. Suec. Wir. *Br. C. Fi. Sp. Sw. Vm.*)

Der Name dieſes Präparats rührt von Ricander her; Andromachus verfertigte es auf Befehl Nero's nach dem ſchon lange vor ihm bekannten Mithridat. Die Formel dazu, wie ſie von Galen überliefert wurde, iſt folgende:

℞. Radicis Iridis Florentinae,
— Liquiritiae,
singularum uncias duodecim.
— Costi Arabici,
— Rhapontici,
Radicis Quinquefolii majoris,
singularum uncias sex.
Radicis Mei,
— Rhei,
— Gentianae,
singularum uncias quatuor.
— Aristolochiae uncias duas.
Herbae Scordii uncias duodecim.
— Schoenanthi,
— Marrubii,
— Dictamni Cretici,
— Calaminthae,
singularum uncias sex.
— Pulegii,
— Ivae,
— Chamaedryos,
Malabathri,
singulorum uncias quatuor.
Florum Rosarum rubrarum
uncias duodecim.
— Stoechadis . uncias sex.
— Hyperici uncias quatuor.
— Centaurii minoris
uncias duas.
Croci . . . . . uncias sex.
Carpobalsami . uncias quatuor.
Cinnamomi . uncias duodecim.
Cassiae ligneae,
Nardi Indicae,
singularum uncias sex.
— Celticae . uncias quatuor.
Piperis longi uncias viginti quatuor.
— nigri,
Zingiberis, singulorum uncias sex.
Cardamomi . . uncias quatuor.
Agarici,
Seminum Napi, singulorum uncias duodecim.
— Petroselini Macedonici
uncias sex.
— Anisi,
— Foeniculi,
— Nasturtii,
— Seseleos,
— Thlaspios,
— Amomi,
— Ammi,
singulorum uncias quatuor.
— Dauci . uncias duas.
Opii . . uncias viginti quatuor.
Opobalsami . uncias duodecim.
Myrrhae,
Olibani,
Terebinthinae,
singulorum uncias sex.
Storacis,
Gummi Arabici,
Sagapeni,
singulorum uncias quatuor
Asphalti,
Opopanacis,
Galbani, singulorum uncias duas.
Succi Acaciae,
— Hypocistidis,
singulorum uncias quatuor.

Castorei . . . . uncias duas.
Terrae Lemniae,
Vitrioli calcinati,
singulorum uncias quatuor.
Trochiscorum Scillae uncias quadraginta octo.
— Viperarum,
— Hedychroi. singulorum uncias viginti quatuor.

Tritura balsama, resinas et gummiresinas in Vini sufficiente quantitate ut puls spissa obtineatur, quam cum Mellis boni unciis nongentis et sexaginta exacte commisce. (*Sp.*)

Eine andre, noch längere Formel läßt die dazu kommenden Ingrebienzen in sechs Classen theilen, auf folgende Weise:

1. Classe. Radicis Iridis Illyricae,
Summitatum Scordii Cretici,
Seminum Napi, singulorum sesquiunciam.
— Anisi,
— Seseleos,
Polii Cretici,
singulorum semunciam.
Zedoariae electae drachmas sex.

Pondus totius semilibram et drachmas sex aequat.

2. Classe. Radicis Gentianae,
Herbae Chamaedryos,
Seminum Foeniculi Cretici,
— Amomi,
singulorum semunciam.
Radicis Quinquefolii majoris,
Summitatum Marrubii,
Calaminthae montanae,
singularum drachmas sex.

Pondus totius uncias quatuor et drachmas duas aequat.

3. Classe. Radicis Mei vel Angelicae,
— Valerianae,
Nardi Celticae,
Herbae Ivae,
Seminum Thlaspios,
singulorum semunciam.
Aristolochiae longae drachmas duas.
Dictamni Cretici drachmas sex.

Pondus totum uncias tres cum dimidia aequat.

4. Classe. Rosarum rubrarum sesquiunciam.
Florum Hyperici semunciam.
— Centaurii minoris,
Seminum Dauci Cretici,
singulorum drachmas duas.
— Petroselini Macedonici . . drachmas sex.
Trochiscorum Viperae uncias tres.
Trochiscorum Scillae uncias sex.

Pondus totum uncias duodecim et drachmas duas aequat.

5. Classe. Seminum Ammi,
Calami aromatici,
singulorum semunciam.
Cinnamomi sesquiunciam.
Cassiae ligneae,
Rhei,
singulorum drachmas sex.
Piperis longi . uncias tres.

Pondus totum uncias septem aequat.

6. Classe. Zingiberis albi,
Piperis nigri,
— albi,
singulorum drachmas sex.
Malabathri,
Cubebarum,
Cardamomi,
singulorum semunciam.

Pondus totius uncias tres et drachmas sex aequat.

Quâque harum miscellarum seorsim pulveratâ et pulverentur substantiae sequentes:

Myrrhae,
Olibani,
Croci orientalis,
singulorum drachmas sex.
Trochiscorum Agarici sesquiunciam.
Castorei,
Bituminis Judaici, singulorum drachmas duas.
Terrae Lemniae,
Chalcitidis usti,
singulorum semunciam.

Minutim concisa imbibantur Mucilagine Gummi Tragacanthae, et siccata pulverentur:

Schoenanthi,
Nardi Indicae,
Stoechadis Arabicae,
singulorum drachmas sex.

Pulverata seorsim commisce cum
Trochiscorum Hedychroi unciis tribus.

Dissolve in Vino Cretico
Gummi Arabici,
Sagapeni,
singulorum semunciam.
Opopanacis,
Galbani,
singulorum drachmas duas et solutionem spissam per cribrum sericeum cola. Denique repone
Terebinthinae Cypricae drachmas sex.
Storacis Calamita drachmas quatuor.

Quo facto omnes sex classes pulverum, pulveres trochiscorum hedychroi, et

variarum substantiarum seorsim contusarum, exceptis terra lemnia, croco et chalcite, commisceantur. Immitte deinde in lebetem magnum

Mellis despumati et tepidi
uncias sex

quas pistilli lignei magni ope in parietibus vasis ita extende ut obtegantur; infunde deinde in lebetem terebinthinam prope ignem fusam cum mellis et vini cretici parva quantitate, tunc solutionem gummatum, itidem cum ejusdem Vini pauxillo dilutam et leviter calefactam. Adde deinde

Succi Acaciae semunciam.
— Liquiritiae sesquiunciam.
— Hypocistidis semunciam.
Opii Aceti ope purificati
uncias tres

dissoluta seorsim in Vino cretico. Misce bene triturando, adde Mellis despumati et calidi libras aliquot et adjice lente pulverem, cribri arcte texti ope, subinde mel affundendo et continue agitando, ne grumae formentur; infunde deinde terram lemniam et chalcitem in Vino dilutas cum Olei Nucis moschatae pauxillo, tunc crocum itidem dilutum. Post agitationem mixturam immitte in vas, cujus nonnisi trientes duos vel quadrantes tres implet, ut fermentationi subjectum volumine augeri posset; agita primum quotidie per hebdomadem, tunc quolibet mense per annum unum, et tunc eo uti incipe. (Pal.)

Man findet dieselbe Formel bei His., jedoch ohne Angabe der Bereitung und ohne Classification der Ingredienzen.

℞. Radicis Fraxinellae,
— Scillae praeparatae,
singularum libras duas.
— Iridis Florentinae
libram unam.
— Quinquefolii . uncias sex.
— Calami,
— Valerianae,
singularum uncias quinque.
— Rhei,
— Zingiberis albi,
singularum uncias sex.
— Angelicae,
— Gentianae,
singularum uncias quatuor.
— Aristolochiae longae
uncias duas.
— Asari scrupulos sedecim.
Herbae Scordii Cretici
libram unam.
— Dictamni Cretici uncias sex.
— Chamaedryos
uncias quatuor.
— Marrubii albi,
Herbae Calaminthae montanae,
singularum uncias sex.
— Pulegii Cretici,
— Ivae,
singularum uncias quatuor.
— Centaurii minoris
uncias duas.
— Majoranae,
Herbae Mari,
singularum scrupulos sedecim.
Malabathri . . uncias quinque.
Florum Rosarum rubrarum
libram unam.
— Stoechadis Arabicae
uncias sex.
— Hyperici . uncias quatuor.
Seminum Napi . libram unam.
— Cardamomi uncias octo.
— Petroselini Macedonici
uncias sex.
— Anisi,
— Foeniculi Cretici,
— Ammi,
— Seseleos,
— Thlaspios,
singulorum uncias quatuor.
— Dauci Cretici uncias duas.
Schoenanthi . . uncias septem.
Nardi Indicae . . uncias octo.
— Celticae . uncias quatuor.
Piperis longi . . . libras duas.
— albi,
— nigri,
singulorum uncias sex.
Cardamomi minoris,
Carpobalsami vel Cubebarum
singulorum uncias quatuor.
Cinnamomi . . . uncias octo.
Costi Arabici . . uncias septem.
Ligni Aloës vel Xylobalsami
unciam unam.
— Aspalati scrupulos sedecim.
Trochiscorum Agarici
libram unam.
Myrrhae electae . uncias octo.
Olibani electi . . . uncias sex.
Mastichis . . . scrupulos octo.
Gummi Arabici uncias quatuor.
Bituminis Judaici . uncias duas.
Terrae Lemniae uncias quatuor.
Castorei . . . . . uncias duas.
Viperarum Italicarum libras duas.

Pulveratis simul omnibus his substantiis, schoenantho et nardo indica minutim concisis et cum gummi arabico in aqua dissoluto contusis, et lente desiccatis, pulvis cum priori commisceatur.

Pulveri rosarum rubrarum reposito et in vino diluto adde

Chalcitis vel Vitrioli ad alborem
usque calcinati uncias quatuor.

Croci Austriaci pulverati
uncias octo.
Ab altera parte in Vini Maderani sufficiente quantitate dissolve
Opii . . . . . libras duas.
Succi Liquiritiae libram unam.
— Hypocistidis,
— Acaciae,
Sagapeni,
singulorum uncias quatuor.
Galbani . . . . uncias duas.
Solutionibus colatis adde
Mellis despumati
libras centum sexaginta.
Pultem vinosam cum rosis, croco et chalcite paratam adde et tunc pulverem cribri ope admisce. Adde denique
Storacis in granis uncias quatuor dissolutas in
Terebinthinae claraе unciis sex.
Opobalsami vel hoc deficiente
Olei Nucis moschatae
unciis tredecim.
Agita per horam ut mixtura fiat perfecta et in vase magno, pluries per mensem agitando, fermentationi subjice. (Br. Wir.)

Außer diesen beiden Classificationen der Ingredienzen, von denen die eine auf die Gleichheit des Gewichts, die andere auf die Aehnlichkeit des Ursprungs gegründet ist, findet man noch bei Gal. eine, auf Aehnlichkeit der Natur und der Eigenschaften gegründete, welche dreizehen Abtheilungen begreift, nämlich:

1. Classe. Scharfe Substanzen.
Pulpae Scillae praeparatae uncias tres, drachmas quatuor et grana sexaginta.
Radicis Asari grana octoginta octo.
Agarici albi,
Seminum Napi sylvestris,
singulorum sesquiunciam.
— Thlaspios . semunciam.

2. Classe. Bittere Substanzen.
Myrrhae . . . unciam unam.
Summitatum Centaurii minoris
drachmas duas.
Radicis Gentianae . semunciam.
— Rhei . . . drachmas sex.
Herbae Scordii . sesquiunciam.
— Chamaedryos,
— Ivae,
Summitatum Hyperici,
singulorum semunciam.

3. Classe. Adstringirende Substanzen.
Petalorum Rosarum rubrarum
sesquiunciam.
Radicis Quinquefolii drachmas sex.
Succi Hypocistidis,
Succi Acaciae,
Chalcitis calcinati,
singulorum semunciam.

4. Classe. Ausländische Gewürze.
Cinnamomi
uncias duas cum dimidia.
Cassiae ligneae . unciam unam.
Zingiberis . . . drachmas sex.
Piperis longi . . . uncias tres.
— nigri . . . . uncias sex.
Amomi racemosi unciam unam.
Cardamomi . . . semunciam.
Malabathri . . . drachmas sex.
Schoenanthi
drachmas quatuordecim.
Nardi Indicae . unciam unam.
— Celticae . . semunciam.
Costi Arabici drachmas septem.
Acori veri . drachmas quinque.
Ligni Aloës grana octoginta octo.

5. Classe. Inländische Gewürze.
Croci . . . . unciam unam.
Corticis siccati Citri,
Calamintae montanae,
Dictamni Cretici,
Stoechadis Arabicae,
Marrubii albi,
singulorum drachmas sex.
Polii montani . . semunciam.
Mari,
Majoranae, singulorum grana octoginta octo.
Iridis Florentinae sesquiunciam.

6. Classe. Gewürze aus Dolbenpflanzen.
Seminum Petroselini Macedonici;
— Ammi,
— Foeniculi,
— Anisi,
— Seselios,
Radicis Mei,
singulorum semunciam.
Seminum Dauci Cretici
drachmas duas.

7. Classe. Harze und Balsame.
Xylobalsami . drachmam unam.
Carpobalsami . . . semunciam.
Opobalsami drachmas quindecim.
Olibani,
Terebinthinae de Chio,
singulorum drachmas sex.
Mastichis grana viginti quatuor.
Bituminis Judaici drachmas duas.
Storacis Calamita . semunciam.

8. Classe. Uebelriechende Substanzen.
Radicis Valerianae majoris
drachmas quinque.
— Aristolochiae tenuis,
Galbani,
Opopanacis,
singulorum drachmas duas.

Sagapeni . . . . semunciam.
Castorei . . . drachmas duas.

9. Klasse. Giftige Substanz.

Opii . . . . . uncias tres.

10 Klasse. Wirkungslose Erde.

Terrae Lemniae drachmas quatuor.

11. Klasse. Schleimharz, Satzmehl ꝛc.

Gummi Senegalensis drachmas quatuor.
Micae Panis triticei drachmas quinque et grana quinquaginta.
Farinae Orobi uncias duas drachmas tres et grana quindecim.
Carnis Viperarum uncias duas drachmas duas et grana viginti.

12. Klasse. Süße Substanzen.

Succi Liquiritiae sesquiunciam.
Mellis Narbonnensis libras decem cum dimidia.

13. Klasse.

Vini Hispanici libras duas cum dimidia.

Vinum in tres partes divide, in cujus una mel, in altera opium et in tertia denique gummata et succi solvantur; liquores tres seorsim colatos commisce, adde colcothar, deinde balsama et denique pulveres et massam per annum in vase clauso fermentationi subjice. (Gal.)

Das Opium bildet ungefähr den acht und achtzigsten Theil der Gesammtmasse, was etwas weniger als ein Gran auf die Drachme beträgt.

℞. Aristolochiae longae,
Bituminis Judaici,
Castorei,
Galbani,
Opopanacis,
Centaurii minoris,
Seminum Dauci sylvestris, singulorum partem unam.
Amomi racemosi,
Carpobalsami,
Corticis Citri,
Gummi Arabici,
Foliorum Chamaedryos,
— Ivae,
— Malabathri,
— Pulegii montani,
Florum Hyperici,
Nardi Celticae,
Calami,
Radicis Gentianae,
— Mei,
— Valerianae,
Sagapeni,
Seminum Ammi,
— Anisi,
Seminum Cardamomi minoris,
— Foeniculi,
— Seselios,
— Thlaspios,
Storacis Calamita,
Succi Acaciae,
— Hypocistidis,
Ferri sulphurici ad alborem calcinati,
Terrae Lemniae, singulorum partes duas.
Calamintae montanae,
Cassiae ligneae,
Costi Arabici,
Dictamni Cretici,
Foliorum Marrubii,
Zingiberis,
Myrrhae,
Nardi Indicae,
Olibani,
Piperis nigri,
Radicis Quinquefolii,
— Rhapontici,
Croci,
Seminum Petroselini Macedonici,
Schoenanthi,
Stoechadis Arabicae,
Terebinthinae, singulorum partes tres.
Agarici,
Balsami Meccaënsis,
Cinnamomi,
Foliorum Scordii,
Petalorum Rosarum rubrarum,
Iridis Florentinae,
Scillae,
Seminum Erucae,
Succi Liquiritiae, singulorum partes sex.
Seminum Orobi . partes novem.
Specierum Trochiscorum Hedychroi,
Opii,
Piperis longi, singulorum partes duodecim.
Mellis albi partes sexcentas septuaginta duas.
Vini Malacensis quantum sufficit.

Dissolve opium, succos acaciae, hypocistidis et liquiritiae in vini quantitate necessaria; galbanum, opopanacem et sagapenum primo sola deinde cum gummi vini ope in mucilaginem redacto et tunc cum opobalsamo et terebinthina in emulsionem redige; reliquas substantias pulveratas et cribratas commisce exacte, adde mel et emulsionem et cum quantitate sufficiente vini electuarium forma. (*Vm.*)

℞. Pulpae Scillae praeparatae sesquilibram.
Terebinthinae Cypricae,
Olei Nucis moschatae,

Succi Liquiritiae,
Opii,
Viperae siccatae,
singulorum uncias novem.
Cinnamomi,
Myrrhae, singulorum uncias octo.
Balaustiorum,
Benzoës electi,
Croci,
Gummi Arabici,
Olibani, singulorum uncias sex.
Angelicae,
Dictamni albi,
Costi Arabicae,
Contrayervae,
Serpentariae Virginicae.
Iridis Florentinae,
Gentianae,
Valerianae,
Calaminthae montanae,
Ivae,
Polii montani,
Scordii,
singulorum uncias quinque.
Baccarum Lauri,
Cardamomi minoris,
Seminum Citri,
— Petroselini Macedonici,
— Seselios,
singulorum uncias quatuor.
Vitrioli viridis ad alborem calcinati
drachmas decem.
Nardi Indicae,
Castorei, singulorum uncias duas.
Mellis albi . . triplum totius.
Vini Maderani quantum sufficit.

Pulvera quae possunt et pulverem per cribrum trajice; opio in vino soluto, solutionem cola et eam sensim cum oleo nucis moschatae et terebinthina simul liquatis melli blando igne liquato infunde et tunc pulverem admisce. (Sar.)

℞. Scillae pulveratae,
Iridis,
Scordii, singulorum uncias sex.
Radicis Zingiberis,
Dictamni Cretici,
Foliorum Rosarum rubrarum,
Myrrhae in lacrymis,
Radicis Gentianae,
Amomi,
Opii, singulorum uncias novem.
Spicae Nardi,
Calami, singulorum sesquilibram.
Croci uncias duas et drachmas duas.
Valerianae radicis
uncias tres et drachmas sex.
Piperis longi
uncias quatuor cum dimidia.
Cinnamomi . . . . sesquiunciam.
Seminum Anisi . . uncias octo.
Castorei,
Galbani,
singulorum drachmas tres.
Bituminis Judaici . uncias tres.
Storacis in lacrymis,
Sagapeni,
singulorum drachmas sex.
Vitrioli ferri ad siccum calcinati
[illegible]ias duas.
Mellis despumati
libras quinquaginta.

Mellis adhuc calidi parti uni duas specierum pulveratarum, continue agitando, ad perfectam conjunctionem usque admisce et deinde Opium in vino dissolutum adde et sic porro. (*Fi.*)

℞. Radicis Scillae siccatae
partes quatuordecim.
— Iridis Florentinae
partes sex.
— Zingiberis
partes viginti duas.
— Gentianae partes undecim.
— Calami
partes viginti quatuor.
— Valerianae,
— Rhapontici,
singulorum partes tres.
Cinnamomi partes quatuordecim.
Dictamni Cretici partes octodecim.
Scordii . . . . . partes octo.
Petalorum Rosarum rubrarum
partes duodecim.
Croci . . . . partes quatuor.
Seminum Anisi
partes quatuordecim.
Gummi Senegalensis partes viginti.
Olibani . . . . . partes tres.
Terebinthinae . . . partes sex.
Galbani . . . partes quatuor.
Balsami Peruviani liquidi,
Opii purificati,
Succi Liquiritiae,
singulorum partes sex.
Agarici albi partes quatuordecim.
Ferri sulphurici . . partes tres.
Castorei . . . . partem unam.
Mellis Narbonnensis partes sexcentas quinquaginta sex.
Vini Hispanici partes centum quinquaginta octo.

Pulverata solida misce, vinum in tres partes divide, in quarum prima mel blando calore liqua, in secunda balsamum et terebinthinam, in tertia opium dilue; liquores ambos postremos misce et cum Syrupo Mellis per panum colato commixtis adde sensim, continue agitando, pulverem. (GalM.)

℞. Scillae siccatae uncias quatuor.
Iridis Florentinae . semunciam.
Zingiberis,
Dictamni Cretici,
Nardi Indicae,

Stoechadis Arabicae,
Croci,
Myrrhae,
Gentianae,
Calami,
Mei,
Valerianae,
Nardi [illegible]lticae,
Amom[illegible]cemosi,
singulorum drachmas sex.
Piperis longi . . . uncias tres.
Scordii . . . . uncias quatuor.
Cinnamomi . . unciam unam.
Schoenanthi . sesquidrachmam.
Foeniculi . . . sesquiunciam.
Opii . . . drachmas undecim.
Castorei . . . drachmas duas.
Storacis . . . . . semunciam.
Balsami Meccaënsis uncias duas.
Sagapeni . . . . . semunciam.
Galbani . . . drachmas duas.
Vini Hispanici quantum sufficit.
Mellis albi . . . libras quatuor.

Dissolve opium in vino et mel in hujus liquoris libra una; reliquas substantias pulvera; balsamum, sagapenum et galbanum in balneo aquae liquata dilue in vino mellito et opiato, et admisce pulveres. (An.)

℞. Radicis Zingiberis,
— Iridis Florentinae,
— Nardi Indicae,
— — Celticae,
— Calami,
— Gentianae,
singulorum drachmas sex.
— Valerianae unciam unam.
— Scillae . . . uncias tres.
Foliorum Dictamni Cretici
drachmas sex.
— Calaminthae,
— Marrubii,
— Scordii,
singulorum uncias tres.
Seminum Anisi,
— Foeniculi,
singulorum unciam unam.
— Cardamomi minoris
drachmas sex.
Piperis longi,
Succi Liquiritiae,
Cinnamomi,
Bituminis Judaici,
Opii, singulorum uncias duas.
Storacis in granis,
Sagapeni,
Galbani,
singulorum drachmas tres.
Castorei . . . sesquidrachmam.

Pulvera omnes has substantias et in sartagine stannea lente liqua
Terebinthinae Cypricae uncias sex.
Adde sensim Mellis despumati tepidi quantum satis ut uncia quaeque pulveris duas cum dimidia, qui gradatim addendus est, contineat, tunc adde mixturam tepidam dies duos antea praeparatam cum
Gummi Arabici,
Vitrioli viridis in Aqua soluti,
Rosarum rubrarum,
Gallarum,
singulorum sesquiuncia.
Vini Hispanici . . . uncias sex.
Agita electuarium per dies circiter sex. (*Br.*)

℞. Radicis Valerianae,
— Contrayervae,
— Gentianae,
Poliorum Scordii,
Florum Chamomillae,
Cinnamomi electi,
Piperis,
Baccarum Juniperi,
Corticis Aurantii,
Seminum Anisi,
Myrrhae,
singulorum libram unam.
Chinae . . . . . libras quatuor.
Croci,
Ferri sulphurici ad alborem calcinati, singulorum libram unam.
Opii . . . . . libras duas.
Mellis Sambuci . . . libras sex.
— electi
libras quadraginta octo.

Melli cum Vini generosi sufficiente quantitate despumato adde mel sambuci, crocum et vitriolum, tunc opium in vino dissolutum et denique reliqua pulverata. (His.) — Jede Drachme enthält zwei Gran Opium.

℞. Radicis Angelicae . uncias sex.
— Serpentariae Virginicae
— Valerianae,
— Scillae,
— Zedoariae,
Cinnamomi (Cassiae cinnamomeae),
singulorum uncias duas.
Cardamomi minoris,
Myrrhae,
Croci,
Caryophyllorum,
Ferri sulphurici,
Opii, singulorum unciam unam.
Mellis despumati . . libras sex.

Melli leviter calefacto adde opium in Vini Malacensis sufficiente quantitate solutum et tunc reliqua pulverata. (B°. Bor. GalF. Han. HassP. O. Pol.) — Jede Unze enthält ungefähr fünf Gran Opium.

Bor4. Crocum omittit.

℞. Serpentariae Virginicae,
Contrayervae,
singulorum uncias sex.

Angelicae,
Valerianae,
Calami aromatici,
Gentianae,
Zedoariae,
singulorum uncias quatuor.
Cardamomi,
Myrrhae,
Macidis, singulorum uncias duas.
Opii in Vino Hispanico dissoluti
drachmas novemdecim.
Roob Sambuci uncias octoginta.
— Juniperi uncias quadraginta.
Syrupi Sacchari . . libras duas.
Misce bene. (R.)

℞. Radicis Angelicae . . uncias sex.
— Serpentariae Virginicae,
uncias quatuor.
— Scillae,
— Valerianae majoris,
Cinnamomi,
singulorum uncias duas.
Cardamomi minoris,
Myrrhae,
Croci,
Caryophyllorum,
Ferri sulphurici,
Opii, singulorum unciam unam.
Mellis despumati . . libras sex.
Melli parumper calefacto adde opium in Vino Hispanico dissolutum et tunc reliquas substantias pulveratas. (D.) — Jede Unze enthält etwa fünf Gran Opium.

℞. Radicis Angelicae . uncias octo.
— Gentianae . . uncias sex.
— Valerianae . uncias tres.
— Zedoariae,
Cardamomi minoris,
singulorum uncias duas.
Croci,
Succi Liquiritiae,
Myrrhae,
Opii, singulorum unciam unam.
Mellis uncias septuaginta quinque.
Dissolve succum, myrrham et opium in Vino Hispanico, solutionem cum melle calefac et adde, agitando continue, pulveres. (Fer. Suec. *Sw.*)

℞. Radicis Angelicae . partes sex.
— Serpentariae Virginicae
partes quatuor.
— Scillae,
— Zedoariae,
Cinnamomi,
Cardamomi minoris,
Myrrhae,
Croci,
Caryophyllorum,
singulorum partem unam.
Commisce intime cum
Mellis despumati partibus duodecim et quo momento praescribitur, unciae cuique adde
Tincturae thebaicae semidrachmam.
Misce bene. (Sax.)

℞. Opii sicci et pulverati
partem unam.
Vini generosi . partes quatuor.
Macera per duos dies in vase clauso, tunc adde
Mellis despumati
partes septuaginta duas.
Misce bene et adde, continue agitando, pulverem ex
Myrrhae,
Croci,
Protosulphatis Ferri,
singulorum parte una.
Caryophyllorum,
Cardamomi minoris,
Radicis Valerianae,
— Zingiberis,
singulorum partibus duabus.
— Angelicae,
— Gentianae,
singularum partibus sex.
Serva. (Ba.)

℞. Pulveris aromatici (Fabae Pichurim, Cardamomi minoris, Cinnamomi, singulorum pars una) uncias sex.
— Serpentariae Virginicae,
uncias tres.
Mellis despumati quantum sufficit.
Misce bene. (Lus.)

℞. Nucis moschatae,
Cardamomi minoris,
Zingiberis,
singulorum uncias duas.
Radicis Serpentariae Virginicae
uncias tres.
Opii in Vino Hispanico dissoluti
drachmas tres.
Mellis despumati pondus triplum pulverum. Misce. (Wir.)

℞. Opii pulverati . drachmas sex.
Piperis longi . . unciam unam.
Zingiberis . . . . uncias duas.
Carvi . . . . . uncias tres.
Syrupi Sacchari octarium unum.
Tritura opium cum syrupo calido et admisce pulveres. (B°. Lon.)

LonN. Tragacanthae contritae drachmas duas addit.

℞. Pulveris aromatici (e Cinnamomi partibus duabus, Cardamomi minoris, Zingiberis, Piperis longi, singulorum una) . uncias sex.
Serpentariae Virginicae uncias tres.
Opii puri in Vino Hispanico dissoluti . . . . drachmas tres.
Mellis despumati pondus triplum pulverum. Misce. (Gen.)

℞. Pulveris aromatici (Cinnamomi, Cardamomi minoris et Zingibe-

ris, singulorum partes aequales) uncias sex.
Serpentariae Virginicae uncias tres.
Opii in Vino Hispanico dissoluti semunciam.
Syrupi Zingiberis libram unam.
Misce bene. (Ed. C.)

B. et Bel. eandem formulam, sed loco syrupi Mel despumatum indicant.

℞. Pulveris aromatici (Cinnamomi, Nucis moschatae, Cardamomi minoris et Zingiberis, singulorum partes aequales) . uncias sex.
Serpentariae Virginicae uncias tres.
Opii in Vino Hispanico dissoluti drachmas tres.
Mellis despumati uncias viginti octo.
Melle et opio commixtis adde pulveres. (Ams.)

Der Theriak stand lange Zeit als eins der wichtigsten Arzneimittel in Ansehen, und wurde daher jedesmal unter besondern Feierlichkeiten und unter Aufsicht der Behörden bereitet. Heutzutage hat jeder Apotheker das Recht, ihn zu verfertigen, doch wird der mit Opium bereitete nur verabfolgt, wenn er von einem Arzte verordnet ist; im Gegentheil giebt der Apotheker nur eine analoge, aber ohne Opium bereitete Mischung.

Gabe, von einem Scrupel bis zu zwei und drei Drachmen, allein oder in Wein.

Extractum theriacale. (*Sa.*)

℞. Theriacae . . . quantum vis.
Alcoholis . . . quantum sufficit ut theriaca digitorum trium crassitiem tegatur; digere per dies tres, decantha alcoholem, exprime, liquores ambos commisce et in balneo aquae ad extracti consistentiam consume.

Nach Guilbert entzieht der Alcohol dem Theriak flüchtiges Oel, Harz, Terpentin, Balsam und ein grünes Oel. Diese Analyse ist offenbar sehr unvollständig.

Aqua theriacalis simplex. (Fer. *Br.*)

℞. Theriacae . . . unciam unam.
Dilue in
Aquae purae . . libris quatuor.
Destillando leni calore libras tres liquidi abstrahe. (*Br.*)

Fer. Theriacae unciam unam et Succi Omphacii libras quatuor; destillent librae tres.

Dieses Wasser gilt als giftwidrig, magenstärkend, Blähungen und Würmer treibend. Man wendet es besonders bei Wurmkrankheiten der Kinder, löffelweise, allein oder mit andern Zusammensetzungen an.

Aqua theriacalis romana s. Scordii composita s. theriacalis frigida. (Pal. Sar.)

℞. Theriacae Andromachi semilibram.
Succi Galegae,
— Acetosae,
— Scordii,
— Citri, singulorum libras sex.

Post horas viginti quatuor digestionis destillent. (Pal.)

Sar. Aquae Scordii libras quatuor, duas Succi Acetosae, Succi Galegae tantidem, Succi Limonum unam cum dimidia et Theriacae uncias quatuor cum dimidia.

Der Gebrauch ist wie bei'm vorhergehenden.

Aqua theriacalis composita. (Wir. *Fi. T.*)

℞ Theriacae Andromachi semilibram.
Radicis Angelicae,
— Valerianae,
— Carlinae,
— Imperatoriae,
— Zedoariae,
singularum unciam unam.
Herbae Scordii,
— Rutae,
singularum sesquiunciam.
Corticis recentis Citri uncias duas.
Baccarum Juniperi unciam unam.
Aquae purae . . libras decem.

Destillando libras sex elice. — Dieses Wasser unterscheidet sich von dem zusammengesetzten Angelikgeist nur durch die Abwesenheit des Alcohol.

℞. Foliorum recentium Rutae,
Dictamni Cretici,
Scordii,
Corticum recentium Aurantii,
Limonum,
Radicum Contrayervae,
Zedoariae,
Calami,
Galangae, singulorum semunciam.
Alcoholis 36° B. libras quatuor cum
Aquae pluvialis vel destillatae pondere aequali diluti.
Theriacae uncias octo in Succi Limonum pondere aequali dilutae.

Post horas 24 vel 30 macerationis in balneo aquae salito libras 6 destillando abstrahe. (*T.*) — Gabe, eine Drachme bis halbe Unze in einem passenden Vehikel als blähung-, wurmtreibend ꝛc.

Fi. Rutae, Dictamni, Scordii, Radicis Angelicae, Imperatoriae, singularum unciam unam, Contrayervae, Zedoariae, singularum semunciam, Corticis recentis Citri unciam unam, Baccarum Juniperi uncias quatuor, Alcoholis 25° libras duas, Succi Limonum libram unam, Aquae communis libras octo,

Theriacae uncias quatuor. — Gabe, eine halbe bis ganze Unze.

Spiritus theriacalis. (Br. Pal. Wir. *Sp.*)

℞. Theriacae Andromachi
uncias quatuor.
Vini albi . . uncias sexaginta.
Post sufficientem digestionem destillent unciae triginta. (Br. Wir. *Sp.*)

℞. Alcoholis concentrati
uncias decem.
Theriacae Andromachi
uncias quinque.
Myrrhae rubrae
uncias duas cum dimidia.
Croci . . . . . semunciam.
Post septem dies digestionis destillent in balneo aquae; adde, si necesse est, Camphorae drachmas duas. (Pal.)

Dieses Präparat unterscheidet sich von dem zusammengesetzten Angelikgeist fast gar nicht.

Essentia s. Tinctura theriacalis. (Br. Sar. Wir. *Vm.*)

℞. Theriacae . . . partem unam.
Aquae Vitae . . . partes tres.
Post aliquot dies infusionis filtra. (*Vm.*)

Sar. Theriacae partem unam et sex Aquae Vitae.

℞. Herbae Scordii,
— Dictamni Cretici,
Radicis Angelicae,
— Calami,
— Serpentariae Virginicae,
Nardi Indicae,
singularum drachmas tres.
Cinnamomi,
Cardamomi minoris,
Caryophyllorum,
singulorum sesquidrachmam.
Opii,
Croci,
singulorum drachmam unam.
Aquae Vitae . . libram unam.
Infunde frigide per plures dies et filtra. (Br. Wir. *Vm.*)

Reizend, magenstärkend. — Gabe, vierzig bis sechszig Tropfen. Eine Unze dieser Tinctur enthält fast fünf Gran Opium.

Emplastrum stomachicum. (*Sw.*)

℞. Theriacae Andromachi
unciam unam d duas.
Olei Nucis moschatae
drachmas duas.
Mixta supra pellem extende, cujus margo emplastro adhaesivo oblitus est.

Bei Magenkrampf und sogenannter Krampfcolik empfohlen.

Scutum stomachicum s. antispasmodicum. (*Pie. Sw.*)

℞. Theriacae . . . . uncias duas.
Pulveris Mais,
singulorum quantum sufficit.
Opii . . . . . grana tria.
Camphorae . . . . grana duo.
Misce. (*Pie.*) — Fouquet empfahl es bei Colik, chronischem Erbrechen und krampfhaften Magenbeschwerden.

℞. Theriacae . . . . uncias duas.
Nucis moschatae pulveratae
drachmas duas.
Misce. — Gleich dem vorhergehenden Magenpflaster angewendet. (*Sw.*)

Emplastrum antihaemorrhoidale. (*Pie. Sm.*)

℞. Opii . . . . . grana decem.
Theriacae . . . drachmas duas.
Misce. (*Pie.*)

Sm. Theriacae drachmas sex et Opii grana quatuor ad sex.

Man wendet dieses Pflaster auf den Nabel an; Balsalva soll es mit dem glücklichsten Erfolg gegen übermäßigen Hämorrhoidalfluß benutzt haben.

Topicum antispasmodicum et tonicum. (*Pie.*)

℞. Theriacae . . drachmas duas.
Opii,
Camphorae, singulorum grana sex.

Auf die Oberbauchgegend anzuwenden.

Cataplasma Fermenti Panis theriacale s. theriacale s. ad singultum. (His. *Sm.*)

℞. Fermenti Panis . . . uncias tres.
Theriacae . . . . semunciam.
Pulveris Juniperi,
— Rosarum rubrarum,
— Foliorum Menthae,
singulorum drachmas duas.
— Caryophyllorum,
— Nucis moschatae,
— Mucidis,
singulorum drachmam unam.
Aceti rosati . . quantum sufficit ut fiat cataplasma. (His.)

℞. Theriacae . . . . uncias duas.
Anisi virid s pulverati
drachmas duas.
Olei Caryophyllorum guttas octo.
Aquae Vitae camphoratae
quantum satis ad diluendum et cataplasmatis consistentiam praebendum. (*Sm.*)

Das erstere dieser beiden Cataplasmen wurde als Mittel gegen Schluchzen auf den Magen anzuwenden empfohlen. Das zweite rühmte Zimmermann gegen clavus hystericus.

Opiatum dysentericum. (*Sp.*)

℞. Theriacae Andromachi,

Diascordii, singulorum uncias duas.
Pulveris Gummi Arabici
semunciam.
Boli Armenae . . . uncias tres.
Misce sedulo.
Addendo Balsami Locatelli uncias duas, *Opiatum dysentericum balsamicum* obtinetur.

Das erstere ist bei einfacher, das letztere bei geschwüriger Ruhr empfohlen worden.

Electuarium adstringens. (*Bo. Ca. Pie.*)

℞. Theriacae,
Diascordii,
singulorum unciam unam.
Aquae destillatae Angelicae,
— — Valerianae,
— — Menthae,
singularum drachmam unam.
Gummi Tragacanthae
semidrachmam.
Syrupi Chinii sulphurici
quantum sufficit.

Adstringirend, von Bally bei Ruhr und chronischer Diarrhöe gepriesen. — Gabe, eine Drachme zwei oder drei Mal täglich, in Auflösung oder mit einem Löffel Wasser oder Bordeauxwein verdünnt. (*Ca. Pie.*)

℞. Balsami Locatelli,
Conservae Rosarum,
Theriacae,
Seminum frigidorum unciam unam.

Gabe, ein Kaffeelöffel alle vier Stunden, in einem Glase Schaafgarbenthee. (*Bo.*)

Mixtura theriacalis. (*Ra.*)

℞. Theriacae . . sesquidrachmam.
Gummi Arabici drachmam unam.
Aquae . . . . . uncias sex.
Syrupi Sacchari . unciam unam.

Löffelweise.

Potio cordialis. (*Bo. Ra.*)

℞. Theriacae . drachmam unam.
Infusi Melissae uncias septem.
Tincturae Cinnamomi
drachmas duas.
Syrupi Dianthi . unciam unam.
Misce. (*Ra.*)

℞. Aquae Artemisiae,
— Matricariae,
— Florum Aurantiorum,
singularum uncias duas.
— Cinnamomi hordeatae
semunciam.
Theriacae,
Confectionis hyacinthinae,
— Alkermes,
singularum scrupulum unum.
Trochiscorum Myrrhae
grana viginti quinque.
Macidis pulverati grana quindecim.
Elixir Proprietatis guttas triginta.
Misce bene. (*Bo.*)

Löffelweise.

Potio tonica. (*Pie.*)

℞. Theriacae . . drachmam unam.
Aquae Florum Aurantiorum,
— vel Vini,
singulorum unciam unam.

Auf einmal zu nehmen.

Potio antispasmodica. (*Pie.*)

℞. Theriacae . drachmam unam.
Syrupi Capitum Papaveris
drachmas sex.
Liquoris Hoffmanni,
Tincturae Succini,
singulorum guttas viginti.
Aquae Florum Aurantiorum,
— Matricariae,
— Rutae,
singularum uncias duas.

Löffelweise.

Tryphera magna. (*Sp.*)

℞. Opii . . . . . uncias duas.
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Galangae,
Nardi Indicae,
Zingiberis,
Costi Arabici,
Storacis,
Calami,
Cyperi rotundi,
Iridis Florentinae,
— nostratis,
Peucedani,
Mandragorae,
Lavandulae,
Rosarum,
Piperis,
Anisi,
Opii,
Foeniculi,
Petroselini Macedonici,
Dauci,
Basilici, singulorum unciam unam.
Mellis . . . quantum sufficit.
Pulverata cum melle intime commisce.

Eine schmerzstillende, von Galen angezeigte Latwerge, welche sich nur wenig vom Theriak unterscheidet.

Orvietanum. (Wir.)

℞. Radicis Aristolochiae longae,
— — rotundae,
— Angelicae,
— Bistortae,
— Carlinae,
— Contrayervae,
— Fraxinellae,
— Gentianae,
— Imperatoriae,

Radicis Quinquefolii,
— Serpentariae Virginicae,
— Tormentillae,
— Valerianae,
— Zedoariae,
Foliorum Cardui benedicti,
— Pulegii,
— Rutae,
— Sabinae,
— Scordii,
— Scabiosae,
Florum Hyperici,
Corticis Aurantiorum,
— Citri,
— Cinnamomi,
singulorum unciam unam.
Viperae siccatae . uncias duas.
Pulverata commisce cum
Roob Juniperi,
Mellis despumati,
singulorum libris tribus.
Bene mixtis adde
Theriacae Andromachi,
Mithridatici,
singulorum uncias duas.
Olei essentialis Rutae,
— Succini albi,
— Caryophyllorum,
— Juniperi,
singulorum scrupulum unum.

Dieſe Latwerge ſoll von Gieron. Ferrante aus Orvieto, wovon ſie den Namen führt, erfunden worden ſeyn. Sie enthält faſt gar kein Opium und verdankt ihre Wirkung lediglich der Menge reizender Subſtanzen, welche in ihr enthalten ſind. — Gabe, von zwei Drachmen bis zu einer halben Unze.

Pulvis s. Species Diascordii. (Sar.)

℞. Foliorum siccatorum Scordii sesquiunciam.
Petalorum Rosarum rubrarum unciam unam.
Boli Armenae . . uncias duas.
Cassiae ligneae,
Foliorum Dictamni Cretici,
Galbani,
Storacis Calamita,
singulorum semunciam.
Radicis Bistortae,
— Gentianae,
Gummi Arabici, singulorum drachmas quinque.
Opii . . . . drachmas duas.

Fiat pulvis, qui per cribrum trajiciatur.

Diascordium s. Electuarium diascordium s. e Scordio s. Scordii s. Scordii opiatum s. Fracastoris s. Mimosae Catechu compositum s. compositum Catechu, Confectio japonica s. diascordii, Conditum catechucicum, Electuarium Scordii opiaceum. (Ams. An. B. Bel. Br. Du. Ed. Fer. Gal. GalF. GalH. GalM. Gen. His. Li. Lus. Pal. Sar. Suec. Wir. Au. *Br. C. Ca. Fi. Sp. Sw. T. Vm.*)

1) Ohne Catechu.

℞. Radicis Bistortae,
— Tormentillae,
— Gentianae,
Herbae Dictamni Cretici,
singularum semunciam.
Herbae Scordii . unciam unam.
Seminum Acetosae sesquidrachmam.
Cinnamomi,
Cassiae ligneae,
singulorum semunciam.
Piperis longi,
Zingiberis,
singulorum drachmas duas.
Opii . . . . sesquidrachmam.
Gummi Arabici,
Galbani,
Storacis, singulorum semunciam.
Boli Armenae . sesquiunciam.
Terrae Lemniae unciam dimidiam.
Conservae Rosarum rubrarum libram unam.
Mellis despumati uncias triginta.

Dissolve opium, gummi arabicum et galbanum in Vini albi unciis tribus, commisce bene cum melle, addé reliqua pulverata et denique conservam rosarum. (Br. Pal. Sar. Wir. *Sp.*)

℞. Foliorum Scordii . uncias duas,
— Dictamni Cretici,
Gemmarum Rosarum,
Radicis Bistortae,
— Gentianae,
— Tormentillae,
singulorum semunciam.
— Zingiberis drachmas duas.
Seminum Acetosae sesquidrachmam.
Piperis longi . drachmas duas.
Cinnamomi,
Gummi Arabici,
Pulpae Cassiae,
Storacis Calamita,
Galbani, singulorum semunciam.
Extracti Opii . drachmas duas.
Boli Armenae . . uncias duas.
Mellis despumati,
Vini Hispanici,
singulorum quantum sufficit.

Radices, folia et semina concisa et contusa cum reliquis maceratis, solutis et bolo porphyrisata commisceantur. (*T.*)

Fi. Boli Armenae sesquiunciam, Herbae Scordii unciam unam, Storacis in lacrymis drachmas quatuor cum dimidia, Galbani, Gummi Arabici, Cinnamomi, Cassiae ligneae, Radicis Tormentillae, Bistortae, Gentianae, Foliorum Dictamni Cretici, Terrae sigilla-

tae rubrae, singulorum semunciam, Zingiberis, Piperis longi, singulorum drachmas duas, Opii, Seminum Acetosae, singulorum sesquidrachmam, Conservae Rosarum libram unam, Mellis despumati triplum pondus specierum. — Innerlich eine halbe Drachme.

℞. Foliorum Scordii . sesquiunciam.
Rosarum rubrarum,
Radicis Bistortae,
— Gentianae,
— Tormentillae,
Seminum Berberidis,
Cassiae ligneae,
Cinnamomi,
Dictamni Cretici,
Storacis Calamita,
Galbani,
Gummi Arabici,
singulorum semunciam.
Zingiberis,
Piperis longi,
Extracti Opii vinosi,
singulorum drachmas duas.
Boli orientalis praeparatae
uncias duas.
Vini Hispanici
libram circiter dimidiam.
Mellis rosati cocti . libras duas.

Dissolve galbanum in vini parva quantitate et mel in eo quod restat liquoris hujus, tunc adde pedetentim pulveres. (Gal *Ca*)

℞. Radicis Bistortae,
— Gentianae,
— Tormentillae,
singularum partes duas.
— Zingiberis partem unam.
Cinnamomi . . partes quatuor.
Herbae Dictamni Cretici
partes duas.
Foliorum siccatorum Scordii
partes sex.
Petalorum Rosarum rubrarum
partes tres.
Piperis longi . . partem unam.
Seminum berberidis,
Gummi Arabici,
Galbani,
Balsami Peruviani liquidi,
singulorum partes duas.
Opii purificati . partem unam.
Boli Armenae . . . partes octo.
Vini Hispanici . partes triginta.
Mellis partes centum viginti quinque.

Fiat electuarium. (GalM.)

℞. Zingiberis,
Gentianae,
Tormentillae,
Dictamni Cretici,
Mastichis,
Boli Armenae,
singulorum drachmam unam.
Opii . . . . . drachmas duas.
Cinnamomi . . . drachmas tres.
Foliorum Scordii,
Petalorum Rosarum rubrarum,
singulorum drachmas sex.
Mellis Rosarum
uncias viginti quatuor.

Pulveres cum melle commisce. (His.)

℞. Zingiberis,
Opii,
Piperis longi,
singulorum partem unam.
Gentianae,
Storacis Calamita,
singulorum partes duas.
Cinnamomi,
Dictamni Cretici,
Gummi Arabici,
Rosarum rubrarum,
Scordii,
Tormentillae,
singulorum partes quatuor.
Boli Armenae . . . partes octo.
Mellis albi partes centum viginti.

Tere opium cum Vino Hispanico ut fiat puls liquida, cum qua storacem cum gummi tritum in emulsionem contere; adde deinde mellis pauxillum, tunc pulveres commixtos et denique mel reliquum; calefac parumper et agita ad refrigerationem usque. (*Vm.*)

℞. Gentianae drachmas septem cum dimidia.
Cinnamomi . drachmas septem.
Opii crudi . . drachmas tres.
Vini albi . . . . uncias sex.

Post aliquot dies digestionis cola, leviter exprimendo, et colaturae adde
Pulveris Herbae Scordii uncias tres.
Mellis despumati uncias viginti.
Misce bene. (Li.)

2) Mit Catechu.

℞. Cinnamomi,
Piperis longi,
singulorum semunciam.
Catechu . . . uncias quatuor.
Herbae Scordii,
Radicis Tormentillae,
Gentianae, singularum uncias duas.

Pulverata misce et adde
Opii in Vino diluti
drachmas quinque.
Mellis puri
libras duas cum dimidia.
Vini Hispanici . quantum sufficit ut fiat electuarium. (*Br.*)

℞. Catechu . . . . uncias tres.
Radicis Tormentillae,
Nucis moschatae,
Olibani, singulorum uncias duas.

Opii in Vino Hispanico dissoluti sesquidrachmam.
Syrupi Corticum Aurantiorum quantum sufficit
vel pulverum pondus triplum. (Gen.)

℞. Foliorum Scordii,
Catechu,
Radicis Tormentillae,
singulorum uncias duas.
Nucis moschatae,
Cinnamomi,
Gummi Arabici,
singulorum unciam unam.
Opii in Vino Hispanico dissoluti
sesquidrachmam.
Mellis rosati uncias viginti octo.

Misce opium cum melle et adde reliquas substantias pulveratas. (Ams.)

℞. Herbae Scordii . . uncias tres.
Catechu,
Fabae Picharim,
Radicis Tormentillae,
singulorum uncias duas.
Opii . . . . sesquidrachmam.
Mellis . . uncias viginti octo.

Tritura opium cum Vino Hispanico, adde mel paullo calidum et admisce reliquas substantias pulveratas et mixtas. (GalF. Saec.)

℞. Catechu . . . uncias quatuor.
Kino . . . . . uncias tres.
Cinnamomi,
Nucis moschatae,
singulorum unciam unam.
Opii in Vino Hispanico dissoluti
sesquidrachmam.
Syrupi Rosarum rubrarum ad mellis consistentiam usque cocti
libras duas cum quadrante.

Misce. (An. B. Bel. Du. Ed. GalH. Lus. C. Ca. Sw.)

℞. Catechu . . . . . uncias tres.
Radicis Tormentillae,
Nucis moschatae,
Olibani, singulorum uncias duas.
Opii . . . . . semidrachmam.
Syrupi Rosarum quantum sufficit.

Fiat electuarium (An.)

℞. Foliorum Scordii,
Catechu, singulorum uncias tres.
Cinnamomi,
Radicis Tormentillae,
singulorum uncias duas.
Opii . . . . drachmas duas.
Mellis . . uncias viginti octo.
Vini Hispanici quantum sufficit.

Misce. (Fer.)

Nur das letztere Präparat führt den Namen Confectio Japonica, die übrigen werden Diascordium correctum genannt, das erste ausgenommen, welches vom Erfinder selbst ist.

Das Diascordium gilt als schweißtreibend, giftwidrig, schmerzstillend und styptisch. Man verordnet es besonders bei Diarrhöe und Ruhr, zu einer, zwei und drei Drachmen. Die Wirkung ist mehr von den adstringirenden Substanzen als von dem darin enthaltenen Opium abhängig.

Electuarium adstringens. (*Sa.*)

℞. Diascordii,
Sanguinis Draconis,
singulorum drachmas sex.
Aluminis,
Catechu,
Cinnamomi,
singulorum drachmas duas.
Syrupi Sacchari quantum sufficit
ut fiat electuarium.

Vinum opiaceum. (GalM.)

℞ Diascordii . . . partem unam.
Vini rubri partes viginti quinque.

Dissolve.

Clysma sedans et adstringens. (*B.*)

℞. Infusi Chamomillae uncias quatuor.
Vitellos Ovorum . . . . no. 2.
Diascordii . . drachmam unam.

Misce. — Bei passiven Bauchflüssen, vergeblichem Würgen, Magenschmerz und Krampfkolik.

Pilulae antiemeticae. (*Pie.*)

℞. Pulveris Menthae drachmas duas.
— Absinthii scrupulos duos.
— Balaustiorum
scrupulum unum.
Olei essentialis Cinnamomi
guttas duas.
Diascordii . drachmam unam.
Syrupi Cydoniorum
quantum sufficit
ut fiat massa pilularis. — Gabe, sechs Stück täglich, auf drei Mal.

Julapium sistens s, adstringens, Mixtura sistens s. Opii adstringens sanguinis s. ad vomitum sanguinis. (His. *Sa.*)

℞. Confectionis Japonicae (formula Ed.) . . . . drachmas tres.
Tincturae thebaicae
guttas quadraginta.
Sacchari albi . . semunciam.
Aquae alexiteriae uncias quatuor.
— Cinnamomi spirituosae
uncias duas.

Misce. (*Sa.*)

Die beiden folgenden Formeln gehören ebenfalls hierher, obgleich sie nur die einzelnen Bestandtheile der confectio japonica getrennt enthalten.

℞. Syrupi Capitum Papaveris
unciam unam.
Aquae Rhoeados . uncias septem.

Catechu . . sesquidrachmam.
Laudani liquidi Sydenhami
guttas viginti.
Misce. (*Sa.*)

℞. Aquae destillatae
uncias duas cum dimidia.
Aceti destillati . . semunciam.
Opii puri . . . . . grana duo.
Solutioni adde
Pulveris Corallii rubri
semidrachmam.
— Catechu semiscrupulum.
Syrupi Sacchari . unciam unam.
Misce fedulo. (His)

Theriaca coelestis Hoffmanni. (Br. *Sp.*)

℞. Extracti Radicis Angelicae,
— — Aristolochiae rotundae,
— — Contrayervae,
— — Inulae,
— — Gentianae,
— — Tormentillae,
— — Valerianae,
— — Vincetoxici,
— — Viperinae,
— — Zedoariae,
Foliorum Cardui benedicti,
— Centaurii minoris,
— Scordii,
singulorum drachmas tres.
Extracti Opii . unciam unam.
Resinae Cascarillae,
— Ladani,
singulorum drachmam unam.
Storacis Calamita drachmas tres.
Myrrhae . . . . . semunciam.
Galbani,
Mastichis,
Opopanacis,
singulorum drachmas tres.
Resinae Guajaci,
Croci, singulorum drachmam unam.
Castorei . . . semidrachmam.
Pulveris Viperae,
Salis volatilis Cornu Cervi,
— — Succini,
singulorum sesquidrachmam.
Camphorae,
Ambrae griseae,
singularum scrupulum unum.
Balsami Peruviani liquidi
drachmas tres.
Olei essentialis Caryophyllorum,
— — Corticis Citri,
— — Baccarum Juniperi,
— — Succini rectificati, singulorum guttas duodecim.
— — Cardamomi,
— — Cinnamomi,
— — Cubebarum,
— — Macidis,
Olei essentialis Nucis moschatae,
singulorum scrupulos duos.
Pulvera substantias pulverandas, resinas et balsama in mortario balnei aquae ope calefacto contunde, adde extracta, pulveri salia volatilia admisce et denique olea essentialia affunde. (Br.)

℞. Myrrhae electae . semunciam.
Galbani,
Mastichis,
Opopanacis,
singulorum scrupulos duos.
Storacis . . . . drachmas tres.
Extracti Cardui benedicti,
— Centaurii minoris,
— Scordii,
— Tormentillae,
— Contrayervae,
— Angelicae,
singulorum semunciam.
— Opii . . drachmas sex.
— Croci,
— Vincetoxici,
— Valerianae,
— Gentianae,
— Aristolochiae rotundae,
singulorum drachmas tres.
Resinae Ligni Aloës,
— Guajaci,
— Ladani,
singularum drachmam unam.
Antimonii diaphoretici,
Cinnabaris,
Succini praeparati,
Pulveris Viperae,
singulorum semunciam.
Salis essentialis Succini,
— — Cornu Cervi,
singulorum sesquidrachmam.
Olei essentialis Cinnamomi,
— — Zedoariae,
— — Cardamomi,
— — Cubebarum,
— — Macidis,
— — Caryophyllorum,
— — Baccarum Juniperi,
— — Citri,
singulorum guttas duodecim.
— expressi Nucis moschatae,
Balsami Peruviani,
singulorum drachmas tres.
Camphorae,
Ambrae griseae,
singularum scrupulum unum.
Misce. (*Sp.*)

Unterscheidet sich von dem Theriak, mit dem es Aehnlichkeit hat, besonders durch den Mangel des Zuckers und durch die Gegenwart von Salzen, welche auf das Opium einzuwirken vermögen; es enthält ungefähr 4 Gran Opium auf die Drachme. — Man hat es vornehmlich als schmerzstillend und

fäulnißwidrig gerühmt. — Gabe, zwei bis vierundzwanzig Gran in Pillen.

Electuarium Hyoscyami opiatum, Philonium Romanum. (His. Pal. Wir. *Fi. Sp.*)

℞. Piperis albi drachmas quinque.
Opii drachmas duas cum dimidia.
Cassiae lignese sesquidrachmam.
Seminum Hyoscyami albi drachmas quinque.
— Apii . drachmam unam.
— Petroselini Macedonici
— Foeniculi,
— Dauci Cretici, singulorum grana quadraginta quinque
Croci . . . scrupulum unum.
Nardi Indicae,
Pyrethri,
Zedoariae,
singulorum grana quindecim.
Cinnamomi . sesquidrachmam.
Euphorbii,
Myrrhae,
Castorei,
singulorum drachmam unam.
Mellis uncias octo et drachmas quatuor cum dimidia.
Misce. (Pal. Wir.)

℞. Radicis Pyrethri,
— Zedoariae,
— Doronici,
Balaustiorum,
singulorum unciam unam.
Piperis longi,
Seminum Hyoscyami albi,
singulorum uncias viginti.
Opii . . . . . uncias decem.
Euphorbii,
Castorei,
Margaritarum,
singulorum unciam unam.
Croci . . . . uncias quinque.
Mellis . . . . . uncias triginta.
Misce. (*Sp.*)

℞. Piperis albi,
Seminum Hyoscyami albi,
singulorum drachmas viginti.
Opii . . . . drachmas decem.
Croci orientalis drachmas quinque.
Castorei,
Spicae Nardi,
Radicis Pyrethri,
singulorum drachmam unam.
Mellis depurati libras duas cum dimidia.
Misce. (*Fi.*)

℞. Seminum Hyoscyami,
— Anisi,
— Foeniculi,
Myrrhae,
Castorei,
singulorum drachmas sex.
Opii . . . drachmas quinque.
Cinnamomi . . unciam unam.
Croci . . . . drachmas duas.
Florum Chamomillae drachmas tres.
Mellis despumati . libras duas.
Misce bene. (His.)

Jede Drachme enthält über anderthalb Gran Opium und vier Gran Bilsenkrautsaamen — Beruhigend, schmerzstillend, schlafbringend, ehedem besonders bei Windcolik, heftigem Husten und Convulsionen empfohlen. — Gabe, eine halbe bis eine Drachme. — Man wendete es auch in Klystir an.

Electuarium requies Nicolai. (Pal. Wir. *Fi. Sp. T. Vm.*)

℞. Florum Rosarum rubrarum,
— Violarum,
singulorum drachmas duas.
Opii,
Seminum Hyoscyami,
— Papaveris albi,
— Scariolae,
— Lactucae,
— Portulacae,
— Psyllii,
Corticis Radicis Mandragorae,
Nucis moschatae,
Cinnamomi,
Zingiberis,
singulorum sesquidrachmam.
Sacchari crystallisati (Candis) drachmam unam.
Ligni Santali albi,
— — rubri,
Spodii,
Gummi Tragacanthae, singulorum scrupulos duos et grana quinque.
Sacchari . . . . uncias decem.
Commisce cum Aqua Rosarum. (Pal.)

℞. Florum Rosarum rubrarum,
— Violarum,
singulorum drachmas sex.
Seminum Hyoscyami albi,
— Papaveris albi,
— Lactucae,
— Psyllii,
singulorum semunciam.
Corticis Radicis Mandragorae,
Nucis moschatae,
Cinnamomi,
Zingiberis albi,
Opii depurati,
singulorum drachmas tres.
Santali albi,
— rubri,
Gummi Tragacanthae,
Spodii, singulorum drachmas duas.
Sacchari albi . . uncias viginti.

Dissolve opium in Vini albi unciis tribus, adde pulveres, et admisce Sac-

charum in Aquae Rosarum unciis decem dissolutum. (Wir.)

℞. Radicis Mandragorae,
Florum Rosarum,
— Violarum,
Seminum Hyoscyami,
— Papaveris,
— Endiviae,
— Lactucae,
— Portulacae,
— Psyllii,
Opii,
Nucis moschatae,
Cinnamomi,
Zingiberis,
singulorum sesquiunciam.
Santali albi,
— rubri,
Spodii,
Gummi Tragacanthae,
singulorum drachmas sex.
Sacchari crystallisati (Candis)
unciam unam.
Julapii rosati
uncias viginti quatuor.
Misce. (*Sp.*)

℞. Gummi Arabici,
Opii, singulorum drachmas duas.
Zingiberis,
Nucis moschatae,
singulorum drachmas tres.
Cinnamomi . . drachmas sex.
Rosarum rubrarum
drachmas quatuordecim.
Seminum Papaveris albi recentium
drachmas octodecim.
Mellis albi uncias quatuordecim.
Misce pulveres, gummi arabici et semina papaveris cum opio, contere totum cum melle et reliquos pulveres commixtos adde. (*Vm.*)

℞. Mellis albi partes triginta duas.
— despumati,
Seminum Anisi,
Calcis subcarbonicae,
singulorum partes octo.
Opii . . . . partem unam.
Cinnamomi,
Nucis moschatae, singulorum partes viginti quinque.
Tritura opium cum subcarbonate ad pulverem; adde pulveres reliquorum ingredientium cum nuce moschata trituratorum, tunc admisce primo mel despumatum, deinde mel crudum.

℞. Cinnamomi . . drachmas tres.
Seminum Hyoscyami,
— Papaveris albi,
— Endiviae,
— Portulacae,
— Lactucae,
— Psyllii,
Corticis Radicis Mandragorae,
Zingiberis,
Nucis moschatae,
Florum Violarum,
— Rosarum,
Opii, singulorum sesquidrachmam.
Santali albi,
— rubri,
Eboris calcinati,
Gummi Tragacanthae, singulorum scrupulos duos cum dimidio.
Contundendo laevigandoque etc. pulverata cum Mellis despumati sufficiente quantitate fiant electuarium, cui in fine opium in Vino Hispanico solutum admisceatur. (*Ki.*)

T. Santali albi scrupulos decem, S. rubri tantidem, Radicis Mandragorae, Seminum Hyoscyami albi vel nigri, Papaveris albi, Portulacae, Psyllii, Lactucae, Endiviae, Radicis Zingiberis, singulorum drachmas sex, Gummi Tragacanthae scrupulos decem, Florum Violarum, Petalorum Rosarum rubrarum, Nucis moschatae, singulorum drachmas sex, Cinnamomi sesquiunciam, Extracti Opii drachmas sex, Eboris calcinati scrupulos decem, Mellis despumati, Vini Hispanici, singulorum quantum sufficit.

Merkwürdig iſt es, daß man dieſer Latwerge nie eine andere als eine beruhigende und ſchlafmachende Wirkung zugeſchrieben hat. Sie genoß ehedem einen ſehr großen Ruf, iſt aber heutzutage faſt außer Gebrauch. Man gab ſie beſonders Kindern zum Brechen, auch wandte man ſie auf die Schläfe an. — Gabe, von einer halben Drachme bis zu zwei und einer halben Unze. — Jede Unze enthält, nach der Formel von Wir., fünf Gran Opium.

Opopanax.

Gummi Panacis; Heilwurzgummi, Opopanaxharz, Panaxgummi, Opopanaxgummi; Opopanax (*Gal.*); Panaxgummi (*D.*); Opopanaco (*His. Lus.*); Opoponaco (*I.*).

Ams. An. B. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Fer. Gal. Gen. Han. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. Sax. Wir. Wür. *Be. Br. C. Fi. G. M. Sp. Z.*

Ein Gummiharz in unregelmäßigen Stücken, ſelten in Tropfen, außen von röthlichgelber, innen von ſchmutzigweißer, mit Roth und Gelb vermiſchter Farbe und von unburchſichtiger, trockner und zerreiblicher Beſchaffenheit. Es hat einen ſehr ſtarken, gewürzhaften, aber nicht ſehr angenehmen Geruch und einen ſcharfen, brennenden Geſchmack.

Es iſt ein vertrockneter Milchſaft, welcher nach Einſchnitten aus der Wurzel von Pastinaca Opopanax, *L.*, ♂, einer Pflan

ze (Pentandria Digynia, L.; Umbelliferae J.) des südlichen Europa's und des Orients ausfließt. (*Plenck* t. 223. *Gouan* Ill. t. 13. 14.) Nur die im Orient wachsende Pflanze liefert es, von woher es durch Syrien kommt.

Es enthält, nach Pelletier, Harz Schleimharz und etwas Satzmehl.

Reizend. — Gabe, von einem Scrupel bis zur halben Drachme.

Fomentum detergens. (*B.*)

℞. Radicis Aristolochiae rotundae,
— — longae,
— Iridis Florentinae,
singularum semunciam.
Opopanacis,
Sagapeni,
singulorum drachmas duas.
Guajaci . . scrupulos quatuor
Caryophyllorum drachmas duas.
Camphorae . . drachmas tres.
Aquae Vitae . . uncias decem.

Post horas viginti quatuor infusionis cola. — Austrocknend, bei unreinen syphilitischen Geschwüren empfohlen.

Emulsio anthelmintica. (*Ba.*)

℞. Opopanacis,
Saponis Veneti,
singulorum drachmam unam.
Vitelli Ovorum drachmas duas.
Syrupi Artemisiae sesquiunciam.
Aquae destillatae Foeniculi
uncias tres.

Gabe, alle Stunden einen Kaffeelöffel voll.

Opuntia.

Cactus Opuntia, L.; gemeine Indianische Feige; Figuier d'Inde (*Gal.*); Common indian fig (*Ang.*); Indianisk fige (*D.*); Higos de pela (*His.*); Gewoone vygplant (*Bel.*); Fico d'India (*I.*); Indiansk ficon (*Suec.*).

Gal. Gen. *M.*

♃ (Icosandria Monogynia, L.; Ficoides, *J.*) Eine Americanische Pflanze, welche im südlichen Europa wächst. (*Knorr.* Del. *I.* t. f. a.)

Man wendet die Stängel, uneigentlich Blätter (folia Opuntiae) genannt, an; sie sind platt, von verschiedener Gestalt und Größe, obgleich meist eirund, fingersdick, saftig und geruchlos. Sie haben einen wässerigen und schleimigen Geschmack.

Origanum.

In den Pharmacopöen werden folgende Arten dieser Pflanzengattung angeführt:

1) *Origanum Creticum, L.*; Cretischer, Spanischer Dosten, Spanischer Hopfen, Candischer Majoran; Origan de Crète (*Gal.*); Majoram of Candia (*Ang.*); Ouregao de Creta (*Lus.*); Spanskhumle (*Suec.*).

Ams. An. Bor. Bor4. Br. Penn. Gal. GalM. Han. Hass. O. Sax. Suec. Wir. *Be. G. M. Pit. Sp.*

♃ (Didynamia Gymnospermia, L.; Labiatae, *J.*) Eine auf Creta und im südlichen Europa wachsende Pflanze. (*Hayne* VIII. 7. *Dod.* Pempt. 284.)

Man wendet die Spitzen (spicae s. herba Origani Cretici) an; sie bestehen aus den röthlichen, behaarten, ästigen Stängeln mit rundlichen, sitzenden, glatten Blättern und purpurrothen, kurze lockere Aehren bildenden Blüthen. Es hat einen starken, gewürzhaften und angenehmen Geruch und einen gewürzhaften, brennenden Geschmack.

Reizend, nervenstärkend, blähungtreibend. Man wendet sie in Aufguß und äußerlich in Kräutersäckchen an.

2) *Origanum Dictamnus, L.*; Cretischer Diptam; Dictame de Crète (*Gal.*); Dittamus of Candia (*Ang.*); Dittamo Cretico (*I.*); Kretsky dyptam (*B.*).

An. Br. Fer. GalM. His. Wür. *Be. Fl. G. Sp.* Z.

Ein kleiner Strauch, welcher auf Candia wächst. (*Blackw.* t. 462. *Plenck* t. 497 *Hayne* VIII. t. 6. *Zorn* Ic. pl. t. 542.)

Man wendet das Kraut (herba s. folia Dictamni Cretici) an; es besteht aus einem ästigen, röthlichen, behaarten Stängel, an welchem unten eirunde, rundliche, gestielte, filzige, weißliche und oben rundliche, sitzende, glatte, oft röthliche, mit vielen Drüsenpuncten bestreute Blätter sitzen. Es hat einen starken balsamischen Geruch und einen gewürzhaften, etwas bittern Geschmack.

Reizend, ehedem für Menstruation befördernd gehalten.

3) *Origanum Majorana, L.*; Ἀμάραντον; Mayran, Majoran; Marjolaine (*Gal.*); Sweet marjoran (*Ang.*); Mirzanjusch (*Ar.*); Maryanka (*B.*); Merian, Mairan (*D.*); Murwa (*Duk.*); Mejorana (*His.*); Mariolein (*Bel.*); Maggiorena (*I.*); Majeran (*Pol.*); Mangerona (*Lus.*); Mejram (*Suec.*); Marru (*Tam.*).

Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. Li. Lus. O. Pal. R. Sax. Suec. Wir. Wür. *A. Be. Br. C. G. M. Pid. Sp.*

⊙ Eine in Europa gemeine Pflanze. (*Hayne* VIII. 9. *Zorn* Ic. pl. t. 81.)

Man wendet die Spitzen (herba et flores Majoranae s. Amoraci s. Sampsuchi) an; sie bestehen aus einem vierkantigen Stängel mit eirunden, filzigen, weißli-

chen Blättern und weißen, in kurzen, rundlichen Aehren, von denen drei oder vier genähert ein Köpfchen bilden, zusammensetzenden Blüthen. Sie haben einen angenehmen Geruch und einen gewürzhaften, scharfen, etwas bittern Geschmack.

Reizend, Nießmittel.

4) *Origanum vulgare; L.*; Wohlgemuth, gemeine Doste, Dost, Dostenkraut; Origan commun (*Gal.*); Wild marjoram (*Ang.*); Dobra mysl (*B*); Vild mairan, tost (*D.*); Oregano (*His.*); Wilde majolyn (*Bel.*); Origano, Erba da Acciughe, Maggiorana silvestre (*I.*); Lebiotka (*Pol.*); Ouregao (*Lus.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fer. Gal. GalM. Gen. Han. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O., Pol. R. RC. Sax. Wir. Würr. *Be. Br. C. Fi. G. M. Sp.* Z.

4 Eine Europäische Pflanze. (*Bull.* t. 193. *Blackw.* t. 280. *Plenck* t. 495. *Hayne* VIII. 8. *Zorn* Ic. pl. t. 57.)

Man wendet die Spitzen (herba et flores Origani vulgaris s. Cunilae bulbulae) an; sie bestehen aus einem etwas viereckigen, behaarten, bloß am obern Theile ästigen Stängel mit eirunden, gestielten, unten etwas behaarten Blättern und purpurrothen Blüthen, welche kurze, einen rispigen Strauß zusammensetzende Aehren bilden. Es hat einen gewürzhaften und angenehmen Geruch und einen scharfen, brennenden, beißenden Geschmack.

Reizend, nervenstärkend und blähungtreibend. In Aufguß, äußerlich in Kräutersäckchen.

Infusum Origani. (GalM.)

℞. Summitatum siccatarum Origani, Liquiritiae rasae, singularum drachmas duas cum dimidia.
Aquae bullientis quantum sufficit ut librae duae colaturae obtineantur.

Oleum Origani aethereum, Aethereoleum Origani. (A. Am. An. Bor. Bor4. Br. D. Du. Han. Lon. LonN. O. Pal. Sar. Sax. Wir. Würr. *C. Fi. Sw.*)

℞. Summitatum florescentium Origani quantum vis.
Aquae . . . quantum sufficit.
Destillent. (Am. Du. Lon. LonN. R. *C.*)

Sw. Herbae partem unam et quatuor Aquae; — D. Herbae unam et sex Aquae; — Bor. Han. O. Sax. et *Fi.* Herbae unam et octo Aquae; — A. Herbae unam et Aquae duodecim; — An. Herbae sex et Aquae viginti.

℞. Summitatum Origani partes viginti quinque.
Aquae partes septuaginta quinque.
Salis culinaris . . partes tres.
Destillent. (Br. Pal. Sar. Wir.)

℞. Summitatum Origani quantum vis.
Aquae destillatae Origani quantum sufficit.
Destillent. (Wür.)

Bor4. oleum origani cretici venale indicat.

Aqua Origani. (A. Pal.)

℞. Summitatum Origani partem unam.
Aquae . . . partes duodecim.
Destillent partes quatuor. (A.)

Pal. Herbae partem unam et quatuor Aquae; destillent partes duae.

Oleum Dictamni aethereum, Aethereoleum Dictamni. (*Sw. T.*)

℞. Foliorum Dictamni partem unam.
Aquae . . . partes quatuor.
Destillent.

T. ut oleum majoranae aethereum.

Syrupus de Dictamno. (Gal. *Fi.*)

℞. Summitatum siccatarum Dictamni Cretici . . . unciam unam.
Aquae destillatae Dictamni libras duas.

Digere in balneo aquae per horas duas in vase tecto; cola et filtra. Liquori adde
Sacchari albi . . . . duplum.
Dissolve in balneo aquae.

Conserva Majoranae. (Sar. Wir.)

℞. Herbae Majoranae contusae partem unam.
Sacchari pulverati . partes duas.
Commisce. (Wir.)

Sar. Herbae contusae et Sacchari, singulorum partes aequales.

Aqua Majoranae. (Ams. B. Pal. Sar. Sax. WW.)

℞. Herbae Majoranae partem unam.
Aquae . . . . partes quatuor.
Destillata parte dimidia destillatio supra novam herbam instituatur. (Pal. Sar.)

Ams. et B. Herbae partem unam et Aquae sufficientem quantitatem; destillent partes decem; — WW. Herbae partem unam et sex Aquae; — Sax. Herbae partem unam et Aquae quindecim; destillent trientes duo.

Gabe, zwei bis vier Unzen.

Oleum Majoranae aethereum, Aethereoleum Majoranae. (Ba. Bor. Bor4. Br. D. Ed. Ful. Han. HassP. Li. O. Pal. Pol. Sar. Sax. Wir. Würr. *Sw. T.*)

℞. Herbae florescentis Majoranae quantum vis.
Aquae . . . quantum sufficit.
Destillando elicitum oleum separetur. (Ed.)

Ful. et Li. Herbae partem unam et tres Aquae; — *Sw.* Herbae unam et quatuor Aquae; — D. Herbae unam et Aquae sex; — Bor. Bor4. Han. HassP. O. Pol. et Sax. Herbae unam et octo Aquae; — Ba. Herbae unam et novem Aquae; — *T.* ut oleum florum aurantii.

℞. Herbae Majoranae
partes viginti quinque.
Aquae partes septuaginta quinque.
Salis communis . . partes tres.
Post tres dies macerationis destillent. (Br. Pal. Sar. Wir.)

℞. Herbae Majoranae quantum vis.
Aquae destillatae Majoranae
quantum sufficit.
Destillent. (Wür.)

Balsamum Majoranae. (Wir. *Sp.*)

℞. Olei essentialis Majoranae
drachmam unam.
Olei Nucis moschatae
drachmas duas cum dimidia.
Misce. (Wir.)

Sp. Oleorum, singulorum partes aequales.

Butyrum s. Unguentum Majoranae. (Bor. Bor4. Br. D. Ful. Han. Hass. HassP. Li. O. Pal. Pol. Sax. Wir. *Pid. Sp. Vm.*)

℞. Herbae recentis Majoranae,
Butyri recentis,
singulorum partes aequales.
Contrita coque lente ad humidi consumptionem usque et cola exprimendo. (Hass. Sax. *Pid. Sp.*)

Bor. Han. et O. Herbae partem unam et duas Axungiae Porci; — Bor4. Adipem suillum loco butyri; — HassP. Herbae et Axungiae, singularum libram unam.

℞. Herbae recentis Majoranae,
Butyri recentis,
singulorum libram unam.
Coque ad consumptionem humidi, cola et adde
Olei essentialis Majoranae
guttas triginta.
Misce bene. (Br. D. Pal. Wir.)

℞. Butyri recentis . . partes tres.
Herbae recentis Majoranae
partem unam.
Post horas duodecim digestionis super cinere calido cola exprimendo, lava cum Aqua tepida, liqua, decantha et ad refrigerationem usque agita. (*Vm.*)

℞. Butyri recentis . unciam unam.
Aquae destillatae Majoranae
drachmas duas.
Contere, liqua super igne, decantha butyrum et tere cum
Olei essentialis Majoranae
guttis octo.
Misce sedulo. (Ful.)

℞. Butyri recentis drachmam unam.
Olei essentialis . . guttas duas.
Contere. (Li.)

Pal. Axungiae Porci semunciam et Olei Majoranae guttas decem.

Erweichend, auflösend, blähungtreibend. — In Einreibungen auf den Unterleib und sonst.

Oleum Majoranae infusum. (Br. Wir. Wür. *T.*)

℞. Herbae recentis Majoranae,
Olei Olivarum,
singulorum libram unam.
Macera per aliquot dies, tunc coque igne lenissimo usque ad humidi consumptionem et cola exprimendo. (Br. Wir.)

Wür. Herbae partem unam et duas Olei; — *T.* ut oleum lavandulae.

Orleana.

Orleana terra, Urucu, Pigmentum Urucu; Orleans; Rocou (*Gal.*).

Br. Wir. *Ke. G. M. Sp. Z.*

Ein Färbeteig in drei bis vier Pfund schweren Broden oder Kugeln, außen von brauner, innen rother Farbe, welcher Beschaffenheit, thierischem Geruch und abstringirendem Geschmack.

Es ist diese Substanz der rothe Ueberzug, welcher die reifen Früchte des Orleanbaumes, Bixa Orellana, L., (Polyandria Monogynia, L.; Tiliaceae, J.) eines mittelmäßigen Baumes in Südamerica (*Desc. Fl. Ant. t. 4. Hayne* IX. t. 34.) bedeckt.

Orobanche.

Orobanche Virginiana; Virginische Sommerwurz; Orobanche de Virginie (*Gal.*); Virginian broom-rape, Beech-drops, Cancer-root (*Ang.*). *C.*

Eine Schmarotzerpflanze (Didynamia Angiospermia, L.; Orobancheae, J.) Nordamerica's. (Moris. p. 12. t. 16. f. 9.)

Man hat sie innerlich bei Ruhr und äußerlich bei rebellischen Geschwüren angewendet. Sie ist abstringirend und besitzt zu gleicher Zeit eine außerordentlich widerliche Bitterkeit.

Oryza.

Oryza sativa, L.; Reis; Riz (*Gal.*); Rice (*Ang.*); Aruz (*Ar.*); Pruisch (*Arm.*); Men-ho (*C.*); Lua (*Co.*); Riis (*D.*);

Chawl (*Duk. Hin.*); Arroze (*His.*); Ryst (*Bel.*); Riso (*I.*); Motsj, Gome, Ko (*J.*); Riskesa (*Ma.*); Tandul (*Mah.*); Bras (*Mal.*); Barinje (*Pe.*); Ryz (*Pol.*); Arroz (*Lus.*); Vrihi (*Sa.*); Ris (*Suec.*); Dugu (*Ta.*); Arisi (*Tam.*); Bium (*Tel.*).

Ams. An. B. Br. Fer. Ful. Gal. GalM. Hass. HassP. His. Li. R. RC. Wir. *A. Be. G. M. Pid. Sp.*

♀ ☉ (Hexandria Digynia, L.; Gramineae, *J.*) Eine in Aethiopien einheimische Pflanze, welche heutzutage in allen warmen Ländern gebaut wird. (*Plenck.* t. 278. Fl. méd. VI. 299)

Man wendet den Saamen (semen s. grana Oryzae) an; wir erhalten ihn ohne Oberhaut; er ist länglich, stumpf, gefurcht, weiß, trocken, hart, zerreiblich, geruchlos und von mehligem Geschmack.

Er enthält, nach **Braconnot**, viel Satzmehl mit etwas thierischem Stoff und sehr wenig nicht crystallisirbarem Zucker, Schleimharz, Oel und verschiedene Salze.

Er besitzt sehr nährende Eigenschaften, wird, mit vielem Wasser verdünnt, etwas erweichend und lindernd, ist aber mit Unrecht als styptisches Mittel angesehen worden.

Decoctum s. Ptisana s. Aqua Oryzae. (B*. Gal. GalM. *ParC. Ra. Sm. T.*)

℞. Oryzae lotae . . . semunciam.
Aquae communis libras duas et uncias octo.
Decoque ad librarum duarum remanentiam, cola et colaturae adde
Syrupi Althaeae vel Capilli Veneris unciam unam.
Misce. (Gal.)

B*. Coquere jubet Oryzae uncias duas cum Aquae libris duabus ad sedecim unciarum remanentiam; — *T.* Oryzae uncias duas, Aquae libras quatuor coquendo ad dimidium redigere jubet; — *Ra.* Oryzae semunciam cum Aquae libris tribus ad tertiae partis remanentiam.

℞. Oryzae lotae . . uncias duas.
Aquae . . . . octarios tres.
Coquendo tertiam partem consume, sub finem addendo
Butyri recentis . unciam unam.
Sacchari vel Salis pro arbitrio quantum requiritur.
Misce. (*Sm.*)

℞. Oryzae mundatae et lotae unciam unam.
Coque, usque dirupta sit, in
Aquae . quantitate sufficiente ut colaturae octarius (litre) obtineatur, cui sub finem adde
Corticis Aurantii amari mundati drachmas duas.
Stent in infusione per horae quadrantem et tunc colentur. (GalM.)

℞. Oryzae . . . . unciam unam.
Aquae octarios duos cum dimidio.
Decoque ad octariorum duorum remanentiam, sub finem addendo
Liquiritiae . drachmas quatuor.
Post refrigerationem cola. (*ParC.*)

Erweichend, aber nicht adstringirend; bei Durchfall und Ruhr empfohlen. — Man kann noch Milch, eine Abkochung von Catechu, Quittensyrup oder sonst einen säuerlichen Syrup, Aqua Rabelii ꝛc. hinzusetzen. Es ist gut, wenn man damit auf vielfache Art Veränderungen vorzunehmen weiß, da diese Abkochung so häufig gebraucht wird.

Decoctum pectorale. (*Sp.*)

℞. Oryzae mundatae unciam unam.
Aquae fontanae uncias centum viginti octo.
Coque, donec oryza sit dirupta, tunc infunde in decocto
Radicis Liquiritiae,
— Althaeae, singularum semunciam.
Herbae Capilli Veneris Canadensis,
Florum Farfarae, singulorum drachmas duas.
— Rhoeados drachmam unam.
Post horae quadrantem decantha.

Potus Oryzae citratus, Decoctum Oryzae acidulatum. (*Au.*)

℞. Oryzae pulveratae unciam unam.
Aquae . . . . libras quatuor.
Coque parumper et adde colaturae
Sacchari Hordei . . semunciam.
Succi Citri . . . unciam unam.

Osmazoma.

Extractum Carnis; Osmazom; Osmazome (*Gal.*).

Ca. Vm.

℞. Carnis bubulae . partem unam.
Alcoholis . . . partes quatuor.
Carnem in frustula minora concisam per horas duodecim aëris sicci torrenti expone, tunc digere cum alcohole in loco calido; post horam unam vas refrigeret et deinde liquor filtretur; alcohole destillatione abstracto residuum per pannum laneum (Flanell) trajice et ad extracti consistentiam consume. (*Vm.*)

℞. Musculorum adipe privatorum quantum vis.
Concisis in pastam tenuissimam, huic pedetentim Aquam frigidam infunde et bene malaxa; liquorem deinde per linteum cola, calefac, coquentem despu-

ma, filtra et ad extracti consistentiam usque consume. (*Ca.*)

Reizend von angenehmem Geschmack, zur Wiederherstellung des Appetits bei Reconvalescenten. — Gabe, eine Drachme.

Ova.

Ova gallinacea; Hühnereier; Oeufs de poule (*Gal.*); Eggs of hen (*Ang.*); Bayzah (*Ar.*); Biju (*Cy.*); Anda (*Duk*); Huevo (*His.*); Hoenderey (*Bel.*); Ovo di gallina (*I.*); Tukim (*Pe.*); Kurze iaia (*Pol.*); Anda (*Sa.*); Haenraegg (*Suec.*); Koray mutay (*Tam.*); Guddu (*Tel.*).

A. Ams. An. Ba. Bor. BorC. Bor4. D. DD. Fenn. Ful. Gal. GalM. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pal. R. RC. Sax. Suec. Wir. WW. *A. Br. C. Fi. G. Par. Pid. Sp.*

Oleum e Vitellis Ovorum s. Ovorum expressum. (An. Bor. Bor4. Br. D. Fer. Ful. Gal. Han. Hass. HassP. His. Li. O. Pal. Pol. RC. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. *Br. Fi. Pid. T. Vm.*)

℞. Vitellorum Ovorum recentium quantum vis.

In sartaginem immissos balnei aquae ope ad dimidium redige, donec inter digitos pressi oleum facile emittant, tunc sacco e tela arctioris texturae confecto, inter duas laminas terreas tepefactas exprime et per chartam emporeticam balnei aquae calore, filtra.

Fi. Ova cocta et dura triturare, in vase cupreo stanno obducto ad humidi consumptionem usque calefacere et tunc exprimere; — *Chaussier* Vitellos duros cum Alcohole diluere, in vase tecto calefacere, filtrare, alcoholem destillare et oleum ab aqua separare jubet (GalH. *Vm.*). — Das auf letztere Weise erhaltene Oel hat, nach Henry, immer den Geruch des Alcohols und ist, nach Van Mons, noch mehr dem Ranzigwerden unterworfen, als das andere.

Erweichend, lindernd, bei schmerzhaften Hämorrhoiden, Frostbeulen, wunden Brustwarzen und aufgesprungenen Lippen empfohlen.

Clysma sedans et emolliens. (BorC. DD. *B. Pie.*)

℞. Furfuris bene loti manipulum dimidium.
Aquae purae . . . libras duas.
Decoque ad dimidii remanentiam et colaturae adde
Vitellorum Ovorum no. 3 vel 4.
Misce. (*Pie*)
℞. Vitellorum Ovorum . . no. 2.
Olei Rosarum,
— Chamomillae,
singulorum uncias tres.
Misce. (*B*)
℞. Vitelli Ovorum . . semunciam.
Olei Olivarum . drachmas duas.
Misce. (BorC. DD.)

Unguentum s. Pomatum contra strumam. (*Sm.*,
℞. Axungiae . . . unciam unam.
Liquatae leni igne adde
Ovum recens absque testa no. 1.
Subige bene.

Alphonse Leroy wendet es drei oder vier Monate lang auf Kröpfe an und soll sie bisweilen damit zertheilt haben.

Emplastrum flavum. (O.)

℞. Vitellos Ovorum coctorum et siccatorum . . . . . no. 6.
Cerae flavae,
Axungiae Porci,
singularum uncias quatuor.
Misce exacte.

Mixtura analeptica. (*Sm.*)

℞. Cremoris Lactis . . uncias sex.
Vitellos Ovorum recentium no. 2.
Sacchari drachmas quatuor ad unciam unam.
Aquae Cinnamomi hordeatae drachmas sex.
Contere. — Eßlöffelweise, bei Erschlaffung und Schwäche nach zu häufig gepflogenem Umgang mit Weibern und Onanie.

Mixtura ad aphthas s. antiaphthosa. (*Sm.*)

℞. Cremoris Lactis,
Aquae Rosarum,
singulorum unciam unam.
Vitellum Ovi recentis . . no. 1.
Syrupi Papaveris albi drachmas quatuor.
Misce. — Löffelweise, in 24 Stunden zu verbrauchen.

Alcohol cum Albumine s. albuminosum. (*Vm.*)

℞. Albumina Ovorum recentium no. 4.
Subige in vase porcellaneo, sensim addendo
Alcoholis . . . . uncias duas.

Cataplasma aluminosum. (RC.)

℞. Aluminis . . drachmam unam.
Albumina Ovorum . . . no. 2.
Agitentur fortiter, ut in coagulum coëant. — Bei asthenischer Augenentzündung, Frostbeulen.

Albumen aluminosum, Coagulum aluminosum officinale. (*Fi.*)

℞. Aluminis . . drachmam unam.
Albumen Ovi recentis . no. 1.
Aquae Florum Sambuci vel Rosarum . . . . unciam unam.

Linimentum Albuminis Ovi. (RC.)

℞. Albuminis Ovi recentis,
Alcoholis, vel
— diluti camphorati, vel
Balsami Peruviani partes aequales.

Conquassando misce. — Beim Auffliegen.

Oxygenium.

Aër purus s. dephlogisticatus s. vitalis; Oxygengas, Lebensluft; Oxigène (*Gal.*).

B*. Fer. Han. HassP. *Br. Fi. Sw. T. Vm.*

℞. Oxydi nigri Mangani quantum vis.

Ad ruborem usque calefac sensim in retorta fictili cum apparatu pneumatico-chemico communicante; priores gasis, quod evolvitur, partes effugere sinendo, serius prodeuntes in lagenas vitreas excipe, quas sub aqua occlusas et obturaculis piceis munitas in loco frigido serva. (B. Fer. Han. HassP. *Sw. Vm.*)

℞. Peroxydi Manganesii partes tres.
Acidi sulphurici concentrati partes duas.

Misce frigide in mortario vitreo; calcina mixturam ad ruborem usque, gas quod evolvitur, excipe et cum Aqua calcis pulsatum serva. (*Sw*. Vm.*)

℞. Nitri pulverati . . quantum vis.

Calefac in retorta, donec hujus fundus ad ruborem excanduit; gas evolutum excipe, partes priores penitus negligendo. (*Br.*)

Van Mons behauptet, der mit Seesalz vermischte Salpeter gebe schneller Oxygen, als wenn er sich allein befinde.

℞. Peroxydi Manganesii partem unam.
Chloratis Potassae partes duas.

Contere, calefac prope flammam spiritu vini alitam et gas, quod evolvitur, excipe. (*Vm.*)

Fi. Gas e Mangano, vel Oxydo Hydrargyri rubro vel Kali muriatico oxygenato extricare jubet: — *T.* itidem praeterea et alias substantias indicat.

Aqua oxygenata. (*Br.*)

℞. Aquae . . . . . quantum vis.

Satura machinae compressoriae ope quantum fieri potest, gase oxygenio.

Ein leichtes Reizmittel, welches man bei Appetitlosigkeit, Mangel der Reinigung, sogenannten asthenischen Wassersuchten, Magenkrämpfen und Hysterie empfohlen hat. — Gabe, eine bis zwei Flaschen in vier und zwanzig Stunden.

Im Allgemeinen ist das Verhältniß des in einem auf diese Weise bereiteten Wasser enthaltenen Oxygens die Hälfte des Volums dieses letztern.

Das so bereitete oxygenirte Wasser unterscheidet sich bedeutend von dem, was Thenard mittelst eines eben so weitläufigen als beschwerlichen und zu sehr in's Kleinliche gehenden Verfahrens erhalten hat und welchem er den Namen *Deutoxydum Hydrogenii* beilegt. Letzteres, so concentrirt als möglich, giebt das vierhundert und fünfundsiebenzigfache Volum Gas unter einem Drucke von 0m,76 und bei einer Temperatur von 14°. Auffallend ist es, daß es noch keinem Arzte eingefallen ist, in der Therapie sowohl innerlich, als besonders äußerlich davon Anwendung zu machen, indem er durch Zusatz einer größern oder geringern Menge Wasser den Grad der Stärke desselben veränderte; und daß unsere Experimentatoren diese Gelegenheit haben vorbeigehen lassen, die Neugierde des Publicums durch die Erzählung ihrer abentheuerlichen Versuche einige Wochen lang zu unterhalten. In diesem Bezug darf man die wichtige Beobachtung Thenard's nicht aus den Augen verlieren, daß die thierischen and organischen Gewebe sämmtlich das oxygenirte Wasser zersetzen, nach Art der meisten Metalle und Metalloxyde, ohne etwas von ihren Grundstoffen abzugeben und ohne die kleinste Menge Oxygen zu absorbiren; ohne demnach die geringste Veränderung zu erfahren, es sey denn, daß das Peroxyd zu stark wäre. Sollte sich dieß aber mit den lebenden Geweben ebenso verhalten? Die Sache verdiente eine Untersuchung, und sollte dieß auch nur seyn, um zu sehen, ob es mit Thenard's Behauptung seine Richtigkeit habe oder nicht, daß die Eigenschaft der thierischen Gewebe, ebenso wie Platin, Gold und Silber, das Oxygen des oxygenirten Wassers zu entbinden, wahrscheinlich einer und derselben Kraft zuzuschreiben sey, diesemnach auch der Gedanke nicht unvernünftig sey, daß die Secretionen durch eine analoge Kraft von Statten gehen und daß man auf diese Weise begreifen könne, wie ein Organ ohne etwas abzugeben oder etwas einzunehmen, dauernd auf eine Flüssigkeit einwirken und sie in neue Producte umändern könne. Diese rationellen Schlüsse über eine positive Thatsache wären einer gründlichen Untersuchung werth, da sie im Stande sind, die physiologischen und therapeutischen Lehrgebäude von Grund aus umzustürzen.

P.

Paeonia.

Paeonia officinalis, L.; Päonie, Pfingstrose, Gichtrose; Pivoine (*Gal.*); Peony (*Ang.*); Peonia (*His.*); Piwoniec (*Pol.*).

Ams. An. Bor. Bor4. Br. Fer. Gal. Gen. Han. His. Pol. R. Sax. Wir. Wür. *Be. Br. Fi. G. M. Sp.*

4 (Polyandria Digynia, L.; Papaveraceae, J.) Eine Pflanze des südlichen Europa's. (*Blackw.* t. 65. 245. *Plenck* t. 432. *Hayne* V. t. 26. Düss. off. Pfl. III. t. 13. Fl. méd. VI. 274.)

Man wendet die Wurzel, die Blüthen und den Saamen an.

Die Wurzel (radix Paeoniae) ist dick, lang, knollig und fleischig.

Frisch hat sie einen unangenehmen und virösen Geruch, welcher sich nach dem Trockenwerden fast ganz verliert. Der Geschmack ist bitter, süßlich, etwas scharf und schwach adstringirend; die Schärfe verliert sich durch Trocknen.

Die Blüthen (flores Rosae benedictae s. regiae) sind roth. Frisch haben sie einen unangenehmen Geruch und einen schleimigen, etwas bittern Geschmack.

Der Saame ist geruchlos und fast ohne Geschmack.

Conservae Paeoniae. (Pal. Sar. Wir.)

℞. Petalorum Paeoniae partem unam.
Sacchari pulverati . partes duas.
Contere. (Pal. Wir.)

Sar. Petalorum partem unam cum Sacchari pauxillo terere et pulpam in partibus tribus Sacchari clarificati leviter coquere jubet.

Faecula Paeoniae. (Wir. T.)

℞. Radicis recentis Paeoniae
quantum vis.

Raspa et pulpam in sacco e tela confecto inclusam prelo submitte; succo Aquae pauxillum adde, sepone, partem limpidam decantha, sedimentum aëris ope siccatum pulvera.

Aqua Paeoniae. (Gal. Pal. Sar. T.)

℞. Florum Paeoniae partem unam.
Aquae . . . . partes quatuor.
Destillet dimidia pars. (Gal. Sar.)

Gal. Florum partem unam et tres Aquae; destillet pars una cum dimidia; — T. ut aquam florum Aurantii.

Extractum Paeoniae. (Fer. Wir.)

℞. Radicis Paeoniae concisae
libram unam.
Aquae bullientis . . libras sex.

Infunde per tres dies, tunc coque parumper; cola exprimendo et liquorem ad extracti consistentiam usque consume. (Wir.)

Fer. Coquere jubet Radicis recentis libram unam in tribus libris Aquae, decoctum Albuminis ope clarificare et vaporando consumere.

Infusum Petalorum Paeoniae. (His.)

℞. Petalorum recentium Paeoniae
libras sex.
Aquae bullientis libras duodecim.

Infunde per horas octo, cola exprimendo et colaturam post aliquot tempus decantha.

Syrupus Paeoniae. (His. Pal. Wir.)

℞. Radicis Paeoniae contusae
uncias duas.
Aquae . . . . . libras sex.

Decoque ad librarum quatuor remanentiam et colaturae adde
Sacchari albi . . . libras duas.
Clarifica ut fiat syrupus. (His.)

℞. Florum recentium Paeoniae
libras tres cum dimidia.
Aquae fontanae bullientis
libras quatuor.

Infunde per horas viginti quatuor, cola exprimendo et in colaturae unciis octodecim solve
Sacchari albi uncias triginta duas.
Serva. (Pal. Wir.)

Gabe, zwei bis drei Drachmen in einem Tranke.

Decoctum Carnis s. Jusculum antispasmodicum. (Bo.)

℞. Carnis vitellinae macrae
uncias sex.
Radicis Valerianae,
— Paeoniae,
singularum drachmam unam.
Foliorum Cichorii,
— Lactucae, singulorum manipulum dimidium.
Aquae . . . quantum sufficit.

Coque et colaturae refrigeratae adde

Pulveris Foliorum Auranti semidrachmam.
Aetheris sulphurici guttas decem.
Auf einmal, Morgens nüchtern.

Jusculum antiepilepticum. (*Bo.*)

℞. Carnis vervecinae uncias quatuor.
Radicis Cichorii,
— Fragariae,
singularum semunciam.
Foliorum Cichorii,
— Boraginis,
— Lactucae,
— Agrimoniae, singulorum manipulum dimidium.
— Melissae pugillum unum.
Seminum Papaveris albi semidrachmam.
Aquae . . . quantum sufficit.
Coque et colaturae adde
Radicis Paeoniae pulveratae scrupulos duos.
Morgens nüchtern zu nehmen.

Species contra apoplexiam. (Pal. Wir.)

℞. Succini praeparati,
Cornu Cervi philosophice praeparati,
Ligni Aloës,
Radicis Paeoniae,
singulorum semunciam.
Corticis Citri . drachmam unam.
Sacchari perlati . . uncias tres.
Olei essentialis Cinnamomi guttas sedecim.
Fiat pulvis. *Completae* appellantur si addis
Ambrae griseae semiscrupulum.
Moschi . . . . grana quinque.
Dieses Pulver wurde ehedem bei Kopfschmerzen, Schwindel, Schlagfluß und Epilepsie gerühmt. — Gabe, eine halbe Drachme bis zwei Scrupel.

Pulvis contra tussim infantum s. anticatarrhalis. (Pal.)

℞. Radicis Paeoniae . semunciam.
— Iridis Florentinae drachmas sex.
— Serpentariae Virginicae drachmas duas.
Croci . . . drachmam unam.
Sacchari crystallisati (Candis) unciam unam.
Fiat pulvis. — Gabe, eine Messerspitze voll.

Pulvis epilepticus s. Marchionis s. antiepilepticus s. Paeoniae compositus s. de gutteta s. ad guttetam s. cephalicus s. de Carignan. (Bor4. Br. GalF. GalH. His. Pal. Wir. *Ca. Pie. Sp.*)

℞. Radicis Paeoniae,
Ammonii subcarbonici, singulorum partem unam.
Cornu Cervi praeparati,
Radicis Fraxinellae,
Visci querni,
singulorum partes duas.
Succini praeparati partes quatuor.
Pulvera. (GalF. GalH. *Ca.*) — Dieß ist der *Pulvis principis de Carignan* (princesse de C.). — Gabe, achtzehen Gran, im ersten, sechs und dreißig im zweiten, acht und vierzig im dritten, eine Drachme im vierten Jahre und darüber, bei convulsivischen Krankheiten.

℞. Radicis Paeoniae,
— Fraxinellae,
Visci querni,
singulorum semunciam.
Seminum Atriplicis drachmas duas.
— Paeoniae,
Ungulae Alces,
singulorum semunciam.
Cranii humani praeparati unciam unam.
Corallii rubri praeparati,
Hyacinthi praeparati,
singulorum semunciam.
Foliorum Auri . . . . no. 50.
Tritura exacte. (Wir.) — Gabe, einen halben Scrupel bis halbe Drachme.

℞. Visci albi pulverati uncias duas.
Radicis Paeoniae,
Concharum praeparatarum,
singularum unciam unam.
Misceantur. Si requiritur, addere licet
Auri foliati . . quantum libet.
(Bor4.)

℞. Radicis Paeoniae sesquiunciam.
— Contrayervae,
Visci querni,
singulorum drachmas sex.
Rasurae Eboris,
— Cornu Cervi,
— Ungulae Aloës,
Cranii humani praeparati,
Corallii rubri porphyrisati,
Hyacinthi praeparati,
Bezoar occidentalis,
singulorum sesquidrachmam.
Fiat pulvis subtilissimus. (His.)

℞. Visci querni,
Radicis Fraxinellae,
— Paeoniae,
Seminum Paeoniae,
singulorum unciam unam.
— Atriplicis,
Corallii rubri praeparati,
singulorum semunciam.
Ungulae Alces . unciam unam.
Fiat pulvis subtilissimus. (*Sp.*)

℞. Visci querni,
Radicis Valerianae,

Magnesiae, singulorum semunciam.
Seminum Paeoniae,
— Polygoni,
Corallii rubri praeparati,
singulorum drachmas duas.

Fiat pulvis. (*Pic.*) — Diese vier Formeln geben das Pulver, welches besonders *Pulvis ad guttetam* genannt wird.

℞. Radicis Paeoniae . uncias tres.
Visci querni,
Rasurae Eboris,
— Ungulae Alces,
— Cornu Cervi,
Eboris usti,
Corallii rubri,
— albi,
Margaritarum praeparatarum
drachmas sex.
Foliorum Auri . . . . no. 20.

Fiat pulvis. (Wir. *Sp.*)

Br. Paeoniae uncias tres, Visci, Cornu Cervi, Magnesiae, Eboris calcinati, Corallii rubri et albi, Nacrae Perlarum, singulorum drachmas sex et Folia Auri no. 10.

Diese Formel giebt den *Pulvis epilepticus Marchionis*, *Pulvis Marchionis*. — Gabe, von zehen Gran bis zu einer halben Drachme.

℞. Succi praeparati,
Nacrae Perlarum praeparatae,
Smaragdi praeparati,
singulorum semunciam.
Ligni Aloës,
Radicis Paeoniae,
singulorum scrupulos duos.
Unicornu marini,
Visci querni,
singulorum sesquidrachmam.
Sacchari crystallisati (Candis)
uncias duas.

Fiat pulvis. (Wir.) — *Pulvis cephalicus albus* — Gabe, eine halbe Drachme bis zwei Scrupel.

℞. Radicis Paeoniae . semunciam.
Visci querni,
Rasurae Eboris,
— Ungulae Alces,
— Eboris calcinati,
— Cornu Cervi,
Corallii rubri,
— albi,
Margaritarum praeparatarum,
singulorum drachmam unam.

Fiat pulvis. (Pal.) — *Pulvis epilepticus albus.*

℞. Radicis Paeoniae,
Seminum Paeoniae,
singulorum semunciam.
Unicornu marini,
Margaritarum orientalium,
singulorum drachmas duas.
Quinque Lapidum pretiosorum,
singulorum grana quadraginta quinque.
Castorei,
Visci,
Ungulae Alces,
Corallii rubri,
singulorum drachmas duas.
Cranii humani praeparati
sesquidrachmam.
Pulveris Viperae drachmam unam.

Fiat pulvis. (Wir.) — *Pulvis epilepticus Cellarii.* — Gabe, von einem Scrupel bis zur halben Drachme.

℞. Radicis Paeoniae drachmas decem.
— Fraxinellae,
Visci querni, singulorum drachmas quinque.
Ligni Aloës,
Seminum Paeoniae,
singulorum drachmas tres.
Corallii rubri,
Nacrae Perlarum,
singularum semunciam.
Ungulae Alces . drachmas tres.
Succini albi,
Unicornu marini,
singulorum drachmas duas.
Carbonis Tiliae . sesquiunciam.

Fiat pulvis. (Pal. Wir.) — *Pulvis epilepticus niger.* — Gabe, von fünf Gran bis zu einem halben Scrupel bei Kindern; eine halbe Drachme bei Erwachsenen.

℞. Radicis Paeoniae,
— Gentianae,
singularum uncias duas.
Herbae Betonicae,
— Chamaedryos,
— Quinquefolii majoris,
Florum Paeoniae,
— Convallariae,
— Violarum,
— Tiliae,
singulorum unciam unam.
Seminum Coriandri,
— Paeoniae,
Visci querni,
singulorum semunciam.
Rasurae Ungulae Alces uncias duas.
— — Asini
drachmas quinque.
— Cornu Cervi,
Cornu Cervi absque igne praeparati, singulorum unciam unam.
Cranii humani . drachmas sex.
Corallii rubri,
— albi,
Margaritarum orientalium,
singulorum semunciam.
Foliorum Auri . . . . no. 24.

Fiat pulvis. (Wir.) — *Pulvis epilepticus Holsaticus.* — Gabe, von einem halben Scrupel bis zur halben Drachme.

Opiatum antiepilepticum. (Bo.)

℞. Croci . . . . . semunciam.
Sennae mundatae,
Rhei, singulorum drachmas duas.
Seminum Paeoniae,
Salis Ammoniaci,
Jalapae,
Scammonei,
Hellebori nigri,
Acidi succinici,
singulorum drachmam unam.
Cinnamomi . . scrupulos duos.
Castorei . . scrupulum unum.
Conservae Paeoniae
quantum sufficit.

Gabe, anderthalb Drachmen, Morgens nüchtern. — Gewiß ist, daß die Päonie in diesem purgirenden Mischmasch eine höchst unbedeutende Rolle spielt.

Electuarium anthelminticum. (Bo. Pie.)

℞. Ferri sulphurici,
Helminthochorti,
singulorum drachmas duas.
Radicis Valerianae sylvestris,
— Paeoniae,
singularum semunciam.
Foliorum Aurantii
drachmas quinque
Aloës . . . drachmam unam.
Syrupi Paeoniae quantum sufficit.

Gabe, alle Morgen nüchtern eine Drachme bei Epilepsie mit Wurmcomplication. — Es gilt von diesem Präparat dasselbe, was von dem vorhergehenden gesagt wurde.

Panax.

Panax Quinquefolium, L.; fünfblättrige Kraftwurzel, Ginseng; Ginseng (*Gal.*); Ginseng, Ginzang (*I.*); Jin chen (*Ch.*); Garent oguen (*Ir.*); Nindsin, Dsindsom (*Ja.*); Orkhoda (*Ma.*); Ginsao (*Lus.*).

Br. Fer. Gal. Wir. *A. Br. C. G. M.*

♃ (Polygamia Dioecia, L.; Araliaceae, *J.*) Eine Pflanze der Chinesischen Tartarei und Canada's. (*Bigel.* Am. med. Bot. II. t. 9. *Woodv.* Med. bot. t. 99. *Sims.* Bot. Mag. t. 1333. Dict. d. Sc. nat. Cah. VI. Fl. méd. IV. 184.)

Man wendet die Wurzel (radix Ginseng) an; sie ist spindelförmig, fingerdick, zwei bis drei Zoll lang, außen röthlich und inwendig gelblich. Ueber ihrem Halse sitzt ein knotiges und gedrehtes Gewebe, auf welchem man die Spuren der alten eingegangenen Stängel sieht. Ihre Substanz ist halbdurchsichtig, derb und gleichsam hornartig. Sie hat keinen Geruch, der Geschmack ist zuckerig, etwas bitter und schwach gewürzhaft. Sie enthält viel Satzmehl und Schleimharz.

Die Völker Asien's betrachten sie als ein mächtiges aphrodisiacum. Sie hat aber auf diese Benennung nicht mehr Recht, als so viele andre Substanzen, welche durch die Volksbeobachtung dazu erhoben worden sind.

Morsuli Ginseng. (Bo. Ca. Pie.)

℞. Sacchari . . . . libras decem.
Vanillae . . . . uncias decem.
Ginseng radicis pulveratae
uncias quinque.
Tincturae Cantharidum
drachmas quinque.
Olei Cinnamomi . guttam unam.
Essentiae Ambrae guttas decem.
Mucilaginis . quantum sufficit.

Fiant morsuli granorum viginti quatuor ad triginta. — Gabe, vier oder fünf Stück täglich. — Diese Pastillen können schwere Zufälle hervorbringen, ohne selbst nur für den Augenblick Vermögen hervorzurufen, welche ohnmächtigen Wünschen nicht mehr entsprechen.

Panicum.

Panicum miliaceum, L.; Hirse; Millet (*Gal.*); Millet (*Ang.*); Hirse (*D.*); Hajo (*His.*); Geerst (*Bel.*); Miglio (*I.*); Proso (*Pol.*); Milho (*Lus.*).

Gal. His. *M.*

☉ (Triandria Digynia, L.; Gramineae, *J.*) Eine Pflanze, deren Vaterland man nicht kennt und welche in mehrern Gegenden Europa's gebaut wird. (*Zorn* Ic. pl. t. 349.)

Man wendet den Saamen (semen Milii) an; er ist klein und rundlich und enthält unter einer dünnen, rindigen, gelben, glänzenden, zweiklappigen Schaale eine weiße, mehlige Substanz.

Panis.

Mica Panis albi etc.; Brod, Semmel; Pain (*Gal.*).

Bor.

Ptisane ex Pane. (B⁺.)

℞. Panis triticei . . . uncias octo.
Aquae . . uncias triginta duas.

Coque per horam, cola et colaturae adde Aquae evaporatae quantitatem aequalem.

Das mit gerösteter Roggenbrodtrinde bereitete Brodtwasser giebt ein angenehmeres, leicht adstringirendes Getränk.

Glasweise bei Reizungen der Nahrungswege.

Panada Anglorum. (Au.)

℞. Panis secalini tosti . uncias sex.

Cinnamomi . . semidrachmam.
Cortic. recentis Citri
drachmas duas.
Vini albi . . . . libras duas.
Coque et cola. — Colaturae addere potes Vitellum Ovi vel Aromata.

Decoctum album s. album Sydenhami s. Cornu Cervi compositum s. Cornu Cervi Elaphi compositum s. Cornu Cervi cum Mica Panis. (An. B*. Bel. Br. Gal. GalM. HassP. His. Sar. Sax. *Ca. ParC. Pie. Ra. Sp. Vm.*)

℞. Cornu Cervi raspati uncias duas.
Micae Panis albi uncias quatuor.
Aquae fontanae . . libras sex.
Coquendo parte tertia consumpta, cola absque expressione (Sar.)

℞. Cornu Cervi,
Micae Panis albi,
singulorum drachmas duas.
Aquae fontanae . . libras tres.
Coquendo partem tertiam consume et colaturae adde
Sacchari albi . . quantum vis.
Solve. (B*.)

℞. Rasurae Cornu Cervi uncias duas.
Aquae . . . . . libras tres.
Coque et sub finem adde
Micae Panis albi . uncias duas.
Coquendo continua ad librarum duarum usque colaturam, cui adde
Sacchari albi . . sesquiunciam.
Dissolve. (An. Bel.)

℞. Rasurae Cornu Cervi semunciam.
Micae Panis albi unciam unam.
Aquae communis . libras tres.
Coquendo tertiam partem consume et colaturae adde
Syrupi Cydoniorum uncias duas.
Misce bene. (*Ra.*)

℞. Cornu Cervi raspati,
Micae Panis albi,
singulorum partem dimidiam.
Aquae . . partes triginta sex.
Coquendo parte tertia consumpta, colaturae adde
Gummi Arabici partem quartam.
Dissolve. (Sax.)

Han. Cornu Cervi raspati, Micae Panis, singulorum semunciam, Aquae libras tres coquendo ad duas consumendas et Gummi Arabici in colatura solvendi drachmas duas.

℞. Rasurae Cornu Cervi,
Micae Panis albi,
singularum semunciam.
Aquae fontanae uncias triginta sex.
Coque ad remanentiam colaturae unciarum viginti quatuor, cui adde
Gummi Arabici sesquidrachmam.
Sacchari . . . drachmas duas.
Dissolve. (HassP. *Sp.*)

Br. coquere jubet Cornu Cervi raspati, Micae Panis. singulorum semunciam, Gummi Arabici sesquidrachmam in Aquae libris tribus ad duas coctione consumendis et in colatura dissolvere Sacchari drachmas duas.

℞. Micae Panis albi partem unam.
Coque per horam dimidiam cum
Aquae . . sufficiente quantitate ut colaturae uncias sexaginta quatuor obtineas, cui in fine adde
Gummi Arabici partem dimidiam.
Cornu Cervi usti partem quartam.
Sacchari . . partem dimidiam.
Cola per pannum; post refrigerationem decantha et adde
Aquae Cinnamomi
partem dimidiam.
Misce bene. (*Vm.*)

Gal. et *ParC.* Coquere jubent Cornu Cervi calcinati drachmas duas cum Micae Panis drachmis sex et Sacchari uncia una, omnia in mortario contusa, in Aquae libris duabus per octo sexagesimas; liquorem bullientem per pannum amplioris texturae leviter exprimendo colare et addere Aquae Florum Aurantiorum semunciam vel Aquae Cinnamomi drachmas duas; — GalM. Coquere per octo sexagesimas Micae Panis drachmas sex, Cornu Cervi vel Ossium aliorum ad alborem usque calcinatorum drachmas duas in Aquae quantitate sufficiente ut colaturae octarius (litre) obtineatur, colare bullientem levis expressionis ope et addere Aquam essentialem Citri et Syrupum simplicem; — His. leviter coquere Cornu Cervi calcinati semunciam, Micae Panis uncias duas cum Aquae libris sex; colare et colaturae addere Syrupi communis uncias quatuor et si vis, Aquae Florum Aurantiorum vel Cinnamomi vinosae drachmas duas; — *Ra.* Micae Panis uncias duas, Cornu Cervi calcinati drachmas duas, Aquae libras duas, Syrupi unciam unam et Tincturae Cinnamomi drachmam unam; — *Ca.* et *Pie.* Micae Panis uncias duas, Cornu Cervi calcinati drachmas duas, Sacchari uncias tres, Aquae bullientis libras duas et Aquae Cinnamomi semunciam.

Erweichend, lindernd, vortheilhaft bei chronischen Reizungen des Ernährungscanals, besonders bei hartnäckiger Diarrhöe angewendet. — Glasweise, stündlich. — Man setzt oft mit Nutzen 10 bis 20 Tropfen laudanum hinzu.

Gelatina Panis. (B*. GalH. *Fi. Vm.*)

℞. Micae Panis semisiccatae
uncias quatuor.
Aquae destillatae . libras duas.

Coque fortiter, cola per cribrum et adde

Sacchari albi . . libram unam.
Vini albi . . . uncias quatuor.
Aquae Cinnamomi drachmas sex.
Misce (GalH.)

℞. Panis biscocti albi partes quatuor.
Aquae . partes viginti quatuor.

Coque per horam dimidiam, cola per pannum, evaporando ad viginti quatuor partium remanentiam consume et adde

Aquae Cinnamomi partem unam.
Succi Citri . . . . partes duas.
Sacchari albi . partes quatuor.
Vini Rhenani . . . partes sex.
Misce. (B*. *Vm.*)

Fi. Panis biscocti uncias sex, Aquae libras decem, coque per horam, cola et ad uncias novem consumme, tunc adde Vini Hispanici uncias duas, Aquae Cinnamomi lacteae drachmas duas, Succi Limonum recentium semunciam, Sacchari pulverati sesquiunciam.

Cataplasma de Mica Panis s. emolliens. (B*. Fer. Ful. Gal. RC. *Be. Br. Fi. Sp. T.*)

℞. Micae Panis vetusti rasae uncias quatuor.
Lactis vaccini vel Decocti Althaeae sesquilibram.

Coque ad consistentiam requisitam. (Gal.)

Br. Micae Panis uncias decem et quindecim Lactis absque coctione miscere jubet; — *B.* Lactis libras quatuor et unam Panis simul coquere; — RC Micarum Panis veterum quantum vis, Aquae fontanae vel Lactis quantum satis; — *Fi.* Micae uncias tres, Lactis libram unam; — *T.* Micae partem unam, Lactis quatuor (addendo Malvae siccatae quantitatem quae requiritur, habes *Cataplasma Panis, Lactis et Malvae* (*T.*), cujus librae cuique scrupuli duo vel tres Croci addi possunt, quo majorem vim resolventem accipiat).

℞. Micae Panis . . uncias sedecim.
Pulveris Florum Meliloti,
— — Sambuci,
singulorum drachmas duas.
Lactis . uncias quadraginta octo.
Coque sufficienter. (*Sp.*)

℞. Micae Panis . . . uncias octo.
Butyri recentis . . uncias duas.
Lactis vaccini . . uncias octo.
Coque simul. (B*. Ful.)

Man muß das Brodt, bevor man es in der Milch kocht, mit etwas Waſſer kochen, um die in ihm enthaltene Eſſigſäure auszutreiben.

℞. Micae Panis . uncias quindecim.
Lactis . . . . uncias viginti.
Aquae bullientis quantum sufficit.
Mica in aqua mollefactâ, cola per crinium et cum lacte coque. (Fer.)

Cataplasma acetatum. (RC.)

℞. Micarum Panis vel Farinae cujuslibet . . . . . quantum vis.
Aceti . . . . . quantum satis ut fiat cataplasma. — Bei Ekchymoſen, Contuſionen, Verbrennungen, ſcrophulöſen Knochengeſchwülſten ꝛc.

Spiritus Panis. (Wir.)

℞. Panis triticei biscocti quantum vis.

Destillet lente ex arena in cucurbita vitrea, igne gradatim aucto, spiritum ab oleo supernatante separa et rectifica.

Aqua Panis. (Wir. *Sp.*)

℞. Crustae Panis teneris et adhuc calidi . . . uncias quatuor.
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Nucis moschatae,
singulorum semunciam.
Vini albi . uncias nonaginta sex.

Destillet dimidia pars. — Ein angenehmes Magenmittel. — Gabe, eine halbe Unze.

Papaver.

In den Pharmacopöen werden zwei Arten dieſer Pflanzengattung angeführt:

1) *Papaver Rhoeas, L.*; Klatſchroſe, Klapproſe; Coquelicot (*Gal.*); Red poppy (*Ang.*); Plany neb wlej mak (*B.*); Klapperose (*D.*); Amapola (*His.*); Klapperroos (*Bel.*); Rosolaccio (*I.*); Papoleira (*Lus.*); Kornros (*Suec.*).

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. DD. Du. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. O. Pol. Sax. Wir. Wür. WW. *B. C. Fi. G. M. Ptd. Sp.* Z.

☉ (Polyandria Monogynia, L.; Papaveraceae, *J.*) Eine in Europa ſehr gemeine Pflanze. (*Blackw.* t. 2. *Plenck.* t. 418. *Hayne* VI. 38. *Curt.* Fl. Lond. III. t. 32. Düss. off. Pfl. VIII. t. 4. Fl. méd. III. 134.).

Man wendet die Blüthen (Flores Papaveris erratici s. Rhoeadis s. Rhoeados) an; ſie beſtehen aus eirunden, ganzrandigen, rothen Blättern. Friſch haben ſie einen widerlichen, nach dem Trocknen gar keinen Geruch. Ihr Geſchmack iſt ſchleimig und etwas bitter.

Sie enthalten, nach Riffard, einen fetten gelben Stoff, einen rothen Färbeſtoff, Schleimharz und Pflanzenfaſer.

Man betrachtet ſie als beruhigend und etwas narkotiſch, aber ſie ſind faſt nur erweichend und lindernd. Sie dienen bei nicht

sehr heftigen Lungencatarrhen, weniger jedoch durch sich selbst, als vielmehr durch das Wasser, welches zum Aufgießen angewendet wurde.

2) *Papaver somniferum*, *L.*; Mohn; Pavot blanc (*Gal.*); Poppy (*Ang.*); Khuschkhasch (*Ar. Duk.*); Bily mak (*B.*); Ying-suh (*C.*); Gaysagussa (*Can.*); Abin atta (*Gy.*); Valmue (*D.*); Adormidera (*His.*); Post (*Hin. Sa.*); Tamme heul (*Bel.*); Papavero (*I.*); Kes (*J.*); Kuknar (*Ps.*); Mak bialy (*Pol.*); Wallmo (*Suec.*); Casa Casa (*Tam.*); Cassa Cassa (*Tel.*).

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pal. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *A. Be. Br. C. Fi. G. M. Par. Pid. Sp. Z.*

Eine ursprünglich im Orient einheimische, im südlichen Europa naturalisirte Pflanze. (*Lam.* Ill. t. 451. *Blackw.* t. 482. 483. *Plenck* t. 417. *Bull.* Herb. t. 57. Düss. off. Pfl. VII. t. 24. X. t. 3. *Zorn* Ic. pl. t. 371. *Bert.* Bild. I. 99. f. 1.)

Man wendet die Frucht und den Saamen an.

Die Früchte, Mohnköpfe (capita s. capitula s. capsulae Papaveris) sind kugelige oder eiförmige Kapseln, welche von der in zehen und mehr strahlig auseinandergehende Lappen getheilten Narbe, unter der eben so viele Löcher liegen, gekrönt wird. Der Geruch ist bei der frischen Frucht betäubend, bei der trocknen aber gar nicht mehr zu bemerken. Der Geschmack ist bitter und scharf.

Diese Kapseln haben eine beruhigende und narkotische Wirkung. Sie liefern im Orient das Opium; in Europa findet man in ihnen zwar auch alle Bestandtheile desselben, jedoch in einem sehr verschiedenen Verhältniß, über welches die Chemiker, die sich mit dieser Untersuchung beschäftigt haben, noch getheilter Meinung sind.

Der Saame (semen Papaveris albi s. nigri s. coerulei) ist sehr klein, nierförmig, etwas runzelig, graulich oder bläulichweiß oder schwärzlich. Das durch Auspressen daraus gewonnene Mohnöl (huile d'oeillette) ist mild und sehr wohlschmeckend.

Conserva Rhoeadis. (Pal. Wir. *Ca. T.*)

℞. Florum recentium Rhoeadis partem unam.
Sacchari albi . . partes duas.
Contere. (Pal. Wir.)

℞. Foliorum siccatorum Rhoeados pulveratorum . . partem unam.
Sacchari pulverati partes quatuor.
Aquae . . . quantum sufficit.
Misce triturando. (*Ca.*)

T. Petalorum pulv. uncias tres, Aquae Rhoeados quantum sufficit, stent per horas 8 vel 10 in vase clauso, donec pulvis mollis fiat, adde solutionem Sacchari albi librarum duarum in Aquae Rhoeados unciis octo in balneo aquae, tunc conjunctis adde Sacchari albi subtiliss. pulv. uncias octo etc.

Aqua Papaveris erratici s. Rhoeados. (Gal. Pal. Sar. *T.*)

℞. Florum Rhoeados partem unam.
Aquae . . . . partes quatuor.
Post sufficientem macerationem destillent partes duae. (Gal. Sar. *T.*)

Pal. Florum partem unam et tres Aquae; destillet pars una cum dimidia.

Extractum Papaveris erratici s. Rhoeadis. (Br. Fer. Sar. *Pid. Vm.*)

℞. Capitum Rhoeadis ante decidentiam petalorum decerptorum libram unam.
Aquae fontanae . . libras octo.
Coque per horam unam et exprime succum, qui ad extracti consistentiam evaporet. (*Pid.*)

Br. tres dies digestionis in Aquae fervidae libris tribus et tunc levem ebullitionem indicat.

℞. Florum Rhoeados recentium quantum vis.
Contusos in mortario macera per horas duodecim in Aquae calidae pondere duplo, cola per crinium, parumper spatulae ligneae ope exprimendo, clarifica liquorem cum albumine et ad extracti consistentiam consume. (Fer. *Vm.*)

℞. Petalorum recentium Rhoeados contusorum . . libras octo.
Macera per tres dies in alambico, tunc destillatione in balneo aquae Aquae uncias circiter duas abstrahe, residuo Aquae triplum infunde et post horas sex digestionis coquendo trientes duos consume; liquorem clarifica, cola et ad electuarii consistentiam consume, cui nonnisi tepido Aquam destillatam affunde. (Sar.)

Bei heftigem Husten, hartnäckiger Diarrhöe, Lungenschwindsucht und in Fällen empfohlen, wo ein gelindes paregoricum angezeigt ist. — Gabe, von zehen Gran bis zu einem Scrupel für einen Erwachsenen.

Infusum Papaveris erratici s. Rhoeados. (Sar. *Ra.*)

℞. Florum Rhoeados drachmas duas.
Aquae bullientis . libras duas.
Infunde. — Erweichend, als gelind-

narkotisch betrachtet und in dieser Eigenschaft bei Nervenschmerzen angewendet. — Glasweise.

Syrupus Papaveris erratici s. rubri s. Rhoeados s. Rhoeadis. (Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Gal. Gen. Ham. HassP. His. Li. Lon. LonN. O. Pal. Pol. Wir. *C. Fi. Sw. T. Vm.*)

℞. Petalorum recentium Rhoeados libras quatuor.
Aquae bullientis . libras octo.
Infunde per horas duodecim in vase tecto; cola leviter exprimendo, sepone per horas aliquot, decantha et liquori adde
Sacchari albi . . . . duplum.
Fiat caloris balnei aquae ope syrupus. (Gal.)

Ams. Florum libram unam, Aquae bullientis libras quatuor, horas duodecim maceracionis et ebullitionem usque ad dimidii consumptionem, solutionem librae unius Sacchari in colatura depurata et coctionem ad consistentiam requisitam; — B. Bel. Bor. Han. O. et Pol. Florum libram unam, Aquae bullientis libras duas, horas duodecim infusionis et libras tres Sacchari; — Bor4. Florum uncias duas, Aquae libras duas, digestionem per noctem et parationem syrupi cum colatura unciarum viginti et Sacchari albissimi libris tribus; — HassP. Florum uncias tres, Aquae fervidae libras duas et uncias quatuor, ad colaturam unciarum viginti Sacchari libras tres ut fiat syrupus; — D. Florum sesquilibram, Aquae bullientis libras tres, infusionis horas duodecim, coctionem ad dimidii remanentiam et parationem syrupi additis Sacchari libris tribus; — Du. et *C.* Florum libram unam, Aquae bullientis uncias viginti, horas duodecim infusionis et Sacchari uncias viginti novem; — His. Florum libram unam, Aquae libras duas, octo horas infusionis et libras quatuor Sacchari; — Lon. LonN. Florum libram unam, Aquae octarium unum et uncias duas, horas duodecim infusionis et Sacchari libras duas cum dimidia; — Pal. Florum libram unam cum dimidia, Aquae bullientis libras tres, infusionis horas viginti quatuor et tres libras Sacchari; — Br. et Wir. Florum libras duas, Aquae libras tres, viginti quatuor horas infusionis et Sacchari libras quinque et uncias quatuor; — Gen. Florum uncias tres, Aquae bullientis libras tres, decoctionem, macerationem per horas duodecim et Sacchari libras sex; — Li. Florum siccorum libram unam, Aquae bullientis quinque, horas duodecim digestionis, coctionem colaturae ad dimidii remanentiam et Sacchari libras tres; — *Fi.* Florum libram unam, Aquae bullientis, Sacchari albi, singulorum libras tres et infusionem per horas viginti quatuor; — *T.* Florum libras duas, Aquae bullientis libras octo, digestionem duodecim horarum in loco tepido, additionem librarum quindecim Sacchari et parationem syrupi in balneo aquae bulliente.

An. *Sw.* et *Vm.* petala in mortario marmoreo contundendo in pulpam redigere jubent; — An. et *Vm.* Florum partem unam et Aquae bullientis unam cum dimidia et horas duodecim infusionis; — *Sw.* Florum partem unam, tres Aquae et horas viginti quatuor infusionis; — *Vm.* Sacchari partes duas pro tribus colaturae; — An. in colatura dissolvere jubet Sacchari uncias octo et *Sw.* partes quatuor praescribit.

Infusum bechicum. (*Sm.*)

℞. Florum Rhoeados . uncias duas.
Infunde
Acidi sulphurici tenuis guttas quindecim.
Adde
Sacchari albi . . . uncias duas.
Infunde totum in
Decocti Hordei perlati libra una.

In vierundzwanzig Stunden, zu zwei oder drei Löffel auf einmal zu verbrauchen, besonders bei den Anfällen des Hustens.

Morsuli Rhoeados. (Per. *T.*)

℞. Infusi Rhoeados . . libras sex.
Sacchari . . . libras quatuor.
Clarificata coque ad aptam consistentiam, in laminam marmoream effunde et in tabellas concide.

T. Decocti Papaveris clarificati libram unam, Sacchari albi libras duas.

Acetum Papaveris erratici s. Rhoeados. (Wir.)

℞. Florum Rhoeados . semilibram.
Aceti rubri . . . . libras tres.
Macera soli exponendo per dies aliquot et cola exprimendo.

Tinctura Papaveris Rhoeados s. erratici. (Pal.)

℞. Conservae Florum Rhoeados unciam unam.
Florum Rhoeados cum Acidi sulphurici sufficiente quantitate adspersorum . . manipulos tres.
Aquae destillatae Succi Florum Rhoeados . . uncias triginta.
Digere per horas viginti quatuor, exprime fortiter et adde

Syrupi Succi Florum Rhoeados cum pauxillo Acidi sulphurici impraegnatorum . . . uncias octo.

Schwach reizend, ehedem häufig bei sogenannten bösartigen Fiebern zu einem Löffel in einem Trank oder Julep angewendet.

Tinctura Florum Papaveris. (Br. Sax. Wir.)

℞. Florum Papaveris albi semunciam. Acidi sulphurici drachmam unam. Aquae Florum Papaveris uncias quatuor.

Digere per horas viginti quatuor, exprime et filtra.

Beruhigend. — Gabe, eine halbe bis eine Unze. (Br. Wir.)

Sax. Florum sesquiunciam, Acidi semunciam, Aquae bullientis uncias duodecim et horas duodecim macerationis.

Oleum Papaveris albi s. somniferi. (A. Ba. Bor. Bor4. Br. Gal. Han. Hass P. H's. Pal. Pol. Sar. Sax. Wir. Würt. *Fi. T.*)

℞. Seminum Papaveris quantum vis. Contunde in mortario marmoreo pistilli lignei ope, et in saccum e tela confectum inclusa frigide exprime.

Bor. Hass P. prelum in aqua bullienti calefacere jubent; — Br. Pal. et Wir. Semina antequam exprimuntur, parumper torrere jubent; — Bor4. oleum venale indicat.

Schmerzstillend und schlafbefördernd.

Pulvis pectoralis. (*Pie.*)

℞. Seminum Papaveris albi drachmas quinque.
Gummi Arabici,
— Tragacanthae,
Amyli,
singulorum sesquidrachmam.
Seminum Portulacae,
— Althaeae,
— Gossypii,
— Malvae,
Quatuor Seminum frigidorum,
Corticis Cydoniorum, singulorum drachmas duas cum dimidia.
Tutiae praeparatae,
Succini,
Pulveris Liquiritiae,
Sacchari,
singulorum sesquidrachmam.

Gabe, zwei Drachmen in Mohn- oder Brustbeersyrup.

Electuarium incrassans. (*Bo.*)

℞. Conservae Rosarum unciam unam.
Syrupi Violarum . uncias duas.
Seminum Papaveris albi drachmas tres.
Olei Nucis moschatae grana sex.

Bei hartnäckigem Husten. — Gabe, ein Kaffeelöffel alle zwei Stunden.

Emulsio temperans. (*Pie.*)

℞. Quatuor Seminum frigidorum unciam unam.
Seminum Papaveris albi uncias duas.
Tere, addendo sensim
Aquae Liliorum,
— Rosarum,
singularum uncias tres.
In colatura dilue
Syrupi Limonum,
— Nymphaeae,
singulorum unciam unam.

Species anodynae. (Ful. Pal. Würt. *Sw.*)

℞. Capitum Papaveris libram unam.
Radicis Althaeae,
Seminis Lini,
singulorum semilibram.
Concisa et contusa misce. (Ful.) Zum Klystir.

℞. Capitum Papaveris . uncias sex.
Florum Chamomillae,
Foliorum Verbasci,
singulorum uncias tres.
Concisa misce. (Ful.) — Zur Bähung.

℞. Capitum Papaveris drachmas duas.
Foliorum Menthae piperitae,
Florum Chamomillae, singulorum manipulum dimidium.
Concisa misce. (*Sw.*)

℞. Foliorum Hyoscyami,
Florum Sambuci,
singulorum unciam unam.
Croci . . . . drachmas duas.
Capitum Papaveris albi uncias quatuor.
Concisa misce. (Würt.)

℞. Capitum Papaveris albi concisorum et contusorum cum seminibus,
Seminum Anethi,
singulorum uncias duas.
Herbae Hyoscyami,
— Cynoglossi,
— Solani nigri,
Foliorum Chamomillae,
singulorum manipulos duos.
Concisa et contusa misce. (Pal.) — Zum Bähen.

Species pro fotu laterali s. ad pleuresiam. (Pal.)

℞. Radicis Althaeae,
Capitum Papaveris contusorum cum granis, singulorum uncias duas.
Seminum Lini,
— Foenu graeci,
— Cumini,
Baccarum Lauri,
singulorum unciam unam.

Herbae Malvae,
— Matricariae,
singularum manipulos tres.
Florum Chamomillae
manipulos duos.

Extractum Papaveris albi. (Br. Han. Lon. LonN. *C. Vm.*)

℞. Capitum Papaveris a seminibus liberatorum . . partem unam.
Aquae . . . . . partes octo.
Decoque ad dimidii remanentiam, cola bene exprimendo et in halneo aquae ad mellis spissi consistentiam consume.

Narkotisch, schmerzstillend, schlafmachend. — Gabe, ein bis zwei Gran, ein oder zwei Mal täglich.

Decoctum Papaveris s. Capitum Papaveris. ((B*. Lon. LonN.)

℞. Capitum Papaveris contusorum uncias quatuor.
Aquae communis octarios quatuor.
Coque per horae quadrantem et cola.

In Bähungen, besonders bei mit Schmerzen verbundenen Abscessen und Excoriationen. Man muß sich jedoch erinnern, daß alle sogenannte narcotica auf der Epidermis beraubte Stellen angewendet, sehr häufig die Schmerzen vermehren, statt sie zu mildern.

Clyster anodynum, Papaveris, leniens (*Ra.*). Decocta de 1) Capitum Papaveris semuncia et Aquae libra una; 2) Capitum Papaveris drachmis tribus et libra una Aquae; 3) denique ex uno Capite Papaveris et duabus libris Decocti emollientis.

Fomentatio leniens ejusd. paratur coquendo Capita duo Papaveris in Aquae et Decocti emollientis, singulorum libris duabus.

Lotio sedativa (*Sw.*). Decoctum Capitum Papaveris semilibrae in Aquae libris duabus ad unam libram colaturae redigendis, cui interdum addi possunt Sublimati corrosivi grana viginti vel Plumbi subacetici liquidi drachma una ad tres.

Fomentatio anodyna. (Pal. *Sa.*)

℞. Specierum anodynarum (formula Pal.) . . libram dimidiam.(?)
Aquae . . . . . libras sex.
Decoque ad librarum quatuor remanentiam et cola. (Pal.)

℞. Capitum Papaveris uncias duas.
Aquae fontanae . . libras duas.
Coque ad librae unius colaturae remanentiam et adde
Aceti . . . . . unciam unam.
Misce bene. (*Sa.*)

Fomentatio antipleuretica. (Pal.)

℞. Specierum ad pleuresiam (Pal.) semilibram. (?)
Lactis vaccini vel Aquae libras octo.
Decoque ad dimidii remanentiam et cola. — Erweichend, auflösend, schmerzstillend. — Bei Pleuresie empfohlen, wenn die Entzündung nicht zu heftig ist.

Gargarisma leniens s. sedans. (Ra.)

℞. Capita Papaveris . . . no. 2.
Seminis Lini . drachmam unam.
Aquae bullientis . . uncias sex.
Colaturae adde
Syrupi Mellis . drachmas duas.

Injectio emolliens. (*Ca.*)

℞. Decocti Capitum Papaveris libram unam.
Emulsionis communis uncias quinque.
Albuminis Ovi recentis drachmam unam.

Bei hitziger Blennorrhagie empfohlen.

Potio leniens. (*Sm.*)

℞. Seminis Lini . drachmas duas.
Caput Papaveris . . . . no. 1.
Aquae . . . . quantum sufficit.
Coque per horae quadrantem ad unciarum octo colaturam et adde
Vitellum Ovi recentis . . no. 1.

Eßlöffelweise in vier und zwanzig Stunden, bei Diarrhöen mit vielem Schmerz.

Jusculum pectorale. (*Sm.*)

℞. Pulli gallinacei partem dimidiam.
Napi in frusta concisi . no. 1.
Aquae . . . . octarium unum.
Coquendo partem quartam consume, in fine addendo
Capitum Papaveris scrupulos duos ad drachmam unam.
Colaturae adde
Sacchari crystallisati (Candis) uncias quatuor.

Gabe, Morgens und Abends zwei Gläser.

Liquor ad nephritidem calculosam. (*Ca. Sw.*)

℞. Capitum Papaveris uncias quatuor ad octo.
Aquae bullientis . libras duas.
Coque ad unciarum octo remanentiam, exprime et adde
Nitri depurati . unciam unam.

Lotio anodyna. (*Sm.*)

℞. Capitum Papaveris unciam unam.
Aquae . . . . . octarios duos.
Coque ad dimidii remanentiam et colaturae refrigeratae adde
Ammoniaci liquidi unciam unam ad duas.

Syrupus Papaveris albi s. Papaveris somniferi s. de Meconio s. de Papavere albo s. diacodion s. de Capitibus Papaveris s. Diacodii s. diacodium liquidum Montani. (A. Ams An B. Ba. Bel. Bor. Br. D. Du. Ed. Fer. Ful. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pal. Sar. Wir. Wür. *C. Fi. Pid. Sp. Sw. T. Vm.*)

℞. Capitum Papaveris albi absque seminibus et grossiuscule contusorum . . . . . partes tres.
Aquae fervidae partes quindecim.
Infunde calore 30 ad 40° per horas duodecim, exprime fortiter et parti uni colaturae adde
Sacchari albi . . partes duas.
Solve. (Ba.)

Li. Papaveris libram unam, Aquae bullientis libras quinque, infusionis horas duodecim et pro libris duabus colaturae Sacchari libras quinque.

℞. Capitum Papaveris cum seminibus uncias octo.
Aquae fontanae . libras quatuor.
Decoque ad dimidii remanentiam; colaturae sepositione depuratae adde
Sacchari albi . . . libras tres.
Fiat syrupus. (Br. Pal. Wir.)

Sp. Sacchari libras quatuor; — Gen. Papaveris libram unam, Aquae libras sedecim et libras quatuor Sacchari; — Fer. Papaveris libram unam, octo libras Aquae et quatuor Sacchari.

℞. Capitum Papaveris albi maturorum et siccorum, absque seminibus, concisorum et contusorum libram unam.
Aquae bullientis . libras octo.
Digere per horas duodecim, tunc in balneo aquae ad consumptionem dimidii usque evapora; liquorem sepone et adde
Sacchari albi . . libras quatuor.
Coque ad syrupi consistentiam. (Gal.)

Du. infundere jubet Capitum non maturorum siccorum absque seminibus libram unam in libris tribus Aquae bullientis per horas duodecim, colare cum expressione, liquidum leni calore ad libram unam consumere, colare per pannum, seponere per horas sex, decanthare et addere Sacchari pulverati uncias viginti novem.

℞. Capitum Papaveris albi fere siccorum absque seminibus, concisorum et contusorum libram unam.
Aquae bullientis libras triginta.
Digesta per horas viginti quatuor coque ad librarum liquidi octo remanentiam, cola exprimendo, ad dimidium consume, sepone ut subsideant et adde Sacchari albi . libras quatuor.
Fiat coquendo syrupus. (Bel.)

Hass. *Pid.* Macerare per horas viginti quatuor Papaveris libram unam in Aquae libris octo, coquere deinde, pro unciis novenis colaturae addere Sacchari uncias sedecim et semel ebullire jubent; HassP. Capitum libram dimidiam, Aquae fervidae libras quatuor macerare per horas viginti quatuor, probe digesta fortiter exprimere et novenis unciis colaturae addere, Sacchari albi uncias sedecim etc.; — Wür. Papaveris uncias octo, Aquae libras duodecim, duodecim horas macerationis, consumptionem ad partem tertiam, colare, ad dimidium evaporare et addere Sacchari libras duas cum dimidia; — *Vm.* Macerare Papaveris partem unam in Aquae quatuor per horas sex, addere octo Aquae, coquendo ad sex redigere, et syrupum cum Sacchari partibus sex parare; — *Sw.* Macerare per horas duodecim Papaveris libras duas in Aquae libris triginta, trientes duos consumere, colare cum expressione, colaturam ad dimidium evaporare, colare et syrupum parare cum Sacchari libris quatuor; — Ams. Macerare per horas duodecim Papaveris libram unam in Aquae bullientis viginti quatuor, dodrantem consumere, colare cum expressione, ad dimidium evaporare, denuo colare, sepositione depurare et cum Sacchari libris tribus syrupum parare; — His. Macerare per horas duodecim Papaveris uncias sedecim in Aquae tepidae libris viginti, trientes duos consumere, colare, addere Sacchari libras quatuor cum Aquae sufficiente quantitate, Albuminis ope clarificare et ad syrupi consistentiam coquendo inspissare; — Ed. Infundere per horas duodecim Papaveris partem unam in Aquae quindecim, trientes duos consumere, colare, ad dimidium usque evaporare et cum Aquae partibus duabus syrupum parare; — Lon. LonN. Macerare per horas viginti quatuor Papaveris uncias quatuordecim in Aquae octariis viginti, coctione in balneo aquae ad sedecim redigere, colare exprimendo, ad octariorum duorum remanentiam denuo consumere, liquorem bullientem colare, seponere per horas duodecim, decanthare, denuo ad octarium unum evaporare et cum Sacchari libris duabus in balneo aquae syrupum parare; — B. Infundere per horas viginti quatuor Papaveris libram unam in Aquae triginta et ad octo redacta colare, iterum pro dimidio consumere, reponere, decanthare et cum Sacchari

albi libris tribus syrupum parare; — Lus. Macerare per horas duodecim Papaveris libras duas in Aquae viginti quatuor, coquendo trientes duos consumere, colare, iterum ad dimidium evaporare et cum quatuor libris Sacchari syrupum parare; — Sar. Infundere per horas viginti quatuor Papaveris libram unam in octo Aquae, tunc coquere, colare exprimendo et colaturae unciis novem Sacchari sedecim addendo syrupum parare; — Gen. Digerere per horas viginti quatuor Papaveris libras duas in octo Aquae, coquendo dimidium consumere et cum libris quatuor Sacchari syrupum parare; — *C.* Macerare per horas duodecim Papaveris partem unam in Aquae quindecim, coquendo quadrantes tres consumere, colare exprimendo, denuo ad dimidium evaporare et addere Sacchari partes duas; — Ful Macerare Papaveris libram unam in Aquae quatuor, coquendo ad dimidium redigere et addere Sacchari ad plumam cocti libras duas; — *T.* Capitum uncias sex, Aquae calidae circa 60° C. libras quatuor; infunde per horas duodecim, cola; residuum per aequale tempus infunde cum Aquae bullientis libris duabus; liquoribus commixtis et ad dimidium evaporatis adde Sacchari albi libras duas vel Syrupi Sacchari libras tres ut fiat evaporando syrupus.

℞. Capitum Papaveris contusorum absque seminibus , libras duas.
Aquae pluvialis , libras viginti.
Macera per horas viginti quatuor, sensim ad ebullitionem usque calorem augendo; cola, sedimentum denuo coque per horae quadrantem cum
Aquae . . . . . libris decem.
Cola, fortiter exprimendo; liquoribus commixtis et ad dimidium evaporatis adde
Sacchari albi . . . libras octo.
Clarifica et ad aptam consistentiam coque. (An.)

Fi. Capitum libram unam macerare cum Aquae pluvialis libris octo per horas duodecim, tunc per horam dimidiam coquere, solvere in colatura Sacchari libras quatuor et clarificata ad syrupi consistentiam decoquere.

℞. Capitum Papaveris siccorum uncias quatuordecim.
Radicis Liquiritiae semunciam.
Aquae bullientis , libras octo.
Macera per noctem, coquendo dimidium consume, cola fortiter exprimendo, adde
Sacchari albi . . libras quatuor et coquendo syrupum para. (D.)

O. Papaveris uncias sedecim, Liquiritiae unciam unam, Aquae libras octo, duodecim horas macerationis, consumptionem partis dimidiae et Sacchari libras quatuor.

℞. Capitum Papaveris concisorum absque seminibus uncias quatuor.
Aquae fontanae . . libras octo.
Decoque ad librarum trium remanentiam et adde sub finem
Radicis Liquiritiae rasae uncias duas.
Cola fortiter exprimendo et liquori adde
Sacchari albi . . sesquilibram.
Clarifica et ad syrupi consistentiam coque. (A.)

℞. Capitum Papaveris non maturorum cum seminibus , uncias duas.
Siliquae dulcis uncias duas cum dimidia.
Aquae fontanae . sesquilibram.
Coque leni igne ad unciarum decem liquidi remanentiam, sub finem addendo
Liquiritiae recentis minutim concisae . . . . sesquiunciam.
In colatura solve
Sacchari albi . uncias sedecim.
Despuma et cola. (Han. Pal. Wir. *Sp.*)

Bor4. Capitum, Siliquarum dulcium absque seminibus, singulorum concisorum uncias tres, Liquiritiae uncias duas, coquere cum Aquae communis libris decem ad duarum cum dimidia remanentiam et colaturae addere Sacchari albissimi libras duas.

Syrupus diacodium s. Papaveris crocatum. (Wir.)

℞. Syrupi diacodium simplicis unciam unam.
Crocі pulverati grana quindecim.

Syrupus Papaveris anisatus. (*Vm.*)

℞. Olei Anisi . drachmam unam.
Mucilaginis Gummi Arabici sesquidrachmam.
Fiat emulsio, cum qua commisce
Syrupi Papaveris albi uncias sexaginta quatuor.

Syrupus pectoralis anglicus. (*Ca.*)

℞. Dactylorum . . . libras duas.
Jujubarum . . . libram unam.
Radicis Liquiritiae . semilibram.
— Althaeae,
Capilli Veneris Canadensis,
Capitum Papaveris albi,
singulorum uncias quatuor.
Coque, cola et colaturae adde
Sacchari albi . . . libras octo.
Evaporent ad syrupi consistentiam usque.

Potio anodyna, leniens, hypnotica,

gummosa opiàcea, Julep narcoticum, anodynum s. pectorale. (Gal. *Pie, Ra.*)

℞. Potionis gummosae uncias quatuor.
Syrupi Diacodii . . semunciam.
Misce. (*Ra.*)

℞. Aquae Cichorii
uncias tres vel quatuor.
Syrupi Diacodii
drachmas quatuor ad sex.
Misce. (*Pie.*)

℞. Infusi Tiliae,
— bechici,
singulorum uncias duas.
Aquae Florum Aurantiorum
drachmas duas.
Syrupi Diacodii . . semunciam.
Misce. (*Ra.*)

℞. Aquae Florum Aurantii
semunciam.
— Lactucae . . uncias tres.
Syrupi Diacodii drachmas duas.
Misce. (Gal.)

℞. Aquae Florum Aurantii,
— Liliorum,
singularum sesquiunciam.
Syrupi Diacodii,
— Boraginis,
singulorum semunciam.
Misce. (*Pie.*)

℞. Aquae Florum Aurantii
unciam unam.
— Melissae . . uncias tres.
Syrupi Sacchari,
— Diacodii,
singulorum unciam unam.
Misce. (*Ra.*)

℞. Aquae Rhoeados,
— Farfarae,
— Nymphaeae,
singularum uncias duas.
Oculorum Cancrorum praeparatorum . . . . . grana viginti.
Syrupi Diacodii . drachmas sex.
Misce. (*Pie.*)

℞. Decocti Lactucae,
— Portulacae,
singulorum uncias tres.
Syrupi Diacodii . uncias duas.
Misce. (*Pie.*)
Löffelweise.

Gargarisma leniens. (*Ra.*)

℞. Decocti Amyli . . uncias octo.
Syrupi Diacodii . unciam unam.

Mixtura pectoralis. (*Sa.*)

℞. Syrupi Diacodii . uncias duas.
Olei Amygdalarum dulcium
uncias quatuordecim.

Emulsio bechica. (*Sa. Sm.*)

℞. Seminum Melonum uncias tres.
Aquae Hordei . quantum sufficit ut fiat emulsionis libra una; colaturae adde
Syrupi Diacodii unciam unam.
Misce bene. (*Sa.*)

℞. Olei Olivarum cochlearia duo majora.
Vitellum Ovi recentis . . no. 1.
Syrupi Diacodii semunciam ad unciam unam.
Aquae . . . . . uncias sex.
Fiat emulsio. (*Sm.*)

Parietaria.

Parietaria officinalis, L.; Wandkraut, Glaskraut; Parietaire (*Gal.*); Pellitory of the wall (*Ang.*); Den a noc, Sklenna bylina (*B.*); Murkurt (*D.*); Parietaria (*His. Lus.*); Parietaria, Erba vitriola (*I.*); Glaskruid (*Bel.*); Noc i dzien (*Pol.*); Vaeggaert (*Suec.*).

Ams. An. Br. Fer. Gal. GalM. Gen. His. Wir. Wür. *Be. Br. G. M. Sp. Z.*

♃ (Polygamia Monoecia, L.; Urticeae, *J.*) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (*Hayne* V. t. 12. *Bull.* t. 198. *Zorn* Ic. pl. t. 121.)

Man wendet das Kraut (herba Parietariae s. Helxines) an; es besteht aus einem rundlichen, röthlichen Stängel mit einrundlanzettigen, gestielten, oben glatten, unten schwach behaarten Blättern.

Gelind harntreibend.

Succus Parietariae. (*T.*)

Ex herba recenti, contundendo in pultem redacta.

Decoctum Parietariae. (*Ra.*)

℞. Foliorum Parietariae
unciam unam.
Aquae . . . . . libras duas.

Ein schwaches diureticum, welches man selten allein anwendet.

Aqua Parietariae. (Gal.)

℞. Herbae recentis Parietariae
partes quinquies millenas.
Aquae partes duodecies mille et quingentas.
Destillent decies circiter mille partes; productum infunde
Herbae recentis Parietariae
partibus quinquies millenis.
Aquae partibus decies millenis.
Destillent partes decies millenae. — Et pro tertio repeti potest.

Paris.

Paris quadrifolia, L.; Einbeere, Wolfsbeere, Fuchstraube; Parisette (*Gal.*); Oneberry (*Ang.*); Ethaer (*D.*); Ubas de zorro (*His.*); Wolfsbezie (*Bel.*); Uva di

volpo (*I.*); Wronie oko (*Pol.*); Parisetta (*Lus.*); Trollbaer (*Suec.*).

Gen. Wir. *Be. M. Sp.*

♃ (Octandria Tetragynia, L.; Asparagineae, *J.*) Eine Europäische Pflanze. (*Zorn* Ic. pl. t. 10.)

Man wendet die Wurzel, das Kraut und die Frucht an.

Die Wurzel (radix Paridis s. Solani quadrifolii) ist fleischig, etwas knotig und mit einigen Fasern versehen. Sie hat einen ekelhaften Geruch und Geschmack. Sie erregt, zu dreißig bis funfzig Gran genommen, Erbrechen. Die Alten verordneten sie gegen Kolik.

Das Kraut besteht aus einem langen, dünnen, glatten, unten blattlosen, oben mit vier eirundspitzigen, wirtelförmig stehenden Blättern besetzten Stängel. Der Geruch ist sehr unangenehm, der Geschmack süßlich. Die Wirkung ist purgirend. Äußerdem hat man es als schmerzstillend, schweißtreibend und giftwidrig betrachtet. Es ist besonders bei Manie, Krämpfen, Keuchhusten, Vergiftung mit Krähenaugen ꝛc. angewendet worden.

Die Früchte (Uvae versae s. vulpinae) sind dunkelpurpurrothe oder schwarzbraune, glänzende, kirschgroße Beeren. Sie haben einen unangenehmen Geruch und einen widerlichen Geschmack. In den Magen gebracht bewirken sie wahre Vergiftungszufälle.

Paronychia.

Paronychia argentea, Lmk.; glänzende Knorpelblume; Paronique argentée (*Gal.*); Nevadella (*His.*).

His.

⊙ (Pentandria Monogynia, L.; Paronychieae, *A. St. Hil.*) Eine Pflanze des südlichen Frankreich's.

Man wendet das blühende Kraut (herba Sanguinariae minoris) an; es besteht aus einem ästigen Stängel mit eirunden, spitzigen, fast glatten Blättern, kürzern aber am Grunde breiten Nebenblättern und kleinen endständigen, von großen Deckblättern geschützten Blüthenköpfen.

Paspalum.

Paspalum Dactylum, Lmk.; fingerförmiges Hirsegras; Pied-de-poule, Paspale (*Gal.*); Creeping panic gras (*Ang.*); Grama (*His.*); Gevingerd panik (*Bel.*); Grama digitade (*Lus.*).

Fer. Gal. Gen. His.

♃ (Triandria Digynia, L.; Gramineae, *J.*) Eine in Europa gemeine Pflanze. (*Schrad.* Fl. Germ. I. p. 165. t. 3. f. 9.)

Die Ausläufer, welche man gewöhnlich anwendet und fälschlich als Wurzeln betrachtet, sind sehr lang, rabenfederdick, walzig und knotig. Sie enthalten unter einer harten, gelben, glänzenden Oberhaut eine weiße Substanz von mehligem, zuckerartigen Geschmack.

Pastinaca.

Pastinaca sativa, L.; Pastinak; Panais (*Gal.*); Garden parsnip (*Ang.*); Passtenak (*B.*); Pastinak (*D.*); Pastinaca (*His. I. Lus.*); Pinsternakel (*Bel.*); Pasternak (*Pol.*); Palsternacka (*Suec.*).

An. B. Fer. Gal. Suec. Wir. *Be. Br. M. Sp. Z.*

♂ (Pentandria Digynia, L.; Umbelliferae, *J.*) Eine in ganz Europa gebaute Pflanze. (*Blackw.* t. 379. *Schk.* t. 76. *Plenck* t. 227. *Huyne* VII. 76. *Zorn* Ic. pl. t. 568.)

Man wendet die Wurzel und die Saamen an.

Die Wurzel (radix Pastinacae) ist daumenstark und dicker, fleischig, weißlich oder gelblich. Sie hat einen etwas gewürzhaften und zuckerigen Geschmack.

Der Saame ist rundlich, elliptisch, fast flach, mit einem kleinen häutigen Rand umgeben, gestreift, von etwas gewürzhaftem und zuckerigem Geschmack.

Reizend, ehedem als harntreibend betrachtet.

Perfoliata.

Bupleurum rotundifolium, L.; Durchwachs; Perce-feuille (*Gal.*); Thorough wax (*Ang.*); Giennenvaext (*D.*); Perfoliata (*His.*); Doorwas (*Bel.*); Perforata (*I.*); Obiezy swiat (*Pol.*); Perfolhada (*Lus.*); Genomväxt (*Suec.*).

Br. Gal. Wir. *M. Sp.*

⊙ (Pentandria Digynia, L.; Umbelliferae, *J.*) Eine in Europa gemeine Pflanze. (*Hayne* VII. 1. *Zorn* Ic. pl. t. 376.)

Man wendet das Kraut und den Saamen an.

Das Kraut (herba Perfoliatae) besteht aus großen, eirunden, rundlichen, meist durchwachsenen oder auch bloß umfassenden, geruch- und geschmacklosen Blättern.

Der Saame ist klein, schwarz, hart und von scharfem, bitteren, gewürzhaften Geschmack.

Persica.

Persica vulgaris, Cand.; Pfirsichbaum, Pfirschenbaum; Pêcher (*Gal.*); Peachtree (*Ang.*); Khowkh (*Ar.*); Breskew (*B.*); Persikkotrae (*D.*); Prisco (*His.*); Per-

sikboom (*Bel.*); Persico, Pesco (*I.*); Schuftalu (*Pe.*); Broskwina drzewo (*Pol.*); Pecegueira (*Lus.*); Persiketraed (*Suec.*).

A. An. Bc. Br. Fer. Gal. Gen. His. Wir. Wür. *A. Be. Br. Fi. G. M. Sp.* Z.

Ein Baum (Icosandria Monogynia, L.; Rosaceae, *J.*), welcher urſprünglich in Perſien einheimiſch iſt. (*Duham.* Arb. fruit. II. t. 1 — 14; 20 — 32. *Blackw.* t. 101. *Plenck* t. 556. *Hayne* IV. 38. *Zorn* Ic. pl. t. 282.)

Man wendet die Blätter, die Blüthen und die Saamen an.

Die Blätter (folia Persicorum) ſind einfach, lang, lanzettförmig, ſpitzig und an den Rändern fein gezähnt. Sie haben den Geruch und Geſchmack der bittern Mandeln. Ihre Wirkung iſt ſchwach abführend.

Die Blüthen ſind röthlich oder roſenroth und beſitzen dieſelbe Eigenſchaft, wie die Blätter.

Der Saame iſt ein holziger, ſehr harter, auf der Oberfläche riſſiger Kern, deſſen bittere Mandel ein ſüßes Oel und Hydrocyanſäure enthält.

Conserva Florum Persicorum. (Sar. *Fi. T.*)

℞. Florum Persicae recentium contusorum . . . partem unam.
Sacchari ad plumam cocti
partes duas.

Commisce bene.

T. Florum uncias sex cum duabus Sacchari in pulpam redigere, hanc per crinium trajectam cum Sacchari albi ad plumam cocti libris quatuor commiscere et evaporatorii ope vel soli exposita ita evaporare ut levis crusta in superficie oriatur, jubet; — *Fi.* Florum libram unam cum Sacchari unciis duabus in pastam redigere et hanc cum Sacchari ad plumam cocti tanta quantitate coquere ut omne saccharum libras tres aequet.

Succus ex Floribus Persicorum. (Sar. *Fi.*)

℞. Florum Persicae recentium a calicibus liberatorum quantum vis.

Adspersos cum Aquae pauxillo in saccum include, exprime fortiter et succum filtra. Si eum servare in animo est, sepone ut subsideat, tunc partem limpidam addito Alcoholis pauxillo sub strato olei in lagenis serva.

Fi. Flores cum parte ponderis quarta Aquae in vase cupreo stanno obducto lenissimo calore calefacere, spatulae ligneae ope agitare ut flores molles fiant et prelo subjicere.

Infusum Persicorum s. Florum Persicae. (His. Sar.)

℞. Florum Persicae . libras duas.
Aquae bullientis . . libras octo.

Infunde per horas octo, cola leviter exprimendo et operationem novies supra novas flores repete. (Sar.)

℞. Florum Persicae libram unam.
Aquae bullientis . libras duas.

Infunde per horas octo et cola exprimendo. (His.)

Decoctum Foliorum Amygdali Persicae. (*Au. Sw.*)

℞. Foliorum siccatorum Persicae
unciam unam.
Aquae . . . . . libras duas.

Decoque ad sesquilibrae colaturae remanentiam. — Bei Blutharnen, Dysurie und Nierenentzündung empfohlen. — Gabe, täglich ein Pfund.

Syrupus Foliorum Persicae. (*Vm.*)

℞. Foliorum recentium Persicae
quantum vis.

Contunde absque aqua et exprime succum, in cujus ebullitione coagulati partibus colaturae quinque solve Sacchari albi . . partes novem.

Syrupus Persicorum Florum s. de Amygdali Persicae Floribus s. Amygdali Persicae. (An. Br. Fer. Gal. Gen. Pal. Sar. Wir. Wür. *Fi. T. Vm.*)

℞. Florum recentium Persicae
libras quatuor.
Aquae bullientis libras duodecim.

Infunde per horas duodecim super cinere calido, in vase tecto; cola leviter exprimendo; sepone, decantha et adde

Sacchari albi libras septemdecim.

Coque ad syrupi consistentiam. (Gal.)

Br. Pal. et Wir. macerare per horas duodecim jubent Florum libram unam in Aquae bullientis libra una, exprimere deinde et in unciis novem colaturae depuratae Sacchari albi uncias sedecim solvendo syrupum parare; — Fer. *Fi.* Macerare per horas duodecim Florum partes duas in tribus Aquae bullientis et colaturae addere Sacchari partes duas; — *Sa.* Coquere ad consistentiam aptam mixturam e partibus aequalibus Infusi Florum Persicae et Syrupi communis; — *T.* Flores cum Aquae bullientis duplo pondere per horas viginti quatuor macerare, tunc filtrare fortiter exprimendo, et hoc semel vel bis repetere, tunc sepositione et decanthatione clarificata cum Sacchari pondere duplo in balneo aquae bulliente commisce vel secund. *Boullay*: Florum libras quatuor cum duodecim Aquae destillare et in parte dimidia, destillatione obtenta in balneo

aquae et in retorta obturata Sacchari libras novem et in decocto in vase residuo, cum expressione filtrato, decanthato aequalem sacchari copiam solvere, syrupos commiscere, agitare bene et mitis balnei aquae caloris ope intime commiscere.

℞. Florum recentium Persicae partes duas.

Contundendo in pastam redige, cui infunde in vase tegendo

Aquae fervidae . partes quatuor.

Post refrigerationem cola exprimendo et in colaturae partibus quatuor solve

Sacchari albi . . . partes septem.

Despuma. (*Vm.*)

℞. Florum Persicae . uncias octo.

Gemmarum Persicae uncias duas.

Aquae bullientis uncias sedecim.

Infunde in balneo aquae per horas viginti quatuor, vase tecto; filtra et in colaturae unciis quinque solve

Sacchari albi . . . uncias octo.

Cola. (An.)

℞. Sacchari albi . libras quatuor.

Aquae fontanae quantum sufficit.

Coque ad syrupi spissi consistentiam, quem adhuc calidum

Florum recentium Persicae libris duabus

infunde, et per tres dies, vase tecto, macerata, leviter coque et cola fortiter exprimendo. (Gen.)

Emulsio externa e nucleis Persicae s. leniens. (Wir.)

℞. Nucleorum Persicae unciam unam.

Seminum Cannabis,

— Papaveris,

singulorum semunciam.

Aquae Meliloti,

— Nymphaeae,

singularum uncias quatuor.

Emulsioni adde

Aquae Vitae camphoratae semunciam.

Man legt es bei Kopfschmerz mittelst Compressen auf die Stirn und die Schläfe.

Persicaria.

Zwei Arten einer Pflanzengattung sind unter diesem Namen in der Medicin gebräuchlich.

1) *Polygonum Persicaria, L.*; gemeiner Knöterich; Persicaire douce (*Gal.*); Spotted persicaria (*Ang.*); Loppegraes (*D.*); Persicaria monchada (*His.*); Persenkruid (*Bel.*); Pessigueira (*Lus.*); Raekuesva (*Suec.*).

Gal. His. *Sp.*

☉ (Octandria Trigynia, L.; Polygoneae, J.) Eine Pflanze Europa's. (*Hayne* V. t. 28. *Oed.* Fl. Dan. t. 702.)

Man wendet das Kraut (herba Persicariae minoris) an; es besteht aus einem runden, röhrigen, röthlichen, knotigen, ästigen Stängel mit abwechselnden, gestielten, lanzettförmigen Blättern. Der Geschmack ist schwach sauer und etwas salzig.

Wurde ehedem für ein Wundmittel gehalten.

2) *Polygonum Hydropiper, L.*; Bitterknöterich, Wasserpfefferknöterich; Persicaire poivrée, brûlante, âcre, Poivre d'eau, Piment brûlant (*Gal.*).

Gal. Gen. *Bs. M. Sp.*

☉ Eine Europäische Pflanze. (*Blackw.* Herb. t. 119. *Bull.* t. 127. *Plenck* t. 308. *Schk.* t. 108. *Hayne* V. t. 20.)

Man wendet das Kraut (herba Persicariae urentis s. Hydropiperis s. Mercurius terrestris) an; es besteht aus einem glatten, runden, knotigen, ästigen Stängel mit abwechselnden lanzettförmigen Blättern. Es hat keinen Geruch, aber einen außerordentlich scharfen, brennenden, pfefferartigen Geschmack.

Frisch auf die Haut gelegt wirkt es rothmachend.

Species pro infuso diuretico s. diureticae. (*Au.*)

℞. Foliorum Persicariae minoris,

Radicis Junci sylvestris semunciam.

Foliorum Petroselini,

Herbae Hyssopi,

Cinnamomi,

Corticis Aurantiorum,

Anisi,

singulorum drachmam unam.

Concisa et contusa misce.

Petasites.

Tussilago Petasites, L.; Pestilenzwurzel, Pestwurzmännlein, Reunkraftrosthuf; Petasite (*Gal.*); Butterbur (*Ang.*); Demesyl Wetssj konske kopyto (*B.*); Storbladet hestihoc (*D.*); Petasites, Lombrerera (*His.*); Poddeblad (*Bel.*); Petasite (*I.*); Lipieznik (*Pol.*); Pestilensrot (*Suec.*).

Ba. Br. Gal. His. Li. Wir. *Bo. Br. M. Pid. Sp.* Z.

♃ (Syngenesia Polygamia Superflua, L.; Synanthereae, *Cass.*) Eine im nördlichen Europa an feuchten Orten gemeine Pflanze. (*Hayne* II. t. 17. 18. Düss. off. Pfl. III. t. 7. *Zorn* Ic. pl. t. 58.)

Man wendet die Wurzel (radix Petasitidis s. Petasitidis majoris s. vulgaris s. rubentis) an; sie ist ästig, faserig, fin-

gerasdick, außen braun, inwendig gelb oder roth. Sie hat einen starken und unangenehmen Geruch und einen bittern, widerlichen Geschmack.

Petroleum.

Oleum Petrae; Steinöl, Bergöl, Pétrole (*Gal.*); Petrol, Barbados tar (*Ang.*); Nefl (*Ar.*); Muttie ka tail (*Duk.*); Petroleo (*His.*); Milti tel (*Hin.*); Petroleo, Olio di Sasso, Nafta impura (*I.*); Kesesa no abra (*Jap.*); Minnia tanna (*Mal.*); Oley skalny (*Pol.*); Bhumi tailam (*Sa.*); Bergolja (*Suec.*); Ippa (*Sumat.*); Mun tylum (*Tam.*).

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. Du. Ed. Fenn. Fer. Gal. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *A. Br. C. Fi. G. Pid. Sp. T.*

Ein flüssiges Erdharz von oft öliger Consistenz, schwärzlichbrauner, bisweilen röthlichbrauner Farbe, fast undurchsichtig, leichter als Wasser, salbenartig anzufühlen, sehr leicht entzündlich, unter Entwickelung eines dicken schwarzen Rauchs verbrennend, von sehr starkem Geruch und scharfem Geschmack.

Reizend, krampfstillend, harntreibend, wurmwidrig. — Gabe, zehen bis funfzehen Tropfen auf Zucker.

Oleum volatile s. Naphtha Petrolei, Petroleum rectificatum. (Bor4. Wür. *Fi. Sw.*)

℞. Petrolei . . . . . libras duas.
Aquae . . . . libras quatuor.
Destillent blando igne, quamdiu oleum limpidum transit.

Bor4. Petroleum cum Aquae fontanae octuplo destillare jubet, ita ut tertia pars prioris remaneat; — *Fi.* Petrolei partem unam, Aquae communis partes decem.

Reizend, auflösend, besonders äußerlich bei Gelenkschmerzen, Ekchymosen und Lähmung.

Linimentum Petrolei. (*Sa. Sw.*)

℞. Petrolei,
Alcoholis rectificati,
singulorum unciam unam.
Misce bene. (*Sa. Sw.*)

℞. Essentiae Saponis drachmas octo.
Petrolei . . . sesquidrachmam.
Misce. (*Sa.*)

In Einreibungen gegen Frostbeulen.

Mixtura anthelmintica. (B*. *Au.*)

℞. Petrolei . . . . . semunciam.
Tincturae Asae foetidae
drachmas sex.
Misce. — Gabe, vierzig Tropfen, täglich drei Mal. — Von Schwarz gegen Bandwurm empfohlen.

Peucedanum.

Peucedanum officinale, L.; Saufenchel, Schwefelwurzel, Haarstrang; Peucédan, Feneuil de porc, Queue de pourceau (*Gal.*); Common sulphur wort (*Ang.*); Svinekenkel (*D.*); Peucedan (*His. I. Lus.*); Hairstreng (*Bel.*); Wieprzniek (*Pol.*); Svinfinkel (*Suec.*).

Br. Gal. His. Wir. *Be. M. Sp.*

♃ (Pentandria Digynia, L.; Umbelliferae, *J.*) Eine Pflanze des nördlichen Europa's. (*Gmel.* Fl. Sibir. I. t. 41. *Hayne* VII. t. 4.)

Man wendet die Wurzel (radix Peucedani s. Feniculi porcini) an; sie ist dick, lang, rund, faserig, außen schwärzlich, innen weiß. Sie hat einen narkotischen Geruch und einen scharfen, bittern und schleimigen Geschmack.

Reizend, gegen Hysterie wirksam.

Extractum Peucedani. (Sar.)

℞. Radicis Peucedani libram unam.
Vini albi generosi
libras quinque ad sex.

Post tres dies digestionis in arenae balneo cola, fortiter exprimendo, tunc coque residuum cum novi Vini sufficiente quantitate ad dimidii remanentiam; liquores commixti ad extracti consistentiam usque evaporent.

Syrupus de Peucedano. (Sar.)

℞. Extracti Radicis Peucedani,
— — Liquiritiae,
singulorum unciam unam.
— Foliorum Veronicae,
— — Tussilaginis,
singulorum drachmas tres.
Mellis albi colati . uncias duas.
Aquae destillatae radicis Peucedani
quantum sufficit.

Misce igne blandissimo ut fiat syrupus.

Oleum Peucedani aethereum, Aethereoleum Peucedani. (Sar.)

℞. Radicis Peucedani
partes viginti quinque.
Aquae partes septuaginta quinque.
Salis culinaris . . . partes tres.

Destillent; oleum producto supernatans collige.

Phellandrium.

Phellandrium aquaticum, L.; Wasserfenchel, Peerfaat, Pferdesaamen; Phellan-

dré equatique (*Gal.*); Fike leaved water hemlock (*Ang.*); Vandfennikel (*D.*); Waterkervel (*Bel.*); Fellandrio aquatico, Finocchio aquatico (*I.*); Koper wodny, Kruszykamien ziele (*Pol.*); Staekra (*Suec.*).

A. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Penn. Fer. Gal. Han. Hass. HassP. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Würt. WW. *Be. Fi. G. M. Sp.*

♂ (Pentandria Digynia, L.; Umbelliferae, J.) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (*Hayne* I. 40. *Blackw.* t. 570. *Plenck* t. 210. *Bull.* t. 147. *Oed.* Fl. Dan. t. 1154.)

Man wendet das Kraut und den Saamen an.

Das Kraut (herba Phellandrii s. Foeniculi aquatici) besteht aus einem walzigen, röhrigen, gestreiften, ästigen Stängel mit dreifach gefiederten, glatten Blättern, deren Blättchen in lange, schmale, linienförmige Läppchen getheilt sind.

Der Saame ist eirund, länglich, auf einer Seite eben, auf der andern gestreift, von den Kelchresten und den Griffeln gekrönt, bräunlich oder grünlichgelb.

Der Geruch ist unangenehm, stark, durchdringend, der Geschmack gewürzhaft und etwas bitter.

Narkotisch, aufregend, harntreibend. — Gabe, vom Pulver der Saamen, zehen bis zwanzig Gran täglich drei Mal.

Pulvis ex Phellandrio aquatico gummatus. (*B.*)

℞. Seminum Phellandrii
scrupulum unum.
Gummi Arabici . drachmas duas.
Divide in doses sex. — Gabe, ein Stück alle drei Stunden, bei Scropheln und scrophulöser Schwindsucht.

Pulvis ad catarrhum s. anticatarrhalis. (*Au. Sm.*)

℞. Seminum Phellandrii
drachmam unam.
Salep,
Gummi Arabici,
singulorum unciam unam.
Sacchari Lactis . uncias duas.
Gabe, ein Kaffeelöffel in einem Glase Zuckerwasser, drei oder vier Mal täglich, bei chronischen Catarrhen. (*Sm.*)

Au. Phellandrii grana quinque, Gummi octo, Nitri sex et decem Sacchari. — Gabe, dreimal täglich zu wiederholen.

Emulsio ad catarrhum s. anticatarrhalis. (*Vm.*)

℞. Seminum Phellandrii
unciam unam.
Gummi Arabici drachmam unam.
Contere, sensim affundendo
Aquae . . . . uncias novem.
Cola, desideant, tum decantha et adde
Syrupi Sacchari . unciam unam.

Tinctura Phellandrii. (B^a. *Au.*)

℞. Seminum Phellandrii semunciam.
Alcoholis . . . . uncias sex.
Digere per horas viginti quatuor et adde
Vini Muscat dicti . uncias sex.
Digerendo per duos dies continua.

Au. eandem formulam sed absque Vino Muscat.

Gabe, zehen bis sechszig Tropfen, bei Lungenschwindsucht. — Von Martius als ein sehr wirksames Mittel betrachtet.

Decoctum pectorale in phthisi. (*B.*)

℞. Dulcamarae . . drachmas duas.
Seminum Phellandrii . .
drachmam unam.
Aquae . . . quantum sufficit ad decocti uncias octo obtinendas, quarum colaturae adde
Emulsionis gummosae uncias duas.
Oxymellis simplicis unciam unam.
Morgens, auf zwei Mal zu nehmen.

Pilulae in bronchitide lenta. (*B.*)

℞. Seminum Phellandrii
scrupulos tres.
Mercurii dulcis grana quatuor.
Fiant pilulae quindecim. — Gabe, drei Stück alle zwei Stunden bei chronischem Catarrh.

Phoenix.

Phoenix dactylifera, L.; Dattelpalme; Dattier (*Gal.*).

Ba. Br. Fer. Gal. HassP. His. Wir. *Be. Br. G. M. Sp.* Z.

Ein Baum (Dioecia Triandria, L.; Palmae, J.) Ostindien's, des nördlichen Africa's und des südlichen Europa's. (*Blackw.* t. 202. *Delile* Egypt. t. 62. Dict. d. Sc. nat. VII. *Lamk.* Ill. t. 893. Fl. méd. III. 148. *Bert.* Bild. II. 43. f. 2.)

Man wendet die Früchte, Datteln (Dactyli, Palmulae), Dattes (*Gal.*); Date (*Ang.*); Datte (*B.*); Dadel (*Bel.*) an. Es sind eirunde, etwas längliche, gelbliche Steinfrüchte, welche unter einer dünnen, glatten Oberhaut ein saftiges Fleisch und von diesem umhüllt, einen fast holzigen Saamen oder Kern enthalten, welcher auf der einen Seite mit einer Längsfurche bezeichnet ist.

Erweichend, Brustmittel.

Pulpa, Conserva Dactylorum. (Gal. *Fi.* T.)

℞. Dactylorum . . quantum vis.

Aquae bullientis quantum sufficit.
Coque ut fructus molles reddantur et nucleis semotis, pulpam per crinium trajice, adde aquam decoctionis et totum blando calore ad aptam consistentiam consume.

Fi. ut conservam prunorum, quam vide.

Pasta Dactylorum. (Gal. *T.*)

℞. Dactylorum a nucleis liberatorum sesquilibram.

In frustula minora concisos coque in
Aquae purae . . . libris decem per horam, donec facillime inter digitos conteri possint et cola decoctum. Dissolve
Gummi Senegalensis . libras sex in Aquae libris viginti et solutionem cola; misce eam cum altero liquore et adde
Sacchari albi . libras quinque.
Albuminum in Aquae pauxillo dilutorum . . . . . no. 5.

Coque, despumando et tunc ad tertiam partem consume; cola per linteum et vaporando ad syrupi spissi consistentiam redige, cui adde
Aquae Florum Aurantiorum uncias novem.

Evaporent ad extracti mollis consistentiam et in modulos chalceos oleo obductos infunde ut balnei vaporis ope siccentur.

T. Dactylorum libram unam et loco Aquae florum aurantiorum Tincturae Citri et Aquae Citri, singularum drachmas tres adhibet.

Phosphorus.

Phosphorus; Phosphore (*Gal.*).

1) Wie er im Handel vorkömmt.

Am. B. Ba. Bel. Bor. Fenn. HassP. Sar. Suec. *C.*

2) Gereinigter.

B. Bel.

℞. Phosphori venalis . quantum vis.

In saccum e tela confectum in Aquam frigidam immersum ingere, hanc pedetentim calefac et simulac phosphorus mollis est factus eum leviter premendo per telam trajice; tunc penitus liqua in Aqua frigida et in tubos vitreos effunde, quos in Aquam puram in fundo lagenae chartâ nigrâ tectae immerge.

3) Bereitung im Ganzen.

A. An. Ba. Bor. Br. D. Ful. Gal. Han. Hass. O. Pol. Sax. Wir. Würz. *Br. Sw. Vm.*

A. Gewinnung des Phosphors aus Urin.

Br. Ful. Wir. Würz.

℞. Salis Ammoniaci pulverati libras duas.
Minii . . . . libras quatuor.

Destillent in cucurbita vitrea, serva productum, caput mortuum repone et hujus libras tres in ollam ferream ingere continentem
Urinae per sex septimanas putrefactae et ad mellis consistentiam inspissatae . . . libras decem.
Carbonis pulverati . semilibram.

Agita mixturam, donec in pulverem nigrum, nullum urinae odorem emittentem redacta sit; imple eâ tres quadrantes cucurbitae fictilis vernice obductae, et adaptato recipiente aliquanto supra dimidium capacitatis Aqua repleto, destilla, ignem sensim augendo; phosphorum guttatim in aquam destillantem collige. (Br. Würz.)

℞. Salis urinae ex urina ad mellis consistentiam inspissata crystallisatione obtenti . . partes octo.
Carbonis pulverati partem unam.
Destillent ut antea. (Ful. Wir.) —

Dieses Verfahren wird nicht mehr angewendet.

B. Gewinnung desselben aus Knochen.

A. An. Ba. Bor. D. Fer. Gal. Han. Hass. O. Pal. Sax. *Br. Sw. Vm.*

℞. Ossium Mammalium ad alborem calcinatorum et pulveratorum partes duodecim.

Dilue in cupa lignea Aquae ea quantitate ut puls spissa obtineatur, cui sensim adde
Acidi sulphurici (66°) partes decem,
baculi ope agitando. Magmati novam Aquam infunde ut fiat puls liquida, quam per horas viginti quatuor sepositam cum Aqua bulliente supra telam arcte textam tene, donec liquidum saporis expers transeat; aquâ in lebete cupreo evaporatâ praecipitatum lava et aquam lotionis cum priore commisce; tunc toto ad syrupi consistentiam evaporato adde Carbonis pulverati partem quartam et calefac ad ruborem fere in pelve ferrea ita ut perfecte siccetur; hac mixtura retortam arenaceam pro tribus quadrantibus repletam in fornicem lectum galea instructum colloca; cujus collo vas cupreum est adaptatum in tubum extensum, qui obturaculum subereum penetrans in lagenam vitream ad dimidium fere Aqua repletam immergit; destilla leni igne ita ut retorta post horam demum rubescat; phosphorum qui in recipientem transit collige et sub aqua fervida 45° per pellem rupicaprae cola.

Eins der kräftigsten Reizmittel, ein sehr gefährliches Gift, und ein Aphrodisiacum, wie behauptet wird, welches nur mit der äußersten Vorsicht angewendet werden darf und besser aus der Materia medica, als inneres Arzneimittel wenigstens, ganz ausgestrichen würde. — Gabe, einen viertel bis einen ganzen Gran täglich.

Phosphorus pulveratus. (Han.)

℞. Phosphori . drachmam unam.
In lagenam unciarum trium capacem immisso superfunde
Aquae . . . . unciam unam.
Calefac lagenam in Aquam bullientem immergendo. Simulac phosphorus liquefactus est, lagenam fortiter agita. Pulverem filtro impositum deinde sicca.

Emulsio phosphorata. (B*. *Au. T*)

℞. Phosphori grana duo ad quatuor.
Olei Amygdalarum dulcium
unciam unam.
Digere et dissolve, tunc cum
Amygdalarum dulcium excorticatarum . . . . . no. 3,
Gummi Arabici . . . semuncia,
Aquae communis
unciis tribus vel quatuor,
Syrupi Althaeae . . semuncia emulsionem para. — Gabe, einen halben oder ganzen Löffel, je nach der Menge des Phosphors.

Linctus Phosphori. (*T.*)

℞. Phosphori sub Aqua fusi
grana duo.
Cum Saccharo, Vitello Ovi et Olei Amygdalarum dulcium modica quantitate looch para. — Wird wie die Emulsion angewendet.

Potio phosphorata. (B*. *Au. E.*)

℞. Phosphori . . . . grana duo
Mucilaginis Gummi Arabici
quantum sufficit.
Aquae fontanae . semilibram.
Fiat emulsio, cui adde
Syrupi Amygdalarum
unciam unam.
Liquoris anodyni Hoffmanni
guttas triginta.
Gabe, alle zwei Stunden einen Löffel.

℞. Essentiae Terebinthinae
semidrachmam.
Olei Olivarum . drachmas tres.
Phosphori . . . . grana duo.
Aquae bullientis quantum sufficit.
Gummi Arabici . . semunciam.
Aquae aromaticae cujuslibet
uncias quatuor.
Syrupi Cinnamomi unciam unam.
Misce. (*Au.*)

℞. Phosphori . . . granum unum.
Olei animalis Dippelii
drachmam unam.
— essentialis Caryophyllorum
scrupulum unum.
Gabe, zwei bis drei Tropfen, Morgens und Abends, bei paralytischer Amaurose, Gesichtsschmerz und chronischem Rheumatismus. (*Au.*)

Alcohol phosphoratus. (*Br.*)

℞. Alcoholis . . . . uncias octo.
Phosphori minutim concisi
grana octo.
Contere in mortario vitreo, donec alcohol saporem suavem perdiderit, et decantha.

Aether phosphoratus.

1) Mit aether phosphoricus.

Aether phosphoro-phosphoricus, Phosphorus liquidus. (*Sw*. Vm.*)

℞. Phosphori . . . partem unam.
Aetheris phosphorici (60°)
partes sexaginta.
Agita fortiter ad dissolutionem perfectam usque. (*Vm.*)

℞. Phosphori . . grana quatuor.
Olei essentialis Caryophyllorum
guttas sedecim.
Aetheris phosphorici semunciam.
Dissolve blando calore, in vase clauso. (*Sw**.)

℞. Phosphori . scrupulum unum.
Ammonii subcarbonici
semiscrupulum.
Contere in mortario cum aethere phosphorico humectato, mixturae in lagenam immissae infunde
Aetheris phosphorici
uncias duas et dimidiam.
Agita ad perfectam solutionem usque. (*Sw**.)

2) Mit Aether sulphuricus.

Aether sulphuricus phosphoratus, Naphtha Vitrioli phosphorata. (An. B*. Bor4. D. Gal. Han. *Au. Br. Ca. Pie. T.*)

A. Formel von Bouttaz oder Pelletier.

℞. Aetheris rectificati uncias quatuor.
Phosphori puri grana viginti octo.
Dissolve. (An. *Ca.*)

Gal. Phosphori drachmas duas cum dimidia et Aetheris libram unam; — B*. Phosphori grana quatuor et Aetheris semunciam; — Bor4. Phosphori grana sex, Aetheris unciam unam; — *Br* Phosphori grana octo et Aether's uncias octo; — D. et Han. Phosphori grana sedecim et Aetheris uncias duas; *Au.* Phosphori grana duo et Aetheris

drachmas duas; — *T.* Phosphori scrupulum unum, Aetheris uncias quatuor.

B. Formel von Flittner.

℞. Phosphori grana viginti quatuor.
Olei essentialis Caryophyllorum drachmas tres.
Solutioni adde
Aetheris sulphurici drachmas viginti et unam.
Misce bene. (B*.)

Pie. Phosphori grana tria, Olei Caryophyllorum guttas duodecim et Aetheris semunciam.

C. Formel von Loebenstein-Loebel.

℞. Phosphori . . . . grana duo.
Olei Menthae piperitae scrupulum unum ad semidrachmam.
Solutioni adde
Aetheris sulphurici . semunciam.
Misce sedulo. (B*.)
℞. Phosphori . . . . grana tria.
Aetheris sulphurici semunciam.
Olei essentialis Valerianae guttas decem.
Misce bene. (*Au.*)

Eine Unze reiner Aether löst sechs Gran Phosphor auf.

Gabe, zwei bis vier Tropfen auf Zucker, in vierundzwanzig Stunden und täglich um zwei oder drei Tropfen gestiegen.

Tinctura Salis Tartari phosphorata. (*Vm.*)

℞. Tincturae Salis Tartari quantum vis.
Calefac leviter in balneo arenae et immitte in frustulis parvis
Phosphori . . quantum sufficit donec hic non amplius dissolvatur; sepone per aliquot tempus et decantha.

Mixtura Chinae phosphorata, Potio excitans. (*Au*)

℞. Aquae Cinnamomi . uncias tres.
Extracti Chinae . . semunciam.
Phosphori in Aethere sulphurico soluti . . . . . grana tria.
Syrupi Corticum Aurantiorum uncias tres.

Gabe, alle zwei Stunden einen Löffel.

Linimentum phosphoratum. (Fer. *Ca.*)

℞. Phosphori concisi grana triginta.
Olei Amygdalarum dulcium libram unam.

Dissolve leni calore et post refrigerationem cola. (*Ca.*)

Fer. Phosphori grana duodecim et Olei uncias quatuor.

Bei rebellischen Rheumatismen, Lähmung und Atrophie. — Gabe, eine halbe bis eine Unze auf jede Einreibung.

Linimentum phosphoratum camphoratum. (B*. Han. *Au. Ca. Vm.*)

℞. Phosphori . . . grana decem.
Camphorae . . . scrupulos duos.
Olei Amygdalarum dulcium unciam unam.

Dissolve (B*. Han.)

Vm. Phosphori scrupulum unum, Camphorae scrupulos quatuor et Olei Amygdalarum dulcium unciam unam; — *Au.* Phosphori grana tria, Camphorae sex et Olei Amygdalarum dulcium drachmas duas.

℞. Phosphori . . . . grana sex.
Olei Amygdalarum dulcium unciam unam.

Contere exacte, digere in balneo aquae et adde
Camphorae,
Ammoniaci liquidi,
singulorum grana decem.
Misce. (Ham. *Au.*)
℞. Essentiae Terebinthinae uncias duas.
Camphorae . . drachmas duas.
Ammonii carbonici pyro-oleosi drachmam unam.
Saponis medicinalis uncias duas.
Phosphori in Olei Caryophyllorum guttis duodecim ad quindecim dissoluti . . granum unum.
Misce sedulo. (B*. *Au.*)

Unguentum s. Pomatum phosphoratum. (Gal. *Ca. T.*)

℞. Phosphori purissimi partes viginti.
Axungiae Porci . partes mille.
Aquae . . . . partes centum.

Coque ad dissolutionem phosphori usque et donec aqua penitus evaporata sit; filtra per chartam griseam et adde, si vis, Olei essentialis Lavandulae partem unam. (Gal. *Ca.*)

T. Phosphori grana decem, Axungiae uncias viginti, Aquae destillatae uncias duas et aliquot guttas Olei Spicae vel Bergamottae.

Oleum phosphoricum s. phosphoratum. (Bor4. *T.*)

℞. Phosphori in globulos parvos divisi et bene siccati scrupulos quatuor.

Ingere in mortarium porphyreum cum duplo vel triplo Vitri contusi et puri vel arenae? lotae et siccatae, infunde sensim Olei Olivarum calidi 50 — 60° C. libras duas, tritura per momenta aliquot, sepone in amplo vase, ut subsideat et decantha. — Aeusserlich zu zwei oder drei Scrupel bis eine halbe Unze, bei chronischen Rheumatismen eingerieben.

Bor4. Phosphori grana duodecim in phialam immitte, Olei Amygdalarum recenter parati unciam unam continentem, quam in aquam calidam immerge, donec phosphorus liquatus sit. Tum vas agitetur, donec phosphorus solutus appareat Oleum refrigeratum a phosphoro forsan secreto caute decantha.

Oleum phosphoratum. (*Au.*)

℞. Phosphori . . . . . grana duo.
Olei Hyoscyami infusi semunciam.
Extracti Chamomillae,
Aquae Menthae piperitae uncias duas.

Gabe, alle zwei Stunden einen Löffel.

Oleum phosphoratum aromaticum. (*Ma.*) Nach Lescot:

℞. Phosphori . . . unciam unam.
Olei Olivarum . . libram unam.

Repositis temperatura communi in loco obscuro per dies quatuordecim Oleum essentialis Bergamottae adde. — Gabe, fünfundzwanzig bis dreißig Tropfen in vierundzwanzig Stunden in einem Trank. (*Ma.*)

Phytolacca.

Phytolacca decandra, L.; Americanische, gemeine Kermesbeere; Phytolaque à dix étamines, Raisin d'Amérique, Morelle en grappes, Herbe de la laque, Méchoacan du Canada (*Gal.*); American pokeweed, Garget, American night shade (*Ang.*); Fitolacca, Herba Camin (*His.*); Tienmannige lackplant (*Bel.*); Pianta lacca (*I.*).

Am. Br. Gal. His. R. Wir. *C. M. Sp.*

♃ (Decandria Digynia, L.; Atriplicеae, *J.*) Eine in Nordamerica einheimische, im südlichen Europa gebaute Pflanze. (*Blackw.* t. 515. *Bigel.* Am. med. bot. I. t. 3. *Zorn* Ic pl. t. 164.)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an.

Die Wurzel (radix Phytolaccae s. Solani racemosi) ist dick, fleischig und in mehrere dicke Fasern getheilt.

Das Kraut besteht aus einem walzigen, ästigen Stängel und vier bis fünf Zoll und mehr langen, abwechselnden, glatten, eirunden, lanzettigen, kurzgestielten Blättern. Es hat einen sehr scharfen Geschmack.

Nach Haywards kann die Wurzel, zu einem Scrupel, die Ipecacuanha sehr gut ersetzen. Das Extract der Blätter ist äußerlich bei offenem Krebs gerühmt worden. Den Aufguß hat man bei Rheumatismen und Hämorrhoiden empfohlen.

Unguentum Radicis Phytolaccae. (B*.)

℞. Radicis Phytolaccae pulveratae unciam unam ad duas.
Axungiae Porci . libram unam.
Misce. — Hayward rühmt diese Salbe bei scabies und hartnäckiger tinea. Sie erregt oft Hitze und Röthe der Haut; man muß alsdann Waschungen anwenden und die Einreibungen weglassen.

Pila marina.

Sphaera marina, *Sphaera thalassia*, *Halogonium rotundum*; Seeballen, Meerkugeln; Pelote de mer (*Gal.*).

Wir. *Sp.*

Mit diesem Namen bezeichnet man leichte, rundliche, platte oder längliche, geruch- und geschmacklose Massen, in denen man Binsen, Haare, und oft Ueberreste von Muschelschaalen unterscheidet und die man an den Küsten des Oceans und des Baltischen Meers findet.

Man hält sie mit Spielmann für Knäuel von Wurzeln der Zostera marina, L. ♃ (Monoecia Monandria, L.; Arcideae, *J.*), einer in den genannten Meeren sehr häufigen Pflanze. (*Oed.* Fl. Dan t. 15.)

Cavola will in der Asche der Zostera Jod gefunden haben, woraus sich erklären ließe, wie man diese Seeballen unter die Mittel gegen den Kropf hat zählen können.

Pimpinella.

Unter diesem Namen kommen verschiedene Pflanzen in Anwendung:

1) *Pimpinella Saxifraga*, *L.*; Pimpinell, Bibernell, Roßbibernelle, Steinbibernelle, Bockspeterlein; Boucage à feuilles de pimprenelle (*Gal.*); Small burnett saxifrage (*Ang.*); Bedznjk (.); Steenbrekke, Qvaeseurt, Bergroed, Pimpinelle (*D.*); Pimpinella blanca (*His.*); Kleine Bevernell (*Bel.*); Pimpinella bianca (*I.*); Budrznyniec (*Pol.*); Pimpinella branca (*Lus.*); Backrot (*Suec.*).

4. Ams. An. Bor. BorC. Bor4. Br. D. Fenn. Ful. Gal Gen. Han. Hass. HassP. Li. O. Pol. Sar. Sax. Wir. Wür. WW. *Be. M. Pd. Sp.*

♃ (Pentandria Digynia, L.; Umbelliferae, *J.*) Eine in ganz Europa wachsende Pflanze (*Jacq.* Austr. IV. t. 395. *Hayne* VII. 20. *Blackw.* t. 472. *Plenck* t. 221. Düs. off Pfl. X. t. 17.)

Man wendet die Wurzel (radix Pimpinellae albae s. nostratis s. umbelliferae s. hircinae s. Tragoselini) an; sie ist lang, walzig, fast spindelförmig, etwas faserig, ringförmig gestreift, außen gelblichgrau, inwendig weiß. Sie hat einen starken, bockartigen, Niesen erregenden Geruch und einen bittern, scharfen und brennenden Geschmack.

2) *Pimpinella magna*, *L.*; schwarze Bibernell, Blauwurzel; Boucage elévé (*Gal.*).

Gal. Wir. *Be. M. Sp.*

4 Eine in ganz Europa wachsende Pflanze. (*Jacq.* Austr. IV. t. 396. *Blackw.* t. 472 *Hayne* VII t. 21.)

Man wendet die Wurzel (radix Pimpinellae nigrae s. Tragoselini majoris s. Dauci cyanopi) an; sie ist lang, fingersdick, am Ende ästig, außen fast schwarz, innen bläulich. Sie hat einen starken, gewürzhaften und angenehmen Geruch, und einen scharfen, brennenden, aromatischen Geschmack.

Beide Pflanzen haben dieselben Eigenschaften; sie sind reizend, schweißtreibend und schmelzend. — Gabe des Pulvers, zehen bis zwanzig Gran.

3) *Poterium Sanguisorba*, *L.*; Bibernelle; Pimprenelle commune (*Gal.*); Small burnet (*Ang.*); Pimpinelle (*D.*); Pimpinella (*His. I. Lus.*); Pimpernelle (*Bel*; Pimpernella (*Suec.*).

Br. Fer. Gal. His. Wir. Wür. *Be. Br. M.*

4 (Monoecia Polyandria, L.; Rosaceae, *J.*) Eine Pflanze des südlichen Europa's. (*Hayne* VIII. t. 23.)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an.

Die Wurzel (radix Pimpinellae minoris s. hortensis s. rubrae s. italicae) ist dick, langgestreckt, röthlich und in mehrere Fasern getheilt.

Das Kraut besteht aus einem kantigen, wenig ästigen Stängel, welcher besonders unten gefiederte Blätter mit schwach behaarten Stielen trägt, deren Blättchen, eilf bis einundzwanzig, rundlich oder eirund, glatt und sehr tief gezähnt sind. Der Geruch ist schwach und gewürzhaft, der Geschmack adstringirend und schwach bitter.

4) *Sanguisorba officinalis*, *L.*; Blutkraut, Blutwurzel, Wiesenknopf; Pimprenelle des prés, Sanguisorbe (*Gal.*); Great burnet (*Ang.*); Pimpinelle (*D.*); Pimpinella (*His.*); Bloed kruid (*Bel.*); Pimpinella maggiore (*I.*); Sanguisorba (*Lus.*); Blodaert (*Suec.*).

Br. Gal. Wir. *M.*

4 (Tetrandria Monogynia, L.; Rosaceae, *J.*) Eine Europäische Pflanze. (*Zorn* Ic. pl. t. 184.)

Man wendet die Wurzel (radix Sanguisorbae s. Pimpinellae italicae) an; sie ist ästig, außen röthlich braungelb, innen gelblichweiß, geruchlos und styptisch.

Ehedem hielt man sie für ein Wundmittel.

Infusum Pimpinellae. (BorC.)

℞. Radicis Pimpinellae albae sesquiunciam.
Aquae bullientis . sesquilibram.
Infunde per horae quadrantem in vase tecto et cola.

Extractum Pimpinellae albae. (Bor. Bor4. Pa. Pol. Wir.)

℞. Radicis Pimpinellae albae libram unam.
Aquae bullientis . . libras sex.
Macera per tres dies, tunc coque leviter, cola exprimendo et liquorem probe inspissa. (Pal.)

℞. Radicis Pimpinellae albae,
Alcoholis, singulorum libras duas.
Aquae communis libras novem.
Digere per horas duodecim, cola exprimendo, alcoholem destillando extrahe et quod restat, ad extracti consistentiam inspissa. (Pal.)

Bor. et Sax. Radicis partes duas, Alcoholis tres et novem Aquae.

℞. Radicis Pimpinellae albae libram unam.
Alcoholis libras quinque ad sex.
Post sufficientem extractionem cola exprimendo; digere, tunc coque parumper residuum cum Aquae libris tribus; clarifica decoctum albuminis ope, liquores commisce et alcohole destillatione separato, quod remanserit ad extracti consistentiam consume. (Wir.)

Bor4. Pimpinellae libram unam cum Spiritus Vini rect. libris quinque per horas 36 ad 48 digerere, exprimere, filtrare et seponere, residuo infundere Aquae communis fervidae libras decem et per 36 ad 48 horas seponere, exprimere, liquori modico calore ad tertiam partem reducto et refrigerato Spiritum Vini rectificatum admiscere, quamdiu inde turbatur, seponere deinde, decanthare, Spiritum Vini elicere, et residuum in balneo vaporis ad extracti absinthii spissitudinem evaporare.

Tinctura s. Essentia Pimpinellae albae. (A. B*. Bor. Bor4. Br. D. Ful. Han. HassP. Li. O. Pal. Pol. Sax. Suec. Wir. *Sw.*)

℞. Radicis Pimpinellae albae concisae . . . . uncias quinque.
Spiritus Vini rectificati vel rectificatissimi . . . libras duas.
Post sufficientem extractionem exprime et filtra. (B*. Bor. Bor4. Han. O. Pol.)

A. et Suec. Radicis uncias duas et Alcoholis (0,910) libram unam; — Br. D. Pal. et Wir. Radicis partem unam et quinque Alcoholis; — *Sw.* Radicis duas cum dimidia et sex Alcoholis; — Ful. Li. et Sax. Radicis unam et quatuor Alcoholis; — HassP. Radicis un-

cias quatuor, Spiritus rectificati libras duas.

Reizend, schweißtreibend, giftwidrig, harntreibend, einschneidend, reinigend und besonders bei catarrhalischen Halsleiden empfohlen. — Gabe, dreißig bis vierzig Tropfen und noch weit mehr.

Tinctura s. Essentia Pimpinellae albae kalica. (Hass. *Pid.*)

℞. Radicis Pimpinellae albae uncias tres.
Kali subcarbonici drachmam unam.
Spiritus Vini rectificati libram unam.

Post sufficientem digestionem exprime et filtra.

Reizend, schweißtreibend, harntreibend und einschneidend. — Gabe, zwanzig bis sechszig Tropfen.

Tinctura Pimpinellae composita, Mixtura resolvens. (*Sw.*)

℞. Tincturae Pimpinellae albae,
— Antimonii alcalisatae,
singularum uncias quatuor

Digere per aliquot dies, saepius agitando; cola et adde colaturae
Tincturae Succini aetheream uncias duas.
Saponis medicinalis unciam unam.
Dissolve.

Reizend, bei chronischen Catarrhen, Nierenentzündung von Steinen, Gelenkrheumatismen, Podagra und manchen Hautkrankheiten gepriesen. — Gabe, von zwanzig Tropfen bis zu einer Drachme, zwei oder drei Mal täglich, in einem passenden Vehikel.

Species pro decocto vulnerario s. vulnerariae. (Pal. Wir. *Sp.*)

℞. Radicis Pimpinellae,
— Ari maculati,
singularum unciam unam.
Herbae Saniculae,
— Pyrolae,
— Hederae terrestris,
— Veronicae,
Summitatum Centaurii minoris,
singularum semunciam.
Concisa misce. (Wir.)

℞. Herbae Alchemillae,
— Agrimoniae,
— Bugulae,
— Consolidae majoris,
— Bupleuri,
— Pimpinellae albae,
— Plantaginis,
— Pulmonariae arboreae,
— Virgaureae,
— Urticae,
singularum unciam unam.
Radicis Consolidae majoris,
— Rhapontici,
— Tormentillae,
singularum libram unam.
Concisa misce. (Pal.)

℞. Radicis Inulae,
— Consolidae majoris,
— Tormentillae,
— Vincetoxici,
singularum semunciam.
— Liquiritiae drachmas sex.
Herbae Alchemillae,
— Saniculae,
— Plantaginis,
— Auriculae muris,
— Hyperici,
— Agrimoniae,
— Pimpinellae,
— Bugulae,
— Virgaureae,
Florum Bellidis minoris,
singulorum semunciam.
Seminum Foeniculi drachmas sex.
Concisa et contusa misce. (Wir. *Sp.*)

Pinus.

In den Pharmacopöen werden folgende beide Arten dieser Gattung angezeigt:

1) *Pinus Pinea, L.*; Pinienbaum; Pin à pignons (*Gal.*); Cultivated pinetree (*Ang.*); Domacy borowice (*B.*); Spansk syrt (*D.*); Pino alvar (*His.*); Tamme pynboom (*Bel.*); Pino sativo (*I.*); Pinheiro manso (*Lus.*); Spansk tall (*Suec.*).

Br. Fer. Gal. Wir. *Br. G. M. Sp.* Z.

Ein Baum (Monoecia Monadelphia, L.; Coniferae, *J.*) des südlichen Europa's. (Nouv. Duh. V t. 72. bis fig. 3. et t. 75. *Blackw.* t. 189. *Plenck* t. 679. Dict d. Sc. nat. Cah. VII.)

Man wendet die Saamen, Piniennüsse (nuces s. nuclei Pineae s. Pini s. Pineoli); Pignons doux (*Gal.*) an; es sind holzige, bald harte und schwer zerbrechliche, bald weiche und leicht zu zerbrechende Knöpfe, welche eine längliche, platte, an einem Ende dickere, ungefähr einen halben Zoll lange, und mit einem dünnen braunen Fellchen bedeckte Mandel enthalten, welche einen angenehmen Geschmack besitzt.

Sie kann die süßen Mandeln sehr gut ersetzen.

2) *Pinus sylvestris, L.*; gemeine Fichte, Kiefer; Pin sauvage (*Gal.*); Wild pine (*Ang.*); Lesnj borowice (*B.*); Furs (*D.*); Pino (*His. I.*); Pyn (*Bel.*); Sosna parowa (*Pol.*); Pinheiro (*Lus.*); Tall, Furu (*Suec.*).

A. An. Bor. Bor4. Br. D. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. HassP. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. *Be. G. M. Sp.* Z.

Ein Baum, welcher in einem großen Theile, besonders des nördlichen und gebirgigen Europa's gemein ist (Nouv. Duh. V. t. 66. *Blackw.* t. 190 *Plenck* t. 677. *Schk.* t. 380.)

Man wendet die Sprossen oder jungen Triebe (turiones s. strobili s. coni Pini) an, welche im Frühjahre am Ende der Zweige hervorkommen. Sie bestehen gewöhnlich aus fünf bis sechs seitlichen, um die Basis einer dickern, sechs Linien bis einen Zoll langen Endknospe herum sitzenden Knospen, welche mit röthlichen Schuppen bekleidet sind und von Harz strotzen. Sie haben einen angenehmen, harzigen Geruch und einen bittern, schwach gewürzhaften Geschmack.

Reizend, antiscorbutisch.

Decoctum Turionum Pini. (B*.)

℞. Turionum Pini manipulos tres.
Aquae . . . . . sesquilibram.

Coque per horae quadrantem in vase tecto; liquori refrigerato adde Vini albi aequalem quantitatem et post horas viginti quatuor exprime. — Gabe, zwei Unzen und mehr.

Emulsio nucleorum Pineae. (Gal.)

℞. Nucleorum Pineae,
Sacchari albi,
singulorum unciam unam.

Contunde diu in mortario marmoreo, aquam sensim affundendo, ut fiat pasta mollis, quam dilue in
Aquae fervidae (40° R.) libra una.
Cola exprimendo et adde
Aquae Florum Aurantiorum semunciam.

Piper.

Unter diesem Namen kommen in den Pharmacopöen vier verschiedene Pflanzen in Erwähnung:

1) *Piper nigrum, L.*; Pfeffer; Poivre commun (*Gal.*); Pepper (*Ang.*); Filfil uswud (*Ar.*); Czerny pepr (*B.*); Micha (*Ba.*); Hu-tseaou (*C.*); Gammiris (*Cy.*); Peper (*Bel. D.*); Kali mirchie (*Duk.*); Pimienta (*His.*); Miritch, Golmirch (*Hin.*); Pepe (*I.*); Maricha (*Ja.*); Kaly mirchingay (*Mah.*); Lada (*Mal.*); Sahan (*Palembang*); Filfil siah (*Pe.*); Pieprz (*Pol.*); Pimenta (*Lus.*); Perez (*R.*); Maricha (*Sa.*); Peppar (*Suec.*); Mellaghu (*Tam.*); Mirialu (*Tel.*).

A. Ams. An. B. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pal. R. RC. Sax. Suec. Wir. Würt. *A. Be. Br. C. Fi. G. M. Par. Pid. Sp.* Z.

Ein Strauch (Diandria Trigynia, L.; Piperaceae, *J.*) Ostindien's. (*Blackw.* t. 348. *Plenck* t. 25. Fl. méd. V. 276.)

Man wendet die Früchte (baccae Piperis s. Piper) an; es sind rundliche harte Beeren von einem gewürzhaften, beißenden Geruch und einem scharfen, brennenden, beißenden, anhaltenden Geschmack. Weißer Pfeffer, Piper album, Poivre blanc (*Gal.*), nennt man sie, wenn das äußere Fellchen abgezogen ist, im Gegentheil, schwarzer Pfeffer, Piper nigrum, Poivre noir (*Gal.*). Im letztern Falle sind sie außen schwarz oder braun und bloß innen weiß.

Ihre Schärfe verdanken sie, nach Oerstedt, einem crystallisirbaren eigenthümlichen Stoffe, dem Piperin, Piperinum, Pipera, Pipérin (*Gal.*), welcher mit den Harzen Verwandtschaft hat

2) *Capsicum annuum, L.*; Spanischer Pfeffer; Poivre de Guinée, Poivre d'Espagne, Corail des jardins (*Gal.*); Guinea pepper (*Ang.*); Spansk peber (*D.*); Pimienta de Indias (*His.*); Jaarlykse spaansche peper (*Bel.*); Peperone (*I.*); Pieprz yca (*Pol.*); Pimentao da India (*Lus.*); Spansk peppar (*Suec.*).

Ams. An. B. Ba. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Gal. GalM. Gen. Hass. HassP. Lon. LonN. Pol. RC. Sax. Wir. Würt. *Be. Br. C. G. M. Par. Sp.*

⊙ (Pentandria Monogynia, L.; Solaneae, *J.*) Eine Pflanze Indien's, von woher sie nach America und Europa verpflanzt worden ist. (*Rheede* Malab. II. t. 35. *Blackw.* t. 129. *Plenck* t. 107. *Schk.* t. 47.)

Man wendet die Früchte (fructus Piperis indici, Piper indicum s. turcicum s. hispanicum) an; es sind trockene, sehr glatte, längliche, hell- oder gelblichrothe, blasige, zweifächerige Beeren von sehr verschiedener Gestalt, in denen sehr viele platte Saamen enthalten sind. Sie haben keinen Geruch, aber einen sehr bittern, scharfen und brennenden Geschmack.

Ihre Schärfe wird von einem eigenthümlichen Alcaloid, dem Capsicin, Capsina, Capsinium, Capsicinum, hergeleitet.

Reizend, jedoch mehr in der Küche, denn als Arzneimittel angewendet.

Ainslie gedenkt dieser Art gar nicht, sondern führt das Capsicum frutescens (*Rumph.* Amb. 5. t. 88. fig. 3.), Filfil achmar (*Ar.*); Tabia (*Ba.*); Meneschena (*Can.*); Gasmiris (*Cy.*); Lal mirchie (*Hin.*); Lombok (*Ja.*); Tambhuda mirchingay (*Mah.*); Lada mirsa (*Mal.*); Fulfili surkh (*Pe.*); Brahn maricha (*Sa.*); Mollaghai (*Tam.*); Merapakaia (*Tel.*), ebenfalls aus Ostindien, an. Diese Pflanze hat dieselben Eigenschaften, wie die vorhergehende.

8) *Myrtus Pimenta, L.*; Neue Würze,

Jamaicanischer Pfeffer, Englisches Gewürz, Allerleigewürz, Amom'ein, Nelkenpfeffer, Wunderpfeffer; Poivre de la Jamaique, Piment des Anglois, Toute-épice (*Gal.*); Pimenta, allspice (*Ang.*); Pimienta de Tabasco, Malaguetta (*His.*); Pepe garofanato (*I.*); Jamaica pepper (*Bel.*); Angielski ziele (*Pol.*); Krydd pepper (*Suec.*).

Ams. An. B. Bel. Bor. Bor4. Br. Du. Ed. Fenn. Fer. Gal. Gen. Han. His. Lon. LonN. O. Pol. Sax. Suec. *Beckr. C. Fi. G. M. Par. Pid. Sp.*

Ein Baum (Icosandria Monogynia, L.; Myrteae, *I.*) der Antillen und Oſtindien's. (*Blackw.* t. 353. *Plenck* t. 375. *Desc.* Fl. Ant. III. 215.)

Man wendet die Früchte oder Beeren (Piper Jamaicense s. Pimenta s. semen Amomi s. Piper Tabasci) an, welche man vor dem Reifwerden trocknen läßt; ſie ſind runzlich, etwas größer als die Körner vom ſchwarzen Pfeffer, kugelig oder länglich, genabelt und dunkelbraun. Sie haben einen gewürzhaften Geruch und Geſchmack wie von Pfeffer, Zimmt und Nelken.

4) *Piper longum, L.*; langer Pfeffer; Poivre long (*Gal.*); Pepe lungo officinale (*I.*).

An. Br. Du. Ed. Fer. GalM. His. Lon. LonN. RG. Wir. *Fl. G. M. Sp.*

Ein rankender Strauch (Diandria Trigynia, L.; Urticeae, *J.*) Oſtindien's. (*Blackw.* Herb. t. 356. 348. *Plenck* t. 26.)

Die Frucht (Piper longum) iſt eine, einige Zoll lange, walzige, graulichte, außen chagrinartige Aehre von der Dicke einer Federſpule, welche innen in mehrere kleine Fächer getheilt iſt, deren jedes einen rundlichen Saamen enthält. Der Bruch iſt ſchwärzlich und an den Rändern harzig, innen graulich und faſerig; der Geſchmack iſt ſcharf brennend und etwas bitter.

Sie enthält, nach Dulong, dieſelben Beſtandtheile, als der ſchwarze Pfeffer.

Essentia Piperis, Tinctura Piperis nigri. (Br.)

℞. Piperis nigri . . partem unam.
Alcoolis . . . . . partes sex.
Post sufficientem extractionem filtra.

Reizend.

Tinctura Capsici s. Capsici annui. (Am. B*. Bor. Bor4. Han. Lon. LonN. *C. E. Vm.*)

℞. Piperis indici . unciam unam.
Alcoholis (0,930) octarios duos.
Digere per dies quatuordecim et filtra. (Am. Lon. LonN. *C. E.*)

B*. Capsici semunciam et Alcoholis libram unam; — Bor. Bor4. et Han. Capsici uncias duas et unam libram Alcoholis; digestionem per triduum Bor4.; — *Vm.* Capsici partem unam et Aquae Vitae decem.

Reizend. — Gabe, eine bis drei Drachmen. — Man wendet dieſe Tinctur bisweilen in Gurgelwaſſer, mit der doppelten Menge Waſſer verdünnt, an.

Tinctura Capsici et Cantharidum. (Am. B*. *C.*)

℞. Cantharidum . drachmas decem.
Piperis Jamaicensis
drachmam unam.
Aquae Vitae . octarium unum.
Digere per dies decem et filtra.

Ein in hohem Grade reizendes Mittel, welches man beſonders bei brandigen Uebeln empfohlen hat, und welches man auch innerlich zu zehen Tropfen in Gummiauflöſung oder Eiviſchabkochung geben könnte.

Essentia stomachica polychresta Gundelsheimeri, Tinctura stomachica. (Wir. *Sp.*)

℞. Piperis Hispanici unciam unam.
— nigri,
— albi,
— longi,
singulorum drachmas duas.
Liquoris Kali acetici,
Alcoholis ammoniacalis,
singulorum uncias sex.
Digere et filtra (*Sp.*)

Wir. Cardamomi minoris drachmas decem addit.

Reizend, als auflöſend bei Cacherien und Waſſerſuchten gerühmt. — Gabe, dreißig bis vierzig Tropfen.

Tinctura stomachica acuta Ernstingii. (B*.)

℞. Piperis Hispanici unciam unam.
— nigri,
— albi,
— longi,
Granorum Paradisi,
Cinnamomi,
Zingiberis,
Radicis Calami,
Polii Cretici,
singulorum semunciam.
Liquoris Kali acetici uncias duas.
Alcoholis . . . uncias viginti.
Digere in loco calido per dies aliquot. — Dieſe Tinctur unterſcheidet ſich wenig von der vorhergehenden.

Tinctura Pimentae sulphurica, Tinctura Piperis Jamaicensis aetherea. (*Sw.*)

℞. Piperis Jamaicensis uncias tres.
Alcoholis . . uncias quindecim.
Post quatuordecim dies infusionis cola et colaturae sensim adde
Acidi sulphurici uncias quindecim.

Reizend, bei Blennorrhoe und Krank-

heiten von Atonie des Magens empfohlen. — Gabe, zehen Tropfen zweimal täglich, in einem paſſenden Vehikel.

Acetum Piperis Jamaicensis. (*Vm.*)

℞. Piperis Jamaicensis partem unam.
Aquae Vitae . . partes quatuor.
Aceti albi . . . . partes octo.

Infunde frigide per septimanam et filtra.

Acetum Piperis longi spirituosum. (*Sw*.*)

℞. Piperis longi recentis et maturi uncias duas.
Aceti albi,
Aquae Vitae,
singulorum uncias duodecim.

Post aliquot dies filtra. — Reizend, fäulnißwidrig, bei bösartiger Bräune in Gurgelwaſſer mit Chinaabkochung, bei Waſſerſucht und Cacherien empfohlen. — Gabe, zwei bis drei Drachmen täglich mehrmals in irgend einem aromatiſchen Waſſer.

Aqua Piperis nigri. (*Vm.*)

℞. Piperis nigri contusi partem unam.
Aquae . . . partes quindecim.

Destillent partes quinque.

Aqua Pimentae s. Piperis Jamaicensis. (B. Bel. Du. Ed. Lon. LonN. *Sw. Vm.*)

℞. Piperis Jamaicensis libram unam.
Aquae . . . quantum sufficit.

Post horas viginti quatuor destillent octarii sedecim. (B. Bel. Du. *Sw.*)

Vm. Piperis libram unam et octodecim Aquae; destillent librae sex; — Lon. LonN. Pimentae libram dimidiam, Aquae quantum sufficit; macera per horas 24, tum destillet congius.

℞. Piperis Jamaicensis partem unam.
Aquae . . . quantum sufficit ad prohibendum empyreuma. Destillent partes decem, producto adde Aquae Vitae uncias quinque.

Aqua Pimentae s. Piperis Jamaicensis vinosa, Spiritus Pimentae. (Bel. Du. Ed. Ful. Gen. Lon. LonN. Wür. *C. Sw.*)

℞. Piperis Jamaicensis uncias tres.
Kali subcarbonici drachmas sex.
Vini Rhenani . . . libras tres.

Post aliquot dies destillent librae duae. (Ful.)

℞. Piperis Jamaicensis partem unam.
Vini generosi . . partes octo.

Macera per duos dies et destilla. (Wür.)

℞. Piperis Jamaicensis partem dimidiam.
Alcoholis 20° . . partes octo.

Post sufficientem macerationem destillet spiritus 19° indicans. (Bel.)

℞. Piperis Jamaicensis semilibram.
Aquae Vitae . . libras novem.
— purae . quantum sufficit ut empyreuma prohibeatur. Destillent librae novem. (Ed. *C.*)

Lon. LonN. Piperis uncias duas, Aquae Vitae octarios octo et Aquae quantum sufficit; destillent octarii octo; — Du. Piperis uncias tres, Aquae Vitae octarios octo et Aquae quantum sufficit; destillent octarii octo; — *Sw.* Piperis partem unam, Aquae Vitae quatuor et tres Aquae; destillent partes quatuor; — Gen. Piperis unciam unam, Aquae Vitae tres et Aquae sufficientem quantitatem; destillent librae tres.

Oleum Piperis nigri s. piperinum. (*Fi.*)

In paratione Piperini obtinetur, vide Piperinum.

Oleum Pimentae aethereum, Aethereoleum Pimentae s. Piperis Jamaicensis. (Am. Br. Du. Ed. Gen. Lon. Pal. Sax. Suec. Wür. *C. T.*)

℞. Piperis Jamaicensis quantum vis.
Aquae . . . quantum sufficit.

Destillent. (Am. Du. Ed. Gen. Lon. LonN. Suec. *C.*)

Sax. Piperis partem unam et quatuor Aquae; — *T.* Piperis partem unam, Aquae duplum; destillent dimidia pars vel duae partes quintae liquidi adhibiti et cohobentur, donec quantitas requisita obtenta fuerit.

℞. Piperis Jamaicensis libram unam.
Aquae . . . libras sedecim.
Salis culinaris . . uncias duas.

Post quinque ad sex dies destillent. (Br. Pal.)

℞. Piperis Jamaicensis quantum vis.
Aquae Piperis Jamaicensis quantum sufficit.

Macera per horas duodecim, tum destillent. (Wür.)

Pulvis aromaticus. (RC.)

℞. Seminum Cardamomi,
Radicis Zingiberis,
— Calami,
Piperis longi, vel
— nigri,
singulorum partes aequales.

Pulverata misce. — Bei Verdauungsbeſchwerden ꝛc. — Gabe, zehen Gran bis ein Scrupel und mehr.

Pulvis febrifugus. (B*.)

℞. Piperis Hispanici . . grana sex.
Baccarum Lauri scrupulos duos.

Fiat pulvis in tres partes dividendus. — Man nimmt das erſte Pulver bei Eintritt der Kälte, das andere den folgenden Tag um dieſelbe Stunde und das dritte den dritten Tag. — Bergius rühmt es.

Pilulae stimulantes. (B*. *E.*)

℞. Piperis Hispanici drachmam unam.

Farinae secalis . grana quinque.
Aquae . . . quantum sufficit.
Fiant pilulae duodecim. — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden, bei schwarzem Erbrechen und gelbem Fieber. (B*.)

℞. Piper s Cayennensis drachmam unam.
Micae Panis,
Aquae,
singularum quantum sufficit.
Fiant pilulae decem — Gabe, ein Stück drei oder vier Mal täglich. (E.)

Boli febrifugi. (B.)

℞. Piperini . . scrupulum unum.
Micae Panis . quantum sufficit.
Fiant boli sex. — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden. — Diese Bissen haben oft keine Wirkung, wie Brera anführt.

Trochisci excitantes. (*Pie.*)

℞. Piperis longi,
Nucis moschatae,
singulorum semidrachmam.
Seminum Staphydis agriae,
Radicis Pyrethri,
singulorum scrupulos duos.
Sinapis,
Origani,
singulorum scrupulum unum.
Mellis sufficientem quantitatem.

Gargarisma excitans. (B*.)

℞. Piperis Cayennensis semunciam.
Magnesiae subcarbonicae drachmam unam.
Aquae bullientis,
Aceti destillati,
singulorum uncias octo.
Diese Formel ist von Headly. — Currie wendete einen Aufguß von einem Gran in zwei Unzen Wasser an; Adair die mit Wasser verdünnte Tinctur des Cayennepfeffers.

Pulvis ocyticus s. partum accelerans. (*Pie.*)

℞. Seminum Lavandulae semidrachmam.
— Plantaginis,
— Endiviae,
singulorum scrupulos duos.
Piperis . . . scrupulum unum.
Man giebt dieses Pulver in vier Unzen Endivien- und ebensoviel Geisblattwasser, um die Niederkunft zu erleichtern; auch dient es in Einreibungen auf den Kopf, zur Tödtung des Ungeziefers.

Electuarium stomachicum alterans s. piperinum. (*Sa. Sw.*)

℞. Piperis nigri,
Conservae Aurantiorum,
singulorum unciam unam.
Syrupi Corticum Aurantiorum quantum sufficit.
Misce. (*Sa.*)

℞. Radicis Calami,
— Galangae,
Piperis nigri,
singulorum unciam unam.
Syrupi Corticum Aurantiorum quantum sufficit.
Misce. (*Sw.*) — Addi potest Oxydi Ferri nigri semuncia.
Bei Verdauungsbeschwerden oder gichtischer Cardialgie und Windcolik empfohlen. — Gabe, eine Drachme täglich zwei Mal.

Electuarium s. Opiatum antihaemorrhoidale s anticachecticum. (*Ca. Sw.*)

℞. Radicis Inulae,
Foeniculi,
singulorum uncias tres.
Piperis nigri . . unciam unam.
Sacchari albi,
Mellis,
singulorum uncias duas.
Misce. — Gabe, eine bis zwei Drachmen zwei oder drei Mal täglich bei Hämorrhoidalkachexie, Verdauungsbeschwerden und Darmverschleimung.

Unguentum Piperis nigri, Epithema rubefaciens. (B*. Du. *Bo. C. Ca.*)

℞. Piperis nigri pulverati uncias quatuor.
Axungiae praeparatae libram unam.
Contere bene. (Du. *C.*)

℞. Salis culinaris,
Piperis nigri,
singulorum libram unam.
Fuliginis cribrati . semilibram.
Sinapis pulverati . semunciam.
Vitellos Ovorum . . . no. 2.
Axungiae Porci . . libras duas.
Fiat unguentum. (*Bo.*)

℞. Saponis albi raspati uncias sex et drachmas duas.
Olibani . . drachmas quinque.
Piperis nigri,
Salis communis,
singulorum drachmas tres.
Alcoholis . . uncias septem.
Digere ad solutionem saponis usque, tunc coque per sexagesimas aliquot, spatulae ope agitando et supra linteum extende. (B*. *Ca.*)
Alle diese Salben wirken hautröthend und mehr oder weniger epispastisch.

Cataplasma antipleureticum s. rubefaciens. (Gal *Bo. Ca. E. Pie.*)

℞. Piperis longi,
Zingiberis, singulorum semunciam.
Albuminis Ovi sufficientem quantitatem.
Misce sedulo. (*Bo. Ca. Pie.*)

℞. Farinae Hordei leviter tostae
unc. as quatuor.
Aceti fortis . . unciam unam.
Albumina Ovorum . . . no. 3.
Aquae . . . quantum sufficit.
Supra stupas extende et consterne mixturam e
Pulveris Piperis nigri,
— Foeniculi,
singulorum semuncia.
Sogleich anzuwenden. (Gal. *Ca*.)

℞. Farinae Sinapis . . semilibram.
Piperis nigri,
Zingiberis,
singulorum drachmam unam.
Syrupi Sacchari quantum sufficit ut fiat pasta mollis. (*E.*)

℞. Pulveris Piperis Cayennensis,
— Cinnamomi,
— Caryophyllorum,
singulorum semunciam.
Farinae,
Vini, singulorum quantum sufficit ut fiat cataplasma. (*E.*)

Emplastrum piperitum s. stimulans, Dropax antiparalyticum. (*Au.*)

℞. Picis . . . . . uncias duas.
Galbani,
Piperis nigri,
singulorum drachmas tres.
Olei Baccarum Lauri
quantum sufficit.
Plenck empfahl es bei Lähmung.

Infusum Piperis Cayennensis. (*E.*)

℞. Piperis Cayennensis
sesquidrachmam.
Aquae bullientis
octarium dimidium.
Löffelweise zu nehmen.

Gargarisma piperitum s. excitans. (*Au.*)

℞. Piperis Cayennensis semunciam.
Magnesiae subcarbonicae
drachmam unam.
Aquae bullientis,
Aceti, singulorum uncias tres.
Headly empfiehlt es bei sogenannter bösartiger Bräune.

Piperinum. (*Pi*.)

℞. Piperis nigri contusi libras duas.
Alcoholis 35° . libras quinque.
Immitte piper cum alcoholis libris tribus in alembicum cupreum stanno obductum, quem post horas duodecim sepositionis in balneum aquae immersum ad ebullitionem usque calefac; tunc ab igne remotum et refrigeratum cola; residuo reliquas duas alcoholis libras infunde, itidem agendo; infusiones conjunctae filtrentur, tunc duo trientes destillent; residuum in vas vitreum infusum, per aliquot dies tectum relinquatur, quo facto piperinum crystallisatum subsidet, et filtrando per chartam separetur; crystallis in filtro residuis infunde alcoholem purum frigidumque, post duos dies filtra, denuo alcoholem infunde piperino ut album obtineatur. Fluida haec cum priori commixta destillationi in vase vitreo subjiciantur ad pelliculae densae apparitionem; infunde itidem in vas vitreum, ut per aliquot dierum lapsum novum piperinum praecipitatur pari modo cum alcohole infundendum, eductum quod obtinuisti intra chartam emporeticam sicca; in fluido superstite *oleum acre* remanet.

Gabe, zwei bis zwölf Gran. — Das scharfe Oel zuweilen von einem Scrupel bis zur Drachme.

Pistacia.

Pistacia vera, L.; Pistazienbaum; Pistachier commun (*Gal.*); Pistachia tree (*Ing.*); Pistacy, Klokoeka (*B.*); Pistaceira (*His.*); Pistache boom (*Bel.*); Pistacchio (*I.*): Fastuca (*Sic.*).

Ba. Br. Fer. Gal. Gen. Wir. *Be. Br. G. M. Sp.* Z.

Ein Baum (Dioecia Pentandria, L.; Terebinthaceae, *J.*), welcher ursprünglich in Asien einheimisch, aber im südlichen Europa angepflanzt ist. (*Lamk.* Ill. t. 811. fig. 1. 2. *Plenck.* t. 708. Dict. d. Sc. nat. Cah. 4. *Blackw.* Herb. t. 461.)

Man wendet die Saamen, Pistacien, Syrische Nüßchen, Pimpernüßchen, Pistaciae, Pistaches (*Gal.*), an; sie sind eiförmig, länglich, röthlich, äußerlich runzelig und enthalten einen öligen, hellgrünen, angenehm schmeckenden Kern.

Oleum Pistaciarum. (Gal. Sar.)

℞. Pistaciarum mundatarum
quantum vis.
Contunde pistilli lignei ope in mortario marmoreo; pastam in sacco e tela confecto inclusam frigide exprime.

Emulsio pistaciarum. (Gal.)

℞. Pistaciarum,
Sacchari albi,
singulorum unciam unam.
Contunde diu, sensim Aquam affundendo, dilue pastam in
Aquae calidae . . . libra una.
Cola exprimendo et adde
Aquae Florum Aurantiorum
semunciam.

Pix liquida.

Pix liquida nigra, Pissa, Pix Cedria, Ce-

dria, Resina Pini empyreumatica liquida, Terebinthina empyreumatica; Theer, flüssiges Pech; Goudron, Poix liquide (*Gal.*); Tar (*Ang.*); Tioere (*D.*); Teer (*Bel.*); Fjaera (*Suec.*)

Am. Ams. B. Bel. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gal M. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. Li. Lon. LonN. O. RC. Sax. Suec. Wir. *Be. C. Fi. G. Par. Sp.*

Eine schwärzlichbraune, zähe, fadenziehende, halbdurchsichtige Flüssigkeit, welche die Consistenz eines dicken Syrups, einen harzigen, brenzlichen Geruch und einen bittern harzigen Geschmack besitzt und den Speichel rosenfarbig braun färbt.

Man erhält sie durch langsame, trockene, unterwärtsgehende Destillation von Holzspänen verschiedener Zapfenbäume.

Es ist ein Gemisch von halbverbranntem Harz, empyreumatischem Oel und Essigsäure.

Der Theer ist ein sehr kräftiges Reizmittel, welches mit zu mehreren Arzneimitteln kömmt. Man hat ihn selbst allein, in Milch oder Bier, oder in Gestalt von Pillen, bei veralteter und hartnäckiger Krätze nehmen lassen. Die Engländer haben vor Kurzem den Dampf davon bei der Behandlung der Lungenschwindsucht empfohlen. Um ihn in Pillenform zu bringen, setzt man Schierlingspulver hinzu und man erhält so eine Masse, welche man in dreigranige Pillen theilt, von denen der Kranke anfangs nur eine nimmt aber dann täglich steigt, bis er auf vier und zwanzig Stück auf einmal gekommen ist.

Aqua picea s. Picis, Infusum Picis liquidum s. Picis empyreumaticae liquidae, Potio picea. (An. B*. Ba. Br. Du. Ful. Gal. Li. R. Sax. Suec. Wir. *C. Ca. Fi. Ra. Sa. Sp. Sw. Sy. T. Vm.*)

℞. Picis liquidae . . partem unam.
Aquae . . . . partes quatuor.

Agita bene mixturam et post sepositionem per horae quadrantem ad duos dies decantha liquidum supernatans. (Br. Du. Sax. Suec. *C. Sa. Sp. Sw. Sy.*)

B*. Picis liquidae partem unam et Aquae quinque; — Ba. Picis liquidae partem unam et sex Aquae (formula *Berkeleyi*); — Ful. Li et Wir. Picis liquidae partem unam et octo Aquae; — *Fi.* Picis libram unam et Aquae sex; sepositionem per dies quatuor, subinde agitando; — Gal. Picis liquidae quinque et sedecim Aquae; — *Ca.* et *Ra* Picis liquidae partem unam, Aquae quadraginta octo et infusionem per septimanam.

℞. Picis liquidae . . partem unam.
Aquae partes sexaginta quatuor.
Commisce triturando, vas deinde tectum calori lenissimo expone per diem unum et filtra. (*Vm.*)

℞. Aquae . . . . uncias viginti.
Tincturae Picis liquidae
scrupulum unum.

Instilla tincturam, guttas tres vel quatuor singula vice, in aquam, vas semper vivide agitando. (*Vm.*)

Van Mons führt die Bereitungsart dieser Tinctur nicht an; es ist jedoch bekannt, daß der Theer in Alcohol auflöslich ist. Wahrscheinlich enthält die letztere Formel eine größere Menge empyreumatisches Oel, als die vorhergehenden, in denen nur wenig enthalten ist, welches mittelst der Essigsäure sich darin aufgelöst befindet.

Früher galt dieses Mittel, nach des Bischof's Berkeley Ansicht, für eine Panacee, heutzutage ist es fast vergessen. Es sollte gegen Scorbut, Blattern, Catarrh, Würmer nützlich, reinigend, alterirend, schweiß- und harntreibend seyn. Es reizt den Magen sehr heftig. — Gabe, für Kinder zwei bis drei Unzen, für Erwachsene ungefähr sechszehen Unzen. — Man kann, um es angenehmer zu machen, Zucker mit einigen Tropfen Muskatnußöl oder selbst Schwefeläther hinzusetzen.

Unguentum Picis liquidae. (Am. DD Du. Ed. Lon. LonN. RC. Suec. *C. Sa.*)

℞. Picis liquidae,
Axungiae Porci praeparatae,
singularum libram unam.

Liquata per linteum cola. (Lon. LonN.)

Du. loco axungiae Sebum vervecinum indicat; — Am. Ed. et *C.* Ceram flavam adhibent prope ignem liquatam cum pice miscendam.

℞. Farinae Secalis . libram unam.
Aceti . . . . quantum sufficit.

Coque ad pastae consistentiam et adde
Resinae Pini,
Picis liquidae,
singularum semilibram.

Stet mixtura super igne continue agitata, donec satis sit spissa. (Suec.)

℞. Picis liquidae . uncias quatuor.
Butyri saliti rancidi uncias duas.
Kali subcarbonici unciam unam.

Misce triturando. (DD.)

℞. Picis liquidae . . libram unam.
Sulphuris . . . uncias quatuor.

Commisce unum post alterum cum
Cerae flavae fusae . uncia una.

Misce bene. (RC. *Sa.*)

Alle diese Salben sind bei Hautkrankheiten und besonders bei Kopfgrind angewendet worden.

Linimentum farinaceum cum Pice. (*Au.*)

℞. Farinae Secalis partes quatuor.

Gentianae pulveratae partem unam.
Picis liquidae quantum sufficit.
Bei Scirrhus, mit Guajacabkochung innerlich, gerühmt.

Emplastrum Picis liquidae. (Han. Sax. *Vm.*)

℞. Cerae flavae . . . partes sex.
Colophonii . . . . partes tres.
Liqua et adde
Picis liquidae . . partem unam.
Cola mixturam et ad perfectam refrigerationem usque agita. (*Vm.*)

Han. et Sax. Cerae partes octo, Resinae Pini unam et sedecim Picis liquidae.

Pilulae Picis. (Am. B⁺. RC. Sar. *C*.)

℞. Picis liquidae . . quantum vis.
Radicis Inulae quantum sufficit.
Fiant pilulae granorum sex. (Am. B⁺. *C.*)

℞. Picis liquidae,
Balsami Peruviani,
singulorum semunciam.
Pulveris Liquiritiae unciam unam.
— Iridis Florentinae
drachmas tres.
Fiat massa pilularis. (Sar.)

Gabe, eine halbe Drachme, täglich zwei Mal. — Man hat sie bisweilen bei Lungenschwindsucht angewendet.

℞. Picis liquidae . . quantum vis.
Pulveris Liquiritiae quantum satis ut fiat massa in pilulas granorum quinque dividenda.

Gabe, vier, sechs zwei- oder dreimal täglich bei Scorbut und Hautkrankheiten. (RC.)

Plantago.

Wir führen hier unter diesem Namen folgende Pflanzen an:

1) *Plantago Psyllium, L.*; Flohsaame; Herbe aux puces commune (*Gal.*); Clammy plantain, Fleaseed (*Ang.*); Chmelik blessnjk (*B.*); Psilleurt (*D.*); Zaragatena (*His.*); Vlookruid (*Bel.*); Pulicaria (*I.*); Pulgueira (*Lus.*); Loppfraegraes (*Suec.*).

Ams. An. B. Ba. Bor. Br. Fenn. Fer. Gal. Gen. Han. His. O. R. Wir. *Br. M. Sp.* Z.

☉ (Tetrandria Monogynia, L.; Plantagineae, *J.*) Eine Pflanze Aegypten's und des gemäßigten Europa's. (*Hayne* V. t. 17. *Zorn* ic. pl. t. 115.)

Man wendet den Saamen (semen Psyllii s. Pulicariae an; er ist klein, langgestreckt, dunkelbraun, glänzend, glatt, weich anzufühlen, auf einer Seite eben, auf der andern gewölbt, geruchlos und von schleimigem, bitterem und scharfem Geschmack.

Erweichend.

2) *Plantago Cynops, L.*; strauchartiger Wegerich; Herbe aux puces vivace (*Gal.*). Ba. Bel. Bor4.

4 Eine Pflanze Aegypten's und des südlichen Europa's. (*Bull.* t. 363. *Waldst.* et Kit. Pl. Hung. t. 51. *Hayne* V. t. 16.)

Der Saame kann ganz wie der von voriger Art angewandt werden.

Erweichend.

3) *Plantago major, L.*; großer Wegerich, Wegtritt; Plantain commun, Grand Plantain (*Gal.*); Great plantain (*Ang.*); Vejbred (*D.*); Llanten major (*His.*); Groote wegblad (*Bel.*); Piantaggine maggiore (*I.*); Kanasch (*Pers.*); Labka (*Pol.*); Tanchagem major (*Lus.*); Popuschnik (*R.*); Grodblad (*Suec.*).

Ams. An. B. Bor4 Br. Fer. Gal. Gen. His. Li. Wir. *Be. C. Fi. G. M. Sp.*

Eine in Europa überall wachsende Pflanze. (*Hayne* V. t. 13. Dict. d. Sc. nat. Cah. V. Fl. med. V. 275.)

Man wendet die Wurzel und die Blätter an.

Die Wurzel (radix Plantaginis majoris s. latifoliae, s. Arnoglossi s. Septinerviae) besteht aus einem harten, dicken, fast holzigen, unten mit walzigen Fasern besetzten Ausläufer.

Die Blätter sind eirund, groß, stumpf, ledrig, an den Rändern eingebuchtet, glänzend und fast geruchlos. Sie haben einen krautartigen, etwas bittern und schwach adstringirenden Geschmack.

4) *Plantago lanceolata, L.*; spitzer Wegerich; Plantain lanceolé, petit Plantain (*Gal.*); Ribwort (*Ang.*); Spids vejbred (*D.*); Smalblaadige weegbree (*Bel.*); Spets groblad (*Suec.*).

Fer. Gal. Wir. *Sp.*

4 Eine Pflanze, welche in ganz Europa wächst. (*Hayne* V. t. 15.)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an.

Die Wurzel (radix Plantaginis lanceolatae s angustifoliae s. quinquenerviae minoris) ist süßlich und schwach adstringirend.

Das Kraut besteht aus einem Büschel lanzettförmiger, fünfrippiger Blätter.

5) *Plantago media, L.*; mittlerer Wegerich; Plantain moyen (*Gal.*); Hoary plantain (*Ang.*); Gitrocel prostrednj neb ssiroky (*B.*); Llanten medio (*His.*); Middelbaare weghree (*Bel.*); Piantaggine media (*I.*); Tanchagem mediana (*Lus.*), Stosskaemper (*Suec.*).

Fer. Gal. Wür. Z.

4. Eine in ganz Europa wachsende Pflanze. (*Hayne* V. t. 14. *Oed.* Fl. Dan. t. 581.)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an.

Die Wurzel ist schwach adstringirend.

Das Kraut besteht aus lanzettigen Blättern und hat einen styptischen Geschmack.

Die drei letztern Pflanzen sind schwach adstringirend.

6) *Alisma Plantago, L.*; Froschlöffel, Froschwegerich, Wasserwegerich; Plantain d'eau (*Gal.*); Great water plantain (*Ang.*); Vard vegbreed (*D.*); Llantin aquatica (*His.*); Groote water wegbree (*Hel.*); Piantaggine acquatica (*I.*); Badkawodna (*Pol.*); Stoeckra (*Suec.*).

Br.

Eine Pflanze (Hexandria Pologynia, L.; Alismaceae, *J.*), welche in ganz Europa an den Ufern von Wassern wächst. (Fl. Dan. 561. *Plenck* t. 292. *Schk.* t. 102. *Zorn* Ic. pl. t. 213.)

Man wendete ehedem das Kraut (herba Plantaginis aquaticae) an; es besteht aus eirunden, langspitzigen nervigen, glatten, ganzen Blättern von einem wässerigen, etwas scharfen Geschmack. Sie bewirken Röthung der Haut; Haller hat sie aber demungeachtet bei Hämorrhoiden empfohlen.

Die knollige Wurzel wurde vor einigen Jahren, in Rußland besonders, gegen die Hundswuth gepriesen. Man wendete das Pulver auf Butterbrodt und zwar von einer einzigen großen Wurzel, oder von mehreren, wenn sie klein waren, an. Jedoch ist das Mittel wieder in Vergessenheit gekommen.

Mucilago Psyllii. (Gal. Sar. *T.*)

℞. Seminum Psyllii drachmas duas.
Aquae tepidae . . sesquiunciam.

Digere per horas viginti quatuor super cinere calido, subinde agitando, et per linteum exprimendo cola. (Gal.)

Sar. Macerare per horas duodecim, tunc coquere jubet Semnum partem unam in decem Aquae et exprimere; — *T.* ut mucilaginem Seminum Cydoniorum.

Conserva Plantaginis. (Wür.)

℞. Herbae Plantaginis recentis et contusae . . . . partem unam.
Sacchari pulverati . partes duas.
Fiat pasta homogenea.

Succus Plantaginis. (Sar. Wür.)

℞. Herbae recentis Plantaginis
quantum vis.
Contunde in mortario lapideo Aquae pauxillo humectando, exprime fortiter, succum ut subsideat sepone, decantha et in lagenis, cuique librae liquidi Alcoholis drachmam unam addendo, serva.

Sar. in balneo aquae clarificare jubet. — Gabe, zwei bis drei Unzen.

Syrupus Plantaginis s. Plantaginis majoris. (His. Wir.)

℞. Succi expressi Plantaginis,
Sacchari albi,
singulorum libras quatuor.
Aquae . . quantum sufficit.

Clarifica et ad syrupi consistentiam coque. (His.)

℞. Succi Plantaginis depurati et lenta super igne evaporatione ad dimidium redacti uncias novem.
Sacchari albi . uncias sedecim.
Fiat syrupus (Wir.)

Aqua Plantaginis. (Gal. Sar. *Fi.* T.)

℞. Herbae recentis Plantaginis
partes quinquies mille.
Aquae partes duodecies mille et quingentas.

Destillent circiter partes decies mille; infunde productum duplo Herbae recentis, adde Aquae partes mille et destillando denuo partes decies mille abstrahe. Operationem tertio repetere potes. (Gal.)

Sar. Herbae partem unam et duas Aquae; destillent trientes duo; — *Fi.* Herbae libram unam, Aquae sedecim; destillent librae sex; — *T.* ut aquam florum Aurantiorum.

Man setzt dieses Wasser zu auflösenden Augenwassern, es ist aber ganz ohne Wirkung.

Extractum Plantaginis. (Sar. Wir. Wür.)

℞. Foliorum recentium Plantaginis
quantum vis.

Contunde in mortario lapideo, Aquae pauxillum adspergendo; exprime succum et statim in balneo aquae consume. (Wür.)

℞. Foliorum Plantaginis
libram unam.
Aquae fontanae . . libras sex.

Digere per dies quatuor in loco calido, tunc coque parumper; cola exprimendo et colaturam ad aptam consistentiam inspissa. (Sar. Wir.)

Fomentatio adstringens. (*Sm.*)

℞. Foliorum Plantaginis
manipulos duos.
Petalorum Rosarum rubrarum
pugillum unum.
Aquae semisextarios (demi-setiers)
quinque.

Decoque ad octarii remanentiam sub

finem calcem vivam volumine ovi gallinae addendo; ab igne remotum repone, decantha et adde

Aquae Vitae . . uncias quatuor.

Aqua Calcis vulneraria s. vulneraria. (Sar.)

℞. Herbae Plantaginis, s
— Saniculae,
— Hyperici,
— Pyrolae,
singularum manipulum unum.
Calcis vivae . . libras duas.

Calcem pulveratam supra herbas concisas conjice et per plures dies macera. Infunde deinde

Aquae purae . . libras decem.

Post decem horas macerationis decantha et infunde denuo

Aquae Plantaginis libras decem.

Macera per horas duodecim et ambos liquores commisce. (Sar.)

Platinum.

Platina; Platina; Or blanc (*Gal.*). Han. His.

Ein Metall, welches faſt eben ſo weiß als Silber, ſehr glänzend ſehr ſtreckbar und leicht zu hämmern, ſehr zäh, faſt unſchmelzbar iſt und an der Luft ſich nicht verändert. Die ſpecifiſche Schwere deſſelben iſt 20,98.

Chloruretum s. Murias Platinae. (B*.)

℞. Platinae . . . . quantum vis.
Aquae regiae . quantum sufficit ad solvendum metallum; solutio evaporata crystallisationi subjiciatur.

Man hat es bei der Behandlung der veneriſchen Krankheiten empfohlen. — Gabe, ein Viertels bis ein Gran, in Einreibungen auf das Zahnfleiſch.

Oxydum Platinae. (B*.)

℞. Solutionis aquosae Platinae muriaticae . . . . quantum vis.
Natri depurati quantum sufficit vel donec nullum amplius oriatur praecipitatum, quod lotum siccetur.

Je nach der Gabe, Brechen oder Purgiren erregend.

Plumbum.

Saturnus; Μολυβδος; Bléi; Plomb (*Gal.*); Lead (*Ang.*); Zobeil Anuk (*Ar.*); Hin-yen (*C.*); Blye (*D.*); Schisch (*Duk.*); Plomo (*His.*); Sisa (*Hin.*); Bly (*Bel.*); Piombo (*I.*); Tamaetam (*Mal.*); Surb (*Pe.*); Olow (*Pol.*); Chumbo (*Lus.*); Swinez (*R.*); Sisaka (*Sa.*); Bly (*Suec.*); Eium (*Tam.*); Schischum (*Tel.*).

A. Am. Ams. An. B. Bel. Bor. Br. D. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. His. Li. Lus. O. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *A. C. Fi. G. Pid. Sp. T.*

Ein derbes, bläulichweißes, weiches, glänzendes, nicht klingendes Metall, welches ſich mit dem Nagel ritzen, hämmern, jedoch mehr zu Blech ſchlagen, als zu Draht ziehen läßt, einige Zähigkeit beſitzt, gerieben einen merklichen Geruch verbreitet, bei 322,22°C. ſchmelzbar iſt und ſich in einer höheren Temperatur verflüchtigt. Die ſpec. Schwere iſt, nach Briſſon, 11,3523.

Sulphuretum Plumbi, Aes ustum. (Ams. Fer. His. Sar. *Fi. T.*)

℞. Plumbi . . . . quantum vis.

Liquato in cochleari ferreo Sulphur pulveratum per cochlearia adde, donec penitus in pulverem nigrum sit conversum, quod porphyrisatum serva. (Ams. His. *T.*)

Fer. Sar. *Fi. T.* laminarum Plumbi et Sulphuris in ollam fictilem strata immittere, hanc igni vehementi exponere et tunc residuum lavare et porphyrisare

Der Name Aes ustum, womit Ams. und Sar. dieſes Präparat bezeichnen, iſt unrichtig, und kömmt nur dem Protoxyde zu.

Emplastrum Plumbi nigrum. (His.)

℞. Plumbi sulphurici,
Lithargyri,
singulorum uncias duas.
Cerussae,
Antimonii crudi,
singulorum unciam unam.
Olei Rosarum . . . libras tres.
Cerae albae . . uncias novem.

Liqua ceram in oleo, adde substantias metallicas bene porphyrisatas, coque parumper et agita massam ad refrigerationem usque.

Chloruretum Plumbi, Murias s. Submurias Plumbi, Oxymurias Plumbi. (*Sp. Vm.*)

℞. Plumbi subacetatis liquidae partem unam.
Aquae . . . . . partes tres.

Mixtis adde Sal commune in sex partibus Aquae dissolutum tamdiu donec nihil amplius praecipitetur; praecipitatum bene lotum sicca.

Beſonders als Schönheitsmittel empfohlen, wobei jedoch Vorſicht nöthig iſt.

Lac Plumbi. (*Vm.*)

℞. Salis communis partem dimidiam.

Dissolve in Aquae quam minima quantitate; solutioni adde sensim

Extracti Saturni partem unam.

Praecipitatum collectum et bene lotum misce cum
Emulsionis communis
partibus duodecim.

Schönheitsmittel.

Protoxydum Plumbi.

§. I. Wie es im Handel vorkommt.

Lithargyrum, Lithargyrium, Lithargyrus, Oxydum Plumbi fusum s. semifusum s. semivitreum, Oxydum plumbicum semivitreum; Bleiglätte; Litharge, Oxide de plomb demi-vitreux (*Gal.*); Litharge (*Ang.*); Sael verglued (*D.*); Murdar sang (*Duk. Hin. Pe.*), Lithargirio, Almartago (*His.*); Lootglans (*Bel.*); Litharginio, Piombo semivitreo (*I.*); Gleyta (*Pol.*); Silfwerglitt (*Suec.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Pul. Gal. GalM. Ham. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *A. Br. C. Fi. G. M. Par. Pid. Sp.*

In kleinen, fett anzufühlenden Blättchen, welche durch Crystallisation des geschmolzenen und langsam erkalteten Protoxyds entstehen. Je nachdem die Farbe weiß oder gelb ist, nennt man sie Silberglätte, Lithargyrus; Litharge d'argent (*Gal.*), oder Goldglätte, Lithargyrius; Litharge d'or (*Gal.*).

Br. Fi. beschreiben das im Handel zur Bereitung der Bleiglätte angewendete Verfahren.

§ II. Im Ganzen bereitet.

1) *Oxydulum Plumbi, Aes ustum, Oxodes Plumbi nigrum, Plumbum ustum, Oxydum Plumbi griseum s. plumbosum, Protoxydum Plumbi, Cinis Plumbi, Suboxydum Plumbi, Cinis Plumbi;* Bleiasche (B. Bel. Br. Fenn. Ful. Han. HassP. Pal. Sax. Wir. *Sp.* Z.)

℞. Plumbi . . . . quantum vis.

In fusione tene in patina fictili vel ferrea, saepius agitando, et stratum griseum, quo tegitur, quoties apparet, separa; simulac totum metallum in oxydum conversum est, pulvera, cribra, porphyrisa et cum multa Aqua ablue.

Ueber das Aes ustum von Ams. und Sar. s. Sulphuretum Plumbi.

2) *Cerussa citrina;* gelbes Bleioxyd; Oxide jaune de plomb, Massicot, Ceruse jaune (*Gal.*).

Wir. *Fi. Vm.*

℞. Cerussae purae . quantum vis.

In crucibulum Hassiacum, latere tectum immitte, quod ita calefiat ut totum acidum carbonicum expellatur sed ne oxydum liberum liquet; post refrigerationem cum Aqua contere ut fiant trochisci.

Wir. Cerussam citrinam venalem recipere jubet; — *Fi.* in paratione Lithargyri indicat.

Das gelbe Bleioxyd ist eine Mischung von vielem Protoxyd und etwas metallischem Blei.

Pulvis erysipelatodes s. ad erysipelas. (Br. HassP. Pal. Wir. *Sp.*)

℞. Farinae (triticeae) . uncias sex.
Aeris usti (Oxyduli Plumbi),
Boli rubrae,
singulorum uncias duas.
Mastichis,
Olibani,
Cerussae,
singulorum unciam unam.
Fiat pulvis subtilissimus.

Injectio saturnina. (*Sw.*)

℞. Oxyduli Plumbi . grana viginti.
Sulphatis Zinci . . grana sex.
Aquae Rosarum uncias quatuor.

Von Clarc bei selbst hitziger Gonorrhoe gerühmt.

Deutoxydum Plumbi, Deutoxydum Plumbi rubrum, Oxydum Plumbi rubrum, Minium, Superoxydum plumbosum, Tritoxydum Plumbi, Plumbum oxydatum rubrum; Mennige; Deutoxide de plomb, Oxide rouge de plomb (*Gal.*); Red lead (*Ang.*); Isreny (*Ar.*); Yuentan (*C.*); Maennie (*D.*); Sendur (*Duk.*); Minio (*His. I.*); Sindur (*Hin.*); Menie (*Bel.*); Temamera (*Mal.*); Minia (*Lus.*); Sindura (*Sa.*); Maenja (*Suec.*); Segapu senduerum, Jum sindurum (*Tam.*); Yerra sindurum (*Tol.*)

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. His. Li. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *A. Br. C. Fi. Pid. Sp. T.*

Ein sehr feines, sehr schweres und rothes Pulver.

Br. Fi. T. beschreiben das bei der Bereitung der käuflichen Mennige angewendete Verfahren.

Errhinum adstringens. (*Pie.*)

℞. Aloës,
Myrrhae, singulorum sesquiunciam.
Calcis vivae . drachmam unam,
Minii . . . . semidrachmam.
Aluminis . . scrupulos quatuor.
Corticis Granati,
Balaustiorum,
singulorum drachmas duas.
Olei Myrti,

Aquae Rosarum, singulorum uncias duas cum dimidia.
— Plantaginis quantum sufficit.
Gegen Geschwüre in der Nase.

Unguentum s. Ceratum Minii s. Ceratum rubrum. (*Fi. Vm.*)

℞. Cerae albae . . partem unam.
Liqua et adde
Olei . . . . . partes duas.
Mixtis adde
Minii cum Olei pauxillo triti partem dimidiam.
Fi. Minii uncias sex, Cerae albae uncias duas et Olei Olivarum libram unam.

Emplastrum rubrum s defensivum rubrum Wepferi. (Wir.)

℞. Butyri recentis,
Olei Lini, singulorum uncias sex.
Corticis viridis Sambuci uncias quatuor.
Coque lente ad humidi consumptionem; cola exprimendo et colaturae adde
Cerae flavae,
Minii, singulorum uncias sex.
Bei alten Geschwüren und selbst offenem Krebs, zur Stillung der Schmerzen.

Ceratum rubrum camphoratum. (Br. Pal. Wir.)

℞. Cerae flavae,
Sevi cervini, singulorum semilibram.
Liquefiant; massae fere refrigeratae adde tunc
Minii cum Olei Rosarum semilibra triti uncias sex.
Adde denique
Camphorae . sesquidrachmam.

Unguentum Minii camphoratum. (Wir. *Sp.*)

℞. Olei Rosarum cocti sesquilibram.
Lithargyri . . . uncias duas.
Minii . . . . . uncias tres.
Cerussae . . . sesquiunciam.
Tutiae,
Camphorae, singularum drachmas tres.
Cerae albae . . . uncias duas.
Liqua ceram leni igne, adde oleum, tunc reliqua pulverata, deinde Aceti destillati uncias tres et tandem camphoram cum Alcohole tritam. (Wir.)
℞. Unguenti Lithargyri uncias quindecim.
Camphorae . . scrupulos duos.
Tritura simul et adde
Minii . . . . . sesquiunciam.
Tutiae . . . drachmas duas.
Misce bene. (*Sp.*)

Diese Salbe, so wie das vorhergehende Cerat gelten als austrocknend und schmerzstillend. Man hat sie besonders bei Verbrennungen empfohlen.

Emplastrum detergens rubrum. (Han. Pal. Wir. *Vm.*)

℞. Cerae flavae . . . libras duas.
Resinae Pini . . unciam unam.
Olei Rosarum . uncias quatuor.
Calcis vivae in Aqua Rosarum lotae et tunc siccatae,
Laterum contusorum,
Boli Armenae,
singulorum drachmas decem.
Minii . . . . . semunciam.
Camphorae in Oleo dissolutae drachmas duas.
Cerae et resinae in Oleo liquatis adde calcem, lateres, bolum et minium, tunc massae semirefrigeratae camphoram. (Pal. Wir.)
℞. Cerae flavae,
Sevi vervecini, singulorum uncias sex.
Cetacei . . . . . semunciam.
Liquatis simul, adde massae semirefrigeratae
Minii . . . . . uncias tres.
Cerussae,
Camphorae in Olei unciis tribus dissolutae, singularum uncias sex.
Misce bene. (Han.)
℞. Minii . . . . . partes duas.
Cerussae . . . partes quatuor.
Contere et adde
Sevi vervecini . . partes octo.
Olei Olivarum . . partes sex.
Cerae flavae . partes sedecim.
Commisce et adde
Camphorae cum Olei pauxillo tritae . . . . partem unam.
Misce bene. (*Vm.*)

Emplastrum ad fonticulos, Sparadrap rubrum. (Pal. *Vm.*)

℞. Terebinthinae coctae partem unam.
Sebi vervecini . . partes duas.
Cerae albae . . . partes sex.
Liqua et adde miscendo
Minii cum Sebi pauxillo triti partem unam.
Fascias e tela confectas in mixtura fusa humecta. (*Vm.*)
Pal. Cerae flavae uncias sex, Sebi cervini duas, Terebinthinae unam cum dimidia, Olei Liliorum alborum tantidem et Minii uncias quatuor.

Emplastrum resolvens. (*Ca. Pie.*)

℞. Emplastri diapalmae uncias quatuor.
Axungiae Porci,

Cerae albae,
singularum uncias duas.
Liqua et adde
Minii . . . . . uncias duas.

Emplastrum fundans s. resolvens. (*Ca*)
℞. Olei Olivarum libram unam et uncias duodecim,
Minii . . . . libram unam.
Cerae flavae . uncias quatuor.
Terebinthinae Venetae,
Magnetis pulverati,
singulorum sesquiunciam.
Olibani,
Mastichis,
Myrrhae,
Aluminis,
singulorum drachmas tres.
Camphorae . . drachmas duas.

Ceratum s. emplastrum Mercantini s. Minii gummoso-resinosum. (*Fi.*)
℞. Minii . . . . . libram unam.
Olei communis . . libras tres.
Colophonii . . unciam unam.
Cerae flavae . . . uncias sex.
Myrrhae,
Olibani,
Galbani,
Mastichis,
Aluminis usti,
singulorum drachmas tres.
Camphorae . drachmas quinque.

Minio cum camphora leni caloris ope nutrito massae si colorem obscure flavum accipit, ceram et colophonium adde ut solvantur, tunc ab igne remotis, simulac condensari coeperunt, adde gummi et alumen pulverata et in fine camphoram in alcoholis pauxillo solutam ut fiant magdaleones etc.

Tritoxydum Plumbi, Superoxydum vel Peroxydum Plumbi, Oxydum Plumbi puliceum; Tritoxide, Suroxide ou Peroxide de plomb, Oxide puce de plomb. (*Vm.*)
℞. Minii . . . . partem unam.
Acidi nitrici . . . partes tres.

Acidum cum Aquae aequali pondere dilue et oxydo pulverato infunde, bene agitando; liquorem calefac, decantha et pulverem lotum sicca.

Unguentum puliceum. (*Vm.*)
℞. Oxydi pulicei Plumbi
partem unam.
Cerati simplicis . . partes octo.
Tritura simul in mortario vitreo.

Sub-proto-carbonas Plumbi, Oxycarbonas Plumbi, Oxydum Plumbi carbonatum per Acidum acetosum, Oxydum Flumbi album, Cerussa alba norica s. Hollandica, Subcarbonas Plumbi, Carbonas Plumbi s. plumbicum s. plumbicus, Subacetas Plumbi, Subcarbonas Plumbi s. Protoxydi Plumbi, Album Argenti s. Plumbi, Album de Krems, Creta plumbica s. Plumbi, Plumbum spathicum, Mephitis Plumbi, Album Cerussae, Oxydum Plumbi album; **Bleiweiß, Schieferweiß**; Sous-proto-carbonate de plomb, Sous-carbonate de protoxyde de plomb, Sous carbonate de plomb, Blanc d'argent ou de plomb, Blanc de Krems, Craie de plomb, Plomb spathique, Méphite de plomb, Blanc de céruse, Oxide de plomb blanc (*Gal.*); White lead, white cride of lead, Cerusse (*Ang.*); Asfidaj (*Ar.*); Bleghvidt (*D.*); Suffidah (*Duk. Pe.*); Albayalde (*His.*); Tootwit (*bel.*); Cerussa, Biacca, Bianco di piombo (*I.*); Bleywas (*Pol.*); Blywhitt, Kiferwhitt (*Suec.*); Vullay, Muthu vullay (*Tam.*); Sibaydu (*Tek.*).

§. I. Wie man es im Handel findet.

Cerussa; **Bleiweiß**; Céruse (*Gal*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Gal. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. WW. *A. Br. C. Fi. G. Par Pid. Sp. T.*

Ein weißes und sehr schweres Pulver. — *Fi.* **führt die Bereitungsart des käuflichen an**

Vm. **zeigt folgendes Reinigungsverfahren an:**

℞. Cerussae . . . . . quantum vis.
Tere in mortario porcellaneo, sensim addendo solutionem tenuem Acetatis plumbici. Post aliquot tempus decantha et aliam solutionem adde et ita continua, donec aqua defluens per unam guttam Hydrosulphatis Potassae, sicut et ea, quae nondum lotioni inservit, praecipitetur. Residuum deinde multa Aqua lotum in trochiscos forma.

§. II. Im Ganzen bereitet.

Br. Ful. Wir. *Br. Pid. T. Vm.*
℞. Laminarum Plumbi tenuium
quantum vis.

Numerum certum earum in vase Acetum Vini bonum continente suspende, quo lente calefacto, evaporet; crustam albam, qua laminae teguntur subinde separa, operationem continuando, donec omnes laminae sint adhibitae?. (*Br. Pid. T. Vm.*)
℞. Acetatis Plumbi neutri
partes octodecim.
Natri subcarbonici dilapsi
partes quinque.
Dissolve sales quemque seorsim in

Aquae excessu et solutiones commisce, fortiter agitando; post subsidentiam decantha, et praecipitatum lotum in trochiscos forma. (*Vm.*)

Br. Ful. et Wir. Kali subcarbonicum indicant, productum *Magisterium Saturni* nominantes.

Man kann auch einen Strom kohlensaures Gas durch eine Auflösung des kohlensäuerlichen Blei's gehen lassen, bis kein Niederschlag mehr entsteht. Thénard hat dieses Verfahren angezeigt und auch Clichy befolgt es.

Trochisci Rhazis s. albi s. albi Rhasis s. carbonati Plumbi camphorati, Pulvis e Plumbo s. Cerussa compositus, Sief album. (Ams. Br. His. Lus. Pal. Sar. Wir. *Ca. Pid. Pie. Sp. Sw*)

℞. Cerussae . . drachmas quinque.
Gummi Tragacanthae
drachmas tres.
Misce triturando. (*Sw.*)

Lus. Cerussae partes duas et unam Gummi.

℞. Cerussae . . . sesquiunciam.
Gummi Ammoniaci,
Amyli, singulorum drachmas duas.
Camphorae . . semidrachmam.
Pulvera seorsim et misce ut fiant cum Aquae sufficiente quantitate trochisci. — Adduntur, si requiritur, cuilibet drachmae Opii grana tria. (His.)

℞. Cerussae . . . uncias quinque.
Sarcocollae . . sesquiunciam.
Gummi Tragacanthae semunciam.
Misce ut fiat pulvis. (*Sp.*) — Addi potest Opii pars vigesima octava.

℞. Cerussae . . . drachmas sex.
Gummi Arabici,
— Tragacanthae,
singulorum semunciam.
Sarcocollae . . drachmas tres.
Fiant pulvis. (Br. Wir.) — Addendo pro scrupulo Opii granum dimidium, habes *Sief cum Opio.*

℞. Cerussae cum Aqua Rosarum lotae . . . . . drachmas decem.
Amyli . . . . . semunciam.
Gummi Arabici,
— Tragacanthae,
singulorum drachmas duas.
Camphorae Alcoholis pauxilli ope pulveratae . . semidrachmam.
Fiat pulvis tenerrimus. (Ams.)

℞. Cerussae cum Aqua Rosarum lotae . . . . drachmas decem.
Sarcocollae . . drachmas tres.
Amyli . . . . drachmas duas.
Gummi Arabici,
— Tragacanthae,
singulorum drachmam unam.
Opii . . . . semidrachmam.
Fiat pulvis. (*Pie.*)

Ca. loco opii Camphorae semidrachmam.

℞. Cerussae . . . drachmas sex.
Amyli . . . . . semunciam.
Ichthyocollae . drachmas tres.
Fiat pulvis. (*Pid.*) — Cuique drachmae Opii granum unum vel duo addi possunt.

Dieses Pulver, in Rosenwasser verdünnt, wurde ehedem gegen Augenentzündungen, Verbrennungen und andre von äußern Ursachen herrührende Entzündungen gepriesen.

Pulvis Plumbi compositus. (*Sw.*)

℞. Pulveris Cerussae unciam unam.
— Corticis Quercus
libram unam.
Misce bene. — Zum Einstreuen auf scrophulöse Geschwüre empfohlen.

Globuli ad erysipelas. (*Sp.*)

℞. Cerussae,
Cretae, singularum unciam unam.
Boli albae . . . uncias duas.
Aquae Vitae camphoratae
quantum sufficit
ut fiat pasta in globulos redigenda.

Plenck bedeckte erysipelatöse Stellen mit Papier, welches mit einer solchen Kugel tüchtig abgerieben war.

Linimentum antiophthalmicum. (*Pie.*)

℞. Cerussae . . . uncias quatuor.
Amyli . . . . drachmas tres.
Gummi Arabici drachmam unam.
Tragacanthae in Aqua Rosarum dissoluti . sesquiunciam.
Dieses Liniment unterscheidet sich von einigen der Formeln zum Sief album nur durch seine Flüssigkeit.

Unguentum ad prosopalgiam s. dolorem factei. (*Ra.*)

℞. Cerussae . . . unciam unam.
Opii . . . . drachmam unam.
Axungiae . . . . semunciam.
Balsami tranquilli quantum sufficit.
Von Fouquier empfohlen.

Ceratum Cerussae s. de Cerussa, Unguentum album s. album simplex s. Carbonatis plumbici s. Oxydi Plumbi carbonati s. Subcarbonatis Plumbi s. Cerussae, Unguentum album Rhazis s. de Tornamira. (Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fer. Ful. Gal. Han. Hass. HassP. His. Li. Lus. O. Pal. Pol. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. *Br. C. Ca. Fi. Pid. Pie. Sp. Sw. Vm.*)

℞. Cerussae pulveratae partem unam.
Axungiae Porci
partem unam cum dimidia.
Misce triturando. (An. Br. D. Ful.

Gal. Hass. HassP. Li. Pal. Suec. Wir. *Br. Fi. Pid. Sp.*)

Sax. Cerussae partes tres et duas Axungiae.

℞. Axungiae Porci . . partes duas.
Sebi vervecini . partem unam.
Liquatis simul adde
Cerussae pulveratae partes duas.
Tritura bene. (Ba. Bor. Han. O. Pol.)

Fer. Olei Olivarum libras duas, Sebi vervecini libras duas cum dimidia et Cerussae libras duas.

℞. Olei Olivarum . . partes tres.
Cerae albae . . partem unam.
Liquatis adde
Cerussae . . . . partem unam.
Tere ad refrigerationem usque. (*Ca. Pie.*)

Lus. et Wür. Olei partes quatuor, Cerae et Cerussae, singularum unam; — *Sw.* Olei tredecim, Cerae duas cum dimidia et decem Cerussae vel tres Olei, unam Cerae et Cerussae unam cum dimidia; — *Vm.* terere jubet Cerussae partes duodecim cum Olei pauxillo et mixturae fere refrigeratae addere Cerae albae partes quinque et Olei Olivarum octodecim; — *Fi.* Axungiae libras duas, Cerussae unam, Cerae albae uncias quatuor.

℞. Cerae albae . . . partes tres.
Olei rosati . . partes duodecim.
Liquatis simul adde
Cerussae pulveratae partes quatuor.
Agita ad refrigerationem usque (Sar.)

His. Cerae partes quatuor, Olei rosati octodecim et duodecim Cerussae.

℞. Cerati albi . . . . partes sex.
Cerussae pulveratae partem unam.
Commisce. (Am. Du. *C.*)

Ed. Cerati partes quinque et tres Cerussae.

℞. Unguenti simplicis . partes tres.
Liqua leni igne et adde
Cerussae pulveratae partem unam.
Continue agita. (Ams.)

Bor4 Cerussae unam cum dimidia.

℞. Unguenti simplicis partes quinque.
Olei Olivarum partem dimidiam.
Blando igne mollefacto adde
Cerussae pulveratae partem unam.
Misce bene. (B. Bel.)

Diese Salbe dient besonders zum Verbinden verbrannter Stellen.

Unguentum album camphoratum. (B. Bel. Bor4. Br. D. Ful. HassP. Li. O. Pal. Pol. Sar. Sax. Wir. Wür. *Br. Ca Fi. Sp. Sw. T. Vm.*)

℞. Unguenti albi Rhazis
partes viginti quatuor.
Camphorae cum Olei Amygdalarum dulcium pauxillo tritae
partem unam.
Misce triturando. (B. Bel. Bor4. Br. HassP. O. Pal. Pol. Sax. Wir *Br.*)

Li. Camphorae partem trigesimam; — *Sp* partem trigesimam secundam; — D. quadragesimam; — Ful. quadragesimam octavam; — *Ca.* et *Sw.* sexagesimam sextam; — Sar. et Wür. septuagesimam secundam; — *Vm.* nonagesimam sextam; — *Fi.* Unguenti Cerussae libram unam, Camphorae scrupulos quatuor.

Unguentum ad ambustiones s. combustiones. (*Sw*.*)

℞. Unguenti albi camphorati,
— Althaeae,
singulorum quantum vis.
Commisce.

Sparadrap album. (*Vm.*)

℞. Terebinthinae coctae partem unam.
Sebi vervecini . . partes duas.
Cerae albae . . . . partes sex.
Liquatis admisce
Cerussae cum Sebi pauxillo tritae
partem unam.
Fascias e tela confectas in massa liquida humecta.

Sparadrap exsiccans. (*Ca. Vm.*)

℞. Olei Olivarum . partem unam.
Medullae bubulae
partem unam cum dimidia.
Cerae flavae . . . partes duas.
Sebi . . . . . partes tres.
Liquatis simul adde
Pulveris Calaminae partem unam.
— Cerussae
partem unam et dimidiam.
In mixtura fascias e tela confectas humecta. (*Vm.*)

Ca. Olei uncias sex, Cerae quatuor, Cerussae et Calaminae, singularum unam cum dimidia.

Unguentum ad combustiones. (Pal. Wir.)

℞. Camphorae . . unciam unam.
Olei rosati . . . uncias tres.
Cerussae . . . . uncias sex.
Pulveris Olibani . uncias duas.
Albumina Ovorum . . . no. 7.
Misce triturando in mortario plumbeo. (Pal.)

℞. Corticis medii Sambuci,
— Tiliae,
singulorum sesquiunciam.
Succi Plantaginis . uncias duas.
— Sedi majoris unciam unam.
Olei Lini . . . . . uncias sex.
Sebi cervini . . unciam unam.
Coque leni igne ad humidi consumptionem, cola oleum et in mortario plumbeo tere cum

Cerussae cum Aquae Rosarum lotae uncia una.
Sacchari . . drachmis duabus.
Olei Ovorum . . . semuncia.
Fiat unguentum. (Wir.)

Unguentum exsiccans. (*Sw.*)

℞. Olei Olivarum . libram unam.
Cerae albae . . . semilibram.
Mixtis et liquatis adde
Calaminae . . . . semilibram.
Cerussae . . . uncias novem.
Lithargyri . . . . uncias tres.
Misce usque refrixerint.

Unguentum de Liquiritia. (Pal.Wir.*Sp.*)

℞. Pulpae Radicis Liquiritiae recentis,
Butyri recentis,
singulorum uncias sedecim.
Coque ad consumptionem humidi, cola exprimendo et colaturae adde
Pompholicis . . drachmas sex.
Cerussae . . . . . uncias tres.
Camphorae cum Olei pauxillo tritae scrupulos duos.

Bei Excoriationen und aufgesprungenen Brustwarzen.

Unguentum antihaemorrhoidale. (Pal.)

℞. Amyli,
Cerussae,
Lithargyri,
Aeris usti (Oxyduli Plumbi),
Gummi Tragacanthae,
singulorum drachmas sex.
Opii,
Camphorae,
singulorum scrupulos quatuor.
Albumina Ovorum . . . no. 2.
Mucilaginis Seminum Psyllii,
Olei Rosarum,
— Verbasci,
singulorum semilibram.
Cerae flavae . . uncias tres.
Liqua ceram in oleis, adde camphoram, pulveres et denique albumina.

Unguentum Plumbi compositum. (*Sw.*)

℞. Cerussae . . . unciam unam.
Lithargyri . . drachmas duas.
Boli Armenae . unciam unam.
Tritura cum
Mellis rosati . . . . semuncia.
Axungiae Porci
sufficiente quantitate
ut fiat unguentum.

Diese Salbe, welche lange geheim gehalten wurde, diente zum Verbinden phagedänischer, scrophulöser und krebsartiger Geschwüre, besonders des penis. Die heftigen Schmerzen, welche ihre Anwendung in den ersten Stunden erregt, beweisen hinlänglich, daß sie reizende Eigenschaften besitzt Man setzt bisweilen zwei Drachmen Eisentritoxyd hinzu, wo sie dann mit dem emplastrum defensivum rubrum, vorzüglich mit dem nach der Formel von His. bereiteten, viel Aehnlichkeit hat.

Aqua ophthalmica (*Sa.*)

℞. Trochiscorum alborum Rhazis
drachmam unam.
Aquae Rosarum uncias quatuor.
Misce bene.

Unguentum adstringens. (*Pie.*)

℞. Succi Plantaginis,
— Bursae Pastoris,
— Verbasci,
singulorum uncias duas.
Coque leviter et adde
Pulveris Sanguinis Draconis
unciam unam.
— Boli Armenae,
— Terrae sigillatae,
— Radicis Bistortae,
singulorum sesquidrachmam.
Cerussae . . . scrupulos duos.

Subprotosulphas Plumbi.

Man bereitet dieses Salz nie eigens, sondern es bildet sich nebenbei, wenn man Bleiextract mit einem selenithaltigen Wasser verdünnt. Außerdem bildet es die Basis von folgenden Präparaten.

Lac virginale. (Br. Wir.)

℞. Lithargyri pulverati semilibram.
Aceti destillati . sesquilibram.
Coque ad tertiae partis liquidi consumptionem et colaturae adde
Aluminis crudi . uncias quatuor dissoluti in
Aquae communis libris duabus.
Liquorem lactescentem exinde prodeuntem serva. — Ein gefährliches Schönheitsmittel.

Protonitras Plumbi.

Dieses Salz ist nur als einer der Bestandtheile des folgenden Präparats angezeigt:

Balsamum Plumbi. (*Vm.*)

℞. Plumbi . . . . partem unam.
Acidi nitrici cum Aqua diluti
quantum sufficit
ad solvendum metallum. Solutionem adhuc calidam, continue agitando, infunde in
Axungiae Porci fusae
partes sedecim.
In modulos chartaceos effusum post refrigerationem in tabellas concide.

Subprotoacetas Plumbi, Acetas Plumbi s. Plumbi liquidus, Acetas superplumbicus aquosus, Aqua Lithargyrii Acetatis, Decoctum saturninum, Liquor

Acetatis Plumbi basicae s. Plumbi acetici basici s. Plumbi Subacetatis s. Subacetatis Lithargyri, Solutio Plumbi in Acido acetoso, Subacetas Plumbi liquidus, Extractum s. Balsamum Saturni, Subacetas Protoxydi Plumbi, Acetas Plumbi cum excessu baseos, Acetum Plumbi s. Saturni concentratum s. saturninum s. plumbicum s. Lithargyri; Bleiextract, flüssiges essigsaures Blei; Sous-protó-acétate de plomb, Sous-acétate de protoxide de plomb, Sousacétate de plomb, Acétate de plomb avec excès de base, Acétate de plomb, Vinaigre de plomb, Extrait de Saturne (*Gal.*). (Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. Du. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pal. R. RC. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. *Br. C. Fi. Pid. Sa. Sp. Sw. T. Vm.*)

℞. Acetatis Plumbi crystallisati partes quinque.
Aquae destillatae partes novem.
Dissolve sal in Aqua blandi caloris ope; solutioni adde
Lithargyri pulverati partem unam.
Coque, spathulae ope agitando, donec liquor 30° ar. indicet; refrigeratum cola et in lagena bene clausa serva. (Gal. GalM.)

T. Sacchari Saturni uncias tres, Lithargyri unam et Aquae destillatae vel pluvialis decem; — Sax. Salis partem unam, Aquae partes viginti ad viginti quinque et Lithargyri partem unam cum dimidia coquere simul donec liquor syrupo violarum viridem colorem praebeat et lagena Aquae unciae unius capax liquoris unciam unam cum dimidia contineat; — B*. et Han. coquere Lithargyri partes quinque et octo Salis in Aquae partibus quadraginta ad viginti quatuor redigendis, ita ut pondus specificum liquidi sit 1,420; *Vm.* calefacere simul Lithargyri partes septingentas cum dimidia, Salis octoginta quatuor cum dimidia et Aquae duas cum dimidia, donec liquor 48 vel 28° indicet; — Ba. Coquere Oxydi partem unam et tres Salis in Aquae novem, donec liquor pondus 1,360 vel 1,365 habeat; — Bor4. Plumbi acetici depurati uncias sex cum Lithargyri laevigati unciis tribus exacte miscere et addendo Aquae destillatae uncias viginti et unam in lagenula vitrea, reponere subinde agitando, donec color ruber sedimenti plane evanuerit et tunc filtrare; — RC. Acetatis Plumbi crystallisati semilibram in Aquae destillatae libris duabus solvere jubet.

℞. Lithargyri . . . partem unam.
Aceti . . . . partes quatuor.
Digere per horas viginti quatuor in retorta vitrea, subinde agitando, tunc lente per horas tres vel quatuor i. e. donec charta exploratoria rubefacta non amplius coloretur calefac; post refrigerationem liquorem serva, cujus pondus sit 1,250 i. e. Acetum Plumbi, vel ita evapora ut unciae duae drachmaeque duae ad implendum volumen Aquae unciae unius requirantur. (B. Bel. Fer.)

HassP. Lithargyri uncias quatuor cum Aceti Vini libris tribus coquere, donec charta explor. coerulea, Aceto rubefacta a liquore alkali instar afficiatur et sesquilibra circiter supersit; pond. spec. 1,2500 = 34° B.; — *T.* Lithargyri libras duas in Aceti octo per horas duas vel tres, agitando, leni calore digerere, per momenta aliquot coquere, post horas 12 sepositionis decanthare et filtrare. Inspissando praeparatum hoc et antea dictum ad mellis vel extracti consistentiam, habes *Extractum Saturni*; — *Vm.* In balneo arenae dissolvere jubet Lithargyri partes viginti unam cum dimidia in Aceti concentrati sex et solutionem ad 29 vel 48° usque evaporare; — *Br*.* coquere Lithargyri libras duas et Aceti boni libras octo cum dimidia in lebete plumbeo ad mellis usque consistentiam; addere deinde Aquae purae libras novem, ebullitionem adhuc per horae quadrantem continuare et ad 27° evaporare; — *Br.* Dissolvere Lithargyri partem unam in Aceti destillati quatuor et liquorem filtratum servare; — Am. Lon. LonN. et *C.* coquere simul Lithargyri libras duas et Aceti octarios octo ad liquoris octariorum sex remanentiam; — Du. coquere Lithargyri libram unam in Aceti octariis octo ad sex redigendis; — Li. coquere Lithargyri libram unam in Aceti libris sex, donec et liquoris drachmae decem volumen unciae unius Aquae impleant et uncia una ejusdem liquoris uncias duas Aquae quoad volumen aequet; — Fenn. et Suec. coquere Lithargyri partem unam in Aceti sex, donec liquor 1,14 pondere par sit; — Ams. Digerere Lithargyri partem unam in quatuor Aceti, et solutionem filtrare vel eam vaporando ad mellis consistentiam consumere; — An. Coquere Lithargyri libram unam in octo unciis Aceti, donec solutio 27° indicet; — *Fi.* Lithargyri uncias novem cum Aceti fortis libris sex ad trium remanentiam evaporare; — Lus. Coquere Lithargyri uncias quatuor in Aceti libris duabus ad unius libras cum dimidia liquo-

ris remanentiam; — Pol Sar. Wir. et *Sa.* coquere Lithargyri partem unam in Aceti quatuor per horam unam et solutionem filtrare; — Gen. Wür. et *Sp.* Coquere Lithargyri partem unam in tribus Aceti ad dimidiae partis liquidi consumptionem; — O. Lithargyri partem unam coquere in Aceti quinque ad hujus perfectam usque saturationem et liquorem ita obtentum evaporare ita ut drachmae sex sufficiant ad volumen unciae unius Aquae implendum; — Br. Coquere Lithargyri libram unam in Aceti quatuor ad duarum remanentiam et colaturam ad unciarum novem remanentiam consumere; — His. et Sar. digerere Lithargyri partem unam per aliquot dies in Aceti quatuor et liquorem deinde filtrare; — Ful. Coquere simul Lithargyri partem unam et duas Aceti concentrati.

Sp. praeterea coquere jubet Minii partem unam et Aceti octodecim, donec solutio consistentiam mellis acceperit; — Bor. coquere simul Minii partem unam et novem Aceti destillati et liquorem evaporando ad partem tertiam consumere; — D. coquere Minii partem unam in Aceti quatuor et liquorem ad dimidium solum consumere vel residuum pro quarta parte evaporare.

R. et Sax. Cerussae partem unam et Aceti boni octo coquendo ad dimidium consumere; — Hass. et *Pid.* Cerussae partem unam et octo Aceti vel per horam unam solum coquere, vel deinde ad mellis consistentiam evaporare; — R. tamen vel Minium vel Cerussam; — *Pid.* Minium vel Cerussam vel Lithargyrum eligere pro arbitrio permittit.

Fi. Acetum s. Tincturam Saturni e Cerussae unciis octo et Aceti destillati quadraginta absque calore, agitando parare et *Extractum Saturni* inspissando acetum hoc ad melleam consistentiam.

Um diese zahlreichen Verschiedenheiten zu beurtheilen, muß man sich erinnern, daß bei dem essigsäuerlichen Blei dreimal so viel Oxyd auf dieselbe Menge Säure kommt, als bei dem neutralen essigsauren Blei.

In Bezug auf die Bleiglätte, welche der Mennige und dem Bleiweiß vorzuziehen ist, bemerkt Thénard, daß man sie vorher calciniren müsse, ehe man sie mit dem neutralen essigsauren Blei in Berührung bringt, um das kohlensaure Blei zu zerstören, welches immer in größerer oder geringerer Menge darin enthalten ist, und welches das letztere nicht auflösen würde.

Viele Pharmacopöen schreiben flüssiges essigsaures Blei von zwei verschiedenen Graden der Dichtigkeit vor; das am meisten mit Wasser verdünnte führt den Namen *Acetum Plumbi s. Lithargyri s. Saturni s. lithargyrites s. saturninum*; das stärkere nennt man *Extractum Saturni s. Plumbi s Goulardi, Balsamum Saturni, Acetum Plumbi concentratum.* Der Stärkegrad dieses letztern variirt im Allgemeinen zwischen 27 und 30° R. Das des Pariser Codex und der Spitäler muß 30° anzeigen. Da man das Salz crystallisirt erhalten kann, so würde man wohl thun, wenn man diese Auflösung, welche nach ihrem Wesen selbst sehr veränderlich ist, ganz wegließe und sie den Magistralformeln einverleibte.

Einige Pharmacopöen (A. BorC.) nennen auch Bleiextract oder Bleiessig die Auflösung des neutralen essigsauren Bleis in Wasser. Dieß ist ein tadelnswerther Mißbrauch oder vielmehr Irrthum.

Die medicinischen Eigenschaften dieses Salzes und die Mittel, mit denen es sich nicht verträgt, sind dieselben, wie bei dem folgenden Salze.

§. I. Präparate, bei denen wässerige Flüssigkeiten das Excipiens des Salzes bilden.

Collyrium plumbatum s. adstringens s. resolvens, Aqua saturnina s. plumbica s. ophthalmica. (Am. Bor. Bor4. Ful. Ham. *C. Huf. ParC. Ra. Sw.*)

℞. Extracti Saturni . semunciam.
Aquae destillatae . libras duas.
Misce. (Bor. Bor4.)

Am. et *C.* Extracti Saturni scrupulum unum et Aquae semioctarium; — *ParC.* duas guttas Extracti et Aquae uncias quatuor; — *Ra.* Extracti guttas decem et Aquae uncias quatuor.

℞. Extracti Saturni guttas decem.
Decocti Malvae . uncias duas.
Misce bene. (Ham.)

℞. Mucilaginis Cydoniorum unciam unam.
Aquae destillatae . uncias tres.
Extracti Saturni guttas duodecim.
Misce. (Ful.)

Huf. Extracti Saturni guttas duas, Aquae Rosarum unciam unam et Mucilaginis Seminum Cydoniorum semidrachmam.

℞. Florum Meliloti semidrachmam.
Aquae . . . . . libram unam.
Infunde et colaturae adde
Extracti Saturni drachmam unam.
Misce. (*Ra.*)

℞. Extracti Saturni . guttas octo.

Aquae Rosarum uncias quatuor.
Misce. (*Sw.*)

Collutorium saturninum. (GalM.)

℞. Extracti Saturni partem unam.
Mellis despumati partes viginti.

Injectio ad leucorrhoeam s. adstringens. (*Au. Ca Sw. Sy.*)

℞. Extracti Saturni drachmas duas.
Aceti destillati . . semilibram.
Aquae Rosarum . sesquilibram.

Von Young bei Leukorrhoe empfohlen. (*Ca, Sw. Sy.*)

℞. Extracti Saturni
guttas novem ad octodecim.
Aquae . . . . uncias novem.
Opii grana duodecim ad viginti quatuor.

Von Girtanner bei sehr schmerzhafter Gonorrhoe empfohlen. (*Au.*)

Injectio sedans s. sedativa. (*Ca. Sw. Sy.*)

℞. Extracti Opii aquosi
drachmam unam ad tres.
Aquae calidae . libram unam.
Solutioni adde
Extracti Saturni
drachmam unam ad tres.
Misce. (*C., Sw.*)

Sy. Extracti Opii drachmam unam, Aquae Rosarum libras duas et Extracti Saturni guttas sexaginta vel: Opii drachmas tres, Aquae destillatae uncias duodecim et Extracti Saturni unciam unam ad tres.

Von Hamilton, besonders bei Gonorrhoe, gepriesen.

Collyrium saturninum opiatum. (Am. WW. *C. E.*)

℞. Extracti Saturni . guttas duas.
Aquae Rosarum unciam unam.
Extracti Opii aquosi
granum unum.
Misce. (WW.)

℞. Extracti Saturni scrupulum unum.
Aquae . . octarium dimidium.
Tincturae Opii . . unciam unam.
Misce. (Am. *C.*)

℞. Extracti Saturni guttas duodecim.
Vini Opii . guttas quadraginta.
Aquae Rosarum . . uncias tres.
Misce. (*E.*)

Lotio adstringens, Aqua exsiccans. (*E. Sa.*)

℞. Extracti Saturni drachmam unam.
Spiritus Camphorae drachmas tres.
Aquae . . . . octarium unum.
Misce. (*E.*)

℞. Aquae Calcis . . sesquiunciam.
— sclopetariae semunciam.
Extracti Saturni semidrachmam.
Misce. (*Sa.*)

Gargarisma adstringens. (*Ra.*)

℞. Extracti Saturni semidrachmam.
Decocti Hordei . libram unam.
Syrupi Sacchari . unciam unam.

Cataplasma saturninum s. resolvens. (GalM. RC. *Ra. Sp. Sy.*)

℞. Farinarum resolventium
quantum vis.
Aquae vegeto-mineralis
octuplum.
Coque ad consistentiam pultis. (*Sp.*)

RC. Micae Panis vel Farinae quantum vis, Solutionis Acetatis Plumbi fortioris quantum satis.

℞. Aquae fervidae . libram unam.
Micae Panis . quantum sufficit.
Extracti Saturni
unciem unam ad duas.
Misce et adde
Axungiae Porci . unciam unam.
Warm anzuwenden. (*Sy.*)

℞. Cataplasmatis emollientis
uncias quatuor.
Extracti Saturni unciam unam.
Salis Ammoniaci semidrachmam.
Misce exacte. (*Ra.*)

§. II. Präparate, in denen dem Bleiextract alcoholische Flüssigkeiten zum Vehikel dienen.

Gargarisma stypticum. (*Pie.*)

℞. Extracti Saturni . uncias duas.
Aluminis . . . unciam unam.
Aceti . . . vitrum dimidium.
Vini albi . . octarium unum.

Aqua Saturni s. saturnina s. Plumbi acetosi s. Lithargyri composita s. Acetatis superplumbici s. Goulardi s. vegeto- s. vegetabili-mineralis Goulardi s. Subacetatis plumbici, Acetas Plumbi dilutum alcoholisatum, Solutio Subacetatis s. Acetatis plumbici, Subacetas Plumbi dilutus, Liquor Plumbi Subacetatis dilutus, Tinctura plumbosa, Acetas Plumbi liquidus cum Alcohole; Goulard's Bleiwasser. (Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Br. D. Du. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wur. *Bo. Br. C. Fi. ParC. Pie. Ra. Sa. Sp. Sw. T. Vm.*)

℞. Extracti Saturni (30°)
partem unam.
Dilue in
Aquae destillatae
partibus quadraginta octo.
Liquori adde
Alcoholis (22°) partes quatuor.

Serva. (Bor4. Fenn. Gal. GalM. *Bo. Fi. ParC Pie. Sp. T.*)

Ams. B. D. Per Ful. Han. Hass. R. Suec. *Br.* et *Pid.* Extracti partem unam, Alcoholis duas et Aquae quadraginta octo; — Lus. Extracti unam, octo Alcohol's et Aquae quadraginta octo; — *Vin.* Extracti unam, Alcoholis unam et Aquae triginta duas; — Wür. Extracti unam, Alcoholis tantidem et Aquae triginta sex; — HassP. Extracti unam, Aquae communis viginti quatuor et Spiritus Vini rectificati unam; — Du. Lon. LonN. *C. Sa.* et *Sw.* Extracti et Alcoholis, singulorum unam et Aquae nonaginta sex (centum viginti octo); — His. Extracti unam, Alcoholis duas et Aquae nonaginta sex; — Br. Extracti unam, Alcoholis duas et Aquae centum viginti octo; — Bel. Extracti sex, Alcoholis sedecim et Aquae centum nonaginta duo; — RC. Extracti scrupulos quatuor, Alcoholis diluti, Acidi acetici diluti vel impuri, singulorum drachmam unam, Aquae destillatae vel fontanae libram unam.

℞. Extracti Saturni partem unam.
Aquae destillatae
partes quadraginta octo.
Misce bene. (Han Li. O. Pol.)

Ra. Extracti partem unam et octo Aquae; — Sax. Extracti unam et duodecim Aquae; — Ba. Extracti unam et Aquae viginti quatuor.

Nimmt man zu diesen Verschiedenheiten in den Verhältnissen der zwei oder drei Bestandtheile dieses Wassers noch die Verschiedenheit des Stärkegrads des Bleiextracts hinzu, so wird man leicht einsehen, wie wenig das Präparat gleichförmig ausfallen müsse. Uebrigens ist es außer Zweifel, daß dem Arzt die Stärke desselben überlassen bleiben muß, welcher sie den Umständen gemäß einrichtet. Nur muß er den Stärkegrad des Bleiextracts, welches er verschreibt, genau kennen, und in diesem Bezug lassen diejenigen Pharmacopöen, welche es gar nicht oder nur sehr flüchtig anführen, eine sehr empfindliche Lücke. Der Alcohol, welcher nach der ursprünglichen Formel Goulard's hinzukommt, ist, wo nicht der bezweckten Wirkung gerade entgegen, doch wenigstens unnütz.

Bereitet man das Goulard'sche Wasser mit gemeinem Wasser, so ist es milchig, weil ein Theil des Salzes sich zersetzt und mit dem kohlensäuerlichen oder schwefelsauren Blei, welches sich niederschlägt, essigsauren Kalk bildet, welcher in Auflösung erhalten wird. Obgleich die Flüssigkeit durch diesen Niederschlag nur wenig, und wenn man sie vor dem Gebrauch tüchtig umschüttelt, nichts an ihrer Kraft verliert, so muß der Pharmaceut doch wo möglich auch diesen Fehler vermeiden.

Das Goulard'sche Wasser wird zu Bähungen und zum Befeuchten von Breiumschlägen angewendet.

Fomentatio refrigerans, Lotio saturnina s. plumbata, Lotio s. Fomentatio resolvens. (Ful. Ham. *Ca. Pie. Sw. Sy.*)

℞. Aquae vegeto-mineralis
sesquilibram.
Alcoholis . . . . uncias tres.
Misce. (Ham.)

℞. Extracti Saturni,
Aquae Vitae,
singulorum unciam unam.
— Rosarum . . libras tres.
Misce. (*Ca. Pie.*)

Sw. Extracti drachmas duas ad quatuor, Alcoholis quatuor, et Aquae libras duas; — *Sy.* Extracti drachmas duas ad quatuor, Alcoholis unciam unam et duas libras Aquae.

Gewiß ist dieses nur eine Abänderung des Goulard'schen Wassers Man kann nöthigenfalls drei oder vier Drachmen Aqua Vitae camphorata zusetzen.

℞. Extracti Saturni,
Aquae Vitae,
singulorum semunciam.
— Plantaginis libram unam.
Misce (*Pie.*)

℞. Aquae vegeto-mineralis
libras duas.
Alcoholis . . . . uncias tres.
Acidi sulphurici unciam unam.
Misce. (Ful.)

Liquor ad perniones (*Sw.*)

℞. Extracti Saturni . partem unam.
Spiritus Rorismarini
partes quatuor.
Misce.

Fomentatio resolvens. (Ful.)

℞. Salis Ammoniaci . semunciam,
Aquae communis uncias duodecim.
Solutioni adde
Alcoholis . . . . uncias duas.
Extracti Saturni drachmas duas.

Collyrium saturninum. (*Au. Ca.*)

℞. Extracti Saturni,
Aquae Vitae camphoratae,
singulorum guttas sex.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae
semunciam.
Aquae Plantaginis . uncias sex.
Misce. (*Ca.*)

℞. Aquae Goulardi,
— Rosarum,
singularum uncias duas.
Opii . . . . . grana octo.
Misce. (*Au.*)

℞. Extracti Saturni drachmas duas.
Infusi Sambuci . . uncias sex.
Aquae Vitae camphoratae drachmam unam.
Misce. (*Au.*)

Aqua roborans. (*Ca.*)

℞. Extracti Saturni,
Aquae Vitae camphoratae,
singulorum drachmas duas.
Sulphatis Zinci drachmam unam.
Aquae Chamomillae semilibram
Gella empfuhl dieses Augenwasser bei sogenannter asthenischer Augenentzündung.

Fomentum saturninum cum Opio, Fomentatio adstringens. (*Au.*)

℞. Aquae . . . . . uncias decem.
Extracti Opii . . grana decem.
— Saturni . semidrachmam.
Aquae Vitae camphoratae guttas viginti.
Vogel empfiehlt es bei eingeklemmter Brüchen.

§. III. Präparate, in denen fette Körper das Excipiens des Bleiextracts bilden.

Cereoli saturnini s. plumbici, Candelae chirurgicae s. resolventes s. mitigantes, Cerei medicati, Cereoli communes s. Acetatis Plumbi. (Bor. Bor4. Br. Ful. HassP. Pol. R. Sax. Suec. *Br. Pid. Pie. Sp. Sw.*)

℞. Cerae flavae . . . libras duas.
Liqua leni igne et adde
Extracti Saturni . unciam unam.
Misce, continue agitando, massam ab igne remotam in cereolos redige. (Bor. Br. Ful. Pol R. Sax. *Br. Pid. Pie. Sp. Sw.*)

Bor4. HassP. Cerae flavae uncias sex, Aceti plumbici drachmas duas.

℞. Cerae flavae . . libram unam.
Cetacei . . . . drachmas tres.
Extracti Saturni drachmas duas.
Cerae et cetaceo fusis extractum adde. (Suec.)

Balsamum universale s. saturninum, Butyrum Saturni, Ceratum Saturni s. Saturni Goulardi s. Lithargyrii s. Plumbi Superacetatis s. Plumbi s. Plumbi compositum s. e Plumbo, Linimentum plumbatum, Pomatum Saturni, Unguentum Acetatis Plumbi s. Acetatis superplumbici s. Lithargyri s. de Lithargyro s. nutritum s. tripharmacum s. saturninum s. plumbicum s. Subacetatis plumbici s. Oxydi Plumbi acetatum, Ceratum Acetatis plumbici, Sapo antiphlogisticus et resolvens, Pomatum s. Unguentum antiherpeticum; Bleicerat, Bleisalbe. (A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fer. Ful. Gal. Han. Hass. HassP. His. Li. Lus. O. Pal. Pol. R. Sar. Sax. Wir. Wür. WW. *Br. Ca. Fi. Pid. Pie. Sm. Sp. Sw. Sy. Vm.*)

℞. Olei Olivarum . . partes duas.
Extracti Saturni . partem unam.
Misce triturando. (Ams.)

His et *Sw.* Olei et Extracti, singulorum partes aequales; — Ful. Li. et *Pid.* Olei partem unam cum dimidia et unam Extracti; — *Pie.* Olei partes octo et unam Extraeti.

℞. Axungiae Porci partes quatuor.
Extracti Saturni partem unam.
Contere. (Sax.)

℞. Olei Olivarum,
Axungiae Porci,
Extracti Saturni,
singulorum partem unam.
Misce in mortario vitreo, bene triturando. (Bel.)

℞. Olei Rosarum cocti partem unam.
Extracti Saturni . partes duas.
Tritura simul. (Wir.)

℞. Lithargyri puri . . partem unam.
Aceti . . . . . partes duas.
Olei Rosarum cocti partes quatuor.
Tere lithargyrum in mortario plumbeo addendo interdum Acidi pauxillum interdum Olei parvam copiam, donec omnia bene sint commixta. (Br.)

℞. Lithargyri,
Cerussae, singulorum uncias tres.
Aceti . . . . . uncias octo.
Olei . . . . . sesquilibram.
Tritura lithargyrum et cerussam modo cum Aceti, modo cum Olei pauxillo, donec liquida sint penitus consumpta. (Sar.)

Wir. Lithargyri partem dimidiam, Cerussae unam cum dimidia, Aceti dimidiam et unam Olei Rosarum cocti; — Pal. Lithargyri duas, Cerussae dimidiam, Aceti unam et Olei Rosarum duas cum dimidia; — *Fi.* Olei Olivarum, Cerussae, singulorum libram unam, lente coquere, addere Aceti calidi albi libram unam et tunc Cerae albae et Emplastri Diachyli simplicis, singulorum uncias sex. (*Ceratum Cerussae* genannt.)

℞. Lithargyri pulverati libram unam.
Olei Olivarum . . . libras tres.
Aceti albi . . uncias sedecim.
Coque lithargyrum cum olei libra una, addendo sensim Aquam, donec massa cerati consistentiam acceperit, quod deinde cum oleo quod restat et aceto contere. (His.)

Sp. Lithargyri partes sedecim, Olei

octodecim et Aceti tres; — *Sm.* Olei partem unam, Aceti, Lithargyri, singulorum duas, coquendo ad dimidium redigere.

℞. Olei Olivarum . partes quatuor.
Cerae albae . partem dimidiam.
Liqua et massae refrigescere coeptae sensim adde, continue agitando,
Extracti Saturni partem unam.
Misce bene. (O. *Br.*)

D. Ful. Li. et *Vm.* Extracti partem unam, Cerae duas et sex Olei; — Wiir. Extracti unam, Cerae unam cum dimidia et quatuor Olei; — *Sy.* Extracti unam, Cerae sex et sedecim Olei; — *Sw.* Extracti unam, Cerae tantidem et tres Olei; — *Sp.* Extracti unam, Cerae sex et Olei viginti quatuor; vel Extracti quatuor, Cerae octo et Olei octodecim; vel Extracti dimidiam, Cerae novem et octo Olei; — Penn. et Suec. Extracti et Cerae, singulorum quatuor et novem Olei; — Hass. Extracti duas cum dimidia, Cerae quatuor et duodecim Olei; — R. Extracti quatuor, Cerae quinque et novem Olei; — Lus. et *Br.* Extracti duas cum dimidia, Cerae quatuor et novem Olei; — *Fi.* Olei libras duas, Cerae unam, Aceti (Extracti) Saturni uncias novem.

℞. Axungiae Porci . partem unam.
Cerae albae . partem dimidiam.
Liqua et mixtis semirefrigeratisque adde
Extracti Saturni partem unam.
Misce triturando. (A.)

BorC. Extracti partes duas, Cerae unam et tres Axungiae.

℞. Olei Nucum juglandium partes duodecim.
Cerae flavae . . partes quatuor.
Liqua blando igne et adde sensim
Aquae fontanae partes duodecim.
Extracti Saturni . partem unam.
Misce exacte. (D. *Pid.*)

Pol. et *Vm.* Extracti partem unam, Aquae duas, unam Cerae et quatuor Olei; — Bor. Extracti partem unam, Aquae Rosarum duas, Cerae duas et octo Olei; — Wir. Extracti unam, Aquae viginti quatuor, Cerae unam et quatuor Olei; — Han. et O. Extracti unam, Aquae Rosarum quatuor, duas Cerae et octo Olei; — Han. Extracti, Aquae, singulorum duas cum dimidia, Cerae tantidem et octo Olei; — Sax. Extracti dimidiam, Aquae tres cum dimidia, unam Cerae et quatuor Olei; — HassP. Olei Olivarum libras duas, Cerae albae uncias sex, Aceti Lithargyri tres, Aquae Rosarum sex.

℞. Cerae,
Sebi vervecini,
singulorum partes duas.
Olei Olivarum . partem unam.
Liqua blando igne et mixturae paullo refrigeratae adde
Extracti Saturni partem unam.
Tritura bene simul. (*Pid.*)

℞. Cerati partes centum viginti quinque.
Extracti Saturni . partem unam.
Misce sedulo in mortario (Gal.)

Ca. et *Pie.* Extracti partem unam et Cerati nonaginta sex; — GalM. Extracti unam et Cerati viginti quinque; — B. et Ed. Extracti unam et viginti Cerati; — Du. Extracti unam et octodecim Cerati; — Ba. Extracti unam et Cerati decem; — An. DD. et *Sw.* Extracti unam et Cerati octo; — WW. Extracti unam et quatuor Cerati; — Fer. Olei Olivarum libras duas, Cerae albae uncias tres et sex Extracti Saturni; — Bor4. Unguenti simplicis libras tres, Aceti plumbici uncias tres.

Alle diese unter dem Namen von Cerat, Liniment, Salbe und selbst Pflaster gebräuchlichen Zusammensetzungen sind bloß hinsichtlich des Dichtigkeitgrads von einander verschieden. Sie gelten für beruhigend, lindernd, auflösend, schmelzend und die Vernarbung befördernd. Sehr und vielleicht zu häufig macht man von ihnen in der chirurgischen Praxis Gebrauch, obgleich sie jetzt weniger benutzt werden, als in der Zeit, wo das Verbinden der Wunden fast einzig in der Anwendung von Salben und Pflastern bestand.

Unguentum ad varices ani s. antihaemorrhoidale. (Ham. *Fi. Sw.*)

℞. Unguenti Cetacei . partes octo.
Extracti Saturni partem unam.
Contere. (*Sw.*)

℞. Unguenti Linariae,
Mucilaginis Seminum Cydoniorum,
singulorum partes duas.
Extracti Saturni . partem unam.
Misce triturando. (Ham.)

Unguentum ad combustiones. (Ful.)

℞. Unguenti Plumbi subacetici unciam unam.
— Basilici,
— balsamici,
singulorum drachmam unam.
Misce.

Ceratum exsiccans Kirklandi. (*Ca. Pie.*)

℞. Cretae praeparatae,
Aceti destillati,
singulorum uncias quatuor.
Cessatâ effervescentiâ adde
Olei Olivarum . uncias quatuor.

Emplastri simplicis semilibram.
Liqua leni igne et massae semirefrigeratae admisce
Extracti Saturni
uncias quatuordecim.
Misce sedulo.

Unguentum Subacetatis Plumbi opiatum s. opiatum s. opiaceum. (*Ra.*)

℞. Extracti Saturni . semunciam.
Laudani liquidi Sydenhami
drachmas duas.
Olei albi . . . uncias duas.
Subige bene.

Unguentum Subacetatis Plumbi camphoratum, Cerátum Plumbi compositum, Balsamum Saturni Goulardi, Unguentum s. Pomatum antiherpeticum Goulardi. (A. Ams. Br. Ful. Lon. LonN. Lus. Wür. *C. Pie. Sp. Sw.*)

Praeparatur, Unguento simplici fere refrigerato addendo Camphorae cum Olei pauxillo tritae partem trigesimam tertiam (Ams.); quinquagesimam quartam (Wür.); septuagesimam sextam (Ful.); centesimam sexagesimam octavam (Br.); ducentesimam decimam (*Sp.*); ducentesimam quadragesimam (*Pie. Sp.*); ducentesimam quadragesimam octavam (Am. Lus. *C*): octingentesimam quadragesimam. (*Sp*).

Lon. LonN Extracti Saturni fluid. uncias duas cum dimidia, Cerae flavae uncias quatuor, Olei Olivarum novem et Camphorae drachmam dimidiam.

Unguentum s. Pomatum antiherpeticum. (*Sm.*)

℞. Cerati Saturni,
Unguenti populei,
singulorum unciam unam.
Camphorae pulveratae
drachmas duas.

Zum Verbinden frischer Flechten.

Linimentum antihystericum. (*Sm.*)

℞. Olei rosati . . . . uncias duas.
Unguenti populei
drachmas quatuor.
Camphorae . . drachmas duas.
Extracti Saturni drachmam unam.

In Einreibungen auf den Unterleib alle Viertelstunden.

Sparadrap s. Pellis Goulardi. (*Pie. Sp. Vm.*)

℞. Olei Olivarum
uncias quatuordecim.
Cerae flavae
uncias viginti quatuor.
Liquatis adde
Extracti Saturni . unciam unam.
Camphorae cum Olei pauxillo tritae
semidrachmam.

Mixturae immerge linteum mediocris teneritatis et superficiem deinde laeviga. (*Vm.*)

Pie. Cerae libras duodecim, Olei tres, Extracti uncias octo et Camphorae drachmas duas; — *Sp.* Cerae uncias nonaginta sex, Olei viginti octo, Extracti quatuor et Camphorae drachmam unam.

Dieser Sparadrap ist bei atonischen Geschwüren der Beine und bei rheumatischen Schmerzen gerühmt worden.

Unguentum Saturni saponaceum s. Subacetatis Plumbi saponaceum, Unguentum s. Pomatum Goulardi. (Br. Ful. Lus. *Fi. Pie*)

℞. Saponis communis uncias octo.
Aquae fontanae . octarios duos.
Dissolve blando igne, continue agitando; adde deinde
Extracti Saturni . uncias duas.
Camphorae . drachmam unam.
Misce bene. (Br. *Pie.*)

Fi. Saponis Alicantini sesquilibram, Extracti Saturni Goulardi uncias duas, Camphorae drachmam unam, Aquae libras quinque.

℞. Unguenti nutriti . uncias octo.
Saponis albi . uncias quatuor.
Coque lente ad consumptionem humidi usque et adde
Camphorae . drachmam unam.
Misce bene. (Ful.)

Lus. addere jubet Unguento Subacetatis simplici (Lus.) Saponis raspati uncias tres.

Diese Salbe soll stärker auflösend und schmelzend seyn, als die einfache. Man hat sie besonders bei Anchylose gerühmt.

Cereoli saturnini. (Fer. *Vi.*)

℞. Cerae flavae . . libram unam.
Extracti Saturni . . semunciam.
Liquorem cum cera liquata commisce ut fiant cum fasciis linteis in hac mixtura immersis cereoli.

Protoacetas Plumbi, Acetas Plumbi s. Plumbi acidulus siccus, Acetas plumbicum crystallisatum, Acetis Plumbi, Cerussa acetata, Plumbum aceticum s. aceticum crudum s. acetatum, Superacetas Plumbi, Saccharum saturninum s. Saturni, Sal Saturni, Sal Plumbi, Acetas Protoxydi Plumbi, Acetas Plumbi neutrum; Bleizucker, essigsaures Blei, Bleisalz; Protoacétate de plomb, Acétate de protoxide de plomb, Acétate de plomb ou de plomb neutre, Sel de saturne, Sucre de plomb, Sucre de Saturne (*Gal.*); Sugar of lead (*Ang.*); Blye-sukker (*D.*); Lootzuiker (*Bel.*); Zucchero di saturno (*I.*); Cukior olowiany, Przyoc-

cian olowin nieczysty (*Lus.*); Blysocker (*Suec.*).

§. I. Wie man ihn im Handel findet.

B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. DD. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Han. Hass. HassP. Li. O. Pol. Sax. Suec. WW. *C. G. Par. Pid.*

Bevor dieses Salz angewendet wird, muß es gereinigt werden (*Saccharum Saturni depuratum, Plumbum aceticum depuratum, Acetas Plumbi depuratus s. in crystallos concretus* etc.)

℞. Acetatis Plumbi . . partes duas.
Aquae calidae . . . partes tres.

Solutioni ut perfecta sit, adde Acidi acetici concentrati pauxillum, liquorem adhuc calidum filtra et in locum frigidum ad crystallisandum repone. (Ba.)

Fenn. Salis partem unam, Aquae quatuor et unam Aceti destillati; — Bor4. Salis partes duodecim, Aquae destillatae calidae quantum sufficit, Aceti destillati partem unam; — Sax. Salis partes tres in totidem Aquae dissolvere, Aceti destillati partem unam addere, mixta coquere, colare et crystallisationi subjicere jubet.

℞. Plumbi acet ci partem unam (quantum libet).
Aquae calidae partem unam (quantum sufficit).

Dissolve, liquorem per telam trajice, adde Aquae partem unam, calefac, filtra et lentae crystallisationi subjice. (Bor. Han. Hass. HassP. O. Suec. *Sw. Vm.*)

Vm. Sal in Aquae quam minima quantitate solvere et liquori torrentem Gasis acidi carbonici immittere tam diu jubet, donec nullum amplius provocetur praecipitatum.

§. II. Im Ganzen bereitet.

A. Am. Ams. An. Br. D. Du. Ed. Ful. Gal. Gen. Hass. His. Lon. LonN. Lus. Pal. Sar. Suec. Wir. Wür. *Br. C. Fi. Pid. Sp. Sw. T. Vm.*)

℞. Cerussae . . . . quantum vis.
Aceti destillati pondus decuplum.

Digere in vase vitreo, donec acidum sit saturatum; decantha et filtra liquorem, quem crystallisationi subjice; crystalli siccentur. (Am. Ams. Du. Ed. Gen. Hass. Lon. Lus. Wür. *C. Pid. Vm.*)

Modus procedendi fere in omnibus pharmacopoeis idem indicatur, exceptis differentiis inter proportionem plumbi et acidi, parvi momenti; sed Pal. Oxydum Plumbi obtentum calcinatione metalli ignis aperti ope; — A. D. et Fer. Minium jubent; — His. et *Vm.* Cerussam vel Lithargyrum; — Ful. *Sp.* et *Sw.* Cerussam vel Minium; — Wir. et *Fi.* Lithargyrum vel Minium; — Br. Gal. et *T.* Lithargyrum sumere praescribunt.

An. Sax. et *Br.* Subacetatem lente evaporare et deinde in loco frigido crystallisationi subjicere jubent; — LonN. *Plumbi Acetas:* Acidi acetici fortioris octarium unum cum Aquae destillatae ferventis sesquioctario miscere et paulatim addendo Plumbi Subcarbonatis libram unam coquere jubet, donec acidum saturetur, tunc per chartam colare, Aquam ad pelliculae apparitionem consumere et seponere ut crystalli fiant, quae super charta bibula exsiccentur.

Der Bleizucker wird als adstringirend, austrocknend und zertheilend oder zurücktreibend betrachtet und sehr häufig äußerlich zur Zertheilung oder Auflösung mancher phlegmonöser und erysipelatöser Entzündungen angewendet. Man giebt ihn auch innerlich, um colliquative Schweiße Schwindsüchtiger zu mäßigen, Diarrhöen zu hemmen, endlich auch bei sogenannten passiven Hämorrhagien und in verschiedenen Fällen von chronischem Catarrh.

Kalkwasser, Alkalien und ihre kohlensäuerlichen Verbindungen, Schwefel- und Salzsäure, alkalische Seifen, Alaun, schwefelsaures Eisen, Kupfer und Zink, Borax, Schleimharz und die meisten thierischen Substanzen zersetzen ihn und können daher nicht damit verbunden werden.

A. Präparate, in welchen das Salz im festen Zustande enthalten ist.

Pulvis temperans. (*Pie.*)

℞. Acetatis Plumbi drachmam unam.
Nitri . . . . . unciam unam.

Fiat pulvis. — Gabe von zwei Scrupeln bis zu einer Drachme in Auflösung in einem Glase Brunnenwasser, zwei oder drei Mal in der Woche.

Wir. hoc praeparatum sub nomine; *Nitrum saturninum* sequenti modo indicat;

℞. Nitri crudi . . . uncias tres.
Acetatis Plumbi . uncias duas.

Dissolve in Aquae Rosarum sufficiente quantitate, tunc vaporando ad pultem spissam redige et denique blandi caloris ope penitus exsicca. — Dieser Bleisalpeter wurde ehedem äußerlich zu Augen-, Gurgelwassern und Einspritzungen in die Harnröhre angewendet.

Pulvis ad phthisin s. antiphthisicus. (*Bo.*)

℞. Acetatis Plumbi,
Opii, singulorum grana sex.
Sacchari . . scrupulum unum.
Misce exacte et in doses duodecim divide. — Gabe, ein Stück Morgens und Abends bei colliquativen Schweißen und Diarrhöen Schwindsüchtiger.

Pulvis stypticus. (*Ca.*)

℞. Dissolutionis Ferri muriatici saturatae . . . uncias quatuor.
Evaporatae ad siccum adde
Acetatis Plumbi pondus aequale.
Evaporationem leni calore ad siccum usque continua; residuum pulvera et cribra. — Aeußerlich und innerlich bei Blutflüssen. — Gabe, innerlich, vier bis zwölf Gran.

Pulvis antipsoricus. (*Ra.*)

℞. Acetatis Plumbi,
Florum Sulphuris,
singulorum partes duas.
Zinci sulphurici . partem unam.
Man verdünnt, nach Chaussier, eine starke Prise mit einigen Tropfen Oel und reibt es in die Handflächen ein.

Pulvis escharoticus. (*Pie.*)

℞. Acetatis Plumbi,
Cerussae,
Aluminis,
singulorum drachmam unam.
Soll die Vernarbung atonischer Geschwüre befördern.

Pilulae Acetatis Plumbi. (*Pie. Ra.*)

℞. Acetatis Plumbi,
Pulveris Althaeae,
singulorum drachmam unam.
Syrupi Sacchari quantum sufficit ut fiant pilulae triginta sex. — Gabe, vier bis zwölf Stück täglich, zur Mäßigung der Schweiße Schwindsüchtiger. Gewöhnlich sind acht bis zehen hinreichend. Man läßt sie zu der Zeit nehmen, wo der Schweiß beginnt.

Pilulae antiphlogisticae. (*Pie.*)

℞. Acetatis Plumbi . . grana sex.
Camphorae,
Nitri, singulorum . grana tria.
Conservae Rosarum
quantum sufficit
ut fiant pilulae sex. — Den Tag über gegen übermäßige Schweiße Schwindsüchtiger und manche Brustentzündungen.

Pilulae stypticae. (*E. Ra.*)

℞. Acetatis Plumbi grana quatuor.
Opii purificati . granum unum.
Extracti Liquiritiae
scrupulum unum.
Fiant pilulae sedecim. — Duméril wendet sie gegen chronische colliquative Diarrhoe zur Verminderung der Stuhlausleerungen an. (*Ra.*)

℞. Acetatis Plumbi . grana duodecim.
Opii . . . . . grana sex.
Conservae Rosarum
quantum sufficit
ut fiant pilulae duodecim. — Bei Blutspeien und andern Blutflüssen von Nutzen. (*E.*)

Pilulae Acetatis Plumbi et Ipecacuanhae. (B*.)

℞. Acetatis Plumbi,
Ipecacuanhae,
singulorum drachmam unam.
Opii . . . . . grana decem.
Syrupi Sacchari quantum sufficit ut fiant pilulae quadraginta. — Thacher empfiehlt sie bei sogenannten passiven Mutterblutflüssen. — Gabe, ein Stück alle drei Stunden.

B. Präparate, in denen der Bleizucker mit fetten Körpern verbunden ist

Ceratum saturninum s. Saturni s. Goulardi. (Gen.)

℞. Acetatis Plumbi . . semunciam.
Cerati Galeni uncias duodecim.
Misce triturando.

Oleum s. Balsamum Saturni s. Goulardi. (Hass. *Ca. Pid. Pie, Vm.*)

℞. Olei Terebinthinae quantum vis.
Calefac in vase vitreo et per partiunculas adde
Acetatis Plumbi pulverati
quantum sufficit
agitando continue, donec nihil amplius dissolvatur; sepone deinde et liquorem adhuc calidum decantha (*Vm.*)
Hass. *Ca. Pid.* et *Pie.* Acetatis sicci unciis quatuor infundere jubent Essentiae Terebinthinae uncias octo et in digestione relinquere in arena per horas viginti quatuor.
Reizend, gegen fressende und schmerzhafte Geschwüre, gegen Brand, jedoch mit Vorsicht anzuwenden.

Unguentum s. Pomatum antiherpeticum. (*Pie.*)

℞. Trochiscorum alborum Rhazis
semunciam.
Acetatis Plumbi,
Mercurii dulcis,
singulorum drachmam unam.
Axungiae Porci quantum sufficit ut fiat unguentum.

Unguentum s. Pomatum saturninum. (*Bo.*)

℞. Acetatis Plumbi . unciam unam.
Aceti destillati . . uncias octo.
Dissolve, ad siccum evapora, pulvera et commisce cum
Axungiae Porci . unciis duabus.
Extracti Cicutae drachmis duabus.
Nach Barthez ſchmelzend und auflöſend.

Pomatum s. Unguentum antihaemorrhoidale. (*Pie.*)

℞. Pomati Limacum unciam unam.
Cerussae,
Laudani liquidi,
singulorum semidrachmam.
Acetatis Plumbi drachmas duas.
Pulveris Radicis Althaeae
quantum sufficit.

Pomatum s. Unguentum resolvens. (*Bo. Pie. Sm.*)

℞. Acetatis Plumbi drachmas tres.
Camphorae . . drachmas duas.
Cerae albae . . unciam unam.
Olei Olivarum . uncias quatuor.
Barthez empfahl ſie bei ſcorbutiſchen Geſchwüren.

Ceratum Acetatis Plumbi. (D. Lon. LonN. *C. Sw.*)

℞. Cerae albae . . . uncias duas.
Olei Olivarum . semioctarium.
Acetatis Plumbi pulverati
drachmas duas.
Liqua ceram in septem unciis olei, adde sensim sal cum reliquo oleo tritum et triturando misce. (Lon. LonN. *C.*)
D. Salis sesquiunciam, Olei duodecim et Cerae tres; — *Sw.* Salis drachmam unam, Olei uncias octo et Cerae sesquiunciam.

Unguentum antihaemorrhoidale. (*Bo.*)

℞. Acetatis Plumbi grana quindecim.
Suberis usti pulverati semunciam.
Butyri recentis . . uncias duas.
Misce triturando.

Unguentum oculare s. ophthalmicum. (*Sp.*)

℞. Acetatis Plumbi scrupulum unum.
Unguenti albi drachmas quinque
Balsami Commendatoris
scrupulos duos.
Commisce bene.

Ceratum saponaceum s. Pottii. (*Ca. Sw. Vm.*)

℞. Acetatis Plumbi pulverati
partes quatuor.
Saponis albi rasi
partem unam cum dimidia.
Misce intime in mortario marmoreo in balneo aquae calefacto; aquâ evaporatâ adde
Cerae albae . . . partes tres, antea liquatas cum
Olei Olivarum . partibus tribus.
Misce bene triturando. (*Vm.*)

℞. Lithargyri . . . libram unam.
Aceti . . . . . libras octo.
Saponis . . . . . semilibram.
Coque blando igne ad humidi consumptionem usque et adde
Olei Olivarum,
Cerae flavae,
singulorum libram unam.
Conterendo misce. (*Ca. Sw.*)
Austrocknend, zum Verbinden von Geſchwüren angewendet und hinſichtlich der Wirkung von der Bleiweißſalbe nicht verſchieden.

Sparadrap resolvens. (*Pie.*)

℞. Cerae virgineae . uncias octo.
Olei Olivarum . . libram unam.
Liquatis adde
Camphorae,
Salis Ammoniaci,
singulorum drachmam unam.
Acetatis Plumbi . unciam unam.
Fascias linteas in mixturam immerge.

Unguentum sedans. (*Pie.*)

℞. Sagapeni,
Gummi Ammoniaci,
singulorum drachmas sex.
Terebinthinae,
Resinae Pini,
singularum uncias octo.
Aquae Vitae . . quantum sufficit.
Solutioni adde
Acetatis Plumbi,
Cerussae, singulorum sesquiunciam.
Olibani . . . . drachmas decem.
Euphorbii . . . drachmas tres.
Axungiae Porci . libram unam.
Olei Liliorum,
— Lavandulae,
Cerae albae,
singulorum quantum sufficit.
Reizend, ehedem für auflöſend gehalten, heutzutage nicht mehr gebräuchlich.

Emplastrum resolvens. (*Bo. Pie.*)

℞. Acetatis Plumbi drachmam unam.
Florum Sulphuris . . semunciam.
Picis albae . . . . uncias duas.
Auf veneriſche Leiſtenbeulen anzuwenden. — Man erneuert es alle zwei Tage.

C. Präparate, in denen Flüſſigkeiten das Excipiens des Bleizuckers bilden.

Acetas Plumbi solutus s. liquidus, Aqua cum Saccharo Saturni s. saturnina, Solutio Acetatis Plumbi aquosa, Liquor Plumbi acetici. (A. Ba. BorC. DD. Ham. Li. *Ra.*)

℞. Acetatis Plumbi . partem unam.
Aquae destillatae . partes sex
Solutionem filtra. (A.) — A. nennt dieſe Formel ſehr unpaſſend *Acetum Lithargyri;* — BorC. *Extractum Saturni:* dissolutio partis unius Salis in Aquae tribus; — DD. *Aqua saturnina:* solutio partis unius Salis in Aquae nonaginta sex.

Ba. Salis partem unam et novem Aquae; — Ham. et Li. Salis unam et Aquae quadraginta octo.

Ra. Injectio resolvens: Salis partem unam, Aquae viginti quatuor ad quadraginta octo.

Bor. *Liquorem Plumbi acetici* indicans parationem ejus non indicat; ut reagens.

Solutio Acetatis Plumbi aquosa opiata. (*Au.*)

℞. Acetatis Plumbi . . grana duo.
Tincturae Opii . semidrachmam.
Aquae . . . . . uncias sex.
Gabe, alle drei Stunden ein Löffel gegen übermäßige Schweiße Schwindſüchtiger.

Tinctura saturnino martialis s. adstringens. (*Au.*,

℞. Acetatis Plumbi . unciam unam.
Sulphatis Ferri . . semunciam.
Alcoholis . . . . uncias octo.
Gabe, zehen Tropfen für Kinder, zwanzig für Erwachſene, bei Blutflüſſen, beſonders aus der Naſe.

Aqua ophthalmica. (B*. GalM. *T.*)

℞. Acetatis Plumbi grana quindecim.
Aquae Rosarum . . uncias sex
GalM. collyrium fere simile indicat.

℞. Acetatis Plumbi . drachmas sex.
Zinci sulphurici . semiscrupulum.
Aquae Rosarum . . uncias sex.
Bei hartnäckigen Augenentzündungen einige Tropfen in's Auge zu tröpfeln. (*T.*)

Lotio antiseptica. (*Pie.*)

℞. Acetatis Plumbi drachmam unam.
Aquae Plantaginis . uncias duas.

Collyrium resolvens. (Gen. Li. *Au. Pie. Ra.*)

℞. Acetatis Plumbi semiscrupulum.
Aquae . . . . . uncias duas.
Dissolve. (Gen.)

℞. Acetatis Plumbi . . grana sex.
Infusi Florum Sambuci uncias quatuor.
Solutioni adde
Alcoholis vulnerarii drachmas duas.
Misce bene. (*Ra.*)

℞. Acetatis Plumbi in Aqua dissoluti partes tres.
Mucilaginis Cydoniorum partem unam.
Misce. (Li.)

℞. Acetatis Plumbi semidrachmam.
Aquae Plantaginis,
— Rosarum,
singularum uncias duas.
Misce. (*Pie*)

℞. Acetatis Plumbi . . grana tria.
Opii . . . . . grana quatuor.
Seminum Cydoniorum grana sex.
Aquae Rosarum uncias duas vel tres.
Misce. (An.)

℞. Acetatis Plumbi . grana decem.
Aluminis . . drachmam unam.
Aquae Rosarum uncias quatuor.
Misce. (*Au.*)

℞. Acetatis Plumbi . . grana tria.
Seminum Cydoniorum grana sex.
Aquae Rosarum,
— Foeniculi,
singulorum uncias duas.
Laudani liquidi Sydenhami sesquidrachmam.
Misce. (*Au.*)

Julep s. Julapium leniens. (*Pie*)

℞. Acetatis Plumbi . grana octo.
Aquae Buglossi,
— Nymphaeae,
singularum uncias tres.
Syrupi Papaveris albi unciam unam.

Gargarisma sedans. (*Pie.*)

℞. Acetatis Plumbi grana sexaginta.
Opii gummosi . . . grana sex.
Aquae Rosarum . . uncias octo.
Syrupi Mororum unciam unam.

Collutorium Catechu saturninum s. adstringens. (*Au.*)

℞. Catechu . . . drachmas tres.
Aquae Calcis . uncias duodecim.
Acetatis Plumbi scrupulum unum.
Mellis rosati . . . uncias duas.

Fomentum saturninum, Fomentatio resolvens. (*Au.*)

℞. Acetatis Plumbi drachmas duas.
Aceti . . . . . uncias tres.
Aquae . uncias viginti quatuor.
Von Girtanner gegen Phimoſis empfohlen.

Gargarisma saturninum s. adstringens. (*Au.*)

℞. Herbae Salviae . . semunciam.
Aquae . . . quantum sufficit

ut decocti unciae quatuor obtineantur, quarum colaturae adde
Aluminis . . drachmam unam.
Aquae saturninae . uncias duas.
Bei Mercurialſpeichelfluß empfohlen.

Injectio adstringens. (*Au.*)

℞. Acetatis Plumbi . . grana duo.
Aquae . . . . unciam unam.
Bei beginnendem Tripper empfohlen.

℞. Acetatis Plumbi drachmam unam.
Essentiae Terebinthinae
uncias quinque.
Solutioni Camphorae pauxillum addatur. — Von Hoffmann ein remedium divinum gegen chroniſchen Tripper genannt.

℞. Acetatis Plumbi drachmam unam.
Aquae . . . . uncias sex.
Liquoris Myrrhae . uncias duas.
Tincturae Opii . unciam unam.
Bei chroniſcher Gonorrhöe.

Potio ad tussim convulsivam. (*Ca.*)

℞. Acetatis Plumbi
grana duo ad quatuor.
Aquae Rosarum . uncias duas.
Syrupi Violarum drachmas duas.
Von Robert Thomas alle vier Stunden zu einem Kaffeelöffel voll empfohlen.

Injectio saturnina myrrhata s. cum Myrrha. (B*.)

℞. Acetatis Plumbi drachmam unam.
Aquae destillatae . uncias sex.
Solutioni adde
Tincturae Myrrhae aquosae
uncias duas.
— thebaicae unciam unam.
Frank rühmte ſie bei chroniſchem Mutterblutfluß. — Hierher gehört auch die *Aqua vulneraria Plenkii* (*Bo.*), wozu die Formel folgende iſt:

℞. Aquae Calcis . . libram unam.
Fuliginis ardentis fornacis
unciam unam.
Cerussae . . . . semunciam.
Coque per semihoram et adde deinde
Olei Myrrhae . . semunciam.
Wahrſcheinlich bildet ſich bei dieſer Operation etwas brenzlich-eſſigſaurer Kalk und etwas brenzlich eſſigſaures Blei.

Decoctum ad fungos articulorum s. ad lupias synoviales Heisteri. (Br. *Sp.*)

℞. Lithargyri . . . . uncias sex.
Boli Armenae . unciam unam.
Mastichis,
Myrrhae, singulorum semunciam.
Aceti . . . . libras duas.
Coque leni igne per horam dimidiam. — In Bähung angewendet.

Aqua vegeto-mineralis Bellii. (B*.)

℞. Acetatis Plumbi . semunciam.
Aceti boni . . . uncias quatuor.
Aquae destillatae . . libras duas.

Injectio adstringens. (*Sa.*)

℞. Acetatis Plumbi semidrachmam.
Aceti destillati . . libram unam.
Aquae Rosarum . sesquilibram.
Bei Mutterblutflüſſen.

Fomentatio leniens s. sedans. (*Pie.*)

℞. Acetatis Plumbi,
Camphorae,
singulorum uncias duas.
Oxycrati . . . . uncias sex.
Aquae frigidissimae
quantum sufficit.

Injectio aluminosa composita. (*Sy.*)

℞. Acetatis Plumbi drachmam unam.
Aluminis . . . semidrachmam.
Sulphatis Zinci grana octodecim.
Aquae destillatae uncias sedecim.
Ein ſchlechtes Präparat, welches man gegen Tripper empfohlen hat.

Collyrium tenuianum. (*Pie.*)

℞. Aceti Plumbi . grana quindecim.
Salis Ammoniaci . grana tria.
Aquae Rosarum . uncias tres.

Aqua vulneraria camphorata. (Ham. Wür. *Pie. Sp.*)

℞. Acetatis Plumbi drachmas duas.
— destillatae libram unam.
Alcoholis camphorati uncias duas.
Serva. (Ham.)

℞. Acetatis Plumbi semidrachmam.
Camphorae in uncia una Alcoholis dissolutae . . uncias tres.
Adde sensim, vas agitando,
Aquae fontanae libras quatuor.
Serva. (Wür. Pie. *Sp.*)

Lac virginale. (*Pie.*)

℞. Lithargyri . . unciam unam.
Cerussae . . . drachmas tres.
Camphorae . . scrupulos duos.
Dissolve in
Aceti albi . . . unciis duabus.
Solutioni adde
Aquae Solani,
— Lactucae,
— Nymphaeae,
singularum uncias tres.
Post aliquot dies sepositionis filtra.
Zum Waſchen des Geſichts, drei oder vier Mal täglich.

Opiatum leniens s. sedans. (*Pie.*)

℞. Acetatis Plumbi semidrachmam.
Nitri . . . . . drachmas sex.

Conservae Cynorrhodi uncias duas.
Syrupi Capilli Veneris
quantum sufficit.

Gegen Geilheit bei beiden Geschlechtern gepriesen. — Gabe, eine halbe Drachme Morgens und Abends. Man kann auch Laudanum und Campher hinzusetzen.

Tinctura antiphthisica Gramanni. (B*. Wir.)

℞. Acetatis Plumbi . . semunciam.
Sulphatis Ferri drachmam unam.
Aceti,
Alcoholis, singulorum uncias duas.
Aquae Rosarum . drachmas sex.

Dissolve acetatem in aceto blandi ignis ope; adde sulphatem pulveratum et post solutionem liquori affunde alcohol cum Aqua Rosarum mixtum; stent blando calori sepositа.

Von Gramann, Wedel, Vogel und Andern gegen die colliquativen Schweiße und Diarrhöen Schwindsüchtiger, auch gegen Tripper und nächtliche Pollutionen empfohlen. — Gabe, zwanzig bis dreißig Tropfen. — Mit Recht bemerkt Wir.: „caute tamen ubique, vel nunquam adhibendum esse, censemus.“

Protogallas Plumbi.

Nie wird dieses Salz eigens bereitet, sondern es bildet, wenigstens sehr wahrscheinlich, die Basis folgender beiden Präparate.

Magma scytodepsicum ex Quercu, Linimentum saturnino-quercicum. (B*. Au.)

℞. Corticis Quercus pulverati
unciam unam.
Aquae fontanae . . uncias sex.

Decoque ad dimidii remanentiam; in colaturam instilla
Extracti Saturni circiter
semunciam.

Filtra liquorem et praecipitatum absque siccando sub alcohole serva. — Autenrieth rühmte diese Substanz bei'm Aufliegen.

Lotio Quercus saturnina s. adstringens. (Au.)

℞. Decocti Corticis Quercus,
Aquae saturninae,
singulorum uncias sex.
Albumina Ovorum . . . no. 2.
Liquoris Myrrhae . uncias duas.

Bei Excoriationen, welche den Brand drohen.

Proto-Oleo-Margaras Plumbi.

Dieser Name, unter welchem wir alle Pflaster vereinigen, in welchen eine innige Verbindung zwischen dem Protoxyd des Blei's und den sauren Producten, welche durch die Einwirkung der Grundbestandtheile fetter Körper mittelst der Wärme auf einander hervorgehen, stattfindet, ist nicht ganz genau. Denn in der That enthalten die meisten Pflaster, außer ölsaurem und fettsaurem noch stearsaures, einige capersaures, vielleicht auch buttersaures und einige endlich, schwefel- und essigsaures Blei. Doch schien er uns wegen seiner Kürze und weil doch jene beiden Salze am häufigsten vorhanden sind, passend zu seyn.

Man bereitet die Bleipflaster bald mit Bleiglätte, bald mit Mennige und bald mit Bleiweiß, weßhalb wir sie unter drei verschiedene Abtheilungen gebracht haben; zu irgend einer von ihnen haben wir auch diejenigen gesetzt, welche zwei und selbst drei dieser Bleizusammensetzungen enthalten. Zweckmäßig scheint es uns zu erinnern, daß, nach Hagen, ein Theil Bleiweiß einen Theil, ein Theil Mennige anderthalb und ein Theil Bleiglätte zwei Theile Oel zu seiner Auflösung erfordert. Die Untersuchungen Henry's haben gelehrt, daß 1) in Bezug auf fette Körper die von Natur schleimigen Oele oder die welche es erst geworden sind, sehr schlüpfrige Pflaster geben; daß das Olivenöl vor allen den Vorzug verdient und daß das Schweinefett sich in dieser Hinsicht nur wenig von ihm unterscheidet; 2) in Bezug auf die Oxyde, daß die Mennige sich nur langsam und schlecht verbindet; daß das gelbe Bleioxyd nur eine lockere Masse liefert; daß die Bleiglätte vor allen am meisten zu der Verfertigung von Pflastern paßt und daß endlich die Englische der Hamburger vorzuziehen ist.

§. III. Präparate mit dem Protoxyde des Blei's (Bleiglätte).

Emplastrum commune s. diachylum s. Lithargyri s. Lithargyrii simplex s. Oxydi Plumbi semivitrei s. Oxydi plumbici s. Plumbi, Emplastrum simplex, Ceratum Oxydi Plumbi semivitreum, Emplastrum Protoxydi Plumbi fusi.

1) *Emplastrum diachylum simplex s. Oxydi Plumbi mucilaginosum.* (Br. His. Li. Pal. Sar. Wir. Würz. *Sp.*)

℞. Mucilaginis Foenu graeci,
— Seminum Lini,
— Radicis Althaeae,
singulorum libram unam.
Olei Olivarum . . . libras tres.
Lithargyri pulverati libras duas.

Coque oleum et oxydum super leni igne, addendo subinde Aquae fontanae

unciam unam ad duas et agita continue; tunc immissis mucilaginibus, coquere continua blando igne, donec massa consistentiam requisitam habeat. (Br. Sar. Wir. Würt. *Sp.*)

Pal. eandem formulam, sed Lithargyri solum sesquilibram indicat.

℞. Radicis Althaeae,
Seminum Lini,
singulorum semilibram.
Aquae . . . . . libras octo.

Infunde et tunc coque ad extrahendum mucilaginem et cola exprimendo; deinde

℞. Hujus mucilaginis . libras tres.
Lithargyri pulverati libras duas.
Olei Olivarum . libras quatuor.

Coque oleum una cum lithargyro, mucilaginem pedetentim addendo, ad emplastri consistentiam. (His.)

℞. Emplastri albi cocti,
— emollientis,
singulorum libras duas.

Liqua blandissimo igne et sedulo misce. (Li.)

Dieſes Pflaſter iſt ganz in Vergeſſenheit gekommen; man hat den Namen deſſelben aber vermöge eines ſehr gewöhnlichen Mißbrauchs dem folgenden beigelegt, obgleich es, was doch ſowohl das griechiſche als das lateiniſche Beiwort bezeichnet, kein Atom Schleim enthält.

2) *Emplastrum simplex s. Diachylon simplex s. Lithargyri simplex s. commune.* (A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. Sax. Suec. *Br. C. Ca. Fi. Sw. T. Vm.*)

℞. Lithargyri pulverati,
Olei Olivarum,
Axungiae Porci,
singulorum partem unam.

Calefac sensim, spatulae ope agitando; aquâ massae infusâ coque, continue agitando et pro aqua evaporata novam addendo, donec nullum lithargyri amplius vestigium animadvertatur; tunc ab igne remotum malaxa in Aqua frigida. (Gal. GalM. *Ca.*)

Ams. et B. Axungiae partes duas, Olei et Lithargyri, singulorum tres.

℞. Lithargyri . . . partem unam.
Olei Olivarum . . partes duas.

Fac ut antea. (A. Am. An. Bel. D. DD. Du. Ed. Fer. R. *Br. C. Vm.*)

Sw. Lithargyri partem unam et quatuor Olei; — Hass. HassP. Lithargyri quatuor et septem Olei; — Gen. Lithargyri quatuor et Olei duas cum dimidia; — *Vm.* Lithargyri duas et tres Olei; — Lon. LonN. et Lus. Lithargyri quinque et octo Olei (Aquae octarios duos, qui si coquendo sint consumpti, Aquae fervidae pauxillum est adjiciendum LonN.); — Fenn. Lithargyri quatuor et Olei tres; — Ba. Bor Bor4. Du. Han. O. Sax. et Suec. Lithargyri quinque et novem Olei; — T. Olei quatuor, Aquae duas et Lithargyri tantidem; — *Fi.* Olei duas, Lithargyri et Aquae singulorum unam.

℞. Lithargyri . . . . partes sex.
Axungiae . . partes quindecim.

Eodem modo procede ut antea. (Pol. *Vm.*)

Dieſes Pflaſter, welches in der chirurgiſchen Praxis ſehr in Gebrauch iſt, dient beſonders, um Wunden und Geſchwüre, deren Oberfläche nicht der Sitz einer zu heftigen Entzündung iſt, gegen die äußere Luft zu ſchützen. Auch kommt es zu vielen andern Salben.

Cereoli exploratorii, Candelae cereae s. saturninae, Specilla cerea. (Li.)

℞. Emplastri simplicis uncias quatuor.
Liquato blando igne adde
Cerae . . . . sesquiunciam.
Olei Olivarum . . uncias tres.

In miscellam immerge fascias linteas apte concisas, quas in cereolos forma. (Li. *Vm.*)

℞. Terebinthinae coctae partem unam.
Cerae albae . . . partes octo.
Emplastri simplicis partes quatuor.

Fiant cereoli. (*Vm.*)

Ceratum saturninum. (*Vm.*)

℞. Emplastri simplicis . partes sex.
Cerae albae . partem dimidiam.

Liquata seorsim misce et adde
Olei Olivarum
partes duas cum dimidia.

Emplastrum anodynum s. Sebi anodynum. (His.)

℞. Emplastri simplicis libram unam.
Cerae albae . . . . uncias sex.
Axungiae Porci . uncias quatuor.
Sebi hircini . . . uncias duas.

Liqua simul. — Addendo Olei Olivarum uncias quatuor, habes *Ceratum onodynum.*

Emplastrum epuloticum s. Oxydi Plumbi epuloticum. (His.)

℞. Lithargyri,
Olei Olivarum,
Axungiae Porci,
singulorum libras tres.

Coque cum Aquae sufficiente quantitate, continue agitando, donec massa non amplius digitis adhaereat; adde deinde

Cerae albae . . uncias novem.
Resinae Pini . . . uncias sex.

Coctionem ad emplastri consistentiam continua. — Dieſes Pflaſter unterſcheidet ſich kaum von dem einfachen. Mit

Unrecht giebt ihm His. den Namen *empl. diapalmae.*

Tela emplastica epulotica, Sparadrapus pallidus s. epuloticus. (His.)

℞. Emplastri epulotici . libras duas.
Cerae flavae . . . semilibram.
Liqua et massam supra fascias linteas extende.

Unguentum ad haemorrhoides s. antihaemorrhoidale s. ad varices ani. (Sar.)

℞. Radicis Scrophulariae recentis uncias tres.
Foliorum Hyoscyami albi manipulos tres.
Butyri recentis . . sesquilibram.
Lithargyri . . . uncias duas.
Vitellos Ovorum . . . . no. 2.
Coque lente radicem et folia in butyro ad humidi consumptionem, cola exprimendo, adde lithargyrum, agita bene ad perfectam refrigerationem usque et admisce denique vitellos.

Emplastrum roborans s. adstringens. (*C. Sw.*)

℞. Emplastri simplicis . libras duas.
Liquatis adde
Pulveris Sanguinis Draconis uncias tres.
— Olibani . . semilibram.
Misce bene.

Ceratum fuscum, Unguentum fuscum s. Oxydi Plumbi fuscum s. Oxyduli Plumbi semivitrei adustum s. Acetatis Plumbi carbonatum s. matris s. matris Theclae, Emplastrum fuscum s. fuscum Protoxydi Plumbi fusi. (A. An. B*. Ba. Bel. Br. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. His. Li. Sax. Wir. Wür. *Br. Sp. Sw. Vm.*)

℞. Olei Olivarum partes quingentas.
Axungiae Porci,
Butyri recentis,
Sebi vervecini, singulorum partes ducentas quinquaginta.
Liqua et adde sensim
Lithargyri partes ducentas quinquaginta.
Coque donec massa colorem nigrescenti-fuscum acceperit; adde deinde mixturam fusam e
Cerae flavae partibus centum nonaginta.
Picis nigrae partibus octoginta.
Effunde in modulos chartaceos. (B*. Gal.)

GalM. butyrum omittit, duplicem Axungiae quantitatem adhibendo.

℞. Axungiae Porci,
Butyri recentis,
Sebi vervecini,
singulorum partem unam.
Coque et adde
Lithargyri . . . partem unam.
Coque, continue agitando, donec massa fusca sit reddita; adde deinde
Cerae flavae . . partem unam.
Post refrigerationem serva. (B*. Br. Sax. *Sp.*)

℞. Axungiae Porci,
Olei Olivarum,
singulorum libras duas.
Butyri recentis,
Cerae flavae,
singulorum libram unam.
Mixta calefac, donec in carbonem verti coeperint et adde
Lithargyri pulverati libram unam, spathulae ligneae ope continue agitando, donec massa colorem nigrescenti-fuscum acceperit. (Am. Bel.)

℞. Axungiae Porci,
Butyri recentis,
Cerae flavae,
Sebi vervecini,
singulorum uncias quatuor.
Olei Olivarum . semidrachmam.
Liqua corpora grassa supra lenem ignem, adde lithargyrum, et coque continue agitando, donec emplastrum nigrum sit redditum (Wür. *Sw. Vm.*).

Wir. Axungiae uncias quatuor, Butyri, Sebi vervecini, Cerae, singulorum tantidem, Olei libram unam et Lithargyri uncias quatuor; — Gen. et His. Olei libram unam, Axungiae, Butyri, Cerae, Sebi hircini et Lithargyri, singulorum semilibram; — *Br.* Olei uncias quindecim, Axungiae, Butyri, Cerae, Sebi vervecini et Lithargyri, singulorum semilibram; — Li. Olei uncias sex, Axungiae, Butyri, Cerae, Sebi cervini et Lithargyri, singulorum uncias sex.

℞. Axungiae Porci
uncias quatuordecim.
Sebi vervecini,
Cerae flavae,
Lithargyri pulverati,
singulorum uncias quatuor.
Coque, donec mixtura colorem fuscum acceperit. (A.)

℞. Axungiae Porci,
Olei Olivarum,
singulorum uncias sex.
Cerae flavae . . . uncias duas.
Massae liquatae et bullienti sensim adde
Lithargyri pulverati . uncias duas.
Coque, donec unguentum nigrum sit factum. (Ful.)

℞. Emplastri Diachyli simplicis,

Axungiae Porci,
singulorum partes tres.
Cerae flavae . . partem unam.
Liqua, iguem ad nigrescentiam massae augendo. (*Vm.*)
℞. Emplastri Diachyli simplicis
partes quatuordecim.
Coque, continue agitando, donec colorem fuscum acceperit; adde deinde
Picis nigrae . partem dimidiam.
Sebi vervecini . partem unam.
Serva. (Ba.)
℞. Emplastri Norimbergensis
partes octo.
Olei Olivarum partes quinque.
Calefac, donec mixtura colorem fuscum acceperit. (Han.)
Dieſe Salbe gilt für erweichend und zeitigend.

Emplastrum Hjerneri s. saponaceo-plumbicum. (Suec.)
℞. Saponis Potassae duri et rasi
partes decem.
Olei Olivarum
partes quadraginta quinque.
Liqua saponem in oleo et adde
Pulveris Lithargyri
partes octodecim.
— Cerussae . partes novem.
Coque, donec massa colorem fuscum acceperit; adde
Terebinthinae communis
partem unam cum dimidia.

Emplastrum diapalmae s. diaphoenicon. (Br. Pal. Sar. Wir. *Pid. Sp. T. Vm.*)
℞. Olei Palmae . . . partes sex.
— Olivarum partes sexaginta sex.
Foliorum tenerorum Quercûs
partes octo.
Coque ad humidi consumptionem usque, cola exprimendo et colaturae adde
Lithargyri pulverati
partes quadraginta octo.
Coque ad consistentiam emplastri sensim addendo solutioni aquosae
Vitrioli albi . . . partes quatuor.
Serva. (*Sp.*)
Br. Sar. et Wir. Axungiae Porci, Olei Olivarum, Foliorum Quercûs, Lithargyri, singulorum partes octo et unam Vitrioli albi in duodecim Aquae dissoluti; — . Pal. Axungiae vetustae partes sex, Olei Palmae novem vel Olivarum quantum vis, Lithargyri tantidem et Vitrioli albi in Aqua dissoluti unam.
℞. Lithargyri . . . libras duas.
Axungiae . . . . . libras tres.
Coque, sensim addendo
Aquae, cujus unciae sedecim Aluminis drachmam unam in solutione tenent quantum sufficit. (*Pid.*)
℞. Olei Olivarum . partes novem.
Axungiae . . . . . partes sex.
Lithargyri . . . partes novem.
Zinci sulphurici . partem unam.
Fiat emplastrum. (*Vm.*)
Einfacher iſt folgende Formel von Soubeiran:
℞. Emplastri simplicis
partes ter mille.
Sulphatis Zinci
partes centum viginti octo.
Liquefac emplastrum, adde sulphatem in Aqua dissolutam et igni modico, continue agitando, relinque, donec omnis humor evanuerit.
℞. Emplastri simplicis . libras duas.
Axungiae Porci . . uncias sex.
Ferri sulphurici cum sufficiente quantitate Olei Olivarum in pultem redacti . . uncias duas.
Fiant magdaleones. (*T.*)
Ein in ſehr gelindem Grade abſtringirendes Pflaſter, welches Sar. et *Sp.* unrichtig *e. diachalciteos* nennen, da in letzterem ſtatt des weißen Vitriols rothcalcinirtes Schwefeleiſen oder Chalcit enthalten iſt.

Sparadrap, Sparadrapus s. Sparadrapum album, Tela Gualthieri. (GalM. Wir. *Sp.*)
℞. Emplastri diapalmae,
— simplicis,
singulorum libram unam.
— albi cocti semilibram.
Liquatis adde
Pulveris Iridis Florentinae
sesquiunciam.
Massam supra fascias linteas extende. (Wir. *Sp.*)
℞. Emplastri simplicis,
— Diachyli gummosi,
singulorum partes quindecim.
Cerae flavae . partes quinque.
Terebinthinae . . partes tres.
Liqua in balneo aquae, tunc supra linteum extende. (GalM.)

Emplastrum confortativum Vigonis s. defensivum rubrum s. Ferri s. Oxydi Plumbi rubrum s. Oxydi Plumbi semivitrei cum Sulphate Ferri calcinato s. Oxydi Ferri rubri s. stictícum s. roborans s. stypticum s. siliquarum. (B. Br. Du. Ed. Fer. GalH. His. Pal. Sar. Wir. *C. Fi. Sp. T. Vm.*)
℞ Pulveris Lithargyri,
— Minii,
— Calaminae,
singulorum semilibram.
Olei Lini,

Olei Olivarum,
singulorum libram unam.
Coque igne blandissimo, continue agitando et adde sensim Aquae libram unam in solutione tenentem
Vitrioli albi . . unciam unam.
Emplastro consistentiam requisitam obtento adde
Colophonii,
Cerae flavae,
singulorum libram unam.
Terebinthinae,
Olei Baccarum Lauri,
singulorum semilibram.
Gummi Ammoniaci,
Galbani,
Bdellii,
Myrrhae,
Aloës hepaticae,
Aristolochiae longae,
Sanguinis Draconis,
Haematitis,
singulorum unciam unam.
Misce bene. (Br. Pal. Wir.)

℞. Lithargyri,
Minii,
Olei Lini,
— Olivarum,
singulorum uncias duodecim.
Coque ad consistentiam emplastri, Aquam addendo in solutione tenentem
Vitrioli albi . . uncias quatuor.
Coctione finita adde
Colophonii,
Cerae, singulorum uncias viginti quatuor.
Terebinthinae . uncias duodecim.
Massa colatâ colaturae adde
Pulveris Gummi Ammoniaci,
— Galbani,
— Bdellii,
— Myrrhae,
— Aloës hepaticae,
— Mumiae,
— Radicis Aristolochiae longae,
— Sanguinis Draconis,
— Haematitis,
singulorum uncias duas.
Olei Baccarum Lauri
uncias duodecim.
Misce bene. (*Sp.*)

℞. Mucilaginis Radicis Consolidae majoris . . . . . libras sex.
Olei Juglandis . libras quatuor.
Minii,
Lithargyri,
singulorum libram unam.
Calaminae . . uncias quatuor.
Sanguinis Draconis,
Colcothar,
Aluminis, singulorum unciam unam.
Radicis Aristolochiae rotundae
sesquiunciam.
Coque minium, lithargyrum et calaminam cum oleo, mucilaginem sensim addendo et reliqua pulverata cum massa parumper refrigerata commisce. (Sar.)

℞. Mucilaginis Radicis Althaeae,
— — Consolidae majoris,
Olei Myrrhae,
singulorum libras duas.
Sebi hircini,
Lithargyri praeparati,
singulorum libram unam.
Minii . . . . . uncias sex.
Terebinthinae,
Mastichis,
Boli Armenae,
singulorum uncias quatuor.
Coque oxyda cum mucilaginibus, sebo et oleo; adde deinde terebinthinam, bolum et denique mastichem. (Sar.)

℞. Radicis et Foliorum Consolidae majoris,
Baccarum Myrti,
Petalorum Rosarum rubrarum,
Summitatum Hyperici,
singulorum uncias quatuor.
Aquae . . . . libras novem.
Coque ad tertiae partis usque consumptionem; tunc

℞. Olei Olivarum uncias quatuor.
Sebi hircini . . libram unam.
Lithargyri . . . . libras duas.
Coque ad consistentiam emplastri, sensim addendo decoctum praemonitum, tunc in massa liqua
Cerae flavae . . libram unam.
Terebinthinae . . . uncias tres.
Post sufficientem decoctionem emplastro semirefrigerato adde mixturam e
Pulveris Olibani,
— Myrrhae,
— Mastichis,
singulorum unciis duabus.
— Sanguinis Draconis
unciis tribus.
— Boli Armenae
unciis quatuor.
— Minii . . . unciis sex.
Misce bene. (His.)

℞. Resinae Pini,
Colophonii,
singulorum uncias quatuor.
Cerae flavae . . . uncias sex.
Massae liquatae et colatae adde
Extracti Siliquarum dulcium ad mellis consistentiam redacti
libram unam.
Emplastri Minii uncias quatuor.

Ferri subcarbonici porphyrisati
drachmas sex.
Misce bene. (His.)

℞. Lithargyri . uncias duodecim.
Olei Olivarum
uncias viginti quatuor.
Coque ad consistentiam emplastri, tunc in massa liqua
Cerae flavae,
Terebinthinae Venetae,
Olibani, singulorum uncias duas.
Liquat's adde
Colcothar . . . . uncias tres.
Misce bene. (*Sp.*)

℞. Cerae flavae,
Resinae Pini,
singularum partem unam.
Liquatis adde
Emplastri simplicis partes sedecim.
Momento quo refrigescunt adde
Terebinthinae . partem unam,
tritae calide cum
Colcothar loti
parte una cum dimidia.
Misce bene. (*Vm.*)

℞. Emplastri simplicis libras duas.
Resinae Pini . . . semilibram.
Cerae flavae,
Olei Olivarum,
singulorum uncias tres.
Colcothar . . . . uncias octo.
Oxydum cum oleo tritum adde reliquis leni igne liquefactis. (B.)

Ed. *C.* et *Fi.* Emplastri simplicis partes viginti quatuor, Resinae Pini sex, Cerae flavae tres, Olei tantidem et Oxydi Ferri octo; — *T.* Diachyli simplicis uncias sedecim, Olei Olivarum duas, Resinae Pini quatuor, Cerae flavae duas et Colcothar quinque et scrupulos octo.

℞. Emplastri simplicis,
— Diachyli gummosi,
Cerae flavae,
Olei Olivarum,
Colcothar,
singulorum partes aequales.
Oxydum cum olei pauxillo porphyrisa et reliquis substantiis fusis adde. (GalH.)

℞. Emplastri simplicis . libras duas.
Olibani . . . . . semilibram.
Liquatis adde
Oxydi Ferri rubri . uncias tres.
Agitando bene misce. (Du.)

℞. Emplastri simplicis . libras duas.
Sebi vervecini . uncias sedecim.
Liquatis adde
Colcothar . . . . uncias duas.
Misce sedulo. (Fer.)

Emplastrum imperiale s. Siliquarum imperiale. (His.)

℞. Emplastri Picis nigrae,
Emplastri Minii,
— Opodeldoc (formula His.),
singulorum uncias quatuor.
— Resinae sulphurati,
— defensivi rubri (formula His.), singulorum uncias duas.
Oxydi Ferri rubri . semunciam.
Acetatis Plumbi neutralis,
Camphorae pulveratae,
singulorum drachmas duas.
Liqua emplastra blando igne et massae antequam refrixerit, adde reliqua pulverata et mixta.

Dieſes Gemiſch unterſcheidet ſich hinſichtlich der Wirkung nur wenig von dem empl. defensiv. rubrum.

Emplastrum Collae ad herniam s. Opodeldoc s. resolvens Raistingii. (His. Wir. *Bo. Pie.*)

℞. Lithargyri . . . libras duas.
Olei Olivarum
libras duas cum dimidia.
Cerae flavae . . libram unam.
Terebinthinae de Chio,
Olei Baccarum Lauri,
singulorum uncias quatuor.
Opopanacis
uncias duas cum dimidia.
Bdellii,
Gummi Ammoniaci,
Sarcocollae,
Olibani,
Mastichis,
Myrrhae, singulorum uncias duas.
Aloës Socotrinae . unciam unam.
Radicis Aristolochiae uncias duas.
Camphorae . . . uncias tres.
Fiat emplastrum. (*Bo. Pie.*)

℞. Lithargyri . . . sesquilibram.
Olei Olivarum . . libras duas.
Coque leni igne, sensim addendo
Aceti,
Aquae fontanae,
singulorum uncias quatuor, donec massa colorem clare fuscum obtinuerit. Adde
Cerae flavae . . . semilibram.
Terebinthinae . uncias quatuor.
Post refrigerationem adde mixturam in Aceto dissolutam et ad mellis consistentiam redactam e
Gummi Ammoniaci,
Bdellii,
Galbani,
Opopanacis, singulorum uncia una.
Admisce deinde
Pulveris Aristolochiae rotundae,
— — longae,
— Calaminae,
— Olibani,
— Myrrhae,

Pulveris Mastichis,
singulorum unciam unam.
Olei Baccarum Lauri
sesquiunciam.
Agita ad perfectam usque refrigerationem. (Wir.)

℞. Baccarum Myrti contusarum,
Lumbricorum cum Vino otorum,
singulorum uncias sex.
Aquae . . . . . libras octo.
Decoque ad dimidii remanentiam; tunc

℞. Hujus decocti . . . libras tres.
Olei Olivarum . . libras duas.
Lithargyri . . . libram unam.
Coque ad consumptionem humidi usque et ad emplastri consistentiam; adde deinde mixturam liquatam et colatam e
Cerae flavae . . . . libra una.
Picis nigrae,
Resinae Pini,
Colophonii,
singulorum unciis novem.
Adde deinde mixturam in Aceto dissolutam et ad mellis consistentiam inspissatam e
Galbani,
Gummi Ammoniaci,
singulorum unciis quatuor.
Emplastro semirefrigerato admisce sensim mixturam e
Pulveris Myrrhae,
— Olibani,
— Mastichis,
— Sanguinis Hirci,
— Collae,
— Radicis Aristolochiae rotundae,
— — — longae,
— — Consolidae majoris,
— — — minoris,
— Gallarum,
— Boli Armenae,
— Gypsi,
— Mumiae,
singulorum unciis tribus.
Misce bene. (His.)

Dieſe unförmliche Miſchung, mit welcher einige der Formeln des empl. defens. rubrum Aehnlichkeit haben, wurde als ſchmelzend, auflöſend, die Vernarbung befördernd und abſtringirend betrachtet.

Unguentum Apostolorum s. dodecapharmacum s. viride. (Br. Pal. Wir. *Pie. Sp.*)

℞. Terebinthinae,
Resinae Pini,
Cerae flavae,
singularum uncias duas.
Aristolochiae longae,
Olibani,
Bdellii,
Myrrhae,
Galbani, singulorum semunciam.
Opopanacis,
Aeruginis,
singulorum drachmas duas.
Lithargyri . . . unciam unam.
Olei Olivarum . . libras tres.
Coque oleum cum lithargyro super igne blando, infundendo sensim Aceti albi uncias duas; adde deinde ceram liquatam cum resina, tunc massa paullo refrigerata, terebinthinam et denique reliquas substantias pulveratas et mixtas. (Br. Wir. *Sp.*)

℞. Terebinthinae,
Resinae Pini,
Cerae albae,
Gummi Ammoniaci, singulorum drachmas quatuordecim.
Aristolochiae longae,
Olibani,
Bdellii, singulorum drachmas sex.
Galbani,
Myrrhae,
singulorum drachmas quatuor.
Opopanacis,
Aeruginis,
singulorum drachmas duas.
Lithargyri . . drachmas novem.
Olei Olivarum . . libras tres.
Fac ut supra. (Pal.)

Pie. Terebinthinae, Gummi Ammoniaci, Resinae Pini, singulorum drachmas decem, Cerae flavae uncias duas cum dimidia, Lithargyri drachmas novem, Aristolochiae rotundae, Olibani, Bdellii, singulorum unciam unam, Myrrhae, Galbani, singulorum semunciam, Opopanacis, Aeruginis, singulorum drachmas duas et Olei Olivarum sesquilibram.

Dieſe Salbe, jetzt mit Recht vergeſſen, galt ehedem für austrocknend, brandſtillend und die Vernarbung befördernd.

Emplastrum divinum. (Wir. *Sp. Vm.*)

℞. Aeruginis . . . partem unam.
Emplastri simplicis
partes triginta sex.
Massam tam diu igni superimpositam tene, donec rubescat; adde deinde
Emplastri Diachyli gummosi
partes sex.
Resinae Pini . . . partes duas.
Myrrhae
partem unam cum dimidia.
Misce bene. (*Vm.*)

℞. Lithargyri . . uncias sedecim.
Olei Olivarum uncias triginta duas.
Aeruginis . . . unciam unam.
Coque et adde
Cerae flavae . . . uncias octo.
Pulveris Galbani,
— Myrrhae,

Pulveris Bdellii,
singulorum uncias duas.
— Gummi Ammoniaci
uncias tres.
— Olibani,
— Opopanacis,
— Mastichis,
— Radicis Aristolochiae rotundae, singulorum unciam unam.
— Magnetis sesquiunciam.
Misce bene. (*Sp.*)
℞. Lithargyri . . . sesquilibram.
Olei Olivarum . . libras tres.
Emplastro adde
Cerae flavae . . . uncias octo.
Pulveris Magnetis semilibram.
— Gummi Ammoniaci,
— Galbani,
— Opopanacis,
— Bdellii,
singulorum uncias tres.
— Myrrhae,
— Olibani,
— Mastichis,
— Aeruginis,
— Aristolochiae rotundae,
singulorum sesquiunciam.
Terebinthinae . uncias quatuor.
Misce sedulo. (Wir.)

Emplastrum Ranarum simplex s. de Ranis sine Mercurio s. Vigonis sine Mercurio. (His. Pal. Wir. *Sp.*)

℞. Olei Chamomillae,
— Anethi,
— Lilii albi,
singulorum uncias duas.
Adipis vitulinae . . semilibram.
Ranas . . . . . no. 6.
Lumbricorum lotorum
libras tres cum dimidia.
Decocti Radicis Ebuli,
— — Inulae,
singulorum uncias duas.
Coque ad humidi disparitionem et tunc (coque) colaturam cum
Lithargyri . . . . . libra una.
Massae emplasticae adde
Pulveris Euphorbii
drachmas quinque.
— Olibani drachmas decem.
— Schoenanthi,
— Stoechadis,
— Matricariae,
singulorum semunciam.
Terebinthinae clarae uncias duas.
Styracis liquidae sesquiunciam.
Adipis viperinae
uncias duas cum dimidia.
Olei Lavandulae . uncias duas.
— Lini . . . sesquiunciam.
Misce bene. (Pal.)
℞. Ranas viventes . . . . no. 10.
Lumbricorum viventium
uncias quatuor.
Herbae Schoenanthi,
Stoechadis Arabicae,
Matricariae,
singularum semunciam.
Radicis Inulae,
— Ebuli,
singularum uncias tres.
Vini albi . . . . libras duas.
Aceti boni . . . sesquilibram.
Coque lente ad dimidii usque remanentiam, cola et colaturae sensim adde massam emplasticam liquatam de
Olei Olivarum,
Lithargyri pulverati,
singulorum libra una.
Emplastrum ab igne removendo adde
Olei Baccarum Lauri,
Terebinthinae,
Cerae flavae,
singulorum uncias duas.
Pulveris Olibani drachmas sex.
— Euphorbii
drachmas quinque.
Styracis liquidae,
Croci, singulorum semunciam.
Misce bene. (Wir. *Sp.*)
℞. Ranas viventes . . . . no. 80.
Radicis recentis Ebuli,
— — Bardanae,
singularum sesquilibram.
Aceti . . . . . libras tres.
Aquae . . . . libras novem
Macera per dies duos, coque deinde ad dimidii consumptionem et cola; tunc
℞. Colaturae . . . libras quinque.
Olei Olivarum . libras novem.
Coque ad humidi consumptionem, ab igne remove et adde
Axungiae Porci . . libras tres.
Lithargyri pulverati libras sex.
Decocti praemoniti
quantum sufficit.
Coque, donec massa digitis adhaerere cessaverit; adde deinde
Cerae flavae . . . libras tres.
Terebinthinae . . uncias duas.
Massae fere refrigeratae adde
Pulveris Euphorbii unciam unam.
Misce sedulo. (*E.*)

Dieſes ſo berühmte Pflaſter kennt man heutzutage faſt nur noch dem Namen nach. Es iſt noch complicirter als das alte Diachylonpflaſter, unterſcheidet ſich aber von demſelben nur durch eine etwas ſtärker reizende Wirkung.

Emplastrum Oxydi Plumbi diabotanum s. resolutivum s. diabotanum Blondelli. (His. Sar. Wir. *Sp.*)

℞. Radicis et Herbae recentis Bardanae,

Radicis et Herbae recentis Chamaepityos,
— — — Valerianae,
— — — Angelicae,
— — — Inulae,
— — — Aristolochiae rotundae,
— — — Raphani rusticani,
— — — Elaterii,
— — — Scrophulariae,
— — — Panis porcini,
— — — Chelidonii minoris,
singulorum libras quatuor.
Succi Cicutae,
— Hormini,
— Chelidonii majoris,
singulorum libras quatuor.
Lithargyri praeparati
libras duas cum dimidia.
Olei Olivarum . libras quatuor.
Cerae flavae,
Terebinthinae,
Colophonii,
Tacamahacae,
Sulphuris,
singulorum libram unam.
Asphalti,
Olibani,
Mastichis,
Myrrhae, singulorum uncias sex.
Euphorbii,
Camphorae,
singulorum sesquiunciam.
Olei essentialis Caryophyllorum
semunciam.

Contunde herbas et radices mundatas, infunde succos, et per duos dies macera, tunc ad dimidii consumptionem coque; cola exprimendo, colaturam cum oleo et lithargyro, continue agitando, ad aptam consistentiam coque, adde ceram, colophonium et terebinthinam, tunc tacamahacam, mastichem et euphorbium, denique post refrigerationem emplastri, reliquas substantias pulveratas et cum oleo caryophyllorum tritas. (Sar.)

℞. Lithargyri pulverati libras duas.
Olei Olivarum . libras quatuor.
Aceti boni . . quantum sufficit.
Coque ad consistentiam emplastri, sub finem addendo mixturam liquatam e
Succi inspissati Cicutae,
— — Chelidonii majoris,
— — Elaterii,
singulorum unciis duabus.
Extracti Radicis Inulae,
— — Valerianae,
singulorum semuncia.

Coque denuo per aliquot momenta et adde tunc mixturam fusam et colatam e
Cerae flavae,
Picis nigrae,
Terebinthinae,
singulorum semilibra.
Styracis liquidae . unciis tribus.
Massae fere refrigeratae admisce
Pulveris Gummi Ammoniaci,
— Galbani,
singulorum uncias tres.
— Olibani . . uncias duas.
— Mastichis,
— Tacamahacae,
singulorum unciam unam.
— Baccarum Lauri,
— Radicis Iridis,
— Hellebori nigri,
— Seminum Cumini,
singulorum drachmas sex.
Olei Olivarum . . uncias tres.
Camphorae in hoc oleo dissolutae
semunciam.
Misce bene. (*E.*)

℞. Herbae et radicis recentium Bardanae,
— — — Petasitidis,
— — — Calendulae,
— — — Chamaepityos,
— — — Levistici,
— — — Valerianae,
— — — Angelicae,
— — — Cicutae,
— — — Inulae,
— — — Armoraciae,
— — — Elaterii,
— — — Scrophulariae,
— — — Sedi minoris,
— — — Chelidonii majoris,
— — — Chelidonii minoris,
— — Gratiolae,
singulorum uncias tres.
Aquae . . . libras viginti.
Coque ad dimidii remanentiam, cola exprimendo et adde colaturae
Succi Cicutae,
— Chelidonii majoris,
— Hormini,
singulorum libras duas.
— Sedi minoris semilibram.
Consume ad extracti mollioris usque consistentiam; tunc

℞. Hujus extracti . . semilibram.
Galbani,
Gummi Ammoniaci,
Opopanacis,
Sagapeni,
singulorum uncias quatuor (duas).

in Aceto scillitico dissoluta et ad extracti consistentiam evaporata; tunc

℞. Lithargyri pulverati libram unam.
Olei Lumbricorum,
— Catellorum,
— Meliloti,
— Mucilaginis,
singulorum uncias quatuor.
Aquae fontanae . uncias decem.

Coque ad consistentiam emplastri, cui adde sensim extractum cum gummatibus mixtum et

Florum Sulphuris
uncias septem cum dimidia.
Pulveris Radicis Iridis Florentinae,
— — Panis porcini,
— — Ranunculi tuberosi,
— — Coronae imperialis,
— — Serpentariae,
— — Hellebori albi,
singulorum drachmas tres.
— — Sigilli Salomonis,
— — Ari,
singulorum semunciam.
— — Aristolochiae longae,
— — — rotundae,
— — Clematitis,
singulorum drachmam unam.
Baccarum Lauri drachmas duas.
Seminum Angelicae,
— Nasturtii,
singulorum drachmas tres.
— Cumini . sesquiunciam.
Fimi columbini . . semunciam.
Pulveris Asphalti,
— Olibani,
— Mastichis,
singulorum uncias quatuor.
— Tacamahacae uncias sex.
— Bdellii,
— Myrrhae,
singulorum sesquiunciam.

Adde deinde sensim mixturam liquatam e

Cerae flavae,
ResinaePini, singularum semilibram.

Adjice denique

Styracis liquidae . . uncias sex.
Camphorae in Olei essentialis Caryophyllorum semuncia solutae
drachmas sex.
Olei lateritii drachmas decem.

Serva. (Wir. *Sp.*)

Dieſes Ungeheuer von Zuſammenſetzung, welches ſeinen Namen der großen Menge Pflanzen, welche mit dazukommen, verdankte und ehedem dem empl. Vigonis gleichgeachtet, ja ihm von Manchen noch vorgezogen wurde, galt als ſchmelzend und auflöſend, iſt aber heutzutage vielleicht höchſtens nur in Spanien in Gebrauch.

§. II. Mit dem Deutoxyd des Blei's (Mennige) bereitet.

Unguentum magistrale s. de Minio s. Oxydi Plumbi rubrum. (His.)

℞. Minii . . . . uncias quinque.
Cerussae,
Lithargyri,
singulorum sesquiunciam.
Olei Rosarum . . sesquilibram.

Coque parumper, continue agitando et adde

Cerae albae . . uncias quatuor.

Agita ad perfectam refrigerationem usque.

Emplastrum resolvens opiaceum. (*Bo.*)

℞. Olei Lini . . . . libras duas.
Minii,
Cerussae,
Cerae flavae,
singulorum uncias octo.
Terebinthinae . . uncias tres.
Opii pulverati . unciam unam.

Bei anfangenden ſcirrhöſen Geſchwülſten. — Man legt täglich ein neues auf.

Emplastrum Oxydi Plumbi rubri camphoratum, Emplastrum s. Ceratum Noribergense s. Noricum s. tripharmacum s. Minii adustum s. Minii camphoratum s. Matris. (B*. Bor4. Br. D. Gal. Han. HassP. Sar. Sax. Wir. *Ca. Fi. Sp. Vm.*)

℞. Minii pulverati . . uncias octo.
Olei Olivarum . libram unam.

Coque, continue agitando, donec massa coloris fusci prodeat, cui semirefrigeratae adde

Cerae flavae . . sesquiunciam

et post hujus liquationem

Camphorae cum Olei pauxillo tritae
drachmas duas.

Misce bene. (Han.)

HassP. Picis solidae unciam dimidiam addit; — Bor4. Olei uncias sedecim, Cerae quatuor et Camphoram in Spiritu Vini rectificatissimo solutam, caeterum ut Han.; — *Sp.* Minii uncias duodecim, Olei Rosarum viginti quatuor, Cerae tres et Camphorae drachmas duas; — *Vm.* Minii uncias sedecim, Olei Olivarum viginti quatuor, Cerae tres et Camphorae drachmas tres; — *Ca.* Olei Olivarum libram unam, uncias tres et drachmam unam, Minii uncias quatuor et drachmas tres, Cerae libram unam et Camphorae drachmas sex; — Gal. Olei partes sexcentas, Minii trecentas, Cerae quingentas et Camphorae viginti quatuor; — Hae duae supremo loco nominatae pharmacopoeae inter coctionem oleo

et oxydo certam aquae quantitatem addere jubent; — *Fi.* Minii uncias quinque cum Aquae communis unciis sex et Olei Olivarum decem ad eam consistentiam coquere ut massa digitis non amplius adhaereat et tunc addere Cerae flavae uncias octo, Camphorae drachmas tres et adhuc Minii unciam unam.

℞. Minii . . . . . libram unam.
Olei Napi . . . . libras duas.

Coque, continue agitando, donec emplastrum colorem fuscum acquisiverit et adde

Camphorae cum Alcohole tritae drachmas duas.

Misce bene. (B*. Sax.) — Diese Formel ist von Trommsdorf.

℞. Minii . . . . . uncias octo.
Aceti . . . . uncias quatuor.
Olei Rosarum . . libram unam.

Coque ad consistentiam emplastri mollis et adde

Cerae flavae . . sesquiunciam.
Camphorae . . drachmas duas.

Misce sedulo. (Sar. Wir.)

D. Minii libram unam, Aceti semilibram, Olei libras duas, Cerae sesquiunciam et Camphorae drachmas duas; — B*. et Br. Minii, Aceti, singulorum libram unam, Olei duas, et Camphorae sesquiunciam absque cera.

Dieses Pflaster wird als lindernd und schützend betrachtet. Man wendet es besonders an, um die Vernarbung nicht sehr ausgebreiteter Geschwüre zu beschleunigen und Theile, auf welche durch langes Liegen im Bette Druck gewirkt hat, vor der Reizung zu bewahren.

Emplastrum camphoratum Stahlii. (*Sp.*)

℞. Olei Olivarum uncias duodecim.
Minii . . . . . uncias octo.

Coque ad consistentiam requisitam et adde massae refrigeratae

Camphorae in Olei pauxillo dissolutae . . . . . uncias duas.

Dieses Pflaster ist einfacher, als das vorige und ihm vorzuziehen.

Emplastrum Porri. (*Bo.*)

℞. Minii . . . . libras duas.
Olei Olivarum . libras quatuor.
Succi Porri . . . . libras sex.

Coque ad consistentiam requisitam et adde

Cerae flavae . . libram unam.
Saponis albi . . . libras duas.

Agita ad refrigerationem usque.

Emplastrum anglo-saxonicum. (B*.)

℞. Cerae albae,
Minii, singulorum libram unam.
Pulveris Succini,
— Camphorae,
— Aluminis usti,
singulorum drachmas duas.
Olei Olivarum . . libram unam.

Coque oleum, donec colorem fuscorubrum acquisiverit, adde deinde minium, coquendo continua, et simulac massa consistentiam emplastri acquisiverit, adde succinum et post refrigerationem, camphoram et alumen.

Zum Verbinden übelriechender Geschwüre gerühmt.

Emplastrum mammillare. (Pal.)

℞. Emplastri Minii,
— Mucilaginis,
Pulveris Minii,
— Lithargyri,
singulorum semunciam.
Olei Liliorum,
— Ovorum,
— Elaterii,
— Sesami,
Butyri recentis,
Cetacei, singulorum unciam unam.
Camphorae . . . semunciam.

Auflösend, gegen Anschwellungen der Brüste bei Stillenden und um das Aufspringen der Brustwarzen zu verhüten.

Emplastrum de Doyen. (*Ca.*)

℞. Minii,
Olei Hyperici,
singulorum libram unam.
Resinae Pini . uncias quatuor.
Olibani . . . . . uncias duas.
Saponis albi . . . semunciam.

Emplastrum antiarthriticum. (Wir.)

℞. Olei Seminum Hyoscyami,
— — Papaveris,
— — Lini,
singulorum uncias quatuor.
Minii . . . . . libram unam.
Aquae Sambuci . . semilibram.

Coque lente ad consistentiam emplastri et adde

Saponis Veneti . . uncias tres.
Cerae flavae . . . uncias duas.

Ehedem auf schmerzhafte und von Krämpfen ergriffene Theile zu legen empfohlen.

Emplastrum miraculosum. (Wir.)

℞. Minii,
Lithargyri, singulorum semilibram.
Cerussae . . . . libras duas.
Olei Olivarum . . libras tres.

Coque leni igne et adde

Saponis Veneti raspati uncias quatuor.

Massae ad emplastri aliquanto duri consistentiam redactae adde

Pulveris Baccarum Lauri
semunciam.
— Camphorae unciam unam.

Es wurde ehedem, wie auch der Name anzeigt, als ein vortreffliches Mittel gegen alte Geschwüre und selbst frische Wunden betrachtet. Es unterscheidet sich nicht bedeutend von dem folgenden.

Emplastrum saponaceum de Barbette. (Br. His. Pal. Wir.)

℞. Minii,
Cerussae,
singulorum uncias quatuor.
Olei Rosarum . libram unam.

Coque, continue agitando et Aquae fontanae uncias aliquot affundendo, ad emplastri consistentiam; massae deinde ingere

Saponis Veneti rasi uncias quatuor et his solutis
Camphorae cum Alcohole tritae
semunciam.

Misce. (Br. Pal. Wir.)

His. Miscere jubet Minii uncias duodecim et sex Cerussae cum Olei uncias triginta duabus, addere Saponis in Aquae sufficiente quantitate dissoluti uncias tres, miscellam subigendo in linimenti formam redigere, coquere blando igne, continue agitando et subinde Aquae paucillum affundendo, humidum deinde omne consumere, addere Cerae sesquiunciam et semirefrigeratis adjicere Camphorae unciam unam.

Die Alten hielten es für schmelzend, auflösend, schmerzstillend und Kindern auf den Bauch gelegt für gelind abführend.

Emplastrum balsamicum. (B*.)

℞. Olei Olivarum . . libras tres.
Saponis Veneti,
Minii,
Cerussae,
singulorum libram unam.
Castorei . . . sesquiunciam.
Camphorae . . . uncias tres.

Dieses anfangs geheime Pflaster, für dessen Mittheilung Catharina II. 30,000 Rubel bezahlte, wurde bei Migräne, Blindheit, Taubheit, Rheumatismus, Zahnschmerz, Kropf, Lähmung, Anschwellung der Brüste, Gesichtskrebs und in einer Menge anderer Krankheiten empfohlen, doch verdiente es keine solche Anpreisung.

§. III. Mit kohlensäuerlichem Blei (Bleiweiß) bereitet.

Emplastrum Cerussae s. album coctum s. Subcarbonatis Plumbi s. griseum coctum. (B*. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Ful. Han. HassP. Li. O. Pal. Pol. Sar. Sax. Wir. Wür. *Fi. Sm. Sp. Sw. T.*)

℞. Cerussae porphyrisatae
partes quatuor.
Olei Olivarum . . partes tres.

Coque continue agitando et subinde Aquam calidam affundendo, donec cerussa sit liquata. (*Sp.*)

Ba. Li. et Sax. Cerussae partes duas et unam Olei; — *Vm.* Cerussae et Olei singulorum unam; — HassP. Olei libras quatuor cum dimidia, Cerussae octo; — Pol. Cerussae novem et sex Axungiae Porci.

℞. Cerussae porphyrisatae
partem unam.
Olei Olivarum partes duodecim.

Coque, continue agitando et Aquam pedetentim addendo ad consistentiam emplastri et adde

Cerae albae . . . partes tres.

Post refrigerationem serva. (*Sw*.*)

B*. Bor. Han. et O. Cerussae partes octo, Cerae unam et Olei quatuor cum dimidia; — Wür. Cerussae octo, Cerae quatuor et unam Olei; — Br. Pal. et Wir. Cerussae octo, Cerae unam et sex Olei; — D. Cerussae octo, Cerae unam et quatuor Olei; — Sar. Cerussae quatuor, Cerae unam et quatuor Olei; — Ful. Cerussae duodecim, Cerae unam et decem Olei; — *Vm.* Cerussae quatuor, Cerae unam et Olei sex.

℞. Cerussae . . . partem unam.
Lithargyri . . . partes duas.
Olei Olivarum . partes quatuor.

Coque cum Aquae sufficiente quantitate et adde

Cerae albae liquatae partem unam.

Misce bene. (*Vm.*)

Bor4. Lithargyri libram unam, Olei Olivarum quatuor cum dimidia, coque instillando sensim modicam Aquae communis calidae copiam, et post solutionem lithargyri adde Cerussae pulveratae libras septem; coque Aquam addendo, donec fiat emplastrum; *Fi. T.* Olei, Cerussae, singulorum libram unam, Emplastri Diachyli simplicis, Cerae albae, singulorum uncias sex, Aceti albi libram unam.

℞. Unguenti simplicis partes quinque.
Olei Olivarum partem dimidiam.

Leni igne mollefactis adde

Cerussae pulveratae partem unam et agita ad refrigerationem usque. (Bel.)

Dieses Pflaster wird als austrocknend und lindernd betrachtet.

Emplastrum de Spermate Ranarum. (Pal. Wir. *Sp.*)

℞. Spermatis Ranarum,

Olei Olivarum,
singulorum libras tres.
Cerussae libras quatuor cum dimidia.
Cerae albae . . libram unam.
Aluminis . . . uncias quatuor.
Terebinthinae . drachmas duas.
Camphorae . . unciam unam.
Fiat emplastrum. (Pal.)

℞. Olei Spermatis Ranarum,
Cerussae,
singulorum libras quinque.
Coque ad cerussae solutionem usque, Aquam et Acetum sensim addendo, ne massa urat; ab igne remotae adde
Aluminis crudi uncias quinque.
Camphorae cum Alcohole trituratae unciam unam.
Misce bene triturando. (Wir.)

Sp. Olei Spermatis Ranarum partes sexaginta, Cerussae octodecim, Aluminis sex et duas Camphorae.

Dieſes Pflaſter unterſcheidet ſich von dem vorhergehenden hinſichtlich der Wirkung, welche eben ſo wenig kräftig iſt, nur wenig; auch iſt es mit Recht ganz in Vergeſſenheit gekommen.

Emplastrum Plumbi Subcarbonatis (Cerussae) compositum. (Am. *C.*)

℞. Cerussae . . . libram unam.
Olei Olivarum . octarios duos.
Cerae flavae . uncias quatuor.
Emplastri Diachyli simplicis sesquilibram.
Iridis pulveratae uncias novem.
Coque oleum et plumbum in Aquae pauxillo, continue agitando ad perfectam usque mixtionem; adde ceram et emplastrum et his liquatis, bene agitando, pulverem.

Ceratum Cerussae compositum. (Am. *C.*)

℞. Emplastri Cerussae compositi partes quinque.
Olei Olivarum . partem unam.
Liqua emplastrum et adde oleum, agitando donec massa refrixerit.

Unguentum Bicour. (*Ca.*)

℞. Olei rosati . uncias duodecim.
Cerae albae . . uncias octo.
Cerussae . . . uncias quatuor.
Lithargyri . . . uncias duas.
Adde in fine coctionis
Balsami Peruviani liquidi semunciam.

Bei ſchmerzloſen Geſchwülſten empfohlen.

Emplastrum benedictum s. Carbonatis Plumbi, ustum. (His. Pal.)

℞. Olei Olivarum . . . sesquilibram.
Radicis Calami . unciam unam.
— Iridis,
Radicis Althaeae,
singularum drachmas sex.
Oleo coquere incipienti adde radices mundatas et concisas, coque, donec liquidum nigrescat et deinde ab igne remoto adde
Cerussae . . . . semunciam.
Tutiae praeparatae drachmas sex.
Coque denuo ad emplastri consistentiam usque et adde
Cerae flavae . . . semunciam.
Balsami Peruviani nigri sesquidrachmam.
Misce bene. Pal.)

His. Olei libras tres, Radicis Althaeae, Calami, singularum uncias duas, Radicis Iridis tres, sex Cerussae et Lithargyri tres absque tutia, Cerae flavae uncias quatuor et Balsami semunciam.

Pocgereba.

Cortex Pocgereba; Pocgerebarinde; Pocgereba (*Gal.*).

Br.

Eine Americaniſche Rinde in gerollten Stücken von der Dicke einer Gänſefeder bis zu der eines Fingers, hart, derb, feſt, gerade oder krumm, äußerlich runzlig und dunkelbraun, inwendig braun, geruchlos, von ſchwachem abſtringirenden Geſchmack.

Podophyllum.

Podophyllum peltatum, Willd.; Mayapfel; Podophylle (*Gal.*); May apple (*Ang.*).

Am. *C.*

♃ (Polyandria Polygynia, L.; Podophyllaceae, *J.*) Eine Pflanze Nordamerica's. (*Bigel.* Am. Med. Bot. II. t. 23.)

Man wendet die fingersdicke Wurzel an. — Sie iſt, zu zwanzig Gran gegeben, ein vortreffliches Purgirmittel.

Extractum Podophylli.

℞. Radicis Podophylli libram unam.
Alcoholis . . octarios quatuor.
Aquae . . . . octarios decem.
Macera radicem per dies quatuor in alcohole, tunc in Aqua ad octariorum duorum remanentiam coque; tincturas seorsim evaporatas commisce et lente ad spissitudinem requisitam redige.

Polanisia.

Polanisia dodecandra, Cand.; Baſtardſenf; Mosambé dodecandre (*Gal.*); Bastard mustard (*Ang.*).

C.

⊙ (Tetradynamia Siliquosa, L.; Cap-

paridеae, J.) Eine Pflanze Ostindien's. (*Bart.* Flore of N. Amer. t. 1. XXII.

Die Wurzel wird für wurmwidrig gehalten.

Polygala.

Die Pharmacopöen zeigen drei Arten dieser Pflanzengattung an:

1) *Polygala amara, L.*; bittere Kreuzwurz, Kreuzblumenkraut, Milchblume; Polygala amer (*Gal.*); Milkwort (*Ang.*); Vstawae, Zezhulka, Mudatka (*B.*); Korsblomster (*D.*); Poligala lechera (*His.*); Kruisbloem (*Bel.*); Poligala (*I.*); Wyczka (*Pol.*); Poligala leitera (*Lus.*); Jungfrumariaelin (*Suec.*).

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Ful. Gal. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. O. Pol. R. RC. Sax. Wir. Wür. *Br. Fi. G. M. Sp.* Z.

4 (Diadelphia Octandria, L.; Polygaleae, J.) Eine Europäische Pflanze. (*Jacq.* Flor. Austr. V. t. 413. *Plenck* t. 548. Dict. d. Sc. nat. Cah. XIV. Düss. off. Pfl. XII. t. 11.)

Man wendet die Wurzel (radix Polygalae amarae) an; sie ist hart, fast holzig, faserig, außen gelblich, innen weißlich und geruchlos: Sie hat einen bitteren zugleich süßlichen Geschmack.

Man nimmt gewöhnlich, wegen der Kleinheit der Wurzeln, die ganze Pflanze; selten aber trifft man sie im Handel, wo man statt ihrer häufig die Polygala vulgaris verkauft.

Bitter, tonisch, brustlindernd, ehedem besonders gegen Lungenschwindsucht empfohlen. — Gabe des Pulvers, eine halbe Drachme.

2) *Polygala vulgaris, L.*; Kreuzblume; Polygala commun (*Gal.*).

Ams. Gal. Wir. Wür. *Fi. G. M.*

4 Eine Europäische Pflanze. (*Jacq.* Fl. Aust. V. 413.)

Die Wurzel und das Kraut (radix et herba Polygalae vulgaris s. Ambarvalis), welche man gewöhnlich zugleich sammelt, sind weniger wirksam, als die der P. amara, wie man behauptet, obgleich diese nur eine Varietät derselben zu seyn scheint und in allen ihren Theilen um die Hälfte kleiner ist.

3) *Polygala Senega, L.*; Klapperschlangenwurzel, Senegawurzel; Polygala de Virginie, Senega, Seneka (*Gal.*); Rattle snake root (*Ang.*); Indiczk Wirginiansky (*Pol.*).

Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Gal. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. *Be. Br. C. Fi. G. M. Par. Sp.*

4 Eine Pflanze Nordamerica's. (*Linné* Amoen. Acad. 2. p. 139. t. 2. *Plenck* t. 549. Berl. Jahrb. X. t. 5. *Bigel.* Am. Med. Bot. III. t. 30. *Woodwille* Med. Bot. III. t. 93. Düss. off. Pfl. XII. t. 12.)

Man wendet die Wurzel (radix Senegae s. Senekae s. Polygalae americanae) an; sie ist gedreht, knotig, ästig und hat eine graulichte harzige Rinde, unter welcher ein weißliches Parenchym liegt. Der Geruch ist schwach und widerlich, der Geschmack anfangs süß, dann scharf und bitter und sie bewirkt Speichelfluß.

Sie enthält, nach Peschier, drei eigenthümliche Stoffe, Polygalin oder Senegin (Gehlen), Isolusin und Polygalsäure.

Reizend, harntreibend, eröffnend, in hoher Gabe Brechen und Purgiren erregend. — Gabe des Pulvers, von zehen Gran bis zu einer halben Drachme.

4) *Polygala rubella, Willd.* Am. C.

Species bechicae. (Han.)

℞. Radicis Polygalae . semunciam.
Florum Arnicae drachmas duas.
Concisa misce.

Pulvis resolvens antiphlogisticus s. aperitivus. (Ful.)

℞. Radicis Polygalae Virginicae,
Nitri, singulorum drachmam unam.

Gabe, von einem Scrupel bis zur halben Drachme.

Pilulae resolventes. (B*.)

℞. Radicis Polygalae Virginicae quantum vis.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae quantum sufficit
ut fiant pilulae granorum duorum. — Gabe, alle zwei Stunden ein Stück. — Wendt rühmt diese Pillen zur Zertheilung des hypopyon.

Potio pectoralis amara. (Ra.)

℞. Radicis Polygalae drachmas duas.
Syrupi Sacchari . uncias duas.
Aquae . . . . uncias quatuor.

Electuarium Polygalae amarae s. pectorale. (Au.)

℞. Pulveris Radicis Polygalae amarae semunciam.
Mellis . . . quantum sufficit.

Gabe, ein Kaffeelöffel täglich, bei chronischen Leiden der Bronchien.

Extractum Polygalae amarae. (HassP. Wür.)

℞. Radicis Polygalae amarae quantum vis.

Coque in Aquae sufficiente quantitate per horam unam, cola exprimendo, sepone et decantha liquorem, tunc ad mellis spissi consistentiam consume.

HassP. ut extractum cardui benedicti. (I. p. 418.)

Extractum radicis Senegae s. Polygalae Virginicae. (Bor. Bor4. Ful. HassP. Sax.)

℞. Radicis Polygalae Virginicae libram unam.

Aquae Vitae . . . . libras sex.

Digere leni calore per dies aliquot, filtra tincturam et ad mellis consistentiam eam consume, sedimentum coque cum Aquae libris tribus, exprime et itidem consume, extracta tum commisce et vaporando inspissare continua. (Ful.)

HassP. ut extractum colombo. (I. p. 561.)

℞. Radicis Senegae . partes duas.
Alcoholis . . . . partes tres.
Aquae communis partes novem.

Digere per horas viginti quatuor; lente vaporando alcoholem elice et quod restat ad extracti consistentiam consume. (Bor. Sax.)

Bor4. ut extractum Aconiti (I. p. 61.)

Gabe, sechs bis funfzehen Gran.

Tinctura s. Essentia Senegae. (Han. *Vm.*)

℞. Radicis Senegae . partem unam.
Aquae Vitae . . . partes sex.

Infunde frigide per plures dies. (*Vm.*)

Han. Radicis uncias quinque et Alcoholis libras duas.

Gabe, dreißig Tropfen täglich mehrmals.

Infusum Polygalae amarae. (*Ra.*)

℞. Radicis Polygalae amarae semunciam.
Aquae bullientis . libras duas.

Infunde et cola. — Tonisch, bei der Behandlung bösartiger Fieber als Trank empfohlen.

Decoctum Polygalae amarae. (B*. Ful. His. RC. *Fi.*)

℞. Polygalae amarae unciam unam.
Aquae . . . quantum sufficit ut coquendo librae duae colaturae obtineantur. (His.)

B*. Polygalae amarae uncias duas et Aquae libras tres ad dimidium redigendas; — *Fi.* Polygalae amarae vel vulgaris drachmas duas ad unciam unam coquere in Aquae sesquilibra ad tertiae partis remanentiam.

℞. Polygalae amarae sesquiunciam.
Aquae . . . uncias octodecim.

Coquendo parte tertia consumpta, colaturae adde

Oxymellis simplicis uncias duas.

Misce. (Ful.)

RC. Polygalae semunciam, Aquae sesquilibram ad libram coquere et colaturae, si placet, addere Radicis Scillae praeparatae scrupulum unum, Mellis semunciam.

Bei Lungenschwindsucht gepriesen. — Gabe, vier bis sechs Unzen täglich mehrmals.

Decoctum Senegae s. Polygalae Senegae s. Polygalae Virginicae. (Am. B*. Ed. Ful. Gen. Lon. LonN. Wür. WW. *Br. C. E. Fi. Sa. Sw. T.*)

℞. Radicis Polygalae Virginicae unciam unam.
Aquae libras (octarios Lon. LonN.) duas.

Decoque ad dimidii remanentiam. (Am. Ed. Lon. LonN. Wür. WW. *Br. C.*)

B*. Radicis uncias tres et Aquae libras duas, ad tertiam partem redigendas; — Ful. et Gen. Radicis unciam unam et Aquae esquilibram ad libram unam redigendam; — *T.* Senegae drachmam unam cum Aquae libra una in vase tecto per sexagesimas aliquot coquere jubet; — *Fi.* Senegae semidrachmam cum Aquae libra una ad octo unciarum remanentiam.

℞. Radicis Polygalae Virginicae unciam unam.
Aquae . . . . . libras duas.

Coque ad libram unam, cola et colaturae adde

Syrupi simplicis unciam unam.

Misce bene. (*Sa. Sw.*)

℞. Polygalae Virginicae unciam unam.
Liquiritiae . . . . semunciam.
Aquae . . . . sesquioctarium.

Coquendo ad octarii remanentiam consume. (*E.*)

Reizend, bei catarrhalischen Lungenaffectionen, bei Gliederreißen und Wassersuchten empfohlen. — Gabe, zwei Unzen täglich zweimal; bisweilen stündlich eine halbe Unze, bis Stühle erfolgen.

Syrupus Senegae s. Polygalae Virginicae. (Am. B*. Bor. Bor4. Fenn. Han. HassP. Pol. Suec. *C. Fi. T. Vm.*)

℞. Radicis Polygalae Virginicae unciam unam.
Aquae bullientis . sesquilibram.

Coque ad unciarum decem colaturae remanentiam; adde

Sacchari albi . . sesquilibram.

Fiat syrupus. (B°. Bor. Bor. Fenn. Han. Hass. Pol. Suec.)

℞. Radicis Polygalae Virginicae partem unam.
Aquae . . . . partes duodecim.

Infunde leni calore, in vase tecto, per horas aliquot, cola leviter exprimendo et adde

Sacchari albi . partes octodecim.

Fiat syrupus. (*Vm.*)

T. Senegae uncias tres cum Aquae bullientis libra una infundere per horas duodecim, filtrare et cum Sacchari libris duabus in balneo aquae syrupum parare.

℞. Radicis Polygalae Virginicae uncias quatuor.
Aquae . . . . octarium unum.

Coque ad dimidii consumptionem usque; liquido decanthato adde

Sacchari . . . libram unam

Fiat syrupus. (Am. *C.*)

℞. Radicis Senegae . unciam unam
Alcoholis 22° . . . uncias octo.

Digere per triduum, filtra per chartam, destillando liquidi dimidium elice et residuum cum

Sacchari ad plumam cocti libris duabus

leni calore ad aptam consistentiam coque. (*Fi.*)

Syrupus Senegae cum Liquiritia. (*Au.*)

℞. Elixir Succi Liquiritiae drachmam unam.
Syrupi Polygalae Virginicae unciam unam.

Gabe, ſtündlich einen Kaffeelöffel voll.

Syrupus Senegae moschatus. (*Au.*)

℞. Syrupus Polygalae Virginicae uncias tres.
Gummi Ammoniaci cum Mucilagine Gummi Arabici triti scrupulum unum.
Moschi . . . . grana decem.
Elixir Succi Liquiritiae guttas quindecim ad viginti.

Gabe, ſtündlich ein Löffel.

Decoctum pectorale. (Ham. *B. Ra.*)

℞. Radicis Polygalae Virginicae,
Lichenis Islandici,
singulorum semunciam.
Aquae fontanae . uncias sedecim.

Coque leni igne ad colaturae unciarum decem remanentiam, tunc adde

Mellis glycyrrhizati unciam unam.

Misce. (Ham.)

℞. Radicis Polygalae amarae uncias tres.
Herbae Farfarae,
— Veronicae,
singularum unciam unam.
Aquae . . . . . libras tres.

Coquendo partem tertiam consume. (*Ra.*)

Gabe, drei oder vier Unzen, mehrmals täglich. — Man verſüßt es mit Zucker oder mit Honig.

Decoctum diureticum. (Ham.)

℞. Radicis Polygalae Virginicae concisae . . . . . semunciam.
Scillae concisae scrupulum unum.
Aquae fontanae uncias duodecim.

Parte tertia coquendo consumpta, cola et adde

Spiritus Nitri dulcis drachmas duas.
Tincturae thebaicae scrupulos duos.
Mellis glyzyrrhizati unciam unam.

Decoctum emmenagogum. (*E.*)

℞. Radicis Polygalae Virginicae unciam unam.
Corticis Aurantiorum drachmas duas.
Aquae . . . . octarium unum.

Decoque radicem cum aqua ita ut hujus pars tertia consumatur, adde corticem et post aliquot tempus cola.

Gabe, vier Unzen täglich bei Amenorrhöe.

Decoctum pectorale corroborans, Haustus pectoralis incitans, Potio pectoralis. (*Au. B.*)

℞. Radicis Polygalae Virginicae drachmas duas.
Aquae . : . . quantum sufficit ut decocti unciae octo obtineantur, quarum colaturae adde
Camphorae cum Mucilagine Gummi Arabici tritae drachmam unam.

Misce sedulo. (*B.*)

℞. Radicis Polygalae Virginicae drachmas duas.
Aquae . . . . quantum sufficit ut decocti unciae sex obtineantur, quarum colaturae adde
Oxymellis scillitici unciam unam.

Misce bene. (*B.*)

℞. Radicis Polygalae Virginicae drachmas duas.
Decocti Chinae bullientis quantum sufficit ut infusionis unciae septem obtineantur; colaturae adde
Camphorae cum Mucilagine Gummi Arabici tritae semidrachmam.
Aetheris sulphurici guttas triginta.
Syrupi Corticum Aurantiorum,
— Althaeae,
singulorum unciam unam.

Misce exacte. (*B.*)

℞. Radicis Polygalae Virginicae semidrachmam ad drachmam unam.

Radicis Liquiritiae drachmas duas.
Aquae bullientis . . uncias tres.
Infunde et colaturae adde
Elixir paregorici drachmam unam.
Syrupi Althaeae . . semunciam.
Misce sedulo. (*Au.*)
Löffelweise.

Polypodium.

Polypodium vulgare, *L.*; Engelfüßtüpfelfarrn, Engelfüß, Süßfarrn, Tüpfelfarrn; Polypode commun (*Gal.*); Common polypody (*Ang.*); Osladyc (*B.*); Engelsoedt (*D.*); Polipodio (*I.*); Engelzoet (*Bel.*); Felce quercina o quercia, Filicola, Polipodio officinale (*I.*); Paprolka (*Pol.*); Stensoeta (*Suec.*).

A. Ams. An. Ba. Bor. Br. D. Fer. Ful. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. His. Li. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. *Be. Br. Fi. G. M. Pid. Sp.* Z.

♃ (Cryptogamia, L.; Filices, J.) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (Fl. méd. V. 278. *Bert.* Bild. X. 38. fig. 2.)

Man wendet den Ausläufer, uneigentlich Wurzel (rhdix Polypodii s. Filiculae dulcis) genannt, an; sie ist hart, dick, holzig, mit vielen röthlichen häutigen Schuppen bedeckt und mit schwärzlichen Fasern versehen. Sie ist fast geruchlos, hat aber einen anfangs süßlichen, dann bittern, widerlichen und schwach adstringirenden Geschmack.

Sie enthält, nach Bucholz, zuckerartigen Stoff, Schleimharz, Harz, Oel und Satzmehl.

Schwach adstringirend, besonders bei catarrhalischen Krankheiten, auch gegen Würmer; sie macht die Basis des Herrenschwand'schen Mittels gegen den Bandwurm aus. — Gabe des Pulvers, eine bis zwei Drachmen.

Polytrichum.

Polytrichum commune, *L.*; goldener Widerthon, Güldenwiderthon, Güldenhaarmoos; Polytric commun, Percemousse (*Gal.*); Great golden maidenhair (*Ang.*); Guldhaar (*D.*); Golden weilerhood (*Bel.*); Biaernmossa (*Suec.*).

Br. Gal. Wir. *Be. G. M. Sp.*

♃ (Cryptogamia, L.; Musci, J.) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (*Zorn* Ic. pl. t. 415.)

Man wendet das Kraut (herba Adianthi aurei s. Polytrichi aurei s. Muscus capillaceus major) an, welches aus einem einfachen, wuchernden Stängel mit linienlanzettförmigen, gezähnelten Blättern besteht und weder Geruch noch Geschmack besitzt.

Sehr schwach adstringirend.

Pomum.

Malus communis, *Cand.*; Apfelbaum; Pommier (*Gal.*); Appletree (*Ang.*); Missenske gablko (*B.*); Aebletrae (*D.*); Manzano (*His.*); Appelboom (*Bel.*); Malo (*I.*); Jablon (*Lus.*); Mareiro (*Lus.*); Appeltraed (*Suec.*).

Am. Ba. Bor. Bor4. Br. Ful. Gal. Han. HassP. His. O. Pol. Sax. Suec. Wir. *Be. Br. M. Sp.* Z.

Ein Baum (Icosandria Monogynia, L.; Rosaceae, J.), welcher in ganz Europa verbreitet ist (*Blackw.* Herb. t. 141. 178. *Schk.* t. 133. *Plenck.* t. 394. *Hayne* IV. t. 46. Düss. off Pfl. III. t. 1.)

Seine zahlreichen, durch die Cultur entstandenen Varietäten geben sehr verschiedene Früchte, Aepfel (Poma, Poma acidula), unter denen jedoch blos die Renet- und die Borsdorfer Aepfel; Poma renetia et Borstorfiana; Reinette, Pomme de Borstorf (*Gal.*) angewendet werden.

Pulpa Pomorum dulcium s. Melimelorum. (RC)

℞. Pomorum dulcium quantum vis.
Coque ex Aqua et per filtrum exprime. — Zum Umschlag auf entzündete Augen.

Succus Pomorum. (Ful. Gal. His. Sar. T.)

℞. Pomorum renetiorum quantum vis.
In pulpam rasis, semina separa, exprime inter duo strata straminis secalini concisi et cum Aqua tepida loti; succum postquam subsedit, cola et in lagenis sub olei strato serva.
Lagenae etiam vapori sulphuris urentis exponi vel libris duabus succi, Sulphureti Calcis grana quindecim addi possunt.

Syrupus Pomorum redolentium. (Fer. His. *Fi.*)

℞. Syrupi Pomorum libram unam.
Sacchari albi pulverati libras duas.
Solve lenis caloris vel balnei aquae ope. (His.)
Fer. *Fi.* vel dissolvere Sacchari libras tres in Succi quatuor vel (Fer.) coquere quadrantes Pomorum ab epidermite et seminibus liberatos in Syrupo Sacchari.

Potus ex Pomis s. Pomorum, Decoctum Pomorum. (B*. *Au.*)

℞. Pomorum Renetiorum
uncias decem.

Aquae fontanae
libras duas cum dimidia.

Coque per horam in vase tecto et cola. — Dieser Trank, welcher schon an sich sehr angenehm ist, wird es durch Zusatz von Zucker noch mehr. Man kann, wenn die Indication es erfordert oder erlaubt, entweder eine Drachme Muscatpulver oder eine halbe Drachme gepulverten Zimmt oder endlich drei Unzen Rheinwein zusetzen. Im letztern Falle dient der Trank nur als Vehikel des Reizmittels, im erstern, um dem Kranken das Wassertrinken angenehm zu machen, da die geringe Reizwirkung desselben fast gar nicht in Anschlag zu bringen ist.

Populus.

Man findet drei Arten dieser Gattung in den Pharmacopöen angezeigt:

1) *Populus balsamifera, L.*; Balsampfpe; Peuplier baumier (*Gal.*); Balsamtree (*Ang.*); Balsam popelier (*Bel.*).

Gal. GalM. Li. Sax. *B. G. M. Pid.*

Ein Baum (Dioecia Octandria, L.; Amentaceae, *J.*), welcher in Nordamerica und Siberien wächst. (*Cat.* Car. I. p. 34. t. 34. *Plenck* t. 714.)

Die Knospen, welche man anwendet, sind sehr groß, eirund, länglich, spitzig mit geschindelt über einander liegenden, festen, länglichen, hohlen Schuppen. Ihre Oberfläche ist mit einem harzigen, klaren, goldgelben Safte von gewürzhaftem Geruch und brennendem und etwas bitterem Geschmack überzogen.

2) *Populus nigra, L.*; Pappel; Peuplier noir. Peuplier franc (*Gal.*); Poplar (*Ang.*); Topol (*B*); Poppel (*D.*); Chopo (*His. Lus.*); Popelier (*Bel.*); Pioppo o Fioppo (*I.*); Topola czarna (*Pal.*); Asp (*Suec.*).

Ams. An. B. Bel. Br. D. Du. Fer. Gal. GalM. Gen. Han. HassP. His. Sax. Suec. Wir. *Br. Fi. G. M. Sp.* Z

Ein Baum, welcher in ganz Europa wächst. (*Blackw.* t. 248. *Zorn* Ic. pl. t. 577.)

Man wendet die Knospen (oculi s. gemmae Populi, recentes et siccatae), Pappelknospen, Pappelknöpfe, an; sie sind rundlich, länglich, spitzig, gelblichbraun, mit Schuppen von verschiedener Größe, welche über einander liegen, und eine glänzende, mit einem klebrigen, goldgelben, durchsichtigen Safte überzogene Oberfläche haben. Sie haben einen durchdringenden, balsamischen, sehr angenehmen Geruch und einen bittern, brennenden und gewürzhaften Geschmack.

3) *Populus tremula, L.*; Zitterpappel, gemeine Espe; Tremble (*Gal.*); Trembling poplar tree (*Ang.*).

Suec.

Ein Europäischer Baum. (Nouv. Duh. II. t. 887.)

Man wendet die Ausläufer der Wurzel an, welche adstringirende Kräfte besitzen.

Tinctura s. Essentia Populi s. oculorum Populi. (Li. *Vm.*)

℞. Gemmarum Populi recentium
partem unam.
Alcoholis . . . . partes sex.
Infunde frigide et liquorem filtratum serva. (*Vm.*)

Li. Gemmarum partem unam et duas Alcoholis.

Essentia Populi vulneraria. (Wir.)

℞. Gemmarum Populi recentium
semilibram.
Alcoholis concentrati sesquilibram.
Post aliquot dies digestionis cola exprimendo, filtra et colaturae adde
Essentiae Florum Hyperici
semilibram.
Digere per aliquot temporis spatium, tunc destillando Alcoholis dimidium elice et quod remanet serva.

Reizend, äußerlich bei atonischen Geschwüren, innerlich bei Tripper, weißem Fluß, Diarrhöe und Lungenschwindsucht empfohlen. — Gabe, dreißig bis funfzig Tropfen und mehr. — Diese Essenz hat viel Aehnlichkeit mit der tinct. alcoholica hyperici compos.

Unguentum populeum. (Fer. Li. *Br.*)

℞. Gemmarum Populi balsamiferae siccarum . . . . semilibram.
Butyri recentis . libram unam.
Coque lente ad humidi usque consumptionem et cola exprimendo. (Li)

Br. contundere jubet Gemmarum siccarum uncias octo, addere Axungiae liquatae libras duas, tenere in balneo aquae per horas tres in fusione et deinde decanthare; — Fer. digerere per dies septem Gemmarum recentium libras duas in Axungiae libris quatuor contritas.

Diese Salbe ist die einzige, welche den Namen ung. populeum verdient.

Portulaca.

Portulaca oleracea, L.; Portulak; Pourprier commun (*Gal.*); Purslane (*Ang.*); Portulak (*D. Suec.*); Berdolaga (*His.*); Perselein (*Bel.*); Porcellana (*I.*); Kurza noga (*Pol.*); Beldroega (*Lus.*).

Ams. Br. Gal. His. Wir. *Be. G. M. Sp.*

⊙ (Dodecandria Monogynia, L.; Por-

tulaceae, J.) Eine in Europa gebaute Pflanze. (*Blackw.* t. 287. *Schk.* t. 130. *Plenck* t. 361. *Zorn* Ic. pl. t. 489.)

Man wendet das Kraut und den Saamen an.

Das Kraut (herba Portulacae) besteht aus einem rundlichen, glatten, glänzenden, saftigen Stängel und länglichen, keilförmigen, fleischigen, glatten, dunkelgrünen Blättern. Der Geschmack desselben ist wässerig und etwas gewürzhaft.

Der Saame ist sehr klein, nierförmig, gekrümmt, etwas runzelig, schwarz und geschmacklos.

Man zählt ihn zu den sogenannten vier kleinern kalten Saamen. Das Kraut, welches mehr in der Küche als in der Heilkunst gebraucht wird, soll in großer Menge auf einmal genossen, purgiren.

Conserva Portulacae. (*Vm.*)

℞. Foliorum Portulacae partem unam.
Sacchari albi . . partes duas.
Contunde folia, adde saccharum et lente calefac.

Aqua Portulacae. (Gal. Pal.)

℞. Herbae Portulacae partes quinque.
Aquae partes duodecim cum dimidia.

Destillent decem circiter partes; productum infunde Herbae partibus decem, adde Aquae partes decem et destillando denuo partes decem abstrahe. Operationem tertia vice repetere potes. (Gal.)

Pal. Herbae partem unam et quatuor Aquae; destillet pars una cum dimidia.

Potassium.

Ein in der Medicin ungebräuchliches Metall, dessen zahlreiche Zusammensetzungen aber zu sehr mannichfaltigen Zwecken benutzt werden.

Protoxydum Potassii, Potassa caustica s. pura, Kali vegetabile purum s. causticum; caustisches Kali; Protoxide de Potassium, Potasse caustique (*Gal.*).

§. I. Im flüssigen Zustande

Deutoxydum Potassii liquidum, Aqua Potassae s. Potassae purae s. Kali puri, Lixivia caustica, Potassa pura liquida, Liquor Potassae s. Kali caustici s. Potassae causticae, Lixivium causticum s. Potassae purae magistrale s. saponariorum s. causticum vegetabile; Laugenwasser; Solution de Potasse ou de potasse caustique, Potasse liquide, Liqueur des savonniers (*Gal.*). (Am. Ams. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. Li. Lon. LonN. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. *C. Fi. Pid. Sw. Vm.*)

℞. Calcis vivae . . . uncias octo.
Infunde
Aquae . . . . uncias viginti.
Effervescentia cessatâ adde statim
Kali subcarbonici . . uncias sex, dissolutas in Aquae unciis octo. Misce bene totum, tege ad refrigerationem perfectam usque, infunde in infundibulum vitreum, cujus orificium telae panniculo occlusum est, quod prodit in vase subposito recipiens, et simulac nihil amplius profluit, aliquot uncias Aquae in infundibulum effundens, quod repetendum est, donec liquidi librae tres prodierint, ad quod dies duo ad tres requiruntur. (Ed. Fer. Gen. *C. Sw.*)

Es giebt von diesem Verfahren fast eben so viel, jedoch meist geringe Verschiedenheiten als Pharmacopöen

Du. Calcis vivae uncias octo humecta cum Aquae bullientis octariis duabus ad extinctionem usque, admisce tunc Kali subcarbonici uncias sex; massam refrigeratam in infundibulum effunde, cujus collum linteo obstructum est et destillando lixivii octarios tres abstrahe, cujus pondus specificum sit 1,100; — Gal. Subcarbonatis partes duas et unam Calcis cum Aquae communis duodecim solvendo et coquendo in lixivium redige; cola liquorem, inspissa, donec 36° areom. indicet, tunc sepositum ut subsideat decantha; densitas ejus erit 1,334. — Parari potest etiam ex parte una Potassae purae fusae ac duabus Aquae destillatae; — Ams. Bel. Aquae calidae uncias quatuor infunde in Calcis vivae novem, post extinctionem adde Subcarbonatis uncias sex, immitte omnia in infundibulum, cum gossypio obturatum, adde, quum nihil amplius transit, Aquam bullientem, ut lixiviae librae tres obtineantur; — Lon. LonN. Dissolve Potassae libram unam in Aquae octariis duobus, Calcis semilibrae infunde Aquae octarios sex, misce liquores calidos, sepone in vase tecto et post refrigerationem cola: octarius unus uncias sedecim pondere aequat; — R. Exstingue sensim Calcis uncias quatuor in Aquae fervidae pauxillo, adde Aquae fervidae uncias octodecim et tunc Cinerum arenaceorum uncias tres, agita fortiter et post refrigerationem adde Aquae quantum sufficit ut lixivii unciae octodecim obtineantur; — Sax. Dissolve Kali subcarbonicum in Aquae pondere sex-

tuplo, calefac deinde et Calcem pedetentim adde, subinde videndo, num lixivium in acidum aliquod instillatum effervescentiam provocet et statim calcem addere desinendo, hoc si fieri desierit; cola per pannum exprimendo; lava residuum cum Aquae calidae pauxillo, exprime denuo, post subsidentiam decantha et inspissa, donec liquor 36° areom. indicet; — Li. Calcis libras quatuor exstingue cum Aquae bullientis sufficiente quantitate, adde deinde Subcarbonatis uncias sedecim in Aquae libris novem dissolutas, sepone per horas viginti quatuor; liquorem vicissim Calcis et Acidi sulphurici ope, experimento subjice et si a nullo eorum turbatur, filtra in infundibulum, gossypio instructum et si requiritur, vaporationi subjice, donec in vase, Aquae destillatae librae unius capaci, unciae sedecim contineantur; — Ful. Calcis uncias sex exstingue cum Aquae sufficiente quantitate, adde Subcarbonatis uncias tres in Aquae sesquilibra dissolutas, post aliquot tempus filtra in infundibulum, gossypio instructum et liquori prodeunti adde Aquae quantum sufficit ut pondus ejus sesquilibram impleat.

℞. Kali subcarbonici . partes duas.
Calcis . . . . . partes tres.
Misce et adde
Aquae pluvialis partes sedecim.

Coque per semihoram, saepius agitando; cola per linteum dupliciter plicatum, sub finem parumper exprimendo; massam residuam ablue cum
Aquae . . . partibus quatuor.
Evaporet utrumque liquidum commixtum ad octo partium remanentiam; sepone in lagena magna bene obturata, liquidum clarum decantha et in parvas lagunculas distribue. (B.)

Hass. et *Pid.* infundere jubent Aquae fontanae libras sex in unam Calcis vivae, addere, simulac haec est exstincta, Cinerum clavellatorum semilibram, coquere, donec liquor corrodat et plumam anserinam immissam dissolvat et diluere deinde Aquae sufficiente quantitate, tunc filtrare; — Bor. Fenn. Han. O. Pol. RC. Suec. et *Vm.* Subcarbonatis libras duas solvere in Aquae libris decem (viginti), solutioni sensim addere Calcis pulveratae libras tres, coquere per horae quadrantem, spatulae ope agitando, seponere per tempus aliquot, colare et vaporando consumere, donec liquor pondus specificum 1,337 acquisiverit; — HassP. Cinerum clavellatorum libras duas, Aquae sedecim, Calcis vivae sesquilibram vel libras duas in pulverem dilapsas, coquere per semihoram etc.; — Bor4. Kali carbonici e cin. clavell. libras duas cum dimidia, Aquae fervidae duplum, successive ingerere Calcariae ustae pulveratae libras tres, coquere etc. Pond. spec. = 1,330 — 1,340; — Ba. Dissolvere Subcarbonatis depurati partem unam in Aquae communis decem, coquere liquorem et addere, continue agitando, Calcis purae trientes duos; post horae quadrantem bullitionis per linteum colare, residuum cum Aquae communis partibus quinque coquere, lixivia ambo commiscere, per horas viginti quatuor seponere, liquorem deinde decanthare et evaporare donec pondus specificum sit 1,35.

B. proponit, dissolvere Potassae prope ignem fusae partem unam in Aquae destillatae duabus. — Letzteres Verfahren giebt ein schnelleres und in Betreff der Qualität vorzüglicheres Product.

§. II. Im festen Zustande.

Alcali causticum, Causticum alcalinum s. commune s. commune fortius s. potentiale s. salinum, Cauterium potentiale, Kali causticum siccum et fusum, Hydras kalicum s. Potassae purae fusae, Lapis causticus s. causticus chirurgorum s. infernalis alcalinus s. septicus, Potassa fusa s. pura s. caustica s. caustica fusa, Ruptorium commune, Hydras Protoxydi Potassii, Hydras kalicus et kalicus fusus; Aetzkali, Aetzstein; Potasse fondue, Pierre à cautère, Hydrate de protoxide de potassium (*Gal.*). (A. Am. Ams. B. Ba. Bel. Bor. Bor4 Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. L. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sar. Sax. Wir. Würr. *Br. C. Fi. Pid. Sp. Sw. T. Vm.*)

℞. Calcis vivae . . . partes tres.
Infunde Aquae quantum satis ad exstinctionem et adde
Kali subcarbonici purificati
partem unam.

Dilue totum cum multa Aqua, agita bene baculi ope, filtra, ad siccum consume, tunc massam fusam in modulos ferreos adipe obductos vel supra marmor calidum effunde et post refrigerationem in frusta dirumpe. (Würr.)

His. digerere et pulsare simul jubet Calcis vivae libras duas, Kali subcarbonici unam et sedecim Aquae, filtrare deinde, liquorem ad siccum usque evaporare, residuum fundere in crucibulo et supra lapidem calidum effundere.

℞. Kali subcarbonici . partes duas.
Calcis grossiuscule pulveratae
partem unam.

Aquae communis partes duodecim. Coque per semihoram, cola, ad siccum consume, residuum in crucibulo liqua et supra marmor calidum effunde. (Gal. GalM.)

Br. Coque simul Subcarbonatis libram unam, Calcis tres et sedecim Aquae per horae quadrantem, evapora ad siccum et residuum fusum supra lapidem laevem oleo obductum effunde; — *T.* Salis Tartari libras tres in Aquae duodecim solvere ignis ope, addere Calcis duas in Aquae decem exstinctae et per horae quadrantem coquere, filtrare et in lagenis hermetice clausis reponere, donec fluidum transparens sit, decanthare deinde, vaporando ad extracti consistentiam consumere, fundere etc.; — A. Dissolve Subcarbonatis libram unam in Aquae bullientis decem et, continue agitando, adde sensim Calcis vivae pulveratae libras duas; coque per horam unam et diutius, tunc sepone, decantha, consume in tantum, donec massa tranquille olei instar fluat et in modulos vel supra laminam ferream effunde; — Sar. Coque Cinerum sarmentorum calcinatorum l bras quatuor et Calcis vivae duas cum Aquae communis decuplo ad dimidii remanentiam, cola et ad siccum consume; residuum in crucibulo fusum supra lapidem caldum oleo obductum effunde; — *Sp* Coque per horas aliquot Subcarbonatis partem unam, Calcis vivae quatuor et Aquae pondus v cies majus; filtra, ad siccum evapora et residuum leni calore fusum in modulos effunde.

℞. Potassae causticae crystallisatae quantum vis.

Ingere partitim in crucibulum argenteum; aquâ crystallisationis perdita et omnibus aequale fusis et tranquillis, in modulum ferreum calefactum effunde. (*Vm.*)

℞. Lixivii saponariorum quantum vis.

Consume in tantum, donec gutta supra lapidem frigidum dejecta, statim concrescat (*siccum*); massam deinde in crucibulum ingere, calefac, donec olei instar fluat et illam in modulos voluminis plumae anserinae effunde (*fusum*). (Am. B. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Han. HassP. Li. Lon. LonN. O. Pol R. RC. Sax. Suec. Wir. *Br. C. Fi. Pid. Sw.*)

Ams. Ba. Bel. et Gal. lixivium ad siccum evaporare et tunc fundere jubent.

Vm. modulos, in quos alkali fusum ingeritur, oleo non obducere suadet.

Pharmaceutae aliquot potassam guttatim supra lapidem oleo obductum effundere jubent. (*Br.*)

§. III. Im Zuſtande vollkommener Reinheit.

Potassa per Alcoholem. (Gal. *T.*)

℞. Potassae liquidae quantum vis.

Ad siccum consumptam in Alcohole (40°) dissolve et deinde hujus partem unam destillando abstrahe; residuo in pelvi argentea evaporato, cochlearis ope pelliculam nigrescentem, qua liquor tegitur, separa, quod remanet, supra laminam argenteam effunde et post refrigerationem in frusta dirumpe.

T. Lapidis caustici uncias octo in vase cylindrico librarum trium capaci Alcoholis 40° B. infundere et mixta saepius agitare, tunc per horas aliquot seponere, quo facto mixtura tria praebebit strata, e quorum superiore liquorem alcoholicum siphonis ope separa, ad consistentiam oleosam evapora et adhuc calidum supra laminam porphyream oleo illitam effunde, refrigeratum frange et serva.

Das Product iſt reines Potaſſiumprotoxydhydrat, der Aetzſtein dagegen enthält kaliſche, ſchwefel- und ſalzſaure Salze ꝛc.

Die reine Pottaſche iſt im concentrirten Zuſtande ätzend und beizend, mit vielem Waſſer verdünnt, ſtark reizend. Man hat ſie in dieſer Geſtalt als ſäuretilgendes, harntreibendes und beſonders ſteinzerſtörendes Mittel zu 10 bis 15 Tropfen in einem Vehikel angewendet.

Feſt und geſchmolzen dient ſie als Aetzmittel.

Potassa caustica, Potassa cum Calce, Causticum commune mitius. (Am. Du. Ed. GalH. Gen. Lon. LonN. O. *Sp.*)

℞. Liquoris saponariorum octarios tres.

Decoque ad octarii remanentiam et adde

Calcis extinctae . libram unam.

Misce exacte. (Lon. LonN.)

An. Du Ed. *G.* et *C.* liquorem saponariorum ad tertiam partem evaporare et addere deinde Calcis vivae quantum satis ad obtinendam pastam solidam; — *Sp.* dissolvere Potassae causticae partem unam in Aquae tribus, addere deinde Calcis vivae quantum satis ut liquorem totum consumat et pastam proferat.

Henry (GalH.) kali caustico vulgari antequam effundatur, Calcis vivae pulveratae pauxillum addere jubet, quo prohibetur, ne humiditas aëris tam cito absorbeatur.

Dieses Aetzmittel wirkt weniger stark als das vorige.

Pasta caustica Elsii. (B*. Wir.)

℞. Lixivii saponariorum uncias octo.
Decoque ad unciarum duarum remanentiam et liquori bullienti adde
Extracti Opii . drachmas duas.
Calcis vivae . . drachmas sex
vel quod sufficit ut totum humidum absorbeatur.

Lixivium lithontripticum Saundersii. (*Ca.*)

℞. Potassae venalis calcinatae semilibram.
Concharum calcinatarum sesquilibram.
Aquae bullientis libras octo et dimidiam.
Post horas viginti quatuor seposito nis filtra. — Man giebt täglich drei Drachmen auf drei Mal in einem Aufguß von Leinsaamen, wozu man funfzehen Gran gebrannte Magnesia setzt.

Fomentatio Brünningshauseni. (B*.)

℞. Potassae causticae fusae unciam unam.
Aquae communis uncias quadraginta octo.
Dissolve. — Diese Auflösung will man mit Erfolg bei einer mit Convulsionen befallenen schwangeren Frau auf den Unterleib angewendet haben.

Injectio Girtanneri. (B.)

℞. Potassae causticae semidrachmam.
Aquae destillatae . . uncias sex.
Dissolve. — Von Girtanner im Anfang des Trippers zur Verhütung des völligen Ausbruchs empfohlen.

Collyrium Gimbernati. (B*. *Ca. Pie. Sw.*)

℞. Potassae causticae granum unum.
Aquae destillatae unciam unam.
Dissolve alcali in aqua. (B*. *Sw.*)
Ca. et *Pie.* Kali dosin duplam adhibent. — Man läßt einige Tropfen in das mit dem Flecke behaftete Auge einbringen und wäscht dann das Organ mit einer schleimigen Abkochung.

Solutio Cohemi. (B*. *Au.*)

℞. Potassae causticae liquidae guttas decem ad viginti.
Decocti Juniperi . libram unam.
Misce. — Den Tag über zu trinken.

Aqua ophthalmica resolvens. (Ham.)

℞. Potassae causticae granum unum.
Aquae destillatae uncias quatuor.
Extracti Opii . grana quatuor.
Dissolve et filtra.

Solutio Sanoardi. (B*.)

℞. Potassae causticae drachmas duas.
Camphorae . . scrupulos duos.
Sacchari albi . . uncias duas.
Aquae fontanae . . libras duas.
Zum Waschen schmerzloser und mit Fleischwucherungen bedeckter Geschwüre.

Cereoli cum Kali caustico. (*Au.*)

℞. Potassae causticae grana quatuor.
Extracti Opii drachmam unam.
Aquae . . . . . uncias duas.
Gummi Arabici quantum sufficit ut solutio spissa fiat, in quam filas immersas sicca, hoc modo continuando, donec cereoli satis sint spissi.
Hecker empfahl diese auflöslichen Bougies bei chronischem Tripper.

Tinctura Metallorum s. Antimonii tartarisata s. Stibii alcalisata s. Antimonii acris s. Antimonii alcalina s. Antimonii nigra s. Antimonii balsamica s. Salis Tartari s. Tartari s. alcalina s. kalina s. alcalina acris, Alcohol Potassae s. alcalisatum, Spiritus potassatus, Solutio alcoholica Potassae; scharfe Spießglanztinctur. Kalitinctur. (Ba. Bor. Bor4. Br. Ful. Han. HassP. Li. O. Pal. Pol. Sar. Sax. Wir. Wür. *Sp Sw. Vm.*)

℞. Reguli Antimonii martialis uncias duas.
Cupri,
Stanni, singulorum unciam unam.
Liqua simul, pulvera amalgama et pro partiunculis cum Nitri unciis duodecim detonare fac; ignem ita auge ut residuum in scorias virescentes redigatur, cui deinde pulverato infunde
Alcoholis . . . . sesquilibram.
Liquorem, postquam fusco - rubrum colorem accepit, filtra. (Br. *Sp.*)

℞. Reguli Antimonii martialis uncias tres.
Nitri depurati uncias octodecim.
Mixta pro portionibus in crucibulum rubre excandescens injice et post deflagrationem per horae spatium calcina, tunc massam fusam in mortarium ferreum cum creta tritum infunde et in pulverem redige, cui adhuc calido in retortam ingesto infunde
Alcoholis concentrati uncias quadraginta octo.
Decantha et post tres dies digestionis filtra. (Ful.)

Li. Reguli sesquiunciam, Nitri uncias novem et Alcoholis libras duas; — Wir. Reguli uncias quatuor, Nitri viginti et Alcoholis sesquilibram; — Br. Reguli libram unam, Nitri tantidem et Alcoholis sesquilibram; — *Sp.* Reguli

uncias quatuor, Nitri octo et duodecim Alcoholis.

℞. Antimonii crudi . . semilibram.
Kali subcarbonici libram unam.

Mixturam in crucibulo fusam in scorias flavescentes redige, contunde deinde in mortario ferreo calefacto et pulveri infunde

Alcoholis . . . . libras tres.

Post tres dies cola. (Br. Pal. Sar. Wir. Würr. *Sp. Sw.*)

℞. Antimonii crudi . . uncias sex.

Liquatis in crucibulo adde

Nitri siccati . . sesquiunciam.

Igne per horae quadrantem alito, massam pulveratam coque cum

Nitri fixi . . . . unciis octo

in Aquae libris duabus dissoluti ad syrupi consistentiam usque et, magmati infunde

Alcoholis . . . libram unam.

Post sufficientem digestionem decantha. (Br.)

℞. Reguli Antimonii medicinalis adhuc calidi et pulverati
uncias quatuor.

Infunde lixivium praeparatum e

Kali subcarbonici . . unciis sex.
Aquae communis . unciis octo.

Coque ad pultis consistentiam et adde

Alcoholis concentrati uncias decem.

Digere calore blandissimo, saepius agitando, donec liquor colorem nigrescenti-rubrum acquisiverit. (Ful.)

℞. Kali subcarbonici . uncias sex.

Calcina fortiter in crucibulo et contuso adhuc calido infunde

Alcoholis concentrati
uncias duodecim.

Digere e balneo arenae, donec liquor ruber sit redditus. (Br. Ful. Pal. Sar. Wir. Würr. *Sw.*)

Sp. calcinare jubet Salis Tartari uncias octo cum tribus Calcis vivae per horam unam et residuum digerere cum Alcoholis concentrati unciis viginti quatuor; — Wir. calcinare fortiter Salis Tartari uncias sex cum Pulveris Carbonum sesquiuncia et residuum digerere cum Alcoholis libra una.

℞. Potassae causticae partem unam.
Alcoholis concentrati partes octo.

Digere in balneo arenae per dies aliquot. (B. Bor. Han. O. Pol. Sax. *Vm.*)

Bor4. HassP. Kali caustici sicci recenter parati uncias quatuor cum Spiritus Vini alcoholisati libris duabus calefacti agitare et digerere.

Man braucht dieses Präparat heutzutage nur wenig; es gilt als reizend, eröffnend, harn- und schweißtreibend. — Gabe, zwanzig bis sechzig Tropfen.

Mixtura tonico-nervina Stahlii. (B*. Br. Ful. Pal. Sax. Wir. *Sp.*)

℞. Tincturae Antimonii acris
uncias duas.
Spiritus Cornu Cervi rectificati
unciam unam.

Misce sedulo — Reizend, eröffnend, auflösend, schmelzend, nervenstärkend, krampfstillend, schweiß- und harntreibend. — Gabe, dreißig bis funfzig Tropfen.

Tinctura salina. (Sar.)

℞. Potassae purificatae uncias sex.
Corticis recentis Aurantiorum,
Radicis Gentianae pulveratae,
singularum sesquiunciam.
Aquae destillatae . sesquilibram.

Post dies quatuor digestionis adde

Alcoholis rectificati uncias octo.

Digere denuo per horas viginti quatuor et filtra. — Gabe, eine bis zwei Drachmen.

Mixtura resolvens spirituosa. (Ful.)

℞. Tincturae Antimonii nigrae
unciam unam.
— Pimpinellae albae
drachmas sex.
— Succini . drachmas tres.
Saponis Alicantini rasi
drachmas duas.

Misce et dissolve. — Diese Mixtur, welche sehr gut statt der Dippel'schen Seife gebraucht werden kann, gilt als reizend, tonisch, balsamisch, schmelzend, krampfstillend, nervenstärkend, harn- und schweißtreibend. — Gabe, vierzig bis siebenzig Tropfen.

Sapo chimicus Dippeli. (Wir.)

℞. Kali subcarbonici libram unam.
Antimonii crudi . . semilibram.
Limaturae Cupri . uncias tres.

Mixta et liquata contunde, antequam sint refrigerata, adde Olei Juniperi vel Terebinthinae uncias novem, ut fiat pulus; infunde deinde Alcoholis concentrati quantum sufficit ut digitorum aliquot crassitiem tegatur; digere per plures dies et liquidum coloratum decantha; digestionem bis terve cum novo Alcohole repete; tincturas commisce, destillando spiritus partem unam abstrahe et reliquo Saponem Venetum cum Balsami Peruviani pauxillo adde.

Ein sehr unrichtiges Präparat, welches Dippel äußerlich als auflösend und schmerzstillend, bei Podagra und Frostbeulen empfahl.

Protoxysulphuretum Potassii, Sulphuretum Protoxydi Potassii, Sulphuretum Potassae s. Lixiviae s. Kalii cum

Sulphate kalico s. kalicum, Hepar Sulphuris s. Sulphuris salinum s. Sulphuris vulgare, Kali sulphuratum; Schwefelleber, Schwefelkali; Protoxisulfure de potassium, Sulfure de protoxide de potassium, Sulfure de potasse, Foie de soufre (*Gal.*). (A. Am. Ams. An. B. Ba. Bor. Bor4. Br. D. Du Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Hass. HassP. Li. Lon. LonN. O. Pol. R. RC. Sax Suec. Wir. Wür. *Br. C. Fi. Sw. T. Vm.*)

§. I. Im festen Zustande.

℞. Sulphuris sublimati partem unam.
Kali subcarbonici . partes duas.

Liqua simul in retorta (crucibulo), igne gradatim aucto (massam homogeneam in laminam ferream aut in mortarium ferreum) et post refrigerationem vase dirupto, contentum statim in lagenam ingere et serva. (A. B. Bor. Bor4. Br. D. Ed. Fenn. Gal. GalM. Han. Hass. HassP. Li. Lon. LonN. O. Pol. R. Wir. Wür. C. *Sw. T.*)

Bor4. et HassP. Kali sulphuratum e Sulphure depurato et Kali carbonico e Tartaro; *Kali sulphuratum pro balneo* e Sulphure citrino et Kali carbonico e Cinerib. clav. parare jubent.

Es ist wichtig, die Masse so lange zu erhitzen, bis sie ruhig wie Wasser fließt; denn sobald sie aufschwillt, enthält sie Kohlensäure. Auch müssen die Flaschen, in welchen man sie aufbewahrt, vorher erwärmt werden, um die Luft und Feuchtigkeit herauszuziehen

Vm. terere simul jubet Subcarbonatis pulverati partes sex cum dimidia et tres Florum Sulphuris et mixturam in crucibulo liquefacere; — Ba. Subcarbonatis partes quatuor et tres Sulphuris; — Du. Fer. Li. Sax. Suec. RC. *Br.* et *Fi.* singulorum partes aequales. — Die letzteren Verhältnisse, welche auch Bauquetin hat, geben eine Mischung von schwefelsaurem und Schwefelkali mit einem Ueberschuß von Schwefel.

Béral Potassae partes quindecim et Sulphuris quadraginta; — hat das Unangenehme, daß es wegen des darin enthaltenen Schwefeleisens beim Baden die Haut grün färbt.

Henry Subcarbonatis Potassae e combustione Tartari partes duas et unam Sulphuris in baculis pulverati in retortam pro tribus trientibus inde replendam immittere, vas supra balneum arenae collocare et igne primum blando deinde sensim aucto massam liquefacere.

℞. Sulphuris in baculis partem unam et tres quadrantes.
Potassae causticae fusae partes quinque cum dimidia.

Misce simul et in retorta super balneo arenae liqua. (*Vm.*)

Van Mons nennt dieses Präparat *Sulphuretum simplex Potassae*, ein Name, den man auch dem Sulfüre giebt, welches durch Zersetzung des Sulphats mittelst Kohle bei hoher Temperatur entsteht. In Betreff der Bereitung seines *Supersulphuretum Potassii* zeigt er zu dessen Gewinnung folgende Formel an:

℞. Sulphuris in baculis partes quinque et dimidiam.
Potassae causticae fusae partes tres.

Liqua in retorta vitrea super balneo arenae gradatim calefacto.

§. II. Im flüssigen Zustande.

Aqua Sulphureti Kali s. Potassii (Du. *C.*)

℞. Florum Sulphuris . semunciam.
Potassae causticae liquidae uncias novem.

Coque per sexagesimas decem et filtra. Pond. spec. est 1,120.

Reizend, erregend und anspornend, in hoher Gabe giftig, in vielen Fällen Auswurf und Ausdünstung befördernd, äußerlich austrocknend. Man hat es gegen Asthma und Croup angewendet, jedoch ohne sonderlichen Nutzen, bei alten Catarrhen, chronischen Rheumatismen, Gicht, Krebs, Flechten, Krätze, Kopfgrind und einer Menge anderer Krankheiten des Hautgewebes. Auch hat man es als Gegengift gegen Arsenik und Blei benutzt. — Gabe, fünf bis fünfzehen oder zwanzig Gran.

Säuren und säuerliche, metallische oder erdige Salze dürfen nicht damit verbunden werden, da sie es zersetzen würden.

Pulvis ad s. contra ptyalismum s. salivationem. (*Bo. Sm.*)

℞. Sulphureti Potassii scrupulos quatuor.
Cremoris Tartari drachmas quatuor.

Divide in partes viginti quatuor. — Hahnemann empfahl dieses Pulver gegen Mercurialspeichelfluß. Der Kranke nimmt drei Stück, Morgens, Mittags und Abends, in einem halben oder ganzen Glase Zuckerwasser. Ungeachtet aller Lobeserhebungen, welche man diesem Pulver gemacht hat, ist es, wie alle andere Ableitungsmittel, oft sehr unwirksam.

Pilulae Carbonum kalinae. (*Au.*)

℞. Sulphureti Potassii drachmam unam.

Extracti Cardui benedicti,
Carbonis pulverati,
singulorum grana (drachmas?) duo.
Fiant pilulae granorum duorum. — Gabe, funfzehen bis zwanzig Stück täglich viermal, bei Lungenschwindsucht.

Sapo sulphurato-ceratus s. antisialagogus Singeri. (Ba.)

℞. Sulphureti Potassii partem unam.
Aquae bullientis . partes duas.
Dissolve et adde
Cerae flavae . . partem unam.
Consume, agitando continue, donec massa non amplius digitis adhaereat; tunc in modulos chartaceos effusam refrigefac.

Linimentum saponato-hydrosulphuratum, Unguentum s. Pomatum de Jadelot. (B*. Gal, *Au. Ca, Fi.*)

℞. Sulphureti Potassii . uncias sex.
Diem antea in Aquae ponderis tertia parte solutum tritura cum solutione e
Saponis albi rasi . libris duabus in Olei Papaveris libris quatuor et adde
Olei essentialis Thymi
drachmas duas.
Bei Krätze empfohlen. — Gabe, eine Unze auf die Einreibung. (B*. *Au. Ca.*)

℞. Saponis communis
partes quinquaginta.
Liqua in balneo aquae in vase vitreo et adde
Olei Papaveris
partes viginti quinque.
Commisce triturationis ope intime et adde deinde
Sulphureti Potassii pulverati
partes decem.
Tritis bene, adde
Olei Papaveris
partes septuaginta quinque.
Misce sedulo. (Gal.)

Ra. Sulphureti uncias sex, Aquae duas, Saponis libras duas et Olei Olivarum tantidem.

Henry (GalH.) Saponem in Aquae parva quantitate mollefacere, evaporare in balneo aquae, addere deinde Oleum per portiunculas, mixturam agitare, semper in aquae balneo, donec bene sit homogenea, infundere illam deinde in patinam vernice obductam et cum ea, pistilli lignei ope continue agitando, Sulphuretum sensim commiscere.

Mit diesem Präparat hat das *Pomatum sulphuro alcalinum* Albert's Aehnlichkeit, welches ebenfalls bei der Behandlung der Krätze angewendet und aus zwei Theilen Schwefelblumen, einem Theil gereinigter Potasche und acht Theilen Schmeer bereitet wird. (*Ra.*)

Sulphuretum Potassae martiale. (Fer.)

℞. Kali subcarbonic.,
Sulphuris,
singulorum unciam unam.
Aethiopis martialis drachmas duas.
Liquata in crucibulo supra laminam marmoream effunde et post refrigerationem in frusta frange. — In drei- oder viergranigen Pillen oder zu einem Scrupel in zehen Unzen Wasser, löffelweise genommen.

Emplastrum resolvens et anticancrosum. (*Bo.*)

℞. Sulphureti Potassii,
Pulveris Cicutae,
singulorum drachmas duas.
Camphorae pulveratae,
Terebinthinae,
singularum drachmas quatuor.
Saponis albi . . semidrachmam.
Cerae flavae . . unciam unam.
Emplastri simplicis uncias quatuor.
Zur Auflösung lymphatischer Drüsengeschwülste empfohlen.

Solutio Hepatis Sulphuris. (Ham.)

℞. Kali sulphurati . . semunciam.
Aquae destillatae . uncias tres.
Solutionem filtra.

Aqua Kali sulphurati, Potio sulphurosa. (*Au.*)

℞. Kali sulphurati drachmam unam.
Aquae . . . . libram unam.
Sacchari . . drachmam unam.
Als Gegengift bei Arsenikvergiftung empfohlen.

Potio ad s. contra herpetem. (*Ca.*)

℞. Sulphureti Potassii
grana quadraginta.
Aquae . . . . libram unam.
Solutionem filtra.

Balneum sulphuratum. (*B. Ra.*)

℞. Sulphureti Potassii uncias duas.
Aquae communis quantum sufficit pro balneo, circiter libris centum.

Balneum sulphuratum et gelatinosum Dupuytrenii. (*Ra.*)

℞. Sulphureti Potassii uncias quatuor.
Aquae communis libras ducentas.
Solutioni infunde
Collae flamandicae albae
libras duas
dissolutas in
Aquae bullientis . libris decem.

Balneum resolvens. (*Sm.*)

℞. Sulphureti Potassii unciam unam.

Salis marini . . . uncias duas.
Sodae . . . drachmas quatuor.
Foliorum Salviae
manipulum unum ad duos.

Coque omnia per horas viginti quatuor in
Aquae communis . octariis sex.

In Waschungen, Douchen oder Bähungen bei spina ventosa oder Scropheln. Ist Eintauchen möglich, so muß dieß eine halbe Stunde lang dauern und drei oder viermal täglich wiederholt werden.

Syrupus de Sulphureto Potassae s. Sulphuris s. Kali sulphurati, Arcanum bechicum Willisii, Syrupus Hepatis Sulphuris s. bechicus. (B*. Gal. Wir. *Au. Br*. Ca. T.*)

℞. Sulphureti Potassae semunciam.
Aquae Hyssopi vel Foeniculi
semilibram.
Sacchari albi uncias quindecim.

Dissolve sulphuretum frigide et saccharum in balneo aquae solve. (Gal.)

Br.* Sulphureti drachmas duas, Aquae Foeniculi uncias octo et Sacchari uncias quindecim; — *T.* Sulphureti semunciam, reliqua ut B*.; — *Ca.* Sulphureti drachmas duas, Aquae Foeniculi semilibram et Sacchari libram unam.

℞. Sulphureti Potassae semunciam.
Aquae fontanae,
— Foeniculi, singularum uncias quatuor cum dimidia.

Solutioni adde
Sacchari albi . uncias sedecim.

Coque ad syrupi consistentiam et cola. (B*. Wir. *Au.*)

Willis digerere jubebat Sulphureti uncias duas in Vini Hispanici libris tribus per horas viginti quatuor, liquorem filtrare et in illo solvere Sacchari libras duas. (*Ca.*)

Boullay et *Planche* formulam sequentem proposuerunt:

℞. Sodae purae cum Alcohole paratae . . . drachmam unam.
Aquae destillatae drachmas quinque.

Calefac et adde Sulphuris puri tantum quod dissolvi potest; liquidi unciam unam cum Syrupi communis unciis triginta et una commisce et mixturam in lagena bene obturata agita.

Von Chaussier bei catarrhalischen Lungenaffectionen und Croup empfohlen. Befördert die Schleimsecretionen, bewirkt bisweilen Erbrechen oder Stühle und begünstigt die Ausdünstung. — Gabe, einen Kaffeelöffel für Kinder, einen oder zwei Eßlöffel für alte Personen.

Solutio Sulphureti Potassae alcoholica. (*Vm.*)

℞. Sulphureti Potassae siccati
quantum vis.
Alcoholis . . quantum sufficit.

Dissolve blandi caloris ope, liquorem post refrigerationem filtra et in lagena in collum inversa serva.

Vm. hoc praeparatum iterum sub nomine *Tinctura Sulphuris* (Teinture de soufre) indicat et parare jubet dissolvendo Sulphureti Potassae partem unam in Aquae Vitae duodecim. Eadem ipsa Tinctura Sulphuris etiam a *Sar.* et *Sp.* — Sar. Sulphuris uncias duas cum Subcarbónatis uncia una liquare et productum contusum cum Alcoholis libra una digerere jubet; — *Sp.* eodem modo procedit, sed productum per dies aliquot cum Alcoholis unciis octo digerere jubet. — Ehedem wurde diese Tinctur gegen Krätze empfohlen. — Gabe, sechszig Tropfen.

Boli in ptyalismo mercuriali s. contra salivationem. (*B.*)

℞. Sulphureti Potassae grana tria.
Roob Sambuci quantum sufficit.

Fiant boli sex. — Gabe, ein Stück alle drei Stunden.

Subprotocarbonas Potassii, Subcarbonas Protoxydi Potassii, Subcarbonas Potassii.

§. I. Im festen Zustande.

A. Unrein.

Carbonas Potassae venale s. impurum s. alcalinus s. kalicus crudus, Cineres clavellati, Carbonas Lixiviae alcalinus, Alcali vegetabile aëratum, Hypercarbonas Potassae venale, Kali carbonicum s. carbonicum crudum s. subcarbonicum crudum s. carbonicum impurum, Alcali fixum vegetabile impurum, Potassa impura s. venalis, Subcarbonas Potassae impurus s. crudus s. kalicum impurum; käufliches; unreines, kohlensaures Kali rohe Pottasche; Potasse, Potasse du commerce (*Gal.*). (Am. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *C. Fi. Par. Pid. Sp. T.*)

Dieß ist ein Gemisch von kohlensäuerlichem, schwefel- und salzsaurem Kali, Kalk und Magnesia, Kieselerde, Eisenoxyd und bisweilen von Braunsteinoxyd in sehr verschiedenen Verhältnissen.

B. Rein.

1) Reinigen der käuflichen Pottasche.

Kali praeparatum s. carbonicum, Lixivia purificata, Cineres clavellati depurati, Sal cinerum clavellatorum depuratus, Subcarbonas kalicum depuratum, Alcali Lignorum depuratum, Carbonas superpotassicus purus s. depuratus; gereinigte Pottasche, kohlensaures Kali; Potasse préparée, purifiée (*Gal.*). (Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Du. Ed. Fenn. Ful. GalM. Han. Hass. HassP. Li. Lon. LonN. R. Sax. Suec. Wür. *C. Fi. Pid. Sp. Sw. T. Vm.*)

℞. Potassae venalis pulveratae,
Aquae frigidae,
singularum partes aequales.

Misce, subinde agitando, sepone deinde per dies septem aëri exposita, cola, et in vase ferreo, continue agitando, ad siccum consume. (An. Bel. Du. Ful. Han. Hass. Li. R. Sax. *Pid. Sp.*)

℞. Potassae venalis . partem unam.
Aquae bullientis . partes tres.

Coque per horae quadrantem, liquorem adhuc calidum decantha, et sepone per horas viginti quatuor in patina ut sales subsideant; cola, ad dimidium consume, ad locum frigidum repone et ad siccum usque deinde consume. (Ba. Bor.)

Bor4. Kali carbonici crudi partem unam cum Aquae ferventis duabus ad cuticulam evaporare, per aliquot dies seponere, liquorem a crystallis decanthare et ad siccum evaporare, Aquae destillatae frigidae aequali quantitate solvere, solutionem filtrare et leni calore ad siccum evaporare; — HassP. Salis et Aquae partes aequales macerare donec dilapsa sint, liquorem ad cuticulam evaporare etc. ut antea; — *Fi. T.* Salis partem unam, Aquae quatuor, caeterum ut HassP.; — Lon. LonN. Potassae libras tres in Aquae ferventis octariis tribus cum dimidio liquare, colare, lente consumere ut liquor spissescat, dein igne subducto assidue agitare, donec sal in granula abeat.

℞. Potassae venalis . partem unam.

Calcina fortiter in crucibulo ferreo et infunde deinde per tres dies in
Aquae . . . . . partes tres
subinde agitando. Decantha, lava residuum, donec aqua colores vegetabiles coeruleos non amplius virides reddat, liquores commixtos ad pelliculae apparitionem consume, per aliquot dies sepone, decantha, sales alienos separa et reliqua vaporando ad siccum redige. (Ams. Bel. GalM. Lon. Wür.)

Ed. *C.* et *Sw.* Aquae et Salis partes aequales; — Fenn. et *Sw.* Potassae partem unam et Aquae unam cum dimidia.

℞. Potassae venalis,
Aquae frigidae,
singularum partem unam.

Stent, subinde agitata, per horas viginti quatuor; filtra deinde et ad siccum consume; residuum, usque rubroalbum coloretur, calefac in crucibulo, dissolve deinde in Aquae parte una cum dimidia, filtra liquorem et eo lente refrigerato, altero die crystallos formatas separa et sicca. (*Vm.*)

Wenn man nach *Vm.* die käufliche Pottasche dadurch reinigt, daß man die Auflösung bis zum Salzhäutchen abdampft, um den crystallisirbaren Salzen ihr Wasser zu entziehen, so kann man so viel von diesen sogenannten fremdartigen Salzen trennen, daß am Ende kein Alcali übrig bleibt. Bei Befolgung des eben beschriebenen Verfahrens hat derselbe die Crystallisationsfähigkeit des kohlensauren Kali erkannt.

Unter dem Namen *Gallatocarbonas Potassae*, Gallato-carbonate de potasse hat man ein Präparat beschrieben, welches für ein neutrales kohlensaures oder doppelt kohlensaures Salz ausgegeben wird, in der That aber nur ein kohlensäuerliches Salz ist; die Formel dazu ist folgende:

℞. Subcarbonatis Potassae quantum vis.

Dissolve in Aquae quam minima potest quantitate, filtra liquorem et tannini ope in pastam siccam redige, quae in crucibulo per horam dimidiam fortiter ad ruborem usque candeat; post refrigerationem massam in Aqua dissolve et liquorem filtratum ad siccum consume. (*Sw.*, *Vm.*)

2) Bereitung des Salzes durch Verbrennen des Weinsteins.

Sal Tartari, Cineres clavellati, Alcali Tartari, Carbonas Potassae purissimus, Alcali vegetabile aëratum, Kali carbonicum s. Carbonas kalicus e Tartaro, Kali subcarbonicum purissimum; Weinsteinsalz; Sel de tartre, Cendres clavelées (*Gal.*). (A. Ams. Ba Bor. Bor4. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. His. Lon. LonN. Lus. O. Pal. Pol. RC. Sar. Sax. Suec. Wir. Würr. *Br. C. Sp. T. Vm.*)

℞. Crystallorum Tartari quantum vis.

Ad ruborem usque calefac in crucibulo argenteo, donec fumus non amplius evolvitur, residuum grossiuscule pulveratum in illo ipso crucibulo, saepius agitando, per horas duas torre, coque deinde cum Aquae duplo pondere per horae quadrantem; decantha liquorem clarificatum, quam operationem ter e serie repetes, filtra lixivia commixta, ad siccum in pelvi argentea

consume, sub finem saepius agitando, et denique ad rubrum usque calefac massam penitus refrigeratam in lagena bene obturata servando. (Du.)

Ba. Fenn. et Sax. Crystallos Tartari itidem praescribunt; omnes reliquae pharmacopoeae indicant vel Tartarum crudum vel Residuum e destillatione tartari et priorem in crucibulo vel aheno ferreo vel denique inter prunas in charta involutum ad alborem calcinari jubent et donec nullum fumum amplius emittat; — HassP. itidem ad alborem et donec sine flamma seu fumo candeat urere, residuum adhuc calidum, pulveratum in Aquae bullientis sextuplo solvere, filtrare, per horas 24 seponere et ad siccum consumere jubet.

GalH. melius procedi dicit miscendo Tartarum cum quarta parte Carbonis vegetabilis pulverati et mixta in parva crucibula inter strata carbonum disposita ingerendo.

3) Bereitung des Salzes durch Einäschern des Salpeters mit Kohle:

Nitrum fixum. (Gal Sar. *Sp. Sw. T. Vm.*)

℞. Nitri puri . . . . quantum vis.

Liqua in crucibulo, in illud injiciendo per vices Carbonem grossiuscule pulveratum, donec flamma non amplius appareat; residuum deinde calcina per horae quadrantem, dissolve in Aqua et filtratum liquorem ad siccum consume.

GalH. calcinare fortiter jubet ut remaneat hyponitris, saepius in producto occurrens.

4) Bereitung des Salzes durch Einäschern des Salpeters und des Weinsteins.

Nitrum per Tartarum fixum. (Fer. Gal. *Fi. T. Vm.*)

℞. Nitri puri,
Cremoris Tartari,
singulorum partes aequales.

Ingere mixta in mortarium ferreum, accende carbonem ardentem appropinquando, dissolve residuum in Aquae sufficiente quantitate et liquorem colatum ad siccum consume. (Fer. Gal. *Fi.*)

T. Cremoris Tartari crudi partes duas et unam Nitri in crucibulo per aliquot tempus igni exponere, agitare, deinde in laminam marmoream effundere et post refrigerationem cum Aqua bulliente tractare etc.; — *Vm.* Tartari partem unam et duas Nitri. — Diese Formel ist der des Codex gall. vorzuziehen, welche ein mit Salpeter gemischtes Salz giebt.

Man muß übrigens das Gemisch in einen kaum gerötheten Schmelztiegel werfen, die Masse sogleich nach dem Einäschern auslaugen und die Flüssigkeit bis zur Trockenheit abdampfen. Bewirkte man, statt so zu verfahren, die Einäscherung bei hoher Hitze so daß das kohlensäuerliche Kali in einen Zustand teigiger Schmelzung gebracht würde, so erhielt man letzteres, nach Guibourt's interessanter Bemerkung mit blausaurem Kali gemischt.

5) Bereitung des Salzes durch doppelte Zersetzung:

℞. Carbonatis Barytae
uncias duodecim.
Sulphatis Potassae
uncias quindecim.
Pulveratis infunde
Aquae bullientis
uncias viginti quatuor.

Mixta agita bene, post refrigerationem liquorem filtra et ad siccum redige. (*Sw*.*)

6) Bereitung des Salzes durch Verbrennen von Pflanzen:

Sal Tachenianus, Sal lixiviale Tachenii. (Br. Ful. Gal. His. Pal. Sar. Wir. Wür. *Sp. T.*)

℞. Herbae siccae Absinthii
quantum vis.

Ingere in ollam ferream tectam igni modico superponendam, ita ut lente uratur et magnam fumi copiam sed minime flammam emittens in carbonem redigatur; tunc operculo semoto carbonem torre, continue cum baculo agitando; coque cinerem cum Aquae pondere sextuplo, cola liquorem bullientem et ad siccum consume.

Auf dieselbe Weise wie dieses *Sal Absinthii* bereitet man das

Sal Cardui benedicti. (His. Sar.)
Sal Centaurii minoris. (A. Gal. Sar.)
Sal Ligni Juniperi. (Sar.)
Sal Ononidis. (Sar.)
Sal Tamarisci. (Sar.)
Sal Stipitum Fabarum. (Sar.)

Das in diesen Fällen erhaltene Kali führt den Namen der Pflanze, von welcher es gewonnen ist; jedoch ist es darum immer dasselbe.

Ful. coquere jubet Carbonem productum e combustione Absinthii sicci unius librae cum Potassae purificatae untiis duodecim in Aquae sufficiente quantitate dissolutis, decoctumque ad siccum evaporare. — Ein lächerliches Verfahren.

Man darf das kohlensäuerliche Kali nicht mit Mineralsäuren, mit Borax, mit salzsaurem und essigsaurem Ammoniak, mit Alaun, schwefelsaurer Bittererde, Kalk, Kalkwasser und nicht mit Metallsalzen verbinden.

Sapo vegetabilis, Pulvis gummosus alcalinus. (*Gal.*)

℞. Subcarbonatis Potassae crystallisati . . . . partes quatuor.
Gummi Arabici pulverati partes triginta duas.
Tritura simul per longum tempus.

Pulvis anticolicus Camerarii. (Wir.)

℞. Salis Absinthii,
— Chamomillae,
singulorum drachmas tres.
Crystalli rupestris praeparatae semunciam.
Cornu Cervi praeparati drachmas sex.
Rasurae Eboris . . uncias duas.
Fiat pulvis tenerrimus. — Camerarius rühmte dieses Pulver bei Krankheiten von Säure in den ersten Wegen. — Gabe, ein bis zwei Scrupel für Erwachsene, ein halber Scrupel für Kinder.

Pulvis digestivus. (Pal.)

℞. Salis Absinthii drachmas decem.
Cremoris Tartari . drachmas sex.
Kali sulphurici,
Diagrydii sulphurati, singulorum scrupulos duos et grana quinque.
Elaeosacchari Citri unciam unam.
Fiat pulvis. — Bei Unterleibsverstopfungen empfohlen. — Gabe, von einem Scrupel bis zu einer Drachme.

Liquor Salis Tartari s. Kali carbonici s. Kali subcarbonici, Liquamen Salis Tartari, Hypocarbonas Potassae liquidum, Lixivium Tartari s. Alcali vegetabilis, Aqua Kali, Alcahest Glauberi, Carbonas Lixiviae alcalinus solutus s. Potassae alcalescens liquidus, Solutio aquosa Subcarbonatis Potassae; flüssiges Weinsteinsalz, kohlensäuerliche Kaliflüssigkeit; Solution aqueuse de sous-carbonate de potasse, Liqueur de sel de tartre (*Gal.*).

1) Von selbst entstanden. *Oleum Tartari per deliquium, Sal Tartari per se liquidus.* (Br. Du. Hass. Pal. RC. Sar. Wir. Würr. *Fl. Pid. Sp. Sw. T.*). Obtinetur seponendo Subcarbonatem crystallisatum ad locum humidum ita ut deliquescat et liquorem filtrando.

2) Besonders bereitet. Da der Sättigungsgrad dieser Flüssigkeit unendlich verschieden ist, wie man leicht einsehen wird, so hat man vorgeschlagen, sie mittelst bestimmter Verhältnisse des Salzes und des Wassers zu bereiten, nämlich:

His. Salis partem unam et Aquae dimidiam; — Am. An. Lon. LonN. et *C.* Salis et Aquae partes aequales; — *Sw*. Vm.* Salis unam et Aquae unam cum dimidia; — A. Ba. Bor. Bor4. D. Fenn. HassP. Li. O. Pol. Sax. Suec. Salis unam et duas Aquae (Pond. spec. 1,325 — 1,335 Bor4.; 1,300 = 40° Ar. B. HassP.); — Lus. R. RC. Salis unam et tres Aquae; — Wir. Salis unam et quatuor vel quinque Aquae; — Ful. Salis unam et Aquae quantitatem sufficientem.

Diese Auflösung wird äußerlich als Schönheitsmittel angewendet; innerlich als absorbirend, reizend, einschneidend, reinigend und harntreibend.

Solutio lithontriptica. (B*. *Au.*)

℞. Kali subcarbonici drachmas novemdecim et grana duodecim.
Aquae communis uncias quindecim.
Dissolve. — Gabe, einen bis zwei Scrupel täglich drei Mal, (B*.)

Au Subcarbonatis drachmas tres, Aquae libras duas; solve. — Täglich zu trinken.

Lotio antirachitica Bonhomme. (*Pie.*)

℞. Kali subcarbonici calcinati semunciam ad unciam unam.
Aquae purae . . libram unam.
Dissolve.

Pediluvium alcalinum. (*Ra.*)

℞. Kali subcarbonici . uncias octo.
Aquae communis calidissimae quantum sufficit pro pediluvio. — Reizend, ableitend.

Tisana alcalina Mascagni. (*Sm.*)

℞. Kali subcarbonici drachmas duas.
Aquae communis . libras duas.
Dissolve. — In vier und zwanzig Stunden zu kleinen Löffeln, jeden mit einem Kaffeelöffel syrupus gummi Arabici, althaeae oder pulmonis vitulini versüßt. Mascagni empfahl ihn bei chronischer Pneumonie.

Potio lithontriptica. (*E.*)

℞. Kali subcarbonici drachmas duas.
Aquae Calcis . , octarios duos.
Gabe, alle zwei Stunden ein Glas in Milch.

Lixivium juniperinum s. cum Juniperc. (*Sa.*)

℞. Cinerum Ligni juniperini uncias tres.
Aquae communis . libras duas.
Digere per horas duodecim inter cineres calidos et filtra.

Auf dieselbe Weise bereitet man das *Lixivium Absinthii, Genistae* und *Tamarisci.*

Tisana antidysenterica. (*Sm.*)

℞. Cinerum Sarmentorum Vitis viniferae . . . drachmas quatuor.
Aquae communis sextarios (setiers) tres cum dimidio.
Coctione partem tertiam consume. — In vier und zwanzig Stunden zu trinken. — Man vermischt diesen Trank mit einer gleichen Menge Wasser.

Collutorium alcalinum. (GalM.)

℞. Kali subcarbonici . partem unam.
Mellis despumati . partes viginti.
Tritura simul in mortario vitreo.

Syrupus alcalinus. (Gen.)

℞. Kali subcarbonici drachmas tres.
Syrupi Sacchari . . uncias sex.
Dissolve.

Lotio ad s. contra perniones. (B*.)

℞. Kali subcarbonici unciam unam.
Aquae Rosarum . libram unam.
Solutionem filtra. — Brugnatelli empfiehlt Leinen in diese Flüssigkeit getaucht auf die Frostbeulen zu legen.

Potio ad strumam s. antistrumosa. (*Sm.*)

℞. Subcarbonatis Potassae,
Ipecacuanhae,
Mercurii dulcis,
singulorum sesquidrachmam.
Aquae . . . . octarium unum.
Decoque ad dimidii remanentiam. — Gabe, zwei Eßlöffel in einer Pinte Tisane, den Tag über.

Potio absorbens. (*Au. E.*)

℞. Magnesiae subcarbonicae drachmam unam.
Aquae uncias quinque cum dimidia.
Tincturae Cinnamomi drachmas tres.
Subcarbonatis Potassae liquidi drachmam unam.
Gabe, zwei oder drei Löffel nach der Mahlzeit. (*Au.*)

℞. Subcarbonatis Potassae,
Sacchari albi,
singulorum drachmam unam.
Tincturae Lavandulae compositae drachmas duas.
— Opii . guttas quatuor.
Aquae Menthae uncias quatuor.
Gabe, alle Stunden oder zwei Stunden einen Löffel.

Potio antispasmodica. (*Au.*)

℞. Kali subcarbonici drachmam unam.
Aquae . . . . uncias quatuor.
Gabe, alle zwei Stunden einen Löffel, indem man in den Zwischenräumen zehen Tropfen laudanum giebt. — Bei Convulsionen, zugleich mit Klystiren von zwei Scrupel kali subcarbonicum in einem Chamillenaufguß und Epithemen von einer Auflösung einer Unze kali causticum in zwei Pfund Wasser von Deutschen Aerzten mit Nutzen angewendet.

Aqua kalino-aetherea, Potio antiasthmatica. (*Au.*)

℞. Kali subcarbonici drachmam unam.
Aquae Menthae piperitae uncias quatuor.
Liquoris Hoffmanni scrupulos duos.
Syrupi Sacchari . semunciam.
Gabe, ein Löffel, bei Asthma.

Mixtura s. Potio saponacea. (*Au.*)

℞. Liquoris Kali subcarbonici semunciam.
Olei Amygdalarum dulcium sesquiunciam.
Aquae . . . . uncias decem.
Syrupi emulsivi . unciam unam.
Löffelweise alle halbe Stunden, bei Arsenikvergiftungen.

Potio expectorans. (*E.*)

℞. Subcarbonatis Potassae scrupulum unum.
Coccionellae . . semiscrupulum.
Sacchari . . drachmam unam.
Aquae . . . . uncias quatuor.
Gabe, ein Kaffeelöffel voll alle zwei oder drei Stunden, bei'm Keuchhusten.

Decoctum Carbonatis Potassae Absinthii s. febrifugum, Febrifugum salsum. (His.)

℞. Salis Absinthii drachmam unam.
Mellis electi . uncias quatuor.
Aquae . . . . . libras duas.
Coque, despuma bene et cola.

Mixtura alcalina. (*Sm.*)

℞. Vitellos Ovorum recentium no. 4.
Tere, sensim affundendo,
Aquae bullientis octarium unum (chopine).
Emulsioni adde
Olei Tartari per deliquium guttas decem ad scrupulum unum.
Eßlöffelweise alle Viertelstunden und selbst öfter. — Man hat es bei Sublimatvergiftung empfohlen.

Potio pellens s. antilactea. (*Sm.*)

℞. Subcarbonatis Potassae scrupulum unum.
Aquae Liliorum . . uncias sex.
— Florum Aurantiorum unciam unam.
Syrupi Althaeae . uncias tres.
Löffelweise in vier und zwanzig Stunden zu verbrauchen, indem man die Brüste

mit einer ſtarken Auflöſung von Seife in einer Abkochung der Mohnköpfe bäht.

Potio antiscorbutica. (*B.*)

℞. Subcarbonatis Potassae drachmas duas.
Aquae Cochleariae . uncias sex.
— Florum Aurantiorum semunciam.
Syrupi Erysimi . unciam unam.

Potio diuretica. (*Sm. Sw.*)

℞. Salis Genistae grana viginti quatuor.
Succi Cerefolii depurati cochlearia viginti quatuor.
— Millepedum . . no. 100.
Misce bene. (*Sm.*)

℞. Subcarbonatis Potassae grana decem.
Oxymellis scillitici sesquidrachmam.
Tincturae Lavandulae compositae semidrachmam.
Aquae Cinnamomi drachmas sex.
Misce. (*Sw.*)

Linimentum alcalinum. (Wür. *Sp.*)

℞. Subcarbonatis Potassae liquidi uncias duas.
Olei Olivarum . uncias quatuor.
Vitellos Ovorum . . . no. 2.
Misce sedulo. — Plenck empfahl es bei Schrunden.

Julapium leniens s. sedans. (*Pie.*)

℞. Subcarbonatis Potassae drachmas duas.
Aquae Florum Tiliae,
— Rosarum,
singularum uncias quatuor.
Solutioni adde
Syrupi Corticum Aurantiorum unciam unam.

Auf drei oder vier Mal in vier und zwanzig Stunden, in einem paſſenden Gefäße.

Tisana diuretica. (*Ra.*)

℞. Gummi Arabici drachmas quinque.
Saponis medicinalis semidrachmam.
Subcarbonatis Potassae sesquidrachmam.
Nitratis Potassae grana viginti quatuor.
Infusi Juniperi . . libras duas.

Von Récamier in verſchiedenen Fällen von Waſſerſucht nützlich befunden.

Lac infantum. (*Pie.*)

℞. Subcarbonatis Sodae scrupulum unum.
Aquae Florum Tiliae uncias duas.
Aquae Cerasorum nigrorum,
Olei Amygdalarum dulcium,
singulorum unciam unam.
Vitellos Ovorum recentium no. 3.
Mucilaginis Gummi Arabici drachmam unam.

Emulsio ad s. contra lumbaginem. (*Ca.*)

℞. Subcarbonatis Potassae semidrachmam.
Aquae communis uncias decem.
Solutioni adde
Vitelli Ovorum . quantum satis.
Olei Amygdalarum dulcium sesquiunciam.
Syrupi Althaeae . uncias duas.

Glasweiſe alle halbe Stunden.

Potio purgans et febrifuga. (*Ca.*)

℞. Subcarbonatis Potassae scrupulum unum.
Olei Ricini . . . uncias duas.
Tritura in mortario vitreo et adde
Syrupi Capilli Veneris semunciam.
Aquae Menthae piperitae uncias tres.

Auf zwei Mal im Zwiſchenraum einer halben Stunde.

Fomentatio resolvens. (*Ca.*)

℞. Subcarbonatis Potassae,
Saponis Massiliensis,
singulorum unciam unam.
Aquae Sambuci . . libras duas.
Solutioni filtratae adde
Salis Ammoniaci drachmas duas.

Unguentum s. Pomatum antipsoricum. (*E.*)

℞. Subcarbonatis Potassae semunciam.
Aquae Rosarum,
Cinnabaris,
singulorum unciam unam.
Olei essentialis Bergamottae semunciam.
Florum Sulphuris,
Axungiae,
singulorum uncias novem.
Misce triturando.

Tinctura antiarthritica. (Br.)

℞. Lumbricorum terrestrium cum Oleo Tartari per deliquium in pulpam redactorum unciam unam.
Radicis Aristolochiae rotundae,
— Juniperi,
singularum semunciam.
Extracti Chamaepityos drachmas tres.
Castorei,
Croci,
Subcarbonatis Potassae,
singulorum drachmas duas.
Spiritus Cochleariae uncias duodecim.

Post sufficientem infusionem cola exprimendo.

Collyrium rubrum. (*Bo.*)

℞. Subcarbonatis Potassae grana viginti quinque.
Camphorae . . . grana decem.
Aquae Chelidonii majoris uncias duas.

Digere per horas viginti quatuor ex arena, filtra deinde liquorem et adde
Tincturae Aloës guttas viginti quatuor.

Gegen Hornhautflecken empfohlen. — Man tröpfelt einige Tropfen davon in's Auge.

Julapium stomachicum, Mixtura Carbonatis Potassae Absinthii stomachica. (His.)

℞. Salis Absinthii scrupulos quatuor.
Aquae Corticis Citri,
— Menthae,
— Absinthii,
singularum uncias quatuor.
— Cinnamomi . uncias duas.
Solutioni adde
Tincturae Ligni Aloës drachmas duas.
Syrupi Corticis Citri unciam unam.

Reizend. — Löffelweise zu nehmen.

Tinctura antisyphilitica Besnardi. (B*. *Au. Bo. Sw*. Vm.*)

℞. Opii . . . . . partes duas.
Aquae Cinnamomi vinosae partes viginti.
Maceratis adde
Gummi Arabici . partes duas.
Subcarbonatis Ammoniaci partem unam.
— Potassae partes quatuor.

Post unum diem blandi caloris ope digestionem filtra. (*Vm.*)

℞. Subcarbonatis Potassae,
Aquae Cinnamomi simplicis,
singulorum libram unam.
Opii . . . . . uncias duas.
Aquae Cinnamomi vinosae uncias quatuor.

Stent in digestione per septimanas tres, saepius agitata, in balneo aquae, tum colaturae adde
Gummi Arabici . uncias duas.
Subcarbonatis Ammoniaci unciam unam.
Aquae Cinnamomi . uncias sex.

Post aliquot dies filtra. (B*. *Bo.*)

℞. Subcarbonatis Potassae uncias tres.
Opii,
Gummi Arabici,
singulorum semunciam.

Triturata simul dissolve in
Aquae Chamomillae unciis sex.

Adde deinde
Subcarbonatis Ammoniaci,
Aquae Vitae,
singulorum drachmas duas.

Digere in balneo aquae et post refrigerationem filtra. (*Sw*.*)

Au. Subcarbonatis Potassae semunciam, Aquae Cinnamomi uncias quatuor, Opii grana duo et Subcarbonatis Ammoniaci drachmam unam.

Gabe, ein halber bis zwei und vier Scrupel in Gersten- oder Zuckerwasser.

Tinctura antisyphilitica Talbotii. (*Au.*)

℞. Subcarbonatis Potassae uncias duas.
Aquae Melissae uncias tres cum dimidia.
Extracti Opii,
— Chelidonii,
singulorum scrupulum unum.

Post horas viginti quatuor digestionis adde
Ammoniaci caustici drachmas duas.

Diese Tinctur, welche in der letzten Zeit von Eichheimer gerühmt wurde, hat viel Aehnlichkeit mit der vorigen.

Potio incisiva. (*Bo.*)

℞. Subcarbonatis Potassae scrupulum unum.
Coccionellae . semidrachmam.
Aquae Hyssopi . uncias quatuor.
Syrupi Capitum Papaveris,
— Tolutani,
singulorum semunciam.
— Ipecacuanhae,
Aquae Florum Aurantiorum,
singulorum unciam unam.

Tritura simul coccionellam et sal, infunde aquam hyssopi fervidam; post refrigerationem filtra et adde reliqua. — Gabe, alle zwei Stunden einen Kaffee- oder Suppenlöffel, je nach dem Alter der Kinder, bei'm Keuchhusten.

Remedium antidiabeticum de Redfearn. (*Au.*)

℞. Chinae rubrae . unciam unam.
Aluminis calcinati drachmas tres.
Subcarbonatis Potassae drachmas duas.
Petrolei . . . quantum sufficit ut fiat electuarium. — Gabe, einer Muscatnuß groß, täglich dreimal. Zu gleicher Zeit nimmt man den Tag über eine Auflösung von drei Drachmen sulphuretum potassae in sechszehen Unzen Kalkwasser und vier Pillen, zu welchen die Formel folgende ist:

℞. Sulphatis Sodae drachmam unam.
Saponis medicinalis scrupulos quatuor.

Mucilaginis Gummi Arabici
quantum sufficit
ut fiant pilulae triginta.

Unguentum Bardenii s. antipsoricum. (*B.*)

℞. Subcarbonatis Potassae
unciam unam.
Florum Sulphuris . uncias duas.
Axungiae Porci uncias quatuor.
Zu vier Einreibungen bey Tag über.

Protocarbonas Potassii, Carbonas Protoxydi Potassii, Carbonas Potassae, Sal Tartari perfecte saturatum, Kali carbonicum neutrale, Carbonas Potassae completum, Kali carbonicum acidulum, Carbonas Potassae neutrum, Deutocarbonas Potassii, Alcali vegetabile crystallisatum s. perfecte saturatum, Bicarbonas Potassae.; gesättigt kohlensaures Kali; Protocarbonate de potassium, Carbonate de protoxide de potassium, Carbonate de potasse, Bicarbonate de potasse (*Gal.*). (An. B. Ba. Bel. Bor4. D. Ed. Fenn. Fer. Gal. Han. HassP. Lon. LonN. Pol. Suec. *C. Fi. Sw. T. Vm.*)

℞. Subcarbonatis Potassae partes duas.
Aquae communis . partes tres.
Post dissolutionem liquorem filtra et in eum immitte torrentem Gasis Acidi carbonici. Post horas viginti quatuor (tres dies Bor4.) vaporata ad crystallisandum repone. (An. B. Ba. Bel. Bor4. Ed. Fenn. Fer. Gal. Han. Pol. Suec. *C.*)

℞. Subcarbonatis Potassae
libram unam.
— Ammoniaci . uncias tres.
Aquae communis octarium unum.
Potassae in aqua solutae ammoniacum adde, mixturam per horas tres temperaturae 130° F. (180°) balnei arenae expone, donec ammoniacum perfecte sit expulsum; tunc liquorem sepositum crystallisationi subjice. (GalH. Lon. *Fi.*)

Dieses ist das Verfahren Berthollet's.

℞. Potassae per Alcoholem
quantum vis.
Aquae destillatae pondus triplum.
Immitte torrentem Acidi carbonici in liquorem, donec perfecte sit saturatus, tunc evaporatum blandi caloris ope ad crystallisandum repone. (*Sw.*)

GalH. ut pulchrae crystalli obtineantur suadet, liquorem magna Acidi carbonici copia saturatum, in quo jamjam est formata ad trientes duos consumere et illum deinde per dies duos seponere; — *Fi.* Carbonatem Potassae liquidum (Oleum Tartari) adhibens torrentem gasis immittere jubet ut supra; — LonN. Liquoris Potassae Subcarbonatis congio torrentem gasis transmittere ad plenam saturationem et vaporare, cavendo ne calor gradum 120 excedat; — *T.* praeter hunc agendi modum suadet Sal in vasis fictilibus vitreatis emanationibus musti uvarum vel aliorum fluidorum fermentantium exponere.

Gal. tubum in solutionem immergi vult; — An. B. Ba. Bel. et *Vm.* ad ejus superficiem paene attingere jubent.

HassP. ut Sal Sodae perfecte saturatum s. Protocarbonatem Sodae.

Aqua Carbonatis Potassae acidula s. Supercarbonatis Potassae s. aërata alcalina s. cum Carbonate Potassae acidula s. Oxycarbonatis aciduli Potassae s. Falconeri s. Supercarbonatis kalici, Aqua lithontriptica, Potio alcalina. Aquae mephitica alcalina; kohlensaures Wasser; Eau méphitique alcaline, Potion alcaline (*Ga'.*). (Am. Bor. D. Ed. Fenn. GalH. His. Pol. Suec. *Br. C. Fi. Sw. Vm.*)

℞. Subcarbonatis Potassae puri
unciam unam.
Aquae . . . . libras decem.
Sale in aqua dissoluto, torrentem Gasis acidi carbonici per liquorem transmitte. (Am. Ed. Fenn. *Br. C. Sw.*)

Fi. Carbonatis neutri drachmam unam, Aquae destillatae libram unam.

℞. Subcarbonatis Potassae partes duas.
Aquae communis . partes tres.
In lagenam octariorum trium capacem Acido carbonico repletam immitte et per longum tempus agita. (Bor. GalH. Pol.)

℞. Subcarbonatis Potassae
drachmas duas.
Aquae Acido carbonico saturatae
libram unam.
Dissolve et in lagena bene obturata serva. (D.)

Suec. Salis uncias tres et Aquae cum Gase saturatae libras quinquaginta sex.

℞. Subcarbonatis Potassae
partem unam.
Aquae . partes centum viginti.
Satura solutionem numero desiderato atmosphaerarum Gasis Acidi carbonici. (*Vm.*)

℞. Carbonatis neutralis Potassae
uncias tres.
Aquae . . . uncias duodecim.
Dissolve et filtra. (*Sw.*)

℞. Carbonatis neutralis Potassae
partem unam.
Aquae cum Acido carbonico saturatae . partes centum viginti.
Dissolve. (*Vm.*)

His. Carbonatis neutralis drachmas tres et Aquae gase impraegnatae libras duas.

Reizend, als Digestiv und steinzerstörend betrachtet, in letzterer Hinsicht jetzt einen von der Mode abhängigen Ruf genießend. Auch hat man es bei sogenannten lymphatischen Krankheiten gerühmt. — Gabe, zwölf Unzen täglich, womit man allmälig steigen kann. — Bisweilen setzt man etwas Branntwein zu.

Potio lithontriptica. (*E.*)

℞. Carbonatis neutralis Potassae grana decem ad quindecim.
Aquae Seltersianae . uncias sex.

Drei oder vier Mal täglich zu trinken.

Protocarbonas Potassii et Ammoniaci, Carbonas Protoxydi Potassii et Ammoniaci s. Potassae et Ammoniaci. (*Sw.*)

℞. Subcarbonatis Potassae crystallisati partes quatuor.
— Ammoniaci crystallisati partem unam.

Trituratis simul et commixtis infunde Aquae frigidae quantum requiritur ad dissolutionem. Filtra, liquori torrentem Acidi carbonici immitte ut saturetur; calefac parumper ut sal quod subsederat redissolvatur et crystallisationi subjice.

Bei Harnruhr, Verdauungsbeschwerden und besonders bei Harnsteinen empfohlen. — Gabe, eine halbe Drachme in einer halben Unze Wachholder- oder Münzenwasser, täglich vier Mal.

Hypophosphis Potassae. (*Vm.*)

℞. Tincturae Salis Tartari quantum vis.
Phosphori granulati quantum sufficit

ut frigide saturetur. Decantha et serva.

Immittere potes etiam in lagenam smiri obductam Phosphorum granulatum cum Potassa liquida concentrata et addere Alcoholem rectificatum, per aliquot dies seponere et deinde decanthare.

Protosulphas Potassii, Alcali vegetabile vitriolatum, Arcanum duplicatum Mynsichti, Kali sulphuricum s. vitriolatum s. sulphuricum depuratum, Lixivia vitriolata, Nitrum vitriolatum Schroederi, Panacea duplicata, Sal de duabus s. polychrestum Glaseri s. Lemery s. sapientiae s. polychrestus parisiensis s. Tartari sulphuratum, Specificum Paracelsi, Spiritus Vitrioli coagulatus Mynsichti, Sulphas Potassae, Tartarus vitriolatus, Nitrum fixum Schroederi, Sulphas Protoxydi Potassii, Vitriolum Potassae, Panacea Holsteniana, Potasse sulphurica s. vitriolata; schwefelsaures Kali, vitriolisirter Weinstein; Protosulfate de potassium, Nitre fixe de Schroeder, Panacée du Holstein, Potasse sulfatée ou vitriolée, Sel de duobus ou polychreste de Glaser, Sel de la sagesse, Sulfate de potasse, Sulfate de protoxide de potassium, Tartre vitriolé, Vitriol de potasse (*Gal.*).

§. I. Wie es im Handel vorkömmt.

Ba. Bel. Bor4. Ed. GalM. Hass. HassP. His. Li. Sax. *C. Par.*

§. II. Reinigung des käuflichen Salzes.

Kali sulphuricum depuratum.

B. Ba. Bel. Bor4. Hass. HassP. Li. Sax.

℞. Sulphatis Potassae venalis partem unam.
Aquae communis . partes octo.

Dissolve, liquori instilla solutionem aquosam Subcarbonatis Potassae, donec non amplius turbetur; filtra, evapora ad cuticulae tenuis apparitionem et crystallisationi subjice. (B. Bel. Hass. Sax.)

HassP. Salis partem unam, Aquae sex, coquendo solvere, addere liquorem Cinerum clavellatorum quantum requiritur vel ad saturationem acidi praeponderantis vel ad terrarum metallorumque praecipitationem; — Li. Aquae duplum pondus adhibet; — Ba. dissolvere jubet Salis partem unam in Aquae bullientis quinque et liquorem ad locum frigidum reponere ut in crystallos abeat; — Bor4. Sal bene crystallisatum et albissimum Aqua communi frigidâ abluere et siccare.

§. III. Im Ganzen bereitet.

A. Am. Ams. An. B. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Ful. Gal. Gen. Han. Hass. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pal. Pol. R. RC. Sar. Suec. Wir. Würz. *Br. C. Fi. Sp. T. Vm.*

℞. Subcarbonatis Potassae partem unam.
Aquae communis partes duodecim.

Dissolve et liquori adde sensim
Acidi sulphurici (20°) quantum sufficit

ad saturationem alcali; cola ad cuticulae apparitionem usque, vapora et lente refrigefac. (Ams. An. B. Bel. Br. Fer. Ful. Gal. Gen. Hass. His. Li. Lus. Pal. R. Sar. Wir. Würz. *Br. Fi. Pid. T.*)

RC. Acidi sulphurici Aquae sextuplo pondere diluti quantum libet in amplum vas vitreum infunde et instilla solutionem Subcarbonatis Potassae purissimi in Aquae sextuplo pondere ad saturandum acidum usque, finita effervescentia liquorem filtra et ad crystallisandum sepone.

℞. Sulphatis Ferri . . partes duas.
Aquae bullientis . partes octo.
Dissolve. Recipe
Subcarbonatis Potassae
quantum sufficit.
Dissolve in
Aquae . . . partibus quinque.

Liquores ambos commisce ut perfecte saturentur, filtra deinde, praecipitatum bene ablue, aquas lotionum liquori filtrato admisce, evapora ad cuticulae usque apparitionem et crystallisationi subjice. (Br. Pal. Wir. *Sp.*)

℞. Nitri depurati,
Sulphatis Ferri ad alborem calcinati, singulorum partes aequales.

Immitte in crucibulum pro dimidio replendum; calcina aëri exposita, donec fumi nihil amplius prodeat; dissolve residuum in Aqua bulliente, ad siccum evapora, productum denuo calcina per plures horas, tunc in Aqua dissolutum et filtratum vaporationi subjice ut in crystallos abeat. (Sar. *T.*)

℞. Residui ex destillatione Nitri cum Acido sulphurico quantum vis (libras duas Lon. LonN.).
Coque in
Aquae sufficiente quantitate (congios duos).

Acidum cum excessu Subcarbonatis Potassae satura; evapora ad cuticulam, filtra et crystallisationi subjice. (B. Bor. Bor4. D. Du. Fer. Ful. Han. Lon. LonN. O Pol. RC. Suec *Br. C. Sp. T. Vm.*)

A. Ed. et Gal. Subcarbonatem Calcis pro saturando Acidi excessu indicant. — Ein Verfahren, welches ein weniger reichliches Product liefert.

Sar. solutionem ad tertiae partis consumptionem usque evaporare, filtrare deinde et ad siccum consumere; calcinare, igne fortissimo, per plures horas, in Aqua dissolvere, filtrare, ad siccum evaporare, denuo calcinare, productum in Aqua dissolvere, liquorem filtratum ad dimidium consumere et in loco frigido crystallisationi subjicere.

Penn. excessum Acidi ignis ope expellere jubet.

Nach Chevallier und Ibt enthält das auf diese Weise erhaltene Salz bisweilen etwas Salpeter.

℞. Nitri depurati . . partes duas.
Florum Sulphuris partem unam.

Ingere mixta per portiunculas in ollam ferream rubro candentem. Flammâ extinctâ massam prope ignem retine per horas duas, ollam totam ad ruborem usque calefaciens; quod post refrigerationem remanet, pulvera, dissolve in Aqua bulliente, cola ad cuticulam, evapora et in locum frigidum ad crystallisandum repone. (Sar.)

Ams. B. Br. Ed. Wir. Würr. *C.* et *Sp.* Nitri et Sulphuris partes aequales; — Ed. productum deflagrationis post refrigerationem absque tractando cum aqua servare jubet.

Li. loco nitri Subcarbonatem Potassae et ejus cum Sulphure partes aequales adhibere jubet.

Das Product scheint eine Mischung von schwefelsaurem und schwefligsaurem Kali zu seyn. Gewiß ist, nach Duncan, daß es keinen freien Schwefel enthält, so daß der Name *Sulphas Potassae cum Sulphure*, welcher ihm von Ed. gegeben wird, unpassend scheint.

℞. Urinae Hominis bonae valetudinis quantum vis.

Frigore expone ita ut ad dimidium congelet; reliquum filtra, in patinam effunde, crystallos sponte concretas ablue et siccatas serva. (Wür.)

Dieses nannte man ehedem *Sal nativum, Sal fusibile, Sal microcosmicum urinae;* es ist ein Gemisch von phosphorsaurem Natron und Ammoniak und von schwefelsaurem Kali und Natrum, in welchem das erstere dieser Salze, nach Berzelius, zu 2,94, das zweite zu 1,65, das dritte zu 4,45, das vierte zu 1,50, das fünfte zu 3,71 und das sechste zu 3,16 auf 100 enthalten ist. Um es vollkommen farblos und rein zu erhalten, muß man es anfangs durch Alcohol behandeln, dann in Wasser auflösen und die Flüssigkeit crystallisiren lassen.

Reizend, eröffnend und purgirend. — Gabe, von einem Scrupel bis zu einer Drachme als alterirendes und von einer bis sechs Drachmen als Purgirmittel.

Es darf weder mit Salz-, Salpeter- und Hydrochlorsäure, noch mit salzsaurem Kali, und ebensowenig mit Mercurialsalzen und salpetersaurem Silber verbunden werden.

Pulvis digestivus. (Li. Wir. *Sw.*)

℞. Sulphatis Potassae partes duas.
Concharum praeparatarum
partem unam.
Misce bene. (Wir.)

℞. Sulphatis Potassae partes duas.
Pulveris Radicis Ari
partem unam.
Misce triturando. (Li.)

℞. Sulphatis Potassae partes octo.
Citratis Calcis . partes quatuor.
Pulveris Radicis Ari
partem unam.
Misce. (*Sw.*)
Die Gabe ist im Allgemeinen eine halbe Drachme.

Pulvis digestivus cum Rheo s. compositus. (DD.)

℞. Sulphatis Potassae partes quatuor.
Pulveris Rhei . . partem unam.
Tritura simul. — Gabe, eine halbe Drachme. — Man kann statt des schwefelsauren Kali schwefelsaures Natron oder schwefelsaure Magnesia nehmen.

Pulvis antiphlogisticus. (*Huf.*)

℞. Sulphatis Potassae,
Nitri,
Salis Seignett',
singulorum partes aequales.

Pulvis aperiens et resolvens. (*Bo.*)

℞. Sulphatis Potassae,
Tartari martialis solubilis,
singulorum drachmas duas.
Salis Genistae drachmam unam.
Nitratis Potassae semidrachmam.
Millepedum . . grana triginta.
Misce sedulo. — Grimauld empfahl es bei Verstopfungen der Unterleibseingeweide, bei Decem, Infiltration und Unterdrückung oder Verminderung der Urinabsonderung. — Gabe, fünfzehen oder zwanzig Gran, Abends beim Schlafengehen.

Tabellae desalterantes. (*Pie.*)

℞. Sulphatis Potassae drachmas tres.
Sacchari . . . . libram unam.
Olei essentialis Citri guttas octo.
Gummi Tragacanthae
quantum sufficit
ut fiant tabellae duarum ad sex linearum crassitudine.
Ohne Zweifel ist diese Formel unrichtig, da sie Weinstein- oder Citronensäure enthalten müßte, wenn sie ihren Namen als Limonadepulver rechtfertigen sollte. Jedenfalls kann man sie unter dieser Form beibehalten. Die Täfelchen wirken reizend und alterirend. — Gabe, eine halbe Unze und mehr in einem Glase Wasser.

Conserva spagyrica. (Wir. *Sp.*)

℞. Salis Absinthii . . uncias duas.
— Melissae,
— Urticae,
singulorum unciam unam.
Tartari vitriolati . semunciam.
Arcani duplicati . uncias duas.
Fiat pulvis, cui infunde
Spiritus Sulphuris per campanam.
drachmas duas.
Post effervescentiam adde
Conservae Rosarum rubrarum,
— Dianthi,
singularum libram unam.
Misce bene. (Wir.)

℞. Salis Absinthii uncias tres et drachmas sex.
Pulveris Cinnamomi
drachmas duas.
— Macidis,
— Caryophyllorum,
— Zingiberis,
singulorum drachmam unam.
— Sulphatis Potassae unciam
unam et drachmas sex.
— Sacchari albi uncias octo.
Conservae Rosarum rubrarum
uncias sedecim.
— Dianthi uncias octo.
Acidi sulphurici drachmas duas.
Olei essentialis Anisi,
— — Citri,
singulorum drachmam unam.
— — Foeniculi
semidrachmam.
— — Cinnamomi
scrupulum unum.
— — Menthae
guttas quatuor.
Misce sedulo. — Ein schlechtes Präparat, welches man ehedem als auflösend und als ein nützliches Auflösungsmittel bei Verstopfungen des Unterleibs, Gelbsucht, hartnäckigen viertägigen Wechselfiebern, Mangel der Menstruation betrachtete. — Gabe von einer Drachme bis zu einer halben Unze.

Fel Vitri, Recrementa Vitri, Sal Vitri, Anatron. (Br. Wir. *Sp.*)

In weißen, leichten und schwammigen Massen. — Es ist ein Gemisch aus salzsaurem Kali oder Natron, welches sich während des Schmelzens des Glases trennt und auf der Oberfläche der glasigen Masse schwimmt.
Ehedem wendete man es als einschneidendes und Abführmittel an.

Solutio Sulphatis Potassae aquosa. (Ba)

℞. Sulphatis Potassae partem unam.
Aquae destillatae
partes novemdecim.
Dissolve. — Beim Verordnen dieses Salzes im flüssigen Zustande muß man sich erinnern, daß, nach Gay-Lussac, 100 Theile Wasser bei 12° 72 C. 10 $\frac{57}{100}$, bei 101°, 50 C. 26 $\frac{33}{100}$ desselben auflösen.

Liquor Tartari vitriolati (HassP.): Solutio Tartari vitriolati scrupuli unius in Aquae destillatae drachmis sex — Ut reagens.

Potio laxativa. (*Sa.*)

℞. Sulphatis Potassae drachmas sex.
Aquae Melissae . uncias quatuor.

Emulsio refrigerans. (*Sa.*)

℞. Sulphatis Potassae
drachmam unam.
Dissolve in emulsionis e
Seminum Malvae uncias tribus.
Aquae Hordei quantitate sufficiente paratae sesquilibra. Adde deinde
Syrupi Althaeae . sesquiunciam.
Glasweise.

Mixtura acida. (*Sa.*)

℞. Sulphatis Potassae semunciam.
Nitratis Potassae drachmam unam.
Aquae fontanae . uncias decem.
Solutioni adde
Oxymellis simplicis unciam unam.
Aceti . . . . . sesquiunciam.

Mixtura vinosa. (*Sa.*)

℞. Sulphatis Potassae semidrachmam.
Decocti Hordei . . libras duas.
Solutioni adde
Roob Ribium,
Vini, singulorum sesquiunciam.
Aceti . . . . unciam unam.
Syrupi Rubi Idaei uncias duas.

Potio resolvens. (*B.*)

℞. Sulphatis Potassae drachmas tres.
Infusi Rhei . . . uncias sex.
Allmälig zu nehmen bei Milchverſetzungen und Milchknoten.

Subprotosulphas Potassii, *Potassae Supersulphas*, *Supersulphas Potassae*, *Sulphas acidus Potassae*, *Bisulphas Potassae s. kalicus*, *Kali sulphuricum acidum*; ſaures ſchwefelſaures Kali; Subprotosulfate de potassium, Subsulfate ou Sulfate de potasse, Bisulfate de potasse (*Gal.*). (Bor4. Fer. Lon. LonN. Suec. *E. Par. Sw*. T. Vm.*)

℞. Salis e destillatione Nitri cum Acido sulphurico residui libras duas.
Aquae bullientis octarios quatuor
Dissolve, filtra, coctione ad dimidium redige et ad crystallisandum sepone. (Lon. LonN. *E. Vm.*)

T. Obtinetur e residuo destillationis Acidi nitrici et nitrosi, triturando et solvendo in Aquae pondere quintuplo vel sextuplo.

℞. Acidi sulphurici,
Aquae, singulorum partes septem.
Subcarbonatis Potassae
partes quatuor.
Misce et liquorem vaporando consume. (*Sw**.)

℞. Acidi sulphurici . partes decem.
Subcarbonatis Potassae
partes sex cum dimidia.
Acido Aquae duplo diluto, mixturae adhuc calenti, simulac ob effervescentiam fieri potest sal admisce; filtrata tunc leviter evaporent et ad crystallisandum seponantur. (*Vm.*)

℞. Sulphatis Potassae pulveratae
partes octo cum dimidia.
Acidi sulphurici partes quinque.
Sicca prope ignem, ad ruborem levem calefac, dissolve in Aquae bullientis parte una cum dimidia, filtra et crystallisationi subjice. (*Vm.*)

Fer. Sulphatis uncias duas et tres Acidi.

℞. Sulphatis Potassae partes octo.
Acidi tartarici
partes septem cum dimidia.
Contere, lava cum Aquae tepidae pauxillo, filtra liquorem et parumper evaporatum ad crystallisandum sepone. (*Vm.*)

℞. Sulphatis Potassae . partes duas.
Acidi sulphurici partem unam.
Aquae communis . partes tres.
Misce, ad siccum consume et pulvera. (Bor4. Suec.)

Purgirend, fäulnißwidrig; man will es mit Vortheil bei gaſtriſchen und adynamiſchen Krankheiten angewendet haben; bisweilen ſetzt man es zu der Abkochung der China.

Potus sulphurico-salinus, *Tisana sulphurico-salina.* (*Sw**.)

℞. Supersulphatis Potassae
drachmas sex.
Aquae . . . . . libras sex.
Dissolve et solutioni adde
Aquae Vitae,
Syrupi Violarum,
singulorum sesquiunciam.
Reizend, gelind laxirend und für fäulnißwidrig gehalten; man verordnet den Trank bei galligen und adynamiſchen Fiebern, Blutbrechen und Mutterblutfluß. — Gabe, glasweiſe mehr oder minder oft.

Protosulphas Potassii et Ammoniaci, *Sulphas Potassae et Ammoniaci.* (*Vm.*)

℞. Supersulphatis Potassae quantum vis.
Aquae fervidae duplum pondus.
In solutionem infunde
Ammoniaci liquidi quantum sufficit ut acidum cum excessu saturetur et ad crystallisandum sepone.

Protosulphas Potassii et Magnesii, *Sulphas Potassae et Magnesiae.* (*Vm.*)

℞. Sulphatis Potassae
partes tres cum dimidia.
Sulphatis Magnesiae partes decem.
Misce, solve in Aquae fervidae sufficiente quantitate, filtra liquorem et ad crystallisandum sepone.

℞. Sulphatis Magnesiae partes decem.
Subcarbonatis Potassae calcinati
partes tres cum dimidia.
Tritura, sensim addendo
Aquae tepidae quantum sufficit ad solutionem salium. Ebulliant aliquoties, tunc filtra et ad crystallisandum sepone.

℞. Supersulphatis Potassae
partem unam.
Aquae . . . partes octodecim.
Satura calide solutionem cum
Magnesiae sufficiente quantitate.
Filtra et crystallisationi subjice.

℞. Sulphatis Magnesiae partem unam.
Aquae . . . . . partes duas.
Solutioni sensim infunde aliam solutionem saturatam Potassae causticae, donec nihil amplius praecipitetur; sepone, decantha, praecipitatum cum Aquae frigidae pauxillo ablue, dissolve in Aquae bullientis pondere octuplo et liquorem ad crystallisandum sepone.

Protohyposulphis Potassii, Hyposulphis Potassae, Sulphis sulphuratus Potassae. (Vm.)

℞. Sulphitis Potassae
partes septem cum dimidia.
Potassae causticae fusae
partes quinque cum dimidia.
Sulphuris pulverati
partem unam cum dimidia.
Liqua sal in Aquae tepidae quantum fieri potest minima quantitate, adde potassam, deinde sulphur, calefac per horam dimidiam in vase tecto, filtra et crystallisationi subjice.

℞. Sulphureti Potassae,
Sulphitis Potassae,
singulorum partes aequales.
Contere per aliquot tempus, dissolve deinde mixturam in Aquae quantum minima quantitate, filtra et ad crystallisandum repone.

℞. Hydrosulphatis Potassae
quantum vis.
Dissolve in Aqua et torrentem Gasis acidi sulphurosi in liquorem immitte, donec nihil ejus amplius absorbeatur, calefac leviter, filtra et ad crystallisandum sepone.

Potes etiam transmittere Gas acidum hydrosulphuricum in solutionem Sulphitis Potassae, calefacere deinde liquorem, filtrare et crystallisationi subjicere.

Man kann dieſes Salz ſtatt des Sulphis sulphuratum sodae benutzen.

Protosulphis Potassii, Sulphis Potassae. (Vm.)

℞. Subcarbonatis Potassae,
Aquae, singulorum partem unam.
Dissolve et filtra, cum Gase acido sulphuroso satura, calefac deinde in balneo aquae tepido et liquorem ad crystallisandum sepone.

Protonitras Potassii, Nitras Protoxydi Potassii, Nitras Potassae, Nitrum, Sal Nitri, Kali nitricum, Nitras kalicum s. kalicus s. Lixiviae; ſalpeterſaures Kali, Salpeter; Protonitrate de potassium, Nitrate de protoxide de potassium, Nitrate de potasse, Nitre, Sel de nitre, Salpêtre (*Gal.*).

§. I. Wie es im Handel vorkommt.

Nitrum crudum s. venale; roher Salpeter; Nitre cru (*Gal.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4 Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *Br. C. Fi. Par. Pid. Sp. T.*

§. II. Reinigung des käuflichen Salpeters.

Nitrum s. Kali nitricum depuratum s. purificatum s. purum, Nitras Potassae s. kalicus depuratus s purus; gereinigter Salpeter; Nitre depuré ou purifié (*Gal.*).

Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4 Br. Fenn. Fer. Ful. Gal. Han. Hass. HassP. His. Li. Lus. O. Pal. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. *Br. Fi. Par. Pid. Sm. Sp. T Vm.*)

℞. Nitri venalis . . partes duas.
Aquae bullientis partem unam.
Dissolve sal in aqua, cola liquorem et crystallisationi subjice. (Ams. Bel. Br. Fer. Ful. Gal. His. Li. Lus. O. Pal. R. Wir. Wür. *Br. Par. Pid. Sp. T.*)

RC. Nitrum venale in aquae sextuplo solvere, filtrare et evaporare, doneo guttae lapidi frigido inspersae congulentur, tunc in loco temperato crystallisationi subjicere, residuum evaporatum item in crystallos cogere etc.; — Fenn. et Suec. liquare jubent sal leni ignis ope, in crucibulo, massam albam post refrigerationem pulverare, dissolvere in Aquae pondere quadruplo, colare liquorem et ad cuticulam evaporatam celeriter refrigefacere, continue agitando, crystallos exortas cum Aquae pauxillo abluere et siccare; — An. Be. Bel. Bor. Bor4. HassP. et Pol. dissolvere Sal in Aquae bullientis sufficiente quantitate (duplo), liquori instillare solutionem Subcarbonatis Potassae, doneo non amplius turbetur, tunc illum seponere, filtrare et evaporatum ad crystallisandum reponere; — Hass. Sax. et *Sw.* eandem egendi rationem prae-

scribunt sed praeterea liquorem filtratum cum Carbone coquere; — *Fi.* Nitri venalis libras quatuor, Aquae bullientis octo, Olei Tartari quantum sufficit, Carbonis uncias octo, caeterum ut antea; — Han. instillare ei Nitratem Argenti, donec non amplius turbetur.

Vm. coquere Nitrum cum Aquae bullientis quarta ponderis parte, liquorem decanthare, addere Aquae frigidae partem quartam, totum ad refrigerationem perfectam usque subige, decanthare, sal crystallisato Aquae frigidae pauxillum immittere, eum in infundibulos ingerere et in illis frigide abluere primò pluries cum eadem ipsa solutione saturata Nitratis depurati tunc cum solutione nondum adhibita; crystallos exstillatas deinde in Aquae bullientis partibus quinque dissolvere, liquorem calidum filtrare et ad crystallisandum seponere.

Nitrum purissimum (HassP.) praeparatur solvendo Nitri depurati partem unam in Aquae destillatae partibus octo, liquori filtrato tam diu liquorem Barytae nitricae dilutiorem instillando, quam praecipitatum oritur et iterum filtrato liquorem Argenti nitrici dilutiorem sensim affundendo, donec Acidum Salis secretum sit; resideat fluidum, a sedimento defundatur et filtratum, si opus est, cum guttulis aliquot Salis Tartari puri a Baryta vel Argento omnino liberatum limpidum evaporare fac et in crystallos coge, quas sicca; — ut reagens.

§. III. Wiedererzeugter Salpeter.

Nitrum regeneratum.

Br.

℞. Acidi nitrici . . . quantum vis.
Instilla paulatim
Solutionis Subcarbonatis Potassae quantum sufficit
vel donec effervescentia desierit; filtra liquorem et ad cuticulam usque evaporatum crystallisationi subjice.

§. IV. Salpeter mit fremden Substanzen getränkt.

Nitrum papaveratum (Pal), Nitrum in Infusione Papaveris dissolutum et in crystallos concretum; *Nitrum rosatum* (Wir), in Infusione saturata Rosarum rubrarum dissolutum et in crystallos concretum.

§. V. Salpeter mit schwefelsaurem Kali vermischt.

Nitras Potassae cum Sulphure fusus, Nitrum tabulatum, Sal s. Lapis Prunellae, Crystallum s. Cristallum minerale, Cristallus mineralis; Prunellensalz; Sel ou Pierre de prunelle, Cristal minéral (*Gal.*).

Ams. An. Br. Gal. His. Pal. Sar. Wir. *Fi. Sp. T. Vm.*)

℞. Nitri . libras duas cum dimidia.
Liquatis in crucibulo adde pedetentim
Florum Sulphuris . semunciam.
Deflagratione finita et vase parumper refrigerato massam liquatam in pelvim immitte inter manus agitatam ita ut sal parietibus ejus tenuis et uniformis strati instar adhaereat, quod post refrigerationem separatum in frusta dirumpe. (His.)

An. Nitri libras duas et Sulphuris semunciam; — Sar. Nitri libram unam et Sulphuris drachmas duas; — Ams. Sulphuris partem unam et Nitri viginti; — Gal. Sulphuris partem unam et Nitri centum viginti octo; — *Fi. T.* et *Vm.* Sulphuris partem unam et Nitri viginti quatuor; — Br. Pal. et Wir. Sulphuris partem unam et Nitri viginti quatuor; — Caeterum agendi modus ubique aequalis.

Reizend, in hohen Gaben purgirend, jedoch unter die kühlenden oder vielmehr entzündungswidrigen Mittel gestellt, ohne Zweifel wegen der durch die Reizung der ersten Wege bewirkten Ableitung, und für ein ganz besonders harntreibendes Mittel gehalten. Man hat es bei Wassersuchten, Blutflüssen Flechten, Tripper angewendet. — Gabe, gewöhnlich zehen Gran bis eine halbe Drachme: neuere Practiker sind aber weit höher gestiegen, ein Beweis, daß der Salpeter nicht so giftig wirkt, als Fodéré und Orfila behauptet haben.

Schwefelsäure, schwefelsaures Natrum und Bittererde, Alaun und schwefelsaure Metalloxyde dürfen nicht damit verbunden werden, da sie Zersetzung bewirken.

A. Präparate, in denen die Wirkung des Salpeters nicht merklich durch fremde Substanzen verändert ist.

Nitrum perlatum. (Wir.)

℞. Nitri purificati uncias quatuor.
Matris Perlarum praeparatae semunciam.
Misce bene. — Ehedem verordnete man dieses Pulver von fünf Gran bis zu einem Scrupel bei bösartigen Fiebern und man schrieb gewöhnlich dem ganz wirkungslosen Zusatz des Salpeters die Hauptwirkung zu.

Hierher gehört auch der *Pulvis nitrosus* (*Au*): Nitri et Testarum Ovorum

praeparatorum, singulorum partes aequales.

Pulvis Iridis cum Nitro s. anticatarrhalis. (*Au.*)

℞. Radicis Iridis Florentinae unciam unam.
Nitri . . . drachmam unam.
Cetacei . . . . drachmas duas.
Sacchari . . . . unciam unam.
Gabe, ein Kaffeelöffel bei Catarrhalbeschwerden.

Pulvis aperitivus. (Gen. *Sw.*)

℞. Nitri . . . . unciam unam.
Pulveris Gummi Arabici sesquiunciam.
— Radicis Liquiritiae,
— — Althaeae,
singulorum uncias tres.
Harntreibend, erweichend, in dem hitzigen Stadium der Harnröhrenentzündung empfohlen, — Gabe, anderthalb bis zwei Drachmen, drei Mal täglich, in Wasser. (*Sw**.)

℞. Nitri . . . . drachmas tres.
Magnesiae . . . . semunciam.
Divide in partes duodecim. (Gen.)

Pulvis Nitratis Potassae compositus. (RC.)

℞. Nitratis Potassae,
Sacchari albi,
singulorum semunciam.
Gummi Arabici . unciam unam.
Misce ut fiat pulvis. — Gabe, eine bis anderthalb Drachmen.

Pilulae aperitivae. (*Sw*. Vm.*)

℞. Nitri . . . . . drachmas sex
Pulveris Gummi Arabici drachmas tres.
— Radicis Liquiritiae,
— — Althaeae,
singulorum uncias tres.
Syrupi Sacchari quantum sufficit ut fiant pilulae granorum quinque. (*Sw**.)

℞. Nitri partem unam cum dimidia.
Concharum praeparatarum partem unam.
Pulveris Gummi Arabici partes duas.
— Radicis Liquiritiae,
— — Althaeae,
singulorum partes quatuor.
Syrupi Sacchari quantum sufficit ut fiat massa pilularis. (*Vm.*)
Harntreibend, erweichend, schmerzstillend, bei Harnröhrenentzündung und Dysurie empfohlen. — Gabe, fünf bis sechs Stück, täglich drei Mal. — Auffallend ist es, daß Van Mons in seiner Ausgabe des Swediaur die Austerschaalen nur dann zusetzt, wenn die Gonorrhöe durch den Gebrauch des Biers erzeugt worden ist.

Trochisci de Nitro s. Nitratis Potassae. (Ed. Wür. *C. Sp.*)

℞. Nitri purificati . partem unam.
Sacchari . . . . . partes tres.
Contere et pulveri adde
Mucilaginis Gummi Tragacanthae quantum sufficit
ut fiat massa in trochiscos dividenda. (Ed Wür.)

Sp. Nitri partem unam, Sacchari sex, unam Succi Citri et Mucilaginis quantum sufficit.

Electuarium temperans. (Gen. Ham.)

℞. Nitri purificati drachmas duas.
Conservae Rosarum,
Oxymellis simplicis,
singulorum uncias duas.
Misce. (Ham.)
Gen. Nitri semunciam et Conservae Rosarum uncias quatuor absque oxymelle.

Tisana nitrata. (*Pie.*)

℞. Nitri . . . . semidrachmam.
Tisanae communis libras quatuor.
Dissolve sal in tisana. — Glasweise.

Potio diuretica. (*Sm.*)

℞. Nitri . . . . . semidrachmam.
Succi Cerefolii cochlearia viginti quatuor.
Dissolve. — Eßlöffelweise.

Potio febrifuga. (B*.)

℞. Nitri . . . . unciam unam.
Succi Baccarum Oxycocci libram unam.
Dissolve. — Gegen Wechselfieber. — Man giebt davon täglich eine Unze bis ein halbes Pfund. — Statt des succi oxycocci kann man auch den succus rubi oder myrtilli nehmen.

Mixtura nitrosa. (BorC.)

℞. Nitri . . . . drachmas duas.
Aquae purae . . . uncias octo.
Syrupi Sacchari . unciam unam.
Misce.

Gargarisma commune. (Ful. Li.)

℞. Nitri . . . . drachmam unam.
Aquae communis . uncias octo.
Solutioni adde
Syrupi Aceti . . unciam unam.
Kühlend, reizend, auflösend.

Mixtura e Kali nitrico s nitrata s. refrigerans s. sedativo-refrigerans. (WW. *Sa. Sm.*)

℞. Nitri . . . drachmam unam.
Aquae communis . uncias octo.

Solutioni adde
Oxymellis simplicis unciam unam.
Alle Stunden zwei Eßlöffel. (WW.)

℞. Nitri . . . . . semunciam.
Aquae purae . . . uncias sex.
Solutioni adde
Aceti,
Syrupi Aceti Rubi Idaei,
singulorum unciam unam.
Man giebt alle zwei Stunden einen oder zwei Löffel. (*Sm.*)

℞. Nitri . . . drachmam unam.
Aquae Florum Sambuci
uncias octo.
Syrupi Mororum sesquiunciam.
Gabe, alle Stunden zwei Eßlöffel. (Sar.)

Linctus s. Looch refrigerans. (*Sa.*)

℞. Nitri . . . . semidrachmam.
Syrupi Rubi Idaei unciam unam
— Ribium . . uncias tres.
Misce bene.

Injectio lithontriptica. (*Bo.*)

℞. Nitri . . . . . uncias duas.
Acidi nitrici . drachmas duas.
Collae Flamandicae unciam unam.
Aquae . . . . libram unam.
Dieses Einspritzungsmittel wurde zur Auflösung von Steinen, welche aus phosphorsaurem und sauerkleesaurem Kalk bestehen, vorgeschlagen.

Potio aperitiva. (*Ra.*)

℞. Nitri . . . . scrupulum unum.
Decocti Quinque Radicum
uncias quinque.
Syrupi Quinque Radicum
uncias duas.
Loco syrupi Oxymel et, si necesse est, Spiritus Mindereri semuncia addi potest. — Wird bei Wassersuchten empfohlen.

Potio nitrosa, Potion nitrée (*Ra.*). Nitri grana octodecim, Decocti Graminis uncias quatuor et Syrupi Quinque Radicum unciam unam. — Paßt wie die vorige zur Bethätigung der Urinabsonderung.

Potio temperans. (*Sm.*)

℞. Nitri . . . grana quindecim.
Aquae Lactucae . . uncias sex.
Solutioni adde
Aquae Florum Aurantiorum
drachmas duas.
Syrupi Nymphaeae . uncias duas.
Auf zwei oder drei Mal während der Nacht, im Anfang hitziger Krankheiten.

Julapium refrigerans. (*Pie*)

℞. Nitri . . . semidrachmam.
Infusi Capilli Veneris
uncias quinque.
Solutioni adde
Succi Aurantiorum uncias duas.
Syrupi Granati . unciam unam.
Auf vier Mal.

Gargarisma refrigerans s. nitrosum. (*Fi. Sa. Sm.*)

℞. Nitri . . . . . drachmas sex.
Decocti Hordei . libram unam.
Solutioni adde
Oxymellis simplicis uncias duas.
Misce. (*Sm.*)
Sa. Mellis rosati uncias tres loco oxymellis; — *Fi.* Nitri scrupulum unum, Aquae communis libram unam, Aceti semunciam, Mellis rosati unciam unam.

Potio antiphlogistica. (Ham.)

℞. Nitri . . . . drachmas tres.
Decocti Radicis Althaeae
uncias octo.
Oxymellis simplicis uncias duas.
Löffelweise.

Tisana antiphlogistica. (*Au. Ca. E.*)

℞. Hordei mundati uncias duodecim.
Aquae . . . . . libras tres.
Coque donec hordei semina sint dirupta, tunc decocto adde
Nitri . . . . sesquidrachmam.
Syrupi Aceti . . . uncias duas.
Alle Stunden eine kleine Tasse, bei entzündlichen Fiebern (*Ca.*)
Au. Decocti Hordei libras duas, Nitri drachmam unam et Oxymellis unciam unam; — *E.* Decocti Hordei octarium unum, Nitri drachmas duas et Succi Citri unciam unam ad duas.

Potio diuretica. (*Ca.*)

℞. Nitri . . . . . semunciam.
Decocti Hordei
octarium (chopine) unum.
Olei Amygdalarum dulcium
uncias quatuor.
Syrupi Althaeae . . uncias sex.
Tassenweise alle vier Stunden, bei Dysurie und Strangurie.

Decoctum stomachicum resolvens, Tisana stomachica resolvens. (B.)

℞. Decocti amari . . libram unam.
Extracti Taraxaci drachmam unam.
Nitri . . . . sesquidrachmam.
Allmälig zu nehmen, bei Anschwellungen der Unterleibseingeweide mit träger Verdauung.

℞. Decocti amari . libram unam.
Nitri . . . . . drachmas duas.
Den Tag über zu nehmen.

Clysma s. Enema refrigerans. (*Au. Sa.*)

℞. Nitri . . . . , semidrachmam.
Decocti Seminum Lini
uncias quinque.

Solutioni adde
Olei Lini recentis,
Oxymellis simplicis,
singulorum unciam unam.
Misce. (*Sa.*)

℞. Decocti Hordei . uncias decem.
Nitri . . . . drachmam unam.
Mellis . . . . unciam unam.
Misce. (*Au.*)

℞. Seri Lactis . . uncias quatuor.
Nitri . . . drachmam unam.
Oxymellis simplicis unciam unam.
Misce. (*Au.*)

Emulsio nitrosa. (GalM. *Au. B. Sa.*)

℞. Nitri . . . scrupulum unum.
Dissolve in unciis sex emulsionis praeparatae cum
Amygdalarum dulcium excorticatarum . . . . drachmis sex.
Seminum Papaveris albi
drachma una.
Aquae Tiliae quantitate sufficiente.
Solutioni adde
Syrupi Succi Citri unciam unam.
Stündlich, löffelweise. (*Sa.*)

℞. Amygdalarum dulcium excorticatarum . . . . semunciam.
Aquae . . . . libram unam.
Nitri . . . . . semunciam.
Syrupi Althaeae unciam unam.
Fiat emulsio. (*Au.*)

℞. Emulsionis gummosae
libram unam.
Nitri . . . . drachmam unam.
Mellis despumati unciam unam.
Misce. (*B.*)

GalM. Emulsioni simplici Nitri partes decimas tres addere jubet.

Emulsio Barthezii. (*Bo.*)

℞. Nitri . . . . . grana decem.
Dissolve in emulsione praeparata cum
Seminum frigidorum majorum
semuncia.
Decocti drachmarum duarum Chinae unciis octo.
Solutioni adde
Syrupi Capilli Veneris
unciam unam.
Auf zwei Mal, bei Blutspeien und andern Brustbeschwerden.

Tisana vinosa. (*Pie.*)

℞. Nitri . . . . semidrachmam.
Aquae communis . libras duas.
Solutioni adde
Vini albi vel rubri uncias quinque.
Ein Reizmittel für den Darmcanal, glasweise zu nehmen.

Potio refrigerans. (*Sa.*)

℞. Nitri,
Sacchari albi,
singulorum scrupulos duos.
Aquae alexiteriae simplicis
uncias duas.
Essentiae Piperis Jamaicensis
drachmas duas.
Dieser Trank ist keineswegs kühlend, sondern vielmehr stark reizend.

Potio leniens s. sedans et diuretica. (*Pie.*)

℞. Nitri . . . . . grana viginti.
Aquae destillatae Parietariae,
— — Petroselini,
— — corticis Fabarum
singularum unciam unam.
Acidi nitrici alcoholisati
scrupulum unum.
Syrupi Limonum unciam unam.
Auf einmal zu nehmen. — Man wiederholt es alle vier Stunden, wenn die Schmerzen nicht weichen, indem man nöthigenfalls eine Unze Syrupus Papaveris albi zusetzt.

Julapium lenians et purgans. (*Pie.*)

℞. Nitri . . . . drachmas tres.
Aquae Lactucae,
— Rosarum,
— Portulacae,
— Rhoeados,
singularum uncias tres.
Solutioni adde
Syrupi Violarum,
— Granati,
singulorum sesquiunciam.
Auf drei Mal den Tag über.

Julapium temperans. (*Sm.*)

℞. Nitri . . . . grana duodecim.
Aquae Lactucae,
— Portulacae,
singularum uncias quatuor.
Solutioni adde
Syrupi Violarum . uncias duas.
— Limonum unciam unam.
Aquae Florum Aurantiorum
semunciam.
Auf zwei oder drei Mal, während der Nacht zu nehmen.

B. Präparate, in denen die Wirkung des Salpeters mehr oder weniger durch fremde Substanzen verändert ist.

1) Durch Campher.

Pulvis nitroso-camphoratus. (*Sy.*)

℞. Nitri . . . . . grana decem.
Camphorae grana quatuor ad octo.
Gummi Arabici scrupulum unum.
Auf zwei oder drei Mal zu nehmen.

℞. Nitri,
Sacchari,
singulorum grana quindecim.

Camphorae grana duo ad quatuor.
Ebenſo angewendet wie das vorige.

Pulvis temperans camphoratus. (D. DD.)
℞. Pulveris refrigerantis
partes octodecim.
Camphorae pulveratae
partem unam.
Misce sedulo.

Pulvis alexipharmacus. (Wir.)
℞. Nitri crudi . . . . sesquiunciam.
Oculorum Cancri Acido citrico saturatorum . . unciam unam.
Boli Armenae . . sesquiunciam.
Camphorae . drachmam unam.
Pulverata misce. — Gabe, einen bis zwei Scrupel.

Aqua diuretica camphorata. (*Ca.*)
℞. Nitri . . . . . uncias duas.
Camphorae cum Alcoholis pauxillo tritae . . drachmam unam.
Trituratis simul adde pedetentim
Aquae octarium (chopine) unum.
Eßlöffelweiſe.
℞. Nitri . . . . uncias quatuor.
Aquae Parietariae . libras duas.
Solutioni adde
Acidi acetici . uncias quatuor.
Alcoholis . . . . semilibram.
Camphorae . . drachmas sex.
Agitata diu filtra. — Sogleich eßlöffelweiſe zu nehmen

Emulsio refrigerans. (*Sm.*)
℞. Nitri . . . . . grana decem.
Liqua in emulsione refrigerata, praeparata tr turando in mortario
Seminum Cannabis
pugillum unum
et pastae sensim infundendo
Aquae bullientis
octarium (chopine) unum.
Solutioni adde
Camphorae in Aethere dissolutae
grana sex.
Syrupi Nymphaeae uncias duas.
Abends zu vier Gläſern, ſtündlich, bei gonorrhoea chordata.

Tisana emulsiva camphorata s. cum Camphora. (*Sm.*)
℞. Nitri . . . . scrupulum unum.
Camphorae . . . grana octo.
Seminum Melonum uncias duas.
Fiat emulsio cum
Aquae fontanae
sufficiente quantitate.
Colaturae (librarum duarum) adde
Sacchari . . . . uncias duas.
Alle zwei Stunden ein Glas mit Zuſatz einiger Tropfen Citronenſaft.

Mixtura diuretica et refrigerans. (*Pie.*)
℞. Nitri . . grana quinquaginta.
Camphorae . grana quadraginta.
Mellis Narbonnensis unciam unam.
Tere diu et adde
Aquae sufficientem quantitatem.
In der erſten Periode der Harnröhrenentzündung empfohlen.

Mixtura nitrato-camphorica. (*Sw**.)
℞. Nitri . . . . sesquidrachmam.
Sacchari albi . drachmas tres.
Olei Camphorae semidrachmam
ad drachmam unam.
Commisce exacte, tunc tritura cum
Mellis albi . . . sesquiuncia.
Aquae Salviae . . unciis decem.
Reizend, für krampfſtillend und ſchweißtreibend gehalten und bei exanthematiſchen Fiebern, beſonders aber gegen Seitenſtechen empfohlen. — Gabe, einen oder zwei Löffel alle zwei Stunden.

2) Durch Eiſen.

Pulvis diureticus martialis. (Ham.)
℞. Pulveris diuretici quantum vis.
Limaturae Ferri porphyrisatae
scrupulos quatuor.
Divide in partes octo.

3) Durch ſalzſaures Ammoniak.

Pulvis refrigerans. (*Sw**.)
℞. Nitri . . . . . partes duas.
Salis Ammoniaci partem unam.
Misce terendo. — Man wendet es, in eine Blaſe gethan und mit Waſſer getränkt oder mit zerſtoßenem Eis vermiſcht, in kühlenden Umſchlägen auf die Oberfläche des Körpers, beſonders in Fällen von eingeklemmten Brüchen an.

Fomentatio s. Fotus refrigerans s. frigidus s. frigida Schmuckeri s. Richteri, Mixtura frigorifica s. antiphlogistica. (B*. Ful. Han. HassP. *Au. B. Br. Ca. Fi. Pie. Sp. Sw.*)
℞. Nitri . . . . uncias octo.
Salis Ammoniaci uncias quatuor.
Aquae . . . . libras viginti.
Solutioni adde
Aceti . . . . . libras duas.
Misce bene. (*Ca Sw.*)
B*. Nitri, Salis Ammoniaci, singulorum libram unam, Aquae uncias sexcentas quadraginta et Aceti nonaginta sex; — *Pie.* Nitri libram unam, Salis Ammoniaci uncias octo, Aquae libras duodecim et Aceti libras quatuor; *Sp.* Nitri semunciam, Salis Ammoniaci uncias duas, Aquae centum viginti, et Aceti duodecim; — *Br* Nitri uncias duas, Salis Ammoniaci unam et Aquae fontanae cum Acido acetico acidulatae libras duas; — Han. Salis Ammoniaci, Nitri, singulorum unciam unam,

Aquae et Aceti, singulorum sedecim; — HassP. Salis Ammoniaci, Nitri, singulorum partem unam, Aceti partes quatuor, Aquae quadraginta octo; — Ful. Nitri uncias duas, Salis Ammoniaci unam, Aceti semilibram et Aquae libras sex; — *Au.* Nitri uncias quatuor, Salis Ammoniaci duas, Aceti libram unam et Aquae octo; — *B.* Nitri drachmas tres, Salis Ammoniaci duas, Aceti libram unam et Aquae quatuor; — *Fi.* Nitri, Salis Ammoniaci, singulorum unciam dimidiam, Aquae uncias novem, Aceti fortis uncias tres; — vel: Nitri semunciam, Salis Ammoniaci drachmas duas, Aquae libras duas, Aceti uncias duas (*Foment. Richteri*).

Diese Flüssigkeit ist besonders bei Quetschungen und Austretungen von Blut ꝛc. von Nutzen. Man tränkt vier- oder sechsfach zusammengelegte Leinwand damit und legt sie kalt auf; die Ueberschläge müssen alle Stunden erneuert werden.

Tinctura antigonorrhoica s. contra gonorrhoeam. (*Pie.*)

℞. Nitri . . . . . uncias duas.
Salis Ammoniaci drachmas duas.
Aquae . . . octarium unum.
Dissolve blando calore et adde
Camphorae . . drachmas duas.
Alcoholis sufficientem quantitatem.
Macerentur ad refrigerationem producti usque et filtrentur. — Gabe, ein Löffel, in einem Glase Wasser.

4) Durch Opium.

Boli contra tussim. (*Pie. Sm.*)

℞. Nitri purificati grana duodecim.
Pilularum de Cynoglosso grana quatuor.
Conservae Rosarum rubrarum scrupulos duos.
Fiant boli duo. — Jeden Abend alle zwei oder drei Stunden.

Potio antinephretica. (Fer.)

℞. Capitum Papaveris . uncias sex.
Aquae . . . . . libras tres.
Decoque ad unciarum octo remanentiam et adde colaturae
Nitri . . . . unciam unam.
Gabe, eine bis zwei Drachmen täglich in acht Unzen Leinsaamen- oder Eibischabkochung.

5) Durch Meerzwiebel.

Pulvis diureticus. (*Pie. Sw.*)

℞. Nitri calcinati . . partes octo.
Radicis Vincetoxici partes sex.
Scillae siccatae . partem unam.
Misce bene. (*Pie. Sw.*)
Sw. praeterea: Nitri grana quindecim, Scillae et Piperis Jamaicensis, singulorum decem.

℞. Nitri,
Cremoris Tartari,
singulorum scrupulos quatuor.
Pulveris Scillae . . grana octo.
— Zingiberis grana sedecim.
Misce et divide in partes octo. (Ham.)
Bei Wassersuchten, besonders Bauchwassersucht, Asthma und chronischen Blasenkrankheiten, als harn- und schweißtreibendes Mittel. — Die erste Formel ist von Van Helmont. Man giebt das Pulver zu zehen bis zwanzig Gran, zwei, drei oder vier Mal täglich.

Mixtura diuretica. (*Fi. Sw.*)

℞. Nitri . . . . drachmas duas.
Aquae . . . . . uncias octo.
Solutioni adde
Pulveris Radicis Scillae semidrachmam.
Oxymellis scillitici unciam unam.
Fi. loco pulveris scillae Extracti Scillae scrupulum unum.
Bei Wassersuchten und Brustbeschwerden von sogenannter Verschleimung gepriesen. — Gabe, zwei bis drei Löffel drei Mal täglich.

Decoctum resolvens et diureticum, Tisana resolvens et diuretica. (*B.*)

℞. Decocti Graminis libram unam.
Extracti Trifolii,
Nitri, singulorum drachmam unam.
Oxymellis scillitici unciam unam.
Allmälig zu nehmen, bei Verstopfungen der Leber und der Milz.

Potus antiphlogisticus diureticus, Tisana diuretica. (*B.*)

℞. Decocti Radicis Asparagi libras duas.
Nitri . . . . drachmas duas.
Oxymellis scillitici semunciam.
Allmälig zu nehmen.

6) Durch säuerliche oder Neutralsalze.

Mixtura refrigerans. (*Au. Sw.*)

℞. Nitri,
Cremoris Tartari,
singulorum drachmas duas.
Aquae . . . . . uncias octo.
Solutioni adde
Syrupi Aceti Rubi Idaei unciam unam.
Alle zwei Stunden einen Eßlöffel. (*Sw.*)

℞. Nitri,
Cremoris Tartari,
singulorum drachmas tres.
Aquae . . . . . uncias sex.
Succi Citri,

Syrupi Limonum,
singulorum unciam unam.
Gabe, alle zwei Stunden einen Löffel. (*Au.*)

Mixtura salina simplex. (*Sa.*)
℞. Nitri,
Cremoris Tartari,
singulorum drachmas sex.
Aquae Foeniculi uncias quinque.
Solutioni adde
Aetheris sulphurici
drachmam unam.
Syrupi Capitum Papaveris
uncias duas.
Ebenso wie das vorige angewendet.

Potus antiphlogisticus et diureticus, Tisana refrigerans et diuretica. (*B.*)
℞. Decocti Graminis . libras duas.
Cremoris Tartari unciam unam.
Nitri . . . . . drachmas tres.
Sacchari . . . unciam unam.
Den Tag über allmälig zu trinken.

Tabellae de tribus, Saccharum nitratum. (*Sa.*)
℞. Nitri purificati . unciam unam.
Cremoris Tartari . semunciam.
Sacchari albi . . libram unam.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae
quantum sufficit
ut fiant tabellae.

Pulvis temperans diureticus s. temperans albus s. nitrosus s. Nitri tartaricus. (Fenn. Ham. Li. *B.*)
℞. Nitri . . . . drachmas tres.
Cremoris Tartari . semunciam.
Divide in partes octo. — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden.
℞. Nitri . . . . partem unam.
Cremoris Tartari . partes tres.
Misce bene. (Ham.)
Li. Salium, singulorum partes aequales.
℞. Nitri purificati,
Cremoris Tartari,
singulorum unciam unam.
Sacchari albi . . . uncias tres.
Pulverata seorsim commisce (Fenn.). — Gabe, eine halbe Drachme für Erwachsene.

Pulvis Nitri tartaricus. (Suec.)
℞. Nitri depurati . partes decem.
Acidi tartarici bene siccat
partes duas.
Subcarbonatis Magnesiae
partem unam.
Sacchari albi . partes triginta.
Tritura acidum cum magnesia, tunc cum saccharo et denique cum nitro.

Mixtura refrigerans. (*Sw.*)
℞. Nitri . . . . drachmas tres.
Acidi tartarici scrupulum unum.
Sacchari albi . . unciam unam.
Aquae . . . . . uncias octo.
Dissolve. — Interdum adduntur Olei Amygdalarum dulcium uncia una vel duae. — Stündlich, löffelweise.

Pulvis temperans Bouillon - Lagrange. (*Ca.*)
℞. Nitri . . . . . libras tres.
Tartari
libras quatuor cum dimidia.
Acidi borici . . libram unam.
Pulverata per cribrum setaceum tenerrimum cribra. — Temperirend, laxirend, bei Hautkrankheiten, manchen Catarrhalbeschwerden und retentio urinae empfohlen. — Gabe, eine halbe Drachme in einer Pinte Wasser, wozu man zwei und eine halbe oder vier Drachmen zerfallenes Glaubersalz setzt, und wovon man Morgens ein Glas voll trinkt.

Pulvis Nitri oxalicus s. nitrosus s. temperans Rosensteinii. (B°. Suec. *Vm.*)
℞. Nitri depurati . sesquiunciam.
Salis Acetosellae . semunciam.
Tabellarum Citri
uncias septem cum dimidia.
Pulverata misce. (B°.)
℞. Nitri . . . . . uncias tres.
Salis Acetosellae unciam unam.
Sacchari albi . . uncias decem.
Pulverata seorsim misce. (Snec.)
Vm. Acetosellae Salis unciam unam, Nitri duas et tres Sacchari.

Pulvis diaphoreticus. (*E.*)
℞. Nitri . . . . drachmam unam.
Tartari stibiati . granum unum.
Mercurii dulcis . . grana sex.
Fiant doses sex. — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden in Syrup.

Trochisci refrigerantes s. temperantes. (Ful. *Sp.*)
℞. Pulveris Nitri . drachmas sex.
— Salis Acetosellae
drachmas duas.
— Sacchari albi uncias sex.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae
quantum sufficit
ut fiat massa trochiscorum. (Ful.)
Sp. Nitri unciam unam, Salis Acetosellae drachmas quatuor, Sacchari uncias sex, Essentiae Citri semiscrupulum et Mucilaginis Gummi Tragacanthae quantum sufficit.
Gabe, eine bis vier Drachmen.

Pulvis febrifugus salinus. (*Vm.*)
℞. Nitri partes duas cum dimidia.
Subcarbonatis Potassae
partem unam cum dimidia.

Cremoris Tartari . partes duas.
Sulphatis Potassae . partes tres.
Nucis moschatae partem unam.
Pulverata sedulo misce.

Pulvis temperans. (Bor. BorC. Bor4. Han. HassP. O. R. *Vm.*)

℞. Nitri,
Sulphatis Potassae
singulorum partes aequales.
Pulverata misce.

Pulvis temperans Unzeri. (Br. *Pid. Sp.*)

℞. Nitri depurati,
Sulphatis Potassae,
singulorum unciam unam.
Pulveris diatragacanthae
drachmas duas.
Misce bene. (*Pid.*)

℞. Nitri,
Sulphatis Potassae,
Subcarbonatis Magnesiae,
singulorum partes aequales.
Misce ut fiat pulvis. (Br.)

Sp. eandem formulam sed loco magnesiae Oculos Cancrorum.

7) Durch Schwefel.

Pulvis pyricus s. pyricus de Struensee. (B*.)

℞. Nitri . . . . . partes sex.
Sulphuris,
Carbonis,
singulorum partem unam.
Pulverata misce. — Aetzmittel bei Biß-wunden wüthender Thiere. — Ein schlechtes Mittel, da es nur oberflächlich wirkt.

Protochloras Potassii, Chloras Protoxydi Potassii, Chloras Potassii, Murias Potassae hyperoxygenatum s. oxygenatum, Alcali vegetabile salito-dephlogisticatum, Chloruretum Potassae oxydatum, Haloidum oxygenatum, Oxygeno-chloruretum Potassii, Potassae Euchloras, Kali muriaticum oxygenatum s. oxymuriaticum s. chloricum, Chloras kalicus; oxydirt salzsaures Kali; Protochlorate de potassium, Chlorate de protoxide de potassium, Chlorate de potasse, Muriate suroxigéné de potasse (*Gal.*). (B*. Bor4. Fer. Gal. *Br. Fi. Sw. T. Vm.*)

℞. Salis communis,
Acidi sulphurici,
singulorum partes quinque.
Potassae causticae fusae
partes quinque cum dimidia.
Oxydi Manganí
partes octo cum dimidia.
Potassae Aquam adde, donec liquidum non supra 30° B. indicet, filtra, in vitrum cylindricum, longum et arctum infunde, in liquorem transmitte torrentem Chlori reliquas tres substantias commiscendo producti; lamellas quae subsident, collige et cum Aquae frigidae pauxillo ablue. (B*. Fer. Gal. *Br. Sw. T. Vm.*)

Fi. Salis marini libras duas, Oxydi Mangani, Acidi sulphurici, singulorum libram unam, Potassae causticae fusae unciam unam, Aquae purae libras quatuor; — GalH. et *Sw.* Subcarbonatem praescribunt; GalH. liquidum 20° B. et redissolutionem lamellarum in Aqua bulliente indicat.

Bor4. Kali oxymuriaticum venale indicat, quod depuratur solvendo in Aquae destillatae fervidae partibus tribus, filtrando et ad crystallisationem reponendo.

Reizend, bei Scorbut, Flechten, chronischer Leberentzündung und venerischen Krankheiten empfohlen. — Gabe, fünfzehen bis dreißig Gran.

Solutio Muriatis Potassae oxygenati, Liquor ad ulcera atonica, Solutio Chloratis Potassae. (B*. *Sw. Sy.*)

℞. Chloratis Potassae
drachmam unam.
Aquae destillatae uncias duodecim.
Dissolve. — Man tränkt mit dieser Flüssigkeit Charpieplumasseaux oder trägt sie mittelst eines Pinsels auf schmerzlose Geschwüre, um das Leben der Gewebe zu bethätigen.

Aqua alcalina oxymuriatica. (B*. Du.)

℞. Salis communis decrepitati
libras duas.
Oxydi Mangani . libram unam.
Aquae,
Acidi sulphurici,
singulorum libras duas.
Commisce sal et oxydum, immitte in retortam et infunde aquam, adde deinde sensim acidum et transmitte torrentem Gasis evoluti e liquore praeparato cum Subcarbonatis Potassae unciis quatuor et Aquae unciis viginti novem. Liquidum saturatum pendet 1,087.

Potus oxygenatus, Tisana oxygenata. (*Sw.*)

℞. Solutionis Chloratis Potassae
libras duas.
Aquae purae . . libras quatuor.
Commisce. — Reizend, in Fällen allgemeiner Asthenie gepriesen. — Gabe, ein bis zwei Pfund täglich.

Protohydrochloras Potassii, Hydrochloras Protoxydi Potassii, Hydrochloras s. Murias Potassae, Sal digestivum

s. *febrifugum s febrifugus etc. Sylvii*, *Spiritus Salis marini coagulatus*, *Chloruretum Potassii*; Hydrochlorsaures Kali, Sylvius Digeſtivſalz; Protohydrochlorate de potassium, Hydrochlorate ou Muriate de potasse, Sal digestif ou febrifuge de Sylvius (*Gal.*). (B°. Ba. Br. Gal. His. Sar. Wir. *Fi. Sp. T. Vm.*)

℞. Subcarbonatis Potassae
quantum vis.
Aquae . . . quantum sufficit ad dissolutionem; liquori filtrato in
funde
Acidi hydrochlorici
quantum sufficit ad saturandam potassam. Evaporet liquidum, donec 30° indicet et sepositum crystallisationi subjiciatur. (Ba. Gal. His. Wir. *T.*)

Fi. Salis Tartari quantum vis; infundatur Acidum muriaticum per vices, donec effervescentia cessaverit, filtra et ad cuticulam usque consume.

℞. Salis communis
partes quinque cum dimidia.
Subcarbonatis Potassae calcinati
partes sex cum dimidia.
Aquae . . . . partes sedecim.
Coque, filtra et ad crystallisandum repone, liquorem calidum servando, donec non amplius crystallos demittat. (*Vm.*)

B°. Sar. *Fi. Sp.* et *T.* Residuum e praeparatione Subcarbonatis Ammoniaci elegi volunt; — Br. et Wir. Sal commune per Sal Tartari in Aqua dissolutum decomponi et crystallisationi subjici volunt.

Potest etiam, secundum *Chevallier* et *Idt*, Sulphas vel Supertartras Potassae dissolvi in Aqua destillata et liquori infundi Hydrochloras Calcis liquidus, donec non amplius oriatur praecipitatum. (*T.*)

Dieſes Salz führt, cryſtalliſirt, den Namen *Chloruretum Potassii*.

Reizend, ſchmelzend, einſchneidend, gegen viers und dreitägige Fieber als ſchweiß- und harntreibendes Mittel geprieſen. — Gabe, ein bis zwei Scrupel in vier Maß ſo viel Waſſer.

Hydrosulphas Potassae. (*Vm.*)

℞. Potassae causticae calcinatae
partem unam.
Aquae . . . . . partes sex.
Post solutionem immitte torrentem Gasis acidi hydrosulphurici in liquorem, qui post subsidentiam clarefactus servetur.

Protoacetas Potassii, *Acetas Protoxydi Potassii*, *Acetas Potassae*, *Acetis s*, *Acetas Potassae s. Lixiviae s. kalicum s. kalicus*, *Alcali Tartari Aceto saturatum*, *Alcali vegetabile cum Aceto*, *Arcanum Tartari*, *Kali acetatum s. aceticum*, *Lixivia acetata*, *Magisterium Tartari purgans*, *Oxytartarus*, *Sal diureticus*, *Tartarus acetosus*, *Terra foliata Tartari*; Weinſteinblättererde, eſſigſaures Kali; Protoacétate de potassium, Acétate de protoxide de potassium, Acétate de potasse, Terre foliée de tartre (*Gal.*). (A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pal. Pol. R. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. *Br. C. Fi. Pid. Sp. Sw. T. Vm.*)

1) Im feſten Zuſtande.

℞. Subcarbonatis Potassae sicci et pulverati . . . . libram unam.
Aceti fortis libras duas vel tres.
Calefac sal in capsula vitrea et adde sensim acetum; cessatâ effervescentiâ destillent in balneo aquae ad siccum; residuo adde novum acetum et iterum destillando ad siccum redige; continua ita, donec acetum immutatum transeat; sicca deinde sal blando calore, dissolve in Alcoholis triplo et tunc, filtratus liquor destillet in balneo aquae; residuum siccum serva. (Pal. Sar.)

℞. Subcarbonatis Potassae
partem unam.
Dissolve in Aquae parva quantitate et solutioni adde
Aceti destillati . . libras octo.
Coque ad syrupi parumper spissi consistentiam, adde novum acetum ita ut perfecte saturetur, sicca lente, continue agitando, liqua residuum in Aqua destillata et liquorem filtratum lente consume. (Ams. An. Wür. *Br.*)

℞. Subcarbonatis Potassae
quantum vis.
Aceti . . . . quantum sufficit.
Infunde sensim acidum sali et per plures dies digere, saepius agitando et an saturatio perfecta sit videndo; tunc lente ad siccum evaporatis, sal in Aqua pura dissolve et liquorem ad siccum usque consume. (B. Bel. Bor. Br. D. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gen. Han. His. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. Suec. Wir. *C. Fi. Pid. Sp. Sw.*)

℞. Subcarbonatis Potassae
quantum vis.
Immitte sensim in
Aceti destillati
sufficientem quantitatem ita ut perfecte dissolvatur. Cola liquorem et in capsula argentea consume ad quartae (tertiae Bor4. HassP.)

circiter partis remanentiam, tunc refrigeratum sepone ut subsideat et decanthato sensim adde Acetum; evaporet deinde ad siccum. (Gal. Bor4. HassP. *T.*)

Lon. Potassae sesquilibram, Acidi acetici congium; parte dimidia consumta instilla Acidum quod ad plenam saturationem sufficit; iterum ad dimidium evaporet etc.; — LonN. Potassae libram unam, Acidi acetici fortioris octarios duos, Aquae destillatae ferventis octarios duos, primum ad cessationem effervescentiae, deinde ad cuticulam evaporare jubet; — *Vm.* hunc ipsum agendi modum indicans acidum leviter calefacere jubet, antequam sal immittatur et liquorem statim caloris vividioris ope et sub continua agitatione ad siccum redigere.

Proposuerunt quidam ad obtinendum majorem salis alborem, liquorem per filtrum e carbonibus compositum transmittere (*T.*), vel illum frigide cum carbone animali tractare, vel cum pulvere Carbonum vegetabilium praeparatorum coquere (Bor4. HassP.), vel sal pluries dissolvere et vaporationibus successivis subjicere.

℞. Acetatis Calcis desiccati
partes septem cum dimidia.
Subcarbonatis Potassae desiccati
partes undecim et tres quadrantes.

Misce terendo et adde Aquae bullientis quantum exacte ad acetatem productum dissolvendum requiritur, quod per plures vices est infundendum, cola exprimendo et statim sicca ut supra. (*Vm.*)

℞. Sulphatis Potassae pulverati
partes octo cum quadrante.
Acetatis Barytae crystallisati
partes tredecim.

Commisce, adde Aquam et ut antea age. (*Vm.*)

Vm. praeterea Tartratem Potassae et Acetatem Calcis, singulorum partes aequales et in Aqua ad saturationem dissolutas vicissim commiscere ita ut alter alterum decomponat; fit hoc infundendo Tartratem in Acetatem, colando cum expressione, residuum abluendo et liquores commixtos evaporando.

T. Acetatem Plumbi liquidi per Solutionem Carbonatis vel Sulphatis Potassae decomponere, mixta igni exponendo ad bullitionem usque, filtrare et liquido infundere guttas aliquot Sulphatis vel Carbonatis Potassae et ad siccum usque evaporare.

2) Im flüssigen Zustande.

Acetas Potassae liquidus s. aquosus, Liquor Terrae foliatae s. Tartari vegetabilis s. Kali acetici s. digestivus Boerhaavii s. Alkali acetici nigri s. Terrae foliatae Tartari s. Salis Alcali vegetabilis acetati, Salsilago Oxytartari, Acetas Lixiviae solutus, Mixtura salina pauperum; Blätterweinsteinerdeflüssigkeit, flüssiges essigsaures Kali; Acétate de potasse liquide; Liqueur de terre foliée de tartre (*Gal.*). (A. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. D. DD. Fenn. GalM. Ham. Han. Hass. HassP. Li. O. Pol. R. Sax. Suec. *Fi. Pid. Sp. Sw. T. Vm.*)

℞. Subcarbonatis Potassae
quantum vis.
Acidi acetici concentrati
quantum sufficit

ad saturandum sal i. e. partes circiter duas; infunde sensim sali acidum, mixturam tubi vitrei ope agitando. Liquor filtratus pendeat 1,230 ad 1,235. (Ba.)

℞. Subcarbonatis Potassae
uncias duodecim.
Aceti . . . . quantum sufficit

ut perfecte saturetur. Mixta stent in digestione per aliquot dies, subinde agitata; adde acetum si requiritur, vaporando ad unciarum octoginta octo remanentiam (B.), vel ita consume ut liquor 7° indicet (Bel.).

Von dieser Formel giebt es zahlreiche Verschiedenheiten: Hass. Misce Subcarbonatis libram unam et Aceti communis quantum satis ad sal neutralisandum, consume deinde ad librarum trium remanentiam et filtrata serva; — A. Subcarbonatem cum Aceto destillato (pond. 1,005), tunc totum ad librarum trium remanentiam consume; ita ut liquoris pondus sit 1,200; — Fer. GalF. GalH. Subcarbonatem cum Aceto satura et Aquae fontanae sufficientem quantitatem adde ut totum pondus sit sesquilibra; — BorC. DD. Ful. *Sp. Vm.* In Aceto albo 6° Subcarbonatis dissolve quantum potest; liquorem filtra et serva; — Ham. Subcarbonatis unciam unam satura cum Aceti quantitate necessaria et ad unciarum sex remanentiam consume; — GalM. Commisce Subcarbonatis partem unam et Acidi 13° sedecim, calefac ad perfectam saturationem et serva.

℞. Acetatis Potassae partem unam.
Aquae destillatae . . partes duas.

Dissolve. (Ams. Bor. Bor4. Br. D. HassP. O. Pol. R. Sax. *Fi. Sw. T.*)

Bor4. Pond. sp. = 1,140 — 1,150.

Hass. et *Pid.* Sal volunt in aëre libro deliquescere et liquorem filtrari.

℞. Subcarbonatis Potassae
drachmas duas.

Aceti . . . . quantum sufficit ad saturandum sal. Liquori adde
Aquae communis uncias duas ad quatuor.
Oxymellis simplicis uncias duas.
Misce bene. (B*.)
℞. Subcarbonatis Potassae libram unam.
Infunde per portiones
Aceti . quantitatem sufficientem ut saturetur. Liquorem post tres dies filtratum consume balnei arenae ope ad librarum trium remanentiam et adde
Alcoholis . . . . uncias duas.
Serva in lagena obturata. (Li.)

Das essigsaure Kali ist ein Reizmittel, welches, je nach den Gaben oder den Umständen als auflösend, eröffnend, harntreibend und abführend wirkt. Man wendet es bei Wassersucht, Gelbsucht und Verstopfungen der Unterleibseingeweide an. — Die Gabe ist von einem Scrupel bis zur Drachme und mehr. Das Flüssige betreffend, so giebt man es gewöhnlich zu vierzig bis achtzig Tropfen in einem passenden Vehikel.

Mineralsäuren, Tamarindenabkochung, Quecksilbersublimat, salpetersaures Silber, schwefelsaures Natrum und Bittererde, salzsaures Ammoniak und Cremor tart. dürfen nicht damit verbunden werden.

A. Präparate, in denen die Wirkung des Salzes nicht oder wenigstens nicht merklich durch fremde Substanzen verändert ist.

Bolus antilactosus s. lac pellens. (*Sm.*)

℞. Acetatis Potassae scrupulum unum.
Conservae Florum Calendulae quantum sufficit.
Misce sedulo. — Morgens vier und zwanzig Tage lang zu nehmen um die Milch aus den angeschwollenen Brüsten zu entfernen; man trinkt dann einen Napf voll Quendel- und Selleriabkochung mit frischer Butter versetzt. Nöthigenfalls kann man Abends noch einen Bissen nehmen.

Potio diuretica. (*Ra. Sa. Sm.*)

℞. Acetatis Potassae semidrachmam.
Succi Cerefolii uncias duodecim.
Solutioni adde
Syrupi Quinque Radicum aperientium . . . uncias duas. (*Sm.*)

℞. Acetatis Potassae drachmas duas.
Infusi Tiliae . . uncias quatuor.
Solutioni adde
Aquae Cinnamomi drachmam unam.
Syrupi Aceti . . unciam unam.
Misce bene. (*Ra.*)

℞. Oculorum Cancrorum praeparatorum . . . . drachmas tres.
Aceti . . . . . sesquiunciam.
Cessata effervescentia liquorem dilue cum
Aquae fontanae . . unciis octo.
Solve in eo deinde
Acetatis Potassae drachmam unam et adde denique
Syrupi Foeniculi unciam unam.
Misce sedulo. (*Sa.*)

Löffelweise. — In der letztern Formel hängt die harntreibende Wirkung vornehmlich von dem essigsauren Kalk ab.

Potio aperiens s. aperitiva. (*Sm.*)

℞. Acetatis Potassae drachmas duas.
Infusi Chamomillae uncias sex.
Aquae Cinnamomi hordeatae uncias duas.
Extracti Millefolii drachmas quatuor.

Gabe, ein Eßlöffel dreimal täglich. Man trinkt dann einen Bouillon von vier Unzen Hammelfleischbrühe mit einer Handvoll Cichorien-, Huflattig- und Brunnenkreßblättern.

Mixtura ad icterum s. antiicterica. (*Ca*)

℞. Acetatis Potassae,
Extracti Taraxaci liquidi, singulorum semunciam.
— Cicutae liquidi grana decem ad viginti.
Aquae Foeniculi . . uncias sex.
Syrupi Quinque Radicum unciam unam.

Gabe, zwei Löffel alle vier Stunden.

Tisana aperiens s. aperitiva. (*Sm.*)

℞. Acetatis Potassae semidrachmam.
Nitri . . . scrupulum unum.
Succi Boraginis . uncias duas.
Solutioni adde
Seri Lactis clarificati octarium unum.

Desbois von Rochefort verordnete diesen Trank, den Tag über, aber größtentheils Morgens nüchtern zu nehmen.

Potio temperans, Mixtura salina. (Hass. Suec. *Sa.*)

℞. Subcarbonatis Potassae drachmas tres.
Aceti . . . . . uncias novem vel quantum satis ad saturationem.
Adde
Aquae fluvialis . libram unam.
Syrupi Sacchari . uncias duas.
Misce et filtra. (Suec.)

Hass. Subcarbonatem cum Aceto saturare, liquoris uncias quatuor vel quinque cum Aquae destillatae aequali quantitate dilnere et addere Syrupi apti alicujus unciam unam; praeterea: Sa-

lis Tartari quantum vis, Aceti Vini quantum sufficit ad saturationem (loco *Potionis Riverii*) (HassP.); — *Sa.* in lagenam immittere Aceti uncias novem, Aquae libram unam et Sacchari uncias duas, tunc addere Subcarbonatis Potassae drachmas tres et bene obturatam in loco frigido servare.

Gabe, zwei Eßlöffel alle zwei oder drei Stunden.

Conserva resolvens et aperiens. (*Bo.*)

℞. Terrae foliatae Tartari semunciam.
Sulphatis Sodae drachmam unam.
Succi Nasturtii,
— Fumariae,
— Mercurialis,
Succi Taraxaci,
singulorum uncias duas.
Sacchari . . . quantum sufficit.

Gabe, ein Eßlöffel voll, drei oder vier Mal täglich.

Electuarium ad scrophulas s. antiscrophulosum. (*Sm.*)

℞. Acetatis Potassae drachmas sex.
Conservae Cochleariae uncias duas.
Extracti Graminis,
— Taraxaci,
singulorum unciam unam.
Syrupi Cichorii compositi
quantum sufficit.

Gabe, ein Kaffeelöffel viermal täglich in einem Glase einer schwachen Hopfenabkochung.

Potus diureticus simplex, Tisana diuretica. (*Au. B.*)

℞. Decocti Graminis libram unam.
Liquoris Terrae foliatae Tartari
uncias duas.

Allmälig zu nehmen.

Potio diuretica. (*Au.*)

℞. Subcarbonatis Potassae
drachmas duas.
Aceti . . . . quantum sufficit ad saturandum alcali. Adde
Aquae . . . . uncias quatuor.
Syrupi Limonum . semunciam.

Allmälig zu nehmen.

℞. Subcarbonatis Potassae
drachmas duas.
Aceti . . . . quantum sufficit ad saturationem alcali. Adde
Aquae . . . . uncias quatuor.
Syrupi Rubi Idaei . uncias duas.

Allmälig zu nehmen.

℞. Subcarbonatis Potassae
drachmas duas.
Aceti aromatici quantum sufficit ad saturandum. Adde
Aquae Cinnamomi unciam unam.
Vini albi . . . uncias quatuor.

Gabe, alle Stunden einen Löffel.

Decoctum resolvens et diureticum, Tisana resolvens et diuretica. (*B.*)

℞. Decocti Graminis . libras duas.
Liquoris Terrae foliatae Tartari
uncias duas.

Allmälig zu nehmen, bei Wassersucht.

℞. Decocti amari . . libram unam.
Tincturae Rhei aquosae
uncias quatuor.
Terrae foliatae Tartari
drachmas duas.

Bei Anschwellungen der Unterleibseingeweide.

℞. Infusi Corticis Aurantiorum
libram unam.
Terrae foliatae Tartari
drachmas duas.
Sacchari . . . . unciam unam.

Bei sogenannten asthenischen Entzündungen.

B. Präparate, in denen die Wirkung des essigsauren Kali mehr oder weniger durch fremde Substanzen verändert ist.

1) Durch Alcohol.

Hierher gehört außer den folgenden Formeln auch der liquor terrae foliatae tartari nach Li.

Potio diuretica. (*Ra.*)

℞. Acetatis Potassae unciam unam.
Vini albi . . . libram unam.

Bei sogenannten passiven Wassersuchten, d. h. wenn kein Zeichen einer heftigen Reizung des Darmcanals bemerkt wird, empfohlen.

Liquor Terrae foliatae Tartari spirituosus. (Br. Pal. Wir.)

℞. Acetatis Potassae bene siccati
uncias duas.
Alcoholis concentrati uncias octo.

Stent in digestione per dies aliquot tunc filtrentur. — Ehedem als ein vortreffliches Mittel bei Hypochondrie, Podagra, viertägigem Fieber und allen durch Stockungen entstandenen Krankheiten gepriesen. — Gabe, dreißig bis sechszig Tropfen.

Solutio lithontriptica della Lena. (B*.)

℞. Acetatis Potassae liquidi
uncias duas cum dimidia.
Subcarbonatis Potassae
unciam unam.
Aquae destillatae uncias quatuor.
Alcoholis . . . . uncias duas.

Stent in digestione ad perfectam salis solutionem usque.

Man kann von dieser Flüssigkeit zehen bis dreißig Tropfen in einem schicklichen Vehikel geben.

de potassium, Citrate de potasse (*Gal.*). (Ba. Bor. Han. O. *Br. Sw. T. Vm.*)

℞. Subcarbonatis Potassae crystallisati quantum vis.
Succi Citri recens expressi quantum sufficit ad saturationem. Infunde pedetentim succum et subinde liquorem reagentium ope de saturationis gradu indagando; sepone per horas viginti quatuor, filtra et ad siccum consume.

Citras Potassae aquosus, Mixtura salina s. salina simplex, Solutio Citratis kalici. (B*. Fenn. Lus. Suec. *Au. Br. Sw.*)

℞. Subcarbonatis Potassae drachmas tres.
Succi Citri . . . semilibram, vel quantum ad saturationem kali sufficit. Adde
Aquae fontanae sufficientem quantitatem ut libra una liquidi impleatur et
Syrupi Sacchari unciam unam.
Misce bene. (B*. Fenn. Lus. Suec. *Br.*)

℞. Subcarbonatis Potassae drachmam unam.
Succi Citri . . . . uncias tres.
Solutioni adde
Aquae Cinnamomi . uncias sex.
Sacchari albi . . . semunciam.
Misce. (*Sw.*)
Gabe, alle fünf oder sechs Stunden drei Eßlöffel.

Mixtura salina composita s. Macbridii. (Lus.)

℞. Succi Citri . . unciam unam.
Subcarbonatis Potassae quantum sufficit ad saturandum acidum. Adde
Aquae Menthae uncias septem.
Tartari stibiati . granum unum.
Syrupi Sacchari . . semunciam.
Misce.

Mixtura tonica. (*E.*)

℞. Succi Citri . . . sesquiunciam.
Subcarbonatis Potassae drachmam unam.
Tincturae Chinae unciam unam.
Aquae Cinnamomi uncias tres.
Gabe, alle zwei Stunden ein Löffel.

Prototartras Potassii, Deutotartras Potassii, Tartras Protoxydi Potassii, Tartras neutrum Potassae, Alcali vegetabile tartarisatum s. fixum tartarisatum, Kali tartaricum s. tartarisatum, Lixivia tartarisata, Sal vegetabile, Sal panchrestum s. diureticum vegetabile, Tartaras tartarisatus s. solubilis, Tartras kalinus s. Lixiviae s. Potassae; weinsteinsaures Kali, Weinsteinkali, tartarisirter Weinstein; Prototartrate de potassium, Tartrate de protoxide de potassium, Tartrate de potasse, Tartrate neutre de potasse, Tartre tartarisé, Tartre soluble, Sel végétal (*Gal.*). (A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pal. R. Sar. Sax. Suec. Wir. Würz. *C. Fi. Par. Pid. Sp. Sw. T. Vm.*)

1) Im festen Zustande.

℞. Subcarbonatis Potassae quantum vis.
Aquae ferventis quantum sufficit (sextuplum vel octuplum) ad solutionem. Liquori bullienti adde
Cremoris Tartari quantum sufficit ad saturandum perfecte acidi excessum. Post refrigerationem filtra et ad cuticulam evaporata in crystallos coge.

Bor. Bor4. Kali carbonici quantum vis, Aquae fervidae octuplum, Tartarum depuratum adde, donec effervescentia cesset et ad saturationem, massam ad siccum inspissatam solve in Aquae destillatae frigidae partibus decem et per horas 36 sepone, liquorem filtratum et ad siccum evaporatum serva; — HassP. per horas viginti quatuor seponere; — Fer. Ful. Li. Sar. Würz. *Sp.* et *Vm.* a reliquis non differunt, quam quod Solutionem Subcarbonatis ei Supertartratis addant.

2) Im flüssigen Zustande. *Liquor splenéticus ex Tartaro.*

℞. Tartari albi crudi,
Nitri crystallisati,
singulorum libram unam.
Post detonationem mixturae in crucibulo, residuum dissolve in
Aquae bullientis . libris tribus.
Cola et colaturae adde
Tartari albi pulverati libram unam.
Digere per dies septem et decantha. (Pal. Wir. *Sp.*)

Reizend, harntreibend, schmelzend, abführend. — Gabe, von einem Scrupel bis zur Drachme, als alterirendes, etwa eine Unze als abführendes Mittel.

Schwefel-, Salpeter- und Salzsäure, Kalkwasser, salzsaurer Kalk, schwefelsaures Natrum und vegetabilische Säuren dürfen, weil sie Zersetzung bewirken, nie damit verbunden werden.

Pulvis lenitivus antihypochondriacus Kleinii, Solamen hypochondriacorum, Pulvis digestivus Kleinii. (Br. Ham. *Sm.*)

℞. Tartratis Potassae,
Rhei,

Corticis Aurantiorum,
singulorum partes aequales.
Fiat pulvis. (B*. Ham.)

℞. Tartratis Potassae drachmas duas.
Pulveris Rhei,
— Corticis Aurantiorum,
singulorum drachmam unam.
Olei Cajeput scrupulum unum.
Misce et divide in partes viginti quatuor. (*Sm.*)

Von Klein und Baldinger vielleicht zu sehr gerühmt; es bewirkt bisweilen gelindes Purgiren. — Gabe, zwei oder drei Stück alle zwei Tage, jedes in einer Tasse Zuckerwasser.

Pulvis incidens s. resolvens. (*Sa.*)

℞. Tartratis Potassae,
Salis Ammoniaci,
Subcarbonatis Magnesiae,
singulorum semunciam.
Radicis Ari . . drachmas duas.

Nutzen wie das vorige.

Liquor Tartari tartarisati, Solutio Tartari solubilis, Solutio Tartari solubilis aquosa, Limonada Cremoris Tartari solubilis. (BorC. *Br. Ra.*)

℞. Tartratis Potassae . semunciam.
Aquae bullientis . libras duas.
Liqua sal in aqua. (*Ra.*)

BorC. Salis unciam unam, Aquae duodecim et Mellis in solutione dissolvendi semunciam.

Laxirend, glasweise zu nehmen.

Br. Salis libram unam et Aquae tantidem, ad usum servandum.

Fomentatio excitans s. incitans. (*Ra.*)

℞. Cremoris Tartari solubilis
unc am unam.
Aquae . . . . libram unam.
Dissolve. — Zum Auswaschen oder Bähen atonischer langwieriger Geschwüre.

Purgans Grantii. (*Sm.*)

℞. Tartratis Potassae
drachmas sex ad octo.
Infusi Cichorii . uncias viginti.
In solutione solve
Mannae in lacrymis uncias duas.

Zwei Wochen lang, täglich oder einen Tag um den andern, zu vier Gläsern des Morgens zu nehmen; während das Mittel wirkt, trinkt man Kalbfleischbrühe. — Wurde besonders bei Hypochondrie und chronischen Leberkrankheiten gerühmt.

Potio laxans. (*Ca.*)

℞. Tartratis Potassae . semunciam.
Infusi Foliorum Cichorii
libras duas.
Solutioni adde
Mellis depurati quantum sufficit.

Gelind abführend; in vier und zwanzig Stunden zu mehreren Gläsern.

Potio ad atrabilem s. resolvens Mutzelii. (B*. Ful. *Sm.*)

℞. Tartratis Potassae,
Mellis albi,
singulorum semunciam.
Dissolve in
Aquae fontanae . unciis octo.

Stündlich einen oder zwei Löffel; bei Melancholie und Manie sehr gerühmt. (B*. Ful.)

℞. Tartratis Potassae unciam unam.
Mellis Narbonnensis
uncias quatuor.
Misce exacte, aliquot guttas Essentiae Anisi addendo. — Kaffeelöffelweise, indem man ein Glas helle Molken und einen Napf Kalbsbouillon nachtrinkt. (*Sm.* nach Baldinger.)

℞. Tartratis Potassae . semunciam.
Extracti Gentianae,
— Centaurii minoris,
singulorum drachmas duas.
Aquae . . . . . semilibram.

Stündlich zu halben Unzen bei Leberverstopfungen. (*Ca.*)

℞. Tartratis Potassae . semunciam.
Extracti Centaurii minoris
drachmas duas.
Aquae . . . . . uncias octo.

Auf gleiche Art zu nehmen. (*Sw.*)

Emulsio salina. (Suec.)

℞. Tartratis Potassae drachmas tres.
Mellis boni . . sesquiunciam.
Aquae fontanae . libram unam.
Dissolve et solutionem in mortario marmoreo tritura cum
Amygdalarum dulcium excorticatarum . . . . . uncia una.
Emulsionem cola. — Sehr gelindes Abführmittel, glasweise zu nehmen.

Potio purgans infantum s. pro infantibus. (Ham.)

℞. Tartratis Potassae drachmas duas.
Infusi laxantis,
Aquae fontanae,
singulorum unciam unam.
Mellis glyzyrrhizati semunciam.

Potio purgans. (*Bo.*)

℞. Tartratis Potassae
drachmas quatuor.
Jalapae pulveratae . grana octo.
Cerevisiae . . . . vitra duo.
Infunde per horas viginti quatuor, filtra et adde
Aetheris sulphurici guttas viginti.

Auf zwei Mal Morgens, drei Stunden auseinander, mit Kräuterbouillon zu nehmen.

Solutio Tartari solubilis alcoholica. (*Pid.*)

℞, Tartratis Potassae uncias quatuor.
Aquae destillatae . . uncias octo,
Solutioni adde
Alcoholis . . . drachmas duas.
Filtra et serva. — Kommt zu Potionen, Mixturen und Tisanen. — Gabe, eine bis drei Unzen.

Liquor salinus. (Li.)

℞. Tartratis Potassae libram unam.
Salis Ammoniaci . uncias duas.
Corticis Aurantiorum unciam unam.
Aquae destillatae . libras tres.
Digere blando calore per dies quatuor, saepius agitando, et filtra.

Elixir amarum s. aperiens s. resolvens. (Br. Ful. Ham.)

℞. Tartratis Potassae . semunciam.
Extracti Trifolii unciam unam.
Dissolve in
Aquae Menthae piperitae unciis octo.
Serva. (Ham.)

℞. Tartratis Potassae,
Extracti Taraxaci,
singulorum semunciam.
Dissolve in
Infusi Rhei . . . unciis tribus.
Solutioni adde
Aquae Menthae piperitae uncias tres.
Misce bene. (Ham.)

℞. Tartratis Potassae . semunciam.
Extracti Gentianae unciam unam.
Dissolve in
Aquae destillatae . . unciis sex.
Solutioni adde
Aquae Menthae piperitae uncias duas.
Misce bene. (Ful.)

℞. Tartratis Potassae uncias duas.
Aquae . . . uncias duodecim.
In solutione dissolve
Extracti Trifolii,
— Cardui benedicti,
— Centaurii minoris,
singulorum unciam unam.
Liquori adde
Aquae Cinnamomi simplicis uncias duas.
Misce bene. (Br.)

Mixtura resolvens roborans. (*Sa.*)

℞. Tartratis Potassae drachmas tres.
Extracti Fumariae,
— Trifolii,
singulorum sesquidrachmam.
Aquae Cardui benedicti uncias sex.
— Menthae piperitae,
Syrupi balsamici,
singulorum sesquiunciam.

Reizend, schmelzend und eröffnend. — Löffelweise.

Mixtura desobstruens s. resolvens. (*Sw.*)

℞. Tartratis Potassae,
Mellis, singulorum semunciam.
Aquae Cinnamomi uncias octo.
Aetheris alcoholisati drachmam unam.

Reizender als die Potio ad atrabilem (p. 405.), unter denselben Umständen gebraucht. — Gabe, anfangs alle zwei Stunden, dann nur drei Mal täglich eine halbe Unze.

Superprototartras Potassii, Hyperprototartras Potassii, Super- s. Hypertartras Protoxydi Potassii, Hypertartras s. Supertartras Potassae, Bitartras Potassae, Tartras acidus s. acidulus Potassae, Tartras superpotassicus s. subpotassicus, Supertartras kalicum; saures weinsteinsaures Kali; Surprototartrate de potassium, Surtartrate de protoxide de potassium, Surtartrate de potasse, Bitartrate de potasse, Tartrate acide ou acidule de potasse. (*Gal.*).

§. I. Wie man es im Handel findet.

1) Unrein. *Tartarus s. Tartarum, Tartarus crudus s. impurus, Bitartras kalicus cum Aqua crudus, Sal essentiale Tartari;* roher Weinstein; Tartre cru, Sel essential de tartre (*Gal.*).

A. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LouN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. *Be. Br. C. Fi. M. Par. Pid. Sp.*

Eine Salzkruste, welche sich an der Innenwand von Fässern ansetzt, in denen Wein enthalten ist, und welche aus einer Zusammenhäufung vieler crystallischen Blättchen besteht. Sie ist, je nach der Farbe des Weins, aus welchem sie sich absetzt, entweder weiß oder roth und besteht aus saurem weinsteinsaurem Kali mit einer gewissen Menge weinsteinsaurem Kalk und einem färbenden Stoffe.

2) Gereinigt. *Crystalli Tartari, Cremor Tartari, Tartarus crystallisatus, Tartarus depuratus, Bitartras kalicus cum Aqua depuratus;* gereinigter crystallisirter Weinstein, Weinsteincrystalle, saures weinsteinsaures Kali; Tartre cristallisé, Crême de tartre (*Gal.*).

Diese verschiedenen Namen werden dem folgenden Salze beigelegt, welches sich crystallisirt in vierkantigen Prismen oder in Pulvergestalt darstellt. (A. Am. An. B. Ba. DD. Ed. GalM. HassP. Li. Lon. Sax. Suec. *C. Fi. T.*)

HassP. *Fi, T.* führen das zu Montpellier und in Venedig gewöhnliche Reinigungsverfahren an. Nach ersterem löst man den zerriebenen Weinstein in kochendem Wasser, gießt die Flüssigkeit klar ab, die nach dem Erkalten sich niederschlagenden Crystalle werden wieder mit siedendem Wasser aufgelöst und zu 100 Pfund derselben 4 — 6 Pfund kalkfreie Thonerde gesetzt und bis zur Bildung einer starken Salzhaut abgedampft. Die nach dem Erkalten sich bildenden Crystalle werden an der Sonne getrocknet. — In Venedig setzt man den durch Auflösen des Weinsteins in warmem Wasser beim Erkalten sich an die Wände des Gefäßes ansetzenden und wieder aufgelösten Crystallen Eiweiß und kleine Portionen Asche zu, kocht dann und schäumt die Flüssigkeit ab, welches man 14 bis 15 Mal wiederholt, bis die Flüssigkeit ganz farblos und die Crystalle sehr weiß erscheinen. Da aber mit der Asche Potasche verbunden ist, so hat ersteres Verfahren den Vorzug.

§. II. Reinigung des käuflichen Weinsteinrahms.

B. Bel. Bor. Bor4. Br. Ful. Gal. Han. Hass. HassP. His. Lus. O. Pol. Sar. Wir. Würr. *Br. Pid. Sp. Sw. Vm.*

℞. Cremoris Tartari quantum vis.
Aquae . . . quantum sufficit
ad dissolutionem salis. Cola liquorem, albuminis ope clarifica, despuma et per pannum colatum in crystallos coge. (Gal. *Br.*)

B. Bel. Br. Hass. Lus. Sar. Wir. Würr. *Pid. Sp.* et *Vm.* eundem agendi modum sed absque clarificatione albuminis ope indicant.

Bor. Bor4. Han. HassP. O. et Pal. substantias heterogeneas separare, cum Aqua frigida abluere, siccare et pulverare jubent.

℞. Tartari crudi . . libras decem.
Argillae purae . libram unam.
Aquae . . . libras octodecim.
Coque per horas duas, cola liquorem adhuc calidum, sepone ad locum frigidum ut in crystallos concrescat, quas cum Aqua frigida ablutas et in Aqua dissolutas crystallisationi subjice. (His. *Sw.*)

℞. Tartari albi cum Aqua fervida abluti et pulverati partem unam.
Aquae . . . . partes viginti.
Bulliendo dissolve, tunc denuo coque ad cuticulae spissae apparitionem usque, quae separetur, liquorem continue calefaciendo et ita perge, donec cuticula formari cessaverit. (Würr.)

Dieses Verfahren ist das einzige, dessen Erzeugniß den Namen cremor tartari verdient.

Das Salz ist kühlend, harntreibend und abführend. — Gabe, von einer Drachme bis zu zwei Unzen in acht Unzen bis zwei Pfund Wasser.

Pulvis hepaticus ruber. (Wir. *Sp.*)

℞. Cremoris Tartari uncias quatuor.
Ligni Santali rubri,
Petalorum Rosarum rubrarum,
singulorum semunciam.
Acidi sulphurici tenuis
drachmas duas.
Contere petala, acidum aspergendo; adde deinde lignum et sal. — Kühlend. — Gabe, zwei Scrupel bis eine Drachme.

Mixtura Kali tartarici s. tartarica. (*Au.*)

℞. Cremoris Tartari,
Extracti Marrubii albi,
singulorum drachmas duas.
Aquae Melissae . . uncias tres.
Auf zwei Mal, Morgens und Abends, bei Hämorrhoiden mit Verstopfung.

Electuarium Cremoris Tartari. (B*. *Sm.*)

℞. Cremoris Tartari partem unam.
Roob Prunorum . uncias duas.
Lindernd. — Gabe, alle zwei Stunden ein halber Löffel.

Oxymel tartarosum. (*Sw.*)

℞. Cremoris Tartari partem unam.
Mellis despumati . partes duas.
Misce bene. — Bei sogenannten galligen Fiebern und Wassersuchten empfohlen.

Pulvis dentifricius s. Tartari compositus. (Bor. Br. D. Fenn. Fer. Han. O. Pal. Pol. Sar. Suec. Wir. *Ca. Fi. T. Vm.*)

℞. Cremoris Tartari uncias quatuor.
Pulveris Radicis Iridis Florentinae
uncias duas.
— Myrrhae,
— Sanguinis Draconis,
singulorum unciam unam.
Olei Caryophyllorum
guttas quadraginta.
Misce bene. (Bor. D. Han. O.)

℞. Cremoris Tartari,
Radicis Ratanhiae,
singulorum quantum vis.
— Iridis pulveratae
quantum sufficit
ad praebendum suavem odorem. (Fer. *Fi. T.*)

℞. Ratanhiae . . . . uncias sex.
Ossis Sepiae . . uncias decem.
Cremoris Tartari,
Radicis Iridis,
singulorum drachmas quatuor.
Misce. (Fer.)

℞. Cremoris Tartari uncias quatuor.
Radicis Iridis Florentinae
uncias duas.
Mastichis,
Myrrhae,
Catechu, singulorum unciam unam.
Olei Caryophyllorum
guttas quadraginta.
Fiat pulvis subtilissimus. (Pol.)

℞. Cremoris Tartari
partes viginti quatuor.
Radicis Iridis Florentinae,
Myrrhae,
Kino, singulorum partes octo.
Coccionellae cum aliquot guttis Succi Citri triturtae partem unam.
Fiat pulvis, cujus unciis singulis guttas quatuor Olei Caryophyllorum adde. (Fenn. Suec.)

℞. Cremoris Tartari
partes triginta sex.
Ossis Sepiae porphyrisati,
Boli Armenae praeparatae,
Corallii rubri praeparati, singulorum partes viginti quatuor.
Sanguinis Draconis
partes duodecim.
Cinnamomi . . . . partes sex.
Coccionellae . . . partes tres.
Caryophyllorum partem unam.
Fiat pulvis subtilissimus. (Ful.)

℞. Ossis Sepiae praeparati,
Radicis Iridis Florentinae,
singulorum unciam unam.
Sanguinis Draconis,
Cremoris Tartari,
singulorum semunciam.
Mastichis . . . drachmas duas.
Caryophyllorum drachmam unam.
Misce ut fiat pulvis. (Sar.)

℞. Cretae,
Laccae, singularum partes sedecim.
Cremoris Tartari
partes quadraginta octo.
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
singulorum partem unam.
Contere. (*Vm.*)

℞. Cornu Cervi usti . uncias tres.
Ossis Sepiae . . uncias duas.
Cremoris Tartari
unciam dimidiam.
Radicis Iridis Florentinae,
Laccae, singularum unciam unam.
Caryophyllorum drachmam unam.
Misce fiat pulvis tenerrimus. (*Fi. T.*)

℞. Cremoris Tartari,
Radicis Iridis Florentinae,
singulorum sesquiunciam.
Ossis Sepiae calcin. et porphyr.
uncias tres.
Laccae . . quantum satis. (*T.*)

℞. Laccae in granis,
Ossis Sepiae,
Radicis Iridis Florentinae,
singulorum unciam unam.
Cremoris Tartari drachmas sex.
Caryophyllorum,
Myrrhae,
Mastichis,
singulorum drachmas duas.
Fiat pulvis. (Br. Pal. Wir.)

℞. Corallii rubri porphyrisati,
Ossis Sepiae porphyrisati,
Boli Armenae,
singulorum drachmas sex.
Cremoris Tartari drachmas novem.
Sanguinis Draconis drachmas tres.
Cinnamomi . . sesquidrachmam.
Coccionellae . . unciam unam et scrupulum unum.
Caryophyllorum . grana viginti.
Misce bene. (*Ca.*)

Electuarium dentifricium s. gingivale. (Br. Han.)

℞. Pulveris Cremoris Tartari subtilissimi,
— Pumicis tenerrimi,
singulorum uncias sex.
— Myrrhae tenerrimi,
— Oculorum Cancrorum tan.,
— Iridis Florentinae,
singulorum uncias duas.
— Coccionellae tenerrimi
drachmas sex.
Mellis rosati . . . libras tres.
Olei Caryophyllorum
drachmam unam.
Misce sedulo. (Han.)

℞. Cremoris Tartari sesquidrachmam.
Coccionellae . drachmam unam.
Essentiae Myrrhae saturatissimae et destillatione ad dimidium redactae . . . . . uncias tres.
Mellis rosati . uncias quatuor.
Tincturae Laccae unciam unam.
Misce triturando, digere per horas viginti quatuor et colaturae adhuc calidae adde
Olei essentialis Cinnamomi
guttas septem.
Serva. (Br.)

Pulvis ophthalmicus s. Tartari argillatus s. ad maculas corneae s. ophthalmicus Baldingeri. (Ful. Hass. R. Suec. Wilr. *Vm.*)

℞. Cremoris Tartari,
Sacchari albi,
singulorum semunciam.
Gummi Arabici drachmas duas.
Fiat pulvis tenerrimus. (Hass.)

℞. Cremoris Tartari,
Boli Armenae,
Sacchari albi,
singulorum partes aequales.

Pulverata per linteum duplicatum trajice. (Ful. R. Suec. Wür. *Vm.*)

Trochisci de Cremore Tartari. (Wir.)

℞. Cremoris Tartari sesquidrachmam.
Sacchari albi . . . uncias sex.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae quantum sufficit
ut fiat pasta homogenea. — Bei Fiebern, um den Durst zu stillen.

Manna tabulata s. tartarisata. (*Sp.*)

℞. Cremoris Tartari . semunciam.
Mannae . . . uncias quatuor.
Aquae . . . . uncias decem.
Coque ad consistentiam requisitam et in tabellas forma. — Ein angenehmes Laxirmittel.

Pulvis temperans s. refrigerans s. laxans et temperans Tronchini. (D. DD. Hass. *Sm.*)

℞. Cremoris Tartari . uncias tres.
Nitri . . . . . drachmas tres.
Sacchari pulverati uncias quatuor.
Misce exacte. (*Sm.*)

Hass. Cremoris libram unam, Nitri uncias tres absque Saccharo; — DD. Cremoris uncias duas, Nitri et Sacchari, singulorum semunciam; — D. Cremoris uncias tres, Nitri et Elaeosacchari Citri, singulorum semunciam.

Gabe, eine bis zwei Drachmen, Morgens, in einem Glase abgeklärten Molken.

Electuarium lenitivum s. refrigerans. (A. *Sm.*)

℞. Cremoris Tartari unciam unam.
Nitri . . . . . semunciam.
Sacchari albi . drachmas decem.
Syrupi Limonum quantum sufficit.

Herrenschwand verordnete diese Latwerge zu einem Kaffeelöffel alle zwei Stunden, des Morgens, indem er ein Glas Molken nachtrinken ließ. (*Sm.*)

℞. Pulpae Prunorum . libras tres.
Roob Sambuci . libram unam.
Cremoris Tartari . semilibram.
Mellis despumati quantum sufficit
ut fiat electuarium. (A.)

Pulvis eccoproticus. (Ful.)

℞. Cremoris Tartari unciam unam.
Subcarbonatis Magnesiae,
Florum Sulphuris,
singulorum semunciam.
Nitri . . . . drachmas duas.

Einschneidend, harntreibend, schmelzend, abführend. — Gabe, eine bis drei Drachmen.

Pulvis ecphracticus. (*Ca.*)

℞. Cremoris Tartari,
Magnesiae purae,
Florum Sulphuris,
Rhei electae,
Florum Chamomillae,
Elaeosacchari Foeniculi,
singulorum semunciam.

Von Selle bei Verstopfungen der Unterleibseingeweide empfohlen. — Gabe, ein Löffel den Tag über mehrmals.

Pulvis Supertartratis Potassae et Stalagmitidis cambogioidis. (RC.)

℞. Cremoris Tartari . semunciam.
Gummi Guttae . . grana duo.
Pulveris aromatici grana decem vel
— Zingiberis scrupulum unum.

Purgirend, harntreibend, bei Haut- und Bauchwassersucht. — Früh eine halbe bis eine Unze in einem wässerigen Trank.

Pulvis salinus s. Tartari compositus. (Wür. WW.)

℞. Cremoris Tartari . semunciam.
Salis polychresti drachmas duas.
Misce. (Wür.)

℞. Cremoris Tartari
drachmas quinque.
Sulphatis Potassae drachmas tres.
Tartari stibiati . granum unum.
Misce et divide in partes octo. (WW.)

Pulvis digestivus. (T.)

℞. Cremoris Tartari,
Tartari vitriolati,
singulorum partes aequales.

Gabe, zwei Drachmen bis eine halbe Unze und mehr.

Pulvis Frankii. (*Fi. T.*)

℞. Cremoris Tartari drachmam unam.
Tartari stibiati . granum unum.

Ein oder mehrere Male in 24 Stunden.

Electuarium purgans. (*Sa.*)

℞. Cremoris Tartari drachmas duas.
Salis de Seignette . semunciam.
Mannae electae . drachmas sex.
Pulpae Tamarindorum uncias tres.
Syrupi Rosarum solventis
quantum sufficit
ut fiat electuarium spissum. —

Solutio Tartari depurati s. Cremoris Tartari, Decoctum crystallorum Tartari. (Han.)

℞. Cremoris Tartari drachmas tres.
Aquae destillatae fervidae
uncias triginta duas.
Solutioni adde
Syrupi Rubi Idaei uncias duas.

Abführend, harntreibend, kühlend. — Gabe, täglich zwei Pfund.

Tisana Cremoris Tartari (B*.): Cremoris Tartari semunciam, Aquae bullientis libram unam, Syrupi Rubi Idaei unciam unam.

Syrupi Spinae cervinae,
— Violarum,
singulorum semunciam.
Löffelweise. (*Au.*)

Pilulae hydragogae s. eTartaro boraxato. (*Au.*)

℞. Extracti Trifolii . uncias duas.
Tartari boraxati sesquidrachmam.
Radicis Polygalae Virginicae
drachmas duas.
— Colchici sesquidrachmam.
Misce fiant pilulae granorum duorum. — Gabe, sechs bis zwölf Stück, alle zwei Stunden.

Prototartras Potassii et Sodii, Tartras Protoxydi Potassii et Sodii, Tartras Potassae et Sodae, Sal polychrestum solubile s. polychrasius Seignetti s. Seignetti s. Rupellense s. Rupellensis, Alcali minerale tartarisatum, Soda tartarisata, Natrum tartarisatum s. tartaricum, Tartarus natronatus, Tartras kalico-natricum s. kalico-natricus cum Aqua s. Potassae sodicus s. Sodae et Kali; natrumhaltiger, natronisirter Weinstein, Seignettesalz; Prototartrate de potassium et de sodium, Tartrate de protoxide de potassium et de sodium, Tartrate de potasse et de soude, Sel de Seignette, Sel polychreste soluble (*Gal.*). (A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. His. Lon. LonN. O. Pol. R. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. *C. Fi. Pid. Sp. T. Vm.*)

℞. Subcarbonatis Sodae quantum vis (uncias viginti Lon. LonN.).
Aquae bullientis quantum sufficit (octarios decem Lon. LonN.)
ad dissolutionem salis; liquori adde
Cremoris Tartari quantum sufficit (libras duas Lon. LonN.)
vel quantum ejus solvi potest; consume ad 33° ar. et ad crystallisandum sepone. (A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Br. D. Du. Ed. Penn. Fer. Gen. Han. Hass. His. Lon. LonN. O. Pol. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. *C. Pid. Vm. Fi. T.* Subcarbonatis libram unam, Aquae libras tres, Cremoris quantum sufficit; — HassP. Salis Sodae depurati libras duas, Aquae bullientis libras octo, Cremoris tres, et denique Salis Sodae unciam unam; — Bor4. Aquae sextuplum et Cremoris tantum ut natrum fere neutralisetur; crystalli, si opacae apparent, in Aquae frigidae partibus tribus solve etc.; — Gal. *Sp.* et *Vm.* Subcarbonatem in solutionem Cremoris Tartari infundere jubent.

Secundum GalH. lixivium hujus praeparati fere totum e Tartrate Sodae constat, e quo Sal Seignetti separatur, addendo Tartratis Potassae certam quantitatem.

℞. Tartratis Potassae
partes undecim cum dimidia.
Subcarbonatis Sodae sicci
partes duas cum dimidia.
Aquae . partes viginti quatuor.
Subsidere fac pro momento, dequantha et in crystallos coge. (*Vm.*)

℞. Cremoris Tartari . libras duas.
Aquae . . . quantum sufficit ad solutionem salis, quam bullientem Potassae ope neutralisa et adde
Salis communis uncias quinque et drachmas duas.
Solutione refrigerata et Hydrochlorate Potassae in fundum demisso, consume liquorem, ut in crystallos abeat. (*Vm.*)

℞. Tartratis Potassae
partes undecim cum dimidia.
Sulphatis Sodae partes tres et quatuor partes quintas.
Aquae tepidae
partes viginti quatuor.
Calefac, liquori Sodae causticae pauxillum immitte, filtra et in crystallos redige. (*Vm.*)

Reizend, harntreibend, abführend — Gabe, von zwei Drachmen bis eine Unze auf die Pinte Wasser.

Pulvis de Fordyce. (*Sm.*)

℞. Tartratis Potassae et Sodae
grana decem.
Rhei . . grana tria ad septem.
Misce. — Bei Verstopfung der Kinder. — Man giebt es vierzehen Tage hinter einander alle Morgen, in einem passenden Vehikel.

Mixtura resolvens. (*Sm.*)

℞. Tartratis Potassae et Sodae
semunciam.
Sulphatis Potassae drachmas duas.
Infusi Foliorum Cichorii
libram unam.
Solutioni adde
Oxymellis scillitici uncias quatuor.
Von Boerhaave bei Unterleibsstockungen empfohlen. — Gabe, vier Eßlöffel Morgens im Zwischenraume einer Stunde.

Serum Lactis Van Swietenii. (*Sm.*)

℞. Radicis et Foliorum Taraxaci,
Herbae Fumariae,
Foliorum Nasturtii,
— Cerefolii,
singulorum manipulum unum.
Concisa coque per quinque vel sex minima cum

Seri Lactis clarificati
octario uno (chopine).
Cola fortiter exprimendo et colaturae adde
Tartratis Potassae et Sodae
drachmam unam ad duas.
Mellis Narbonnensis drachmas sex.

Alle Morgen nüchtern, einen Monat lang, in vier Gläsern, in Zwischenräumen einer Stunde bei Unterleibsstockungen nach Wechselfiebern oder alten hypochondrischen Beschwerden.

Prototartras Potassii et Ammoniaci, Tartras Protoxydi Potassii et Ammoniaci, Tartras Potassae et Ammoniaci, Tartras kalico-ammonicus, Ammonium tartaricum, Tartarus ammoniatus s. ammoniacalis s. solubilis ammoniacalis, Sal ammoniacum tartareum, Alcali volatile tartarisatum; ammoniakhaltiger auflöslicher Weinstein, Weinsteinammoniak; Protatartrate de potassium et d'ammoniaque, Tartrate de protoxide de potassium et d'ammoniaque, Tartrate de potasse et d'ammoniaque, Tartre soluble ammoniacal (Gal.).

§. I. Im festen Zustande.

B*. Bor. Bor4. D. Han. Hass. HassP. Li. O. Pol. Sax. Wir. *Sw*. Vm.*

℞. Cremoris Tartari quantum vis.
Aquae bullientis quantum sufficit ad solutionem salis; liquori sensim adde
Subcarbonatis Ammoniaci liquidi quantum sufficit ad saturandum acidi excessum; filtra et leni igne ad siccum consume.

HassP. Cremoris quantum libet, Aquae fervidae quadruplum pondus, Spiritus Salis Ammoniaci aquosi quantitatem aliquanto praeponderantem, sepone loco frigido per 24 horas, filtra et ad cuticulam consumtis denuo adde Spiritus Salis Ammoniaci aquosi partem, ut tartarus, qui sub evaporatione secesserit, resolvatur, liquorem in vas murrhinum calefactum effunde et ad crystallisandum per aliquot dies loco frigido sepone etc.; — Hass. Li et Sax. Ammoniacum caustieum indicant; — Han. et *Vm.* in crystallos, quae tunc pulverentur, redigi volunt; — B*. antequam in crystallos redigatur liquor, addere Liquoris ammoniacalis pauxillum, ut crystalli tartari, quae forte inter evaporationem subsederunt, redissolvantur.

§. II. Im flüssigen Zustande.

Liquor Tartari solubilis.

Li.

℞. Subcarbonatis Ammoniaci liquidi
uncias sex.
Adde sensim
Cremoris Tartari quantum sufficit ad perfecte saturandum ita, ut omnis effervescentia cesset; sepone per dies aliquot et filtra.

Reizend, harntreibend und gelind abführend, in hitzigen Fiebern, Wassersuchten und Stockungen in den Organen des Unterleibes, jedoch selten angewendet. — Gabe, eine Drachme täglich mehrmals.

Protooleomargaras Potassii.

Unter diesem Namen vereinigen wir alle eigentlich sogenannten Seifen, selbst die mit mineralischer Basis, weil sie unter therapeutischem Gesichtspunct betrachtet, so zu sagen keinen Unterschied zeigen, ausgenommen den, welcher durch die Verschiedenheit ihrer Zusammensetzung und die davon abhängigen physischen Eigenschaften bedingt wird.

§. I. Im Handel vorkommende Seifen.

1) *Sapo Alicantinus s. Aloniensis s. Hispanicus albus, Sapo albus s. durus*; Spanische, weiße Seife; Savon d'Alicante (*Gal.*).

Am. Ams. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Gal. GalM. Gen. Hass. HassP. Li. Lou. LonN. O. Pol. RC. Sax. Suec. Wir. WW. *Be. Br. M. Sa. Sp.*

Man bereitet sie aus Baumöl und Natron. Sie ist weiß, hart und gleichartig.

2) *Sapo Venetus*; Venezianische Seife; Savon de Venise (*Gal.*).

Bel. Br. Fenn. Fer. HassP. Pol. Suec. *Pid.*

Wie die vorhergehende bereitet; sie ist auch hart, aber marmorirt.

3) *Sapo domesticus s. nostras*; gewöhnliche, gemeine Seife; Savon domestique (*Gal.*).

A. Ba. Bor. BorC. Bor4. DD. Fer. Gal. GalM. Han. Hass. HassP. Pal. R. RC. Sax. WW. *M. Par.*

Wie die vorhergehenden bereitet, mit blauen Adern, welche von Schwefeleisen und Alaun herrühren, die in dem Natron enthalten sind.

4) *Sapo mollis s. niger s. viridis s. kalicus s. piceus*; schwarze, weiche, grüne Seife; Savon noir (*Gal.*).

DD. Ed. Hass. Lon. LonN. RC. Suec. *C. Par. Pid.*

Aus Oel und Pottasche bereitet.

5) *Sapo Wologdensis*; Wologder Seife; Savon de Wologd (*Gal.*).

Penn. R. RC.

Aus Talg und Pottasche, zu Wologda und anderwärts bereitet.

§. II. Pharmaceutische Seifen.

A. *Sapo medicinalis s. medicatus s. amygdalinus s. albus.*

A. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. Fenn. Fer. Gal. GalM. Han. HassP. His. Lus. O. Pol. R. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. *Br. Ca. Fi. Sw. T. Vm.*

℞. Subcarbonatis Sodae,
Calcis vivae,
singulorum libras quatuor.
Aquae . . . . . libras viginti.

Coque, trajice per linteum, liquorem consume donec unciae octo requirantur ad implendum vitrum, aquae unciarum sex capax et adde refrigerato
Olei Olivarum . . . . . duplum.

Coque continue agitando, donec massa homogenea et spissa formetur, quam in modulos effusam sicca. (A. An. B. Ba. Bel. Bor. Fenn. Fer. GalM. Han. His. Lus. O. Pol. R. Sar. Sax. Suec. Wür. *Br. Sw.*)

Gal. Lixivii caustici (36°) partes centum, Olei Amygdalarum dulcium ducentas et decem; — *T.* Lixivii partes 54 et Olei Olivarum vel Sevi 100; — *Vm.* Lixivii partem unam et Olei Amygdalarum dulcium duas cum quadrante; — *Ca.* Lixivii libras duas, Olei Amygdalarum dulcium libras quatuor et uncias tres; — Bor4. HassP. *Fi.* Liquoris Natri caustici recenter parati, Olei Olivarum Provincialis recentissimi duplum.

Br. Sar. Wir. Wür. *T.* et *Vm.* formulam fere similem indicant, sed loco Sodae Potassam causticam adhibent.

Fi T. Saponem Alicantinum vel Venetum balnei aquae ope in Alcoholis diluti pondere nonduplo solvere, sedimentum subsidere, alcoholem destillando elicere et vaporando consumere jubent.

B. *Sapo cacaotinus*; Cacaoseife; Savon de cacao (*Gal.*). (B. Fer. Han. Li. *Sp. T. Vm.*)

℞. Lixivii Sodae . . partem unam.
Butyri Cacao liquati partes duas.

Coque, donec perfecte sint commixta. *T.* Liquori ita condensato, ut corpori frigido immissus coagulet, solutionem Salis communis concentratam infundere jubet, ut sapo melius a liquore separetur, qui tunc in balneo aquae fundatur.

Sapo Medullae bovinae s. animalis s. Wologdensis. (Gal. *Ca. Sw. T. Vm.*)

℞. Medullae bovinae praeparatae
partes quingentas.
Potassae causticae liquidae partes
ducentas et quinquaginta.

Liqua leni igne, continue spathulae ope agitando, donec mixtura complete in aqua sit solubilis; solve deinde in
Aquae bullientis partibus bis mille.
Solutioni adde
Salis communis
partes centum octoginta dissolutas in
Aquae destillatae partibus mille.

Refrigerata trajice per linteum, exprimendo, et sicca. (Gal. *Ca. Fi.*)

Sw. Lixivii saponariorum partes duas et Medullae bovinae quatuor cum dimidia; — *Vm.* Sodae causticae unam cum dimidia et duas Medullae; — *T.* Solutionis Potassae causticae 36° ar. B. uncias sex, Medullae libram unam, Aquae destillatae vel pluvialis libras quatuor, Solutionis filtratae et saturatae Kali muriatici uncias quatuor.

Alle diese Seifen sind mehr oder weniger reizend; man hat sie als schmelzend, harntreibend und steinauflösend gepriesen. Mit Vortheil wendet man sie an bei Vergiftung durch Säuren. Aeußerlich wirken sie auflösend oder zeitigend. — Gabe, von zehen Gran bis eine Drachme zwei oder drei Mal täglich.

T. Saponem de toelette indicat, praeparatum cum Potassa caustica et Axungia praeparata vel Butyro vaccino.

Sapo animalis aromaticus. (*Ca. Vm.*)

℞. Olei Nucis moschatae expressi
partem unam.
Medullae bovinae partes quinque.
Liquatis admisce.
Sodae causticae liquidae
partes septem
sensim addendo et continue agitando ad perfectam conjunctionem usque. (*Vm.*)

Ca. Medullae partes septem, Olei Nucis moschatae unam, Cetacei tantidem et Lixivii Sodae caustici quantum sufficit.

Ceratum exploratorium (pour le toucher). (GalH.)

℞. Olei Olivarum partes sex mille.
Cetacei,
Cerae albae, singulorum partes
quadringentas.

Liqua, per linteum trajice et adde sensim, continue agitando,
Sodae causticae partes quadringentas octoginta.

Man darf dieses Cerat erst einige Zeit nach seiner Bereitung anwenden, damit es nicht mehr alcalisch ist.

Pulvis cosmeticus. (B*.)

℞. Saponis Hispanici uncias duodecim.
Subcarbonatis Potassae uncias duas.

Radicis Iridis Florentinae uncias tres.
Hippocastani pulverati libras duas.
Olei essentialis Lavandulae,
— — Bergamottae, singulorum guttas quadraginta.
— — Citri guttas triginta.
— — Caryophyllorum guttas decem.
Sacchari . . . . semunciam.
Fiat pulvis.

℞. Saponis Hispanici uncias duodecim.
Subcarbonatis Sodae sesquiunciam.
Radicis Iridis Florentinae unciam unam.
Cardamomi minoris drachmam unam.
Olei essentialis Lavandulae,
— — Bergamottae, singulorum guttas triginta.
— — Citri guttas viginti.
— — Cinnamomi guttas tres.
Sacchari . . . . semunciam.
Fiat pulvis.

Sapo cosmeticus. (Bor4.)

℞. Saponis Hispanici . uncias tres.
Radicis Iridis Florentinae unciam unam.
Olei Lavandulae semidrachmam.
— Bergamottae scrupulum unum.
Aquae Rosarum quantum sufficit ut fiat globulus.

Sapo aromaticus pro balneis. (Bor4.)

℞. Saponis Hispanici uncias quatuor.
Amyli . . . . . uncias duas.
Radicis Iridis Florentinae unciam unam.
Balsami Peruviani s. Indici guttas septem.
Olei Bergamottae,
— Corticis Citri,
— Lavandulae,
singulorum scrupulum unum.
Misceantur.

Boli saponacei. (*Sa. Sw.*)

℞. Saponis medicinalis scrupulos duos.
Olei essentialis Carvi guttas duas ad tres.
Syrupi balsamici quantum sufficit.
Interdum adduntur Extracti Aloës grana quatuor vel Rhei grana septem. — Purgirend.

Boli lithontriptici. (*Sp.*)

℞. Saponis Alicantini uncias octo.
Testarum Ovorum calcinatarum,
Fructuum Cynosbati tostorum, singulorum unciam unam.
Salis Tartari . drachmam unam.
Aquae Vitae . quantum sufficit.
Fiant boli sexaginta.

Pilulae saponaceae s. resolventes s. solventes del Porati. (B*. Gal. GalM. Ham. *Fi. Huf. Sm. Sp. Sw. T. Vm.*)

℞. Saponis medicinalis semilibram.
Radicis Althaeae unciam unam.
Nitri . . . . . drachmas duas.
Olei Amygdalarum dulcium quantum sufficit.
Fiat massa pilularis. (Gal. GalM.)

GalH. loco olei facillime rancidita-tem accipientis Syrupum Sacchari adhibet.

℞. Saponis medicinalis drachmas duas.
Rhei,
Myrrhae, singulorum drachmam unam.
Fiant pilulae granorum quatuor. (*Sw.*)

℞. Saponis albi . . unciam unam.
Extracti Juniperi,
Pulveris Gentianae, singulorum drachmas quatuor.
Fiant pilulae quatuor granorum. (*Sm.*)

℞. Saponis Veneti,
Galbani,
Extracti Chelidonii, singulorum drachmas duas.
Pulveris Liquiritiae quantum sufficit.
Fiant pilulae granorum duorum. (Ham.)

℞. Saponis medicinalis sesquidrachmam.
Gummi Ammoniaci drachmam unam.
Extracti Graminis scrupulos quatuor.
Fiant pilulae grani unius. (B*.)

B*. et *Huf.* Saponis, Gummi Ammoniaci et Extracti Chelidonii, singulorum partes aequales, ut fiant pilulae granorum duorum; — *T.* Saponis Veneti uncias tres, Gummi Ammoniaci tantidem, digerere in Alcoholis diluti 24° Ar. B. quantum satis ad submergendum; mollefactae et homogeneae massae adde Pulveris Rhei subtilissimi uncias tres; — *Fi. T.* Saponis, Gummi Ammoniaci, singulorum partes quatuor, Rhei, Radicis Jalapae, singulorum partem unam.

℞. Saponis officinalis unciam unam.
Gummi Ammoniaci,
Extracti Centaurii minoris, singulorum semunciam.
Olei Succini . . guttas decem.
Fiat massa pilularis. (*Sp.*)

℞. Acetatis Potassae,
Gummi Ammoniaci,
Pilularum Rufi, singulorum partem unam.
Saponis albi . . . . partes duas.
Syrupi Sacchari quantum sufficit ut fiat massa. (*Vm.*)

Pilulae Allii sativi. (RC.)

℞. Radicis Allii,
Saponis Alicantini,
singulorum semunciam.

Pulveris Liquiritiae quantum satis ut fiat massa, e cujus singulis drachmis catapotia duodecim formentur. — Gabe, ein bis zwei Scrupel.

Suppositorium ad alvum sollicitandum s. laxans. (B*. Pal. *Sp.*)

℞. Saponis . . . . uncias duas.
Salis culinaris . unciam unam.
Mellis inspissati quantum sufficit.

Fiant coni diversae magnitudinis. — Vor der Anwendung muß man sie mit Wermuthöl bestreichen.

Cataplasma saponaceum s. resolvens s. maturans s. pus maturans. (B*. Ful. GalH. RC. *Ra. Sp.*)

℞. Micae Panis . . . uncias octo.
Saponis Veneti . unciam unam.
Lactis vaccini . . libram unam.
Coque simul. (B*. Ful. GalH.)

℞. Farinae Hordei . . uncias octo.
Sacchari albi . uncias quatuor.
Aquae . . . quantum sufficit ut fiat cataplasma. (*Ra.*)

Sp. Cataplasmatis, Micae Panis uncias sedecim et Saponis rasi duas.

℞. Farinae secalitiae . partes duas.
Saponis nigri,
Radicis Cepae tostae,
Mellis, singulorum partem unam.
Fiat cataplasma (RC.)

Mel Saponis. (B*.)

℞. Saponis communis,
Mellis, singulorum uncias quatuor.
Salis Tartari . . . semunciam.
Aquae Fumariae drachmas duas.

Zur Auflösung schmerzloser Geschwülste empfohlen.

Linctus saponatus s. saponaceus, Looch saponaceum s. saponatum, (Ful. Li. Wir. Würz. *Ca. Sa. Sp. Sw.*)

℞. Saponis . . . . partem unam.
Olei Amygdalarum dulcium
partes octo.
Syrupi Mannae partes duodecim.
Misce triturando. (Li.)

Würz. Saponis partes tres, Olei sedecim et Syrupi Mannae viginti quatuor.

℞. Saponis . . . . partem unam.
Olei Amygdalarum dulcium
partes octo.
Syrupi Capilli Veneris
partes duodecim.
Misce triturando. (Wir. *Sp.*)

Sa. Saponis partem unam, Olei sedecim et Syrupi Capilli Veneris viginti quatuor.

℞. Saponis . . . . partem unam.
Olei Amygdalarum dulcium
partes viginti quatuor.
Syrupi Rhei partes triginta sex.
Contere. (Ful.)

℞. Saponis . . . . partem unam.
Olei Amygdalarum dulcium
partes octo.
Syrupi Limonum
partem unam cum dimidia.
Misce triturando. (*Ca.*)

℞. Saponis . . . . partes quatuor.
Olei Amygdalarum dulcium
partes octodecim.
Syrupi Papaveris
partes quadraginta octo.
Contere. (*Sw.*)

Unguentum s. Pomatum saponaceum. (*Ra.*)

℞. Saponis albi . . libram unam.
Aquae . . . . . sesquilibram.

Mollefacto in aqua sapone, trajice per cribrum. — Gegen Krätze angewendet.

Sapo aromaticus. (B*.)

℞. Solutionis Saponis aquosae concentratae . . . . uncias sex.
Olei essentialis Bergamottae,
— — Lavandulae,
— — Rorismarini,
singulorum drachmas duas.

Als nervenstärkend und tonisch in Bädern angewendet.

Clyster communis. (RC.)

℞. Saponis . . . drachmas duas.
Decocti Hordi, vel
— Avenae, vel
— Radicis Althaeae, vel
Infusi seminum Lini, vel
— Florum Chamomillae, vel
Aquae tepidae . . libram unam.
Olei Lini . . . unciam unam.
Misce.

Clysma s. Enema resolvens. (*B. Sp.*)

℞. Foliorum Malvae
manipulum unum.
Aquae . . . . uncias sedecim.

Decoque ad unciarum duodecim remanentiam et in colatura solve
Saponis Veneti . drachmas duas.
Misce. (*Sp.*)

℞. Decocti Hordei . . uncias sex.
Saponis Veneti drachmam unam.
Mellis . . . . drachmas sex.
Dissolve. (*B.*)

Fomentatio laxans et antispasmodica. (*Bo.*)

℞. Florum Chamomillae

Florum Meliloti,
singulorum manipulum unum.
Baccarum Lauri,
Carvi, singulorum unciam unam.
Lactis . . . quantum sufficit ut post horae quadrantem decoctionis libras tres obtineantur, quarum colaturae adde
Saponis Veneti . sesquiunciam.
Croci . . . . drachmas duas.

Fomentum Saponis compositum. (RC.)

℞. Acetatis Ammoniae liquidi uncias quatuor.
SolutionisSaponis(Alcohol.saponat.) untias duas.
Misce. — Reizend, auflöſend.

Fomentum Saponis ammoniatum. (RC.)

℞. Solutionis Saponis,
Acetatis Ammoniae liquidi, singulorum unciam unam.
Ammoniae liquidae semunciam.
Misce. — Wie das vorige, aber ſtärker.

Potio saponacea. (B*. *Ca. Ra.*)

℞. Saponis medicinalis drachmas tres.
Aquae . . . . uncias quatuor.
Syrupi Althaeae unciam unam.
Magnesiae . drachmam unam.

Gegen Vergiftung durch Mineralſäuren empfohlen. (*Ca.*)

℞. Saponis . . . . drachmas sex.
Infusi Melissae uncias quatuor.
Syrupi Capilli Veneris unciam unam.

Auf drei oder vier Mal in einigen Fällen von Meteorismus des Unterleibs. (*Ra.*)

℞. Saponis . . . drachmas duas.
Pulveris Margaritarum drachmam unam.
— Oculorum Cancri sesquidrachmam.
Syrupi Althaeae . semunciam.
Aquae Menthae,
— Corticis Citri,
— Foenicul,
singularum uncias duas.

Löffelweiſe. — Börhaave wendete es bei Kindern gegen Säure in den erſten Wegen an. (B*.)

Alcohol saponatum, Spiritus saponatus, Tinctura s. Solutio Saponis, Solutio Saponis alcoholica, Lotio alcoholica saponacea, Fomentatio saponacea, Linimentum saponaceum. (Ba. BorC. Fer. Ful. GalM. RC. *Ra.*)

℞. Saponis venalis . partem unam.
Alcoholis (0,900) partes quatuor.
Dissolve et filtra. (Ba.)

RC. Saponis partem unam, Alcoholis sex.

℞. Saponis Alicantini rasi libram unam.
Alcoholis . . . . libras tres.
Aquae destillatae . libram unam.
Solutionem filtra. (BorC.)

GalM. Alcoholis (23°) partes tres, Saponis unam; — *Ra.* Alcoholis (26°) libram unam, Saponis uncias quatuor; — *Ra.* Alcoholis libram unam et Saponis uncias duas; — *Ra.* Alcoholis libram unam et Saponis semunciam; — Alcoholis libras duas, Aquae tantidem et Saponis uncias decem.

℞. Saponis Alicantini rasi uncias octo.
Subcarbonatis Potassae purificati . . uncias quatuor.

Dissolve sal in Aquae unciis sedecim, adde saponem et ad mellis consistentiam decoque; massae deinde infunde Alcoholis rectificati uncias sedecim.

Post septimanam digestionis filtra. (Ful.)

Dieſe Auflöſung, deren Stärkegrad nach den Umſtänden natürlich verſchieden ſeyn muß, iſt ein Auflöſungsmittel, welches man mit Nutzen bei Verbrehungen, nachdem die Entzündung aufgehört hat, anwenden kann. Lugol wendete es mit Nutzen in der Behandlung der Krätze an.

Fomentatio antiphlogistica. (Hass. *Pid.*)

℞. Saponis Veneti . . uncias tres.
Aquae Calcis . . . . libras duas.
Solutioni adde
Alcoholis . . . uncias quinque.
Trochiscorum alborum Rhazis semunciam.

Auflöſend.

Spiritus Saponis s. saponatus s. saponaceus s. resolvens; Tinctura Saponis, Solutio Saponis alcoholica aromatisata, Linimentum saponaceum. (A. An. B. B*. Bor. Bor4. Han. HassP. Li. O. Pol. R. Sax. *Ra. Sp. Vm.*)

℞. Saponis albi . . partem unam.
Spiritus Lavandulae partes octo.
Dissolve et filtra. (*Vm.*)

℞. Saponis albi . . partem unam.
Alcoholis . . . . partes tres.
Aquae Rosarum partem dimidiam (unam Bor. Han. etc.)

Solutionem filtra. (B*. Bor. Bor4. Han. HassP. O. Sax.)

Pol. Alcoholis partes tres cum dimidia.

℞. Saponis albi . . . uncias sex.
Subcarbonatis Potassae drachmam unam.
Alcoholis (0,910) . sesquilibram.
Aquae Lavandulae . semilibram.
Solutionem filtra. (A.)

Sp. Terere jubet Saponis Veneti uncias quatuor cum Subcarbonatis Po-

tassae duabus et magma digerere in mixtura ex Alcoholis unciis duodecim et Essentiae Bergamottae semidrachma; — An. dissolvere Saponis uncias quatuor in Aquae Vitae viginti quatuor, et solutioni addere Spiritus Lavandulae et Spiritus Rorismarini, singulorum uncias duas.

℞. Saponis Alicantini rasi uncias quatuor.
Subcarbonatis Potassae purificati uncias duas.

Coque in Aquae libra una ad consistentiam magmatis spissi, cui infunde
Spiritus Lavandulae uncias sedecim.

Digere blando igne per dies quatuor et filtra. (R.)

B. Saponis uncias octo, Subcarbonatis libram unam et Spiritus Rorismarini uncias sedecim.

℞. Olei albi . . . . uncias duas.
Saponis . . . drachmas duas.
Alcoholis vulnerarii libram unam.
Solutionem filtra. (*Ra.*)

Auflöſend, bei chroniſchen, ſchmerzloſen Geſchwülſten, rheumatiſchen Schmerzen und Contracturen der Gelenke angewendet.

Balneum emolliens et antisepticum. (*Bo.*)

℞. Foliorum Rutae,
— Scordii,
— Malvae,
singulorum uncias duas.
Aquae . . . quantum sufficit ut decocti librae duae obtineantur. Colaturae adde
Saponis Veneti drachmam unam dissolutam in
Alcoholis . . . drachmis sex.

Linimentum saponaceum s. Saponis, Balsamum saponaceum s. Saponis compositum, Alcohol Camphorae saponaceum, Aqua Vitae saponacea, Solutio Saponis alcoholica camphorata. (B*. His. Lus. *Sp. Vm.*)

℞. Saponis albi . . . uncias tres.
Alcoholis . . . uncias sedecim.
Solutioni adde
Camphorae . . unciam unam.
Filtra. (Lus.)

His. Saponis uncias duas, Camphorae drachmas sex et unam libram Alcoholis; — *Sp.* Saponis unciam unam et Aquae Vitae camphoratae sedecim; — B*. Saponis quantitatem arbitrariam, Aquae calidae et Alcoholis camphorati, singulorum unciam unam.

℞. Aquae Vitae camphoratae partes sedecim.
Saponis albi . . partem unam.
Macera ad perfectam solutionem usque et filtra. (*Vm.*)

Linimentum saponatum Kaempfii. (*Ca. Pid.*)

℞. Saponis Veneti concisi unciam unam.
Infunde
Alcoholis . . . uncias quatuor.
Alcoholem accende et baculi ope agita, donec urere cessaverit. Liquori refrigerato adde
Camphorae . . scrupulos duos.
Solutionem filtra. — Auflöſend.

Balsamum saponaceum s. Saponis, Linimentum Saponis s. saponaceum s. Saponis compositum s. Saponis camphoratum, Solutio Saponis alcoholico-aromatica et camphorata, Linimentum saponato-camphoratum. (Am. An. D. Du. Ed. Fenn. Ful. Lon. LonN. Suec. Wir. *C. Fi. Sp. Sw. Vm.*)

℞. Saponis Alicantini albi uncias decem.
Alcoholis . . . libras quatuor.
Dissolve blando calore et adde
Camphorae . . . uncias duas.
Olei essentialis Rorismarini,
— — Origani,
singulorum semunciam.
Solutionem filtra. (D. *Sp.*)

℞. Saponis Alicantini uncias quatuor.
Camphorae . . . uncias duas.
Olei essentialis Rorismarini semunciam.
Alcoholis . . . . libras duas.

Digere saponem in alcohole per dies aliquot, filtra, adde camphoram et oleum. (Ed. *C.*)

Am. et *C.* Saponis uncias duodecim, Camphorae duas, Olei Rorismarini tantidem et Alcoholis octarios octo; — Ful. Saponis uncias quinque, Camphorae duas, Olei Rorismarini semunciam et duas libras Alcoholis.

℞. Saponis albi rasi . uncias tres.
Camphorae rasae scrupulos duos.
Salis Ammoniaci . semunciam.
Aquae communis quantum satis.

Saponi in aqua bullienti soluto adde salem et camphoram. (*Fi.*)

℞. Saponis duri . . uncias duas.
Spiritus Turionum Pini libram unam.
Solutioni adde
Camphorae . . . semunciam et si requiritur
Olei essentialis Rorismarini drachmam unam.
Filtra. (Suec.)

℞. Saponis albi rasi . uncias duas.
Spiritus Millefolii compositi libram unam.

Solutioni adde
Camphorae . . . semunciam.
Serva. (Fenn.)

℞. Saponis medicinalis uncias tres.
Spiritus Rorismarini libram unam (octarium).
Solutioni adde
Camphorae . . . unciam unam.
Liquorem filtra. (Du. Lon. LonN. *Sw. Vm.*)

Wir. Saponis uncias sex, Spiritus Rorismarini libras duas et Camphorae semunciam; — An. Saponis uncias tres, Spiritus Rorismarini libram unam et Camphorae unciam unam.
Auflösend.

Balsamum anodynum, *Linimentum Saponis cum Opio s. anodynum s. opiatum*, *Solutio Saponis alcoholica camphorata et opiacea.* (Am. Ed. Gal. Lus. Suec. *Bo. Ca.*)

℞. Saponis albi . . . uncias tres.
Opii . . . . . drachmas sex.
Alcoholis . . . uncias sedecim.
Solutioni adde
Camphorae . . unciam unam.
Serva. (Lus.)

Bo. et *Ca.* Alcoholis sesquilibram, Saponis uncias quinque, Opii unciam unam, Olei Rorismarini semunciam et Camphorae drachmas tres; — Ed. Alcoholis libras duas, Saponis uncias quatuor, Opii unciam unam, Olei Rorismarini semunciam et Camphorae drachmas duas.

Am. addere jubet Solutioni Saponis alcoholicae aromaticae et camphoratae Opii unciam unam.

℞. Saponis albi . . . uncias duas.
Opii . . . . . semunciam.
Spiritus Turionum Pini libram unam.
Solutioni adde
Camphorae . . . semunciam.

Aeußerlich bei chronischen Schmerzen; innerlich bei sogenannter nervöser Kolik. — Gabe, fünfzehen bis zwanzig Tropfen in einem halben Glase Melissen- oder Lindenblüthenaufguß.

Balsamum anodynum. (Gal.)

℞. Saponis amygdalini semunciam.
Tincturae Opii alcoholicae unciam unam.
Tere solutionem cum
Olei Amygdalarum dulcium unciis duabus.

Linimentum aethericum s. aceticum s. Saponis aethereum, *Sapo Aetheris acetici s. aceticus aethereus*, *Solutio Saponis aetherea.* (GalH. *Bo. Ca. Pie. Sw*. Vm.*)

℞. Saponis Medullae partem unam.
Aetheris acetici partes quinque.
Dissolve in vase clauso balnei aquae tepidi ope et liquorem decantha. (*Vm.*)

Vm. praeterea Saponis partem unam cum dimidia et unam Aetheris acetici; — *Bo.* Saponis unam et duas Aetheris; — GalH. Saponis tres et sedecim Aetheris: — *Ca.* et *Pie.* Saponis unam et octo Aetheris; — *Sw*.* Saponis tres et duas Aetheris.

In Einreibungen bei chronischen rheumatischen Schmerzen.

Balsamum aceticum camphoratum. (GalH. *Bo. Ca. Pie.*)

℞. Saponis animalis,
Camphorae,
singulorum drachmam unam.
Essentiae Thymi guttas decem.
Dissolve balnei aquae ope et adde
Aetheris acetici . unciam unam.
Filtra. (*Bo. Ca. Pie.*)

GalH. dissolvere jubet Saponis drachmam unam et Camphorae tantidem in Aetheris acetici unciis duabus et solutioni addere Essentiae Terebinthinae guttas decem.

In Einreibungen bei Rheumatismen, gichtischem Hüftweh und gichtischen Schmerzen.

Balsamum antiarthriticum. (*Ca.*)

℞. Spiritus Lavandulae uncias quatuor.
Saponis animalis aromatici,
Aetheris acetici,
singulorum unciam unam.
Camphorae . . drachmas duas.
Olei essentialis Menthae piperitae,
— — Cinnamomi,
— — Lavandulae,
— — Nucis moschatae,
— — Caryophyllorum,
— — Sassafras,
singulorum guttas quindecim.

Ebenso gebraucht wie das vorige.

Linimentum aethereum. (*Sa.*)

℞. Saponis mollis,
Alcoholis rectificati,
singulorum unciam unam.
Solutioni adde
Camphorae . . . semunciam dissolutam in
Aetheris sulphurici . uncia una.

Unguentum saponaceum s. Saponis, Oleum Saponis, Linimentum saponaceum camphoratum. (Ham. *Ca. Sw. Vm.*)

℞. Saponis albi . . partem unam.
Olei Olivarum partes quinque.
Tere saponem in mortario, dissolve in oleo et liquorem post sepositionem decantha. (*Vm.*)

℞. Camphorae . . drachmas duas.
Olei Olivarum . . uncias duas.

Solutioni adde
Saponis Veneti . unciam unam.
Misce exacte. (Ham.)

℞. Saponis nigri . . . semunciam.
Camphorae . . drachmas duas.
Balsami Arcaei . unciam unam.
Misce. (*Ca. Sw.*)
Bei Rheumatismen empfohlen.

Linimentum antipleureticum s. Saponis. (Wir. *E. Sp.*)

℞. Saponis Veneti . . . uncias duas.
Olei Lauri,
— Lumbricorum terrestrium,
singulorum unciam unam.
Solutioni adde
Ammoniaci liquidi drachmas duas.
Misce. (Wir.)

℞. Saponis Veneti . . uncias duas.
Olei Lauri . . . unciam unam.
Liqua leni calore et post refrigerationem adde
Balsami tranquilli unciam unam.
Ammoniaci liquidi drachmas duas.
Misce. (*Sp.*)

℞. Linimenti Saponis uncias duas.
Ammoniaci liquidi unciam unam.
Tincturae Opii . semunciam.
Misce. (*E.*)

Unguentum paralyticum s. contra paralysin. (B*. Br. Wür. *Sp.*)

℞. Saponis Veneti . . uncias sex.
Olei Juniperi . . unciam unam.
Seminum Erucae drachmas sex.
Misce triturando.

Balsamum Succini. (*Vm.*)

℞. Olei fusci et spissi Succini partem unam.
Saponis Alicantini . partes duas.
Liqua.

Unguentum s. Pomatum resolvens. (*Sm.*)

℞. Olei Olivarum,
Aquae Calcis,
Saponis albi rasi,
Albuminis,
singulorum uncias duas.
Subige bene.

Emplastrum Cumini saponaceum. (*Sa.*)

℞. Saponis duri,
Cerae flavae,
singulorum unciam unam.
Emplastri Cumini . uncias tres.
Misce exacte.

Emplastrum de Sapone s. Saponis s. saponatum s. saponaceum s. mammillare, Ceratum Saponis. (Am. An. Du. Ed. Gal. GalM. Li. Lon. LonN. Lus. RC. Sar. Suec. *C. Ca. Vm.*)

℞. Cerussae,
Minii, singulorum libram unam.
Olei Olivarum . . libras tres.
Saponis . . . . . uncias octo.
Coque, agitando continue et sensim Aquam addendo, ad emplastri usque consistentiam. (Sar.)

℞. Saponis albi . . . uncias octo.
Cerae flavae . . uncias decem.
Lithargyri . . . libram unam.
Olei Olivarum octarium unum.
Aceti . . . . . octarios octo.
Coque lithargyrum cum aceto, adde saponem, tunc ceram et oleum. (Am. *C.*)

℞. Emplastri diachyli partes ducentas.
Pulveris Minii partes quinquaginta.
— Cerussae partes viginti quinque.
Cerae albae partes nonaginta sex.
Aquae . . . quantum sufficit.
Coque, continue agitando et adde, ab igne removendo, aqua rejecta
Saponis albi rasi partes centum viginti quinque.
Coque igne exiguo. (Gal. *Ca.*)

℞. Emplastri diachyli simplicis libras duas.
Cerae albae . . . uncias tres.
Liquefactis leni igne adde
Saponis albi . . . semilibram.
Fiat emplastrum. (An.)

Jeromel liquare simul jubet Emplastri diachyli libram unam et Cerae albae unciam unam, tunc massae refrigeratae addere pro partiunculis Saponis medicinalis teneris uncias tres; — GalM. Diachyli partes octo, Cerae flavae duas et quatuor Saponis.

℞. Emplastri diachyli simplicis partes octo.
Saponis . . . . partem unam.
Misce simul. (Suec.)

Du. et Lon. Emplastri partes duas et unam Saponis; — Lus. Emplastri unam et tres Saponis; — Lon. LonN. *C.* Emplastri sex et unam Saponis.

℞. Emplastri diachyli simplicis partes quatuor.
— — gummosi partes duas.
Liquatis adde
Saponis duri . . partem unam.
Coque parumper. (Ed.)

℞. Emplastri diachyli gummosi partes decem.
Olei Olivarum partem dimidiam.
Cerae albae . . partem unam.
Saponis albi . partes quatuor.
Liqua simul. (*Vm.*)

℞. Emplastri diachyli gummosi partes duas.

Saponis Alicantini partem unam.
Liqua, continue agitando. (Li.)

Emplastrum saponatum s. Saponis camphoratum s. resolvens cum Sapone et Camphora. (Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. D. Ful. Gal. GalM. Han. Hass HassP. Li. O. Pol. R. Sax. *B. Br. Fi. Pid. Sp. Sw. T. Vm.*)

℞. Olei Rosarum uncias duodecim.
Minii,
Cerussae, singulorum uncias sex.
Coque fortiter et adde
Saponis rasi . uncias quatuor.
Agita ad refrigerationem fere usque et adde
Camphorae cum Olei pauxillo tritae . . . . . semunciam.
Misce. (*Sp.*)

℞. Emplastri diachyli simplicis libras tres.
Cerae flavae . . . semilibram.
Saponis . . . . . uncias tres.
Liquatis adde
Camphorae (in Olei Olivarum Provincialis pauxillo solutae) semunciam.
Misce bene. (B. Bel. Bor. Bor4. D. Ham. O. Pol.)

HassP. Emplastri communis sesquilibram, Cerae flavae uncias quatuor, Saponis Alicantini uncias quatuor et Camphorae in Oleo Olivarum solutae semunciam; — An. addere jubet singulis unciis Emplastri Saponis simplicis Camphorae grana decem; — Li. partem vigesimam quartam; — GalM. vigesimam quintam et quinquagesimam pro arbitrio; — *Vm.* quadragesimam octavam; Sax. Camphorae partem unam, Saponis duas, Cerae quatuor et Emplastri diachyli simplicis viginti quatuor.

℞. Emplastri diachylI simplicis sesquilibram.
Liqua leni igne et adde continua sub agitatione
Saponis Hispanici pulverati uncias quatuor.
Camphorae cum Olei pauxillo tritae . . . . . semunciam.
Misce bene. (Hass. *Pid.*)

Ams. Emplastri libras tres, Saponis semilibram et Camphorae drachmas sex; — R. Emplastri libras tres, Saponis semilibram et Camphorae unciam unam; — Ful. Emplastri uncias duas, Saponis unam et Camphorae drachmam unam; — *Br.* Emplastri uncias sex, unam Saponis et pro libra quaque Camphorae drachmam unam; — *Sw.* Emplastri libram unam, Saponis unciam unam et Camphorae drachmam unam; — Gal. *T.* Emplastri libram unam, Saponis uncias quinque et Camphorae unciam unam; — *B.* Emplastri semilibram, Saponis uncias quatuor et Camphorae semunciam; — *Fi.* Emplastri libras tres, Saponis uncias octo, Camphorae, Lithargyri laevigati, singulorum sesquiunciam.

℞. Cerae flavae,
Resinae Pini,
singularum partes quatuor.
Liquatis adde
Saponis pulverati partes quatuor.
Massae semirefrigeratae denuo adde
Camphorae cum Olei copia aequali tritae . partem nonagesimam.
Misce bene. (Ba.)

Emplastrum balsamicum. (*Sw.*)

℞. Emplastri diachyli libras quinque.
Liquatis adde
Saponis albi . . libram unam.
Camphorae . . . . uncias tres.
Castorei cum Alcohole triti sesquiunciam.
Misce exacte.

Oleum Saponis. (Br. Ful. His. Pal. Sar. Wir.)

℞. Saponis rasi . . partem unam.
Arenae lotae . . . partes tres.
Destillent ex arena in retorta, tunc oleum supra cinerem sarmentorum rectificetur. (Br. Ful. Pal. Sar. Wir.)

His. destillare jubet Saponis partem unam cum una Laterum contusorum et oleum bis terve redestillare ut limpidissimum obtineatur.

Reizend, ehedem zur Auflösung von Ekchymosen, Stillung von Krämpfen und Zahnschmerzen und zur Austrocknung übel aussehender Geschwüre.

Potentilla.

Von dieser Gattung kommen in den Pharmacopöen zwei Arten vor:

1) *Potentilla Anserina, L.*; Gänsekraut, Gänserich, Fingerkraut, Silberkraut; Ansérine vulgaire, Argentine (*Gal.*); Silverwood (*Ang.*).

Br. Gal. Wir. *Be. M. Sp.*

♃ (Icosandria Polygynia, L.; Rosaceae, J.) Eine in ganz Europa wachsende Pflanze. (*Bull.* t. 157. *Blackw.* t. 6. *Plenck* t. 415. *Hayne* IV. t. 31. *Zorn* Ic. pl. t. 15.)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an

Die Wurzel (radix Anserinae s. Argentinae s. Argentariae) ist faserig und schwärzlich. Sie hat einen süßlichen Geschmack.

Das Kraut besteht aus einem sehr dünnen Stängel mit gefiederten Blättern, deren gezähnte Blättchen unten glänzend silberweiß behaart sind. Es ist geruchlos. Der Geschmack ist herb und etwas styptisch.

Ein sehr schwaches adstringirendes Mittel.

2) *Potentilla reptans*, *L.*; Fünffingerkraut, Fünfblatt, Handblatt; Quintefeuille (*Gal.*); Cinqfo l leav'd grass (*Ang.*); Femfingerert (*D.*): Cinco en rama (*His. Lus.*); Vyfvingerkruid (*Bel.*); Cinquefoglio, Pentafillo officinale, Cinque dita della Madonna (*I.*); Pieciornik (*Pol.*); Femfingeraert (*Suec.*).

Ams. Br. Fer. Gal. His. Wir. *Fi. Sp.*

4 Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (*Zorn* Ic. pl. t. 302.)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an.

Die Wurzel (radix Potentillae s. Pentaphylli s. Quinquefolii majoris) ist walzig, außen schwärzlichbraun, inwendig weißlich und von schwach styptischem Geschmack.

Das Kraut besteht aus einem fadenförmigen Stängel und gestielten, fünfzeiligen Blättern mit stumpfen, sägezähnigen hellgrünen Blättchen. Es hat einen etwas bittern und adstringirenden Geschmack.

Primula.

Primula officinalis, *L.*; Schlüsselblume; Primevère officinale (*Gal.*); Cowslips (*Ang.*); Oxedrif (*D.*); Primula veris (*His.*); Sleutelbloem (*Bel.*); Primavera (*I.*); Bakwiza (*Pol.*); Primovera (*Lus.*); Oxelaegg (*Suec.*)

Ams. Br. Gal. Gen. His. Wir. Würt. *Be. M Sp.*

4 (Pentandria Monogynia, L.; Primulaceae, *J.*) Eine Europäische Pflanze. (*Hayne* III. t. 34 *Bert.* Bild. X. 48. fig. 1 Dict. d. Sc. nat. cah. 4. Fl. méd. V. 284.)

Man wendet die Wurzel, das Kraut und die Blüthen an.

Die Wurzel (radix Primulae veris s. paralyseos s. Verbasculi pratensis) ist ein dicker etwas röthlicher Ausläufer, welcher mit langen, weißen, fleischigen Fasern besetzt ist. Sie hat einen angenehmen, anisartigen Geruch und einen schwach adstringirenden, etwas bitteren Geschmack.

Das Kraut besteht aus eirunden, gestreckten, runzligen, dicken, stumpfen, behaarten, gezähnten, unten etwas weißlichen Blättern. Sie haben fast keinen Geruch und einen rein krautartigen Geschmack.

Die Blüthenkronen, welche man bloß allein nimmt, sind einblättrig, walzig, fünftheilig, gelb und haben einen angenehmen Geruch und einen süßen Geschmack.

Conserva Primulae veris. (Pal. Wir.)

℞. Florum Primulae veris partem unam.
Sacchari albi . . . partes duas.
Contere.

Aqua paralyseos s. Primulae veris. (Pal.)

℞. Florum Primulae veris partem unam.
Aquae . . . . . partes tres.
Destillet pars una cum dimidia.

Syrupus Florum paralyseos s. Primulae veris. (Pal. Wir.)

℞. Florum recentium Primulae veris libras tres cum dimidia.
Aquae fontanae bullientis libras quatuor.
Infunde per horas viginti quatuor, exprime et in unciis octodecim colaturae solve
Sacchari albi uncias triginta duas.

Acetum Primulae veris. (Würt.)

℞. Radicis Primulae veris leviter siccatae et contusae sesquiunciam.
Aceti boni . . . libram unam.
Macera per dies quatuordecim, saepius agitando, exprime leviter et adde
Alcohol's . . . unciam unam.
Post aliquot dies decantha.

Oxymel Primulae veris. (Würt.)

℞. Aceti Primulae veris partem unam.
Mellis albi . . . . partes duas.
Coque lente ad syrupi consistentiam.

Prinos.

Prinos verticillatus, *L.*; wirtelförmiges Prinos; Prinos, Apalachine à feuilles de prunier (*Gal.*); Deciduous winterberry, black ader (*Ang.*).

Am. C.

Ein Strauch (Hexandria Monogynia, L.; Rhamneae, *J.*) des nördlichen Amerika. (*Duh.* I t. 23.)

Man wendet die Rinde an, welche bitter und etwas scharf ist.

Prunella.

Prunella vulgaris, *L.*; gemeine Brunelle, Gottheil, Braunheil, Selbstheil; Prunelle (*Gal.*); Selfheel (*Ang.*); Czernoklowek, Swalnjk mensij (*B.*); Prunelle (*D.*); Brunela (*His.*); Bruinella (*Bel.*; Zywokest modry (*Pol.*); Prunella (*Lus.*).

Br. Gal. His. Wir. Würt. *Be. M. Sp.* Z.

4 (Didynamia Gymnospermia, L.; Labiatae, *J.*) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (*Blackw.* t. 24. *Plenck* t.

492. *Hayne* VI. t. 10. · *Zorn* Ic. pl. t. 156.)

Man wendet das blühende Kraut (herba Prunellae s. Brunellae s. Consolidae minoris) an; es besteht aus einem vierkantigen, wenig ästigen Stängel mit gestielten, länglich eirunden, etwas sägezähnigen Blättern und in gedrängten Wirteln beisammenstehenden, eine endständige Aehre bildenden Blüthen. Es hat keinen Geruch. Der Geschmack ist etwas bitter und schleimig.

Es wurde ehedem als Wundmittel betrachtet.

Succus Prunellae. (Wür.)

℞. Herbae recentis Prunellae quantum vis.

Contunde in mortario ligneo, Aquae pauxillo humectando, exprime fortiter, succum sepositum decantha et in lagenis serva, singulis libris liquoris Alcoholis drachmam unam addendo.

Syrupus Prunellae. (Wir.)

℞. Succi Prunellae depurati et lenta evaporatione super igne ad dimidium redacti . uncias novem.

Solve in eo

Sacchari albi . uncias sedecim.

Prunus.

In den Pharmacopöen werden zwei Arten dieser Pflanzengattung angezeigt:

1) *Prunus domestica, L.;* Pflaumenbaum; Prunier domestique (*Gal.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fer. Ful. Gal. Han. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Wir. WW. *Be. Br. C. Fi. G. M. Pid. Sp. Z.*

Ein Baum (Icosandria Monogynia, L.; Rosaceae, *J.*), welchen man in allen Obstgärten antrifft. (*Blackw.* t. 305. *Plenck* t. 879. *Hayne* IV. t. 43. Düss. off. Pfl. V. t. 9. *Bert.* Bild. V. 74. fig. 1. *Zorn* Ic. pl. t. 493.)

Man wendet die Frucht [Prunus; Pflaume; Prune (*Gal.*); Plum (*Ang.*); Swestka, Ssjwa (*B.*); Blom (*D.*); Cirnelo (*His.*); Pruin (*Bel.*); Prugno (*I.*); Sliwina (*Pal.*); Ameixa (*Lus.*); Plom (*Suec.*)] an. Sie ist hinsichtlich der Größe, Gestalt und Farbe unendlich verschieden. Sie hat einen süßen, meist zugleich etwas sauren Geschmack. Im Ofen oder an der Sonne getrocknet, nennt man sie gebackne oder gewelkte Pflaumen (Pruneaux), wozu man gewöhnlich die Damascener Pflaumen wählt. Das rohe Muß (Pulpa Prunorum cruda) wird von Bor4. angezeigt.

2) *Prunus spinosa, L.;* Stechdorn, Schlehenbaum; Prunier sauvage (*Gal.*); Slaetorn, Kreygebaertorn (*D.*).

A. Ams. Ba. D. Fer. Ful. Gal. His. Li. R. Sax. Wir. *Be. M. Sp.*

Ein Strauch, welcher in ganz Europa wächst (*Hayne* IV. t. 44. Düss. off. Pfl. IV. t. 17. *Zorn* Ic. pl. t. 4.)

Man wendet die Rinde, die Blüthen und die Frucht an.

Die Rinde (cortex Acaciae nostratis s. vulgaris s. Germanicae s. Pruneoli sylvestris) ist graubraun. Sie hat einen bittern und adstringirenden Geschmack.

Die Blüthen sind weiß, haben einen angenehmen Geruch, welcher sich durch Trocknen nicht ganz verliert und einen bittern, etwas styptischen Geschmack.

Die Früchte, Prunellen, Schlehen (Prunelles) genannt, sind rundliche, schwarze, mit einem blauen Reif bedeckte Steinfrüchte, welche unter einem grünlichgelben Fleische einen glatten rundlichen Kern enthalten. Der Geschmack ist herbe und adstringirend, wird aber durch Gefrieren süß. Die im Kern enthaltene Mandel hat den Geschmack der bittern Mandeln.

Die ganze Pflanze ist adstringirend. Der verdickte Saft ihrer Früchte liefert den Acaciensaft (Acacia nostras). Die Blüthen sind ein purgirendes Hausmittel zu einer halben Unze im frischen Zustande oder zu zwei Drachmen getrocknet auf sechs Unzen Wasser.

Pulpa Prunorum s. Prunorum depurata. (An. Ba. Bor. Bor4. D. Han. His. Li. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Wür. *Fi. Pid. Sm. T. Vm.*)

℞. Prunorum . . . quantum vis.

In Aqua bulliente mollefactis, liquidum decantha, nucleos separa et per crinium trajice, cum cochleari ligneo primendo; pulpam exime et in olla tecta serva. (Li. *T. Vm.*)

Gal. et Lus. miscere jubent pulpam cum Aqua decocti et totum blando calore sufficienter consumere.

℞. Prunorum bonorum partem unam.

Aquae communis . partes duas.

Coque ad mollitiem fructuum usque et nucleis separatis pulpam per cribrum trajectam consume, Sacchari partem sextam addendo. (Ba. Bor. Han. O. Pol. RC Sax. *Sm.*)

His. Lus. et *Pid.* Sacchari partem unam et duas Pulpae; — An. D. R. et Wür. Sacchari unam et Pulpae tres; — Bor4. Pulpa Prunorum cruda addita Aquae communis sufficiente quantitate per cribrum setaceum trajecta evaporet ad extracti spissioris consistentiam; singulis libris admisceantur Sacchari albi pulverati librae duae.

Ein mildes Abführmittel.

Decoctum purgans antiphlogisticum s. laxans. (*B. Sp.*)

℞. Prunorum . . . uncias duas.
Contunde cum nucleis et adde
Aquae . . . . . libras tres.
Tertia parte coquendo consumptâ colaturae infunde
Syrupi Sacchari . unciam unam.
Auf zwei Mal zu nehmen (*B.*)

℞. Prunorum . . uncias quatuor.
Aquae octarios duos cum dimidio.
Coquendo partem quintam consume, sub finem addendo
Liquiritiae . drachmas quatuor.
Post refrigerationem cola. (*Sp.*)

Conserva Prunorum. (Sar. *Br. Fi. T.*)

℞. Prunorum . . . quantum vis.
Digere cum Aqua, igne lenissimo, donec mollescant, pulpam per cribrum setaceum trajice, adde Sacchari partes tres et sufficienter consume, continue agitando. (Sar.)

Fi. Prunorum libras septem in pulpam redactarum, Sacchari albi tres; — *Br.* Terere jubet Pruna cum Sacchari pulverati duplo et inde pastam homogeneam formare; — *T.* Pulpae Prunorum libras quatuor, Syrupi decocti Prunorum ad plumam inspissati libras sex lente ad spissitudinem requisitam consumere jubet.

Conserva Prunorum leniens. (*Fi. T.*)

Obtinetur in decocto ad conservam simplicem adhibito Sennae drachmas sex digerendo et huic infusum pulpae addendo. Prunorum libras septem; Infusi Sennae, Sacchari, singulorum libras tres.

Acacia nostras, Roob Prunorum sylvestrium s. Fructuum Acaciae Germanicae. (A. Sar.)

℞. Fructuum Acaciae Germanicae fere maturorum . quantum vis.
Contunde, exprime succum et statim in balneo aquae, continue cum spathula agitando, ad electuarii consistentiam consume.

Aqua Florum Acaciae. (Ful. Li. Pal. Sax. Wür. *Sm.*)

℞. Florum siccatorum Acaciae Germanicae . . . partes duas.
Aquae . . . quantum sufficit.
Destillent partes viginti. (*Sm.*)

Pal. Florum partem unam et tres Aquae; destillet dimidia pars; — Li. et Wür. Florum partem unam et Aquae sex; — Sax. Florum partem unam et octo Aquae; destillet dimidia pars.

℞. Florum siccatorum Acaciae libras tres.
In sacco linclusos in cucurbita suspende continente
Aquae . . . . libras decem.
Destillet sesquilibra absque coctione. (Ful.)

Syrupus Acaciarum s. Florum Acaciarum. (Pal. Wir.)

℞. Florum recentium Acaciae Germanicae,
Aquae bullientis,
singulorum libras duas.
Digere per noctem in vase tecto; colaturae unciis novemdecim adde
Sacchari albi uncias triginta duas.
Coque et cola syrupum. (Wir.)

Pal. infundere jubet Florum libras duas in Aquae bullientis quatuor per horas duodecim, liquidum deinde infundere Florum novorum libris duabus, operationem tertia vice repetere et cum colatura suprema et Sacchari albi libris quatuor syrupum parare.

Carirend, wurmtreibend, gegen Nierenentzündung. — Gabe, von einer bis zu drei Drachmen für Kinder; von sechs Drachmen bis eine Unze für Erwachsene.

Ptarmica.

Achillea Ptarmica, L; Deutscher Bertram, wilde Bertrammurzel, Sumpfgarbe, Nieskraut, Bertramachillenkraut; Ptarmique, Herbe à éternuer (*Gal.*); Common sneeze wort (*Ang.*); Hvid regnfan (*D*); Ptarmica (*His. Lus.*); Tysk bertram, Vild bertram (*Bel.*); Erba da sternutare (*I.*); Richawiec ziele (*Pol.*); Nysgraess (*Suec.*)

Bor. Br. D. Gal. Gen. Han. Li. Pol. R. Sax. Wir. Wür. *Be. G. M. Sp.*

♃ (Syngenesia Polygamia Superflua, L.; Synanthereae, *Cass.*) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (*Blackw.* t. 672. *Pleuck* t. 633. *Zorn* Ic. pl. t. 342.)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an.

Die Wurzel (radix Ptarmicae) ist lang, walzig, etwas gegliedert, federspulendick, an den Knoten behaart, außen graulichgelb, inwendig weißlich, von kaum merklichem Geruch und einem anfangs schwachen, dann scharfen Geschmack

Das Kraut besteht aus lanzettförmigen, spitzigen, fein gezähnten, glatten Blättern. Der Geschmack desselben ist scharf und brennend.

Reizend, bei Zahnschmerz empfohlen. Die Russen wenden es gegen Blutharnen und Mutterblutfluß an.

Pteris.

Pteris aquilina, L.; Flügelfarrn, Adlerfaumfarrn, Farrnkrautweiblein; Ptéride, Fougère femelle (*Gal.*); Commonbrake (*Ang.*).

Pul. B. Wir. Wär. *M.*

4 (Cryptogamia, L.; Filices, *J.*) Eine in ganz Europa wachsende Pflanze. (*Bull.* Herb. t. 207. *Bert.* Bild. X. 38. fig. 1.)

Man wendet den Ausläufer, uneigentlich Wurzel (radix Pteridis aquilinae) genannt, an; sie ist fingersdick, lang, außen schwarz, innen gelb. Schräg durchschnitten zeigen sich auf der Durchschnittsfläche zwei sich kreuzende schwärzliche Linien, welche ein undeutliches Bild eines Adlers mit zwei Köpfen geben. Sie hat einen sehr starken Geruch und einen anfangs schleimigen, dann etwas bittern, widerlichen und schwach styptischen Geschmack.

Wurmwidrig. — Gabe, für Kinder dreißig Gran, für Erwachsene drei Drachmen.

Pulegium.

Mentha Pulegium, *L.*; Poley, Polei, Poleiminze; Pouliot (*Gal.*); Penny royal mint (*Ang*); Poley (*Bel. D.*); Poleg (*B.*); Poleo (*His.*); Puleggio (*I.*); Poly (*Pol.*); Poejo (*Lus.*); Puleja (*Suec.*).

Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Br. Du. Ed. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. R. RC. Sax. Wir. Wür. *Be. Br. C. G. M. Pid. Sp.* Z.

4 (Didynamia Gymnospermia, L.; Labiatae, *J.*) Eine Europäische Pflanze. (*Zorn* Ic. pl. t. 490)

Man wendet das Kraut (herba Pulegii) an; es besteht aus einem fast walzigen, behaarten, sehr ästigen Stängel mit eirunden, stumpfen, ganz klein gezähnten Blättern, und hat einen starken, durchdringenden, nicht sehr angenehmen Geruch und einen etwas brennenden, hintennach kühlenden Geschmack.

Reizend, nervenstärkend.

Oleum Pulegii aethereum, *Aethereoleum Pulegii.* (Am. Br. Du. Han. Lon. LonN. Pal. Sar. Wir. Wür. *C. T.*)

℞. Herbae florescentis Pulegii quantum vis.
Aquae communis quantum sufficit.

Destillando elicitum oleum supernatans collige. (Am. Du. Han. Lon. LonN. *C.*)

T. Herbae quantum vis, Aquae bullientis pondus quadruplum, destillet liquidi pars dimidia.

℞. Herbae florescentis Pulegii partes viginti quinque.
Aquae partes septuaginta quinque.
Salis culinaris . . . partes tres.

Post tres dies destillatio fiat. (Br. Pal. Sar. Wir.)

℞. Herbae florescentis Pulegii quantum vis.
Aquae Pulegii . quantum sufficit.

Destillent. (Wür.)

Aqua Pulegii. (A. Ams. Ed. Fer. Ful. Gen. Han. Hass. Lon. LonN. Pal. Sar. Sax. Wür. *Pid. Sp. Vm.*)

℞. Herbae florescentis Pulegii partes duas.
Aquae . . . quantum sufficit.

Destillent partes quatuordecim (Ham.)

RC. Destillent partes decem; — Ams. et *Sw.* Herbae partem unam et Aquae sufficientem quantitatem; destillent partes decem; — Pal. Herbae partem unam et quatuor Aquae; destillent partes duae; — Wür. Herbae unam et sex Aquae; — Hass. et *Pid.* Herbae unam et octo Aquae; destillent partes quatuor; — A. Herbae partem unam et duodecim Aquae; destillent partes quatuor; — Sax. Herbae partem unam et quindecim Aquae; destillent trientes duo; — Gen. Herbae libram unam et Aquae quantum satis ad prohibendum empyreuma; destillent librae sex; — Fer. Herbae libras quatuor et Aquae sedecim; destillent librae octo; — Lon. Pulegii sesquilibram, Aquae quantum satis, destillet congius; — LonN. Pulegii exsiccati semilibram vel Olei Pulegii pondere drachmas tres, Aquae quantum ad prohibendum empyreuma sufficit; destillet congius.

℞. Herbae recentis Pulegii partem unam.
Aquae . . . . partes quatuor.

Destillet dimidia pars et nova supra novam herbam destillatio instituatur. (Sar.)

℞. Herbae re entis Pulegii partes tres.

In sacco inclusam in medio cucurbitae suspende continentis
Aquae . . . . partes duodecim ita ut saccus ad aquam non attingat; destillent partes sex. (Ful.)

℞. Herbae recentis Pulegii libram unam.
Aquae purae . quantum sufficit ut empyreuma prohibeatur. Destillent librae decem, quibus adde Aquae Vitae uncias quinque. (Ed.)

Vm. Herbae recentis partes decem, Aquae Vitae partem dimidiam et Aquae centum sexaginta; destillent partes quadraginta.

Spiritus Pulegii. (Lon. LonN. Sar. *C. Sm.*)

℞. Herbae recentis Pulegii partem unam.
Aquae Vitae . . . partes tres.
— purae . . . partes sex.

Destillent partes duae cum dimidia. (*Vm.*)

e

Lon. et C. Herbae sesquilibram, Aquae Vitae octarios octo et Aquae quantum sufficit ad prohibendum empyreuma; destillent partes octo; — LonN. Olei Pulegii pondere scrupulos septem, Spiritus rectificati octarios quatuor cum dimidio, Aquae quantum sufficit ad prohibendum empyreuma; lento igne destillet congius.

℞. Herbae recentis Pulegii partem unam.
Alcoholis . . . partes quatuor.

Post horas viginti quatuor digestionis destillent in balneo aquae fere ad siccum; macera et productum cum nova herba novae destillationi subjice. (Sar.)

Pulmonaria.

Pulmonaria officinalis, *L.*; Lungenkraut; Grande pulmonaire (*Gal.*); Common longwort (*Ang.*); Spettet longeurt (*D.*); Pulmonaria (*His. Lus.*); Gewoon lungekruid (*Bel.*); Polmonaria, Sinfito macchiato (*I.*); Plaonik (*Pol.*); Meduniza (*R.*); Lungaert (*Suec.*); Koiwiek (*Ta.*).

Ams. An. Br. Fer. Gal. His. Wir. *Be. Br. Fi. G. M. Sp.*

♃ (Pentandria Monogynia, L.; Borragineae, *J.*) Eine Europäische Pflanze. (*Blackw.* t. 367. *Plenck* t. 73. *Hayne* II. t. 44. Fl. méd. V. 286.)

Man wendet das Kraut (herba Pulmonariae maculosae s. Symphyti maculosi) an; es besteht aus eirunden, gestielten, kurz steifbehaarten, weißgefleckten Wurzelblättern und abwechselnden, sitzenden, längern, schmälern, ganzen Stängelblättern. Es hat fast gar keinen Geruch. Der Geschmack ist krautartig, schleimig und etwas adstringirend.

Ehedem rühmte man es sehr bei Lungencatarrh. Heutzutage ist es fast außer Gebrauch.

Succus Pulmonariae. (Gal. *Fi. T.*)

℞. Foliorum Pulmonariae mundatorum . . . . partes sedecim.

Contunde in mortario marmoreo, sensim addendo

Aquae communis partem unam.

Exprime succum, qui postquam subsedit, frigide per chartam emporeticam filtretur.

Pumex.

Lapis Pumicis, *L.*; Bimstein, Bimsenstein; Pierre Ponce (*Gal.*); Pumice stone (*Ang.*); Piedra poncez (*His.*); Puimsteen (*Bel.*), Pietra pomice (*I.*); Zazel kamienna (*Pol.*).

Br. Gal. Han. His. Wir. Wür. *Fi. Sp.*

Ein vulcanischer, weißlichgrauer oder gelblicher, sehr poröser, leichter, brüchiger, faseriger, in der Richtung der Fasern glänzender selbst seidenglänzender Stein mit körnigem und ungleichem Bruche, welcher trocken anzufühlen, leichter als Wasser und zu einem weißen Glase schmelzbar ist.

Er kömmt zu verschiedenen Zahnpulvern.

Pulvis dentifricius albus. (Br. *Sp.*)

℞. Pumicis . . . . uncias duas.
Ossis Sepiae . . uncias unam.
Cremoris Tartari,
Radicis Iridis Florentinae, singulorum semunciam.
Olei essentialis Caryophyllorum guttas quatuor.

Fiat pulvis tenerrimus.

Punica.

Punica Granatum, *L.*; Granatbaum; Grenadier, Balaustier (*Gal.*); Pomegranate-tree (*Ang.*); Ranua, Roman (*Ar.*); Pomapran, Granatowe gablko (*B.*); Delunghedie (*Cy.*); Anar (*Hin. Pe.*); Balaustries (*His.*); Rodia (*Graec. mod*); Granatboom (*Bel.*); Granato, Pomo Granato, Melogranato, Balausto (*I.*); Gangsalan (*Ja.*); Dalimb (*Mah.*); Dalema, Daime (*Mal.*); Drzewo granatowe (*Pol.*); Romeira (*Lus.*); Granatoschnoe derewo (*R.*); Dadima (*Sa.*); Darim (*Suec.*); Magilam palam (*Tam.*); Dadima pundu (*Tel.*); Nar (*Tu.*).

Am. Ams. An. B. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. O. Pol. Sax. Wir. Wür. *A. Be. Br. C. Fi. G. Ma. Par. Sp.* Z.

Ein Baum (Icosandria Monogynia, L.; Myrteae, *J.*) des südlichen Europa's. (*Blackw.* t. 97. *Schk.* t. 131. b. *Plenck* t. 376. Düss. off. Pfl. t. 9. *Zorn* Ic. pl. t. 270.)

Man wendet die Wurzelrinde, die Blüthen und die Früchte an.

Die Wurzelrinde ist außen gelblichgrau, innen graulichgelb oder schwach röthlich, geruchlos und von schwach styptischem und bitterlichem Geschmacke. Das Pulver ist grünlichgelb. Es ist unlängst als ein untrügliches Mittel zur Austreibung des Bandwurms gepriesen worden.

Die Blüthen (flores Balaustiorum, Balaustia) sind halbkugelig, schön roth, fast geruchlos und von etwas styptischem Geschmack. Sie sind adstringirend, aber weniger als die Rinde der Frucht.

Die Früchte, Granaten (Mala Punica); Grenades (*Gal.*), sind rundliche, von

den Kelchabschnitten gekrönte und durch eine Queerscheidewand in zwei vielfächerige Höhlen getheilte Beeren; diese Fächer enthalten eckige, mit einem dreiigen Umschlage versehene Saamen. Das äußere Fellchen (Malucorium, Malicorium) ist graulichgelb oder röthlich, dick, hart und lebrig. Es hat einen adstringirenden Geschmack. Man hat es in allen Fällen angewendet, wo man auf die lebenden Gewebe adstringirend wirken wollte.

Adstringirend; man darf keine Eisensalze damit verbinden. Rehmann empfahl die Rinde der Frucht gegen Wechselfieber, zu sechs bis zwölf Stück von zwei bis sechs Scrupel, während der Apyrexie.

Species Decocti pro gargarismate adstringente s. alstringentes pro gargarismate. (B*. Gal. GalM. Han. Pal. *Fi. Pid.*)

℞. Radicis Bistortae,
Florum Granati,
— Malvae arboreae,
singulorum uncias duas.
Concisa misce. (Han.)

℞. Herbae Plantaginis,
— Prunellae,
singularum uncias quatuor.
— Salviae . . uncias duas.
Florum Rosarum rubrarum,
— Ligustri,
— Balaustiorum,
singulorum unciam unam.
Concisa misce. (Pal. Wir.)

Br. eandem formulam sed absque ligustro; — *Fi.* Plantaginis, Consolidae minoris, singulorum uncias quinque, Salviae uncias tres, Florum Rosarum, Balaustiorum, singulorum unciam unam. (½ Unze auf 1 Pfund schwaches Decoct.)

℞. Radicis Bistortae,
Herbae Agrimoniae,
— Pervincae,
Florum Malvae arboreae,
— Balaustiorum,
singulorum uncias duas.
Concisa misce. (*Pid.*)

℞. Corticis Granati,
Radicis Bistortae,
— Tormentillae,
singulorum partes aequales.
Concisa misce. (Gal. GalM.)

Species pro fotu ad haemorrhoidum fluxum immodicum. (Pal.)

℞. Herbae Millefolii,
— Plantaginis,
— Verbasci,
Florum Sambuci,
singulorum manipulos quatuor.
Corticis Granati unciam unam.

Succus Granatorum. (Gal. His. *Fi. Sio. T.*)

℞. Fructuum Granatorum acidorum quantum vis.

Cortice externo separato reliquum transverse concide, tritura spatulae ligneae ope ut semina separentur, contunde deinde in mortario porphyreo, exprime vel in sacco vel inter duo strata straminis secalitii concisi et cum aqua tepida abluti; succum sepositum et decanthatum in lagenis sub olei strato serva.

Syrupus Granatorum s. de Granatis. (Gal. His. Pal. Sar. Wir. *T.*)

℞. Succi Granatorum depurati et filtrati . . . . . libras duas.
Sacchari albi
libras tres cum dimidia.

Solve lenis caloris ope. (Gal.)

His. et Lus. Succi partem unam et duas Sacchari; — Wir. Succi uncias decem et sedecim Sacchari ut fiat coquendo syrupus; — *T.* Succi libras quatuor, Sacchari septem; — Sar. Syrupi communis quantum necesse est ut fiat levis evaporationis in balneo aquae ope syrupus.

Vinum Granati. (Fi.)

℞. Seminum maturorum quantum vis.

Contunde leviter in mortario marmoreo, sepone, donec odorem vinosum emittant, exprime succum et filtratum per chartam serva in parvis vasis vitreis a strato olei obtectum.

Decoctum Corticis Radicis Granati. (B*. GalF. *E. Ma. T.*)

℞. Corticis Radicis Granati uncias duas.
Aquae . . . . . libras duas.

Partem quartam coquendo consume. — Gegen Bandwurm. — Gabe, zwei Unzen alle halbe Stunden. — Vier Gaben sind gewöhnlich zur Austreibung des Wurms hinreichend.

T. Corticis drachmas decem, Aquae fontanae uncias viginti, macerare per horas viginti quatuor, deinde ad dimidium decoquere et tunc adhuc per horas circiter duodecim in infusione relinquere, supremo decanthare. — Für Erwachsene die ganze Portion auf dreimal in einer Stunde. — Oft bricht der Kranke die erste Portion wieder aus; es ist gut, wenn man Tags vorher ein Abführmittel giebt. (D. A. Bojti Nuova Giorn. de Letterati No. XXV. Pisa 1826.)

Decoctum Corticis Granati, Tisana adstringens. (GalM.)

℞. Corticis Granati unciam unam.

Aquae . . . quantum sufficit ut unciae duae colaturae obtineantur. Coque per horae quadrantem et adde
Liquiritiae rasae drachmas duas.
Abſtringirend.

Fomentatio adstringens. (*Ra.*)

℞. Corticis Granati,
Radicis Bistortae,
singulorum uncias duas.
Vini rubri . . . libram unam.
Coque et colaturae adde
Salis Ammoniaci drachmas duas.

Clysma s. Enema adstringens. (His.)

℞. Corticis Granati unciam unam.
Aquae . . . quantum sufficit ut colaturae librae duae obtineantur.

Gargarisma adstringens. (*Ca.*)

℞. Infusi Agrimoniae,
— Nucum Cypressi,
— Corticis Granati,
— Florum Sambuci,
singulorum uncias quatuor.
Mellis rosati,
Syrupi Mororum,
singulorum drachmas tres.
Acidi sulphurici . guttas viginti.

Decoctum Corticis Granati Rehmanni. (B*.)

℞. Corticis Granati . uncias duas.
Gummi Arabici drachmam unam.
Aquae fontanae . . libras duas.
Decoque ad dimidium et librae cuique decocti adde
Extracti Trifolii semidrachmam.
Aetheris sulphurici alcoholisati drachmam unam.
Abſtringirend. — Gabe, eine halbe Taſſe alle anderthalb Stunden.

Pyrethrum.

Anthemis Pyrethrum, L.; Speichelswurz, Bertram; Pyrèthre salivaire (*Gal.*); Pellitory of Spain (*Ang.*); Bertram (*D. Suec.*); Akur kurha (*Ar.*); Peltram (*B.*); Pelitre (*His.*); Radice di Santa Apollonia, Piretro (*I.*); Piretro (*Lus.*); Zebne ziele (*Pol.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor4. Br. Du. Ed. Fer. Ful. Gal. Gen. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pal. R. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *Be. Br. C. Fi. G. M. Par. Pid. Sp.* Z.

♃ (Syngenesia Polygamia Superflua, L.; Syanthereae, *Cass.*) Eine Europäiſche Pflanze. (*Blackw.* t. 209. *Plenck* t. 621. *Lam.* Ill. t. 683. fig. 4. Düss. off. Pfl. X. t. 6. Fl méd. V. 287.)

Die Wurzel (radix Pyrethri officinalis s. salivalis s. Dentariae) iſt lang, dick, ſpindelförmig, fleiſchig, wenigſtens fingerdick, außen rauh und braungelb, inwendig weiß, mit Fibern beſetzt und faſt geruchlos. Sie hat einen beißenden, ſcharfen und etwas ſauern Geſchmack, welcher ein anhaltendes Gefühl von Hitze hinterläßt.

Sie enthält, nach Gauthier, ein flüchtiges und ein fettes Oel einen gelbfärbenden Stoff, Emetin, Schleimharz ꝛc.

Reizend, die Speichelabſonderung bethätigend und faſt nur in Gurgelwaſſer und als Kaumittel angewendet. — Gabe des Pulvers, von zehen Gran bis zu einer Drachme.

Species resolventes. (*Pid.*)

℞. Radicis Pyrethri . uncias duas.
Herbae Salviae . . semilibram.
Seminum Sinapis . uncias tres.
Concisa misce. — Zu Gurgelwaſſer.

Pulvis sternutatorius. (*Pie.*)

℞. Radicis Pyrethri,
Seminum Staphydis agriae,
Zingiberis,
singulorum drachmam unam.
Piperis longi . semidrachmam.

Bolus excitans. (B*.)

℞. Radicis Pyrethri semidrachmam.
Syrupi Corticum Aurantiorum quantum sufficit.
Abends zu nehmen.

Pilulae Pyrethri s. incitantes. (*Au.*)

℞. Pulveris Radicis Pyrethri drachmam unam.
Mucilaginis Gummi Arabici quantum sufficit.
Fiant pilulae triginta. — Gabe, ſechs Stück alle vier Stunden, bei Wechſelfiebern und Lähmungen.

Pilulae excitantes. (B*.)

℞. Radicis Pyrethri drachmam unam.
Olei essentialis Menthae piperitae guttas quinque.
Conservae Cochleariae quantum sufficit.
Fiant pilulae octodecim. — Gabe, zwei bis drei Stück täglich.

Trochisci excitantes. (*Ca*)

℞. Infusi Pyrethri alcoholici unciam unam.
Sacchari pulverati uncias decem.
Mucilaginis Gummi Arabici quantum sufficit
ut fiant pilulae centum quinquaginta. — Gabe, vier bis neun Stück täglich, bei chroniſchen Bruſtbeſchwerden.

Masticatorium excitans. (*E.*)

℞. Radicis Pyrethri,
Mastichis,
singulorum drachmam unam.

Fiat massa in duas partes aequales dividenda.

Electuarium excitans.

℞. Radicis Pyrethri drachmas duas.
Mellis . . . quantum sufficit.
Gabe, ein Kaffeelöffel alle drei Stunden.

Unguentum contra pediculos. (B*.)

℞. Pulveris Radicis Pyrethri,
— Seminum Sinapis,
singulorum uncias duas.
— — Petroselini
uncias quatuor.
Axungiae Porci
uncias triginta duas.
Olei essentialis Anisi
drachmas duas.

Emplastrum Pyrethri. (B*. *Ca.*)

℞. Cerae flavae . . . uncias tres.
Terebinthinae unciam unam et drachmas duas cum dimidia.
Liqua leni igne et adde
Sagapeni,
Galbani,
Gummi Ammoniaci,
singulorum unciam unam.
Semirefrigeratis adde
Pulveris Radicis Pyrethri,
— Seminum Sinapis,
singulorum unciam unam.
Auflöſend, ſchmelzend.

Gargarisma sialagogum. (*Pie.*)

℞. Radicis Pyrethri drachmas tres.
— Liquiritiae sesquidrachmam.
Foliorum Salviae,
— Majoranae.
— Hyssopi,
singulorum semimanipulum.
— Stoechadis pugillum unum.
Aquae . . . quantum sufficit.
Decoque ad librae unius remanentiam.

Gargarisma excitans. (*Ca.*)

℞. Aquae Salviae . . uncias octo.
Spiritus Cochleariae uncias sex.
Salis Ammoniaci drachmas duas.
Radicis Pyrethri sesquidrachmam.
Post horas duodecim infusionis cola et adde colaturae
Mellis . . . . . semunciam.

Collutorium sialagogum. (*Sw.*)

℞. Radicis Pyrethri unciam unam.
Aquae bullientis libram unam.
Post horam unam cola et colaturae adde
Aceti . . . . . uncias tres.
Salis Ammoniaci drachmas tres.

Gargarisma antiodontalgicum. (*Pie.*)

℞. Radicis Pyrethri . semunciam.
Radicis Tormentillae drachmas tres.
Aceti rubri . . octarium unum.
Coque et ab igne removendo adde
Opii,
Camphorae,
singulorum drachmam unam.
Seminum Hyoscyami
drachmas tres.
Post horam unam infusionis filtra.

Collutorium antiodontalgicum. (*Ca. Pic. Sp.*)

℞. Salis Ammoniaci drachmam unam.
Radicis Pyrethri drachmas duas.
Extracti Opii . . . grana duo.
Aceti,
Aquae Lavandulae,
singulorum uncias duas.
Stent in digestione calida per aliquot horas et tunc colentur. — Wird gegen Zahnſchmerz von Weinſtraß und Rheumatismus gerühmt; man nimmt einen Löffel davon in den Mund.

Collutorium excitans. (*E.*)

℞. Radicis Pyrethri . semunciam.
Aceti . . . . . drachmas sex.
Opii gummosi . . . grana tria.
Digere per horam unam super arena.
— Man faßt einen Löffel davon in den Mund.

Tinctura odontalgica s. antiodontalgica, Elixir antiodontalgicum. (B*. Br. His. Wir. *Bo. Ca. Sw.*)

℞. Radicis Pyrethri unciam unam.
Spiritus Rorismarini semilibram.
Post sufficientem digestionem filtra. (*Ca.*)

℞. Radicis Pyrethri . uncias duas.
Spiritus Lavandulae libram unam.
Salis Ammoniaci semidrachmam.
Digere ex arena per horas viginti quatuor et filtra. (*Bo.*)

℞. Radicis Pyrethri drachmas sex.
Rasurae Ligni Guajaci
uncias duas.
— — Sassafras
unciam unam.
Foliorum Nicotianae
drachmas tres.
Summitatum Thymi,
— Origani,
singulorum drachmas duas.
Caryophyllorum drachmam unam.
Camphorae,
Opii, singulorum semidrachmam.
Alcoholis . . . . libras tres.
Post horas duodecim macerationis cola. (His.)

Sw. Pyrethri drachmas sex, Guajaci unciam unam, Sassafras tantidem, Nicotianae drachmas tres, Serpylli, Ori-

geni, singulorum drachmas duas, Camphorae semidrachmam, Opii scrupulum unum et Alcoholis libras duas,

℞. Radicis Pyrethri,
Seminum Hyoscyami,
singulorum drachmas duas.
Rasurae Guajaci . uncias duas.
Corticis Sassafras . semunciam.
Caryophyllorum,
Piperis longi,
singulorum drachmam unam.
Camphorae,
Opii, singulorum semidrachmam.
Santali rubri . drachmas duas.
Alcoholis . . uncias quindecim.

Post sufficientem digestionem filtra. (Br. Wir.)

℞. Radicis Pyrethri drachmas decem.
Alcoholis . . . libram unam.

Post decem dies infusionis colaturae adde

Camphorae . . unciam unam.
Olei Rorismarini . semunciam.
Tincturae Opii drachmas duas.

Misce. (B°. secundum Oxley.)

℞. Radicis Pyrethri,
Nucis moschatae,
singulorum unciam unam.
Caryophyllorum,
Ligni Guajaci,
singulorum semunciam.
Alcoholis (26°) . . libras tres.

Post sufficientem digestionem cola exprimendo et colaturae adde

Olei essentialis Rorismarini
guttas decem.
— — Bergamottae
guttas quatuor.

Reizend, bei Zahnkrankheiten und Zungenlähmung empfohlen. — Man wendet sie etwas erwärmt als Mundwasser an, oder tränkt auch Baumwolle damit und bringt sie in den hohlen Zahn.

Tinctura Pyrethri aetherea. (*Au.*)

℞. Radicis Pyrethri drachmas decem.
Aetheris sulphurici libram unam.

Post dies decem digestionis cola et colaturae adde

Camphorae . . unciam unam.
Olei Rorismarini . semunciam.
Tincturae Opii drachmas duas.

Ebenso gebraucht wie die vorige.

Spiritus Pyrethri. (GalF.)

℞. Radicis Pyrethri . libram unam.
Alcoholis (35°) libras quinque.
Aquae . . . . libram unam.

Maceratis per dies duos libras quinque destillent.

Spiritus Pyrethri compositus. (GalH.)

℞. Spiritus Pyrethri
octarium (litre) unum.
Cinnamomi teneris
scrupulos quatuor.
Vanillae,
Coriandri,
Caryophyllorum,
singulorum drachmam unam.
Macidis,
Coccionellae,
Croci,
Salis Ammoniaci,
singulorum grana octodecim.
Aquae Florum Aurantiorum
semunciam.
Olei essentialis Anisi,
— — Citri,
singulorum guttas octodecim.
— — Lavandulae,
— — Thymi,
Tincturae Ambrae,
singulorum guttas novem.

Post dies quatuordecim macerationis filtra.

Pyrola.

Pyrola rotundifolia, *L.*; Waldmangold, rundblättriges Wintergrün; Pyrole à feuilles rondes (*Gal.*); Vintergroen (*D.*).

Br. Gal. His. Li. Sax. Wir. *Be. M. Sp.*

♃ (Decandria Digynia, L.; Ericineae, J.) Eine Nordeuropäische Pflanze. (*Blackw.* t. 594. *Plenck* t. 335. *Hayne* IV. t. 21. *Oed.* Fl. Dan. t. 110.)

Man wendet das Kraut (herba Pyrolae) an; es besteht aus einem Büschel runder, grüner, lebriger, langgestielter Wurzelblätter. Es hat keinen Geruch, aber einen bittern und etwas styptischen Geschmack.

Q.

Quassia.

Quassia amara, *L.*; Quassienholz, Americanisches Bitterholz; Quassie, Bois de Surinam (*Gal.*); Legno del Surinam (*I.*); Drzewo kwassya (*Pol.*).

Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bord. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *Fi.*

Ein Baum (Decandria Monogynia, L.; Simarubeae, J.) Surinam's. (*Hayne*

IX. 14. *Lam.* Ill. gen. t. 343. fig. 1. *Plenck* t. 333. *Curt.* Bot. Mag. t. 497. Düss. off. Pfl. XIII. t. 1. *Desc.* Fl. Ant. I. 5.)

Man wendet das Holz des Stammes und besonders der Wurzel an, welches mit seiner Rinde bekleidet, in Stücken von verschiedener Länge und Dicke, bisweilen kaum kleinen Fingers, bisweilen aber armsdick, von einem oder mehreren Fuß Länge, welche walzenförmig, glatt, oder der Länge nach gespalten, meist gerade, selten krumm, bisweilen knotig und ästig sind, zu uns kommt Die Rinde ist gelblichgrau, nicht sehr dick, glatt anzufühlen und hängt nur wenig am Holze. Letzteres ist gelblichweiß, leicht und innerlich von zartem Gewebe. Sie hat keinen Geruch, aber einen außerordentlich bittern Geschmack.

Ihre Bitterkeit verdankt sie einem eigenthümlichen Stoffe, dem Quassin (Quassina).

Man leitet dieses Holz auch von Quassia excelsa, *Sw.*, einem Baume Jamaica's (*Comm.* Hort. I. p. 149. t. 942. *Hayne* IX. t. 16.) ab.

Bitter, tonisch, magenstärkend, bei Verdauungsbeschwerden, Diarrhoe und Blutflüssen gebraucht. — Gabe des Pulvers, von einem Scrupel bis zur halben Drachme.

Extractum Quassiae s. Ligni Quassiae (aquosum). (Am. Ams. An. Ba. Bor. Bor4. Br. Han. Hass. HassP. Lus. O. Pol. R. Sax. Wür. *C. Fi. Pid. T.*)

℞. Rasurae Ligni Quassiae libram unam.
Aquae frigidae . libras decem.
Macera per duos dies, subinde agitando, cola, repone ut desideat, liquorem cola et leni igne consume. (Pol.)

℞. Ligni Quassiae raspati quantum vis.
Coque in Aquae sufficiente quantitate per horam unam, cola exprimendo, liquorem post subsidentiam decantha et vaporando ad mellis spissitudinem redige. (Wür.)

Lus. Ligni libram unam et sex Aquae.

℞. Rasurae Ligni Quassiae libram unam.
Aquae fontanae . . libras sex.
Digere per dies quatuor in loco frigido, tunc coque parumper; cola exprimendo et ad extracti consistentiam consume. (Br.)

Am. Hass. *C.* et *Pid.* coquere jubent Ligni libram unam in Aquae octo ad dimidii remanentiam.

℞. Rasurae Ligni Quassiae libram unam.
Aquae bullientis . libras octo.
Digere per horas viginti quatuor, tunc coque per horae quadrantem et cola; residuum coquatur per horae quadrantem cum Aquae novae libris quatuor et coletur; liquores commixti post subsidentiam decanthati evaporent. (Am.)

Ams. Bor. D. Han. O. Pol. R. et Sax. pluries e serie coquere jubent Ligni partem unam cum Aquae decem et colaturas commixtas (sub finem Spiritus Vini rectificati aliquantulum addendo Bor.) consumere; — Bor4 Ligni libram unam cum Aquae sedecim ad dimidii remanentiam, residuum itidem cum Aquae sedecim ad octo decoquere et sic pergere quamdiu opus fuerit, liquores commixtos post subsidentiam decanthatos ad quatuor librarum remanentiam et has in balneo vaporis ad extracti Absinthii consistentiam inspissare; — *Fi.* Ligni libram unam primum per dimidiam horam cum duodecim, deinde cum sex Aquae decoquere, decocta commixta ad sesquilibrae remanentiam et post refrigerationem filtrata in balneo aquae ad extracti consistentiam consumere; — HassP. ut extractum Colombo; — *T.* Ligni partem unam cum Aquae duodecim per horam dimidiam coquere, colare cum expressione, decoctionem cum nova Aqua repetere etc.; — Ba. coquere Ligni partem unam primum cum quinque deinde cum decem Aquae partibus et liquores commiscere.

Gabe, zehen bis fünfzehen Gran.

Extractum Quassiae s. Ligni Quassiae alcoholicum. (Ful. Li.)

℞. Ligni Quassiae . . libram unam.
Aquae Vitae . . . . libras sex.
Post aliquot dies digestionis leni calore, exprime, filtra et ad mellis consistentiam consume; sedimentum coque cum Aquae libris tribus, exprime, filtra et itidem evapora; liquores syrupi formam praese ferentes commixti ad extracti consistentiam evaporent. (Ful.)

Li. digerere jubet Ligni semilibram primo in Alcoholis libris sex per dies duos, tunc per horas viginti quatuor cum Aquae bullientis libris novem et tincturas commixtas consumere.

Pilulae tonicae. (*Au. E.*)

℞. Extracti Quassiae drachmam unam.
Pulveris Gentianae quantum sufficit.

Fiant pilulae viginti. — Gabe, ein Stück täglich drei oder vier Mal. (*E.*)

Au. Extracti drachmas duas et Pulveris Zingiberis quantum satis ut fiant pilulae granorum duorum. — Gabe, zehen Stück auf ein Mal.

Elixir cum Aqua Calcariae ustae s. antacidum. (*Au.*)

℞. Extracti Quassiae drachmam unam.
Aquae Calcariae . . uncias octo.
Gabe, ein Kaffeelöffel.

Infusum Quassiae s. Quassiae excelsae. (Am. B*. Ed. Lon. LonN. Lus. RC. *C. E. Fi. Sw. T.*)

℞. Ligni Quassiae rasi semidrachmam.
Aquae bullientis . uncias octo.
Digere per horas duas et cola. (Am. Ed. *C.*)

B*. Ligni drachmas quatuor et Aquae libram unam; — B*. Lon. et LonN. Ligni scrupulum unum et Aquae semioctarium, — RC. *Sw.* Ligni drachmas duas et Aquae libram unam; — Lus. Ligni drachmas tres et Aquae libram unam; — *Fi. T.* Ligni drachmam unam, Aquae libram unam.

℞. Ligni Quassiae,
Serpentariae Virginicae,
Corticis Aurantiorum,
singulorum semunciam.
Aquae bullientis . octarios duos.
Infunde et cola. (*E.*)
Bitter. — Gabe, eine bis zwei Unzen mehrmals täglich.

Infusum Quassiae cum Sulphate Zinci. (Am. *C.*)

℞. Rasurae Ligni Quassiae
drachmam unam.
Sulphatis Zinci . . grana octo.
Aquae frigidae . semioctarium.
Macera per horas duas et cola.

Haustus stomachicus, Potio stomachica. (*B.*)

℞. Radicis Colombo drachmam unam.
Ligni Quassiae sesquidrachmam.
Aquae . . . . quantum sufficit ut infusi unciae octo obtineantur. Colaturae adde
Elixir stomachici Whytti
drachmas duas.
Allmälig zu nehmen.

Decoctum Ligni Quassiae. (Ful. Ham.)

℞. Rasurae Ligni Quassiae
unciam unam.
Aquae fontanae . . libras duas.
Coquendo ad sesquilibrae remanentiam consume. (Han.)

℞. Rasurae Ligni Quassiae
sesquiunciam.
Aquae . . . . libras quatuor.
Ad libras tres coctione redige, sub finem addendo
Florum Chamomillae sesquiunciam.
Subsideant tunc decantha. (Ful.) — Gabe, alle zwei oder drei Stunden ein Löffel.

Decoctum Quassiae s. Ligni Quassiae compositum, Decoctum amarum. (Wür.)

℞. Rasurae Ligni Quassiae
unciam unam.
Florum Chamomillae siccatorum
sesquiunciam.
Subcarbonatis Potassae
drachmas duas.
Aquae fontanae libras quatuor.
Parte quarta coctione consumptâ, cola.

Tinctura Quassiae vinosa. (Han.)

℞. Rasurae Ligni Quassiae
uncias quatuor.
Vini Malacensis . . libras duas.
Post sufficientem digestionem filtra. — Bitter, tonisch. — Gabe, drei Drachmen bis eine halbe Unze, täglich zwei Mal.

Tinctura Quassiae s. Ligni Quassiae s. Quassiae excelsae (alcoholica). (Am. Ams. An. B. Bel. D. Du. Ed. Gen. Han. HassP. O. Sax. *C. Fi. Sw. T. Vm.*)

℞. Rasurae Ligni Quassiae
unciam unam.
Alcoholis (0,930) . octarios duos.
Digere per duos dies et filtra. (Am. Du. *C.*)

Ed. Ligni unciam unam et Alcoholis (0,935) libras duas cum dimidia; — B. et Bel. Ligni partem unam et Alcoholis (15°) sex; — Ams. Ligni partem unam et Alcoholis (0,917) sex; — *Fi.* Ligni unam et Alcoholis (30°) sex; — *Sw.* Ligni uncias duas et Alcoholis (0,935) libras duas cum dimidia; — *Vm.* Ligni partem unam et Aquae Vitae sex; — Han. et O. Ligni uncias quinque et Alcoholis libras duas; — D. Ligni partem unam et quinque Alcoholis; — Sax. Ligni unam et decem Alcoholis; — HassP. ut tincturam Colombo; — *T.* Ligni uncias quatuor cum Alcoholis 25° B. libris duabus per octo dies digerere.

℞. Ligni Quassiae . unciam unam.
Alcoholis (20°) uncias quatuor.
Digere per dies quatuor in balneo aquae tepido, cola et residuo infunde
Alcoholis (20°) . . uncias duas.
Post duos dies cola et colaturas mixtas filtra. (An.)

℞. Rasurae Ligni Quassiae
uncias duas.
Corticis Aurantiorum unciam unam.

Cardamomi minoris semunciam.
Aquae Vitae . . . libras duas.
Post dies quatuor macerationis cola. (Gen.)

Quercus.

In den Pharmacopöen werden fünf Arten dieser Pflanzengattung angezeigt:

1) *Quercus alba*, *L.*; weiße Eiche; Chêne blanc (*Gal.*); White oak (*Ang.*) Am. *C.*

Ein Baum (Monoecia Polyandria, L.; Amentaceae, *J.*) der Vereinigten Staaten. (*Mich.* Arb. Amer. II. t. 1.)

Die Rinde, welche man anwendet, ist adstringirend

2) *Quercus tinctoria*, *L.*; Quercitronneneiche, Färbereiche; Chêne quercitron (*Gal.*); Black oak (*Ang.*).

Am *C. G.*

Ein Baum der Vereinigten Staaten. (*Mich.* Arb. Amer. II. t. 22.)

Man wendet die Rinde an, welche stark adstringirend ist.

3) *Quercus robur*, *L.*; Eiche; Chêne Rouvre (*Gal.*); Oak (*Ang.*); Uub (*B.*); Eeg (*D.*); Majup'hal (*Hin. Sa.*); Eik (*Bel.*); Querce, Quercia (*I.*); Kora debowa (*Lus*); Ek (*Suec.*).

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC Bor4. Br. D. DD. Du Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. WW. *Be. Br. C. Fi. G. M Par. Pid. Sp.* Z.

Ein großer Baum, welcher in ganz Europa wächst. (*Hayne* VI. 35. 36. *Blackw.* t. 487. *Plenck.* t. 670. Nouv. Duh. VII. 57. *Bert.* Bild. V. 68. fig 2.)

Man wendet die Rinde und die Früchte an.

Die Rinde der jungen Zweige (cortex Quercus s quercinus) ist glatt, außen aschgrau, inwendig roth. Sie hat einen eigenthümlichen Geruch und einen bittern und sehr adstringirenden Geschmack.

Die Früchte (Glandes s. Nuces Quercûs), Eicheln; Glands (*Gal.*); Zoladz (*Pol.*) sind eiförmig oder eirund, länglich, geruchlos und haben einen herben, bittern Geschmack. Ihre Becher (Cupulae s. Calyculi Glandium Quercûs) bestehen aus graulichen, dicht dachziegelförmig auf einander liegenden Schuppen

B. Ba. Bor. Bor4. Br. D. Fenn. Ham. Han. Hass. O. Pol. Sax. Suec. Wür. *Be. M.*

Quercus pedunculata, *Willd.*

Bn. Bor4. HassP. LonN.

4) *Quercus Ilex*, *L.*; Steineiche; Chêne Yeuse (*Gal.*).

His.

Ein Baum des südlichen Europa's und des nördlichen Africa's. (*Zorn* lc. pl. t. 618.)

Die Eicheln, welche man anwendet, sind bisweilen süß und eßbar, länglich und unten von Becherchen bekleidet, welche aus sehr kleinen, dicht dachziegelartig auf einander liegenden und filzigen Schuppen bestehen.

Die Eichenrinden, besonders die von der gemeinen Eiche, enthalten viel Gärbestoff mit einer extractivstoffigen Substanz. Sie besitzen eine sehr stark adstringirende Kraft, so daß man sie nicht in hoher Gabe anwenden kann, ohne die Verdauungswege zu reizen, ja ohne eine allgemeine Reaction zu bewirken. Man hat sie statt der China vorgeschlagen, allein sie hat als Fiebermittel, eine weit geringere Wirkung — Gabe des Pulvers, von einer Drachme bis zu einer Unze. Die Eicheln dienen, wenn sie süß sind, als Nahrungsmittel; die andern hat man, geröstet, als ein nützliches Reizmittel bei Drüsenkrankheiten, besonders Scropheln, empfohlen.

5) *Quercus Suber*, *L.*; Korkeiche; Liège (*Gal.*); Corktree (*Ang.*); Korketrae (*D.*); Alcorhoque (*His.*); Korkboom (*Bel.*); Savero (*I.*); Savereiro (*Lus.*); Korktraed (*Suec.*).

Gal. Suec. Wir *Be. G. M. Sp.*

Ein Baum des südlichen und westlichen Europa's. (*Blackw.* t. 193. *Plenck* t. 671. *Bert.* Bild. I. 66. fig. 1. Nouv. Duh. VII. 45.)

Man wendet die Rinde und die Frucht an.

Die Rinde (cortex Suberi s. Suber) ist biegsam, leicht, riffig, schwammig, elastisch und von röthlichgelber Farbe.

Nach Chevreul besitzt sie als vorzügliches Agens einen eigenthümlichen Stoff, Suberin (Suberina), Subérine (*Gal.*).

Ehedem wendete man sie innerlich als Adstringens an.

Die Eicheln haben im Allgemeinen einen süßen und angenehmen Geschmack.

Pulvis Quercus compositus, *Pulvis Corticis Quercus et Anthemidis nobilis.* (BorC. RC. *Au*)

℞. Corticis Quercus scrupulum unum.
Radicis Calami,
— Gentianae,
singularum grana quinque.
Fiat pulvis. (BorC. *Au.*)

℞. Corticis Quercus grana quinque.
— Aurantiorum,
Olibani, singulorum grana decem.
Fiat pulvis. (*Au.*)

℞. Pulveris Corticis Quercus,
— Florum Anthemidis nobilis,
singulorum scrupulum unum (RC.)

Cataplasma antisepticum s. cum Cinnamomo. (GalM. Li.)

℞. Pulveris Corticis Quercus,

Pulveris Salicis fragilis,
singulorum partem unam.
Aceti camphorati . partes sex.
Misce. (Li.)

℞. Farinae Hordei,
— secalitiae,
Corticis Quercus pulverati,
singulorum partes aequales.
Aquae . . . quantum sufficit.
Coque ad consistentiam requisitam. (GalM.) — Massae refrigeratae addendo Camphorae partem quinquagesimam vel vigesimam quintam habes *Cataplasma antisepticum s. c. Concinno et Camphora s. cum Camphora.* (GalM.)

Suppositorium roborans. (*Ca.*)

℞. Corticis Quercus,
Radicis Tormentillae,
singulorum partem unam.
Mellis . . . . . partes duas

Extractum Corticis Quercus. (BorC. Du. *Br.*)

℞. Corticis Quercus libram unam.
Aquae purae . . . libras octo.
Coquendo dimidia parte consumptâ cola exprimendo, et colaturam blando igne ad consistentiam pilularem consume. (Du.)

℞. Corticis Quercus partem unam.
Aquae . . . . . partes sex.
Coque per horas duas et per cribrum trajice; residuo cum nova Aqua cocto, liquores commixti sufficienter evaporent. (*Br.*)

℞. Corticis Quercus pulverati
libram unam
Aquae bullientis libras duodecim.
Digere, saepius agitando, per horas viginti quatuor, tunc liquorem leviter ad consumptionem tertiae partis usque consume; post refrigerationem filtra et in balneo aquae ad extracti consistentiam usque inspissa. (BorC.)

Tinctura Corticis Quercus. (A.)

℞. Corticis Quercus grossiuscule pulverati . . . . . uncias duas.
Alcoholis (0,910) . libram unam.
Digere ad sufficientem extractionem usque et filtra. — Adstringirend.

Decoctum Quercus s. Quercus Roboris s. Corticis Quercus. (B*. BorC. Ed. Lon. LonN. *Fi. T.*)

℞. Corticis Quercus unciam unam.
Aquae communis . octarios duos.
Decoque ad unius octarii remanentiam et cola. (B*. Lon. LonN.)

Ed. *Fi.* Corticis unciam unam, Aquae libras duas cum dimidia et reductionem ad unciarum sedecim (ad dimidium, *Fi.*) remanentiam; — BorC. Corticis uncias duas, Aquae uncias sedecim et decoctionem ad unciarum duodecim remanentiam; — *T.* Corticis uncias tres cum Aquae libris quatuor ad dimidii remanentiam decoquere.

Adstringirend, tonisch, fieberwidrig, bei Wechselfiebern empfohlen. — Gabe, alle drei Stunden eine Tasse.

Decoctum Corticis Suberi. (*Bo. Pie.*)

℞. Suberi raspati . scrupulos duos.
Aquae . . . . . octarios duos.
Decoque ad dimidii remanentiam. (*Pie.*)

Bo. addere jubet Syrupi Capilli Veneris uncias duas.

Gabe, acht Unzen, drei Mal täglich, acht oder zehen Tage lang. Man kann syrupus Nymphaeae zusetzen und die Wirkung durch ein Klystir von einer starken Abkochung der Korkeichenrinde oder von Petersilie, jeden Morgen gegeben, unterstützen.

Fomentatio cum Concinno s. Corticis Quercus. (GalM.)

℞. Corticis Quercus unciam unam.
Aquae . . . . quantum sufficit ut coquendo octarius unus colaturae obtineatur.

Injectio adstringens. (*Sw.*)

℞. Corticis vel Foliorum Quercus
unciam unam ad duas.
Aquae . . . . . sesquilibram.
Decoque ad librae unius colaturae remanentiam. — Zu Einspritzungen in die Harnröhre, drei oder vier Mal täglich, bei rebellischem chronischem Tripper. — Man kann diese Einspritzung auch mit einer halben Unze Gallapfelpulver bereiten.

Fomentatio adstringens, Fomentum quercinum. (*Au. Ra.*)

℞. Corticis Quercus . semunciam.
Aquae . . . . . libras tres.
Decoque ad dimidii remanentiam et adde
Florum Chamomillae unciam unam.
Post horam dimidiam infusionis colaturae adde
Aceti . . . . uncias quatuor.
Misce. (*Au.*)

℞. Summitatum Millefolii
unciam unam.
Radicis Caryophyllatae,
Corticis Quercus,
singulorum semunciam.
Aquae Calcariae
uncias viginti quatuor.
Decoque ad unciarum duodecim colaturam et adde
Alcoholis . . . . uncias tres.
Misce. (*Au.*)

℞. Radic. Quinquefolii majoris
unciam unam.
Corticis Quercus pulverati,
Rosarum rubrarum,
singulorum drachmas sex.
Aquae . . . . libram unam.
Post sufficientem coctionem cola. (*Ra.*)

Lac adstringens. (*Sa.*)

℞. Corticis Quercus,
— Granati,
Radicis Tormentillae,
singulorum drachmas duas.
Aquae fontanae,
Lactis vaccini,
singulorum libram unam.
Coque ad dimidii remanentiam, in fine addendo
Cinnamomi pulverati
drachmas duas.

Decoctum Corticis Quercus cum Alumine s. Quercus aluminosum, Fotus s. Fomentatio adstringens. (DD. RC. *Sa. Sw.*)

℞. Corticis Quercus . uncias duas.
Aquae purae uncias triginta sex
Coque ad unciarum octodecim liquidi remanentiam; cola fortiter exprimendo et adde
Aluminis crudi pulverati
drachmas tres.
Dissolve. (DD.)

RC. Corticis drachmam unam, Aquae fontanae libram unam, ad uncias octo decocto adde Aluminis drachmam unam, Syrupi simplicis semunciam. — Gabe, eine Unze drei oder vier Mal täglich, mehr oder weniger, seltener oder häufiger, je nach der Wirkung und den Umständen. Ohne Syrup, äußerlich in Bähung und Gurgelwasser.

℞. Corticis Quercus libram unam.
Balaustiorum . uncias quatuor.
Aquae fontanae . . libras sex.
Decoque ad dimidii remanentiam et colaturae adde
Aluminis . . . . drachmas sex.
Dissolve. (*Sa.*)

Sw. Corticis Quercus semilibram, Balaustiorum vel Corticis Granati uncias tres, Aquae libras sex, reductionem ad tres, et Aluminis drachmas sex.

Decoctum Corticis Quercus cum Aceto, Fotus antisepticus, Fomentatio antiseptica. (DD. Ful. Ham.)

℞. Corticis Quercus unciam unam.
Herbae Absinthii . uncias duas.
Aquae purae uncias triginta sex.
Coque ad unciarum viginti liquidi remanentiam; cola fortiter exprimendo et colaturae adde
Aceti . . . . uncias quatuor.
Misce bene. (DD.)

℞. Corticis Quercus . uncias duas.
Aceti . . . uncias triginta sex.
Coque, sub finem addendo
Herbae Rutae,
— Scordii,
singularum drachmas tres.
Salis Ammoniaci . . semunciam.
Cola. (Ful.)

Ham. Corticis Quercus unciam unam, Aceti libras duas, Rutae manipulum unum, Scordii tantidem et in colaturae sesquilibra solvere Salis Ammoniaci semunciam.

Gargarisma antisepticum. (RC.)

℞. Decocti Quercus aluminosi (RC.)
libram unam.
Aceti,
Tincturae Myrrhae,
singulorum unciam unam.
Misce. — Interdum loco aceti Acidi sulphurici vel muriatici guttae quindecim.

Cerevisia quercina s. adstringens. (*Sw. Vm.*)

℞. Glandium Quercus partem unam.
Cerevisiae fortis partes sedecim.
Infunde in balneo aquae tepido per plures dies et cola.

Emulsio adstringens. (*Bo.*)

℞. Glandium Quercus excorticatarum,
Amygdalarum dulcium,
singulorum no. 6.
Infusi Verbasci . . uncias sex.
Syrupi Hederae terrestris
unciam unam.

Bei Harnruhr empfohlen. — Abends bei Schlafengehen zu nehmen.

Opiatum adstringens. (*Bo.*)

℞. Conservae Cynorrhodon uncias sex.
Glandium Quercus pulveratarum
uncias tres.
Corallii rubri praeparati,
Catechu, singulorum sesquiunciam.
Cinnamomi . . drachmas tres.
Syrupi Rosarum rubrarum
quantum sufficit.

Bei Diarrhöe und chronischer Ruhr. — Gabe, eine Drachme alle vier Stunden.

Glandes s. Nuces Quercus s. quernae tostae. (Ba. HassP. L. Sax.)

℞. Glandium Quercus quantum vis.

Cupulis et cortice separatis concide nucleos in partes quatuor, sicca prope ignem cribro impositos et tunc in pelvi ferrea torre, agitando continue, donec frusta brunnea et fragilia reddita sint; post refrigerationem molae ope in pulverem redige.

Infusum Glandium Quercus tostarum. (B*. *Fi.*)

℞. Glandium Quercus tostarum semunciam.
Aquae bullientis uncias sex ad octo

Infunde et cola. — Bitter, bei Gekröseverstopfungen und Atrophie gepriesen. — Man kann den Aufguß angenehmer machen, wenn man eine Drachme Chocolate zusetzt.

Coffea Glandium. (*Au.*)

℞. Glandium Quercus tostarum drachmas sex.
Coffeae ustae . drachmas duas.
Aquae sufficientem quantitatem.

Post brevem ebullitionem cola. — Dieser Trank mit Milch und Zucker gemischt, wird bei Scropheln und Rhachitis für nützlich gehalten. — Gabe, zwei oder drei Tassen täglich.

R.

Radix Lopeziana.

Racine de Jean Lopez (*Gal.*)

Ams. An. B. Bel. Br. Fer. Ful. Gal. Wir. *A. M. Sp.*

Diese Wurzel kommt in sehr großen holzigen Stücken vor, deren Holz gelblichweiß, derb, geadert, geruchlos und sehr bitter ist. Die Rinde besteht aus einer innern röthlichen, bitter und styptisch schmeckenden und einer äußern körnigen, pulverartigen, hellgelben Schicht, welche letztere wahrscheinlich von irgend einem Cryptogam herrührt.

Man kennt die Pflanze, von welcher diese Wurzel kommt, nicht genau. Sie wird aus Africa gebracht. Manche halten Morus indica dafür. Fer. leitet sie, aus einem sonderbaren Irrthum, von Lopezia racemosa, *Cav.*, aus Mexico ab.

Reizend, tonisch, bei chronischer Diarrhöe angewendet.

Gabe des Pulvers, sechs bis zwanzig Gran, drei oder vier Mal täglich.

Syrupus adstringens. (*Sm.*)

℞. Radicis Lopezianae minutim concisae . . . . unciam unam.
Aquae bullientis sesquioctarium.

Digere inter cineres calidos per horas quadraginta octo, coque deinde blando igne ad remanentiam liquoris octarii (chopine) unius, in quo colato solve

Sacchari albi . . libram unam.

Semel vel bis ebulliant. — Gabe, täglich wenigstens sechs Löffel.

Electuarium adstringens. (*Sm.*)

℞. Radicis Lopezianae drachmas duas.
Conservae Rosarum rubrarum,
— Cynorrhodon,
singularum uncias duas.
Syrupi Gummi quantum sufficit.

Gabe, ein Kaffeelöffel zwei oder drei Mal täglich.

Tinctura adstringens. (*Sm.*)

℞. Radicis Lopezianae sesquidrachmam.
Alcoholis uncias duas cum dimidia.

Post sufficientem digestionem filtra. — Gabe, ein Kaffeelöffel täglich drei Mal in einem passenden Vehikel.

Ranunculus.

In den Pharmacopöen werden mehrere Arten dieser Pflanzengattung angeführt:

1) *Ranunculus acris, L.*; scharfer Hahnenfuß; Renoncule âcre (*Gal.*); Upricht crawfoot (*Bel.*).

Br. Gal. His. *G. M. Sp.*

4 (Polyandria Polygynia, L.; Ranunculaceae, J.) Eine in ganz Europa sehr gemeine Pflanze. (*Orfila* méd. lég. t. 3. *Bull.* t. 109. *Plenck* t. 458. Fl. méd. VI. 294.)

Man wendet das Kraut und die Blüthen an.

Das Kraut (herba Ranunculi s. Ranunculi acris s. pratensis) besteht aus zweierlei Blättern, von denen die untern in drei vielspaltige Lappen getheilt, die obern linienförmig sind.

Die Blüthen sind gelb.

2) *Ranunculus aquatilis, L.*; Wasserhahnenfuß, Wasserhähnlein; Renoncule aquatique (*Gal.*).

His.

4 Eine Europäische Pflanze. (*Oed.* Fl. Dan. t. 376)

Man wendet das Kraut und die Blüthen an.

Das Kraut besteht aus theils in haardünne Läppchen getheilten, theils ganzen und schildförmigen Blättern. Es hat einen scharfen Geschmack.

Die Blüthen sind weiß.

3) *Ranunculus bulbosus, L.*; knolliger Hahnenfuß; Renoncule bulbeuse (*Gal.*); Bulbous crawfoot (*Ang.*); Knollwartige Ranonkel (*Bel.*); Solvifrar (*Suec.*).

Gal. *G. M.*

4 Eine in Europa gemeine Pflanze. (*Bull.* t. 27. *Plenck* t. 457. *Bigel.* Am. med. Bot. III. 1. t. 47. *Oed.* Fl. Dan. t. 351.)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an.

Die Wurzel (bulbi Ranunculi bulbosi) ist einfach, rundlich, knollig, weiß.

Das Kraut besteht aus einem aufrechten Stängel und zusammengesetzten Blättern.

Die ganze Pflanze hat eine außerordentliche Schärfe.

4) *Ranunculus sceleratus*, *L.*; giftiger Hahnenfuß, Froscheppich. Feigblatterneppich; Renoncule des marais (*Gal.*); Marsh crowfoot, Sharp hanewood (*Ang.*); Puggepeber (*D*); Ranonculo mulvado (*His.*); Water haanevoet (*bel.*).

Gal. *C. G. M.*

☉ Eine in Europa an sumpfigen Orten gemeine Pflanze. (*Blackw.* Herb. t. 259. *Plenck* t. 456. *Bull.* t. 47. *Lert.* Bild. IV. 7. fig. 1.)

Man wendet das Kraut (herba Ranunculi palustris s. aquatici) an; es besteht aus einem glatten, hohlen und sehr ästigen Stängel und theils gestielten, rundlichen, glatten, zur Hälfte in drei eingeschnittene oder gekerbte Lappen gespaltenen, unbehaarten, blaßgrünen, theils in längere, schmälere, linienförmige, gefingerte oder handförmige Lappen gespaltenen Blättern.

Eins der heftigsten reizenden und scharfen Gifte. Einige Schriftsteller halten diese Pflanze für die herba Sardoa des Gallust, durch deren Gebrauch das sardonische Lachen entsteht.

5) *Ranunculus Flammula*, *L.*; kleiner Sumpfhahnenfuß; Petite Douve (*Gal.*); Lisser spearwort (*Ang.*); Liden guul hanefod (*D.*); Kleen egelkolen (*Bel.*); Aelt graes (*Suec.*).

Gal. *G. M.*

♃ Eine Pflanze, welche in ganz Europa wächst. (*Bull.* t. 15. *Plenck* t. 459. *Zorn* Ic. pl. t. 326.)

Man wendet das Kraut (herba Flammulae) an; es besteht aus einem glatten Stängel mit ganzen und ganzrandigen, eirundlanzettförmigen, gestielten Blättern. Es besitzt einen außerordentlich scharfen und brennenden Geschmack.

Reizend; die schwedischen Landleute wendeten es als Pulspflaster gegen Wechselfieber an.

* Raphanus.

In den Pharmacopöen werden zwei Pflanzen dieses Namens angeführt:

1) *Raphanus sativus*, *L.*; Rettig, Ratich, Reddik; Raifort cultivé, Radis noir (*Gal.*); Radish (*Ang.*); Reddiske (*D.*); Rabano (*His.*); Tamme radys (*Bel.*); Rafano (*I.*); Rabao (*Lus.*); Raettika (*Suec.*).

Ams. Br. D. Fer. Gal. His. Pal. Wir. Würr. *Be. G. M. Pid. Sp.*

☉ et ♃ (Tetradynamia Siliquosa, L.; Cruciferae, *J.*) Eine Pflanze, welche ursprünglich in China einheimisch seyn soll, aber überall gebaut wird. (*Lam.* Ill. t. 566. *Blackw.* t. 81. *Plenck.* t. 518. Fl. méd. VI. 292.)

Die Wurzel (radix Raphani nigri s. hortensis) ist dick, kreisrund, außen schwarz, inwendig weiß, ihr Fleisch ist fest und saftig. Sie hat einen starken, eigenthümlichen Geruch und einen sehr scharfen, besonders in der Schaale deutlichen Geschmack.

Die Radischen und Rüben sind Varietäten dieser Art und durch die Cultur entstanden.

2) *Cochlearia Armoracia*, *L.*; Meerrettig, Meerrettigscharbockheil, Kreen, Krän; Raifort sauvage, Cran (*Gal.*); Broad horse radish (*Ang*); Kren (*B.*); Peberrod (*D.*); Rabano, Marvisro (*His.*); Meerradys (*Bel.*); Armoraccio, Peperello bobrasso, Barba forte, Cren (*I.*); Chrzan (*Pol.*); Rabao rusticano (*Lus.*); Chren (*R.*); Pepparrot (*Suec.*).

A. Am. Ams. An. B. Bi. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. His. Li. Lon. Lon N. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Würr. *Be. C. Fi. G. M. Par. Sa. Sp.* Z.

♃ (Tetradynamia Siliquosa, L.; Cruciferae. *J.*) Eine in verschiedenen Gegenden Europa's wachsende Pflanze. (*Blackw.* t. 415. *Schk.* t. 181. *Plenck* t. 513. *Hayne* V. t. 29. Dict. s. off. Pfl. XIII. t. 21. *Zorn* Ic. pl. t. 457.)

Die Wurzel (radix Armoraciae s. Raphani rusticani s. rustici s. marini) ist gestreckt, walzenförmig, dick, außen gelb, innen weiß und faserig. Sie hat einen sehr durchdringenden Geruch und einen scharfen, beißenden, bittern Geschmack.

Sie enthält Satzmehl und ein flüchtiges Oel, dessen vorzüglicher Bestandtheil der Schwefel zu seyn scheint.

Kräftig reizend, magenstärkend, antiscorbutisch. — Gabe des Saftes, eine halbe Drachme in Milch oder Wein.

Pediluvium ex Armoracia s. irritans. (*Au.*)

℞. Aquae fervidae libras quatuor.
Radicis Armoraciae tritae
uncias duas ad quatuor.

Schlegel empfiehlt es zur Wiederherstellung des unterdrückten Fußschweißes.

Species contra scorbutum s. antiscorbuticae. (*Pal.*)

℞. Herbae Cochleariae,
— Nasturtii aquatici,
— Beccabungae,
— Marrubii albi,
— Fumariae,
— Trifolii,
singularum semunciam.

Radicis Armoraciae semilibram.
— Polypodii,
— Sarsaparillae,
singularum uncias tres.
Seminum Anisi . drachmas sex.
Concisa et contusa misce.

Succus Armoraciae compositus s. diureticus. (B*. Suec.)

℞. Succi Armoraciae uncias quatuor.
Oxymellis scillitici unciam unam.
Misce. (B*.)

℞. Succi Armoraciae unciam unam.
Spiritus Frumenti . uncias sex.
Aceti . . . . uncias duas.
Misce. (Suec.)
Gabe, zwei Löffel.

Potio ad catarrhum s. anticatarrhalis. (*Pie. Sm.*)

℞. Succi Raparum coctarum expressi,
Aquae communis,
singulorum uncias octo.
Mellis albi . . uncias duas.
Den Tag über, Kaffeetassenweise.

Mel Armoraciae. (B*. Suec. *Vm.*)

℞. Succi Armoraciae . uncias tres.
Mellis albi . . . libram unam.
Misce frigide. (Suec.)

Vm. Succi partem unam et quatuor Mellis; — B* secundum dispensatorium pauperum Pragense, Succi partem unam et duas Mellis, leni igne ad aptam consistentiam inspissanda.

Aqua Armoraciae. (GalH. *Fi. T.*)

℞. Radicis Armoraciae recentis
partem unam.
Aquae puræ . partes quinque.
Destillent partes duae.

Aqua diuretica. (Sar. *Ca. Pie.*)

℞. Radicis Armoraciae,
— Petroselini,
— Saxifragae,
singularum libram unam.
Baccarum Juniperi . uncias sex.
Succi Limonum,
Aquae Ononidis,
singulorum libras tres.
Post horas viginti quatuor macerationis destillent in balneo aquae. (Sar.)

℞. Succi Porri,
— Ceparum,
— Armoraciae,
singulorum libras duas.
— Parietariae,
— Citri,
singulorum semilibram.
Post trium dierum digestionem destillent lente. (*Ca. Pie.*)
Gabe, eine Unze Morgens und Abends.

Spiritus Raphani rusticani s. Armoraciae. (Hass. Sar.)

℞. Radicis Armoraciae recentis,
Succi Armoraciae,
Aquae communis,
singulorum libras sex.
Alcoholis . . . . libras duas.
Destillet dimidia pars; producto adde
Radicis Armoraciae recentis
libras tres.
Destillent in balneo aquae. (Sar.)

℞. Radicis Armoraciae,
Aquae communis,
singularum partes sex.
Alcoholis . . . partes quatuor.
Destillent partes duae. (Hass.)

Spiritus Armoraciae compositus. (B*. Ful. Lon. LonN.)

℞. Radicis Armoraciae libras tres.
Alcoholis . . . libras quatuor.
Destillent librae quatuor in balneo aquae; adde
Aquae Piperis Jamaicensis
libras octo.
Misce bene. (Ful.)

℞. Radicis Armoraciae,
Corticis sicci Aurantiorum,
singulorum libram unam.
Nucis moschatae . semunciam.
Aquae Vitae . . octarios octo.
— communis quantum sufficit ad prohibendum empyreuma. Maceratis per horas viginti quatuor destillent lente octarii octo. (B*. Lon. LonN.)
Löffelweise zu nehmen.

Tisana ad scorbutum s. antiscorbutica. (*ParC*)

℞. Spiritus Armoraciae compositi
unciam unam.
Infusi Cichorii octarium unum.
Misce.

Cerevisia Armoraciae s. antiscorbutica. (*Ca. Huf. Vm.*)

℞. Armoraciae . . uncias quinque.
Cerevisiae . . . . libras duas.
Infunde per horas viginti quatuor et colaturae adde
Syrupi Sacchari unciam unam.
Misce bene. (*Huf.*)

℞. Cerevisiae recentis
octarios sedecim.
Immerge, inter fermentandum, saccum linteum continentem
Betonicae,
Salviae,
Agrimoniae,
Cochleariae,
Absinthii pontici,
singulorum manipulum unum.
Radicis Inulae,

Radicis Armoraciae,
singularum uncias quatuor.
Post duos vel tres dies cola. (*Ca.*)

℞. Fructus Aurantiorum . . no. 3.
Succum expressum infunde in
Cerevisiae fortis
partes sexaginta quatuor.
In mixtura frigide macera
Foliorum recentium Cochleariae,
— — Nasturtii,
— — Salviae,
singulorum partem unam.
Seminum Sinapis,
Radicis Armoraciae,
singulorum partem dimidiam.
Post aliquot dies cola leviter exprimendo. (*Vm.*)

Gabe, zwei oder drei Gläser täglich, bei Scorbut und Nieren-, Blasen- und Leber-krankheiten.

Cerevisia antiscorbutica s. Turionum Pini. (RC. *Ca.*)

℞. Cerevisiae . . . libras quatuor.
Radicis Armoraciae uncias duas.
Foliorum Cochleariae
sesquiunciam.
Turionum Pini . unciam unam.
Post sufficientem infusionem exprime.

Gabe, zwei bis vier Unzen täglich. (*Ca.*)

℞. Radicis Armoraciae,
Seminum Sinapis nigrae contusorum,
Extracti Turionum Pini,
singulorum libras duas.
Syrupi Molassis libras quatuor.
Cerevisiae tenuis, vel
Infusi Malti Hordei, vel
Decocti ejusdem libras centum et viginti.
Digere leniter per dies quatuor vel sex ut fiat fermentatio et cola. — Gabe, ein halbes bis ein Pfund täglich, bei Scorbut und Lähmung; bisweilen läßt man kalt ein Pfund kohlensaures Kali darin einweichen, wodurch es besonders harntreibend und bei Wassersucht nützlich wird. (RC.)

Acetum Cochleariae Armoraciae. (*Sw.*)

℞. Radicis Armoraciae unciam unam.
Aceti . . . . . libram unam.
Post septem dies macerationis filtra.

— Besonders als Schönheitsmittel gegen Sommersprossen, auch gegen scorbutische Mundgeschwüre.

Aqua emetica. (*Pie.*)

℞. Juglandium viridium,
Radicis Armoraciae,
singulorum libras duas.
Aceti . . . . . libras tres.
Digere leni calore per dies quinque vel sex et deinde cola. — Gabe, eine halbe bis drei Unzen.

Tinctura Raphani composita. (B*. GalM.)

℞. Radicis recentis Raphani
uncias duas.
Corticis sicci Aurantiorum
unciam unam.
Spiritus Cochleariae libras quatuor.
Digere per dies aliquot et cola exprimendo. — Reizend, bei Scorbut empfohlen. — Gabe, ein Löffel.

Gargarisma antiscorbuticum. (*Ra.*)

℞. Infusi amari . . . uncias sex.
Tincturae Raphani semunciam.
Mellis Rosarum . uncias duas.

Vinum Armoraciae. (Suec.)

℞. Radicis Armoraciae semilibram.
Vini albi . . . . libras octo.
Digere per dies quatuor et cola. — Reizend, gegen Scorbut.

Vinum Cochleariae compositum. (B*. GalM. *Sw.*)

℞. Radicis Armoraciae unciam unam.
Cinnamomi,
Seminum Sinapis nigrae,
singulorum sesquiunciam.
Vini albi libras duas cum dimidia.
Macera per tres dies, vas saepius agitando, tunc liquidi partem limpidam decantha. (*Sw.*)

℞. Tincturae Armoraciae compositae
unciam unam.
Vini albi octarium (litre) unum.
Misce. (B*. GalM.)

Reizend; bei Scorbut, Unordnungen in den Verdauungsfunctionen von Schwäche des Magens und Lähmung empfohlen — Gabe, fünf bis sechs Eßlöffel zwei Mal täglich. Nöthigenfalls kann man ihn in Wasser geben.

Vinum antiscorbuticum. (Gal. Sar. *Sp. Vm.*)

℞. Radicis Armoraciae partes tres.
Seminum Sinapis
partem unam cum dimidia.
Herbae Nasturtii aquatici,
— Cochleariae,
— Beccabungae,
singularum partem unam.
Spiritus Cochleariae
partem unam cum dimidia.
Vini Rhenani partes nonaginta sex.
Infunde per dies septem, exprime leviter et filtra. (*Vm.*)

℞. Radicis Armoraciae recentis
unciam unam.
Foliorum recentium Cochleariae,
— — Nasturtii aquatici,
— — Trifolii,
Seminum Sinapis,
singulorum semunciam.

Salis Ammoniaci drachmas duas.
Vini albi . . . . libras duas.
Digere per horas triginta sex, subinde agitando; cola paullo exprimendo et adde colaturae
Alcoholis Cochleariae semunciam.
Misce. (Gal.)

℞. Radicis recentis Armoraciae uncias duodecim.
— — Bardanae uncias quinque.
Foliorum recentium Cochleariae,
— — Nasturtii,
— — Beccabungae,
— — Fumariae,
Seminum Sinapis, singulorum uncias sex.
Salis Ammoniaci . uncias tres.
Vini albi uncias trecentas octoginta.
Post septem dies infusionis exprime fortiter et filtra. (*Sp.*)

℞. Radicis recentis Armoraciae uncias quatuor.
Foliorum recentium Cochleariae,
— — Trifolii, singulorum manipulos duos.
— — Salviae manipulum unum.
Vini albi . . . . . libras sex.
Digere, blando calore, per horas viginti quatuor et cola. (*Sa.*)
Gabe, ein Liförglas voll und mehr.

Vinum diureticum. (*Sa.*)

℞. Radicis Armoraciae,
— Iridis Florentinae, singularum uncias sex.
Vini albi . . quantum sufficit ut post semihoram infusionis colaturae librae duae obtineantur, quibus adde
Syrupi Foeniculi,
— Juniperi, singulorum uncias duas.

Syrupus antiscorbuticus s. antiscorbuticus compositus s. Cochleariae officinalis compositus s. de Armoracia compositus. (An. Bel. Gal. *Sp. Sw. Vm.*)

℞. Cinnamomi contusi partem unam.
Foliorum recentium contusorum Cochleariae,
— — — Beccabungae,
— — — Nasturtii, singulorum partes triginta.
Seminum Sinapis contusorum partes triginta quinque.
Radicis recentis Armoraciae partes quadraginta quinque.
Succi Aurantiorum partes nonaginta.
Vini rubri partes ducentas sexaginta.

Infunde, blando calore, per horas viginti quatuor; post refrigerationem cola exprimendo; in colatura blandi caloris ope solve
Sacchari albi partes quadringentas octoginta.
Cola syrupum per pannum. (*Vm.*)

℞. Foliorum recentium concisorum Cochleariae,
— — — Trifolii,
— — — Nasturtii,
Radicis Armoraciae,
Pomorum Aurantiorum amarorum concisorum . . libram unam.
Cinnamomi contusi sesquiunciam.
Vini albi generosi libras quatuor.
Macera per duos dies in cucurbita stannea, galeâ suâ tectâ et bene lutatâ. Destillet deinde in balneo aquae liquoris libra una, cum quo et
Sacchari albi . . libris duabus in balneo aquae, vase tecto, syrupum para. Quod in cucurbita remanet, cola absque expressione; liquorem post subsidentiam decantha et coque ad syrupi consistentiam cum
Sacchari albi . . libris duabus.
Clarifica et nonnisi tepidum cum praecedente commisce. (Gal.)

℞. Herbae recentis Cochleariae,
— — Lepidii,
— — Nasturtii, singularum libras quinque.
Radicis Armoraciae libras decem.
Cinnamomi pulverati uncias sex.
Pomorum Aurantiorum amarorum cum cortice concisorum libram unam.
Alcoholis (20°) . . libras duas.
Aquae destillatae . libras octo.
In alembicum immissis, destillent lente liquoris librae quinque, cum quibus et
Sacchari albi . . libris decem fiat in balneo aquae syrupus. Exprime fortiter, quod in cucurbita remanet. Liquori prodeunti adde
Sacchari albi . . libras decem.
Clarifica, coque lente ad syrupi consistentiam et post refrigerationem syrupum cum praecedente commisce. (An. Bel.)

Sw. loco mixturae alcoholis et aquae Vini albi libras decem praescribit et liquori expresso residui addere jubet Aquae libras decem et viginti Sacchari, ut syrupus secundus obtineatur.

℞. Succi non depurati Cochleariae,
— — — Beccabungae,
— — — Nasturtii,
— — — Radicis Armoraciae, singulorum uncias duodecim.

Succi non depurati Pomorum Aurantiorum amarorum uncias viginti.
Corticum recentium Fructuum Aurantiorum amarorum unciam unam.
Digere frigide in vase tecto, subinde agitando, per horas circiter duodecim, filtra et liquori adde
Sacchari albi . . . . duplum.
Post solutionem adde denuo
Spiritus Cochleariae,
Aquae Cinnamomi,
singulorum unciam unam.
Post subsidentiam decantha. (*Sp.*)

Syrupus purificans amarus. (*Ca.*)

℞. Vini albi . . . libras sedecim.
Foliorum Cochleariae libras tres.
— Trifolii,
Radicis recentis Armoraciae,
singulorum libras duas.
— — Gentianae,
libram unam.
Macera per dies aliquot; tunc recipe
Hujus Vini . . . libram unam.
Sacchari
libram et uncias duodecim.
Liqua blando igne, adde hujus syrupi singulis libris alius syrupi cum Spiritu Cochleariae parati unciam unam.

Infusum Armoraciae. (RC.)

℞. Armoraciae . . unciam unam.
Aquae bullientis . libram unam.
Post horam unam infusionis cola.

Infusum Armoraciae s. Armoraciae compositum s. Seminum Sinapis s. Raphani. (Am. B*. Gen. Lon. LonN. Wür. *C.*)

℞. Radicis Armoraciae,
Seminum Sinapis,
singulorum unciam unam.
Aquae bullientis octarium unum.
Macera per duas horas in vase leviter tecto et adde
Spiritus Cochleariae compositi unciam unam.
Misce bene. (B*. Lon. LonN.)
Am. et *C.* eandem formulam sed spiritum cochleariae omittentes.

℞. Radicis Armoraciae,
Seminum Sinapis,
Conservae Cochleariae,
singulorum unciam unam.
Aquae bullientis . libras duas.
Infunde per horas viginti quatuor in vase tecto et cola. (B*. Wür.)

℞. Radicis Armoraciae,
Seminum Sinapis,
singulorum unciam unam.
Canellae albae . drachmas tres.
Aquae bullientis . sesquilibram.
Infunde per duas horas et colaturae adde
Aquae Anisi . . . uncias duas.
Misce. (Gen.)
Reizend, bei Scorbut, Lähmung, Wassersuchten und Wechselfiebern empfohlen. — Gabe, eine bis drei Unzen.

Syrupus Armoraciae s. Raphani rusticani. (B*. Ful. Li. Suec. Wir. *Fi.*)

℞. Succi Armoraciae recenter expressi quantum vis.
Sacchari albi . quantum sufficit ut fiat syrupus. (Suec.)
Ful. et Li. Succi et Sacchari, singulorum partes aequales.

℞. Radicis Raphani sativi rasae,
Aquae, singularum partes aequales.
Contere bene, exprime succum et partibus novem hujus adde
Sacchari albi . . partes septem.
Liqua in vase clauso. (*Vm.*)
Cullen infuso e drachma una Radicis Armoraciae rasae in Aquae fervidae unciis duabus colaturae addere jubebat Sacchari duplum. (B*.); — *Fi.* Armoraciae uncias duas cum Aquae bullientis octo per horas quatuor infundere et addere Sacchari albi libram unam.
Gabe, von einer bis zu drei Drachmen.

Infusum paralyticum s. ad paralysin. (*Sa. Sw.*)

℞. Radicis Armoraciae,
Seminum Sinapis,
singulorum sesquiunciam.
Aquae bullientis . libras duas.
Macera per horas duas et colaturae adde
Alcoholis . . . . uncias duas.
Misce. — Reizend, bei Lähmung gepriesen. — Gabe, vier Unzen zwei Mal täglich.

Infusum antihydropicum s. ad hydropicos. (*Sa. Sw.*)

℞. Infusi amari,
— ad paralysin,
singulorum libram unam.
Misce. — Gabe, vier Unzen täglich zwei Mal.

Decoctum s. Apozema antiscorbuticum. (Gal. *Bo. Ca. Sp.*)

℞. Radicis Armoraciae uncias duas.
Aquae . . . uncias octoginta.
Coque per horae quadrantem et adde
Herbae Beccabungae,
— Nasturtii,
— Cochleariae,
— Acetosae
singularum manipulos duos.
Coque parumper, cola et adde

Aceti . . . . uncias quatuor.
Misce bene. (*Sp.*)
℞. Radicis Raphani,
— Parellae,
— Trifolii,
singularum semunciam.
Nasturtii aquatici,
Cochleariae,
Beccabungae,
singulorum pugillum unum.
Aquae . . . quantum sufficit ut decocti vitra tria obtineantur. Colaturae adde
Syrupi antiscorbutici Portali absque Sublimato unciam unam.
Misce. (*Bo.*)
℞. Radicis Patientiae,
— Bardanae,
singularum unciam unam.
Aquae . . . . libras quatuor.
Coque per viginti sexagesimas et adde
Radicis Armoraciae unciam unam.
Foliorum Cochleariae,
— Trifolii,
— Nasturtii,
singulorum drachmas sex.
Post sexagesimas decem infusionis cola. (Gal. *Ca.*)

Bei hartnäckigen Flechten, Scorbut und Krankheiten, welche im lymphatischen System ihren Siz haben, empfohlen. — Gabe, täglich mehrere Gläser.

Apozema diureticum. (*Pic. Sm.*)
℞. Radicis Armoraciae
drachmas duas ad quatuor.
Baccarum Juniperi contusorum
pugillum dimidium.
Marrubii albi pugillum magnum.
Aquae bullientis vitra tria magna.
Stent in infusione inter cineres calidos per horam et post refrigerationem colentur.

Auf drei Mal, Morgens nüchtern; zu jeder Gabe seze man einen Eßlöffel einer Mischung von vier Unzen Syrupus scilliticus mit vier Unzen Syrupus Polygalae Virginicae cum Vino albo paratus.

Ratanhia.

Krameria triandra, Ruiz et Puv, dreimännige Kramerie; Ratanhia (*Gal.*); Raiz para los dientes (*His.*).

B. Bel. Bor4. Fer. Gal. Han. HassP. His. Sax. *C. Fi. Par.*

♃ (Tetrandria Monogynia, L.; Polygaleae, *J.*) Eine Südamericanische Pflanze. (Fl. Peruv. t. I. p. 61. Ic. 93. 94. Berl. Jahrb. XI. t. 1. *Hayne* VIII. t. 13.)

Man wendet die Wurzel (radix Ratanhiae s. Rathaniae s. Ratanhae) an; sie ist holzig, hart und rundlich und besteht aus einer dicken Rinde mit etwas unregelmäßiger Oberfläche, von schwärzlichrother Farbe und bitterem adstringirendem Geschmack und einem sehr derben, weißlichen oder schwach gelblichen, geruch- und geschmacklosen Holze.

Peschier hat eine eigenthümliche Säure (Acidum kramericum) darin entdeckt.

Bor4. HassP. haben das Extractum Ratanhae venale.

Sie darf nicht mit Gallerte, Eisensalzen und Mineralsäuren verbunden werden.

Ein sehr kräftig adstringirendes Mittel, welches bei alten Schleimflüssen und sogenannten passiven Blutflüssen häufig gebraucht wird.

Extractum Ratanhiae. (B*. Bor4. Fer. Gal. HassP. His. Sax. *Fi. T. Vm.*)
℞. Corticis Ratanhiae partem unam.
Aquae purae . . . partes octo.
Macera per horas viginti quatuor, tunc coque per horae quadrantem et cola fortiter exprimendo; residuum coquatur cum Aquae partibus quatuor, liquores commixti post horas viginti quatuor sepositionis ad aptam consistentiam evaporent. (B*. Fer. Sax.)

Bor4. Ratanhiae libram unam cum Aquae sedecim et residuum cum eadem Aquae quantitate utrumque ad dimidium decoquere, decoctionem quoties opus fuerit, repetere et liquores commixtos, subsidendo et decanthando depuratos ad librarum quatuor remanentiam et balneo vaporis ope ad extracti absinthii spissitudinem consumere; — HassP. ut extractum Colombo, Ligni campechiensis etc.
℞. Corticis Ratanhiae pulverati
libram unam.
Aquae . . . libras duodecim.
Infunde per dies duos in balneo aquae vel levis caloris ope, saepius agitando; infusionem repete cum nova Aqua, donec nullum amplius accipiat saporem; liquores commixti et filtrati primum ignis ope, deinde in balneo aquae ad siccum evaporent. (His)

Fi. Ratanhiae uncias quatuor cum Aquae communis libris quatuor calide per horas tres infundere, fortiter exprimendo colare, decanthare liquidum et cum albumine clarificatum in balneo aquae ad extracti consistentiam consumere.
℞. Corticis Ratanhiae pulverati
quantum vis.
Abunde cum Aqua humectatum macera per horas viginti quatuor, adde deinde Aquae frigidae pondus massae

toti aequale, coque per sexagesimas quindecim vel viginti, liquorem bullientem per pannum laneum (Planell) cola, residuo infunde Aquae bullientis pondus duplum, coque denue per horae quadrantem. cola et colaturas mixtas, postquam per momentum subsederunt, decantha et continue coquendo consume. (*Vm.*)

℞. Tincturae Ratanhiae alcoholicae bene saturatae . quantum vis.

Destillet quarta pars in balneo aquae, residuum leni calore ad extracti sicci consistentiam evaporet. (Gal.)

Gabe, zwanzig Gran bis eine halbe Unze.

T. Extractum siccum cum Radice et Alcohole diluto solo vel etiam cum Aqua et deinde cum Alcohole parare jubet. — Radicis libras tres cum Aquae sufficiente quantitate decoquere novam Aquam addendo pro evaporata etc. et inspissare balnei vaporis vel solis ope ad siccum.

Decoctum Radicis Ratanhiae. (B*.Fer.*Fi.*)

℞. Radicis Ratanhiae . semunciam.
Aquae fontanae . . libras duas.

Coquendo ad colaturae semilibrae remanentiam consume. (B*.)

Fer. *Fi.* eandem formulam sed colaturae addere jubent Aceti drachmas duas et quatuor Sacchari.

Adstringirend. — Gabe, von einem Löffel bis zu einem halben Glase.

Tinctura Ratanhiae aquosa. (Fer.)

℞. Extracti sicci Ratanhiae drachmas quinque.
Herbae Lepidii uncias quatuor cum dimidia.
Aquae . . . . uncias novem.

Macera per dies tres et cola.

Tinctura Ratanhiae acetosa s. cum Aceto. (Fer.)

℞. Extracti sicci Ratanhiae drachmam unam.
Sulphatis Sodae unciam unam.
Aquae . . . . . uncias sex.
Solutioni adde
Aceti . . . drachmam unam.

Tinctura Ratanhiae, Alcohol cum Ratanhia acetatus. (B*.Fer.HassP.*Fi.T.Vm.*)

℞. Corticis Radicis Ratanhiae pulverati . . . . . uncias tres.
Alcoholis . . . . libras duas.

Post septem dies digestionis, blando calore, cola. (B*.)

Vm. Ratanhiae partem unam et sex Aquae Vitae; — HassP. Spiritum Vini rectificatum, caeterum ut *Vm.*

℞. Extracti Ratanhiae drachmas quatuor.
Alcoholis (24°) uncias quatuor.
Aceti destillati . . uncias octo.

Digere per tres dies et filtra. (Fer. *Fi. T.*)

Adstringirend. — Gabe, dreißig bis achtzig Tropfen.

Tinctura Ratanhiae composita. (B*.Fer.)

℞. Radicis Ratanhiae pulveratae uncias tres.
Corticis Aurantiorum uncias duas.
Serpentariae Virginicae semunciam.
Croci . . . drachmam unam.
Alcoholis . . . . libras duas.

Digere per dies duodecim et cola. — Adstringirend. — Gabe, sechzig bis achtzig Tropfen.

Tinctura Ratanhiae saccharata. (Bor4.)

℞. Radicis Ratanhiae uncias quatuor.
Sacchari tosti . . uncias duas.
Aquae destillatae uncias quatuor.
Spiritus Vini Gallici uncias sedecim.

Digere per aliquot dies, exprime et filtra.

Gargarisma adstringens. (Fer.)

℞. Extracti Ratanhiae drachmas quatuor.
Aquae . . . . uncias viginti.
Solutioni adde
Aceti . . . . . uncias quatuor.

Unguentum adstringens. (Fer.)

℞. Extracti Ratanhiae,
Olibani,
singulorum uncias quatuor.
Galbani . . . . uncias duas.
Unguenti defensivi rubri uncias sex.
Terebinthinae uncias duas cum dimidia.
Olei Olivarum . . uncias duas.

Auf Brüche anzuwenden.

Pilulae adstringentes. (Fer.)

℞. Extracti Ratanhiae drachmam unam.
Aquae . . . quantum sufficit ad molle reddendum. Fiant pilulae decem ad duodecim.

Electuarium adstringens. (Fer.)

℞. Pulveris Ratanhiae unciam unam.
— Zingiberis drachmam unam.
Syrupi Corticis Aurantiorum quantum sufficit.

Gabe, ein Kaffeelöffel voll, bei Fiebern und Anfällen von Epilepsie.

Boli adstringentes. (*Ca.*)

℞. Pulveris Extracti Ratanhiae sesquiscrupulum.

Pulveris Alumînis grana decem.
Conservae Cynorrhodi drachmam unam.
Syrupi adstringentis quantum sufficit.
Fiant boli viginti. — Gabe, zwei Stück alle drei oder vier Stunden.

Potio adstringens. (Fer. *B. Ca. Ra.*)

℞. Extracti Ratanhiae drachmam unam.
Aquae Rosarum uncias quatuor.
Syrupi Chinae . unciam unam.
Misce. (*Ra.*)

℞. Extracti Ratanhiae semidrachmam.
Aluminis . . . . grana decem.
Infusi Rosarum uncias quinque.
Syrupi Rosarum,
— Catechu,
singulorum unciam unam.
Aquae Rabelii guttas quindecim.
Misce. (*Ca.*)

℞. Tincturae Ratanhiae compositae,
Pulveris Ratanhiae,
singulorum drachmas sex.
Aquae . . . . . uncias sex.
Misce. (Fer.)

℞. Infusi Rosarum . unciam unam.
Acidi sulphurici Aqua diluti guttas quadraginta.
Extracti Ratanhiae drachmas duas.
Syrupi Mororum drachmas sex.
Misce. (*B.*)

Löffelweise. — Der erste Trank wird besonders bei Mutterblutfluß, der vorletzte bei Fiebern und Anfällen von Epilepsie empfohlen.

Resina elastica.

Resina Cayennensis, Gummi elasticum, Cahuchu; Caoutchouc, Kaoutsock, Federharz, elastisches Harz; Caoutchouc, Gomme élastique, Résine elastique, Résine de Cayenne (*Gal*); Elastick harpix (*D.*); Kautschuk (*Suec.*).

D. Fer. Gal. Sax. Suec. Wir. *Be. Br. G. M. Pid. Sp.*

In dicken, lederartigen, dichten, stark federnden, braunen oder rothbraunen, geruchs und geschmacklosen Stücken.

Diese Substanz, welche sich von den eigentlichen Harzen dadurch unterscheidet, daß Azot einen ihrer Bestandtheile bildet, ist in vielen Pflanzen und Pflanzenproducten vorhanden; besonders aber liefert es der coagulirte Saft von Siphonia Cahuchu, *Schreb.*, einem Baume (Monoecia Monadelphia, L.; Euphorbiaceae, *J.*) Brasilien's und Guiana's. (Fl. méd. II. 93. *Lam.* III. t. 790. *Plenck* t. 692. Berl. Jahrb. VIII.)

Emplastrum e Resina elastica. (*Ca. Sw.*)

℞. Resinae elasticae uncias quatuor.
Essentiae Terebinthinae libram unam.

Digere, modico calore, per dies septem, in vase clauso, tunc blando igne coque; post subsidentiam decantha et adde

Olei Olivarum,
Cerae albae,
singulorum uncias duas.

Coque lente ad evaporationem essentiae usque et massam refrigeratam serva. — Zur Bereitung von Heftpflasterstreifen.

Rhamnus.

In den Pharmacopöen kommen zwei Arten dieser Gattung in Erwähnung:

1) *Rhamnus Frangula, L.*; Faulbaum; Bourgène (*Gal.*); Blackaldertree (*Ang.*); Taersttrae (*D.*); Arraclan (*His.*); Vuilboom (*Bel.*); Frangula (*I.*); Kruszyna (*Pol.*); Frangulina (*Lus.*); Brakvoed (*Suec.*).

Gal. GalM. Gen. Wir. Würt. *Be. M. Sa. Sp.*

Ein Strauch (Pentandria Monogynia, L.; Rhamneae, *J.*) des nördlichen Europa's. (*Hayne* V. t. 44. Düss. off. Pfl. VI. t. 21. Nouv. Duh. III. t. 15.)

Man wendet die Rinde (cortex Frangulae s. Alni nigrae bacciferae) an, welche dunkelgrün und weißpunctirt ist. Unter der Oberhaut ist sie gelb und nach dem Trockenwerden braunroth. Sie hat keinen Geruch, aber einen etwas bittern Geschmack.

Sie wirkt laxirend. — Die Beeren besitzen dieselbe Eigenschaft.

2) *Rhamnus catharticus, L.*; gemeiner Kreuzdorn, Färbebeere; Nerprun purgatif (*Gal.*); Purging buckthorn (*Ang.*); Psy gahody, Rzesetlak (*B.*); Korsbaer, Vrietorn (*D.*); Ramno catartico (*His.*); Purgeerende wegedoorn (*Bel.*); Spino cervino (*I.*); Szaklak kzewia (*Pol.*); Espinha cervina (*Lus.*); Getappel, Saftgraent (*Suec.*).

A. Am. Ams. Au Bel. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fer. Gal. GalM. Gen. Han. His. Li. Lon. LonN. Lus. Sax. Suec. Wir. *Bo. C. G. M. Sa. Sp.* Z.

Ein Strauch, welcher in ganz Europa wächst. (*Blackw.* t. 135. *Plenck* t. 140. *Hayne* V. t. 43. Düss. off. Pfl. III. t. 10. Nouv. Duh. III. t. 10.)

Man wendet die Früchte (baccae Rhamni s. Spinae cervinae s. domesticae) an; es sind erbsengroße, runde, glänzende, schwärzliche Beeren mit vier Saamen in der Mitte eines saftigen Fleisches. Sie haben einen unangenehmen Geruch und einen bittern, widerlichen, scharfen Geschmack.

Sie enthalten, nach Vogel, einen ei-

genthümlichen, färbenden Stoff, Rhamnin (Rhamnium).

Ein sehr kräftiges Purgirmittel, welches man bei Wassersucht sehr gerühmt hat.

Succus Rhamni cathartici s. Spinae cervinae s. Baccarum Spinae cervinae. (Gal. Sar. *T*)

℞. Baccarum Spinae cervinae maturarum . . . . quantum vis.

Contere inter manus, seminibus parcendo; massam per tres vel quatuor dies fermentationi subjice, cola exprimendo et succum in lagena sub strato olei serva.

Gabe, zwei bis vier Drachmen

Roob Spinae cervinae. (A. Gal. Wür. *T.*)

℞. Baccarum Spinae cervinae maturarum . . . . quantum vis.

Contere, granis parcendo, massam per (duos vel) tres dies sepone, donec fermentationis initium animadvertatur; exprime fortiter, tunc succum per pannum colatum et post tres vel quatuor horas decanthatum blando calore ad extracti consistentiam inspissa. (Gal.)

℞. Succi Baccarum Spinae cervinae libram unam.

Coque ad mellis consistentiam, sub finem uncias duas Sacchari addendo. (Wür.)

A. Sacchari partem unam et novem Succi; — *T.* Succum balnei aquae vel vaporis ope ad syrupi consistentiam inspissare et cuique librae Sacchari uncias tres addendo, ad mellis consistentiam consumere.

Gabe, von einem Scrupel bis anderthalb Drachmen.

Syrupus Rhamni s. Rhamni cathartici s. domesticus s. de Spina cervina. (Am. Ams. An. Bel. Bor4. Br. Gal. GalM. Gen. Han. Li. Lon. LonN. Lus. Pal. Sar. Wir. Wür. *C. Sp. Sw. T. Vm.*)

℞. Succi clarificati Baccarum Spinae cervinae,
Sacchari albi,
singulorum partes aequales.

Fiat lento igne syrupus. (Gal. *T*)

Am. An. Lus. et *C.* Succi partes quatuor et duas Sacchari; — Wür. Succi sex et quatuor Sacchari; — Ams. et Bel. Succi uncias sedecim et Sacchari libras duas cum dimidia; — GalM. Succi partes tres et quatuor Sacchari; — *Sw.* Succi libras septem cum dimidia et Sacchari libras tres cum dimidia; — Gen. Succi libras sex et Sacchari tres; — Li. Succi partem unam et Sacchari unam cum dimidia; — Bor4. Succi uncias viginti, Sacchari libras tres.

Sw. si necesse est, addere jubet Tincturae Piperis Jamaicensis alcoholicae libram unam.

℞. Succi Baccarum Spinae cervinae depurati . . octarium unum.
Zingiberis concisi,
Pimentae pulveratae,
singulorum semunciam.

Macera blando calore per horas quatuor et filtra; tunc Succi depurati octarios alios tres coquendo ad dimidium consume, liquores commisce et adde

Sacchari libras tres cum dimidia.

Fiat syrupus. (Lon. LonN. *T.*)

℞. Baccarum Spinae cervinae maturarum . . . libras sedecim.

Exprime succum, sedimento Aquae bullientis tantum ut obtegatur infunde, macera per horas viginti quatuor et cola exprimendo; liquorem cum succo commisce et adde

Sacchari albi . . . libras octo.

Clarifica albuminis ope et ad syrupi consistentiam usque consume, cui refrigerato adde

Olei Cinnamomi,
— Caryophyllorum,
— Macidis, singulorum cum Saccharo tritorum scrupulum unum.

Misce bene. (*Vm.*)

℞. Succi depurati Spinae cervinae uncias viginti.
Sacchari albi uncias triginta duas.

Coque ad consistentiam requisitam et sub finem adde in nodulo inclusa

Anisi,
Mastichis,
singulorum drachmas tres.
Zingiberis,
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
singulorum sesquidrachmam.

Serva. (Br. Han. Wir. *Sp.*)

Pal. Succi libram unam, Sacchari duas et Aromatum, singulorum drachmam unam; — Sar. Succi et Sacchari, singulorum partes aequales, Anisi et Mastichis, singulorum drachmas duas et Zingiberis, Cinnamomi et Caryophyllorum, singulorum drachmam unam.

Gabe, eine halbe bis eine Unze.

Potio purgans. (*ParC.*)

℞. Decocti Pruuorum uncias quatuor.
Syrupi Spinae cervinae unciam unam.

Misce.

Rhaponticum.

Rheum Rhaponticum, L.; Pontischer Rhabarber; Rhapontic (*Gal.*); Pontic

rhubarb (*Ang.*); Reupontykum, Zemerlnc wetesj (*It.*); Rapontico (*His. Lus.*); Rhapontic (*Bel.*); Rapontico, Rheaturco Rabarbaro dei Monaci (*I.*)

Br. Fer. GalM. His. Wir. Würr. *Be. Br. Fi. G. M. Sp. Z.*

4 (Enneandria Trigynia, L.; Polygoneae, J.) Eine im südlichen Rußland einheimische, in südlichen Ländern Europa's gebaute Pflanze. (Fl. méd. VI. 296.)

Man wendet die Wurzel (radix Rhapontici veri s. Rhabarbari Rhapontici) an; sie kommt unter zwei verschiedenen Formen vor; die eine der Varietäten ist faustdick oder minder, von holzigem Ansehen, äußerlich röthlichgrau, auf dem Queerbruche roth und weiß marmorirt, in sehr dichten, strahlig von der Mitte nach dem Umkreise laufenden Streifen; sie hat einen sehr adstringirenden und schleimigen Geschmack, kracht nicht unter den Zähnen und färbt den Speichel gelb; der Geschmack ist dem der Rhabarber ähnlich, aber unangenehmer; das Pulver ist gelb mit röthlichem Anstrich. Die andre ist drei oder vier Zoll lang, zwei oder drei dick, von weniger holzigem Ansehen, reiner blaßgelb oder weniger röthlich; der Bruch strahlig, der Geschmack adstringirend und schleimig, der Geruch dem der Rhabarber ähnlich, auch sie kracht nicht unter den Zähnen.

Sie enthält nach Henry weit mehr Satzmehl und weniger kleesauren Kalk als die Rhabarber, aber mehr rothfärbenden Stoff. Hornemann hat darin eine eigenthümliche Substanz, das Rhaponticin (Rhaponticinum) gefunden.

Tonisch, laxirend.

Extractum Rhapontici. (GalM.)

℞. Radicis Rhapontici siccatae partem unam.

Aquae frigidae . . partes quatuor.

Infunde per horas viginti quatuor, cola deinde, leviter exprimendo, infunde residuum

Aquae frigidae partibus duabus et cola. Liquores commixti in balneo aquae ad extracti consistentiam evaporent.

Rheum.

Rhabarbarum; Rhabarber; Rhubarbe (*Gal.*); Rhubarb (*Ang.*); Rhabarber (*Bel. D. Suec.*); Rawend (*Ar*); Rabarbara (*B.*); Tay huam, Hay-hoang (*C.*); Ta-hoam (*Co.*); Rewund chini (*Duk.*); Ruibarbo (*His. Lus.*); Reywan chinie (*Hin.*); Rabarbaro (*I*); Schara-modo (*Ma.*); Reywand (*Pe*); Korzen rabarbarowy (*Pol.*); Variatu kalung (*Tam.*); Dschum-za (*Th.*).

Die Pharmacopöen bezeichnen mit diesem Namen vorzüglich folgende beide Substanzen:

A. *Rheum s. Rhabarbarum officinale.* A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pal Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Würr. WW. *A. Be. Br. C. Fi. G. M. Par. Pid. Sa. Sp. Z.*

Man unterscheidet mehrere Arten derselben:

1) *Rhabarbarum s. Rheum verum s. Indicum s. Sinense s. Chinense s. Danicum*; Indische, Chinesische, Dänische Rhabarber; Rhubarbe de Chine ou des Indes (*Gal*), in rundlichen, außen schmutzig gelben Stücken von einem derben Gewebe, ziegelrother Marmorzeichnung, matt ziegelrother Farbe und bitterem Geschmack. Sie kracht unter den Zähnen und färbt den Speichel orangegelb. Das Pulver hat eine zwischen Falb und Orangegelb die Mitte haltende Färbung. Sie kommt aus China über Canton zur See.

2) *Rhabarbarum Tataricum s. Moscoviticum s. Russicum*; Russische, Tatarische Rhabarber; Rhubarbe de Moscovie, de Tartarie ou de Bucharie (*Gal.*), in etwas platten, unregelmäßigen, eckigen, großlöcherigen, außen rein gelben Stücken, von minderer Dichtheit als die vorige, mit rothen und weißen, sehr deutlichen und sehr unregelmäßigen Adern durchzogen. Sie hat einen sehr merklichen Geruch und einen bittern, adstringirenden Geschmack. Sie färbt den Speichel stark safrangelb und kracht unter den Zähnen. Das Pulver ist reiner gelb als das der vorigen. Diese wird am meisten geschätzt, obgleich die Chinesische, wenn sie von guter Beschaffenheit ist ebenfalls gesucht wird. Sie kömmt ebenfalls aus China, aber aus Kiachta durch Sibirien.

Nach Guibourt kommen beide Spielarten von Rheum palmatum, L. (*Blackw.* t. 600 *Plenck* t. 322. Fl. méd. VI. 297. *Bert.* Bild. I. 73.), welche in der Gegend von Kian-Sin und Chan-Sin in der Chinesischen Tartarei wächst. Pfaff verwirft diesen Ursprung zwar nicht, zieht ihn aber in Zweifel.

Man findet im Handel noch eine andre Sorte:

3) *Rhabarbarum Britannicum s. Gallicum s. nostras*; Europäische Rhabarber; Rhubarbe d'Europe (*Gal*), welche von Rheum undulatum, compactum und selbst palmatum kommt, welche Pflanzen in verschiedenen Gegenden Europa's, in Deutschland, Frankreich und England gebaut werden. Diese unterscheidet sich von den beiden vorhergehenden sowohl in phy-

fischer als chemischer Hinsicht und zeigt im Allgemeinen, einige geringe Verschiedenheiten abgerechnet, die Merkmale der zweiten Varietät des Rhabarbers.

Die Morgenländische Rhabarber enthält, nach Henry, einen eigenthümlichen färbenden Stoff, das Rhabarbarin (Rhabarbarinum); Rhabarbarine oder Capho picrite, ein fettes Oel, sauern, äpfelsauren Kalk, Schleimharz, Satzmehl, kleesauren Kalk, welcher den dritten Theil des Gewichts beträgt ꝛc. Letzteres Salz bewirkt, daß sie unter den Zähnen kracht. Hornemann betrachtet das Rhabarbarin als einen unreinen Stoff; er schreibt der Rhabarber einen andern eigenthümlichen Stoff, das Rheumin (Rheuminum); Rheumine (*Gal.*), zu, welcher mit den Säuren verwandt, aber demungeachtet von der Rhabarbersäure (Acidum rheumicum), Acide rheumique (*Gal.*), welche Henberson annimmt, deren Existenz aber nicht erwiesen ist, sich sehr unterscheidet. Auch hat man darin einen zuckerartigen Stoff erkannt, dessen Vorhandenseyn auch durch Meißner bestätigt wird.

B. *Rheum s. Rhabarbarum spurium*; Mönchsrhabarber, Alpenampfer; Rhubarbe des moines, fausse Rhubarbe (*Gal.*); Bastard monks rhubarb (*Ang.*); Skreppe (*D.*); Romaza (*His.*); Spitzbladdige pattich (*Bel.*); Romice (*I.*); Szczaw kobyli (*Pol.*); Babaca menor (*Lus.*); Haestsyrae (*Suec.*).

Bel. Br. Gal. *M. Sp.*

Dieß ist die Wurzel von Rumex alpinus, L. ♃ oder ♂ (Hexandria Trigynia, L.; Polygoneae, *J.*), einer auf den Alpen wachsenden Pflanze. (*Zorn* Ic. pl. t. 261.)

Diese Wurzel (radix Hippolapathi s. Rhabarbari monachorum) ist sehr dick, holzig, faserig, außen roth, inwendig gelb. Sie hat einen unangenehmen Geruch und einen bittern, herben und widerlichen Geschmack.

Die Rhabarber ist tonisch oder purgirend, je nach der Gabe; tonisch zu fünf bis zehen, purgirend zu achtzehen bis vier und zwanzig und mehr Gran.

§. I. Präparate, welche die Rhabarber in Substanz enthalten.

Rhabarbarum tostum (His. Pal. Sar. *Fi.*)

℞. Rhei pulverati . . quantum vis.

In pelvim ferream amplam et planam immissum ignis moderati calori expone, continue cum spathula agitando, donec colorem fuscum acquisiverit; tunc refrigeratum serva.

Species Diaturbith cum Rhabarbaro. (Pal. Wir. *Vm.*)

℞. Radicis Rhei,
Turbith, singulorum uncias duas.
Hermodactylorum unciam unam.
Diagrydii (sulphurati cum seminibus Tiglii triti),
Cremoris Tartari,
Seminum Violarum,
singulorum semunciam.
Fiat pulvis, cui adde
Olei Cinnamomi guttas decem.
Serva. (Pal. Wir.)

℞. Cinnamomi . . . partem unam.
Zingiberis,
Seminum Anisi,
singulorum partes tres.
Scammonei . . partes quatuor.
Hermodactylorum,
Radicis Turbith,
singulorum partes octo.
— Rhei . . partes decem.
Fiat pulvis. (*Vm.*)

Purgirend, wurmtreibend. — Gabe, einen bis zwei Scrupel.

Pulvis absorbens. (*E.*)

℞. Chelarum Cancrorum praeparatarum . . . drachmam unam.
Rhei . . . . . scrupulos duos.
Divide in partes quatuor. — Gabe, ein oder zwei Stück täglich.

Pulvis excitans. (*E.*)

℞. Rhei,
Ipecacuanhae,
singulorum drachmam unam.

Mit Erfolg auf schmerzlose Geschwüre angewendet.

Pulvis Rhei cum Tartaro s. Tartrate Potassae, Pulvis catharticus s. Rhei compositus s. lenitivus s. lenitivus tartarisatus. (DD. Ful. Han. *Sm. Sy.*)

℞. Rhei,
Cremoris Tartari,
singulorum semunciam.
Fiat pulvis. (DD.) — Gabe, ein Scrupel

Sy. Rhei, grana viginti et Tartari decem pro dosi; — *Sm.* Rhei et Tartari solubilis; singulorum partes aequales.

℞. Pulveris Rhei,
— Cremoris Tartari,
— Corticis Aurantiorum,
singulorum unciam unam.
Misce. (Han.)

Ful. Rhei drachmas duas, Tartari tartarisati semunciam et Corticis Aurantiorum scrupulos quatuor.

Gabe, von einer halben bis zur ganzen Drachme.

Pulvis Rhei compositus s. Rhei et

Sulphatis Potassae s. antihecticus s. purgans. (BorC. *Sa. Sp.*)

℞. Rhei . . . . . grana sex.
Sulphatis Potassae grana duodecim.
Fiat pulvis. (*Sp.*)

BorC. Rhei partem unam et tres Sulphatis.

℞. Rhei . . . . semidrachmam.
Sulphatis Potassae grana decem.
Scammonei . . . grana octo.
Olei essentialis Foeniculi guttam unam.
Fiat pulvis. (*Sa.*)

Pulvis puerorum epilepticus cum Rheo s. cathartícus absorbens s. laxans s. infantum cum Rheo s. Magnesiae compositus s. Rhei salinus s. Rhei cum Magnesia s. digestivus s. e Rheo. (B*. Br. D. DD. Fer. Gen. Li. Suec. *E. Sa. Sw.*)

℞. Rhei . . . . . partem unam.
Magnesiae albae, partes tres.
Fiat pulvis. (*Sa. Sw.*)

Suec. Rhei et Magnesiae, singulorum partes aequales; — Gen. Rhei partem unam et quatuor Magnesiae; — Fer. Rhei unam et octo Subcarbonatis Magnesiae.

℞. Rhei . . . . scrupulum unum.
Magnesiae calcinatae semidrachmam.
Olei Cinnamomi guttam unam.
In Syrup zu nehmen. (*E.*)

℞. Rhei . . . . . semunciam.
Magnesiae albae,
Foeniculi,
Sacchari albi,
singulorum drachmas duas.
Fiat pulvis. (Suec.)

Br. Rhei unciam unam, Magnesiae tantidem, Foeniculi drachmas duas et Sacchari semunciam.

℞. Rhei,
Magnesiae albae,
Elaeosacchari Foeniculi,
singulorum partes aequales.
Fiat pulvis. (D. DD.) — Gabe, ein Scrupel.

℞. Rhei . . . . . semunciam.
Visci querni,
Radicis Liquiritiae,
singulorum drachmas sex.
Magnesiae albae uncias duas cum dimidia.
Fiat pulvis. (B*. Li) — Gabe, ein Scrupel bis halbe Drachme.

Pulvis ad tormina infantum s. Rhei saponaceus. (*Au. Sp.*)

℞. Rhei . . . . . semidrachmam.
Saponis officinalis drachmam unam.
Oculorum Cancrorum semunciam.
Anisi,
Cumini,
singulorum scrupulum unum.
Croci . . . . grana quatuor.
Sacchari albi . . drachmas tres.
Misce. (*Sp.*)

℞. Pulveris Saponis medicinalis grana decem ad viginti.
— Magnesiae subcarbonicae,
— Sacchari,
— Rhei,
singulorum semidrachmam.
Misce. (*Au.*)

Boli e Rheo. (GalM. *Sa. Sw.*)

℞. Rhei pulverati . semidrachmam.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.
Misce. (*Sa. Sw.*) — Adduntur si necesse est, Mercurii dulcis grana quinque vel Jalapae grana decem.

℞. Rhei pulverati . partem unam.
Sulphatis Sodae . partes duas.
Fiat cum Aquae pauxillo bolus. (GalM.)

Bolus ad diarrhoeam s. e Rheo sedativus s. adstringens. (*Sa. Sw.*)

℞. Rhei . . . grana quindecim.
Diascordii . . . semidrachmam.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.
Fiat bolus. (*Sa.*)

℞. Rhei . . . . grana duodecim.
Pulveris aromatici . grana tria.
Tincturae sedativae guttas viginti.
Syrupi Corticum Aurantiorum quantum sufficit.
Misce. (*Sw.*)

Boli resolventes et purgantes. (*B.*)

℞. Rhei . . . . drachmam unam.
Saponis Veneti sesquidrachmam.
Roob Sambuci quantum sufficit ut fiant boli octo. — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden.

Pilulae Rhei. (Li. RC. *Sa.*)

℞. Rhei pulverati . quantum vis.
Infusi Rhei . quantum sufficit.
Fiant pilulae granorum duorum. — Gabe, fünf bis funfzehen Stück.

℞. Pulveris Rhei . . . semunciam.
Aloës . . . . drachmas tres.
Myrrhae . . . drachmas duas.
Olei Menthae guttas quindecim.
Syrupi Zingiberis quantum satis ut fiat massa. — Gabe, funfzehen bis fünfundzwanzig Gran, täglich zweimal, mit lauwarmem Wasser oder Chamillenthee, bei Verdauungsbeschwerden ꝛc. Sind den pilulae Aloës compositae sehr ähnlich. (RC.)

Pilulae resolventes s. resolventes cum Rheo s. e Rheo cum Natro acetico s. ecphracticae. (BorC. Li. WW. *E. Sw.*)

℞. Pulveris Rhei,

Acetatis Sodae,
Fellis Tauri inspissati,
singulorum drachmas duas.
Gummi Arabici semidrachmam.
Fiant pilulae granorum duorum. (BorG. WW.)

℞. Rhei pulverati sesquidrachmam.
Saponis Veneti drachmas quatuor.
Essentiae Terebinthinae
quantum sufficit.
Fiant pilulae granorum quinque. (*Sm.*)

℞. Fellis Tauri inspissati,
Gummi Ammoniaci pulverati,
Rhei pulverati,
singulorum unciam unam.
Fiant pilulae granorum duorum. (Li.)

℞. Rhei . . . . drachmam unam.
Saponis albi . . . grana decem.
Aquae . . . quantum sufficit.
Fiant pilulae quindecim. — Gabe, vier Stück auf einmal. (*E.*)

℞. Rhei . . . . sesquidrachmam.
Sulphatis Ferri semidrachmam.
Saponis albi . . scrupulos duos.
Aquae . . . quantum sufficit.
Fiant pilulae quadraginta. (*E.*)

Pilulae amarae. (*Vm.*)

℞. Extracti Gentianae,
Saponis albi,
singulorum partem unam.
Rhei partem unam cum dimidia.
Tere in mortario ut fiat massa pilularis.

Pilulae rhabarbarinae antacidae s. absorbentes. (*Sw.*)

℞. Rhei,
Magnesiae calcinatae,
singulorum drachmas duas.
Extracti Gentianae quantum sufficit.
Fiant pilulae granorum quinque.

Pilulae roborantes ad blennorrhoeam s. stimulantes. (*Sa. Sy.*)

℞. Rhei pulverati drachmam unam.
Terebinthinae coctae
drachmas duas.
Fiant pilulae triginta sex. (*Sa.*)

℞. Rhei,
Gummi Arabici,
singulorum unciam unam.
Balsami Copaivae quantum sufficit.
Fiant pilulae granorum quatuor. (*Sy.*)

Electuarium stomachicum. (*Sw.*)

℞. Rhei pulverati sesquidrachmam.
Pulveris Ari,
— aromatici,
singulorum drachmam unam.
Oxydi Ferri nigri scrupulum unum.
Conservae Corticis Aurantiorum
uncias duas.
Syrupi Corticum Aurantiorum
quantum sufficit.
Gabe, einer Muscatnuß groß, täglich zwei Mal.

Electuarium ad dysenteriam s. antidysentericum. (*Ca.*)

℞. Confectionis japonicae uncias duas.
Balsami Locatelli uncjam unam.
Rhei pulverati . . . semunciam.
Syrupi Althaeae quantum sufficit.
Gabe, wie bei'm vorigen.

Conditum purgativum, Pulticula saponacea. (*Sa. Sm. Sp.*)

℞. Sulphatis Potassae
drachmam unam.
Cremoris Tartari . semunciam.
Rhei . . . . sesquidrachmam.
Pulpae Tamarindorum uncias duas.
Misce. (*Sa.*) — Gabe, ein Kaffeelöffel voll.

℞. Saponis officinalis semidrachmam.
Aquae Menthae drachmas tres.
Solutioni adde
Vitelli Ovorum drachmam unam.
Magnesiae albae scrupulos duos.
Rhei . . . scrupulum unum.
Syrupi Althaeae,
— Chamomillae,
singulorum drachmas duas.
Misce. (*Sp.*) — Gegen Kolik bei Rindern empfohlen.

℞. Rhei,
Cremoris Tartari,
singulorum drachmas duas.
Pulpae Prunorum, uncias octo.
Syrupi Cydoniorum
quantum sufficit.
Misce. (*Sm.*) — Gabe, vier Kaffeelöffel täglich.

Passulae antheliminticae s. vermifugae. (*Par*)

℞. Passularum minorum semilibram.
Rhei in nodulo inclusi semunciam.
Helminthochortos in nodulo
unciam unam.
Aquae Portulaccae uncias quatuor.
In furnum immitte, pane exinde remoto et vas ibi relinque, donec passulae intumuerint et mollefactae sint.

Tabellae de Rheo s. Diarrhoden cum Rhabarbaro. (Gal. Sar. *Fi.*)

℞. Rhei pulverati . . semunciam.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae
cum Aqua Cinnamomi paratae
quantum sufficit.
Fiant tabellae granorum duodecim. (Gal.)

Fi. Rhei pulverati semunciam, Sacchari albi pulverati uncias quatuor, Mucilaginis Tragacanthae cum Aqua

Cinnamomi pulveris quantum sufficit, ut fiant tabellae np. 192, quarum quaeque rhei sesquigranum continet.

℞. Pulveris Diarrhodon,
— Rhei,
singulorum sesquiunciam.
— Sacchari albi
libram unam.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae
quantum sufficit.
Fiant tabellae. (Sar.)

℞. Pulveris Rhei;
Cremoris Tartari,
singulorum drachmas duas.
Corticis recentis Aurantiorum
semidrachmam.
Sacchari in Aqua Florum Aurantiorum dissoluti uncias quatuor.
Fiant tabellae. (Br.)

Haustus catharticus pro infantibus, Potio purgans. (*Pie. Sw.*)

℞. Rhei . . . . grana duodecim.
Aquae Cichorii . . uncias tres.
Syrupi Cichorii . unciam unam.
Löffelweise für ein Kind von neun bis zehen Jahren. (*Pie.*)

℞. Rhei . . . grana sex ad octo.
Calcariae subcarbonicae
grana decem.
Aquae purae . . drachmas tres.
— Cinnamomi drachmas duas.
Syrupi Sacchari drachmam unam.
Wie das vorhergehende zu nehmen. (*Sw.*)

Potio purgans et vermifuga. (*Pie.*)

℞. Cinnabaris . . . grana decem.
Resinae Guajaci,
— Jalapae,
singularum grana quinque.
Rhei . . . . drachmam unam.
Antimonii diaphoretici
grana quindecim.
Syrupi Cichorii compositi
drachmas sex.
Aquae Cichorii . . uncias duas.

Mixtura amara s. amara cum Rheo. (*Sw.*)

℞. Sulphatis Potassae . semunciam.
Rhei,
Extracti Gentianae,
singulorum drachmas duas.
Aquae Menthae piperitae
uncias octo.
Löffelweise zu nehmen.

§. II. Präparate, welche den wirksamen Bestandtheil des Rhabarbers ohne das zu seinem Aussehen angewendete Vehikel enthalten.

Extractum Rhei s. Rhabarbari (aquosum). (Ams. Ba. Bor. Bor4. Br. D. Ped. Gal. Gen. Han. HasP. Ris. La. O. Pal. Sar. Suec. Wir. *Fi. T. Vm.*)

℞. Rhei in frusta minora concisi
quantum vis.
Aquae frigidae quantum sufficit ut paullulum obtegatur; post horas viginti quatuor adde Aquae triplum pondus et cola absque expressione; residuo infunde Aquae pondus aequale, cola leviter exprimendo; colaturae commixtae et albuminis ope clarificatae ad extracti spissi consistentiam evaporent. (*Vm.*)

Ba. macerare jubet binis vicibus, qualibet per horas viginti quatuor, Rhei partem unam in Aquae frigidae quinque.

℞. Rhei electi . . . libram unam.
Aquae frustanae . . . libras sex.
Macera in loco calido per horas quatuor, tunc coque parumper, cola exprimendo et ad consistentiam requisitam consume. (Br. Fer. His. Pal. Wir.)

Ft. Calide infundere jubet Rhei uncias quatuor in Aquae communis libris quatuor et fortiter premendo colare, fluidum decanthare et albuminis ope clarificatum in balneo aquae ad extracti consistentiam consumere; — *T.* Rhei libram unam, Aquae fervidae octo, infusionem per horas 24 etc.

℞. Rhei concisi . . libram unam.
Aquae bullientis libras sedecim.
Digere per horas viginti quatuor, tunc sepone et cola; residuo infunde Aquae bullientis libras octo et post horas viginti quatuor iterum cola, quo facto liquores commixti sufficienter evaporent. (Ams. Sar.)

Bor4. Rhei quantum vis, Aquae fervidae decuplum, sepone per horas 36 et liquorem exprimendo separa; residuum iterum infunde Aquae fervidae quintuplo et post refrigerationem exprimes liquores primo leni igne ad tertiam partem tum in balneo vaporis ad justam extracti spissitudinem evapporent; — HasP. Rhei libram unam, Aquae fervidae sex, macerationem per 24 horas, et residuo infundere Aquae fervidae libras quatuor et ad siccum consumere

℞. Rhei electi . . . partem unam.
Aquae bullientis . . partes octo.
Coque leviter per horas quadrantem et cola cum expressione; residuum coquatur cum Aquae partibus quatuor et eidem colatur; liquores commixti et post sufficientem sepositionem decanthati ad extracti spissitudinem evaporent. (Bor. D. Han. La. O.)

Suec. ternus vel quaternus ebullitiones succedentes, quamlibet cum Aquae partibus tribus instituere jubet.

℞. Rhei . . . . . libram unam.
Aquae frigidae . libras quatuor.
Macera per horas viginti quatuor, subinde agitando et cola; novâ Aquâ rheo infusâ macera itidem et tunc levi cum expressione cola; liquores commixti et iterum colati in balneo aquae sufficienter evaporent. (Gal.)

℞. Rhei electi . . . libras duas.
Aquae frigidae libras duodecim.
Macera per horas viginti quatuor, subinde agitando et cola; residuum macereturin Aquae novae frigidae libris octo et coletur; liquoribus ambobus commixtis et in balneo aquae ad consistentiam syrupi evaporatis, lineas circiter duas liquidi patinis infunde, et in furno vel balneo aquae ad siccum consumptis, squamulas separa. (Gal.)

Dieß iſt das *Sal essentiale Rhei s. Rhabarbari.*

Gabe, fünfzehen bis zwanzig Gran.

Extractum Rhei s. Rhabarbari alcoholicum. (Ful. Lon. LonN. Lus. Pol. Sax. Wür. *C.*)

℞. Rhei concisi,
Alcoholis, singulorum libras duas.
Aquae communis libras novem.
Digere per horas duodecim, cola exprimendo, destillando alcoholem separa et residuum ad consistentiam extracti consume. (Pol.)

Ful. et Wür. Rhei libram unam, Alcoholis tantidem, octo Aquae et tres dies digestionis; — Sax. Rhei partes duas, Alcoholis tres, novem Aquae et digestionis horas viginti quatuor; — Lon. LonN. et *C.* Rhei libram unam, Alcoholis (0,930) octarium unum, Aquae octarios septem et macerationem per quatriduum.

℞. Rhei pulverati . libram unam.
Alcoholis . . . libras quatuor.
Post dies quatuor digestionis decantha, residuum cum Aquae libris decem ad duas redigendis coque; cola decoctum et consume; tincturam ad mellis consistentiam destillando redactam cum residuo decocti commisce et tunc totum, continue agitando, ad aptam consistentiam consume. (Lus.)

Gabe, wie beim vorigen.

Extractum Rhei compositum s. catholicum s panchymagogum s. enico-pharmacum. (B*. Bor. Bor4. D. HassP. O. Pal. Pol. Sax. *Pid.*)

℞. Extracti Rhei . . uncias tres.
— Aloës . . unciam unam.
Mollefactos in Alcohole balnei aquae ope ad massae pilularis consistentiam consume. (Pol.)

℞. Extracti Rhei . . uncias tres.
— Aloës . . unciam unam.
Misce (in Aquae destillatae sufficiente quantitate soluta Bor4. HassP.) et adde
Saponis jalappini in Alcoholi sufficiente quantitate dissoluti unciam unam.
Evaporent in balneo aquae ad aptam consistentiam. (B*. Bor4. HassP. O. Sax.)

D. Extracti Rhei uncias duas, Extracti Aloës drachmas quinque et Saponis jalappini in Alcohole dissoluti unciam unam.

℞. Extracti Rhei . . uncias duas.
— Aloës aquosi semunciam.
— Hellebori nigri drachmam unam et grana triginta sex.
Misce in mortario calefacto cum
Resinae Jalapae pulveratae drachmis duabus et granis viginti quatuor.
Serva ad usum. (*Pid.*)

℞. Rhei . . . . . unciam unam.
Seminum Carthami excorticatorum uncias quatuor.
Polypodii querni . uncias duas.
Zingiberis albi . drachmas duas.
Foliorum Sennae,
Turbith, singulorum uncias duas cum dimidia.
Agarici albi . . drachmas sex.
Scammonii . drachmas decem.
Mannae electae uncias duas cum dimidia.
Infunde per plures vices agaricum, scammonium et turbith in Aquae libris duabus ita ut penitus extrahantur; quod restat macera in Aquae bullientis libris tribus et coque deinde ad tertiae partis consumptionem, sub finem addendo residuum prioris extractionis spirituosae; cola exprimendo, mannam in colatura solve, solutionem clarificatam cum extracto spirituose commisce, alcoholem lenis caloris ope expelle et quod restat ad extracti mollis consistentiam consume. (Pal.)

Purgirend. — Die Gabe des letztern iſt von einem Scrupel bis zur halben Drachme, ohne Manna, von einer Drachme bis zu vier Scrupel mit Manna.

§. III. Präparate, welche den wirkſamen Beſtandtheil des Rhabarbers mit dem zu ſeinem Ausziehen angewendeten Vehikel zugleich enthalten.

A. Auszug durch Waſſer.

Infusum Rhei s. Rhabarbari, Tinctura Rhei aquosa, Anima Rhei. (A. B*

Ba. Ed. Gen. Ham. Lon. LonN. Lus. Wür. *B. Br. C. Fi. ParC. Ra. T.*)

℞. Rhei concisi drachmam unam.
Aquae bullientis
octarium dimidium.
Macera per horas duas et cola. (B°. Lon. LonN. *ParC.*)

Ba. Rhei partem unam et duodecim Aquae; — A. Rhei semunciam et Aquae semilibram; — *Br.* Rhei uncias tres et Aquae libras duas cum dimidia; — *Ra.* Rhei unciam unam et Aquae libras duas; — Ham. Rhei unciam unam et Aquae sufficientem quantitatem ut colaturae unciae octo obtineantur; — *Fi.* Rhei drachmas duas, Aquae bullientis uncias sex et horas duodecim infusionis vel ebullitionem unicam cum Aquae unciis sex cum dimidia; — *B.* Rhei drachmas tres et Aquae uncias sex; — *T.* Rhei drachmam unam, Aquae uncias duas.

℞. Rhei contusi . . semunciam.
Aquae bullientis . . uncias octo.
Macera per horas duodecim, in vase tecto, et adde
Aquae Cinnamomi vinosae
unciam unam.
Cola. (Ed. Lus. *C.*)

Wür. Rhei drachmas tres, Aquae semilibram et Aquae Cinnamomi vinosae drachmas sex.

℞. Rhei pulverati unciam unam.
Aquae Menthae piperitae
uncias duodecim.
Digere blando calore et cola. (Gen.)

Tonisch und schwach purgirend, bei einigen chronischen Krankheiten und in der Reconvalescenz nach hitzigen Krankheiten, in denen die Verdauungswege nicht vorzüglich afficirt waren.

Infusum Rhei amarum, Decoctum amaro - aromaticum laxativum, Potio tonica. (Am. *B.*)

℞. Decocti amari . libram unam.
Infusi Rhei . . uncias quatuor.
Aquae Menthae piperitae
unciam unam.

Allmälig zu nehmen. (*B.*)

℞. Rhei . . . . . drachmas tres.
Corticis Aurantiorum
semidrachmam.
Aquae Menthae piperitae
uncias quatuor.
In colatura dissolve
Extracti Centaurii minoris
drachmas duas.

Den Tag über zu nehmen. (*Au.*)

Haustus incitans resolvens, Potio excitans et resolvens. (*B.*)

℞. Rhei . . . . drachmam unam.
Decocti Chinae . . uncias octo.
Infunde et adde colaturae
Camphorae cum Mucilagine Gummi Arabici tritae semidrachmam.
Aetheris sulphurici guttas triginta.
Syrupi Corticum Aurantiorum
unciam unam.

Gabe, zwei Löffel alle zwei Stunden.

Infusio laxativa sedans, Potio laxans et sedans. (*B.*)

℞. Infusi Rhei . . . . uncias sex.
Syrupi Acetatis Morphinae
unciam unam.

Auf zwei Mal zu nehmen, bei reizbaren Subjecten.

℞. Infusi Rhei . . . . uncias sex.
Aquae Menthae piperitae
unciam unam.
Liquoris Hoffmanni
scrupulum unum.

Aufzwei Mal zu nehmen.

Potio resolvens et laxans. (*B.*)

℞. Infusi Rhei . . . uncias octo.
Subcarbonatis Potassae
drachmas tres.
Syrupi Cichorii compositi
unciam unam.

Auf zwei oder drei Mal zu nehmen.

Decoctum Rhabarbari, Anima Rhabarbari. (His.)

℞. Rhei contusi . drachmas duas.
Aquae . . . . . uncias octo.
Coque leviter et cola. — Auf einmal zu nehmen.

Syrupus Rhei s. Rhei palmati s. de Rheo s. de Rhabarbaro. (Am. An. B. Ba. Bel. Fenn. Hass. Lus. Suec. *C. Sw. Vm.*)

℞. Infusi Rhei . . partem unam.
Sacchari albi pulverati partes duas.
Fiat syrupus. (Fenn. Hass. Lus. Suec.)

℞. Rhei minutim concisi
partem unam.
Aquae bullientis partes duodecim.
Infunde per horas duodecim calore 30 ad 40° et parti uni colaturae adde
Sacchari albi . . . partes duas.
Fiat syrupus. (Am. Ba. *C.*)

℞. Rhei concisi . partem unam.
Aquae . . . . . partes octo.
Infunde et infusionem in Aquae aequali quantitate repete; colaturis tunc commixtis adde
Sacchari albi partes quatuordecim.
Albuminis ope clarificata ad syrupi consistentiam coque. (*Sw. Vm.*)

℞. Rhei concisi . . uncias octo.
Aquae . . . . libras quatuor.
Infunde per horas viginti quatuor,

cola et colaturae sepositione depuratae adde
Sacchari albi . . libras quatuor.
Massae residuae adde
. Aquae . . . . libras quatuor.
Infunde, calore sensim ad bullitionem usque aucto, cola exprimendo et colaturae adde
Sacchari albi . libras quatuor.
Clarifica, ad consistentiam aptam consume et syrupum semirefrigeratum cum praecedente commisce. (An.)

℞. Rhei concisi . . uncias tres.
Aquae bullientis . libras duas.
Macera per horas duodecim, tunc leviter coque, cola exprimendo, filtra et subsidendo et decanthando depurato adde
Sacchari albi . . . libras duas.
Fiat leni calore syrupus. (B. Bel.)

Syrupus cum Rheo s. Rhabarbaro s. Rhei aromaticus. (Am. Gal. Pol. *C. Fi.*)

℞. Rhei . . . . . uncias tres.
Cinnamomi . . drachmas sex.
Aquae bullientis . libras duas.
Digere per noctem; altero mane cola, colaturae uncis viginti adde
Sacchari albi . . . libras tres.
Fiat syrupus. (Pol.)

℞. Rhei pulverati drachmas decem.
Seminum Coriandri,
— Foeniculi,
singulorum semidrachmam.
Aquae
uncias duodecim cum dimidia.
Immitte in lagenam ad collum usque replendam et in balneum aquae immergendam, quo facto per sexagesimas viginti, balneo tunc gradatim refrigerato, lagenam exime et post horas viginti quatuor liquido decanthato et colato adde
Sacchari albi
uncias viginti quinque.
Solve in balneo aquae. (Gal.)
Fi. Aquae uncias quatuordecim, Sacchari libras duas, caeterum ut antea.

℞. Rhei . . . drachmas quinque.
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
singulorum semunciam.
Nuces moschatas . . . no. 2.
Aquae . . . . octarium unum.
Digere, ad dimidium consume et adde
Sacchari . . . . libram unam.
Alcoholis diluti
octarium dimidium.
Coque parumper. (Am. *C.*)

Syrupus de Rheo s. de Cichorio compositus. (A. Am. Ams. Br. Gal. Gen. Han. His. Pal. Sar. Wir. Wür. *Bo. Fi. Pid. T.*)

℞. Herbae recentis Cichorii
uncias quatuor.
Aquae . . . . libras quatuor.
Coque ad consumptionem partis tertiae usque, sub finem addendo
Rhei electi minutim concisi
uncias quatuor.
Cola exprimendo et adde colaturae
Sacchari albi . . libras quatuor.
Clarificata ad consistentiam syrupi coque. (His.)

℞. Herbae et Radicis Cichorii recentium . . . . . uncias duas.
Aquae purae . . . libras tres.
Decoque ad tertiae partis consumptionem et adde
Rhei concisi . . uncias tres.
Digere per horas duodecim et post levem coctionem cola; colaturae sepositione depuratae adde
Sacchari albi . . . libras tres.
Fiat coquendo syrupus. (Ams.)

℞. Succi depurati Cichorii libras duas.
Rhei electi concisi uncias duas.
Digere per noctem inter cineres calidos; altero mane exprime; residuum digere iterum cum
Aquae bullientis . libris duabus.
Post brevem coctionem cola exprimendo; liquoribus commixtis adde
Syrupi communis . libras tres.
Fiat syrupus. (*Sa.*)

℞. Radicis Cichorii . . uncias sex.
Foliorum Cichorii uncias novem.
— Fumariae,
— Scolopendrii,
singulorum uncias tres.
Baccarum Alkekengi uncias duas.
Aquae communis
libras quatuordecim.
Decoque ad duodecim librarum liquidi remanentiam, cola et colaturae adde
Sacchari albi . libras quinque.
Clarifica et leni igne ad syrupi spissi consistentiam consume. Praeterea

℞. Rhei contusi . . uncias sex.
Santali citrini,
Cinnamomi,
singulorum semunciam.
Aquae communis . libras octo.
Infunde per horas viginti quatuor in vase clauso et cola levi cum expressione. Liquor cum syrupo antea praeparato commixtus semel ebulliat, tunc syrupum adhuc calidum nodulo immitte continenti
Cinnamomi,
Santali citrini,
singulorum semunciam.

Post horas sex infusionis decantha. (Gal.)

Bosson coquere suadet Folia et Herbas per horae quadrantem, tunc per horas duas infundere in Aquae libris decem, colare, decanthare et cum Sacchari libris quinque syrupum ad 25° coctum parare; praeterea parare infusionem cum Rheo, Aromatibus, Aquae libris tribus et Subcarbonatis Potassae drachmis duabus, absque expressione colare, liquorem cum syrupo commiscere, denuo si requiritur coquere et mixturam bullientem Santalo et Cinnamomo immittere. (GalF.)

℞. Radicis Cichorii,
— Taraxaci,
singularum uncias quatuor.
Aquae fontanae quantum sufficit ut coctione libraé tres obtineantur; tunc
℞. Rhei concisi . . . uncias sex.
Aquae bullientis . . libras tres.
Macera per horas viginti quatuor, exprime, colaturam cum decocto praecedente commisce et totum coque cum
Sacchari albi . . . libris sex.
Syrupum bullientem immitte
Ligni Santali citrini,
Cinnamomi, singulorum semunciae.
Post refrigerationem exprime et per pannum cola. (Gen.)

℞. Radicis Rusci,
— Asparagi,
singularum uncias tres.
Foliorum Cichorii,
— Pimpinellae,
— Capilli Veneris,
— Agrimoniae,
— Cerefolii,
singulorum manipulum unum.
Aquae . . . . . libras tres.
Coque et sub finem in decocto infunde
Sennae mundatae . uncias tres.
Rhei contusi . unciam unam.
Radicis Turbith,
Hermodactylorum,
singulorum drachmas sex.
Florum Calendulae,
— Tamarisci,
— Sambuci,
singulorum manipulum dimidium.
Cola et adde
Sacchari albi . . sesquilibram.
Fiat syrupus. (*B.*)

℞. Herbae Cichorii unciam unam:
Radicis Cichorii . . uncias tres.
Rhei . . . . uncias quatuor.
Subcarbonatis Potassae
semidrachmam.
Aquae fontanae . . libras octo.
Coque ad librarum sex liquidi remanentiam; exprimendo fortissime cola et colaturae adde
Sacchari albi . . . . libras sex.
Clarifica et ad consistentiam syrupi coquendo consume. (A. *Fi. T.*)

℞. Radicis Cichorii
uncias duas cum dimidia.
Aquae fontanae . sesquilibram.
Coque ad librae unius liquidi remanentiam et adde
Rhabarbari minutim concisi
unciam unam.
Subcarbonatis Potassae
grana viginti.
Coque lente et cola leviter exprimendo; adde
Sacchari albi . uncias sedecim.
Clarifica, cola et adde
Aquae Cinnamomi spirituosae
unciam unam.
Misce bene. (Br. Han. Pal. Wir.)

℞. Radicis Cichorii . . uncias tres.
Aquae fontanae . . libras tres.
Coque ad tertiae partis remanentiam et adde
Rhei minutim concisi
uncias duas.
Subcarbonatis Potassae
semidrachmam.
Stent in digestione per horas aliquot in loco calido, tunc semel vel bis ebulliant et cum expressione colentur; colaturae adde
Sacchari clarificati
uncias triginta duas.
Cola syrupum. (Wür.)

Pid. eandem praebens formulam addit Aquae Cinnamomi spirituosae uncias duas.

Sp. Radicis Cichorii uncias duas cum dimidia, Aquae uncias octodecim, coquendo ad duodecim redigendas, Rhei unciam unam, Subcarbonatis scrupulum unum et Sacchari uncias viginti duas.

Tinctura Rhei s. Rhabarbari s. Rhei etc aquosa, Anima Rhei, Infusum Rhei s. Rhei alcalisatum s. aquosum s. cum Subcarbonate Potassae, Tinctura aquosa Rhei alcalina. (A. Ams. An. E*. Ba. Bor. Ber4. Br. D. DD. Ful. Han. HassP. Li. O. Pal. RC. Sax. Wir. *Fi. Sw. T. Vm.*)

℞. Infusi Rhei simplicis
partes undecim.
Subcarbonatis Potassae
partem unam.
Dissolve. (Ba)

℞. Rhei concisi . . partes tres.
Aquae communis
partes quinquaginta.
Calefac, donec liquor bullire incipit, tunc, ab igne remoto adde

Subcarbonatis Potassae . . .
. . . . . partem unam.
Post refrigerationem cola. (*Vm.*)

℞. Rhei . . . . . semunciam.
Subcarbonatis Potassae
drachmam unam.
Aquae purae . . . uncias sex.

Infunde calore gradatim aucto per horas duas, ita ut liquor semel ebulliat, cola, seponę et decantha.

D. Rhei unciam unam, Subcarbonatis drachmas duas et Aquae bullientis uncias decem, ebulliant semel; — Ful. Rhei unciam unam, Subcarbonatis scrupulos quatuor, Aquae uncias octo et viginti quatuor horas digestionis; — *T.* Rhei unciam unam, Aquae bullientis uncias octo, Salis Tartari drachmam unam, et digestionem inter cineres calidos per horas viginti quatuor.

℞. Rhei . . . . drachmas duas.
Subcarbonatis Potassae
semidrachmam.
Aquae . . . . quantum sufficit ut colaturae unciae quatuor obtineantur. Liquori, postquam semel ebulliverit, adde
Syrupi Sacchari . unciam unam.
Misce bene. (*Sw.*)

℞. Rhei . . . . . partes duas.
Aquae bullientis partes sedecim.

Post horas duas digestionis cola leviter exprimendo et adde
Subcarbonatis Potassae
partem dimidiam.
Alcoholis . . . partem unam.
Misce bene. (Li.)

RC. Rhei sesquiunciam, Subcarbonatis Potassae sesquidrachmam, Aquae fervidae libram unam, macerationem per horas duodecim et colaturae unciarum decem addere Alcoholis diluti unciam unam; — *Sw.* Rhei unciam unam, Subcarbonatis drachmas tres, Aquae bullientis uncias duodecim, viginti quatuor horas macerationis et Alcoholis Cinnamomi uncias quatuor; — Ams. Rhei unciam unam, Aquae bullientis uncias sex, sex horas digestionis, Aquae Cinnamomi uncias quatuor et Subcarbonatis drachmas duas; — B*. Bor. Han. O. et Sax. Rhei sesquiunciam, Subcarbonatis drachmas tres, Aquae uncias duodecim, duodecim horas macerationis et Aquae Cinnamomi vinosae uncias duas; — Bor4. Aquae fervidae uncias octodecim, liquorem refrigeratum colare et colaturae decanthatae uncis decem, Aquae Cinnamomi vinosae uncias duas admiscere; — Hass P. Aquae bullientis uncias quindecim, caeterum ut Bor. etc.; — *Fi.* Rhei sesquiunciam, Subcarbonatis drachmas tres, Aquae libram unam, digestionem per horas viginti quatuor et Tincturae Cinnamomi uncias duas; — DD. Rhei semunciam, Subcarbonatis drachmam unam, Aquae bullientis uncias quatuor, duodecim horas digestionis et Aquae Foeniculi unciam unam; — Wür. Rhei unciam unam, Subcarbonatis drachmas duas, Aquae Cichorii, Aquae Cinnamomi cum Buglosso, singularum uncias sex, et viginti quatuor horas digestionis; — Fol. Rhei unciam unam, Subcarbonatis drachmas duas, Aquae Cichorii uncias sedecim et viginti quatuor horas digestionis; — Br. Rhei unciam unam, Subcarbonatis sesquidrachmam, Aquae purae uncias tres et Aquae Cinnamomi tantidem.

Tonisch, auch absorbirend und gegen Gelbsucht, Hypochondrie und Säure in den ersten Wegen, — Gabe, zwei Drachmen bis eine Unze, zwei oder drei Mal täglich.

Infusum Rhei salinum s. boraxatum, Tinctura aquosa Rhei salina. (B*. GalP. Hass. Pal. Wür. *Ca. Pid. Sp.*)

℞. Rhei contusi . unciam unam.
Aquae destillatae uncias novem.
Acetatis Potassae drachmam unam.

Post horas viginti quatuor infusionis filtra. (*Ca.*)

℞. Aceti . . . . . uncias novem.
Subcarbonatis Potassae
quantum sufficit ad saturandum acidum. In solutione digere per horas duodecim
Rhei concisi . unciam unam.

Filtra. (*Sp.*)

℞. Rhei . . . . . semunciam.
Tartari tartarisati drachmas duas.
Aquae bullientis . semilibram.

Stent in digestione per horas viginti quatuor et filtrentur. (*Pid.*)

Wür. eandem formulam, addendo autem Coccionellae semiscrupulum; — Hass. Tartarum tartarisatum vel boraxatum recipere pro arbitrio.

℞. Rhei . . . . . sesquiunciam.
Boracis pulverati drachmas duas.
Aquae bullientis . libram unam.

Macera per horas duodecim et colaturae unciis decem adde
Aquae Cinnamomi vinosae
uncias duas.
Misce. (B*. GalP. Pol.)

Gabe, ein oder zwei Löffel, drei oder vier Mal täglich.

Decoctum aperiens. (Ex.)

℞. Radicis Rhei,
— Rubiae,
singularum drachmas tres.
Subcarbonatis Potassae
. . . . . drachmas duas.

Aquae fontanae . . libras octo.
Coque per horam unam, cola et adde
Decocti Zingiberis . uncias tres.
Elixir viscerale Rosensteinii. (B*)
℞. Rhei concisi . . uncias octo.
Subcarbonatis Potassae uncias tres.
Aquae Cinnamomi
uncias quadraginta octo.
Stent in digestione per dies quatuordecim loco frigido et in lagena bene obturata, sub hujus postremae frequenti agitatione; adde deinde
Corticis recentis Aurantiorum
uncias duas.
Cardamomi minoris,
Seminum Foeniculi,
singulorum semunciam.
Digere, saepius agitando, per dies septem et exprime; residuo infunde
Decocti Radicis Cichorii
uncias sex.
Agita, cola exprimendo, commisce colaturam cum priore et in mixtura solve
Sacchari uncias viginti quatuor.
Tonisch, stärkend. — Gabe, ein halber bis ganzer Löffel.
Syrupus Rhei alcalisatus. (Bor. Bor4. D. Fer. Ful. Han. HassP. Li. O. R. Wir. *Sw.*)
℞. Tincturae aquosae Rhei alcalinae
libram unam.
Sacchari albi . . . libras duas.
Coque ad consistentiam syrupi. (Ful.)
Li. Tincturae aquosae alcalinae uncias decem et Sacchari uncias sedecim.
℞. Rhei . . . . uncias quatuor.
Subcarbonatis Potassae
drachmas duas.
Aquae bullientis . . libras duas.
Coque blando igne, cola exprimendo et adde pro unciis viginti colaturae
Sacchari albi . . . libras tres.
Fiat syrupus. (D.)
℞. Rhei . . . . . uncias tres.
Subcarbonatis Potassae
drachmas duas.
Aquae bullientis . libras duas.
Digere per horas duodecim et pro unciis viginti colaturae adde
Sacchari albi . . . libras tres.
Fiat syrupus. (O.)
R. Rhei uncias duas, Salis sesquidrachmam, Aquae uncias octodecim et Sacchari libras duas.
℞. Rhei . . . . . uncias tres.
Cinnamomi . . drachmas tres.
Subcarbonatis Potassae
drachmas duas.
Aquae bullientis . libras duas.
Digere per horas duodecim, cola et colaturae unciarum viginti adde
Sacchari albi . . . libras tres.
Fiat syrupus. (*Sw.*)
Bor. Bor4. et Han. Cinnamomi (Cassiae cinnamomeae) drachmas sex; — HassP. Rhei sesquiunciam, Cassiae cinnamomeae drachmas tres, Salis Tartari unam, Aquae fervidae uncias tredecim, digestionem per noctem et liquoris expressi unciis decem addere Sacchari albi uncias octodecim.
℞. Rhei . . . . . uncias duas.
Subcarbonatis Potassae
drachmam unam.
Succi bullientis Cichorii libras tres.
Post horas duodecim macerationis cola exprimendo et colaturae adde
Sacchari . . . . libras duas.
Liqua. (Fer.)
℞. Rhei,
Foliorum Sennae,
singulorum sesquiunciam.
Cinnamomi . sesquidrachmam.
Salis Tartari . scrupulos duos.
Zingiberis . . semidrachmam.
Aquae Cichorii . uncias decem.
— Rosarum uncias quatuor.
Digere per tres dies, loco calido, tunc ebulliant semel; exprime, albuminis ope clarifica et colaturae unciis novem adde
Sacchari albi . uncias sedecim.
Fiat syrupus. (Wir.)
Potio cum Manna et Rheo. (GalM. *Ra.*)
℞. Rhei . . . . . semunciam.
Aquae . . . . uncias quatuor.
Coque per aliquot sexagesimas, tunc in colatura dissolve
Mannae . . . . uncias duas.
Potio purgans. (*Pie.*)
℞. Rhei,
Subcarbonatis Potassae,
singulorum drachmam unam.
Decocti Parietariae
quantum sufficit.
Coque et in colaturae uncia una dissolve
Mannae . . . . uncias duas.
Cola et adde
Syrupi Rhei compositi
unciam unam.
Potio purgans et tonica. (*Pie.*)
℞. Mirobalanorum citrinarum
drachmas duas.
Rasurae Santali citrini
drachmam unam.
Rhei contusi . semidrachmam.
Mannae . . . . uncias duas.
Aquae bullientis quantum sufficit.
Colaturae adde
Confectionis hyacinthinae
drachmam unam.
Mixtura carminativa. (*Sm.*)
℞. Tincturae Rhei aquosae
uncias sex.

Liquoris anodyni mineralis
drachmam unam.
Gabe, ein Löffel bei oder vier Mal täglich.

Tinctura aperiens. (Ham.)
℞. Infusi Rhei aquosi,
Liquoris Terrae foliatae Tartari,
singulorum semunciam.
Vini Antimonii Huxhami
drachmam unam.

B. Auszug durch Wein.

Tinctura Rhei s. Rhabarbari vinosa, Vinum Rhei s. Rhei palmati aromaticum s. compositum, Elixir Rhei dulce s. compositum. (Am. An. B. Bel. Ed. Fenn. Gen. Lus. O. Suec. *C. Ca. Vm.*)
℞. Rhei . . . . . uncias duas.
Cinnamomi . drachmam unam.
Vini albi . . . . sesquilibram.
Macera per octo dies et cola. (Lus.)
℞. Rhei . . . . . partes octo.
Anisi stellati . . partem unam.
Vini Malacensis
partes nonaginta sex.
Digere frigide per octo dies, cola leviter exprimendo et filtra. (*Vm.*)
℞. Rhei . . . . . uncias duas.
Cardamomi minoris
drachmam unam.
Alcoholis (25°) . . uncias duas.
Vini albi Hispanici libram unam.
Post octo dies macerationis cola. (Bel.)
℞. Rhei . . . . . uncias duas.
Cardamomi minoris
drachmas duas.
Vini Hispanici . libram unam.
Digere per dies quatuor et cola exprimendo. (Fenn. Suec.)
℞. Rhei,
Alcoholis (0, 935),
singulorum uncias duas.
Caneliae albae drachmam unam.
Vini albi Hispanici
uncias quindecim.
Post dies septem filtra. (Am. B. Ed. *C. Ca.*)

Ams. eandem formulam sed Alcoholem 0,951.

℞. Rhei . . . . . uncias duas.
Corticis Aurantiorum mundati
semunciam.
Cardamomi minoris drachmas duas.
Vini albi . . . . libras duas.
Alcoholis . . . . uncias duas.
Post aliquot dies macerationis cola. (B*. O.)
℞. Rhei . . . . . unciam unam.
Cardamomi minoris drachmas duas.
Croci . . . drachmam unam.
Vini Hispanici . . uncias octo.
Digere per dies sex, cola et residuo infunde
Vini Hispanici . uncias quatuor.
Post horas viginti quatuor digestionis cola et colaturas ambas commisce. (An.)

Gen. Rhei uncias duas, Cardamomi semunciam, Croci drachmas duas et Vini Hispanici libras duas.

Reizend, gelind abführend, besonders bei Hypochondrie, Hysterie, Scrofeln und Drüsenverstopfung gerühmt. — Gabe, ein bis zwei Löffel für Erwachsene, dreißig bis sechszig Tropfen für Kinder.

Vinum Rhei s. Rhabarbari amarum, Elixir Rhei damarum. (D. Fenn. Suec. *Vm.*)
℞. Rhei . . . . . uncias duas.
Radicis Gentianae drachmas sex.
Cardamomi minoris semunciam.
Vini albi . . . . libras duas.
Digere blando calore et filtra. (D.)
℞. Rhei . . . . . unciam unam.
Radicis Gentianae drachmas duas.
Cancllae albae drachmam unam.
Vini Hispanici . libram unam.
Digere per tres dies et cola exprimendo. (Fenn. Suec.)
℞. Cinnamomi . . partem unam.
Vini Maderani
partes nonaginta sex.
Infunde frigide per duos dies et adde
Rhei . . . . . partes octo.
Post octo dies adde
Radicis Gentianae partem unam.
Post aliquot dies cola leviter exprimendo et filtra. (*Vm.*)

Reizend, tonisch. — Gebrauch und Gabe wie beim vorigen.

Tinctura Rhei vinosa s. Darelii s. dulcis. (B*. Ba. Bor. Bor4. Br. Han. Hass. HassP. Pol. Sax. Suec. *Pic. Vm.*)
℞. Rhei . . . . . partes octo.
Corticis Aurantiorum amarorum
partes duas.
Cardamomi minoris partem unam.
Radicis Inulae . partes quatuor.
Vini Maderani
partes centum viginti octo.
Macera frigide per plures dies, cola leviter exprimendo et filtra. (*Vm.*)
℞. Rhei concisi . . uncias duas.
Corticis Aurantiorum mundati
semunciam.
Cardamomi minoris drachmas duas.
Vini Malacensis . libras duas.
Digere, blando calore, per dies quatuor, cola exprimendo et adde
Extracti Inulae . . semunciam.
Sacchari albi . . uncias tres.
Serva. (Ba. Bor. Pol. Sax.)

Bor4. extractum Inulae omittit.

℞. Rhei pulverati . . uncias duas.
Passularum minorum unciam unam.
Corticis Citri,

sonders drei Arten in den Pharmacopöen angezeigt:

1) *Rhus Cotinus*, L.; Perückensumach, Venussumach; Fustet (*Gal.*); Coccigria (*Ang.*).

A. Fer.

Ein Baum (Pentandria Digynia, L.; Terebinthaceae, J.) des südlichen Europa's. (*Jacq.* Fl. Austr. t. 210.)

Man wendet die Rinde und die Blätter an.

Die Rinde (Cortex Cotini) ist außen glatt und weißlich.

Die Blätter sind verkehrt eirund, ganz, und auf beiden Seiten glatt. Sie haben einen styptischen, balsamischen und harzigen Geschmack.

Adstringirend, tonisch.

2) *Rhus Coriaria*, L.; Sumach, Gärberbaum; Sumac des corroyeurs (*Gal.*); Coriar's sumach (*Ang.*); Tumtum tum (*Ar.*); Zumague (*His.*); Sumack (*Bel.*); Sommaco (*I.*); Sumak (*Pe.*); Sumagro (*Lus.*).

Br. Fer. Gal. His. Wir. Wür. *A. Be. Br. G. M. Sp.*

Ein großer Strauch des südlichen Europa's. (*Blackw.* t. 486. *Plenck* t. 232. *Zorn* Ic. pl. t. 510.)

Man wendet die Blätter und die Früchte an.

Die Blätter (folia Sumac) sind gefiedert und bestehen aus funfzehen bis siebenzehen eirunden, sitzenden, oben behaarten, am Rande stumpf gezähnten Blättern von einem sehr adstringirenden Geschmack.

Die Beeren sind schön roth, von der Größe einer Linse und von adstringirendem saurem Geschmack.

Ein wenig gebrauchtes adstringirendes Mittel.

3) *Rhus Toxicodendrum et radicans*, *L.*; Giftbaum, Giftsumach, Wurzelsumach; Sumac vénéneux (*Gal.*); Common upright sumach, Poison oak (*Ang.*); Vergiftboom (*Bel.*); Sommaco radicante (*I.*).

Am. An. Ba. Bel. Ed. Fer. Gal. HassP. Lon. Sax. *Br. C. Fi. G. Par.*

Ein Bäumchen Nordamerica's. (*Hayne* Ic. 1. *Plenck* t. 235 236. *Schk.* t. 32. *Vogel.* Am. Med. Bot. III. t. 42. Düss. off. Pfl. III. t. 19. 20. *Dill.* Elth. 389. t. 291. fig. 375. *Bert.* Bild. III. 97. f. 1.)

Man wendet die Blätter (folia Rhois s. Rhuris Toxicodendri s. radicantis) an; sie sind dreizählig, die Blättchen gestielt, eckig gezähnt oder ganz und filzig. Sie haben eine solche Schärfe, daß die bloße Berührung und selbst wie man sagt, die Ausdünstungen die Haut heftig reizen.

Reizend, giftig, bei Flechten und Lähmung empfohlen.

Succus Toxicodendri. (*T.*)

Ut succus cichorii paratur.

Extractum Rhois radicantis et Toxicodendri. (An. B*. Bel. Gal. Han. HassP. Sax. *Fi. Sw*. T. Vm.*)

℞. Foliorum recentium Rhois Toxicodendri . . . quantum vis.

Contunde in mortario marmoreo, Aquae pauxillum adspergendo, et exprime succum, qui statim, continue, sub finem spathulae ligneae ope agitatus evaporet. (B*. Gal. Han. *Fi.*)

HassP. *T.* Faeculam antea a succo separatam post hujus evaporationem ad syrupi spissitudinem addere et totum in balneo aquae ad massae pilularis mollioris consistentiam redigere; — *T.* cum succo ad mellis et tunc ad pilularum consistentiam evaporato commiscere jubet pulveris foliorum quantum sufficit.

℞. Foliorum recentium Rhois Toxicodendri . . . quantum vis.

Contunde celeriter in mortario marmoreo, Aquae dimidium pondus addendo, cola succum exprimendo, sepone per temporis momentum, decantha supra cribrum setaceum et continue agitando ad extracti consistentiam inspissa. (*Vm.*)

℞. Foliorum recentium Rhois Toxicodendri,

Aquae frigidae,

singulorum partem unam.

Macera per horas duodecim et adde

Aquae bullientis . . . duplum pondus totius massae; post refrigerationem cola, albuminis ope clarifica, igni impone et liquorem, simulac spissescere coepit per pannum trajice, qui tunc continue agitatus sufficienter evaporet. (An. *Vm.*)

℞. Foliorum Rhois Toxicodendri libras duas.

Aquae bullientis . . libras decem.

Digere in vase tecto per horas viginti quatuor, tunc per unam coque; post refrigerationem decantha, exprime deinde folia, liquores commisce et sepositione depuratos ad aptam spissitudinem consume. (Bel.)

*Sw** coquere jubet binis vicibus sequentibus Foliorum siccorum partem unam in Aquae decem, per cribrum setaceum trajicere et colaturam consumere; — Sax. Coquere Foliorum siccorum partem unam in Aquae triginta ad quindecim remanentiam, per cribrum trajicere et colaturam inspissare.

T. praeterea succum filtratum in laminas fictiles lineae crassitiem effusum, vaporis vel solis ope siccare jubet.

Gabe, eine halbe Drachme vier Mal täg-

lich bis auf sechs Drachmen und selbst eine Unze gestiegen, in Zuckerwasser. Man hat es bis zu mehreren Unzen täglich gegeben.

Mixtura Extracti Rhois radicantis, Potio excitans. (B.)

℞. Extracti Rhois radicantis drachmam unam.
Aquae . . . . unciam unam.

Gabe, zehen Tropfen, allmälig bis auf einen Kaffeelöffel gestiegen, täglich zwei Mal, bei Lähmung der Extremitäten.

Pilulae Toxicodendri. (Fer. B. Sw*. Vm.)*

℞. Chlorureti Barii partem unam.
Extracti Rhois Toxicodendri partes sex.
Foliorum Rhois Toxicodendri pulveratorum . quantum sufficit.

Fiant pilulae granorum quatuor. — Gabe, drei Stück zwei oder drei Mal täglich, bei Flechten. *(Sw*. Vm.)*

℞. Foliorum Rhois Toxicodendri granum unum.
Pulveris Liquiritiae scrupulum unum.
Roob Sambuci quantum sufficit.

Fiant pilulae quatuor. — Den Tag über zu nehmen, bei Lähmungen nach Schlagfluß. (Fer. B.)

Tinctura Rhois radicantis. (Sax. Huf.)

℞. Succi Rhois radicantis recenter expressi,
Alcoholis concentrati,
singulorum partem unam.

Infunde frigide per plures dies et filtra. (Sax.)

Huf. Foliorum Rhois uncias duas, Alcoholis libram unam et tres dies infusionis.

Ribes.

Man findet von dieser Pflanzengattung besonders folgende drei Arten in den Pharmacopöen angezeigt:

1) *Ribes nigrum, L.*; schwarze Johannisbeere, Gichtbeere; Cassis, Groseillier noir (*Gal.*); Common black currant (*Ang.*); Rybes neb wjno, Jana cerna (*B.*); Saellaer (*D.*); Swarte winbaer (*Suec.*).

Ams. B. Bel. Br. D. Fenn. Ful. Gal. Gen. Hass. Li. R. Sax. Suec. Wir. *Be. Br. G. M. Fid. Sp. Z.*

Ein Strauch (Pentandria Monogynia, L.; Grossularieae, *J.*) aus dem Norden beider Continente. (*Blackw.* t. 285. *Plenck* t. 147. *Hayne* III. 26. *Zorn* Ic pl. I. 305.)

Die Früchte, welche man anwendet, sind kugelige, schwarze Trauben bildende Beeren und mehr gewürzhaft als sauer.

2) *Ribes rubrum, L.*; rothe Johannisbeere; Groseillier rouge (*Gal.*); Red currant (*Ang.*); Rybes, Neb wjno sjana cerwene (*B.*); Raede ribs (*D.*); Agracejo encarnada (*His.*); Rothe aalbezie (*Bel.*); Uva de prati (*I.*); Porzeczkie (*Pol.*); Smorodina krasnaja (*Lus.*); Raeda winbaer (*Suec.*).

Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Fer. Ful. Gal. Ham. Hass. HassP. Li. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. *Be. Br. Fi. G. M. Pid. Sp. Z.*

Ein Strauch, welcher in ganz Europa wächst. (*Hayne* III. 25. *Blackw.* t. 285. *Plenck* t. 146. Düss. off. Pfl. II. t. 11. Fl. méd. IV. 189. *Bert.* Bild. V. 78. f. 1.)

Man wendet die Früchte (baccae Ribesiorum s. Ribium rubrorum) an; es sind kleine, kugelige, sehr saftige Beeren, von rother oder gelblichweißer Farbe, ohne Geruch und säuerlichen und zuckerartigen Geschmacks, welche Trauben bilden.

3) *Ribes Grossularia et Uva crispa, L.*; Stachelbeere; Groseillier à maquereau (*Gal.*); Gooseberry (*Ang.*); Stikkebbaer (*D.*); Grossellero (*His.*); Kruisbezie (*Bel.*); Grispignolo (*I.*); Agrest (*Pol.*); Groselheira espin (*Lus.*); Steckelbaer (*Suec.*).

Fer. Gal. His. *Be. Br. G.*

Ein Strauch des nördlichen Europens. (*Blackw.* Herb. t. 277. *Bert.* Bild. V. 78. f. 2.)

Die Früchte, welche man anwendet, sind kugelige oder eiförmige, grünliche oder röthliche Beeren von der Größe einer Haselnuß, vor der Reife von saurem und adstringirendem, dann fadem und zuckerartigem Geschmack.

Conserva Foliorum Ribium nigrorum. (Vm.)

℞. Foliorum Ribium nigrorum et in pulpam tenellam redactorum partem unam.
Sacchari albi . . partes duas.

Contere et calefac in balneo aquae in vase clauso, donec saccharum solutum sit.

Succus Ribesiorum nigrorum. (Ful. F.)

℞. Baccarum Ribium nigrorum maturarum . . . quantum vis.

Contunde in mortario lapideo vel inter manus tere, massam per aliquot dies in cavam sepone, exprime fortiter, succum sepone, per pannum cola et in lagenis longicollibus serva.

Roob s. Gelatina Ribesiorum nigrorum.

(Ams. B. Bel. Li. R. Sax. *Sw.*)

℞. Baccarum Ribium nigrorum bene maturarum . . quantum vis,

Coque cum Aquae pauxillo in vase stanneo obtecto, continue agitando, donec baccae rumpantur; cola per cri-

Emulsionis gummosae uncias quatuor.
Allmälig zu nehmen. (*B.*)
℞. Ricini . . . . . uncias tres.
Mucilaginis Gummi Arabici drachmas duas.
Aquae Menthae . uncias octo.
Gabe, alle halbe Stunden zwei Löffel. (*Au.*)
℞. Olei Ricini . . unciam unam.
Gummi Arabici drachmam unam.
Syrupi Althaeae . . semunciam.
Aquae Florum Sambuci sesquiunciam.
Aetheris nitrici drachmam unam.
Laudani Sydenhami scrupulum unum.
Gabe, alle Stunden einen Löffel.
℞. Olei Ricini . . sesquiunciam.
Gummi Arabici drachmas duas.
Sacchari albi drachmam unam.
Aquae Menthae uncias quatuor.
Tincturae Opii guttas quadraginta ad quinquaginta.
Gabe, alle Stunden einen Eßlöffel. (*E.*)
℞. Olei Ricini . . . uncias tres.
Vitellum Ovi . . . . . no. 1.
Syrupi Althaeae . uncias duas.
Aquae . . . . uncias decem.
Gabe, alle halbe Stunden zwei Löffel (*Au*)
℞. Olei Ricini . . . uncias tres.
Sacchari albi . . . semunciam.
Vitellum Ovi . . . . . no. 1.
Aquae Rosarum . uncias decem.
Gabe, zwei Löffel alle halbe Stunden. (*Au.*)
℞. Olei Ricini . . . uncias duas.
Vitellum Ovi . . . . . no. 1.
Syrupi Althaeae . unciam unam.
Contere, sensim addendo
Aquae purae . . . uncias octo.
— Cinnamomi hordeatae drachmas duas.
Misce bene. (*Sm.*)

Gal. Olei unciam unam, Vitelli Ovi partem dimidiam, Aquae purae uncias duas, Aquae Florum Aurantiorum et Syrupi Sacchari, singulorum semunciam; — *Ca.* Olei unciam unam, Aquae purae uncias duas, Vitelli Ovi quantum sufficit, Syrupi Cichorii compositi et Aquae Florum Aurantiorum, singulorum semunciam; — *Vm.* Olei partes duas, Vitelli Ovi unam, Syrupi Sacchari, Aquae Florum Aurantiorum, singulorum unam et Aquae purae quatuor.
℞. Olei Ricini . . unciam unam.
Vitellum Ovi . . . . . no. 1.
Aquae Hyssopi . . uncias octo.
Magnesiae albae,
Mannae,
singularum drachmas duas.
Fiat emulsio. (*Pie.*)

Haustus cathartici oleosus, Potio purgans, Mixtura laxans. (*Au. B. Bo. ParC. Ra. Sw.*)
℞. Olei Ricini . . . uncias duas.
Syrupi Limonum unciam unam.
Misce. (*Ra.*)

Ra. praeterea Olei et Syrupi Cichorii partes aequales; — *Bo.* Olei et Syrupi Florum Persicae partes aequales.
℞. Olei Ricini unciam unam ad duas.
Syrupi Sacchari unciam unam.
Gummi Arabici drachmas duas.
Aquae purae . uncias quatuor.
Fiat potio. (*Ra.*)
℞. Olei Ricini unciam unam ad duas.
Syrupi tartarici unciam unam.
Aquae Cichorii . . uncias duas.
Misce. (*Ra.*)

Ra. etiam Olei, Syrupi Rhamni, singulorum uncias duas, Aquae Menthae unciam unam; — vel Olei, Syrupi Cichorii, singulorum uncias duas, Aquae Menthae drachmas duas; — vel Olei drachmas sex, Oxymellis scillitici semunciam et Syrupi Rhamni unciam unam.
℞. Olei Ricini . . unciam unam.
Aquae Vitae,
Sacchari, singulorum semunciam.
Misce. (*Sw.*)
℞. Olei Ricini . . . . uncias duas.
Decocti Carnis . . uncias tres.
Auf einmal zu nehmen. (*B.*)
℞. Olei Ricini . . unciam unam.
Decocti Carnis cum Herbis uncias quatuor.
Misce. (*Sp.*)
℞. Olei Ricini . . . uncias tres.
Saponis medicinalis semunciam.
Syrupi Corticum Aurantiorum uncias tres.
Gabe, alle halbe Stunden einen Löffel. (*Au.*)
℞. Olei Ricini . . . uncias tres.
Subcarbonatis Potassae drachmam unam.
Mellis . . . . unciam unam.
Aquae Tiliae . . uncias decem.
Gabe, zwei Löffel alle zwei Stunden. (*Au.*)

Potio anthelmintica oleoso - aromatica. (*B.*)
℞. Olei Ricini,
Aquae Menthae piperitae, singulorum uncias duas.
Auf einmal zu nehmen.

Clysma emolliens anthelminticum, Enema vermifugum. (*B.*)
℞. Olei Ricini . . . uncias tres.
Decocti Seminis Lini uncias quatuor.

Robinia.

Robinia Pseudo-Acacia, L.; Unächter Acacienbaum; Robinier, Faux Acacia (*Gal.*); False Acacia (*Ang.*).

Gal.

Ein Baum (Diadelphia Decandria, L.; Leguminosae, *J.*), welcher in America einheimisch und in Europa angepflanzt ist. (Nouv. Duh. II. t. 16.)

Die Rinde wirkt purgirend und brechenerregend.

Rosa.

Fünf Arten dieser Pflanzengattung werden in den Pharmacopöen angezeigt:

1) *Rosa Centifolia, L.*; Centifolienrose; Rosier à cent feuilles (*Gal.*); Hundred leav'd rose (*Ang.*); Ruze cerwena (*B.*); Fyld rose, raed rose (*D.*); Rosa de Alexandria (*His.*); Damask rozen (*Bel.*); Roze centijfoliie (*Pol.*); Rosa (*R.*); Rosor (*Suec.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Ham. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. *Be. Br. C. Fi. G. M. Pid. Sp.* Z.

Ein Strauch (Icosandria Polygynia, L.; Rosaceae, *J.*), welcher in allen Europäischen Gärten cultivirt wird. (*Zorn* Ic. pl. t. 600.)

Man wendet die Blüthen (flores Rosarum incarnatarum s. pallidarum, petala Rosae Centifoliae) an; sie haben eirunde, ganze, blaßrosenrothe Blätter von sehr angenehmem Geruch, welcher sich beim Trocknen fast ganz verliert; der Geschmack ist etwas bitter, scharf und styptisch.

2) *Rosa moschata, Ait.*; Moschusrose; Rose musquée (*Gal.*).

Gal.

Ein in Nordafrica einheimischer Strauch.

Die Blüthen dienen, nach Willdenow, zur Bereitung der Rosenessenz.

3) *Rosa alba, L.*; weiße Rose; Rose blanche (*Gal.*).

Br. Gal. Wir. *Be. M. Sp.* Z.

Ein in ganz Europa verbreiteter Strauch. (*Oed.* Fl. Dan. t. 1215.)

Die Blüthen (flores Rosae albae) haben einen angenehmen Geruch und einen etwas bittern, styptischen Geschmack.

4) *Rosa gallica, L.*; Essigrose, Provinzrose, Damascenerrose; Rose rouge, Rose de Provins (*Gal.*); Red rose (*Ang.*); Edike rose (*D.*); Rosa rubra, Rosa castellana (*His.*); Fransche rosen (*Bel.*); Roza damascenskie (*Pol.*); Rosa vermelha (*Lus.*); Raettikeroser (*Suec.*).

Ams. An. B. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Gal. GalM. Gen. Han. Hass HassP. His. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. WW. *Be. Br. C. Fi. G. M. Sp.*

Ein Strauch des südlichen Europa's. (*Blackw.* Herb. t. 82. *Plenck* t. 402. Düss. off. Pfl. IX. t. 21.)

Man wendet die Blüthen (flores Rosae rubrae, petala Rosae gallicae) an, wenn sie noch nicht ausgebreitet und von den Nägeln getrennt sind.

5) *Rosa canina, L.*; Hundsrose; Hahnbuttenstrauch, Hagebutten; Rosier sauvage, Églantier (*Gal.*); Dogrose (*Ang.*); Sypek, Plana ruze (*B.*); Hybentorn (*D.*); Rosa silvestre (*His.*); Hondsrose (*Bel.*); Rosa selvatica, Cinorodon, Cynosbato, Grattaculo, Paterlenga (*I.*); Roza pulna (*Pol.*); Rosa brava (*Lus.*); Niupon (*Suec.*).

Ams. An. Br. D. Ed. Fer. Ful. Gal. Gen. His. Lon. LonN. Wir. *Be. Br. C. Fi. Pid. Sp.* Z.

Ein Strauch, welcher in ganz Europa wächst. (*Blackw.* t. 8. *Plenck* t. 404. *Zorn* Ic. pl. t. 529.)

Man wendet die Blüthen, die Früchte und die Saamen an.

Die Blüthen (flores Rosae sylvestris s. rubrae vulgaris) haben rosenrothe oder fast weiße Blätter von einem süßen und angenehmen Geruch; sie führen gelind ab.

Die Frucht, Hagebutte, Hahnbutte (fructus Cynosbati, Cynorrhodon) Gratte-cul (*Gal.*) ist eine eirunde, glatte, scharlachrothe Beere, welche man, nachdem man die Saamen und die ihnen anhängenden Borsten herausgenommen, trocknet, oder aus denen man auch das breiige Fleisch auspreßt (pulpa baccarum Cynosbati expressa). Der Geschmack ist etwas styptisch. Man hält sie für harntreibend und krampfstillend; doch ist es wohl eher ein adstringirendes und sehr kräftig reizendes Mittel, dessen Mißbrauch Husten, Erbrechen und Tenesmus verursacht.

Die Saamen (semina Cynosbati) sind länglich, eckig, hart und behaart. Man wendet sie heutzutage nicht mehr an.

Alle diese Pflanzen sind mehr oder weniger adstringirend und tonisch.

Succus Rosarum pallidarum. (Gal. His. Sar.)

℞. Petalorum Rosarum pallidarum mundatorum . quantum vis.

Contunde in mortario marmoreo vel ligneo et cola fortiter exprimendo; succum filtratum in lagenis a strato olei obtectum serva. (Gal. His.)

Sar. Flores in saccum inclusos sub

Aquam bullientem demergere, saccum tam diu suspensum tenere quam aqua viridescens profluat, et simulac haec rubra prodit, exprimere.

Conserva s. Confectio Rosae s. Rosarum. (Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pal. Pol. R. Sar. Sax. Suec. Wir. Würr. *Br. C. Ca. Fi. Pid. Sw. T. Vm.*)

℞. Petalorum Rosarum recentium et mundatorum . partem unam.

Contunde in mortario lapideo pistilli lignei ope; pulpae sensim adde

Sacchari pulverati . partes duas.

Fiat massa homogenea. (An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Ful. Ham. Hass. HassP. His. O. Pal. Pol. R. Sax. Wir. Würr. *Br. Sw. Vm.*)

Am. Ams. Du. Ed. Li. Lon. LonN. *C.* Rosarum partem unam et tres Sacchari; — GalM. et Suec. Rosarum et Sacchari partes aequales.

℞. Petalorum Rosarum recentium partes quindecim.

Sacchari pulverati partes triginta.

Contere, pulpam per cribrum e crinibus confectum trajice et adde

Sacchari albi ad electuarii consistentiam cocti et parumper refrigerati partes centum viginti.

Misce sedulo. (Gal.)

T. Petalorum uncias sex, Sacchari duas et colaturae addere Sacchari ad plumam cocti libras quatuor; in evaporatorio vel soli exposita ad crustae apparitionem evaporare.

℞. Petalorum Rosarum recentium libram unam.

Contunde in mortario vitreo, sensim addendo

Syrupi Sacchari spississimi libras duas.

Humidum blando igne ad aptam consistentiam usque consume. (His.)

℞. Rosarum rubrarum mundatarum libram unam.

In saccum inclusas per aliquot tempus sub Aquam bullientem demerge, saccum tamdiu suspensum tene, donec aqua rubra profluere coeperit, exprime tunc fortiter, contunde faeces in mortario et coque cum Sacchari clarificati libris tribus, succum expressum sensim addendo, ad consistentiam conservae. (Sar. *Fi.*)

℞. Petalorum Rosarum siccatorum pulveratorum partes nonaginta.

Aquae Rosarum quantum sufficit ut massa pulpaeformis obtineatur. Macera per horas sex, saepius agitando, adde Sacchari in Aqua Rosarum soluti et ad crystallisationis punctum cocti partes mille et sedulo in mortamario rmoreo pistilli lignei ope commisce. (Gal.)

GalM. Aquam communem, sex horas digestionis blando calore et mixtionem pulpae cum Sacchari quantitate aequali; — Lus. Pulveris uncias tres, Aquae Rosarum uncias octo, horas sex infusionis et Sacchari albi sesquilibram; — *Ca.* Pulveris uncias sex, Aquae Rosarum sufficientem quantitatem et Sacchari semilibram; — Fer. *Fi. T.* Pulveris uncias tres, Aquae Rosarum octo et Sacchari libras duas.

℞. Pulveris Petalorum Rosarum uncias tres.

Aquae Rosarum . uncias octo.

Post aliquot dies macerationis adde

Sacchari albi . . sesquilibram

antea cum Aquae sufficiente quantitate ad syrupum spissum redacti et misce exacte. (Gen.)

Gabe, eine halbe bis eine Drachme.

Conserva Rosarum vitriolata. (Br. Sar. Wir. *T.*)

℞. Conservae Rosarum libram unam.

Acidi sulphurici drachmam unam.

Misce bene. (Br. Sar.)

Wir. Acidi sulphurici duplum; — *T.* Spiritus Vitrioli guttas decem pro uncia una.

Conserva Rosarum mercuriata s. anthelmintica. (*Fi.*)

℞. Conservae Rosarum rubrarum recentium . . . sesquiunciam.

Mercurii purissimi unciam dimidiam.

Agita ad extinctionem mercurii. — Gabe, für Kinder eine halbe bis ganze, für Erwachsene zwei Drachmen und nach Erforderniß mehr.

Tabellae rosatae s. Manus Christi, Conserva Rosarum sicca, Saccharum rosatum. (Br. Pal. Sar. Wir. *Sp. T.*)

℞. Petalorum Rosarum rubrarum siccorum . . . unciam unam.

Sacchari ad congelationis punctum cocti . . . uncias sedecim.

Misce bene, ut fiant tabellae. (Wir. *Sp.*)

Br. Pulveri Rosarum antea adspergere jubet Acidi sulphurici guttas duodecim; — Pal. Pulveris drachmas sex et Sacchari cocti uncias quatuor.

℞. Rosarum siccarum unciam unam.

Sacchari albi ad consistentiam tabulati cocti . . sesquilibram.

Succi Citri . . drachmas duas.

Rosis pulveratis adsperge succum Citri et totum cum saccharo bulliente commisce; fiant tabellae. (Sar.)

℞. Sacchari albi . . libram unam.

Aquae Rosarum quantum sufficit.

Coque ad aptam consistentiam, ut fiant tabellae. (Pal.)

Addendo sub finem Margaritarum praeparatarum semunciam, *Saccharum perlatum* obtinebis.

T. ut rotulas Menthae piperitae.

Tabellae diarrhodon. (Sar.)

℞. Pulveris diarrhodon sesquiunciam.
Sacchari albi . . libram unam.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae quantum sufficit

ut fiant tabellae.

Pulpa Cynorrhodontos. (Gal. *T.*)

℞. Fructuum Cynosbati nondum penitus maturorum partes sedecim.

Umbilico et pediculo rescisis et seminibus separatis reliquum macera per tres vel quatuor dies in Vini albi partibus duabus ad mollitiem completam usque, contunde deinde pistilli lignei ope in mortario marmoreo et pulpam per cribrum setaceum arctioris texturae trajice.

Conserva s. Confectio s. Roob Cynosbatos s. Rosae gallicae s. Fructus Rosae caninae. (B*. Ed. Ful. Gal. Gen. Lon. LonN. Lus. Pal. Sar. Wir. *Fi. Sw. T. Vm.*)

℞. Pulpae Cynorrhodontos,
Sacchari albi,
singulorum libras tres.

Evaporent blando igne ad aptam usque consistentiam. (Gen. *Sw.*)

Ful. et Pal. Pulpae libras duas et unam Sacchari; — Wir. Pulpae libras tres et duas Sacchari; — Lus. et *Vm.* Pulpae partem unam et duas Sacchari; — B*. Ed. et Sar. Pulpae partem unam et tres Sacchari; — Lon. LonN. Pulpae libram unam et Sacchari uncias viginti; — Gal. *Fi. T.* Pulpae partem unam et Sacchari ad consistentiam electuarii cocti (Syrupi ad pennam cocti) unam cum dimidia.

Schwach adstringirend, harntreibend, krampfstillend, magenstärkend. — Gabe, vier bis zwölf Drachmen.

Electuarium adstringens Fulleri, Conserva Rosarum rubrarum adstringens. (His. *B. Bo. Pie. Sm.*)

℞. Conservae Rosarum rubrarum uncias duas.
Diascordii . . . . semunciam.
Boli Armenae . drachmas duas.
Sanguinis Draconis sesquidrachmam.
Balaustiorum . semidrachmam.
Olei Nucis moschatae,
— Cinnamomi,
singulorum guttas duas.
Syrupi Rosarum rubrarum unciam unam.

Misce. (His.)

℞. Conservae Rosarum rubrarum uncias quatuor.
Nitri . . . drachmam unam.
Syrupi Diacodii unciam unam.
Aquae Florum Aurantiorum drachmas duas.

Misce. (*Bo. Pie. Sm.*)

℞. Conservae Rosarum rubrarum uncias quatuor.
Syrupi Balsami Tolutani unciam unam.

Misce. (*B.*)

℞. Conservae Cynorrhodon uncias quatuor.
Syrupi Granati drachmas duas.
— Papaveris albi unciam unam.
Nitri . . . . scrupulos duos.

Misce. (*Sm.*)

Bei Blutspucken. — Gabe, einen Kaffeelöffel alle zwei oder drei Stunden.

Electuarium traumaticum. (Br.)

℞. Conservae Rosarum rubrarum uncias duas.
Balsami Locatelli unciam unam.
Syrupi balsamici . semunciam.

Misce.

Linctus communis, Mixtura adstringens. (*Sa. Sm.*)

℞. Olei Olivarum uncias duas cum dimidia.
Conservae Cynorrhodon semunciam.
Syrupi Papaveris unciam unam.

Misce. (*Sa.*)

℞. Conservae Rosarum rubrarum uncias duas.
— Rorismarini,
— Inulae,
Syrupi Succini,
singulorum unciam unam.

Misce exacte. (*Sm.*)

Gabe, ein Kaffeelöffel, täglich drei Mal. — Bei veralteter Leukorrhoe.

Tisana adstringens. (*Bo. Pie. Sm.*)

℞. Florum Verbasci manipulum unum.
Aquae . . . . octarium unum.

Coquendo dimidium consume et in colatura solve

Conservae Rosarum rubrarum unciam unam.

Von Fouquet gegen Ruhr empfohlen.

Infusum s. Mucharum s. Brodium Rosarum. (Fer. Hass. His. Li. Sar. Wir. *Fi. Pid.*)

℞. Petalorum recentium Rosarum libras duas.
Aquae bullientis . . libras octo.

Digere per dies octo, cola leviter

exprimendo, colaturam aequali novorum Florum quantitati infunde, operationem tertia vice repete et liquorem denique in lagena longicolli a strato olei obtectum serva. (Sar.)

℞. Petalorum Rosarum recentium,
Aquae bullientis,
singulorum libras octodecim.

Post horas viginti quatuor macerationis cola, et liquorem in lagena a strato olei obtectum serva. (Wir.)

His. Rosarum libram unam, Aquae duas et octo dies infusionis; — Hass. et *Pid.* Rosarum rubrarum libram unam, Aquae octarium unum et aliquot dies infusionis; — Li. Florum et Aquae partes aequales et tres dies digestionis; — Fer. *fi.* Florum et Aquae partes aequales et duodecim horas digestionis.

Dieſer Aufguß dient beſonders zur Bereitung des Roſenſyrups und des Roſenhonigs.

Infusum Rosae acidulum s. compositum s. adstringens. (Am. B*. Du. Ed. Gen. His. Lon. LonN. Suec. *Br. C. Ra.*)

℞. Petalorum Rosarum rubrarum siccatorum . . . . semunciam.
Aquae bullientis
octarios duos cum dimidio.
Acidi sulphurici Aqua diluti
drachmas tres.

Macera per semihoram, cola et adde
Sacchari albi . . sesquiunciam.
Liqua. (Am. B*. Lon. LonN. Suec. *C.*)

Ed. Rosarum unciam unam, Aquae libras duas cum dimidia, Acidi semunciam, quatuor horas digestionis et Sacchari unciam unam; — Du. Rosarum semunciam, Aquae libras tres, Acidi drachmas tres, horam dimidiam infusionis et Sacchari sesquiunciam; — *Br**. Rosarum unciam unam, Aquae libras quinque, Acidi sulphurici drachmam unam, infusionis horas viginti quatuor et Sacchari uncias duas; — His. Rosarum semunciam, Aquae libras tres, horae quadrantem infusionis, Acidi scrupulum unum et absque saccharo; — *Ra.* Rosarum semunciam, Aquae libram unam, Sacchari sesquiunciam et Acidi semidrachmam; — Gen. Rosarum semunciam, Aquae libras duas cum dimidia, Acidi scrupulum unum, et Sacchari sesquiunciam.

Schmach abſtringirend, ſäuerlich. — Dieſer Aufguß, welcher ſelten allein verordnet wird, dient beſonders, um wäſſerigen Getränken Farbe und einen ſäuerlichen Geſchmack zu geben. Auch wendet man ihn als Vehikel verſchiedener Arzneimittel an; man ſetzt ihn ebenfalls zu Gurgelwaſſern; doch verordnet man ihn auch bisweilen in paſſiven, d. h. von keiner Reizung herrührenden Blutflüſſen.

Infusum (Thé) haemastaticum. (*Pie.*)

℞. Florum Rosarum siccatorum
semunciam.
Aceti albi cochlearia tria majora.
Sacchari . . . unciam unam.
Aquae bullientis . libras duas.

Post duas horas infusionis cola. — Taſſenweiſe den Tag über. — Gegen Diarrhoe und Blutflüſſe.

Infusum adstringens. (*Bo.*)

℞. Rosarum rubrarum,
Quinque Myrobalanorum contusorum, singulorum semunciam.
Aquae communis libram unam.

Digere inter cineres calidos, cola et colaturae adde
Syrupi Granati . . semunciam.

Abſtringirend, bei Diarrhoe und Blutflüſſen empfohlen. — Auf drei oder vier Mal den Tag über zu nehmen.

Syrupus Rosarum rubrarum s. Rosae Gallicae s. e Rosis siccis, Rhodosaccharum. (Ams. An. Bel. Ed. Gal. His. Wir. *C. Fi. T. Vm.*)

℞. Succi Rosarum rubrarum depurati
libras duas.
Sacchari albi . . libras quatuor.
Aquae . . . quantum sufficit.

Coque ad consistentiam syrupi. (His.)

℞. Petalorum Rosarum rubrarum recentium . . . libras quatuor.
Aquae bullientis . libras octo.

Infunde per horas duodecim in vase tecto; exprime leviter, sepone per horas aliquot, decantha et liquori adde
Sacchari albi . . . . duplum.

Fiat balne aquae ope syrupus. (Gal.)

Wir. Rosarum siccarum semilibram, Aquae bullientis sesquilibram, viginti horas macerationis et pro unciis novem colaturae Sacchari uncias sedecim; — An. et Bel. Florum libram unam, Aquae tres, horas duodecim digestionis et quatuor libras Sacchari.

℞. Petalorum Rosarum rubrarum recentium . . . partem unam.
Aquae frigidae . . partes tres.
— bullientis . partes septem.

Infunde per horas sex, trajice per cribrum absque diu continuata expressione et adde
Sacchari albi . partes quatuor.

Clarifica, ut fiat syrupus. (*Vm.*)

℞. Petalorum Rosarum rubrarum siccorum . . . partem unam.

Aquae bullientis partes novem.
Macera per horas duodecim, coque deinde parumper, cola et colaturae adde
Sacchari albi . . partes decem.
Fiat coquendo syrupus. (Ed. *C.*)

℞. Petalorum Rosarum rubrarum siccatorum . . . uncias octo.
Aquae bullientis libras quinque cum dimidia.
Digere per horas duodecim, coquendo dimidium consume, cola exprimendo, seponendo depura et ita inspissa, ut addendo
Sacchari puri . uncias sedecim syrupus absque coctione paretur. (Ams.)
T. ut syrupum florum Persicae.

Syrupus Rosae s. de Rosis pallidis s. Rosarum pallidarum s. rosatus simplex s. Rosarum solutivarum s. rosatus solutivus. (Ams. An. Ed. Fer. Gal. Gen. His. Lon. LonN. Sar. Wir. *C. Fi. T. Vm*)

℞. Succi Rosarum pallidarum expressi,
Sacchari albi,
singulorum partes aequales.
Coque, blando igne, ad consistentiam syrupi. (Gal.)
Sar. loco sacchari Syrupum communem.

℞. Petalorum Rosarum pallidarum recentium . . . partem unam.
Aquae bullientis partes quatuordecim.
Macera per horas duodecim, cola et colaturae adde
Sacchari albi . . . partes tres ut fiat coquendo syrupus. (Ed. *C.*)

His. Petalorum partes tres, Aquae bullientis sex, horas duodecim infusionis et Sacchari partes duas; — Per. Petalorum partem unam, Aquae bullientis octo, infusionis horas viginti quatuor et Sacchari partes sex; — *Fi.* Rosarum pallidarum uncias sex, Aquae bullientis libras quatuor, digestionem inter cineres calidos per horas duodecim et post colationem, adjectis albuminibus duobus et Sacchari libris tribus, coctionem ad syrupi spissitudinem.

℞. Petalorum Rosarum pallidarum recentium . . . partem unam.
Contundendo in pastam redige et infunde
Aquae fervidae partes duas cum dimidia.
Post horas duodecim maceration's cola leviter exprimendo, et colaturae adde
Sacchari albi . pondus aequale.
Clarifica et ad syrupi consistentiam inspissa. (*Vm.*)

℞. Petalorum Rosarum pallidarum recentium . . libras duodecim.
Contunde in mortario marmoreo, tunc infunde per horas duodecim in
Aquae . . . . libris quatuor.
Liquori expresso adde
Sacchari albi . libras quatuor.
Clarifica et coque blando calore ad consistentiam syrupi. Singulis libris syrupi adde libram unam syrupi frigidi praeparati cum
Aquae Rosarum pallidarum drachmis decem.
Sacchari albi . . unciis duabus.
Misce bene. (An.)

℞. Sacchari puri . . libras duas.
Aquae fontanae quantum sufficit.
Coque ad consistentiam syrupi, quem bullientem infunde
Petalorum recentium Rosarum pallidarum . . . libris duabus.
Post tres dies macerationis coque leviter et cola fortiter exprimendo. (Gen.)

℞. Petalorum recentium Rosarum pallidarum . . . libram unam.
Aquae bullientis libras quatuor.
Macera per horas duodecim, tunc coquendo dimidium consume, continue agitando; cola cum expressione et colaturae sepositione depuratae adde
Sacchari puri . . libras duas.
Coque ad consistentiam requisitam. (Ams.)

℞. Petalorum siccorum Rosarum pallidarum . . . uncias septem.
Aquae fervidae octarios quatuor.
Macera per horas duodecim, redige vaporatione in balneo aquae ad remanentiam liquidi octariorum duorum cum dimidio, adde deinde
Sacchari puri . . . libras sex.
Liqua in balneo aquae. (Lon. LonN.)

Fi. Rosarum pallidarum libras sex et Aquae communis duodecim in alembicum ingerere, destillando libras quatuor aquae odorosae abstrahere; quod in alembico remanet fortiter exprimere et hoc fluidum sepositione depuratum cum Sacchari libris duabus et dimidia ad syrupi consistentiam coquere; — *T.* ut syrupum florum Persicae.

℞. Petalorum Rosarum pallidarum libras quatuor.
Aquae bullientis . libras octo.
Infunde per horas viginti quatuor, tunc cola fortiter exprimendo; colaturam digere supra novam quantitatem Rosarum, operationem tertia vice repete et supremi liquoris unciis novem adde
Sacchari albi . uncias sedecim ut fiat syrupus. (Br. Pal. Wir.)

Dieß iſt der *Syrupus Rosarum solutivus.* Der *Syrupus Rosarum simplex* wird mit demſelben dreifachen Aufguß, aber bloß mit zwei und dreißig Unzen Zucker auf anderthalb Pfund Flüſſigkeit bereitet.

Syrupus Rosarum solutivus cum Senna s. de Senna rosaceus s. Rosarum compositus. (Ams. Ba. Wür.)

℞. Petalorum recentium Rosarum pallidarum . . . libram unam.
Aquae bullientis . . libras sex.
Macera per horas duodecim, tunc coque ad librarum quatuor remanentiam, cola exprimendo et macera in liquore per horas duas
Foliorum Sennae mundatorum uncias octo.
Cola exprimendo. Liquori sepositione depurato adde
Sacchari puri . . libras duas.
Coque ad consistentiam syrupi. Post refrigerationem adde
Olei essentialis Anisi,
— — Foeniculi,
singulorum guttas quinque.

Wür. infundere jubet Sennae unciae uni libras duas infusi Rosarum pallidarum et post aliquot horas digestionis colaturae addere duplum Sacchari puri ad parandum syrupum; — Ba. infundere per semihoram Petalorum partem unam et duas Sennae in Aquae fervidae octoginta octo et cuique parti colaturae addere Sacchari partes duas.

Mel rosatum s. rosaceum s. de Rosis s. Rosae Gallicae, Rhodomel, Mellitis Rosarum. (A. Ams. An. B. Ba. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. His. L. Lon. LonN. Lus. O. Pal. Pol. R. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. *Br. C. Fi. Pid. Sp. Sw. T. Vm.*)

℞. Petalorum siccorum Rosarum rubrarum . . . uncias decem.
Aquae bullientis . . libras sex.
Macera per horas duodecim, tunc coque blando igne; cola exprimendo, sepone, decantha et adde
Mellis despumati libras quatuor.
Evaporent lente ad syrupi consistentiam. (B.)

An. et GalM. Rosarum siccarum partem unam, Aquae quatuor, horas duodecim digestionis et Mellis partes sex; — Br. et Wir. Rosarum recentium partes sex, Aquae tantidem, digestionis horas viginti et Mellis partes sex; — Pal. Rosarum recentium partes novem, Aquae duodecim, reductionem ad quinque colaturae et Mellis quatuor; — Han. O. Pol. et *Sw.* Rosarum siccarum partes octo, Aquae quatuor, duodecim horas digestionis et Mellis partes octo; — Ed. Rosarum siccarum partem unam, Aquae duodecim, horas sex digestionis et Mellis partes sedecim; — Fenn. Lus. et Suec. Rosarum siccarum partem dimidiam, Aquae tres, horas duodecim digestionis et Mellis partes sex; — Bor. Rosarum siccarum partes quatuor, Aquae octo, horas duodecim digestionis et Mellis partes octo; — Bor4. HassP. *Fi.* Rosarum incarnatarum uncias octo, Aquae libras quatuor, digestionem per noctem et Mellis despumati libras octo; — *T.* Petalorum uncias sedecim, Aquae Rosarum libras octo, duodecim horas infusionis et Mellis libras octo; — Ba. Rosarum siccarum partem unam, Aquae octo, horas tres digestionis et Mellis duplum colaturae; — A. et R. Rosarum siccarum partes tres, Aquae duodecim, tres horas digestionis et Mellis partes viginti quatuor; — *Br.* Rosarum siccarum partem unam, Aquae quatuor, horas sex digestionis et Mellis partes quinque; — *Sp.* Rosarum partes sex, Aquae tant dem, viginti quatuor horas digestionis et Mellis octo partes; — Sax. Rosarum siccarum partem unam, Aquae sex, duodecim horas digestionis Mellis, colaturae pondus duplum; — Du. Lon. LonN. et *C.* Rosarum uncias quatuor, Aquae octarios tres, horas sex digestionis et Mellis libras quinque; — Gen. Rosarum siccarum uncias tres, Aquae libras duas, aliquot horas digestionis et Mellis libras duas cum dimidia; — Ams. Rosarum siccarum uncias octo, Aquae libras sex, horas duodecim macerationis et Mellis despumati libras duas.

℞. Petalorum Rosarum rubrarum partem unam.
Aquae . . . . . partes octo.
Infunde binis vicibus, singulâ absque expressione cribrando; cum colatura albumen unum vel duo subige, ebulliant et per pannum colentur; adde
Sacchari albi . . partem unam.
Mellis albi . . partes quinque.
Evaporent ad syrupi consistentiam. (*Vm.*)

℞. Petalorum siccorum Rosarum rubrarum . . . partem unam.
Decocti Calicum Rosarum a petalis separatorum partes quatuor.
Infunde per horas duas, cola absque expressione et colaturae adde
Mellis electi . . . partes sex.
Albuminis ope clarificata ad syrupi consistentiam evaporent (Gal.).

GalM. eundem agendi modum sed loco decocti calicum Aquam adhibet.

Durch letzteres Verfahren kommt eine große Menge Gerbestoff und Gallapfelsäure in das Product. Henry bemerkt außerdem, daß das zum Abklären angewandte Eiweiß nothwendig einen Theil des wirksamen Stoffs, durch seine Verbindung mit einem großen Theile des Gerbestoffs, vernichten müsse.

℞. Succi depurati vel Infusi saturati Rosarum rubrarum partem dimidiam.
Mellis crudi . . partem unam.
Commisce bene. (Hass.)

Pid. ad syrupi consistentiam coquere jubet Infusi Rosarum saturati uncias novem et Mellis despumati libram unam; — His. Succi depurati Rosarum et Mellis communis, singulorum partes aequales; — Sar. Succi depurati partem unam et Mellis despumati partes duas; — Li. Infusi partem unam et quatuor Mellis; — Wür. Infusi unam et duas Mellis; — Fer. Infusi et Mellis, singulorum partes aequales.

℞. Aquae Rosarum . unciam unam.
Mellis despumati uncias quatuor.
Misce. (D. Fer. Ful.)

Die Verschiedenheiten in der Bereitung sind von keiner besondern Wichtigkeit, da man sich dieses Honigs nur fast äußerlich bedient. Er ist adstringirend und wird daher in dieser Eigenschaft zu Gurgelwassern, Collutorien, Einspritzungen angewendet.

Mel rosatum solutivum. (Sar. Wir. *Fi.*)

℞. Mellis boni . . . libras duas.
Succi Rosarum pallidarum libras tres.

Coque, despuma, et lente ad consistentiam requisitam consume. (Wir.)

Sar. Mellis et Succi depurati partes aequales; — *Fi.* Infusi Rosarum, Mellis despumati, singulorum partes aequales ad aptam consistentiam redigere jubet.

Selten innerlich, zuweilen zu Klystiren. — Gabe, von anderthalb bis zwei Unzen.

Gargarisma commune s. detergens. (GalM. Gen. *Ra. Sm. Sp.*)

℞. Infusi Rosarum aciduli semilibram.
Mellis rosati . . unciam unam.
Misce. (Gen.)

℞. Mellis rosati . partes quindecim.
Decocti Hordei . partes centum.
Misce bene. (GalM.)

Ra. Mellis rosati unciam unam et Decocti Hordei libram unam.

℞. Foliorum Agrimoniae manipulum unum.
— Salviae pugillum unum.
Aquae . . . semisextarios tres.

Coque per horae quadrantem et colaturae adde
Mellis rosati . . . uncias duas.
Misce bene (*Sm.*)

℞. Hordei integri . unciam unam.
Aquae . . uncias triginta duas.

Decoque ad dimidii remanentiam et adde
Foliorum Agrimoniae,
— Rubi,
singulorum pugillos duos.

Cola et in colatura solve
Nitri . . . . drachmam unam.
Mellis rosati . . unciam unam.
Misce bene. (*Sp.*)

Collutorium detergens s. adstringens. (B.)

℞. Mellis rosati . . unciam unam.
Decocti Hordei . libram unam.
Tincturae Laccae guttas viginti.
Misce.

℞. Mellis rosati . . unciam unam.
Spiritus Cochleariae,
Liquoris Hoffmanni,
singulorum guttas triginta.
Decocti Hordei libras duas.
Misce.

℞. Mellis rosati . . unciam unam.
Decocti Hordei . libram unam.
Liquoris Hoffmanni guttas triginta.
Misce.

Tinctura Rosarum. (*Vm.*)

℞. Petalorum recentium Rosarum Provincialium . partem unam.
Aquae Vitae . partes quatuor.

Macera frigide per dies duos, cola exprimendo et filtra.

Acetum Rosae s. Rosarum. (Bor. Bor4. Br. D. Fer. Han. HassP. His. Lus. O. Pal. Pol. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. *Fi. T. Vm.*)

℞. Petalorum Rosarum rubrarum partem unam.
Aceti rubri . . partes sedecim.

Macera per horas quatuordecim in vase tecto, subinde agitando, cola et filtra.

Sar. Rosarum partem unam, Aceti quatuor, sex dies macerationis et infusionem semel vel bis repetitam supra novas Flores, ita ut acetum magis saturatum obtineatur; — Bor. D. Fer. Han. O. Pol. Sax. et *Vm.* Rosarum partem unam, octo Aceti et dies decem frigidae macerationis; — Bor4. Rosarum rubrarum uncias tres, Aceti ferventis quantum sufficit, ut post horam colata sesquilibram aceti praebeant; — Wür. Rosarum partem unam, Aceti novem, et tres septimanas macerationis solis calore; — Suec. *Fi. T.* Rosarum partem unam, Aceti duodecim et quatuor (sex *Fi.* octo ad de-

cem) dies macerationis; — Br. Pal. et Wir. Rosarum partem unam et Aceti sex.

℞. Petalorum siccorum Rosarum rubrarum ab unguibus separatorum libram unam.
Aceti albi . . . . libras octo.

Macera per aliquot dies soli exposita vel aliquot horas in balneo aquae; cola exprimendo et adde

Aquae Vitae . . . uncias duas.

Misce (His.)

Lus. infundere jubet per dies sex Rosarum libram unam in libris sex Aceti, parumper coquere, et addere Alcoholis semilibram; — HassP. Rosarum unciam unam, Aceti Vini duodecim, macerationem frigidam per septimanam et Spiritus Vini rectificati unciam unam.

Acetum Rosarum compositum. (*Sw*. Vm.*)

℞. Florum siccatorum Rosarum rubrarum
partem unam cum dimidia.
Florum siccatorum Rhois
partem unam.
Vini Cydoniorum partes quatuor.
Aceti rubri . . . partes decem.

Macera frigide per dies decem, cola leviter exprimendo et filtra. (*Vm.*)

Sw.* Rosarum partem unam, Rhois unam, Aceti duodecim et infusionem blandi caloris ope.

Adstringirend, fäulnißwidrig, äußerlich bei Blutflüssen und Ecchymosen.

Oleum Rosarum s. rosatum. (Br. Gal. His. Sar. Wir. *Fi. T.*)

℞. Rosarum recentium
partem unam cum dimidia.
Olei Olivarum . . partes tres.

Digere per dies duos in balneo aquae, exprime post refrigerationem et operationem semel adhuc repete. (Sar.)

Fi. Rosarum libram unam, Olei quatuor, macera per duos dies, coque per horae quadrantem, exprime et oleum decantha; — *T.* ut oleum iridis.

℞. Rosarum contusarum
partes quatuor.
Olei Olivarum . partes quinque.

Post octo dierum soli expositionem coque ad consumptionem humidi et cola cum expressione. (Br. His. Wir.)

℞. Rosarum contusarum partem unam.
Olei Olivarum . partes quatuor.

Per tres dies soli exposita cola exprimendo et operationem bis repete, suprema vice illam per tres menses producendo.

Gegen Frostbeulen gerühmt.

Oleum Rosarum aethereum, Aethereoleum Rosarum. (Bor4. Gal. Sar. T.)

℞. Petalorum recentium Rosarum
partes quinque.
Aquae . . . . partes septem.
Destillent. (Gal.)

Sar. Rosarum partes viginti quinque, Aquae septuaginta quinque et tres Salis. Bor4. Oleum venale; — *T.* ut oleum florum aurantiorum.

Aqua Rosae s. Rosarum. (A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor4. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. Li. Lon. LouN. Lus. O. Pal. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. *Br. C. Fi. Pid. Sw. T. Vm.*)

℞. Petalorum recentium Rosarum
partes tres.
Aquae . . . . quantum sufficit ad prohibendum empyreuma. Destillent partes octo. (Fer. Hass. *Pid.*)

Lus. Florum partes sex et Aquae quantum satis ad prohibendum empyreuma; destillent partes octo; — Fenn. et Suec. Florum partes tres, Aquae quantum sufficit ad prohibendum empyreuma; destillent partes sex; — Gen. Florum partes quatuor, Aquae quantum sufficit ad prohibendum empyreuma; destillent partes sex; — Ams. B. et Bel. Florum partem unam et Aquae quantum satis ad prohibendum empyreuma; destillent partes decem; — Du. Florum libras sex et Aquae sufficientem quantitatem; destillent octarii octo; — Han. O. et Pol. Florum partem unam et Aquae quantum sufficit; destillent partes quinque; — *Fi.* Rosarum libras tres, Aquae libras quindecim, post duodecim horarum digestionem destillent libras sex; — Am. Lon. et LouN. Florum libras octo et Aquae satis; destillent octarii octo; — An. Florum partem unam et quinque Aquae; destillent partes quatuor; — *Br.* Florum partes tres et Aquae quindecim; destillent partes octo; — Sar. et Wür. Florum partem unam et Aquae quatuor; destillent partes duae; — Gal. Florum partem unam et Aquae quatuor; destillet una pars; — R. Florum partes decem et Aquae quadraginta; destillent partes quindecim; — Ba. Florum partem unam et novem Aquae; destillent partes tres; — Sax. Florum partem unam et decem Aquae; destillent partes quatuor; — Pal. et Wir. Florum partem unam et Aquae tres; destillet dimidia pars; — Bor4. Florum Rosarum incarnatarum recentium libras quatuor, Aquae quantum sufficit; destillent libras viginti; — HassP. Rosarum pallidarum libras sex, caeterum ut Bor4.; — RC. Rosarum Centifo-

liarum libras duas, Aquae quantum satis; destillent librae decem.

℞. Petalorum recentium Rosarum partes tres.
Aquae . . . partes duodecim.

Floribus in saccoe tela confecto et in medio cucurbitae, ita ut aquam non attingat, inclusis destillent absque bullitione partes sex. (Ful. Li.)

℞. Petalorum recentium Rosarum partes quatuor.
Aquae . . . quantum sufficit.
Salis culinaris . . partem unam.

Destillent partes viginti. (*Sw.*)

A. Florum sale conditorum partem unam et octo Aquae; destillent partes tres; — D. Florum salitorum partem unam et sex Aquae; destillent partes tres; — Bor4. Florum sale conditorum libras sex, Aquae quantum sufficit; destillent librae viginti; — HassP. Florum salitorum libras septem, caeterum ut Bor4.; — *T.* Rosarum gallicarum vel albarum quantum placet, Aquae salitae (Aquae partes 100, Salis marini 5) pondus duplum; destillet dimidia pars.

℞. Petalorum recentium Rosarum partes decem.
Aquae Vitae . partem dimidiam.
— purae partes centum sexaginta.

Destillent partes quadraginta. (*Vm.*)

℞. Petalorum recentium Rosarum libram unam.
Aquae . . . . quantum sufficit ad prohibendum empyreuma; macera per duos dies; destillent librae decem, tunc producto adde
Aquae Vitae . . uncias quinque.

Misce bene. (Ed. *C.*)

Gabe, eine bis zwei Unzen.

Spiritus Rosarum. (Bor4. Br. Pal. Sax. Wir. *T.*)

℞. Rosarum recentium partes duas.
Alcoholis,
Aquae, singulorum partem unam.

Destillet una pars. (Sax.)

℞. Petalorum Rosarum libram unam.
Vini albi . . . . libras decem.
Alcoholis . . . sesquilibram.

Destillet dimidia pars, productum novis Floribus infunde et destillet denuo dimidia pars. (Br. Wir.)

℞. Petalorum Rosarum pallidarum libras duodecim.
Sacchari albi . . . libras duas.
Fermenti . . . . semilibram.
Aquae tepidae . libras triginta.

Fermentationi tamdiu subjice, donec odor vinosus non amplius evolvatur; destillent deinde et productum rectificetur. (Pal. Wir.)

℞. Olei Rosarum scrupulum unum.
Spiritus Vini Gallici fortioris uncias sex.

Mixta filtrentur. (Bor4.)

T. Rosarum rubrarum libras decem macerent et destillent in balneo aquae cum Alcoholis 35° B. libris quinque, donec tres quadrantes circiter obtentae sint.

Herzstärkend, Nervenmittel, heutzutage nicht mehr gebraucht und auch ehedem häufiger äußerlich als innerlich.

Tinctura Florum Rosarum s. Rosarum acidula. (Bor. Bor4. Br. Han. O. Pol. Sax. Wir. *Vm.*)

℞. Petalorum Rosarum pallidarum semunciam.
Acidi sulphurici drachmam unam.
Aquae Rosarum uncias quatuor.

Digere per horas viginti quatuor, cola exprimendo et filtra. (Wir.)

Bor. Bor4. Han. O. et Sax. Petalorum sesquiunciam, Acidi semunciam, Aquae bullientis uncias duodecim et duodecim horas macerationis; — Pol. Petalorum, Acidi, singulorum drachmam unam, Aquae unciam unam et tres horas macerationis.

Kühlend, lindernd. — Gabe, eine halbe bis eine Unze.

Julapium rosatum s. Rosarum s. regium, Syrupus regius s. alexandrinus. (Br. Hass. Pal. Wir. *Pid. Sp.*)

℞. Aquae Rosarum . uncias viginti.
Sacchari albi libras duas cum dimidia.

Ebulliant semel et colentur. (Pal. Wir. *Sp.*)

Br. Aquae uncias sedecim et Sacchari libras duas cum dimidia; — Hass. et *Pid.* Aquae uncias novem et Sacchari sedecim.

Collyrium adstringens. (*Ra.*)

℞. Aquae Rosarum,
Infusi Meliloti,
singulorum uncias quatuor.

Misce.

Mixtura detergens. (*Sm.*)

℞. Aquae Rosarum . . uncias tres.
Cremoris Lactis,
Albuminis,
Syrupi Violarum,
singulorum unciam unam.

Von Boerhaave bei Schwämmchen und Geschwulst des Zahnfleisches in Gestalt von Collutorien.

Unguentum rosatum s. Rosarum s. pomadinum s. refrigerans s. Aquae Rosae. (Am. B°. Bor. Bor4. Br. Fenn.

Fer. Ful. Gal. Han. Hass. HassP. His. Li. Lus. O. Pal. Pol. R. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. *Br. C. Ft. Pid. Sp. Sw. T. Vm.*)

℞. Axungiae Porci . quantum vis.
Adde, continue cum pistillo ligneo agitando,
Aquae Rosarum quantum sufficit vel tantum, donec axungia alborem niveum acceperit. (Sax. Suec.)

Fenn. et Lus. Axungiae partes octo et Aquae Rosarum unam.

℞. Axungiae Porci
uncias triginta duas.
Guttatim instilla
Aquae Rosarum uncias quatuor.
Quando mixtura alborem sufficientem accepit, adde Oleum essentiale aliquod, ut forte illud Lavandulae. (R.)

Br. Wir. et Wür. Axungiae cum Aqua Rosarum lotae libram unam et Olei Ligni Rhodii guttas duodecim; — *Sp.* Axungiae in Aqua Rosarum lotae uncias duodecim et Olei Ligni Rhodii guttas sedecim; — *Sw.* Axungiae in Aqua Rosarum lotae libram unam et Olei Ligni Rhodii drachmam unam.

℞. Axungiae Porci . . libras duas.
Sebi ovilli . . . . uncias tres.
Liquata simul infunde in Aquam Rosarum, agita bene et refrigerata sicca. Libris singulis addere potes Olei Ligni Rhodii drachmam unam. (Br.)

Am. et *C.* liquare jubent Cetacei semunciam et Cerae albae drachmam unam in Olei Amygdalarum dulcium unciis duabus, addere Aquae Rosarum uncias duas et ad refrigerationem usque agitare.

℞. Axungiae Porci in Aqua Rosarum lotae . . . . . uncias octo.
Cerae albae . . . uncias duas.
Liqua lente et post refrigerationem sensim adde
Aquae Rosarum . . uncias tres.
Olei essentialis Citri
drachmam unam.
Misce bene. (Bor. Han. Pal.)

Bor4. Aquae Rosarum uncias duas absque oleo; — *Vm.* liquare jubet Cerae albae partem unam, addere Axungiae partes quatuor et sensim addere Aquae Rosarum sesquiunciam; — Ful. Terere Axungiae uncias triginta duas cum Aquae Rosarum unciis quatuor, liquare deinde axungiam prope ignem, ab aqua separare et terere cum Olei essentialis Citri guttis sexaginta; — Li. Conterere Axungiae libram unam et Aquae Rosarum, Aquae Florum Aurantiorum, singularum duas, axungiam liquare, ab aqua separare et terere cum Olei Bergamottae guttis viginti quatuor et Olei Lavandulae guttis quindecim.

℞. Axungiae Porci . libram unam.
Aquae Rosarum,
— Florum Aurantiorum,
singularum uncias duas.
Olei essentialis Citri
guttas viginti quatuor.
— — Lavandulae
guttas quindecim.
— — Caryophyllorum
guttas duodecim.
Misce. (Hass. O. *Pid.*)

Sw. Axungiae libram unam, Aquae Florum Aurantiorum semunciam, Aquae Rosarum uncias tres, Oleorum Citri, Lavandulae et Caryophyllorum, singulorum guttas duodecim.

℞. Axungiae Porci . uncias decem.
Cerae albae . . . uncias duas.
Liqua et adde
Aquae Rosarum . . uncias tres.
— Florum Aurantiorum
unciam unam.
Sepone per horas viginti quatuor, decantha aquam et axungiam tritura cum
Olei essentialis Lavandulae,
— — Citri,
singulorum semidrachma.
Misce bene. (B*.)

HassP. Axungiae Porci libram unam, Cerae albae uncias tres, Aquae Florum Naphae, Aquae Rosarum, singularum uncias duas, Olei de Cedro guttas viginti quatuor, Olei Bergamotte, Lavandulae, singulorum guttas duodecim.

℞. Axungiae cum Aqua Rosarum lotae uncias duodecim.
Adde sensim, continue terendo,
Aquae Rosarum . . uncias tres.
— Florum Aurantiorum,
Spiritus Rosarum,
singulorum semunciam.
Olei essentialis Lavandulae
semidrachmam.
— — Ligni Rhodii,
— — Citri,
singulorum guttas sedecim.
Misce bene. (*Sp.*)

℞. Olei Rosarum infusi libram unam.
Cerae albae . . . uncias tres.
Liquata simul et mixta in Aqua lava et subige, donec alba sint reddita. (Wir.)

Sar. Olei rosati sesquilibram et Cerae uncias sex.

℞. Axunciae Porci . . libras tres.
Storacis Calamita,
Benzoës,
Iridis Florentinae,
singulorum unciam unam.
Fructus Citri,

Fructus Aurantiorum,
singulorum no. 2.
Poma Renetia . . . . no. 4.
Coque ad consumptionem humidi et adde
Olei essentialis Cinnamomi,
— — Caryophyllorum, singulorum guttas viginti quinque.
Subige totum cum Spiritu Rosarum per fermentationem (Pal.).

℞. Caryophyllorum drachmas duas.
Cinnamomi,
Benzoës,
Storacis Calamitae,
singulorum drachmas tres.
Macidis . . . . scrupulos duos.
Lavandulae,
Ligni Aloës,
— Rhodii,
singulorum drachmam unam.
— Sassafras semidrachmam.
Iridis Florentinae unciam unam.
Aquae Rosarum . . semilibram.
Axungiae Porci . libram unam.
Pulpae Pomorum Renetium
uncias sex.
Sebi hirc ni . . uncias quatuor.

Coque lente, digere deinde per tres dies; coque iterum ad omnis aquae consumptionem; colaturam cum Aqua Rosarum subige, donec albescat et adde
Olei Ligni Rhodii guttas viginti.
Misce bene. (B*.)

Diese Formel, *Unguentum pomadinum*, ist von Gartheuser.

℞. Axungiae cum Aqua Rosarum lotae,
Rosarum pallidarum contusarum,
singularum partes aequales.

Sepone per dies duos, tunc axungiam liqua et in ea macera Rosarum aequalem copiam per duos dies, filtra, faeces exprime, liquefac deinde in balneo aquae et sepone. (Gal. T.)

Br. liquare simul jubet Axungiae libras duas et Sebi uncias tres, addere Rosarum rubrarum contusarum uncias duas et Alcannae semunciam, colare et lente, spatulae ope agitando refrigefacere; — Sar. Digerere per tres dies in balneo Aquae Rosarum rubrarum et pallidarum, singularum libras duas in Axungiae sex, exprimere, addere Cerae uncias sex, liquare inter cineres calidos et seponere, ut refrigerent.

℞. Axungiae Porci libras duodecim.
Petalorum Rosarum pallidarum
libras sex.

Post tres dies macerationis coque ad humidi consumptionem et cola exprimendo. (His)

Pal. et Wir. coquere jubent Axungiae libram unam cum Rosarum unciis quatuor ad humidi usque consumptionem, colare exprimendo et addere Essentiae Rosarum grana tria; — *Fi.* Axungiae libras viginti, Petalorum recentium Rosarum libras quindecim, Aquae Rosarum libras septem; mixta sepone, per dies quatuor in balneum aquae immerge, coque per horas duas, exprime etc.

℞. Axungiae Porci . libras novem.
Sebi ovilli . . . libram unam.
Petalorum recentium Rosarum
libras novem.

Digere petala per unum diem in utroque adipe et cola exprimendo. (Fer.)

Species de Hyacintho. (Br. Pal. Wir.)

℞. Hyacinthi praeparati,
Boli Armenae,
Terrae Lemniae,
Corallii rubri praeparati,
singulorum sesquidrachmam,
Margaritarum orientalium praeparatarum,
Smaragdi praeparati,
singulorum drachmam unam.
Cornu Cervi philosophice praeparati,
Rasurae Eboris praeparati,
Ossis Cordis Cervi praeparati,
Radicis Praxinellae,
— Tormentillae,
Santali albi,
— citrini,
— rubri,
Petalorum Rosarum rubrarum,
Granorum Kermes,
Seminum Acetosae,
— Citri,
— Portulaccae,
Croci,
Myrrhae,
singulorum scrupulos quatuor.

Completae nominantur, si addis
Ambrae griseae,
Mosch,
singulorum scrupulos quatuor.

Fiat pulvis. — Schwach adstringirend. — Gabe, ein halber bis ein ganzer Scrupel.

Pulvis contra abortum. (Pal. Wir.)

℞. Granorum Kermes semunciam.
Ligni Santali rubri,
Petalorum Rosarum rubrarum,
Corallii rubri praeparati,
Rasurae Eboris,
singulorum drachmas tres.
Mastichis,
Nucis moschatae,
singulorum drachmam unam.
Saccheri pondus omnium aequale. (Wir.)

Pal. Kermetis drachmam unam, San-

tali rubri semidrachmam, Caryophyllorum scrupulum unum, Nucis moschatae scrupulos duos, Radicis Tormentillae semidrachmam, Margaritarum, Corallii rubri, Corallii albi, singulorum scrupulum unum et Sacchari drachmas tres.

℞ Gabe, eine Drachme. — Reizend und daher eher Abortus befördernd, als verhütend.

Pulvis cephalicus ruber. (*Vm.*)

℞. Pulveris Rosarum rubrarum uncias sex.
— Acidi tartarici semunciam.
— Iridis Florentinae uncias sex.

Misce et massam cum Aqua Rosarum humecta.

Pulvis nasalis odoratus. (Pal.)

℞. Petalorum Rosarum rubrarum drachmas sex.
Florum Calcitrapae,
— Calendulae,
— Caryophyllorum,
singulorum drachmam unam.
Iridis Florentinae drachmas duas.
Majoranae,
Serpylli,
Thymi,
singulorum scrupulum unum.
Pulveratis adde
Olei essentialis Ligni Rhodii guttas quatuor.
— — Caryophyllorum guttas sex.

Pulvis s. Species Diarrhodon. (Pal. Sar. Wir.)

℞. Petalorum Rosarum rubrarum uncias duas.
Santali albi,
— rubri,
singulorum semunciam.
Radicis Liquiritiae,
Seminum Anisi,
singulorum drachmas duas.
— Basilici,
Cinnamomi,
Nardi Indicae,
Rhei,
Croci,
Rasurae Eboris,
Cornu Cervi philosophice praeparati,
Mastichis,
Matris Perlarum praeparatae,
singulorum drachmam unam.
Fiat pulvis. (Pal. Wir.)

℞. Rosarum rubrarum uncias duas.
Santali citrini . unciam unam.
Cardamomi minoris,
Cinnamomi,
Croci,
Mastichis,
Nardi Indicae,
Foeniculi,
singulorum drachmam unam.
Fiat pulvis. (Sar.)

Magenstärkend. — Gabe, von einer halben Drachme bis zwei Scrupel.

Pulvis pro epithemate cordis et pulsuum. (Pal. Wir. *Sp.*)

℞. Herbae Rorismarini,
— Majoranae,
— Melissae,
Florum Cheiri,
— Caryophyllorum rubrorum,
singulorum semunciam.
— Lavandulae,
— Rosarum,
singulorum drachmas sex.
Macidis,
Nucis moschatae,
Ligni Aloës,
— Rhodii,
Cinnamomi,
singulorum drachmas sex.
Corticis Citri,
— Aurantiorum,
singulorum drachmas tres.
Concisa et contusa misce. (Wir.)
Sp. pulverem parare jubet.

℞. Florum Buglossi,
— Boraginis,
— Melissae, singulorum manipulum dimidium.
Santali albi,
— rubri,
— citrini,
Petalorum Rosarum rubrarum,
singulorum drachmas duas.
Corticis Citri,
Seminum Acetosae,
Ligni Aloës,
Caryophyllorum,
singulorum sesquidrachmam.
Doronici,
Radicis Behen rubri,
— — albi,
Succini,
singulorum scrupulos quatuor.
Fiat pulvis. (Pal.)

Species pro Decocto ad gangraenam. (Pal. Wir. *Vm.*)

℞. Foliorum Marrubii,
— Pulegii,
— Rutae,
— Rorismarini,
— Salviae,
— Scordii,
singulorum partem unam.
Florum Chamomillae vulgaris,
— Rosarum rubrarum,

Florum Sambuci,
singulorum partes duas.
— Althaeae . . partes sex.
Seminum Foeni graeci partes octo.
— Lini partes viginti quatuor.
Concisa et contusa misce. (*Vm.*)

℞. Herbae Millefolii,
— Absinthii,
singulorum drachmas sex.
— Scordii,
— Salviae,
— Hyssopi,
— Rutae,
Florum Sambuci,
— Hyperici,
singulorum semunciam.
— Rosarum . unciam unam.
Myrrhae . . . drachmas sex.
Aloës,
Asae foetidae,
singulorum semunciam.
Lithargyri . . . . uncias sex.
Concisa et contusa misce. (Pal. Wir.)

Man läßt es in fünf Pfund Kalkwasser und zwei Pfund Essig kochen und wendet die Abkochung, mittelst Flanell, warm an. Auch kann man vier bis sechs Unzen Kampherspiritus zusetzen. — Heutzutage zieht man bei heißem Brand erweichende Mittel mit Recht vor.

Rosmarinus.

Rosmarinus officinalis, L.; Rosmarin; Romarin officinal (*Gal.*); Rosemary (*Ang.*); Rosmarin (*D. Suec.*); Hasalban achsir (*Ar.*); Rosmaryn (*B. Bel. Pol.*); Yong tsao (*C.*); Tay-duong-choi (*Co.*); Romera (*His.*); Ramerino, Rosmarino (*I.*); Alecrim (*Lus.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pal. R. Sax. Suec. Wir. Wär. *A. Be. Br. C. Fi. G. M. Pid. Sp. Z.*

♄ (Diandria Monogynia, *L.*; Labiatae, *J.*) Eine im südlichen Europa wachsende Pflanze. (*Blackw.* t. 159. *Plenck* t. 18. *Hayne* VI. t. 25. Fl. méd. VI. 200.)

Man wendet das blühende Kraut (herba et flores Anthos s. Rorismarini s. Rorismarini hortensis) an; es besteht aus dünnen, langen, aschgrauen Zweigen mit sitzenden, entgegengesetzten, etwas harten, schmalen, linienförmigen, oben grünen, unten weißlichen, an den Rändern eingerollten Blättern und blaßblauen, kleine buschige, achselständige, gegenüberstehende Trauben bildenden Blüthen. Es hat einen sehr durchdringenden, angenehmen Geruch und einen gewürzhaften, kampherartigen, etwas scharfen Geschmack.

Innerlich reizend, äußerlich auflösend.

Gabe des Pulvers, von achtzehen Gran bis zwei Scrupel.

Conserva Anthos s. Rorismarini. (Ams. B. Bel. Sar. Wir. *Ca. T.*)

℞. Florum Anthos contusarum
partem unam.
Sacchari albi . . . partes tres.
Misce. (Ams.)

B. Bel. et Wir. Florum partem unam et Sacchari albi duas; — Sar. Florum partem unam et Sacchari ad plumam cocti tres; — *Ca.* Florum pulveratorum partem unam, Sacchari quatuor et Aquae quantum sufficit; — *T.* ut conservam rosarum.

Pulvis aromaticus. (*Ra.*)

℞. Pulveris Rorismarini,
— Salviae,
— Thymi,
singulorum uncias quatuor.
Salis Ammoniaci,
Camphorae,
singulorum grana viginti.

Von Dupuytren äußerlich bei Brand oder Hospitalfäulniß, statt der China.

Species aromaticae. (Ful.)

℞. Radicis Iridis Florentinae,
— Zedoariae,
Herbae Melissae,
— Rorismarini,
— Serpylli,
Florum Lavandulae,
singulorum drachmas sex.
Caryophyllorum,
Nucis moschatae,
Cinnamomi,
singulorum drachmas duas.

Auflösend, nervenstärkend, stärkend, zu Kräutersäckchen.

Species dianthos. (Wir.)

℞. Radicis Liquiritiae drachmas sex.
— Zingiberis,
— Zedoariae,
— Galangae,
Ligni Aloës,
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Cardamomi minoris,
Macidis,
Nucis moschatae,
Nardi Indicae,
singulorum scrupulos quatuor.
Florum Rorismarini unciam unam.
— Rosarum,
— Violarum,
singulorum drachmas sex.
Seminum Anisi,
— Foeniculi,
singulorum scrupulos quatuor.

Fiat pulvis. — Gabe, von einer halben bis einer ganzen Drachme. — Gegen Kopfschmerz, magenstärkend, blähungtreibend.

Extractum Rorismarini. (Wür.)

℞. Summitatum florescentium Rorismarini,
Alcoholis, singulorum libram unam.
Aquae communis . libras octo.

Digere blando calore, per tres dies, cola exprimendo, sepone et decantha liquorem, alcoholem destillando elice et residuum ad aptam consistentiam consume.

Infusum Rorismarini. (GalM.)

℞. Summitatum florescentium Rorismarini,
Liquiritiae rasae, singularum drachmas duas cum dimidia.
Aquae bullientis quantum sufficit ut librae duae colaturae obtineantur.

— Gabe, eine bis zwei Unzen

Mel Rorismarini s. anthosatum. (Ful. Pal. Sar. Wir. *Sp.*)

℞. Florum recentium Rorismarini uncias octo.
Aquae fontanae uncias quatuor.
Mellis despumati calidi libras duas.

Digere per dies decem ad duodecim in loco calido, tunc in balneo aquae coque et cola exprimendo. (Pal. Wir.)

Sar. digerere jubet, tunc coquere in balneo aquae Mellis libras quatuor et Florum duas; — *Sp.* digerere per dies aliquot Herbae Rorismarini siccatae uncias octo in Mellis despumati unciis viginti quatuor; — Ful. Commiscere Infusi Rorismarini partem unam et Mellis despumati quatuor.

Reizend, gegen Kopfschmerz, Kolik, bei Blähungen und auf den Uterus wirksam. — Man kann es auch zu Klystiren setzen.

Balneum aromaticum. (*Ca.*)

℞. Rorismarini,
Thymi,
Salviae,
Origani,
Menthae, singulorum semilibram.
Aquae . . . quantum sufficit.

Decocto adde
Essentiae Saponis uncias quatuor.
Salis Ammoniaci . uncias duas.

Acetum Rorismarini. (Gal. *T.*)

℞. Florum Rorismarini partem unam.
Aceti albi . . partes sedecim.

Macera per dies quatuordecim in vase tecto, subinde agitando, cola et filtra. *T.* Florum uncias sex, Aceti libras sex, decem dierum digestionem etc.

Acetum s. Acidum aceticum aromaticum s. odoratum. (Bor. D. Ed. Fer. GalF. Han. HassP. Lus. O. Pal. Suec. Wir. *C. Huf. Sp. T.*)

℞. Summitatum Rorismarini,
Foliorum Salviae,
singulorum unciam unam.
Florum Lavandulae sesquiunciam.
Caryophyllorum semidrachmam.
Aceti . . . . . libras duas.

Macera per dies septem et filtra. (Ed. *C.*)

GalF. Lus. Suec. et *Sw.* Rorismarini, Salviae, singulorum uncias quatuor, Lavandulae uncias duas, Caryophyllorum drachmas duas et Aceti libras octo.

℞. Herbae Absinthii,
— Rorismarini,
— Salviae,
— Menthae piperitae,
singularum uncias duas.
Cinnamomi . . . semunciam.
Caryophyllorum,
Nucis moschatae,
singulorum drachmas duas.
Aceti . . . . . libras octo.

Digere super arena tepida, cola exprimendo et filtra. (D. O.)

℞. Radicis Zedoariae,
Caryophyllorum,
singulorum semunciam.
Herbae Absinthii,
— Rorismarini,
— Salviae,
— Menthae piperitae,
singularum uncias duas,
Aceti . . . . . libras octo.

Post sufficientem maceration co-la exprimendo et colaturae adde
Spiritus Rorismarini uncias quatuor.

Misce bene. (Bor. Han. HassP. Pol. *Huf.*)

℞. Radicis Cyperi rotundi,
— Galangae minoris,
— Zedoariae,
singularum semunciam.
Herbae Rorismarini,
— Salviae,
Florum Lavandulae,
— Convallariae majalis,
— Rosarum,
singulorum drachmas tres.
Ligni Rhodii,
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Corticis recentis Citri,
singulorum drachmas duas.
Aceti . . . . . libras duas.

Post tres dies digestionis filtra. (Wir. *Sp.*)

℞. Radicis Zedoariae,
— Galangae,
singularum semunciam.
Herbae Rorismarini,

Herbae Rutae,
Mari,
Florum Lavandulae,
singulorum drachmas duas.
Corticis recentis Citri,
Caryophyllorum,
Cubebarum,
Cardamomi minoris,
singulorum semunciam.
Aceti . . . uncias quadraginta.
— Convallariae,
Caryophyllorum rubrorum,
singulorum uncias duas.
Macera et cola. (*Sp.*)

℞. Summitatum Rorismarini,
— Absinthii,
— Salviae,
— Rutae,
singularum sesquiunciam.
Calami aromatici,
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
singulorum drachmas duas.
Aceti . . . . . libras sex.
Post octo dies infusionis exprime et colaturae adde
Camphorae . . . unciam unam.
Addi possunt Allii drachmae duae. (Fer.)

T. Summitatum Absinthii Romani et Pontici, Rorismarini, Salviae, Menthae piperitae, Rutae, Florum Lavandulae, singulorum uncias duas, Allii, Calami, Cinnamomi, Nucis moschatae, Caryophyllorum, singulorum drachmas duas, Aceti rubri fortioris libras octo, dies quindecim macerationis et Camphorae in Spiritu Vini 36° B. solutae semunciam.

Das nach den beiden letzten Formeln bereitete Präparat hat noch mehr Aehnlichkeit mit dem Vierräuberessig als die vorhergehenden.

Essentia Rorismarini. (℞.)

℞. Summitatum florescentium Rorismarini . . . . . sesquiunciam.
Spiritus Rorismarini uncias sex.
Post sufficientem digestionem exprime et filtra. — Reizend.

Fomentum aromaticum. (*Au.*)

℞. Herbae Rorismarini semunciam.
Vini rubri,
Aquae, singulorum uncias tres.
Infunde et exprime.

Oleum Rorismarini (*infusum*). (His.)

℞. Florum Rorismarini partem unam.
Olei Olivarum . . partes tres.
Post tres vel quatuor dies digestionis coque ad consumptionem humidi et exprime.

Oleum essentiale Rorismarini s. Anthos aethereum, Aethereoleum Anthos s. Rorismarini. (A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fer. Ful. Gal. Gen. Han. Li. Lon. LonN. O. Pal. Pol. R. Sar. Sax. Suec. Wür. *Br. C. Sw. T.*)

℞. Florum Rorismarini quantum vis.
Aquae . . quantum requiritur.
Destillent. (Am. Ams. B. Bel. Du. Ed. Fer. Gen. Lon. LonN. R. Suec; *Br. C.*)

An. Florum partes tres et decem Aquae; — Gal. Florum quinque et septem Aquae; — Ful. et Li. Florum unam et tres Aquae; — *Sw.* Florum unam et Aquae quatuor; — D. Florum unam et sex Aquae; — Bor. Han. O. Pol. et Sax. Florum unam et octo Aquae; — Ba. Florum unam et novem Aquae; — A. Florum unam et duodecim Aquae; — *T.* Florum unam et Aquae bullientis duas.

℞. Herbae florescentis Rorismarini partes viginti quinque.
Aquae partes septuaginta quinque.
Salis culinaris . . . partes tres.
Post tres dies macerationis destillent. (Br. Pal. Sar.)

℞. Herbae Rorismarini quantum vis.
Aquae destillatae Rorismarini quantum sufficit.
Destillent. (Wür.)

Bor4. HassP. Oleum venale pond. spec. = 905. Bor4. = 0,865. HassP.

Gabe, zwei bis fünf Tropfen.

Balsamum apoplecticum s. aromaticum s. cephalicum. Saxonicum s. nervinum s. Scherzeri s. stomachicum, Linimentum aromaticum stimulans, Unguentum aromaticum s. nervinum, Linimentum stomachicum. (B*. Br. D. Fenn. Ful. Gal. Han. Hass. Li. Pal. Sax. Suec. Wir. Wür. *Ca. Pid. Sp. Sw. Vm.*)

1) Mit Perubalsam.

℞. Olei Nucis moschatae expressi unciam unam.
essentialis Rorismarini,
— — Caryophyllorum,
singulorum drachmam unam.
— essentialis Succini semidrachmam.
Balsami Peruviani drachmam unam.
Misce triturando. (Li.)

Pid. Olei Nucis moschatae unciam unam, Olei Caryophyllorum, Lavandulae, singulorum drachmam unam, Olei Succini scrupulum unum et Balsami sesquidrachmam; — Sax. Olei Nucis moschatae unciam unam, Olei Caryophyllorum, Rorismarini, singulorum drachmam unam, Olei Succini scrupulum unum et Balsami sesquidrachmam; — Hass. Olei Nucis moschatae unciam unam, Olei Caryophyllorum, Menthae piperitae, singulorum drachmam unam, Olei Succini scrupulum unum et Balsami sesquidrachmam; — *Vm.* Olei

Nucis moschatae uncias tres, Olei Caryophyllorum, Lavandulae, Succini, singulorum semunciam et Balsami drachmas duas; — *Sw.* Olei Nucis moschatae drachmas tres, Olei Caryophyllorum, Succini, singulorum scrupulum unum et Balsami sesquidrachmam, vel: Olei Nucis moschatae unciam unam, Olei Caryophyllorum, Lavandulae, singulorum drachmam unam, Olei Succini scrupulum unum et Balsami sesquidrachmam; — D. Olei Nucis moschatae unciam unam, Olei Caryophyllorum, Lavandulae, Rorismarini, singulorum semidrachmam, Olei Succini semiscrupulum et Balsami drachmam unam.

℞. Olei Nucis moschatae partes tres.
— essentialis Caryophyllorum,
— — Benzoës,
Balsami Peruviani,
singulorum partem unam.
Misce bene. (B*.)

℞. Olei Nucis moschatae
unciam unam.
— essentialis Absinthii,
— — Corticis Aurantiorum,
— — Caryophyllorum,
— — Macidis,
— — Menthae,
singulorum semidrachmam.
Balsami Peruviani
drachmam unam.
Misce. (Pal. Wir.)

Han. eandem formulam sed omisso oleo corticum aurantiorum.

℞. Olei Nucis moschatae
unciam unam.
— essentialis Rorismarini,
— — Lavandulae,
— — Caryophyllorum,
singulorum semidrachmam.
— — Succini,
Moschi cum Alcohole triti,
singulorum semiscrupulum.
Balsami Peruviani
drachmam unam.
Misce. (Br.)

℞. Olei Nucis moschatae
uncias tres cum dimidia.
— Jasmini,
— Cinnamomi,
— Ligni Rhodii,
singulorum sesquidrachmam.
— Lavandulae,
— Majoranae,
— Caryophyllorum,
singulorum drachmam unam.
— Rutae,
— Succini,
singulorum scrupulum unum.
Moschi,
Ambrae griseae,
singulorum grana sedecim.
Zibethi . . . semiscrupulum.
Balsami Peruviani scrupulos duos.
Eboris usti nigri quantum sufficit.
Misce. (Wir. *Sp.*)

Pal. Olei Nucis moschatae unciam unam, Olei Rorismarini, Caryophyllorum, Cinnamomi, singulorum scrupulum unum, Olei Lavandulae, Ligni Rhodii, Majoranae, Rutae, Succini, singulorum semiscrupulum, Balsami sesquidrachmam et Fuliginis Succini quantum sufficit.

℞. Olei Palmae,
— Nucis moschatae,
Medullae cervinae,
— Cruris bovini,
singularum uncias quatuor.
Adipis Hominis,
— Melis,
— Viperae,
singulorum unciam unam.
Liqua leni calore et adde
Olei essentialis Lavandulae,
— — Menthae,
— — Rorismarini,
— — Salviae,
— — Thymi,
— — Caryophyllorum,
singulorum drachmam unam.
Camphorae . . drachmas duas.
Balsami Peruviani unciam unam.
Misce. (*Sp.*)

℞. Medullae bubulae,
Olei Nucis moschatae,
singulorum uncias quatuor.
Liquata in lagenam amplo ostio munitam immitte et adde
Olei essentialis Rorismarini
drachmas duas.
— — Caryophyllorum,
Camphorae,
singulorum drachmam unam.
Balsami Peruviani in Alcoholis (36°)
semuncia dissoluti drachmas duas.
Liqua omnia in balneo aquae. (Gal. *Ca.*)

T. Camphorae drachmas duas, Balsami in Alcoholis sufficiente quantitate soluti semunciam, caeterum ut antea.

β) Ohne Perubalsam.

℞. Olei Nucis moschatae
unciam unam.
Cerae flavae . . drachmas duas.
Liqua lente et adde
Olei essentialis Caryophyllorum,
— — Lavandulae,
singulorum drachmas duas.
— — Succini
semiscrupulum.
Misce. (Fenn. Suec.)

℞. Sebi ovilli . . . . libras duas.
Olei Chamomillae cocti,

Olei Majoranae cocti,
singulorum uncias quatuordecim.
Liqua et adde ab igne removendo
Olei essentialis Rorismarini
uncias duas.
Misce bene. (Wür.)

℞. Olei Nucis moschatae
unciam unam.
— Succini,
— Caryophyllorum,
singulorum semidrachmam.
— Lavandulae,
— Juniperi,
singulorum drachmam unam.
Misce frigide. (Ful.)

℞. Olei Nucis moschatae
partes centum viginti.
— Lavandulae,
— Succini,
singulorum partes quatuor.
— Rorismarini . . partes sex.
— Majoranae,
— Menthae piperitae,
singulorum partes tres.
— Macidis . . . partes duas.
Contere. (B*.)

Ca. Olei Nucis moschatae drachmas triginta tres, Oleorum Lavandulae, Succini, singulorum sesquidrachmam, Oleorum Origani, Salviae, Majoranae, Rorismarini, singulorum drachmam unam, Oleorum Rutae, Macidis, Menthae, singulorum scrupulos duos; — *Sp.* Olei Nucis moschatae sesquiunciam, Oleorum Majoranae, Lavandulae, Rorismarini, Succini, Serpylli, singulorum drachmas duas, Oleorum Rutae, Pulegii, Melissae, Menthae, Cardamomi, singulorum scrupulum unum; — Br. Olei Nucis moschatae uncias duas cum dimidia, Oleorum Corticis Aurantiorum, Caryophyllorum, Macidis, singulorum drachmam unam, Oleorum Rorismarini, Lavandulae, Absinthii, Cumini, Anethi, singulorum semidrachmam, Olei Rosarum parvam quantitatem et Cerae albae semunciam; — Wir. Oleorum Lavandulae, Succini, singulorum scrupulum unum, Oleorum Pulegii, Majoranae, Salviae, Rorismarini, Saturejae, singulorum grana quindecim, Oleorum Rutae, Macidis, singulorum semiscrupulum, Oleorum Menthae, Origani, singulorum grana duodecim et Olei Nucis moschatae unciam unam.

℞. Olei Nucis moschatae
unciam unam.
— Succini . . semidrachmam.
— Rosarum,
— Cinnamomi,
singulorum scrupulum unum.
— Lavandulae,
Olei Majoranae,
singulorum grana quindecim.
— Rutae,
— Bernoës,
singulorum semiscrupulum.
— Caryophyllorum,
— Corticum Citri,
singulorum grana quatuor.
Ambrae griseae sesquidrachmam.
Zibethi . . . scrupulos quatuor.
Moschi . . . drachmam unam.
Misce bene. (*Sw.*)

Alle dieſe Präparate, welche, ungeachtet der verſchiedenen Namen, mit denen man ſie bezeichnet, ſehr viel Aehnlichkeit mit einander haben, unterſcheiden ſich von dem Hoffmann'ſchen Balſam weſentlich nur dadurch, daß kein Alcohol dazu kommt. Man wendet ſie beſonders äußerlich in Einreibungen auf den Unterleib, bei Windcolik, hartnäckiger Diarrhoe und Leibſchneiden der Kinder; auf die Schläfe bei Kopfſchmerz; in die Hände, welche man dann vor die Augen hält, gegen Geſichtsſchwäche und Trieſäugigkeit, und auf die Glieder bei ſchwächlichen Kindern, an. Zuweilen läßt man auch bei Verdauungsbeſchwerden einige Tropfen auf Zucker nehmen.

Balsamum vitae Hoffmanni s. ad modum Hoffmanni, Mixtura oleoso-balsamica s. succinea, Liquor balsamico-aromaticus, Tinctura Succini aromatica. (B*. Bor. Bor4. Br. D. HassP. O. Sax. Suec. Wir. *Au. Bo. Ca. Sp. Sw. Vm.*)

℞. Olei Rorismarini . semunciam.
— Succini rectificati
drachmas duas.
Alcoholis . . . libram unam
Misce. (Bor.)

℞. Florum siccatorum Lavandulae,
Foliorum siccatorum Majoranae,
— — Rutae,
singulorum unciam unam.
Corticis recentis Citri semunciam.
Cardamomi minoris,
Caryophyllorum,
Macidis,
singulorum drachmas tres.
Aquae Vitae uncias triginta duas.
Aquae uncias sexaginta quatuor.
Destillando liquidi uncias octodecim elice et in producto solve
Balsami Peruviani
sesquidrachmam.
Olei Succini rectificati
semidrachmam.
Serva. (*Vm.*)

℞. Olei essentialis Lavandulae,
— — Majoranae,
— — Caryophyllorum,
— — Macidis,
— — Cinnamomi,

Olei essentialis Citri, singulorum scrupulum unum.
— — Rutae guttas decem.
Balsami Peruviani semidrachmam.
Alcoholis concentrati uncias decem.

Digere frigide et per gossypium filtra. (B⁶. Bor. O.)

Bor4. omnium horum oleorum, addito illo Florum Aurantii, singulorum scrupulum unum, Balsami drachmam unam et Spiritus Vini Gallici fortioris quantum sufficit. Pond. sp. = 0,850 — 0,860; — HassP. Oleorum Lavandulae, Majoranae, Caryophyllorum, Macidis, Cassiae cinnamomeae, de Cedro, singulorum scrupulum unum, Oleorum Rutae et Succini rectificati, singulorum guttas decem, Balsami semidrachmam, Spiritus rectificatissimi uncias decem; — Sax. Oleorum Lavandulae, Majoranae, Caryophyllorum, Macidis, Cinnamomi, Citri, singulorum partem unam, Oleorum Rutae, Succini rectificati, singulorum partem dimidiam, Balsami Peruviani partem unam cum dimidia, Alcoholis concentrati partes ducentas quadraginta et dies quatuor frigidae infusionis; — D. Oleorum Lavandulae, Caryophyllorum, Macidis, Cinnamomi, singulorum scrupulum unum, Olei Succini rectificati guttas decem, Balsami Peruviani semidrachmam, Alcoholis concentrati uncias decem et Radicis Alcannae parvam quantitatem ad colorandam tincturam; — *Bo.* Oleorum Cinnamomi, Lavandulae, Caryophyllorum, Citri, Rorismarini, Succini, singulorum guttas decem, Balsami Peruviani liquidi guttas viginti et Spiritus Vini rectificati uncias duas.

℞. Balsami Peruviani,
Olei essentialis Lavandulae,
— — Majoranae,
— — Caryophyllorum,
— — Citri,
— — Macidis,
— — Cinnamomi,
— — Rutae,
— — Succini,
Ambrae griseae,
singulorum scrupulum unum.
Misce bene et dissolve in
Alcoholis concentrati unciis decem.
Serva. (Br. Wir.)

Au. Balsami Peruviani grana quindecim, Oleorum Lavandulae, Majoranae, Caryophyllorum, Serpylli, Rutae et Succini, singulorum guttas decem et Alcoholis uncias quinque; — *Sp.* Oleorum Lavandulae, Majoranae, Caryophyllorum, Cubebarum, Cardamomi, Cinnamomi et Citri, singulorum scrupulum unum, Olei Macidis scrupulos duos, Oleorum Rutae, Succini, Balsami Peruviani et Ambrae griseae, singulorum semiscrupulum, Alcoholis uncias viginti; — *Ca.* Oleorum Lavandulae, Majoranae, Caryophyllorum, Macidis, Cinnamomi et Citri, singulorum scrupulum unum, Oleorum Rutae et Succini, Ambrae griseae, singulorum semiscrupulum, Alcoholis uncias quinque; — B⁶. et *Huf.* Oleorum Lavandulae, Rorismarini, Bergamottae, Juniperi et Terebinthinae, singulorum semidrachmam, Alcoholis uncias decem; — *Siw.* Oleorum Lavandulae, Majoranae, Caryophyllorum, Macidis, Cinnamomi, Citri, Rutae et Succini, singulorum guttas decem; Balsami Peruviani semidrachmam, Alcoholis uncias decem et denique si necesse est, Ambrae griseae grana quindecim et decem Moschi; — Li. Oleorum Rorismarini, Majoranae, Caryophyllorum, Cinnamomi, Rutae et Citri, singulorum scrupulum unum, Olei Succini semiscrupulum, Balsami Peruviani semidrachmam; Ambrae grana decem, Moschi grana quindecim, Alcoholis uncias decem et quatuor dies frigidae digestionis.

℞. Olei Succini rectificati
partem unam.
Balsami Peruviani . partes tres.
Aquae Lavandulae,
— Coloniensis,
singularum partes centum viginti.
Dissolve et, post aliquot dies filtra. (*Vm.*)

℞. Olei essentialis Caryophyllorum,
— Cinnamomi,
— Lavandulae,
— Nucis moschatae,
singulorum scrupulum unum.
Tincturae Succini uncias quatuor.
Misce. (Suec.)

Reizend, nervenstärkend, Kopf- und Magenmittel. — Gabe, zehen bis zwanzig Tropfen. — Man wendet es auch äußerlich in Einreibungen an.

Es enthalten zwar nicht alle Formeln zu diesem Präparat Rosmarinöl, doch scheint es wegen seiner Aehnlichkeit mit den vorhergehenden hierher zu gehören.

Balsamum ophthalmicum. (*Au.*)

℞. Balsami Vitae Hoffmanni
unciam unam.
Ammoniaci liquidi
drachmam unam.
Olei essentialis Chamomillae
guttas viginti.
Alcoholis concentrati semunciam.

Von Löbenstein-Löbel bei Gesichts-

schwäche in Waschungen auf die Stirn, die Augenlider und die Wangen empfohlen.

Unguentum Rorismarini compositum. (BorC.)

℞. Cerae flavae . . unciam unam.
Axungiae Porci . . uncias tres.
Liqua et mixtis semirefrigeratisque adde
Olei essentialis Rorismarini,
Ammonii subcarbonici,
singulorum semunciam.
Misce bene.

Unguentum aromaticum. (*Au.*)

℞. Unguenti Rorismarini compositi uncias duas.
Olei essentialis Lavandulae,
— Cajeputi,
— Menthae,
— Chamomillae,
singulorum scrupulum unum.

Bei asthenischen und nervösen Uebeln, so wie bei Lähmungen von Nutzen.

Aqua Anthos. (A. Ams. B. Bel. Wür.)

℞. Herbae florescentis Rorismarini partem unam.
Aquae . . . quantum sufficit.

Post horas viginti quatuor infusionis destillent partes decem. (Ams. B. Bel.)

Wür. Herbae partem unam et sex Aquae; — A. Herbae partem unam et duodecim Aquae; destillent partes quatuor.

Spiritus s. Aqua spirituosa Anthos s. Rorismarini. (A. Ams. An. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Han. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pal. Pol. R. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. *Br. C. Fi. Sp. Sw. T.*)

℞. Herbae florescentis Rorismarini partem unam.
Alcoholis (20°) . partes quatuor.

Post sufficientem digestionem destillet spiritus 20° indicans. (Ams. An.)

Ful. Gen. et Li. Florum partem unam et sex Alcoholis; destillent partes quatuor; — *Sp.* Florum partem unam et tres Alcoholis; — Du. Florum partem unam cum dimidia et octo partes Alcoholis; destillent partes quinque; — Ed. Florum partes duas et Alcoholis octo; destillent partes septem; — Br. Pal. et Wir. Florum partem unam et quatuor Alcoholis; — Lus. Florum partes duas cum dimidia et decem Alcoholis; destillent partes quinque; — Fer. Florum partem unam cum dimidia et octo Alcoholis; destillent partes sex

℞. Florum siccorum Rorismarini partem unam.
Alcoholis . . . partes quatuor.

Post horas viginti quatuor digestionis destillent in balneo aquae fere ad siccum, productum novis floribus infunde et iterum destillationi subjice. (Sar.)

D. Florum libram unam, Aquae Vitae libras sex; mixtis destillando trientes duos abstrahe et productum cum novorum Florum semilibra novae destillationi subjice; — Wür. Florum sesquilibram cum Alcoholis libris decem destillationi et productum novae destillationi supra Florum uncias tres subjicere.

℞. Florum Rorismarini partem unam.
Alcoholis (0,910) partes quatuor cum dimidia.
Aquae . . . . . partes sex.

Post horas viginti quatuor destillent partes quatuor (0,915). (A.)

Am. Lon. et *C.* Florum libras duas, Aquae Vitae octarios octo et Aquae quantum sufficit ad prohibendum empyreuma; destillent octarii octo; — Bor. Bor4 Han. HassP. O. Pal. et Sax. Florum partem unam, Alcoholis quatuor et Aquae quantum sufficit; Pond. sp. = 0,8852 = 22° B. HassP.; — *Br.* Florum libram unam et uncias duas et Aquae Vitae libras octo; destillent tres quadrantes; — Suec. Florum partem unam, quatuor Alcoholis et Aquae duas; destillent partes duae; — Fenn. Florum partem unam, Aquae et Alcoholis, singulorum duas; destillent partes duae; — His. Florum partem unam et duas Aquae Vitae; destillet una pars; — *Fi. T.* Summitatum florescentium uncias octodecim, Alcoholis 28° B. libras octo, Aquae duas; post macerationem duodecim horarum destillent in balneo aquae librae sex (octo); rectificari potest productum ad quinque vel sex librarum remanentiam. (*Aqua Reginae Hungariae.*)

℞. Florum Rorismarini partes duodecim.
Alcoholis . . . . partes sex.
Aquae . . . . . partes duas.

Destillent lente partes sex, productum infunde

Florum recentium Rorismarini partibus duodecim
Aquae . . . partibus duabus.

Destillent partes sex. (*Sw.*)

℞. Herbae florescentis Rorismarini partes duodecim.
Alcoholis (22°) partes triginta sex.
Aquae destillatae Rorismarini partes duodecim.

Post quatuor dies destillent partes triginta. (Gal.)

R. Rorismarini semilibram, Aquae Rorismarini libram unam et Alcoholis libras quatuor; destillent librae tres.

℞. Olei Rorismarini pondere unciam unam.
Spiritus rectificati . . congium.
Aquae . . . . quantum satis ad prohibendum empyreuma; destillet lento igne congius. (LonN.)

Aqua Hungarica s. Reginae Hungariae s. Anthos composita, Alcohol Anthos s. Rorismarini compositus, Spiritus aromaticus. (Br. D. Fer. Han. Wir. *Sw. Vm.*)

℞. Florum Rorismarini libram unam.
— Lavandulae uncias quatuor.
Aquae Vitae . . . . libras sex.
Post duodecim horas digestionis destillent librae tres. (D.)

℞. Florum Rorismarini partes tres.
— Lavandulae partem unam.
Aquae Vitae . . . partes sex.
— purae . partes duodecim.
Destillent tres quadrantes. (*Sw.*)

Vm. Lavandulae partem unam, Rorismarini tres, Aquae Vitae duodecim et Aquae quadraginta; destillent partes octodecim

℞. Herbae Rorismarini cum floribus,
— Serpylli,
— Thymi,
singularum partem unam.
Aquae Vitae partes viginti quatuor.
— purae
partes quadraginta octo.
Destillent partes viginti. (*Vm.*)

℞. Herbae florescentis Rorismarini libras quatuor.
— — Salviae uncias sex.
Zingiberis . . . uncias duas.
Aquae Vitae . libras duodecim.
— purae . . . libras duas.
Destillent librae undecim. (Br. Han. Wir.)

Vm. Zingiberis partem unam, Salviae tres, Rorismarini viginti quatuor, Aquae Vitae nonaginta et Aquae centum octoginta; destillent partes sexaginta sex.

℞. Herbae Rorismarini libras duas.
— Salviae . . uncias tres.
— Thymi . . uncias sex.
Alcoholis (34°) . libras sedecim.
Macera per dies duos, tunc destillent in balneo aquae, et productum nova destillatione rectificetur. (Fer.)

Spiritus carminativus, Alcohol Helenii compositum. (His.)

℞. Radicis Helenii,
— Carlinae,
singularum unciam unam.
Summitatum Rorismarini,
— Majoranae,
singularum uncias quatuor.
Baccarum Lauri,
Foeniculi,
Carvi,
Anisi, singulorum unciam unam.
Piperis Jamaicensis,
Cinnamomi,
singulorum semunciam.
Corticis recentis Aurantiorum drachmas tres.
Aquae Vitae . . . libras tres.
Digere per dies duos in vase tecto, tunc destillent in balneo aquae.

Aqua apoplectica. (Pal. Wir. *Sp.*)

℞. Herbae florescentis Salviae uncias octo.
— — Majoranae,
— — Serpylli,
singulorum unciam unam.
Florum Liliorum Convallium uncias tres.
— Lavandulae,
— Rorismarini,
singulorum uncias duas.
Cinnamomi . . . sesquiunciam.
Cubebarum . . . semunciam.
Caryophyllorum . drachmas tres.
Macidis . . . drachmas duas.
Vini albi . . . libras duodecim.
Post tres dies macerationis destillet dimidia pars. (Wir.)

℞. Radicis Calami,
— Iridis Florentinae,
— Aristolochiae rotundae,
singularum sesquiunciam.
Herbae Majoranae,
— Chamaepityos,
— Rorismarini,
Florum Primulae Veris, singulorum manipulum unum.
Seminum Sileris montani,
— Foeniculi,
singulorum sesquidrachmam.
Cubebarum,
Nucis moschatae,
Caryophyllorum,
singulorum drachmas tres.
Cinnamomi,
Ligni Aloës,
singulorum drachmas duas.
Piperis longi,
Sagapeni,
Opopanacis,
Myrrhae,
Sandaracae,
singulorum sesquidrachmam.
Aquae Florum Primulae Veris,
— — Tiliae,

Aquae Salviae,
singularum uncias octodecim.
Post septem dies infusionis destillent. (*Sp.*)

℞. Florum recentium Liliorum Convallium,
— — Lavandulae,
— — Primulae Veris,
— — Tiliae,
— — Betonicae,
— — Caryophyllorum rubrorum,
singulorum unciam unam.
Herbae Rorismarini,
— Majoranae,
— Basilici,
— Salviae,
— Serpylli,
— Mari,
singulorum sesquiunciam.
Cinnamomi . . . uncias duas.
Caryophyllorum . drachmas sex.
Nucis moschatae . unciam unam
Cardamomi minoris,
Cubebarum,
Zedoariae,
Santali citrini,
singulorum semunciam.
Alcoholis,
Vini generosi,
singulorum libras quinque.

Macera herbas et flores in alcohole, aromata in vino, misce liquores, destillationi lentae subjice, prius productum clarum et limpidum ad usum internum et secundum, album et oleaginosum, ad usum externum serva. (Pal. Wir.)

Gabe, von zwei Drachmen bis eine Unze, bei Windcolik. Aeußerlich in Einreibungen oder Räucherungen.

Rubia.

Rubia tinctoria, L.; Krapp, Krappwurzel, Färberröthe; Garance (*Gal.*); Red matter (*Ang.*); Marena (*B.*); Krap (*D. Bel.*); Granza rubia (*His.*); Robbia (*I.*); Marzana (*Pol.*); Ruida (*Lus.*); Krapp (*Suec.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fer. Ful. Gal. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. Sax. Wir. Wür. WW. *Be. Br. C. Fi. G. M. Pid. Sp. Z.*

♃ (Tetrandria Monogynia, L.; Rubiaceae, J.) Eine in Europa angebaute Pflanze. (Fl. méd. IV. 177. *Blackw.* t. 326. *Schk.* t. 25. *Plenck* t. 57. Düss. off. Pfl. VII. t. 18. *Bert.* Bild. I. 71. fig. 2.)

Man wendet die Wurzel (radix Rubiae tinctoriae s. sativae s. majoris) an; sie ist lang, ästig, gegliedert, walzig, gänsefederdick, und roth, besonders außen. Sie hat einen schwachen Geruch und einen bitterlichen, schwach styptischen Geschmack.

Sie enthält viel Färbestoff, Gallapfelsäure, Satzmehl, Sauerkleesäure und einen eigenthümlichen Färbestoff, von Collin und Robiquet Alizarine (Izarinum) genannt. Döbereiner hatte schon früher einen dergleichen Stoff, Erythrodanin (Erythrodaninum) besonders dargestellt.

In Ostindien gebraucht man statt dieser Art die Rubia Manjista, *Roxb.* [Fuh (*Ar.*); Well madatta (*Cy.*); Menjithe (*Hin.*); Puutvayr (*Mal.*); Runas (*Pe.*); Manjischtha (*Sa.*); Manjittie (*Tam.*); Mandestie (*Tel.*)], eine in Nepaul und Thibet wachsende Pflanze.

Adstringirend, besonders durch die Eigenschaft, die Knochen der damit genährten Thiere zu färben, berühmt. Man hat sie bei Rachitis empfohlen. — Gabe des Pulvers, eine halbe bis eine Drachme.

Species resolventes. (Huf.)

℞. Radicis Rubiae,
— Graminis,
— Taraxac,
— Saponariae,
Herbae Fumariae,
Summitatum Millefolii,
singularum partes aequales.

Extractum Rubiae tinctoriae aquosum. (Fer. *T.*)

℞. Radicis Rubiae . libram unam.
Aquae . . . . . libras tres.

Coque, cola exprimendo, colaturam albuminis ope clarificá et sufficienter consume.

T. Radicis libram unam, Aquae bullientis octo, post horas viginti quatuor infusionis cola, leviter exprimendo, filtra et ad extracti consistentiam consume.

Extractum Rubiae tinctoriae alcoholicum. (Br. Han.)

℞. Radicis Rubiae . . partes duas.
Alcoholis . . . . . partes tres.
Aquae . . . . . partes novem.

Digere in vase tecto, cola exprimendo, alcoholem lenta evaporatione extrahe et reliqua ad extracti consistentiam inspissa. (Han.)

Br. Alcoholis ope penitus extrahere, tincturas commixtas filtrare, alcoholem destillatione separare et quod reliquum est ad extracti consistentiam consumere.

Pulvis ad s. contra rachitidem s. antirachiticus. (*Sm.*)

℞. Rubiae pulveratae drachmas duas.
Concharum praeparatarum drachmas quatuor.
Fiant doses octodecim. — Gabe, zwei oder drei Stück täglich in Zuckerwasser, bei einem jungen Kinde.

Pulvis Rubiae compositus. (Wür.)

℞. Rubiae . . . . . semunciam.
Myrrhae,
Boracis,
singulorum drachmam unam.

Decoctum Rubiae tinctoriae. (*Sw.*)

℞. Radicis Rubiae . unciam unam.
Macidis . . . drachmas duas.
Coquendo partem tertiam consume et colaturae adde
Tincturae aromaticae drachmas duas.
Syrupi Acidi citrici uncias duas.
Adstringirend, bei Gelbsucht, Bleichsucht, Amenorrhöe und chronischen Catarrhalbeschwerden empfohlen. — Gabe, drei Unzen drei oder vier Mal täglich.

Tisana antiscrophulosa. (*Ca. Sm.*)

℞. Radicis Rubiae . . semunciam.
Lupuli . . . manipulum unum.
Foliorum Juglandis . . no. 3
Aquae semisextarios (demi-setiers) tres.
Coquendo ad octarii (chopine) unius remanentiam consume et colaturae refrigeratae adde
Tincturae Martis tartarisatae cochlear minus (Kaffeelöffel).
Gabe, zwei Gläser, Morgens und Abends.

Tisana tonica et antiherpetica. (*Pic.*)

℞. Radicis Rubiae . unciam unam.
Florum Arnicae,
Stipitum Dulcamarae,
singulorum semunciam.
Aquae . . . . . vitra sex.
Coque et adde
Foliorum Cochleariae semunciam.

Decoctum Carnis aperiens s. aperitivum. (*Bo. Ca. Pic. Sm.*)

℞. Carnis e collo vervecis uncias quatuor
Radicis Saponariae semidrachmam.
— Rubiae . drachmas duas.
Foliorum Cichorii amari manipulum unum.
Aquae . . . . sesquioctarium
Coquendo tertiam partem consume.
Auf vier Mal, Morgens nüchtern, bei Anschwellungen der Unterleibseingeweide. Zur ersten Tasse setzt man einen Scrupel essigsaures Kali, dessen Gabe man allmälig verstärkt.

Tisana antiicterica. (*Bo.*)

℞. Radicis Rubiae,
— Curcumae,
singularum unciam unam.
— Chelidonii majoris,
Summitatum Centaurii minoris,
singularum manipulum unum.
Aquae fontanae,
Vini Rhenani,
singulorum libras duas.
Coque et colaturae adde
Syrupi Quinque Radicum aperientium . . . . . uncias duas.
Von Sydenham gegen Gelbsucht gerühmt; er ließ Morgens und Abends ein halbes Pfund davon nehmen.

Potio antirachitica, (*B^a. Sm.*)

℞. Radicis Rubiae siccatae semunciam.
Tartari solubilis drachmas duas.
Aquae fontanae uncias sexaginta quatuor.
Coque blando igne per horam unam, cola et adde
Mellis despumati . uncias duas.
Bei Rachitis empfohlen. — Levret ließ davon Kindern täglich acht Unzen nehmen. — Von der frischen Wurzel nimmt man das Doppelte.

Decoctum Rubiae compositum (alcalinum). (Wür.)

℞. Radicis Rubiae,
— Rhei,
singularum drachmas tres.
Kali subcarbonici drachmas duas.
Aquae fontanae libras tres cum dimidia.
Coque per horam unam et colaturae adde
Syrupi Zingiberis uncias duas cum dimidia.

Apozema tonicum. (*Bo.*)

℞. Radicis Rubiae,
— Ononidis,
singularum semunciam.
Foliorum Marrubii,
— Matricariae,
— Artemisiae,
— Rorismarini, singulorum manipulum dimidium.
Seminum Petroselini pugillum unum.
Croci,
Cinnamomi,
singulorum scrupulum unum.
Aquae . . . . quantum sufficit ut octo unciae colaturae obtineantur, cui adde
Syrupi Marrubii unciam unam.

Tartari martialis solubilis
semidrachmam.

Bei Menstruationsbeschwerden, Bleichsucht, weißem Fluß und Blutflüssen nach Unterdrückung irgend eines habituellen Ausflusses.

Vinum adstringens. (*Au.*)

℞. Radicis Rubiae . unciam unam.
— Tormentillae,
Fructuum Aurantii viridium,
singulorum semunciam.
Cascarillae . . . drachmas sex.
Extracti Ligni Campechiensis
drachmas tres.
Vini . . . . . libras duas.

Post sufficientem digestionem cola. — Gabe, alle drei Stunden eine halbe bis ganze Unze.

Rubus.

Sechs Arten dieser Gattung werden in den Pharmacopöen angeführt:

1) *Rubus chamaemorus*, *L.*; Multbeere; Ronce de montagne (*Gal.*); Mountain bramble (*Ang.*); Multebaer, Myrebaer, Laamanak, Latoch (*D.*); Aalher blaadige bramboos (*Bel.*); Moruszka (*Pol.*).

D. Pol. R. *Be. M.*

♃ (Icosandria Polygynia, L.; Rosaceae, *J.*) Eine im nördlichen Europa wachsende Pflanze. (Linn. Fl. Lapp. t. 5. f. 1. *Plenck* t. 410.)

Man wendet die Früchte (fructus s. baccae Chamaemori) an; es sind geruchlose, unreif etwas sauer, nachher aber wässerig und nicht sehr angenehm schmeckende Beeren.

2) *Rubus fruticosus*, *L.*; Strauchartige Himbeere, Brombeere, Kratzbeere, gemeiner Brombeerstrauch; Ronce noire (*Gal.*); Common bramble (*Ang.*); Brambaer (*Di*); Zarca (*His.*); Bramen, Brummeln (*Bel.*); Rovo volgare, More di razza o di rogo, Rogo di Macchia (*I.*); Jezyny (*Pol.*); Sylva (*Lus.*); Brombaer (*Suec.*).

An. Bor4. Br. Gal. His. Wir. *Br. Fi. Sp.*

Ein in ganz Europa gemeiner Strauch. (*Hayne* III. t. 12. *Lam.* Encycl. meth. t. 441. *Bert.* Bild. IV. 18 fig. 2.)

Man wendet die Früchte (baccae Rubi nigri s. fruticosi s. Mori rubri) an; es sind geruchlose Beeren von angenehmem Geschmack.

3) *Rubus arcticus*, *L.*; nordische Himbeere; Ronce septentrionale (*Gal.*); Dwarf bramble (*Ang.*); Akerbaer (*Suec.*).

Br. R. Suec. *Be. M.*

Ein Strauch des nördlichen Europa's. (*Linn.* Fl. Lapp. t. 5. fig. 2. *Plenck* t. 409.)

Man wendet die Früchte (Baccae Norlandicae), Beeren von angenehmem Geruch und angenehmem, weinartigen Geschmack an.

4) *Rubus trivialis*, *Mich.*; Ronce commune (*Gal.*); Dewberry (*Ang.*).

Am. *C.*

Ein Strauch Nordamerica's, dessen Rinde adstringirende Kräfte besitzt.

5) *Rubus villosus*, *Willd.*; haarige Himbeere; Ronce vélue (*Gal.*); Blackberry (*Ang.*).

Am. *C.*

Ein Nordamericanischer Strauch. (*Bigel.* Med. Bot. II. t. 38.)

Die Rinde ist adstringirend.

6) *Rubus Idaeus*, *L.*; Himbeere; Framboisier (*Gal.*); Raspberry (*Ang.*); Maliny, Ostrucini (*B.*); Hindbaer, Bryngebaer, Himbaer (*D.*); Frambueso, Sanguesca (*His.*); Framboizen (*Bel.*); Rovo ideo, Lamponi, Framboè (*I.*); Maliny (*Pol.*); Amoreira frambeeza (*Lus.*); Hallon (*Sa.*).

A. Am. An. B. Ba. Bor. Bor4. Br. D Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. His. Li. O Pol. R. Sax. Suec. Wir. WW. *Be. Br. Fi. G. M. Pid. Sp. Z.*

Ein in ganz Europa gemeiner Strauch. (*Blackw.* t. 289. *Plenck* t. 407. *Hayne* III. t. 8. Düss. off. Pfl. t. 20. Fl. méd. III. 170. *Bert.* Bild. IV. 18 fig. 1.)

Man wendet die Früchte, Himbeeren (baccae s. fructus Rubi Idaei) an; es sind fast runde, rothe, graue oder weiße Beeren, welche aus einer Menge von weichem Fleisch eingehüllten, auf einem sehr langen kegelförmigen Fruchtboden sitzenden Saamen bestehen.

Decoctum Rubi villosi. (Am. B*.)

℞. Corticis Radicis Rubi villosi
unciam unam.
Aquae . . . . quantum sufficit
ut coquendo unciae octo colaturae obtineantur.

Adstringirend, in Nordamerica in Gebrauch. — Gabe, ein halbes Glas täglich mehrmals.

Syrupus Rubi arctici. (Suec.)

℞. Succi baccarum Rubi arctici recens expressi et depurati
libram unam,
Sacchari albi . . . libras duas,
Fiat leni calore syrupus.

Succus Rubi Idaei. (Br. Ful. Hass. His. Pal. Sar. Sax. Wir. *Pid.*)

℞. Baccarum Rubi Idaei bene maturarum . . . . quantum vis.

Contere inter manus, massam in cavam sepone, donec liquidum clarum supernatet et cola exprimendo; succum per aliquot dies sepone ut depuretur et partem claram in lagenis longicollibus a strato olei obtectam serva. (Br. His. Pal Sax. Wir.)

Hass et *Pid.* succo antequam in lagenas immittatur, Sacchari partem quartam addere et semel ebullire jubent.

Rooh Rubi Idaei. (Br. Ful. His. Wir. Würr. *Pid. Sw. T.*)

℞. Baccarum Rubi Idaei maturorum quantum vis.

Contere, massam per tres dies sepone, et succum leni igne ad consistentiam mellis coque, quartam Sacchari partem addendo. (Br. Ful. Wir. Würr. *Pid. Sw.*)

℞. Sacchari fortissime cocti libras duas.
Succi Baccarum Rubi Idaei,
Aquae communis,
singulorum libram unam.

Coque ad consistentiam gelatinae et cola. (His. *T.*)

Säuerlich, kühlend.

Mel Rubi Idaei. (*Vm.*)

℞. Succi Baccarum Rubi Idaei recenter expressi . partem unam.
Mellis albi . . . . partes tres.

Misce frigide et post aliquot tempus sepositionis decantha.

Syrupus Rubi Idaei s. de Frambaesiis et Rubi fruticosi. (A. Ams. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. D. Fenn. Ful. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. L. Lus. O. Pal. Pol. Suec. Wir. Würr. *C. Fi. Pid. Sw. T. Vm.*)

℞. Baccarum Rubi Idaei nondum perfecte maturarum,
Sacchari puri,
singulorum partes aequales.

Misce leviter agitando, supra lenem ignem collocata, paullulum coque, cola per cribrum setaceum arcte textum et syrupum serva. (Gal.)

T. Baccas Rubi fruticosi non perfecte maturas calori balnei aquae bullientis exponere, donec rumpantur, addere per vices Sacchari albi pulverati pondus aequale, continue agitando, calorem deinde ad bullitionem usque augere, mixta adhuc bullientia cribro immittere et syrupum parare.

℞. Succi Baccarum Rubi Idaei modo expressi . . . . partes duas.
Sacchari albi
partes tres cum dimidia.

Solve in balneo aquae tepido. (*Vm.*)

℞. Sacci Baccarum Rubi Idaei depurati uncias viginti.
Sacchari albi . . . . libras tres.

Liqua blandi caloris ope (ebullient semel et fiat l. a. syrupus). (Bor. Bor4. Han. HassP. Lus. O. Pal.)

Bor4. Syrupum Rubi fruticosi eodem modo praeparandum indicat; — Ams. B. et Bel. Succi uncias sedecim et Succi libras duas cum dimidia; — D. Pal. Wir. et Würr. Succi uncias viginti et Sacchari triginta duas; — Hass. et *Pid.* Succi uncias decem et Sacchari tredecim cum dimidia; — A. Fenn. Suec. *Fi.* Succi partem unam et duas Sacchari (eodem modo Syrupus Rubi fruticosi *Fi.*); — *Sw.* Succi uncias sedecim et Sacchari viginti octo; — Gen. Succi sesquilibram et Sacchari libras duas cum dimidia; — C. Sueci octarium unum et Sacchari libras duas; — L. Succi uncias octodecim et Sacchari libras duas; — Ful. Succi et Sacchari partes aequales.

Fi. Succi Baccarum Rubi fruticosi et Mellis despumati, singulorum partes aequales; lente coquendo paratur *Syrupus Rubi fruticosi cum Melle* s. *Diamoron cum Melle*.

Acetum Rubi Idaei. (Bor. Bor4. Gal. Han. Hass?. O. Pal. Pol. Sar. Wir. *T.*)

℞. Baccarum Rubi Idaei recentium libras sex.
Aceti Vini ruhri libras quatuor.

Macera per dies quatuor, cola absque expressione et filtra. (Gal.)

Bor. Bor4. Han. O. Pol. et Sar. Baccarum partem unam, Aceti duas et unum mensem macerationis (sepositionem donec liquor colore intense rubro imbutus fuerit Bor4.); — Pal. et Wir. Baccarum partem unam, Aceti sex et aliquot dies macerationis soli exposterum; — *T.* Baccarum libras quatuor, Aceti libras duas et uncias octo, macerationem per dies quatuor vel quinque.

℞. Succi Baccarum Rubi Idaei maturarum . . . . libras duas.
Aceti . . . . semilibram.

Post duos dies macerationis exprime fortiter et colaturae adde
Sacchari albi . . sesquilibram.

Digere blande igne et post refrigerationem decantha. (D.)

HassP. Baccarum recentium partem unam; Aceti duas, macerationem per mensem, Sacchari partem unam et ebullitionem.

Kühlend, beruhigend, in verschiedener Menge zu Tisanen hinzugesetzt.

Aqua Rubi Idaei. (Ba. Bor. Bor4. Br. D. Ful. Han. Hass. HassP. Li. O. Pal. Pol. R. Sax. *Pid. Sw. Vm.*)

℞. Baccarum Rubi Idaei contritarum partem unam.
Aquae . . . . . partes duas.
Destillet una pars. (Br.)

Pal. Baccarum partem unam et quatuor Aquae; destillet una pars; — D. Baccarum partem unam et sex Aquae; destillent partes quatuor; — *Vm.* Baccarum partem unam, Aquae viginti quatuor; destillent partes sex; — R. Baccarum partes quatuor et decem Aquae; destillent partes sex; — *Sw.* Baccarum partes decem et Aquae quantum sufficit; destillent partes viginti; — Li. Baccarum partes tres et sedecim Aquae; destillent partes octo; — HassP. Baccarum contusarum ac statim modice expressarum libras duodecim, Aquae quantum satis; destillent librae octodecim.

℞. Pulpae Baccarum Rubi Idaei partem unam.
Aquae . . . . . partes tres.
Destillent partes duae. (Han.)

Ba. Pulpae partem unam et Aquae sex; destillent partes tres; — O. Pulpae partes duas et Aquae sufficientem quantitatem; destillent partes viginti; — Hass. et *Pid.* Pulpae partes tres et sedecim Aquae; destillent partes octo.

℞. Pulpae Baccarum Rubi Idaei partem unam.
Aquae . . . . . partes sex.
Post aliquot dies fermentationis destillent partes duae. (Sax.)

℞. Baccarum Rubi Idaei quantum vis. Contritas cum Aquae tepidae aequali quantitate subige; fermentationi subjice, adde Aquae frigidae partes viginti quatuor et destillando partes sex abstrahe. (*Vm.*)

℞. Pulpae (i. e. residui post parationem succi) Baccarum Rubi Idaei libras decem.
Aquae . . . . . libras triginta.
Subcarbonatis Potassae (Kali carbonici crudi) . . uncias duas.
Destillent librae viginti. (Bor. Bor4. Pol.)

Bor4. praeterea Residui sale conditi libras quindecim, reliqua ut antea; — Ful. Baccarum libras octo, Aquae viginti quatuor et unam Subcarbonatis; destillent librae sedecim.

Rumex.

Drei Pflanzen dieser Gattung führen wir hier an:

1) *Rumex aquaticus*, *L.*; Wasserampfer, Wassermangold, Wassergrindwurzel, Roßampferwurzel, Butterweckenkraut; Patience d'eau ou aquatique, Rhubarbe sauvage (*Gal.*); Waterdock (*Ang.*); Vandskreppe (*D.*); Waterpatjch (*Bel.*); Labaca major (*Lus.*); Vatnsyra (*Suec.*).

A. Ams. B. Bel. Br. D. Ful. Gal. Li. R. Sax. Wir. *Bo. C. M. Sp.*

4 Eine Pflanze (Hexándria Trigynia; *L.*; Polygoneae, *J.*), welche in Europa an überwässerten Stellen wächst. (*Zorn* Ic. pl. t. 586.)

Man wendet die Wurzel (radix Lapathi aquatici s. Herbae Britannicae s. Hydrolapathi s. Rhapontici) an; sie ist groß, ästig, geringelt, außen schwärzlichbraun, innen safrangelb und geruchlos. Der Geschmack ist herb und etwas bitter.

Tonisch, schweißtreibend, bei Hautkrankheiten sehr in Gebrauch.

2) *Rumex crispus*, *L.*; Krauser Ampfer; Patience frisée (*Gal.*); Curled dock (*Ang.*); Kruset skreppe (*D.*); Gekruide patich (*Bel.*); Svinsyra (*Suec.*). Gal. *C.*

4 Eine Europäische Pflanze (*Curt.* Fl. Lond. t. 204.)

Man wendet das Kraut (herba Lapathi crispi) an; es besteht aus einem wässrigen, wenig ästigen Stängel mit lanzettigen, stark wellenförmigen, am Rande wie krausen Blättern. Es hat einen ganz schwach styptischen Geschmack.

3) *Rumex sanguineus*, *L.*; Blutampfer, Blutkraut; Patience rouge (*Gal.*); Bloody dock (*Ang.*); Bluedkruid (*Bel.*). Gal.

4 Eine im nördlichen Europa und Amerika wachsende Pflanze. (*Zorn* Ic. pl. t. 127.)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an.

Die Wurzel (radix Lapathi sanguinei) hat einen herben und adstringirenden Geschmack.

Das Kraut besteht aus einem ästigen, purpurrothen Stängel mit herzförmigen, lanzettförmigen, feingezähnten purpurrothen Blättern.

4) *Rumex acutus* und *obtusifolius*, *L.*; spitz- und stumpfblättriger Ampfer, Grindwurzel; Patience à feuilles aiguës et vulgaire (*Gal.*); Romice Lapato, Acetosa maggiore (*I.*).

Bor. Bor4. HassP.

Eine in Europa an feuchten Stellen wachsende perennirende Pflanze. (*Blackw.* t. 491. *Plenck* t. 296.)

Die Wurzel (radix Oxylapathi s. Lapathi acuti) ist ästig, von verschiedener Stärke, außen gelblichbraun, innen gelb; getrocknet, außen braun, ohne Geruch, der Geschmack bitter und adstringirend.

Aceti et sex dies digestionis blandi caloris ope; — Br. Hass. Pal. Wir. et *Pid.* Rutae partem unam, Aceti sex et aliquot dies digestionis; — Ams. et Bor. Rutae partem unam, Aceti octo et quatuor dies frigidae macerationis; — Wür. Rutae partem unam, Aceti novem et tres septimanas infusionis solis calore; — A. *T.* Rutae partem unam, Aceti duodecim et macerationem per tres (octo vel decem dierum digestionem in loco tepido *T.*) dies; — Bor4. Rutae uncias tres, Aceti fervens quantum sufficit; post horam cola ut sit sesquilibra.

℞. Foliorum recentium Rutae libram unam.
Aceti communis . . libras sex.
Macera per dies sex, tunc coque parumper et colaturae adde
Alcoholis . . semilibram.
Misce bene. (Lus.)

A. Rutae uncias tres, Aceti destillati libras duas, aliquot dies digestionis blandi caloris ope et Alcoholis partem octavam; — Wir. Alcoholis partem vigesimam.

Der Alcohol dient zur Verhütung der Zersetzung.

Acetum Rutae camphoratum. (*Sw*.)

℞. Summitatum Rutae cum floribus uncias duas.
Aceti . . . . uncias sedecim.
Infunde blando calore per horas viginti quatuor, cola et in colatura dissolve
Camphorae . . drachmas duas.
Filtra. — Ein Prophylacticum.

Oleum Rutae infusum. (Br. Gal. His. Sar. Wir. Wür. *Fi. T.*)

℞. Herbae recentis Rutae,
Olei Olivarum,
singulorum partes aequales.
Post tres dies digestionis exprime. (Br. Wir.)

℞. Herbae recentis Rutae partem unam cum dimidia.
Olei Olivarum . . partes tres.
Digere in balneo aquae per dies tres, post refrigerationem exprime et macerationem cum nova Herba repete. (Sar.)

Gal. digerere inter cineres calidos per horas viginti quatuor Olei partes duas et unam Herbae et operatione denuo repetita, leviter coquere et exprimere; — *T.* Herbae uncias quindecim, Olei Olivarum libras quinque solis calore per 3 vel 4 dies digerere et operationem cum nova Herba repetere, tertia vice macerationem per mensem circiter protrahere, sepositione clarificare etc.

℞. Herbae recentis Rutae partem unam.
Olei Olivarum . . partes duas.
Digere blandi caloris ope per tres dies, coque ad humidi consumptionem usque et cola exprimendo. (Wür.)

His. Herbae partem unam et tres Olei; — *Fi.* Herbae libram unam, Olei quatuor per dies duos macerare, per quadrantem horae coquere et exprimere.

Reizend, gegen Kolik und Würmer, nervenstärkend, in Einreibungen und Klystiren.

Unguentum s. Butyrum Rutae. (His.)

℞. Foliorum recentium Rutae,
— Absinthii,
— Menthae,
singulorum uncias duas.
Axungiae Porci uncias sedecim.
Coque ad humidi consumptionem usque et cola exprimendo.

Oleum Rutae aethereum, Aethereoleum Rutae. (A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. Du. Fer. Ful. Gal. Han. Hass. HassP. Li. Pal. Pol. R. Sar. Sax. Wür. *Br. C. Pid. Sw. T.*)

℞. Herbae recentis Rutae quantum vis.
Aquae communis quantum sufficit.
Destillent. (Ams. B. Bel. Du. Fer. R. *Br. C.*)

T. Herbae partem unam, Aquae bullientis duplum pondus et plures destillationes atque cohobationes; — Ba. Ful. et Li. Herbae partem unam et tres Aquae; — *Sw.* Herbae unam et quatuor Aquae; — Gal. Herbae quinque et septem Aquae; — Bor. Bor4. Han. HassP. Pol. et Sax. Herbae unam et octo Aquae (destillatio, oleo separato, cum Aqua stillatitia supra novam Herbam et addita Aquae sufficiente quantitate tam diu repetatur, donec olei desiderata quantitas obtenta fuerit); — A. Herbae unam et Aquae duodecim.

℞. Herbae recentis Rutae partes viginti quinque.
Aquae partes septuaginta quinque.
Salis culinaris . . partes tres.
Post dies tres destillent. (Br. Hass. Pal. Sar. *Pid.*)

℞. Herbae recentis Rutae quantum vis.
Aquae Rutae . quantum sufficit.
Destillent. (Wür.)

Balsamum Rutae. (Wir. *Sp.*)

℞. Olei Nucis moschatae drachmas duas cum dimidia.
— essentialis Rutae drachmam unam.

Misce bene.

Aquae Rutae. (A. Ams. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Han. Pal. Pol. Sar. Sax. *Br. Sw. Vm.*)

℞. Herbae recentis Rutae partem unam.
Aquae . . . quantum sufficit.
Destillent (post horas viginti quatuor) partes decem. (Ams. B. Bel. Bor. Bor4. Han. Pol. *Sw.*)

Pal. Herbae partem unam et quatuor Aquae; destillent partes duae; — Wür. et *Br.* Herbae partem unam et sex Aquae; destillent trientes duo; — Ba. Herbae partem unam et sedecim Aquae; destillent partes octo; — Sax. Herbae partem unam et Aquae quindecim; destillent partes decem; — A. Herbae partem unam et duodecim Aquae; destillent partes quatuor.

℞. Herbae recentis Rutae partem unam.
Aquae . . . . partes quatuor.
Destillet dimidia pars; productum denuo supra novam Herbam destillet. (Sar.)

℞. Herbae recentis Rutae partes decem.
Aquae Vitae . partem dimidiam.
— purae partes centum sexaginta.
Destillent partes quadraginta. (*Vm.*)

Julep s. Julapium antihystericum. (*Sm.*)

℞. Aquae destillatae Rutae,
— — Bryoniae,
— — Florum Auranfiorum,
singularum uncias duas.
Syrupi Stoechadis,
— Valerianae,
— Paeoniae,
singulorum unciam unam.
Auf drei oder vier Mal zu nehmen.

S.

Sabadilla.

Veratrum Sabadilla, Re.; Sabadille, Mexicanischer Läusesaame, Läusemörder, Läusekörner, Mönchensaat; Cevadille (*Gal.*); Sabadillkorn (*D.*); Sabadiglia (*I.*); Nasikiv sabatyh (*Pol.*); Sabadill, Husarfrae (*Suec.*).

A. Ams. An. B. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. Fenn. Fer. Gal. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lus. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *Be. Br. G. M. Sp.* Z.

4 Polygamia Monoecia, L.; Colchicaceae, *J.*) Eine Pflanze Mexico's. Willdenow gab mit Unrecht China als das Vaterland derselben an.

Man wendet die Frucht und die Saamen an.

Die Frucht besteht aus drei länglichen, röthlichen, nach innen aufspringenden, dreisaamigen, geruchlosen, einen scharfen, brennenden, anhaltenden Geschmack besitzenden Kapseln.

Der Saame (semen Sabadilli s. Sabadillae) ist länglich, gebogen, an einem Ende stumpf, rußschwarz punctirt, von anfangs fadem, bald darauf bitterem, endlich scharfem und Ekel erregenden Geschmack.

Er enthält nach Meißner, Pelletier und Caventou Sabadillsäure (Acidum sabadillicum), Acide cevadique und Veratrin oder Sabadillin (Veratrinum, Sabadillinum).

Aufregend, reizend, innerlich Hitze im Magen und Brechen, äußerlich, besonders bei jungen Personen, Hautentzündung erregend. Man bedient sich derselben zur Tödtung der Läuse und der Eingeweidewürmer. Seeliger wandte sie mit Erfolg gegen Bandwurm an. Der Gebrauch erfordert aber viel Vorsicht.

Pulvis Capucinorum. (B*.)

℞. Seminum Sabadillae,
— Staphydis agriae,
— Petroselini,
Foliorum Nicotianae,
singulorum partes aequales.
Fiat pulvis tenerrimus. — Zur Tödtung des Kopfungeziefers. — Dieses Pulver bringt oft Schwindel und andere beunruhigende Zufälle hervor.

Unguentum ad s. contra pediculos. (Ful.)

℞. Pulveris Sabadillae uncias quatuor.
— Sinapis,
— Pyrethri,
singulorum uncias duas.
Axungiae praeparatae uncias triginta duas.

Pilulae anthelminticae. (*Ca. Sw.*)

℞. Sabadillae,
Mellis, singulorum semunciam.
Fiant pilulae viginti granorum. (*Sw.*)
Ca. Olei Foeniculi guttas viginti addit.

Enema s. Clysma Sabadillae s. contra ascarides. (B*. *Au. Sw.*)

℞. Sabadillae . . drachmas duas.

Aquae fontanae . uncias decem. Coque et colaturae unciarum septem adde

Lactis vaccini . uncias septem. *Infusum ad vices.* Seminum uncias duas, Aceti unciam unam; digere per duos dies. — Zur Tödtung der Bettwanzen, die Bettstellen damit zu waschen.

Sacchārum.

Saccharum officinarum, *L.*; Zuckerrohr; Sucre (*Gal.*); Zucchero officinale (*I.*).

(Triandria Digynia, L.; Gramineae, J.) Eine in Indien einheimische, zwischen den Wendekreisen häufig angebaute Pflanze. (*Plenck* t. 40. Tussac Fl. des Ant. I. t. 23. Düss. off. Pfl. Lief 8. *Bert.* Bild. I. 10. fig. 2. Atlas z. Wörterb. d. Naturgesch. 8. Lief. 29. Tf. Fg. 1.); Arundo saccharifera, L. (*Rumph.* Amb. V. 74.)

Aus der perennirenden Wurzel dieser Pflanze erheben sich mehrere 1 bis 2 Zoll dicke, 8, 10 bis 12 Fuß hohe, mit einem lockern, zelligen, saftigen Mark erfüllte, grüne, gelbe oder violette oder gelb und violet gestreifte Halme, welche von zweireihigen, 4 bis 5 Fuß langen, schmalen, schneidenden Blättern umgeben werden, und aus deren Spitze sich auf einem nackten, glatten, ungefähr 6 Fuß hohen Blüthenstiele eine sehr große, ästige, ausgebreitete, pyramidale Blüthenrispe erhebt.

Der untere Theil des Halmes, von welchem die Blätter bald abfallen, ist es vorzüglich, in welchem sich der Zuckerstoff in größter Menge ausbildet und den man daher zur Gewinnung des Saftes, aus welchem nachher der Zucker bereitet wird, vorzugsweise benutzt. Der Zucker,

Saccharum, Sacchar; Σάκχαρ, Σακχάρον; Sucre (*Gal.*); Sugar (*Ang.*); Sukhir (*Ar.*); Cukr (*B.*); Sukker (*D.*); Schukkir (*Duk. Pe.*); Azucar (*His.*); Cheni (*Hin.*); Suiker (*Bel.*); Zucchero (*I.*); Saker (*Mah.*); Gula (*Mal.*); Cukiea (*Pol.*); Assucar (*Lus.*); Sarkara (*Sa.*); Socker (*Suec.*); Sakkarr (*Tel.*); Panchadara (*Tam.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Würt. WW. *A. Ba. Br. C. Fi. G. M. Par. Pid. Sp. T. Z.*

ist eine derbe, weiße, crystallinische, zerreibliche, geruchlose Substanz von sehr angenehm süßem Geschmack. Der weißeste Zucker (Saccharum albissimum), welcher gemeiniglich Raffinade genannt wird, ist mehr, der weiße Zucker (Saccharum album), gewöhnlich Melis genannt, weniger rein. Nach Europa wird er als röher Zucker oder Moscovade (Moscowatum) gebracht. Der aus der Auflösung des gereinigten Zuckers durch regelmäßige Crystallisation erhaltene Zucker wird Candiszucker, Zuckerkand (Saccharum candum s. cantum s. crystallisatum) genannt, und ist, je nach dem Grade der Reinheit, mehr oder weniger weiß oder gelblich, oder braun und mehr oder weniger durchsichtig.

Bor4. zeigt unter den zur materia pharmaceutica gehörigen Gegenständen die Rotulae Sacchari, Zuckerkuchen an.

Syrupus simplex s. communis s. Sacchari s. Sacchari albi, *Saccharum clarificatum.* (A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. D. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. Stuc. Wir. Würt. *C. Fi. Pid. Sw. T. Vm.*)

℞. Sacchari albi . . . partes tres. Aquae . . . . partem unam. Dissolve blandi caloris ope, liquori, despumando continue, Albumen unum in Aquae parte una dilutum immitte; coque donec nonnisi parva spumae albae copia appareat et per pannum trajice. (Gal. GalM.)

T. Sacchari libras triginta, Aquae decem, Albumina Ovorum quatuor cum Aquae tanta quantitate subacta, ut pondus libras decem aequet.

Parari potest quoque absque ebullitione, dissolvendo Sacchari partes duas in una Aquae, balnei vaporis ope. (Gal.); — GalM. Syrupus refrigeratus 35° indicet.

Hass. Würt. et *Pid.* Sacchari partes quatuor et tres Aquae; — Ams. Ed. et *C.* Sacchari quindecim et octo Aquae; — A. An. B. Ba. Bel. Fenn. Fer. Ful. HassP. Suec. Wir. *Fi.* et *Sw.* Sacchari partes duas et unam Aquae; — D. His. et *Vm.* Sacchari et Aquae, singulorum partes aequales; — Bor. Bor4. Han. O. Pol. Sacchari libras tres et Aquae uncias viginti; — Lon. LonN. Sacchari libras duas cum dimidia et Aquae octarium unum; — Am. Sacchari uncias quindecim et Aquae semioctarium; — Li. Sacchari libras tres et Aquae uncias viginti septem; — Gen. Aquae et Sacchari quantum sufficit ut fiat liquor spissus; — RC. Sacchari libras tres cum dimidia, Aquae libras duas.

Du. Syrupum simplicem inter materias pharmaceuticas indicat i. e. venalem.

Blandeau syrupum colore penitus privatum ita parare proposuit:

℞. Sacchari . . . libras sexaginta.
Carbonis animalis abluti
uncias sexaginta.
Aquae . . . octarios sedecim.
Liqua ignis clari ope et infunde per duas vel tres vices, solutionem Albuminum Ovorum no. 6. in Aquae octariis duobus; ab igne remota sepone, despuma et per pannum trajice. (GalH.)

Durozier sequenti modo procedit:

℞. Sacchari . . libras quadraginta.
Aquae frigidae libras viginti duas.
Agita solutionem cum Carbone animali loto, et mixturam subinde vehementer movendo per horas viginti quatuor, tunc filtra.

Grammaire hunc modum parandi indicat:

℞. Sacchari . . . . libras viginti.
Aquae . . . . . libras decem.
Albumina Ovorum . . . no. 3.
In autoclave inclusa stent super igne per horae quadrantem.

RC. praeterea *Syrupum Molasses* s. partem sacchari non crystallisabilem indicat.

Syrupus s. Tinctura Corallii. (Gen.)

℞. Corallii rubri,
Cerae flavae,
singulorum libras duas.
Cerae liquefactae corallium immitte et tamdiu coque, donec hujus supremi color penitus cum cera commixtus sit; decantha deinde et igni appropinquando adde
Sacchari albi . . . libras duas.
Saccharo liquato, ab igne remove et adde
Aquae bullientis . sesquilibram sed sensim infundendo et sub continua agitatione, ne materia e vase repellatur; coque denuo ut cera liquefiat et in locum frigidum ad coagulandum sepone; crustâ deinde semotâ syrupum serva.

Rotulae Manus Christi, Saccharum perlatum. (Br. Wir. *Sp.*)

℞. Sacchari albi . . quantum vis.
Aquae Rosarum quantum sufficit.
Fiant rotulae. (*Sp.*)

℞. Sacchari albi . . libram unam.
Aquae Rosarum quantum sufficit ad dissolvendum saccharum. Coque ad globulum usque et adde
Matris Perlarum pulveratae
semunciam.
Fiant rotulae. (Br. Wir.)

Sagapenum.

Gummi Sagapenum s. serapinum; Σαγάπηνον; Sagapengummi, Serapingummi; Sagapenum, Gomme seraphique (*Gal.*); Sughenus (*Ar. Duk.*); Sagapeno (*His. Lus.*); Sagapeno, Serapino (*I.*); Sagapen (*Pol.*); Kundel (*Sa.*).

Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fer. Gal. GalM. Gen. Han. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. Sax. Wir. Wür. *A. Be. Br. C. Fi. G. M. Sa. Sp. T. Z.*

Ein Gummiharz in körnigen Massen oder erbsengroßen Tropfen (Sagapenum in granis, was jedoch sehr selten vorkömmt), äußerlich von röthlichgelber, innen von röthlichweißer Farbe. Der Geruch ist unangenehm, dem des Asand ähnlich, aber weniger stark, der Geschmack scharf.

Diese Substanz kommt, nach Willdenow, von Ferula Persica, *Hope* ♃, persisches Seckenkraut (Pentandria Digynia, L.; Umbelliferae, J.), einer Pflanze Persien's. (Phil. Trans. LXXV. 36. t. 3. 4.)

Reizend, selten angewendet.

Sago.

Sagu, Faecula Sagu; Sago; Sagou (*Gal.*); Sagu (*Ba. Ju. Mal.*); Sekuhme (*C.*); Sauke chawal (*Duk.*); Sabudana (*Hin.*); Schowarisi (*Tam.*); Zowbium (*Tel.*).

Am. An. B Ba. Bor4. Fer. Ful. Gal. Hass. HassP. Li. Lus. R. Wir. *A. Be. Br. C. Fi. G. M. Pid. Sp. T.*

Eine stärkemehlartige Substanz in kleinen unregelmäßigen, über Stecknadelknopf großen, weißlichen oder röthlichen, sehr harten, gleichsam, besonders in der Mitte, hornartigen, geruch- und geschmacklosen Körnern (Grana Sagu).

Man bereitet den Sago aus dem Mark der Sagopalme, Sagus Rumphii, *Lamk.*, welche auf den Molucken wächst.

Stärkend, erweichend.

Gelatina Sagu. (Lus.)

℞. Sagu pulverati drachmam unam.
Aquae . . . . . uncias octo.
Coque lente, agitando continue, ad consistentiam requisitam. Adde
Sacchari albi . quantum sufficit ad gratum saporem.

Salep.

Salab; Salep; Salep (*Gal.*); Salibimisri (*Ar. Duk. Hin.*); Salamisrie (*Tam.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bor. Bor4. BorC. Br. D. Fenn. Gal. Ham. Han. Hass. HassP. Lus. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *A. Be. C. Fi. G. M. Pid. Sp. T.*

Eine stärkemehlartige Substanz in klei-

nen Stücken von der Größe einer Kaffeebohne bis zu der einer Mandel, von knochenähnlicher Farbe, welche halbdurchsichtig, fasthornartig ist und einen etwas bock- und saamenähnlichen Geruch und einen süßen, schleimigen Geschmack besitzt.

Man bereitet den Salep in Persien aus den Wurzelknollen unbekannter Orchideen. Vorzüglich wird die Wurzel von Orchis mascula, L. (*Blackw.* t. 58. *Plenck* t. 643.) und Morio, L. (*Schk.* t. 271. *Plenck* t. 645.), welche beide in Deutschland, erstere aber vorzüglich häufig in der Türkei und in ganz Asien vorkommen soll, als Salepwurzel benutzt.

Stärkend.

Pulvis Salep. (B*.)

℞. Salep . . . . . sesquiunciam.
Sagu . . . . . unciam unam.
Gummi Tragacanthae drachmam unam.

Man verbäunt Morgens und Abends einen Kaffeelöffel voll mit Wasser und Milch und macht einen Brei daraus, welcher bei Schwindsucht und Husten von Nutzen ist.

Conditum Satyrii, Conserva Orchidis. (Pal. Sar. Wir.)

℞. Radicis recentis Orchidis libram unam.
Aquae . . . . . libras octo.

Macera per dies aliquot, tunc coque ad mollitiem usque; in decocto clarifica deinde

Sacchari albi . . sesquilibram.

Infunde radicem per tres dies et tunc coque in syrupo atque in eo retine vel evaporatorii ope sicca. (Sar.)

Pal. et Wir. Radicem in Aqua coquendo mollefacere, tuno exstillare et ei infundere Saccharum ad plumam coctum.

Gelatina s. Mucilago Radicis Salep (An. BorC. Bor4. Han. Lus. *Fi. Sw. T. Vm.*)

℞. Salep pulverati drachmam unam.
Aquae . . . . . uncias octo.
Coque sufficienter. (*Sm.*)

Bor4. Salep drachmam unam, Aquae frigidae uncias duodecim, ad unciarum septem remanentiam decoque.

℞. Pulveris Salep . drachmas duas.
Aquae bullientis . . uncias sex.
Tritura simul. (An.)

BorC. Salep drachmas duas et Aquae bullientis uncias duodecim.

℞. Salep pulverati drachmam unam.
Aquae . . . . . uncias octo.
Coque et adde
Sacchari sufficientem quantitatem ut sapor gratus prodeat. (Lus.)

Vm. Salep drachmam unam, Aquae uncias quatuor cum dimidia et Syrupi Sacchari sesquiunciam; — Han. Salep drachmas duas, Aquae uncias octo et Syrupi Corticum Aurantiorum sesquiunciam; — *Fi.* Salep unciam unam cum Aquae libris sex ad duarum remanentiam coquere, colare, ad unam lento calore consumere, addere Sacchari uncias duas et ab igne removendo, affundere Aquae Cinnamomi lacteae semunciam; — *T.* ut *Fi.* sed sub finem aquae cinnamomi loco Aquae Citri drachmas duas et aliquot guttas solum Aquae Cinnamomi.

℞. Pulveris Salep . drachmas duas.
Aquae frigidae quantum sufficit ut coquendo decocti unciae novem obtineantur, cui adde
Syrupi Papaveris sesquiunciam.
Aquae Lauro-Cerasi drachmas sex.
Misce bene. (*Sw.*)

Decoctum Radicis s. de Radice Salep, Infusum Orchidis. (Li. Wür. *Au. Sa.*)

℞. Pulveris Radicis Salep drachmam unam.
Aquae puae . uncias sedecim.

Coque ad colaturae librae unius remanentiam. (Wür.)

Au. Salep drachmas duas et Aquae uncias duodecim.

℞. Pulveris Orchidis drachmam unam.

Imbibe Aqua frigida, donec volumen quadruplum obtentum sit; adde deinde
Aquae bullientis . sesquilibram.

Coque per horam dimidiam. (Li.)

℞. Salep pulverati drachmas duas.
Aquae fontanae quantum sufficit.

Decoque ad librarum duarum colaturae remanentiam et adde
Syrupi Papaveris,
— Diacodion,
singulorum unciam unam.
Misce bene. (*Sa.*)

Mixtura s. Potio demuleens. (Ham. *Sm.*)

℞. Salep pulverati scrupulos duos.
Aquae fervidae . uncias decem.
Solutioni adde
Sacchari albi . . . semunciam.
Dissolve. (Ham.)

℞. Salep . . . . drachmam unam.
Aquae bullientis quantum sufficit.

Coque per horae quadrantem et colaturae unciarum quatuor adde
Laudani liquidi Sydenhami guttas quindecim.
Syrupi Diacodion drachmas quatuor.
Misce bene. (*Sm.*)

Potio pectoralis. (*Sm.*)

℞. Salep pulverati

Sacchari Lactis,
singulorum drachmas duas.
Syrupi Diacodion unciam unam.
— Althaeae . . uncias duas.
Misce. — Löffelweise.

Chocolata s. Succolata alba. (*Pie.*)

℞. Cacao . . . . uncias quatuor.
Salep . . . . . uncias sex.
Aquae . . . . . uncias octo.
Coque exiguo igne per horam dimidiam et adde
Sacchari albi . uncias quatuor.
Farinae . . . quantum sufficit.
Fiant tabellae ponderis semunciae.

Electuarium diasatyrum s. aphrodisiacum. (Pal. Wir. *Bo. Sp.*)

℞. Cinnamomi . . drachmas duas.
Vanillae . . . drachmas octo.
Radicis Orchidis drachmas sex.
Marrubii . . . scrupulos duos.
Radicis Eryngi conditae
uncias duas.
Conservae Inulae quantum sufficit.
Misce bene. (*Bo.*)

℞. Radicis Orchidis recentis
uncias quatuor.
Sacchari ad plumam cocti
uncias duodecim.
Contunde, per cribrum setaceum trajice et tere cum
Nucis Indicae conditae,
Zingiberis conditi,
Pinearum recentium,
Pistaciarum,
singulorum uncia una.
Adde deinde
Pulveris Caryophyllorum,
— Cinnamomi,
— Scincorum marinorum,
singulorum semunciam.
Brodii Zingiberis quantum satis ut fiat electuarium. (Wir. *Sp.*)

℞. Radicis recentis Eryngii,
— — Pastinacae,
— — Orchidis,
Nucum conditarum,
Pinearum,
Pistaciarum,
singularum semunciam.
Seminum Anisi,
— Erucae,
— Fraxini,
— Urticae,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Zingiberis,
singulorum drachmas quinque.
Scinci marini
drachmas duas cum dimidia.
Moschi . . grana septem.
Mellis despumati . libras tres.
Misce fiat electuarium. (Pal.)
Gabe, vier bis sechs Drachmen.

Salicaria.

Lythrum Salicaria, L.; brauner Weiderich, Ackerweiderich, Weiderichblutkraut; Salicaire (*Gal.*); Common willow herb (*Ang.*); Wrbina brunatna (*B.*); Parcike (*Bel.*); Salicaria (*I.*).

A. Am. B. Ba. Br. Du. Fer. Fu'. Gal. Ham. His. Li. Sax. Wir. Wür. *Be. C. M. Sp. Z.*

4 (Dodecandria Monogynia, L.; Salicarieae, *J.*) Eine in ganz Europa wachsende Pflanze. (*Hayne* Ill. t. 39. Düss. off. Pfl. t. 3. *Zorn* ic. pl. t. 113.)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an.

Die Wurzel (radix Salicariae s. Lysimachiae purpureae) ist walzig und gelb.

Das Kraut besteht aus einem vierkantigen, röthlichen, ästigen Stängel mit gegenüberstehenden, sitzenden, herzförmig lanzettigen, ganzen, oben glatten, unten behaarten Blättern. Es ist geruchlos und hat einen schleimigen, bittern Geschmack.

Man hat es bei Diarrhoe und Ruhr empfohlen. — Gabe des Pulvers, von einer Drachme bis zu vier Scrupel.

Opiatum adstringens. (*Bo.*)

℞. Pulveris Salicariae grana triginta.
— Radicis Arnicae
semidrachmam.
— Aluminis . . . grana sex.
Conservae Cynorrhodon
quantum sufficit.

Auf einmal und nöthigenfalls binnen vier und zwanzig Stunden zwei Mal wiederholt. Man nimmt es in einer passenden Tisane.

Decoctum Salicariae. (B*.)

℞. Herbae Salicariae unciam unam.
Aquae fontanae . libram unam.
Decoque ad unciarum octo colaturae remanentiam. — Bei Diarrhoe und Ruhr empfohlen. — Gabe, ein Löffel alle zwei Stunden.

Mixtura antidysenterica. (*Ca.*)

℞. Pulveris Salicariae
sesquidrachmam.
Aquae Rhoeados libram unam.
Syrupi Althaeae unciam unam.
Gabe, drei und eine halbe Unze alle drei Stunden.

Salix.

In den Pharmacopöen werden fünf Arten dieser Gattung angezeigt:

1) *Salix alba*, *L.*; gemeine Weide; Saule blanc, Saule commun (*Gal.*); Willow (*Ang.*); Wrba (*B.*); Pil (*D.*); Sauce (*His.*); Wilg (*Bel.*); Salice (*I.*); Kora wierzbowa (*Pol.*); Salguerro (*Lus.*); Pil (*Suec.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Br. D. Du. Fer. Ful. Gal. HassP. R. RC. Sax. Wir. Wür. WW. *Br. C. M. Z.*

Ein Strauch oder Baum (Dioecia Diandria, L.; Salicineae, *J.*), welcher in ganz Europa sehr gemein ist. (*Blackw.* t. 327. *Plenck* t. 710. *Zorn* Ic. pl. t. 402.)

Man wendet die Rinde der drei- oder vierjährigen Zweige (cortex Salicis albae) an; sie ist dünn, biegsam und braunroth, und hat einen eigenthümlichen Geruch und einen sehr adstringirenden, bittern, balsamischen Geschmack.

2) *Salix fragilis*, *L.*; Bruchweide; Saule fragile (*Gal.*).

Ba. Bor4. Br. D. Du. Fer. Han. HassP. Li. O. R. Sax. *E.*

Ein fast allenthalben in Europa wachsender Strauch. (*Lin.* Pl. Lapp. t. 8. fig. 6.)

Man wendet die Rinde der ein- bis zweijährigen Zweige (cortex Salicis fragilis) an; sie hat einen etwas balsamischen Geruch und einen sehr bittern, adstringirenden Geschmack.

3) *Salix caprea*, *L.*; Sealweide, Sohlweide; Saule marceau (*Gal.*).

Ed. Fer. Gal. His. Lon. LonN. *C.*

Ein in ganz Europa gemeiner Strauch. (*Pall.* Fl. Ross. t. 87. fig. 2.)

Die Rinde (cortex Salicis caprae) ist adstringirend.

4) *Salix vitellina*, *L.*; Dotterweide; Saule osier jaune (*Gal.*).

D. R.

Ein Strauch des gemäßigten Europa's. (*Hoffm.* Fasc. I. 57. t. 11. 12. fig. 1—3. und t. 24. fig. 1.)

Die Rinde (cortex Salicis vitellinae) ist adstringirend.

5) *Salix pentandra*, *L.*; Baumwollenweide, Lorbeerweide; Saule pentandre (*Gal.*).

A. B. Bel. Bor. BorC. Bor4. D. Han. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. *Be. Sp.*

Ein in Europa sehr gemeiner Baum. (*Oed.* Fl. Dan. t. 943.)

Man wendet die Rinde der ein- bis zweijährigen Zweige (cortex Salicis pentandrae s. laureae) an; sie ist dünn, biegsam, außen braun und hat einen balsamischen Geruch und einen etwas bittern und styptischen Geschmack.

Diese Rinden enthalten ein eigenthümliches Alcaloid, von Fontana, dem Entdecker, Salicin (Salicinum) genannt. Man hat sie als adstringirend und tonisch bei Wechselfiebern statt der China vorgeschlagen. — Gabe des Pulvers, von einer halben bis zu einer ganzen Unze.

Pulvis Salicis compositus. (RC.)

℞. Corticis Salicis . uncias novem.
— Quercus . . uncias duas.
Radicis Gentianae luteae unciam unam.
Misce. — Statt der China.

Cataplasma antisepticum. (Ful.)

℞. Corticis Salicis albae pulverati,
Herbae Rutae,
singulorum uncias duas.
Aquae Vitae camphoratae uncias tres.
Aceti . . . . quantum sufficit.

Unguentum Salicis. (*Huf.*)

℞. Succi Foliorum Salicis uncias duas.
Axungiae Porci quantum sufficit.
Misce blando calore. — Zum Verband unreiner, scorbutischer und brandiger Geschwüre.

Extractum Salicis aquosum. (A. Ams. An. B. Ba. Bor. Bor4. Ful. Han. HassP. O. Pol. RC. Sax. *Br. T.*)

℞. Corticis Salicis . libram unam.
Aquae frigidae . libras decem.
Macera per dies duos, subinde agitando; cola, sepone, et liquorem decanthatum ad consistentiam extracti inspissa. (Pal.)

℞. Corticis Salicis . partem unam.
Aquae . . . partes duodecim.
Digere per horas duodecim, blando calore, tunc per horam unam coque, cola et liquorem ad extracti consistentiam consume. (*Ba.*)

HassP. ut extractum colombo, ligni campechiensis etc.

℞. Corticis Salicis . partem unam.
Aquae bullientis . partes octo.
Coque leviter per horae quadrantem et cola exprimendo; residuum coquatur cum partibus quatuor Aquae et itidem coletur; liquores commixti et post sufficientem depositionem decanthati ad extracti consistentiam evaporent. (An. Bor. Han. O.)

Bor4. Corticis libram unam cum Aquae sedecim ad octo, residuum cum Aquae sedecim ad dimidium decoquere, decoctionem quoties opus fuerit repetere, liquores commixtos ad remanentiam librarum quatuor et deinde

balneï vaporis ope ad extracti absinthii consistentiam consumere.

RC. Corticis quantum vis cum Aquae octuplo ad dimidium decoquere, exprimere, filtrare et ad mellis spissioris consistentiam consumere; — A. et Sax. Corticem pluribus succedentibus coctionibus penitus extrahere et liquores commixtos in balneo aquae post decanthationem inspissare jubent; — Br. coquere illum jubet per horas duas cum Aquae partibus sex, tunc denuo cum nova Aqua et liquores commixtos consumere; — R. digerere eum per horas viginti quatuor, tunc coquere per duas cum Aquae partibus decem et coctionem per aequale tempus cum novae Aquae partibus octo repetere; — Ams. bis eum decoquere, primum cum viginti, deinde cum quindecim partibus Aquae, qualibet vice ad dimidium redigendis; — T. Coquere per semihoram Corticis libras duas in Aquae libris viginti quatuor et exprimendo colare, coctionem repetere et decocta filtrata inspissare.

Gabe, zehen bis zwanzig Gran.

Extractum Salicis spirituosum. (Ful.)

℞. Corticis Salicis . libram unam.
Aquae Vitae . . . . libras sex.

Digere per dies aliquot et exprime; faeces coquantur cum Aquae libris tribus et cum expressione colentur; colaturas ambas, quamque seorsim, ad mellis consistentiam inspissa et tunc commixtas sufficienter consume.

Infuso-decoctum Salicis Bremeri. (B*.)

℞. Corticis Salicis uncias quatuor.
Spiritus Frumenti . uncias octo.
Aquae . . . . uncias sedecim.

Digere in vase tecto et cola; residuum deinde coquatur cum

Aquae communis unciis triginta ad unciarum quindecim liquidi remanentiam; colaturas commisce. — Fiebermittel. — Zwischen zwei Fieberanfällen zu verbrauchen.

Decoctum Corticis Salicis laureae. (B*. BorC.)

℞. Corticis Salicis, minutim concisi unciam unam.
Aquae fontanae uncias sedecim.

Decoque ad unciarum octo remanentiam. (B*.)

BorC. Corticis sesquiunciam et Aquae uncias quindecim ad novem redigendas.

Tonisch, fieberwidrig. — Glasweise.

Injectio antiseptica. (Ful. Ham.)

℞. Corticis Salicis . . uncias duas.
Aquae . . . . libram unam.

Coquendo parte tertia consumptâ, colaturae adde

Camphorae in Alcoholis sufficiente quantitate dissolutae semidrachmam.
Mellis despumati unciam unam.

Decoctura Salicis composita. (RC.)

℞. Corticis Salicis drachmas novem.
Gentianae luteae drachmam unam.
Aquae . . . . . sesquilibram.

Decoque ad libram. — Interdum addi possunt Corticis Quercus drachmae duae. — Statt des Decoct. Chinae.

Salsola.

Man findet drei Arten dieser Pflanzengattung in den Pharmacopöen angezeigt:

1) *Salsola Soda, L.*; Salzkraut; Soude commune (*Gal.*); Saltwort (*Ang.*); Sul alikantska lavhowa (*Bs.*); Saltyder (*D.*); Soda (*His.*); Loogkruid (*Bel.*); Soda (*I.*); Solda (*Lus.*); Soudaert (*Suec.*).

Gal. His. *M. Z.*

☉ (Pentandria Digynia, L.; Chenopodeae, *J.*) Eine an den Küsten des Mittelländischen Meeres wachsende Pflanze. (*Jacq.* Hort. Vind. I. p. 28. t. 68. *Plenck* t. 161.)

Man wendet das Kraut (herba Vitri) an; es besteht aus ästigen, röthlichen Stängeln mit sitzenden, langen, schmalen, stachellosen Blättern. Es hat keinen Geruch und einen unangenehmen alkalischen Geschmack.

2) *Salsola Tragus, L.*; stacheliges Salzkraut; Soude épineuse (*Gal.*).

Gal. *M.*

☉ Eine Pflanze des südlichen Europa's.

3) *Salsola Kali, L.*; Kalisalzkraut; Soude kali (*Gal.*).

Gal. *G. M.*

☉ Eine Pflanze Südeuropa's.

Diese und die vorhergehende Art können statt des gemeinen Salzkrauts angewendet werden.

Salvia.

Von dieser Pflanzengattung findet man vier Arten in den Pharmacopöen:

1) *Salvia officinalis, L.*; Salbei, Salbey; Sauge commune (*Gal.*); Sage (*Ang.*); Ssalweg (*B.*); Salvie (*D.*); Salvia (*His. I.*); Salie (*Bel.*); Szalwia (*Pol.*); Salva (*Lus.*); Salwia (*Suec.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer.

Pul. Gal Gal M. Ham. Ham. Hass. Hass P. His. Li. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir Wür. WW. *Be. Br. C. Fi. G. M. Pid. Sp.* Z.

♃ (Diandria Monogynia, L.; Labiatae, J.) Eine Pflanze des südlichen Europa's. (*Blackw.* t. 10. *Plenck* t. 19. *Hayne* VI. t. 1. *Zorn* Ic. pl. t. 165.)

Man wendet das Kraut und die Blüthen an.

Das Kraut (herba Salviae minoris) besteht aus einem vierkantigen, einfachen Stängel mit gegenüberstehenden, eirundlanzettigen, ganzen, gekerbten runzligen, grünlichgrauen Blättern. Es hat einen angenehmen, stark gewürzhaften und etwas kampherartigen Geruch und einen styptischen, gewürzhaften etwas bittern Geschmack.

Die violetthlauen Blüthen bilden eine endständige Aehre. Man sammelt die Pflanze vor dem Aufblühen.

Reizend, nervenstärkend, tonisch, schwach adstringirend, auflösend und austrocknend.

2) *Salvia Horminum*, L.; edles Scharlachkraut; Sauge Hormin (*Gal.*); Purple topped sage (*Ang.*); Horminio (*His.*); Edele slarey (*Bel.*); Orminio (*I.*); Ormino (*Lus.*).

Br. Gal. His. Wür. *Be. Sp.*

⊙ Eine Europäische Pflanze. (*Zorn* Ic. pl. t. 244.)

Man wendet das Kraut und den Saamen an.

Das Kraut (herba Horminis s. Gallitrichi) besteht aus stumpfen, gekerbten, unangenehm riechenden und etwas bitter schmeckenden Blättern.

Der Saame ist glatt, schleimig und etwas bitter.

Reizend, tonisch.

3) *Salvia pratensis*, L.; Wiesensalbey; Sauge des prés (*Gal.*).

Gal.

♃ Eine in Europa gemeine Pflanze. (*Blackw.* Herb t. 258.)

Man wendet die Blätter (folia Horminis) an; sie sind gestielt, langgestreckt, herzförmig, gekerbt, runzelig, glatt, von angenehmem Geruch und bitterem, adstringirenden Geschmack.

4) *Salvia Sclarea*, L.; zahmes Scharlachkraut; Sauge Sclarée (*Gal.*); Common clary (*Ang.*); Graakuse (*D.*); Maro cortuso (*His.*); Tamne sclarey (*Bel.*); Schiarea (*I.*); Esclarea (*Lus.*).

Fer. Gal. His. Wir. *G. M*

♂ Eine Pflanze des mittägigen Europa's (*Zorn* Ic. pl. t. 484.)

Man wendet das Kraut (herba Sclareae s. Gallitrichi) an; es besteht aus einem dicken, vierkantigen, sehr ästigen Stängel mit gegenüberstehenden Zweigen und langgestreckten, herzförmigen, runzligen, spitzigen, sägezähnigen, gegenüberstehenden Blättern. Es hat einen sehr starken und unangenehmen Geruch und einen bittern, gewürzhaften Geschmack.

Conserva Florum Salviae. (Sar. Wir.)

℞. Florum Salviae . partem unam.
Sacchari pulverati . partes duas.
Contere. (Wir.)

Sar. Florum partem unam et tres Sacchari ad plumam coct'.

Species s. Herbae aromaticae s. vulnerariae. (A. B*. Ba. Gal. *Vm.*)

℞. Herbae Salviae,
— Melissae,
— Thymi,
— Menthae piperitae,
— Hyssopi,
Florum Lavandulae,
singulorum partes aequales.
Concisa misce. (B*.)

℞. Foliorum Salviae,
— Melissae,
Summitatum florescentium Absinthii,
— Menthae piperitae,
— Serpylli,
Florum Chamomillae vulgaris,
singulorum partes aequales.
Concisa misce. (Ba.)

℞. Foliorum Salviae,
— Thymi,
— Serpylli,
— Hyssopi,
— Menthae aquaticae,
— Absinthii,
— Origani,
singulorum partes aequales.
Concisa misce. (Gal.)

℞. Herbae Hyssopi,
— Marrubii,
— Origani,
— Rutae,
— Salviae,
— Saturejae,
— Scordii,
— Serpylli,
singulorum partes aequales.
Concisa misce. (A.)

℞. Cubebarum,
Nucis moschatae,
singularum partem unam.
Cinnamomi,
Zingiberis,
Caryophyllorum,
singulorum partes duas.
Corticis Aurantiorum
partes quatuor.

Menthae crispae,
Rorismarini,
Salviae, singularum partes octo.
Concisa misce. (*Vm.*)

4) *Extractum Salviae.* (A.)

℞. Foliorum Salviae quantum vis.
Aquae . . . quantum sufficit.
Herba pluribus coctionibus successivis penitus extracta, liquores commisce et post decimthationem ad extracti consistentiam inspissa.

Infusum Salviae. (BorC. DD. GalM. RC. Suec. WW. *Sa.*)

℞. Herbae Salviae drachmam unam.
Aquae bullientis uncias duodecim.
Infunde in vase tecto per horae quadrantem et cola exprimendo. (DD.)

BorC. et WW. Salviae sesquiunciam et Aquae uncias octodecim. — RC. Suec. Salviae unciam unam et Aquae libram unam (infunde per horam et cola RC.). — Ham. Salviae unciam unam et Aquae quantum satis ad colaturam unciarum octo.

℞. Herbae Salviae
Hiquiritiae rasae,
singularum unciam unam.
Aquae bullientis quantum sufficit ut colaturae octarius (litre) obtineatur. (GalM.)

℞. Foliorum Salviae . uncias duas.
Florum Rosarum rubrarum
unciam unam.
Aquae bullientis
uncias tres cum dimidia.
Infunde frigide et cola. (*Sa.*)
Reizend, gewürzhaft. — Taſſenweiſe.

Infusum Salviae acidulum. (B*.)

℞. Herbae Salviae . . semunciam.
Aquae bullientis quantum sufficit ut post semihoram digestionis colaturae unciae sex obtineantur, cui adde
Acidi sulphurici Aqua diluti
drachmam unam.
Misce bene. — Gabe, alle halbe Stunden eine halbe Taſſe.

Gargarisma stimulans. (*Ca Sa.*)

℞. Infusi Salviae . . libras duas.
Roob Juglandis . uncias duas.
Aluminis . . drachmam unam.
Misce. (*Sa.*)

℞. Infusi Salviae . . . uncias sex.
Tincturae Chinae,
Syrupi Mororum,
singulorum semunciam.
Spiritus Cochleariae
drachmam unam.
Misce. (*Ca.*)

Infusum Salviae vinosum. (B*.)

℞. Herbae Salviae . unciam unam.
Aquae bullientis libram unam.
Digere per horam unam, cola et colaturae refrigeratae adde
Vini rubri . . . . semilibram.
Gabe, eine halbe Taſſe alle zwei Stunden.

Decoctum incitans aromaticum s. aromaticum. (*B.*)

℞. Foliorum Salviae . semunciam.
Aquae . . . quantum sufficit ut librae duae decocti obtineantur. Colaturae adde
Elixir acidi Halleri
drachmam unam.
Den Tag über allmälig zu nehmen.

Vinum aromaticum. (Gal. GalM.)

℞. Specierum aromaticarum
uncias quatuor.
Vini rubri . . . uncias duas.
Macera per dies sex in vase clauso, colá exprimendo et filtra. (Gal.)

℞. Vini rubri . . . partes decem.
Tincturae aromaticae
partem unam.
Commisce. (GalM.)
Aeußerlich in Waſchungen oder Bähungen.

Vinum Salviae. (Wür.)

℞. Foliorum recentium Salviae
sesquiunciam.
Vini rubri . . . sesquilibram.
Post horas viginti quatuor macerationis cola.

Fomentum excitans. (*Ra.*)

℞. Vini Salviae . . libram unam.
Alcoholis camphorati uncias octo.
Misce.

Aqua vulneraria spirituosa, Aqua rubra, Tinctura vulneraria s. vulneraria rubra s. aromatica composita. (Gal. *Fi. T. Vm.*)

℞. Foliorum recentium Salviae,
— — Rorismarini,
— — Saturejae,
— — Origani,
— — Majoranae,
— — Thymi,
— — Serpylli,
— — Hyssopi,
— — Melissae,
— — Calaminthae,
— — Basilici,
— — Menthae aquaticae,
— — Foeniculi,
— — Angelicae,
— — Absinthii,
— — Rutae,
Summitatum florescentium Lavandulae,

Summitatum florescentium Hyperici, singularum unciam unam.
Alcoholis (10°) . . libras duas.
Post octo dies macerationis cola exprimendo et filtra. (Gal.)

T. Salviae, Rorismarini, Origani, Majoranae, Thymi, Serpylli, Hyssopi, Melissae, Basilici, Menthae piperitae, Foeniculi, Angelicae, Absinthii, Rutae, Spicae, Hyperici, singulorum unciam unam, Coccionellae drachmas duas, Aluminis scrupulos quatuor, Alcoholis diluti 22° B. Digere per dies quindecim et filtra. — Si loco alcoholis Acetum optimum adhibetur, obtines *Aquam vulnerariam acetosam.*

Aqua vulneraria acetosa, Acidum aceticum dilutum et vulnerarium (*Fi.*). Angelicae, Salviae, Absinthii Romani, Saturejae, Foeniculi, Menthae viridis, Hyssopi, Melissae, Basilici, Rutae, Thymi, Rorismarini, Origani, Calamintae, Serpylli, Florum Lavandulae, singulorum sesquiunciam, Aceti fortis libras octo; destillent in balneo aquae libras sex.

℞. Foliorum recentium Absinthii,
— — Angelicae,
— — Basilici,
— — Abrotani,
— — Foeniculi,
— — Hyssopi,
— — Majoranae,
— — Melissae,
— — Menthae aquaticae,
— — Origani,
— — Rutae,
— — Rorismarini,
— — Salviae,
— — Serpylli,
— — Thymi,
Florum Lavandulae,
singulorum partem unam.
Aquae Vitae partes triginta duas.
Digere frigide per dies octo, exprime et filtra. (*Vm.*)

Acetum Salviae. (Gal. *Fi. T. Vm.*)

℞. Foliorum recentium Salviae partem unam.
Aceti albi . . . partes sedecim.
Macera per dies quatuordecim in vase tecto, subinde agitando, cola ac filtra. (Gal.)

Vm. Salviae partem unam, Aceti octo et octo dies macerationis; — *T.* Foliorum uncias sex, Aceti libras sex et octo ad decem dies digestionis; — *Fi.* Foliorum libram unam, Aceti fortis duodecim et sex dierum digestionem.

Oleum Salviae aethereum, Aetheroleum Salviae. (A. Br. Gal. Han. HassP. Pal. Sar. *Br. T.*)

℞. Herbae florescentis Salviae quantum vis.
Aquae . . . quantum sufficit.
Destillent. (*Br.*)

Han. HassP. Herbae partem unam et octo Aquae; — A. Herbae unam et duodecim Aquae; — Gal. Herbae quinque et septem Aquae; — *T.* Herbae quantum vis, Aquae bullientis pondus duplum, destillare quamdiu liquor aliquid extrahit, tunc per plures vices cohobare.

℞. Herbae florescentis Salviae partes viginti quinque.
Aquae partes septuaginta quinque.
Salis culinaris . . . partes tres.
Post tres dies destillent. (Br. Pal. Sar.)

Aqua Salviae. (A. Ams. Ba. Bor. Bor4. Gal. Han. HassP. Li. O. Pal. Pol. Sar. Sax. Wür. *Sw. Vm.*)

℞. Herbae florescentis Salviae partem unam.
Aquae . . . . quantum sufficit.
Post horas viginti quatuor destillent partes decem. (Ams. Bor. Bor4. Han. O. Pol. *Sw.*)

HassP. Herbae libras tres, Aquae quantum sufficit, destillent libras viginti quatuor; — Gal. et Pal. Herbae partem unam et quatuor Aquae; destillent partes duas; — Li. et Wür. Herbae unam et Aquae sex; — A. Herbae unam et duodecim Aquae; destillent partes quatuor; — Sax. Herbae unam et Aquae quindecim; destillent trientes duo; — Ba. Herbae unam et sedecim Aquae; destillent partes quatuor; — Sar. Herbae partem unam et quatuor Aquae; destillent partes duae et denuo destillent supra novam Herbam.

℞. Herbae florescentis Salviae partes decem.
Aquae purae partes centum viginti.
— Vitae . . partem unam.
Destillent partes triginta. (*Vm.*)

Aqua Salviae composita. (Gal.)

℞. Specierum vulnerariarum partes duas.
Aquae . . . . . partes viginti.
Destillent partes octo.

Aqua Salviae spirituosa, Spiritus Salviae. (Fer. Gal. *T.*)

℞. Herbae florescentis Salviae libram unam.
Vini albi . . . libras quatuor.
Post horas viginti quatuor macerationis destillet dimidia pars. (Gal.)

℞. Herbae florescentis Salviae sesquilibram.
Alcoholis . . . . libras octo.
Destillent librae sex. (Fes.)

T. Herbae florescentis Libras duas, Spiritus Vini 32° octo; destillent circiter libras quinque.

Aqua vulneraria s. traumatica s. sclopetaria s. vulneraria spirituosa s. vinosa s. sclopetaria aromatica s. catapultarum, Alcohol Salviae vulnerarius, Alcohol polyaromaticus. (A. B°. Bel. Bor. Bor4. Br. Gal. Han. Hass. HassP. His. Li. O. Pal. Pol. Sax. Wir. *Br. Ca. Fi. Pid. Sp. T. Vm.*)

℞. Herbae Hyssopi,
— Menthae crispae,
— Salviae,
— Rorismarini,
singularum uncias duas.
Florum Rorismarini,
— Lavandulae,
singulorum unciam unam.
Aquae Vitae . . libras decem.
Destillent, donec liquor limpidus prodire cesset. (Li. Wir.)

℞. Herbae Absinthii,
— Anethi,
— Salviae,
— Tanaceti,
— Sempyli,
— Menthae piperitae,
Florum Lavandulae,
singulorum sesquiunciam.
Aquae fontanae libras duodecim.
Alcoholis . . . libras octo.
Post aliquot dierum infusionem destillent libras octo. (*Pid.*)

℞. Herbae Absinthii,
Rutae,
Salviae, singularum drachmas octodecim,
Foeniculi,
— Menthae piperitae,
Florum Lavandulae,
singulorum sesquiunciam.
Aquae fontanae libras duodecim.
Alcoholis . . . libras octo.
Post duos dies infusionis destillent libras octo. (Hass.)

℞. Herbae recentis Agrimoniae,
— Leontopodii,
— Bellidis minoris,
— Bellidis majoris,
— Betonicae,
— Buglossi,
— Foeniculi,
— Hyperici,
— Plantaginis,
— Samiculae,
— Scrophulariae,
— Verbenae, singularum manipulos duos.
— Aristolochiae,
— Artemisiae,
— Virgaureae,
Herbae recentis Salviae, singularum manipulos quatuor.
Vini generosi libras quadraginta.
Stent in digestione, donec massa fermentare parumper coeperit et deinde destillando dimidium abstrahe. (Wir.)

℞. Radicis Consolidae majoris,
Herbae Consolidae majoris,
— Artemisiae,
— Bugulae, singulorum manipulos quatuor.
— Betonicae,
— Bupthalmi,
— Consolidae minoris,
— Scrophulariae,
— Plantaginis,
— Agrimoniae,
— Verbenae,
— Absinthii,
— Foeniculi,
singularum manipulos duos.
— Hyperici,
— Aristolochiae,
— Telephii majoris,
— Veronicae,
— Centaurii minoris,
— Millefolii,
— Nicotianae,
— Menthae,
— Hyssopi, singularum manipulum unum.
Vini albi uncias centum quadraginta quatuor.
Post trium dierum infusionem destillent. (*Sp.*)

℞. Radicis Consolidae majoris,
Herbae Consolidae majoris,
— Bugulae,
— Samiculae,
— Betonicae,
— Scrophulariae,
— Plantaginis,
— Agrimoniae,
— Hyperici,
— Pervincae,
— Hederae terrestris,
— Artemisiae,
— Veronicae,
— Verbenae,
— Telephii majoris,
— Millefolii,
singularum uncias quatuor.
— Salviae,
— Angelicae,
— Tanaceti,
— Absinthii,
— Chelidonii majoris,
— Foeniculi,
— Clematitis,
— Menthae,
— Hyssopi,
— Nicotianae,
singularum uncias octo.

Herbae Rutae,
— Chamomillae,
— Scordii,
— Majoranae,
— Rorismarini,
singularum uncias quatuor.
Summitatum florescentium Lavandulae,
— — Origani,
— — Calamintae,
singularum uncias sex.
Vini albi libras quinquaginta.
Destillet dimidia pars. (Wir.)

Pal. eandem formulam, addendo tamen Absinthii pontici, Saturejae, singularum uncias octo, Basilici uncias quatuor et Virgaureae tantidem.

℞. Foliorum Salviae uncias octo.
— Rorismarini,
— Serpylli,
— Thymi,
singulorum unciam unam.
Cardamomi minoris,
— majoris,
singulorum drachmas sex.
Macidis,
Nucis moschatae,
Caryophyllorum,
Zedoariae,
Galangae,
Calami, singulorum semunciam.
Vini albi libras octo.
Alcoholis libras quatuor.

Post sufficientem digestionem destillent tres quadrantes. (Wir.)

℞. Florum Lavandulae,
Herbae recentis Hyssopi,
— — Melissae,
— — Menthae crispae,
— — Origani,
— — Rorismarini,
— — Rutae,
— — Salviae,
— — Serpylli,
singularum unciam unam.
Alcoholis (0,860) uncias decem.
Aquae libras duodecim.

Post horas viginti quatuor destillent librae decem. (A.)

℞. Herbae recentis Salviae,
— — Absinthii,
— — Menthae piperitae,
— — Rutae,
— — Rorismarini,
Florum Lavandulae,
singulorum uncias quatuor.
Alcoholis libras sex.
Aquae communis quantum sufficit.

Post horas viginti quatuor destillent librae octodecim. (B^a. Bor. Han. HassP. O. Pol.)

Bor. Herbarum et Florum, singulorum uncias duas, Spiritus Vini rectificati sesquilibram, Aquae quantum sufficit, destillent librae sex.

℞. Foliorum recentium Salviae,
— — Angelicae,
— — Absinthii,
— — Saturejae,
— — Foeniculi,
— — Menthae,
— — Hyssopi,
— — Melissae,
— — Basilici,
— — Rutae,
— — Thymi,
— — Majoranae,
— — Rorismarini,
— — Origani,
— — Calamintae,
— — Serpylli,
Florum Lavandulae,
singulorum uncias quatuor.
Alcoholis
uncias centum viginti octo.
Destillent. (Sp.)

℞. Herbae florescentis Absinthii,
— — Basilici,
— — Catariae,
— — Hyssopi,
— — Majoranae,
— — Origani,
— — Rorismarini,
— — Rutae,
— — Salviae,
— — Thymi,
Florum Lavandulae,
singulorum partes tres.
Aquae Vitae partes nonagintas sex.
— purae partes quadringentas quinquaginta sex.
Destillent partes centum octoginta quatuor. (Vm.)

Bel. Salviae, Absinthii, Catariae, Hyssopi, Melissae, Basilici, Thymi, Rutae, Majoranae, Rorismarini, Origani et Lavandulae, singularum partem unam, Aquae Vitae quadraginta octo et Aquae ducentas septuaginta sex; destillent partes nonaginta duas.

℞. Summitatum Salviae,
— Tanaceti,
— Foeniculi,
— Thymi,
— Lavandulae,
— Absinthii,
— Menthae aquaticae,
— Hyssopi,
— Chamomillae Romanae,
— Origani,
— Majoranae,
— Calamintae,
Stipitum et Radicis Angelicae,
singularum uncias duas.
Alcoholis (22°)
libras viginti quatuor.

Post sufficientem macerationem destillent in balneo aquae libras viginti. (Gal. *Ga.*)

T. Salviae, Angelicae, Tanaceti, Menthae vulgaris, Foeniculi, Thymi, Majoranae, Calamintae, singularum uncias quatuor, Absinthii, Hyssopi, Origani, Chamomillae vulgaris, Lavandulae, singularum uncias duas, Alcoholis 36° uncias triginta octo; post duorum dierum digestionem destillent in balneo aquae liquidi unciae triginta vel triginta duae.

℞. Florum Lavandulae,
Herbae recentis Absinthii,
— — Salviae,
— — Majoranae,
— — Rorismarini,
— — Hyssopi,
— — Rutae,
— — Melissae,
— — Thymi,
— — Basilici,
— — Origani,
— — Hyperici,
singularum uncias unam.
Alcoholis (0,935) libras quatuor,
Aquae . . . libram unam.

Post horas viginti quatuor destillent libras tres. (*Br., Fi.*)

Aqua vulneraria aquosa s. para destillata vulneraria (*Fi.*). Florum Lavandulae, Herbarum recentium Hyssopi, Melissae, Menthae piperitae, Origani, Rorismarini, Rutae, Salviae, singularum uncias unam, Alcoholis 36° uncias quatuor, Aquae libras duodecim; post horas duodecim digestionis, destillent libras octo.

℞. Poliorum Betonicae,
— Hederae terrestris,
— Artemisiae,
— Millefolii, singulorum uncias quindecim.
— Salviae,
— Angelicae,
— Tanaceti,
— Absinthii,
singulorum uncias decem.
— Abrotani,
— Foeniculi,
— Menthae,
— Hyssopi,
— Nicotianae,
singulorum uncias octo.
— Rutae,
— Chamomillae,
— Scordii,
— Majoranae,
— Rorismarini, singulorum uncias quatuor.
Summitatum florescentium Lavandulae,
Summitatum florescentium Origani,
— — Calamintae,
singulorum uncias sex.
Vini generosi
libras sexaginta septem.

Post horas viginti quatuor macerationis destillet dimidia pars. (Br.)

℞. Poliorum Betonicae,
— Agrimoniae,
— Artemisiae,
singulorum libram unam.
— Salviae,
— Hyperici,
— Tanaceti,
— Absinthii,
— Menthae,
singulorum uncias octo.
— Scordii,
— Majoranae,
— Rorismarini,
— Lavandulae,
singulorum uncias quatuor.
Vini albi libras triginta.

Destillet in balneo aquae dimidia pars. (Ma.)

℞. Herbae Salviae,
— Absinthii,
— Menthae piperitae,
— Rutae,
— Rorismarini,
Florum Lavandulae,
singulorum partem unam.
Aquae partes quinquaginta.
Alcoholis partes viginti duas.

Post duos dies destillent partes triginta sex. (Sax.)

Aeußerlich als zertheilend, und stärkend innerlich bei Windcolik.

Elixir vitae mulierum., Aqua s. Balsamum embryonum, Aqua aromatica. (Ama. B*. Bor. Bord. Br. HassP. Pal. Wir. *Sp.*)

℞. Micae Panis triticei modo e furno exsumpti libras duas.
Florum Caryophyllorum rubrorum,
— Tiliae,
singulorum libram unam.
Nucis moschatae
uncias tres cum dimidia.
Florum Lavandulae,
Herbae Salviae,
Seminum Carvi,
— Foeniculi,
singulorum uncias tres.
Caryophyllorum aromaticorum,
Cinnamomi,
Zingiberis,
Cubebarum,
Granorum Paradisi,
Zedoariae,
Herbae Menthae crispae,
Radicis Paeoniae,

Seminum Paeoniae,
Visci querni,
singulorum uncias duas.
Macidis . . . . . semunciam.
Galangae minoris drachmas tres.
Croci . . . . drachmas duas.
Vini Maderani . . libras decem.
Aquae Boraginis,
— Buglossi,
singularum libras quatuor.
— Florum Liliorum Convallium libras duas et uncias octo.
Aquae Fragorum,
— Rosarum,
singularum uncias sedecim.

Post tres dies digestionis destillet, blando igne, liquidi dimidia pars. (Wir.)

℞. Galangae,
Zedoariae, singularum semunciam.
Herbae Menthae,
— Melissae,
singularum unciam unam.
Florum Stoechadis Arabicae,
— Caryophyllorum rubrorum,
— Tiliae, singulorum drachmas quinque.
Seminum Sileris montani,
— Foeniculi,
singulorum semunciam.
Nucis moschatae . unciam unam.
Cinnamomi . . . drachmas sex.
Corticis recentis Aurantiorum,
— Citri,
singulorum sesquiunciam.
Vini albi . . . . libras duas.

Digere per horas viginti quatuor et destillando dimidium producti abstrahe. (Pol. Wir.)

Br. eandem formulam sed loco vini mixturam e libris quinque Aquae Vitae et Aquae libris decem et destillatione liquidi libras sex abstrahere jubet.

℞. Radicis Paeoniae,
— Zedoariae,
— Zingiberis,
singularum uncias duas.
— Galangae drachmas sex.
Herbae Salviae,
— Melissae,
— Foeniculi,
— Menthae,
singularum uncias tres.
Florum Caryophyllorum rubrorum,
— Tiliae,
singulorum uncias sex.
— Lavandulae,
Nucis moschatae,
singulorum uncias tres.
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Cubebarum,
Granorum Paradisi,
Macidis, singulorum uncias duas.
Alcoholis
uncias quadraginta quatuor.
Aquae fontanae
uncias ducentas quadraginta.

Post aliquot dies infusionis destillando uncias centum nonaginta duas abstrahe. (*Sp.*)

℞. Nucis moschatae,
Macidis,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Cubebarum,
Zingiberis,
Zedoariae, singulorum semunciam.
Galangae minoris drachmas duas.
Florum Lavandulae,
Herbae siccae Menthae,
— — Salviae,
singulorum semunciam.
Seminum Coriandri,
— Foeniculi,
singulorum drachmas duas.
Aquae Vitae . . . sesquilibram.
— purae
libras septem cum dimidia.

Macera per tres dies et tunc destillando liquidi libras tres cum dimidia abstrahe. (Ams.)

℞. Herbae Salviae . . uncias octo.
— Rorismarini,
— Menthae piperitae,
Florum Lavandulae,
singulorum uncias quatuor.
Seminum Foeniculi,
Casiae caryophyllatae, Cinnamomeae, singulorum uncias duas.
Alcoholis . . . libras quatuor.
Aquae . . . . libras viginti.

Post horas viginti quatuor macerationis destillando libras duodecim liquidi abstrahe. (B°. Bor. HassP.)

Bord. Spiritus Vini rectificati libras sex.

Reizend, stärkend, herzstärkend und blähungtreibend. — Gabe, eine halbe bis eine ganze Unze. — Man wendet es auch äußerlich an; ehedem soll man es zur Verhütung von Fehlgeburt mit Erfolg benutzt haben, indem man eine damit befeuchtete heiße Brodrinde auf den Leib der Schwangern legte. Heutzutage weiß man, was von der Anwendung solcher reizenden Mittel zu halten ist.

Sambucus.

In den Pharmacopöen finden sich zwei Arten dieser Gattung angezeigt:

1) *Sambucus Ebulus*, *L.*; Zwergholunder, Attich, Attichhirschschwanz; Hièble, Yèble (*Gal.*); Dwart elder (*Ang.*); Chahdj (*B.*); Mmerhyld (*D.*); Yezgo

(*His.*); Lange vlier (*Bel.*); Ebbio (*I.*); Chebd (*Pol.*); Engos (*Lus.*); Sommarhyll (*Suec.*).

A. Ba. Br. Fer. Gal. Gen. His. Lus. Sax. Wir. Wür. *Ae. Br. M. Pid. Sa. Sp. Z.*

Ein Strauch (Pentandria Trigynia, L.; Caprifoliaceae, *J.*), welcher überall in Europa wächst. (*Blackw.* t. 480. *Plenck* t. 230. *Zorn* Ic. pl. t. 40.)

Man wendet die Rinde der Wurzel, die Blätter, die Früchte und den Saamen an.

Die innere Rinde der Wurzel (radix Ebuli s. Sambuci humilis s. agrestis s. Chamaeactis) ist weiß und hat einen bittern, widerlichen Geschmack. Die Wurzel selbst ist langgestreckt, fingerdick. Sie gilt für brechenerregend und wassertreibend. — Man verordnet zwei Unzen, mit Wasser aufgegossen; auch kann man eine Unze von dem ausgepreßten Safte geben.

Die Blätter sind eirund, lanzettförmig, spitzig, gezähnt, oben glatt und glänzend, unten dunkelgrün. Sie haben einen sehr unangenehmen Geruch. Ehedem wendete man sie äußerlich bei Oedem und Erysipelas an.

Die Früchte (baccae s. grana Actes) sind schwarze, dreisaamige Beeren von einem süßen, bittern und widerlichen Geschmack. Sie werden für auflösend, schweiß- und harntreibend gehalten.

Die Saamen geben, in Wasser geweicht und ausgepreßt, Oel.

2) *Sambucus nigra*; L.; Flieder-baum, Hollunder; Sureau noir (*Gal.*); Elder (*Ang.*); Ukti, khamman (*Ar.*); Ber (*B.*); Hyld (*D.*); Saaco (*His.*); vlier (*Bel.*); Sambuco (*I.*); Bzowy (*Pol.*); Sabugueiro (*Lus.*); Busina (*R.*); Floeder (*Suec.*).

A. Am. Anns. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bort. Br. D. DD. Da. Ed. Fenn. Fer. Pul. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HasP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax Suec. Wir. Wür. WW. *A. Be. Br. C. Fi. G. M. Pid. Sp.*

Ein Strauch Europa's. (*Blackw.* t. 151. Fl. Dan. t. 545. *Plenck* t. 229. *Hayne* IV. t. 16. Düss. oek. Pfl. V. t. 17. Fl. méd. VI. 336.)

Man wendet die Rinde, die Blätter, die Blüthen und die Früchte an.

Die mittlere oder innere Rinde der Zweige (cortex s. alburnum Sambuci), von welcher man gewöhnlich die dünne und aschgraue Oberhaut abzieht, ist grün. Sie hat einen starken und widerlichen Geruch und einen anfangs süßlichen, hinterher scharfen und etwas bittern Geschmack.

Die Blätter sind unpaarig gefiedert, dunkelgrün, glatt, die Blättchen eirundlanzettförmig, sägezähnig, spitzig. Sie haben einen unangenehmen Geruch und einen scharfen Geschmack.

Die Blüthen (flores Sambuci) sind weiß, klein und haben einen starken und unangenehmen Geruch und einen schleimigen, etwas bittern Geschmack.

Die Früchte sind saftige, eirunde, schwarze, genabelte, dreisaamige Beeren, welche einen röthlichen, säuerlichen und geruchlosen Saft enthalten. Man nennt sie nach dem Trockenwerden grana Actes. Statt dieser Art gebraucht die Americanische Pharmacopöe die Beeren von Sambucus Canadensis, *Willd.*

Bort. hat ein *Roob Sambuci crudum s. Succus Sambuci inspissatus crudus.*

Pulvis ad erysipelam. (BorC.)

℞. Florum Sambuci,
Furfuris tritici,
singulorum partes aequales.
Misce.

Species sudorificae s. diaphoreticae. (Gal. *Fi. T.*)

℞. Florum Sambuci,
— Boraginis,
— Rhoeados,
Ligni Sassafras,
singulorum partes aequales. (Gal.)

℞. Foliorum Melissae,
Florum siccorum Tiliae,
singulorum partes tres.
— Sambuci partem unam.
Concisa misce. (*Fi. T.*)

Succus Sambuci s. baccarum Sambuci. (Gal. Sar. *T.*)

℞. Baccarum Sambuci maturarum quantum vis.

Contere inter manus, massam tunc per tres vel quatuor dies fermentatam cola exprimendo et succum in lagenis sub olei strato serva.

Gabe, eine halbe bis zwei Unzen.

Succus Ebuli s. baccarum Ebuli. (Gal. Sar. *T.*)

Ut succum baccarum Sambuci parant.

Tragea granorum Actes, Pulvis Sambuci. (Wir. *Sp.*)

℞. Succi baccarum Sambuci quantum vis.

Farinae secalitiae quantum sufficit.

In pastam redige et panes parvos exinde forma, qui prope ignem coquantur, donec bene sint siccati; tunc in pulverem redactos novo succo humecta et sicca. Quam operationem ter e serie repete. Unciae uni massae pulveratae adde

Nucis moschatae pulveratae
drachmam unam.

Gegen Ruhr empfohlen. — Gabe, eine bis zwei Drachmen.

Syrupus Sambuci. (A.)

℞. Succi Baccarum Sambuci recenter expressi . . . libram unam.
Sacchari albi . . . libras duas.
Ebulliant semel.

Roob Sambuci s. Sambuci depuratum, Succus Sambuci inspissatus s. inspissatus depuratus. (A. Am. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fer. Ful. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. Li. O. Pal. Pol. R. Sar. Wir. Wür. *Br. C. Fi. Sw. T. Vm.*)

℞. Baccarum Sambuci maturarum
quantum vis.

Coque in vase stanneo tecto, continue agitando, per semihoram vel donec dirumpantur; trajice per cribrum et residuum fortiter exprime; liquores ambos commisce, mixturae libris quindecim adde Sacchari libras quatuor, et bene despumando ad mellis consistentiam usque inspissa. (Bel.)

B. Succi libras decem, Sacchari quatuor; — An. Succi libras quinque, Sacchari unam; — D. Succi libras quatuor, Sacchari unam; — Ba. Succi sedecim, Sacchari unam; — Fer. Succi libras quatuor et duas Sacchari; — HassP. Succi depurati partes octo, Sacchari partem dimidiam.

℞. Baccarum Sambuci maturarum
quantum vis.

Inter manus contritis, succum exprime et per pannum lanetum trajice; succi octariis duobus adde Sacchari albi semilibram, tuno ignis vividioris ope ad mellis consistentiam consume. (*Vm.*)

Fl. In mortario marmoreo contunde, per diem unum sponere ad fermentationem usque, exprimere, addere Sacchari pondus duplum, coquere et ad mellis consistentiam consumere; — Pal. Sacchari partem unam et duas Succi; — Am. Ed. et *C.* Sacchari unam et quinque Succi; — Ful. Sacchari unam et Succi quatuor; — Br. Hass. R. Wir. Wür. et *Sw.* Sacchari unam et Succi sex; — A. Sacchari unam et Succi novem; — Bor. O. Pol. et Sax. Sacchari unam et sedecim Succi; — *T.* Succum e Baccis contritis post duos vel tres dies exprimere, in balneo aquae vel vaporis ad syrupi et adjectis Sacchari unciis tribus pro quaque libra ad mellis consistentiam inspissare.

℞. Succi expressi Baccarum Sambuci
quantum vis.

Sepositione depuratum ignis moderati ope sufficienter inspissa. (Du. Gal. Gen. Li. Sar. *Br.*)

Bor4. Succum crudum Aqua communi solvere, post decanthationem colare et primum leni igne, tunc in balneo vaporis ad syrupi spissioris consistentiam consumere jubet.

Schweißtreibend. — Gabe, anderthalb bis zwei Unzen.

Roob s. Pulpa Ebuli. (A. Ba. Br. Ful. Pal. Sar. Wir. *T. Vm.*)

℞. Baccarum Ebuli recentium maturarum . . . partem unam.
Aquae . . . quantum sufficit ut empyreuma prohibeatur; coque, donec dirumpantur et exprime succum, qui addendo Sacchari partem sedecimam ad pulpae consistentiam evaporet. (Ba.)

A. Sacchari partem unam et novem Succi; *Vm.* Sacchari unam et Sunci decem; — Br. Ful. Pal. et Wir. Sacchari unam et Succi sex.

℞. Succi Baccarum Ebuli
quantum vis.

Cola et in balneo aquae ad electuarii consistentiam inspissa. (Sar.)

T. ut roob sambuci parari jubet.

Harntreibend, laxirend. — Gabe, zwei Unzen. — Man verschreibt es selten allein und fast immer als Excipiens.

Extractum Florum Sambuci. (Sm.)

℞. Florum Sambuci recentium
. . . libras octo.

Macera per tres dies in alembico et destillando in balneo aquae uncias circiter duas abstrahe; residuo Aquae triplum infunde et post horas sex digestionis coquendo ad tertiae partis remanentiam consume; exprime flores, liquorem clarificatum et colatum ad electuarii consistentiam inspissa et huic nonnisi tepido Aquam destillatam adde.

Mixtura antiasthmatica. (Sm.)

℞. Roob Sambuci,
Pulpae Prunorum,
Syrupi Rhoeados,
singulorum uncias duas.
Nitri . . . . drachmam unam.

Mel Sambuci s. Florum Sambuci. (Wir.)

℞. Florum recentium Sambuci
libram unam.
Mellis despumati . libras duas.
Aquae Florum Sambuci uncias sex.

Macera per aliquot dies, tunc coque blando igne, cola exprimendo et ad consistentiam requisitam consume. — Ehedem zu erweichenden und zertheilenden Gurgelwassern benutzt.

Mel Fructuum s. Baccarum Sambuci. (His.)

℞. Succi Baccarum Sambuci maturarum,
Mellis, singulorum libras duas.
Aquae . . . . quantum sufficit.
Coque ad syrupi spissi consistentiam et cola. Gabe, eine halbe bis ganze Unze.

Acetum Sambuci s. sambucinum. (Ams. Br. Gal. Lus. Pal. Sar. Suec. Wir. Würr. *Pid. Sw. T.*)

℞. Florum Sambuci partem unam.
Aceti . . . partes duodecim.
Macera per dies quatuor, clarifica lactis ope et filtra. (Suec.)

Gal. Florum partem unam, Aceti sedecim et quatuordecim dies macerationis; — Br. Pal. Wir. et *Sw.* Sambuci partem unam et sex Aceti; — Sar. et *Pid.* Sambuci unam, Aceti quatuor et sex dies macerationis; — Würr. Sambuci unam, Aceti novem et tres septimanas macerationis; — Ams. Florum partem unam, Aceti octo et quatuor dies macerationis; — *T.* Florum uncias sex, Aceti libras sex, digestionem per octo vel decem dies, colare leviter exprimendo, clarificare sepositione vel filtrare et infusionem, si vis, repetere.

℞. Florum Sambuci siccorum
libram unam.
Aceti communis . . libras sex.
Macera per dies sex, tunc coque et colaturae adde
Alcoholis . . . semilibram.
Misce bene. (Lus.)

Schweißtreibend, reinigend und austrocknend. — Man wendet es in heißen Aufgußwasser an, um Schweiß hervorzurufen. Auch braucht man es in Gurgelwässern, mit Wasser und Honig vermischt, bei Brüune.

Oxymel Sambuci. (Würr.)

℞. Aceti Sambuci . partem unam.
Mellis albi . . . partes duas.
Coque lente ad consistentiam syrupi.

Decoctum Corticis Sambuci. (B[a].)

℞. Corticis Sambuci manipulos tres.
Aquae fontanae,
Lactis, singulorum libram unam.
Decoque ad libras unius colaturae remanentiam. — Von Boerhaave bei Wassersucht empfohlen. — Gabe, eine Hälfte des Morgens, die andere des Abends.

Infusio s. Infusum Florum Sambuci nigrae. (An. DD. Gal. GalM. Ham. RC. *Huf. Ra.*)

℞. Florum Sambuci drachmam unam.
Aquae bullientis . libram unam.
Digere per horae quadrantem et cola exprimendo. (DD. *Huf. Ra.*)

Ham. et GalM. Florum unciam unam et Aquae bullientis quantum sufficit ad colaturam unciarum octo; — An. RC. Florum unciam unam, Aquae libram unam et digestionem per horam calore gradatim ad bullitionem usque aucto. (An.)

℞. Florum Sambuci drachmam duas.
Aquae bullientis . libras duas.
Infunde per horae quadrantem, cola et colaturae adde
Syrupi Capilli Veneris
unciam unam.
Misce bene. (Gal.)

Schweißtreibend, bei rheumatischen Affectionen und hitzigen Exanthemen empfohlen. — Man wendet den Aufguß heiß und reichlich an, nachdem man ihn mit Honig, Sauerhonig oder Weinsteinsyrup versüßt hat.

Aqua sulphurosa composita. (*Ca.*)

℞. Infusi Florum Sambuci,
Aquae Baregiensis,
singulorum libram unam.
In vier und zwanzig Stunden zu trinken, bei chronischen Catarrhen, Drüsenverstopfung, Scropheln und Flechten.

Gargarisma detergens s. detersivum. (Ful. *Sa.*)

℞. Florum Sambuci uncinam unam.
Aquae bullientis . libram unam.
Infunde, cola et adde
Nitri . . . . semunciam.
Essentiae Pimpinellae
drachmas tres.
Oxymellis simplicis uncias duas.
Misce bene. (Ful.)

℞. Florum Sambuci,
— Verbasci,
singulorum manipulum unum.
Aquae bullientis quantum sufficit ad colaturam librae dimidiae, cui adde
Nitri . . . semidrachmam.
Salis polychresti drachmam unam.
Roob Sambuci,
Syrupi Mororum,
singulorum unciam unam.
Misce bene. (*Sa.*)

Gargarisma aluminosum. (RC.)

℞. Aluminis drachmam unam ad sesquidrachmam.
Infusi Florum Sambuci
libras duas.
Acidi sulphurici diluti
guttas triginta.
Mellis flavi unciam vel
Sacchari puri . . semunciam.
Bei atonischen Hals- und Rachengeschwüren,

geschwüriger Bräune, Schlaffheit des Zäpfchens ꝛc.

Fomentum s. Fotus resolvens. (*Fi. Ra. Sp.*)

℞. Infusi Florum Sambuci libram unam.
Aquae Vitae camphoratae uncias octo.
Misce bene. (*Ra.*)

℞. Florum Sambuci manipulum unum.
Aquae . . . . uncias sedecim.
Infunde per horas duodecim et adde colaturae
Aquae Vitae camphoratae unciam unam.
Acetatis Plumbi drachmam unam.
Misce. (*Sp.*)

℞. Florum Meliloti,
— Sambuci,
singulorum drachmas duas.
Foliorum Menthae,
— Salviae,
singulorum drachmam unam.
Aquae bullientis . libras duas.
Colaturae adde
Aquae Vitae . . . uncias tres.
Misce. (*Ra.*)

℞. Infusi Florum Sambuci,
Aceti Vini albi,
singulorum sesquilibram.
Ammonii muriatici pulverati drachmas duas.
Misce. (*Fi.*)

Fomentum siccum. (*Fi.*)

℞. Florum Sambuci pulveratorum,
— Chamomillae,
singulorum unciam unam.
Farinae secalinae libram unam.
Misce.

Oleum Sambuci. (His. Sar.)

℞. Florum Sambuci partem unam cum dimidia.
Olei Olivarum . . partes tres.
Post duos dies digestionis in balneo aquae, refrigerata exprime et operationem cum novis Floribus repete. (Sar.)

His. Florum partem unam et tres Olei.

Unguentum Sambuci s. sambucinum. (Du. His. Lon. *C. Sp. T.*)

℞. Florum recentium Sambuci partes tres.
Axungiae Porci partes quatuor.
Sebi vervecini . . partes duas.
Coque flores cum axungia, exprime et adde sebum. (Du.)

Lon. et *C.* coquere jubent Florum et Axungiae partes aequales; — His. Florum partes quatuor, Sebi tres et Olei Olivarum unam.

℞. Sebi vervecini . . partes tres.
Olei Olivarum . partem unam.
Liqua simul et in mixtura digere
Florum Sambuci partes quatuor.
Post aliquot tempus cola. (*Sp.*)

T. Sebi uncias sex, Olei octodecim, Florum pondus aequale, octo dierum digestionem, evaporationem humidi in balneo aquae etc.

℞. Corticis Sambuci libras duas cum dimidia.
Florum Sambuci . semilibram.
Axungiae Porci . libras novem.
Post dies septem macerationis coque ad humidi consumptionem usque. (His.)

Aqua Florum Sambuci. (A. Ams. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Fer. Ful. Gal. Han. Hass. HassP. His. Li. O. Pal. Pol. R. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. *Br. Fi. Pid. T.*)

℞. Florum Sambuci . partes tres.
Aquae . . . quantum sufficit.
Destillent partes sex. (Suec.)

HassP. destillent partes viginti quatuor; — A. Florum partes sex et Aquae quantum sufficit; destillent partes octo; — Gal. Sar. et *T.* Florum partem unam et quatuor Aquae; destillent partes duas; — Ba. Florum partem unam et sedecim Aquae; destillent partes quatuor; — Pal. Florum partem unam et Aquae tres; destillet pars una cum dimidia; — Ams. B. Bel. D. Han. O. Pol. Florum partem unam et Aquae quantum sufficit; destillent partes decem; — Hass. R. Sax. et *Pid.* Florum partem unam et octo Aquae; destillent partes quatuor; — Wür. et *Br.* Florum partem unam et Aquae sex; — Bor. Bor4. Florum partem unam et Aquae quindecim; destillent partes decem; — Fer. Florum partes tres et Aquae sex; destillent partes sex; — *Fi.* Florum libras tres, Aquae libras quindecim; destillent librae sex.

℞. Florum Sambuci . partes tres.
Aquae . . . partes duodecim.
Flores in saccum include medio cucurbitae ita suspensum, ut aquam non attingat; destillent partes sex. (Ful. Li.)

℞. Florum recentium Sambuci partes sedecim.
Aquae . . . partes quadraginta.
Macera per dies duos et fermentatione incipiente destillent partes viginti. Producto adde
Alcoholis . . . unciam unam.
Misce bene. (His.)

℞. Baccarum Sambuci contusarum quantum vis.

In dolio fermentent, donec odorem vinosum emittant; destillent deinde leni igne et productum si requiritur rectifica. (Br. Wir.)

Aqua Ebuli. (Wir.)

℞. Baccarum Ebuli contusarum quantum vis.

In dolium immitte, fermentationi subjice et simulac odorem vinosum adeptae sunt, blando igne destillent; productum, si requiritur, rectificetur.

Julapium sambucinum. (Wir.)

℞. Aquae Sambuci . uncias viginti.
Sacchari albi libras duas cum dimidia.

Ebulliant semel et colentur.

Spiritus Sambuci. (Br. Pal. Wir.)

℞. Florum Sambuci partem unam.
Aquae Vitae . . partes quatuor.

Post tres dies macerationis destillet dimidia pars.

Sandaraca.

Gummi s. Resina Juniperi, Vernix sicca; Σανδαράκη; Sandarach, Wachholderharz; Sandaraque, Gomme de genévrier (*Gal.*); Gum juniper (*Ang.*); Resina de enebro, Grasilla, Sandaraca (*His.*); Geneverharb (*Bel.*).

Ams. B. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Fer. Ful. Gal. Ham. Han. His. O. Sax. Wir. Würr. *Be. Br. G. M. Pid. Sp. T. Z.*

Ein Harz in kleinen trocknen Tropfen oder in durchsichtigen Stücken, von hell- oder citronengelber Farbe, welche mit der Zeit roth werden. Der Bruch ist glänzend und glatt, Geruch und Geschmack sind dem des gemeinen Harzes ähnlich. Das Pulver ist weiß.

Nach Broussonet's Vermuthung fließt es aus Thuya articulata, *Desf.*, einem Baume (Monoecia Monadelphia, L.; Coniferae, *J.*) der Berberei (*Vahl* Symb. 2. p. 96. t. 18. *Desf.* Fl. Atlant. II. t. 252.). Lange Zeit leitete man es von Juniperus communis, L., J. lycia, L.; oder J. oxycedrus her, von denen ersterer bisweilen zwischen Holz und Rinde ein sehr verschiedenes, grünliches Harz, welches deutscher Sandarach (Sandaraca Germanica); Sandaraque d'Allemagne (*Gal.*) genannt wird, zeigt.

Reizend.

Sanguinaria.

Sanguinaria Canadensis, L.; Canadisches Blutkraut; Sanguinaire du Canada (*Gal.*); Bloodroot, Puccoon, Indian paint Turmeric (*Ang.*).

Am. *C.*

⊙ (Polyandria Monogynia, L.; Papaveraceae, *J.*) Eine Nordamericanische Pflanze. (*Big.* Med. Bot. t. 7.)

Man wendet die Wurzel und die Saamen an.

Die Wurzel ist dick und überall mit vielen Fasern besetzt. Sie liefert einen blutrothen Saft. Ihr Geschmack ist scharf und etwas bitter.

Brechenerregend. — Gabe des Pulvers, acht bis zwanzig Gran. — Nach Smith ist ihre Wirkung der des rothen Fingerhuts ähnlich und sie vermindert ebenso die Schnelligkeit des Pulses.

Die Saamen haben in der Wirkung, nach Barton, Aehnlichkeit mit denen des Stechapfels.

Infusum Sanguinariae Canadensis. (B*.)

℞. Radicis Sanguinariae Canadensis drachmam unam.
Aquae bullientis uncias quatuor.

Infunde et cola. — Brechenerregend, von Tully empfohlen. — Gabe, zwei Drachmen bis eine halbe Unze, bis die beabsichtigte Wirkung eintritt.

Tinctura Sanguinariae Canadensis. (Am. B*. *C.*)

℞. Radicis Sanguinariae Canadensis uncias duas.
Alcoholis tenuis octarium unum.

Post sex dies digestionis filtra.

Zu Anfang der Lungenschwindsucht, bei Brustwassersucht, beginnendem Croup ꝛc. empfohlen. — Gabe, zehen bis zwanzig Tropfen und mehr, nach und nach gestiegen.

Sanguis Draconis.

Draconis sanguis, Gummi s. Resina Sanguinis Draconis; Drachenblut; Sangdracon (*Gal.*); Dragon's blood (*Ang.*); Damulak-h-wain (*Ar. Duk.*); Drakowa krew (*B.*); Drageblod (*D.*); Sangre de dragon (*His*); Herduky (*Hin.*); Draakenbloed (*Bel.*); Sangue di dragone (*I.*); Jaranang (*Palembang.*); Khunisyawashan, Pra Smocza krew (*Pol.*); Catukamrigarakta (*Sa*); Drakblod (*Suec.*); Kandomurgarittum (*Tam.*); Catgamurgum intura (*Tel.*).

Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Fer. Ful. Gal. Han. HassP. His. O. Pol. Sax. Suec. Wir. Würr. *A. Be. Br. C. Fi. G. M. Pid. Sa. Sp. T. Z.*

Eine dunkel blutrothe, geruch- und geschmacklose, harte, zerreibliche, trockne, am Feuer schmelz- und entzündbare Substanz,

welche mit einem balsamischen Geruch brennt. Man unterscheidet mehrere Sorten:

1) *Sanguis Draconis in granis* (en grains *Gal.*), in kleinen gesonderten durchsichtigen Tropfen.

2) *Sanguis Draconis in lacrymis* (en larmes) in eiförmigen, haselnußgroßen, perlenschnurförmig aneinandergereihten Stücken.

3) *Sanguis Draconis in placentis* (en pains), in platten, einen Zoll dicken und einige Unzen schweren Massen oder Kuchen.

4) *Sanguis Draconis in tabulis* (en tables), in drei oder vier Zoll langen und sechs bis acht breiten und über einen Zoll dicken Platten.

Dieser Stoff wird aus den Früchten von Calamus Rotang, L. (Draco, *Willd.*) (Hexandria Monogynia, L.; Palmae *J.*), einem kleinen Baume Ostindien's (*Rheede* Mal. t. 64. *Bert.* Bild. III. 76. fig. 2.), und aus dem Stamme von Pterocarpus Draco, L. (Diadelphia Decandria, L.; Leguminosae, *J.*), einem Baume Südamerica's (*Hayne* IX. t. 9.); von Pterocarpus santalinus, L., einem Baume Ostindien's; von Dracaena Draco L. (Hexandria Monogynia, L.; Asparagineae, *J.*), auf den Canarischen Inseln (*Blackw.* Herb. t. 358. *Bert.* Bild. II. 8. fig. 1.); von Dalbergia monetaria (Diadelphia Decandria, L.; Leguminosae, *J.*), einem Baume Surinam's und verschiedenen Arten Croton gewonnen.

Melandri (s. Hayne getr. Darst. d. Pfl.) fand ein eigenes Alcalin, Draconin, welches im S. Drac. in guttis s. lacrymis nur in geringer Menge enthalten ist, dahingegen das S. Drac. in placentis fast ganz daraus besteht.

Ein schwaches Adstringens. — Gabe des Pulvers, von zehen Gran bis zu einer halben Drachme.

Pulvis ad haemoptysin. (*Sm.*)

℞. Sanguinis Draconis drachmas duas.
Magnesiae subcarbonicae
drachmas quatuor.
Divide in partes duodecim. — Alle zwei oder drei Stunden ein Stück mit etwas Wasser.

Pulvis adstringens s. contra casum.
(Pal. Sar. *Sp.*)

℞. Terrae sigillatae,
Sanguinis Draconis,
Mumiae Aegyptiacae,
singulorum semunciam.
Cetacei . . . . drachmas duas.
Rhei . . . . drachmam unam.
Fiat pulvis. (*Sp.*)
Pal. Trium priorum dictarum substantiarum, singularum drachmas duas et reliquarum ambarum drachmam unam.

℞. Baccarum Myrti,
Balaustiorum,
Boli Armenae,
Mastichis,
Olibani,
Sanguinis Draconis,
singulorum partes aequales.
Fiat pulvis. (Sar.)
Ehedem nach Stürzen empfohlen. — Gabe, zwei Scrupel.

Tinctura Sanguinis Draconis. (Sar.)

℞. Sanguinis Draconis pulverati
uncias duas.
Alcoholis . . . . libram unam.
Post tres dies digestionis in balneo arenae tepido filtra.
Gabe, von einem Scrupel bis zur halben Drachme.

Julep s. Julapium adstringens. (*Pic.*)

℞. Aquae Plantaginis,
— Rosarum rubrarum,
singularum uncias tres.
Corallii rubri,
Sanguinis Draconis,
singulorum semidrachmam.
Syrupi Rosarum rubrarum,
— Cydoniorum,
singulorum drachmas sex.
Succi Plantaginis . uncias duas.

Sanicula.

Sanicula Europaea, L.; Sanickel; Sanicle d'Europe (*Gal.*); Sanicle (*Ang.*); Sanikel (*Bel. D. Suec.*); Sanicula (*His. Lus.*); Sanicola (*I.*); Zakkiel (*Pol.*).

Br. Fer. Gal. His. Wir. *Be. Br. G. M. Sp.*

♃ (Pentandria Digynia, L.; Umbelliferae, *J.*) Eine Europäische Pflanze. (*Zorn* Ic. pl. t. 109.)

Man wendet das Kraut (herba Sanicula s. Diapensiae) an; es besteht aus einfachen, langgestielten, runden, fünflappigen, sägezähnigen, glänzenden Wurzelblättern, dünnen Stängeln und sitzenden dreispaltigen Stängelblättern. Es hat keinen Geruch und einen bittern, etwas adstringirenden und salzigen Geschmack.

Es kommt mit zu manchen Brustspecies.

Santalum.

Man kennt drei Hölzer dieses Namens.

1) *Lignum Santali rubri;* rothes Sandelholz, Kollaturholz; Santal rouge (*Gal.*); Red saunders (*Ang.*); Sundal almeer,

Undum (*Hr.*); Czerweny santal, Cerwene santalowe drzewo (*B.*); Rackta chandana (*Beng.*); Honnay (*Com.*); Ruct haudun (*Cy*); Lal chudend (*Duk.*); Sandalo rubro (*His.*); Ruckut chundun, Undum (*Hin.*); Root sandelhout (*Bel.*); Sandalo rubio (*I.*); Sundul surkh, Buckum (*Pe.*); Kuchandana, Tilaparni, Runjana, Rukta chandana (*Sa*); Segapu chandanum (*Tam.*); Kuchandanum (*Tel.*).

An. B. Bor. Br. Du. Ed. Gal. His. Lou. LonN. Suec. Wir. *A. Be. Br. C. Fi. G. M. Sp. Z.*

Dieses Holz kommt in mehr oder weniger dicken, der Länge nach geschnittenen, schön rothen, gefurchten Stücken ohne Rinde oder in Raspelspähnen vor (Scobs, Rasura Ligni Santali rubri, Lignum Santali rubrum raspatum), zwischen deren Furchen ein harziger verhärteter Saft sitzt. Es hat einen sehr merklich gewürzhaften Geruch und einen etwas harzigen Geschmack.

Es kommt von Pterocarpus santalinus, L. (Diadelphia Hexandria, L.; Leguminosae, J.), einem Baume Ostindien's. Pelletier hat darin einen eigenthümlichen färbenden Stoff, das Santalin (Santalina, Santalinum), Santaline, entdeckt.

2) *Lignum Santali albi*; weißes Sandelholz; Santal blanc (*Gal.*); Ayasru (*Amb.*); White saunders (*Ang.*); Sundel abiez (*Ar.*); Chándana (*Beng.*); Tanmuh (*Cy.*); Srigunda (*Can.*); Cayhayndhan (*Co.*); Sandan (*Cy*); Sundel (*Duk.*); Chunden, Chandana, Katchandan (*Hin.*); Sandalo bianco (*I.*); Tsjendana (*Mal.*); Sundul sufleid (*Pe.*); Chandana, Malagaja (*Suec.*); Chandanum, Chandanacilttay (*Tam.*); Chandanum (*Tel.*); Aikamenil (*Timor.*).

B. Br. Per. Gal. His. Wir. Wür. *A. Be. Br. C. Fi. G. M. Sp.*

In der Länge nach geschnittenen, sehr schweren, mit einer schwärzlichgrauen, etwas unebenen Rinde bedeckten Stücken von gelblichweißer Farbe, schwach aromatischem Geruch und fast gar keinem Geschmack.

3) *Lignum Santali citrini*; gelbes Sandelholz; Santal citrin (*Gal.*); Yellow saunders (*Ang.*); Zluty santal, Zlute santalowe drewo (*B.*); Sandalo citrino (*I.*).

An. B. Br. Gal. His. Wir. *Fi. G. Z.*

Dieses Holz hat eine gelbliche Farbe und ein feineres Korn als das vorige; es ist brüchiger, leichter und gewöhnlich ohne Rinde. Es hat einen sehr deutlich gewürzhaften Geruch und fast keinen Geschmack.

Das weiße und gelbe Sandelholz kommen von Santalum album; L. (Tetrandria Monogynia, L.; Onagrariae, J.), einem Baume Ostindien's. (*Rumph.* Amb. II. p. 42. t. 11. *Plenck* t. 101. *Lam.* Ill. t. 74.) — Hermann betrachtet das weiße als den Splint, das gelbe als den Kern des Holzes; nach Mérat ist ersteres das junge, letzteres das alte Holz.

Das gelbe Sandelholz ist reizend, schweißtreibend; das rothe schwach adstringirend.

Decoctum Ligni Santali citrini. (B*.)

℞. Rasurae Ligni Santali citrini semunciam.
Aquae fontanae . . libras duas.
Coquendo dimidium consume. — Glass weise.

Oleum Santali citrini vel albi aethereum, Aethereoleum Santali citrini vel albi. (Wir. *T.*)

℞. Rasurae Ligni Santali albi quantum vis.
Aquae . . . . partes quatuor.
Macerentur, destillet dimidium et cohobetur etc. (*T.*)

℞. Rasurae Ligni Santali citrini libras sex.
Aquae purae libras triginta sex.
Salis culinaris . . libram unam.
Macera per quatuor vel quinque dies et destillando obtentum oleum quod in fundum descendit, collige.

Unguentum santalinum, Emplastrum santalinum s. incognitum. (Br. Sar. Sax. Wir.)

℞. Olei Myrti . . . . libras tres.
Cerae albae . . uncias novem.
Petalorum siccorum Rosarum rubrarum,
Ligni Santali rubri,
singulorum uncias quatuor.
Camphorae . . . . semunciam.
Cerae in oleo liquatae pulverem rosarum, tunc santalum et denique camphoram in olei pauxillo solutam adde.

℞. Santali albi,
— citrini,
— rubri,
singulorum drachmas sex.
Florum recentium Rhoeados sesquiunciam,
— — Rosarum uncias duas cum dimidia.
Olei rosati . . . libram unam.
Vini albi . . . uncias quatuor.
Post duos dies macerationis coque lente ad humidi consumptionem usque, cola exprimendo et adde
Boli Armenae,
Cerae albae,
singularum uncias tres.
Camphorae . . drachmas duas.
Misce. (Wir.)

℞. Pulveris Santali rubri partes sex.

Pulveris Croci . . partem unam.
Olibani,
Mastichis,
Myrrhae,
Aluminis crudi, singulorum partem duodecimam.
Liqua et massae semirefrigeratae adde
Resinae Pini,
Cerae flavae,
singularum partes sedecim.
Misce bene. (Sax)
℞. Cerae,
Resinae Pini,
singularum uncias quatuor.
Liqua et adde
Ligni Santali rubri sesquiunciam.
Croci . . . . drachmas duas.
Olibani,
Mastichis,
Myrrhae,
Aluminis,
singulorum sesquidrachmam.
Misce. (Br. Wir.)

Species diatrion Santalon. (Pal. Wir.)
℞. Santali albi,
— citrini,
— rubri, singulorum drachmas duas et scrupulos duos.
Florum Rosarum . uncias tres et drachmas tres.
— Violarum . semunciam.
Rhei,
Seminum Portulaccae,
Eboris ad alborem usti,
Succi Liquiritiae,
singulorum drachmas duas.
Amyli,
Gummi Arabici,
— Tragacanthae, singulorum scrupulos quatuor.
Addi potest
Camphorae . . scrupulus unus.

Die Alten verordneten diese Species zur Verbesserung der unregelmäßigen Hitze der Leber, bei schleichenden Fiebern, Gelbsucht und Wassersucht. — Gabe, eine halbe bis ganze Drachme.

Santolina.

Santolina Chamaecyparissus, L.; Gartencypresse, Cypressenkraut; Santoline à feuilles de cyprès, Aurone femelle, Garde-robe (*Gal.*); Sweet scented lavender cotton (*Ang.*); Santolina (*His. I. Lus.*); Cypreskruid (*Bel.*).
Fer. Gal. Wir. *Be. Br. M. Sp.*

♄ (Syngenesia Polygamia Aequalis, L.; Synantherae, *Cass.*) Eine auf den Gebirgen des südlichen Europa's wachsende Pflanze. (*Zorn* ic. pl. t. 245.)

Man wendet das Kraut (herba Santolinae s. Abrotani foeminei s. montani) an; es besteht aus grauen, vierzähligen, gezähnten, stumpfen, immergrünen Blättern und hat einen durchdringenden, angenehmen Geruch und einen gewürzhaften und bittern Geschmack.
Reizend, nervenstärkend, wurmwidrig.

Saponaria.

Saponaria officinalis. L.; Seifenkraut, Speichelseifenkraut, Waschkraut, Speichelwurz; Saponaire (*Gal.*); Soapwort (*Ang.*); Mydlj koren (*B*); Saebeurt (*D.*); Jabonera (*His.*); Zeepkruid (*Bel.*); Saponaria, Saponella (*I.*); Mydelnik (*Pol.*); Saboaira (*Lus.*); Saepaert (*Suec.*).
A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Ham. Han Hass. HassP. Li. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *Be. Fi. G. Ml. Fid. Sp. Z.*

♃ (Hexandria Digynia, L.; Caryophylleae, *J.*) Eine in Europa gemeine Pflanze. (*Blackw.* t. 113 *Schk.* t. 121. *Plenck* t. 346. *Hayne* II. t. 2. *Bert.* Bild. VI. 95. fig. 2. Fl. méd. VI. 311.)
Die Wurzel (radix Saponariae rubrae) ist dünn, hart, sehr lang, von der Dicke einer Schreibfeder, knotig, außen röthlichbraun, inwendig weiß, runzlig und fast geruchlos. Der Geschmack ist anfangs süßlich und schleimig, wird aber bald bitter, herb und etwas scharf.
Das Kraut besteht aus einem glatten, hohlen, walzenförmigen, gegliederten, wenig ästigen Stängel mit unbehaarten, sehr glatten, dunkelgrünen, fast sitzenden, eirundlanzettförmigen, ganzen und ganzrandigen, dreirippigen, am Grunde verschmälerten, kaum spitzigen Blättern. Es hat keinen Geruch und einen etwas seifenartigen, schleimigen, schwach bittern Geschmack.
Das Seifenkraut enthält Harz, Schleimharz und einen eigenen schleimigen Stoff, von Bucholz Seifenstoff (Saponinum) genannt.
Tonisch, schweißtreibend, besonders bei Haut- und venerischen Krankheiten angewendet.

Succus Saponariae. (Hass.)
℞. Herbae vel Radicis recentis Saponariae . . . . quantum vis.
Contunde in mortario lapideo, exprime sedulo, succum sepone ac filtra. — Gabe, eine bis vier Unzen.

Extractum Saponariae. (*A. Am. Gen. Han. HassP. Sax. Br. Sw. T. Vm.*)
℞. Herbae Saponariae libras decem.
Contunde in mortario ferreo, adden-

do Aquae libras sex, exprime succum, qui semel ebulliat et tunc leni calore ad consistentiam syrupi spissi evaporet. (Sw.)

℞. Foliorum recentium Saponariae quantum vis.

Contunde cum Aquae pauxillo et per pannum cola; sepone, decantha tunc prope ignem coagulent et denuo colentur; deinde ad massae pilularis consistentiam evaporata ab igne remove, admisce faeculam repositam et denuo ad justam spissitudinem redige. (*Vm.*)

℞. Radicis recentis Saponariae quantum vis.

Macera per horas aliquot in Aqua, adde majorem Aquae copiam et postquam aliquoties liquor ebulliverit, albumine clarificatum ad extracti usque consistentiam consume. (*Vm.*)

℞. Herbae Saponariae partem unam. Aquae communis . . partes octo.

Infunde per horas viginti quatuor, coque deinde per horae quadrantem et cola fortiter exprimendo; residuum coquatur cum Aquae partibus quatuor, quo facto liquores ambo, post horas viginti quatuor sepositionis ad aptam consistentiam evaporent. (Sax.)

℞. Foliorum recentium Saponariae, Aquae frigidae, singulorum partem unam.

Macera per horas duodecim, tunc adde

Aquae bullientis duplum pondus totius massae. Postquam refrixerint sepone, albumine clarifica, igni impone et liquorem spissescere coeptum, per pannum trajice et continue agitando, sufficienter consume. (*Vm.*)

℞. Foliorum recentium Saponariae libras duas.
Aquae communis libras decem.

Coque per horae quadrantem, cola exprimendo, sepone et decantha liquorem, qui ad consistentiam requisitam evaporet. (An. Gen.)

L. coquere Radicis libras duas in Aquae octo ad quatuor remanentiam et decoctum evaporare jubet.

℞. Radicis Saponariae partem unam. Aquae bullientis . . partes octo.

Coque leviter per horae quadrantem et cola exprimendo; residuum coquatur cum Aquae partibus quatuor et itidem coletur, quo facto liquores ambo commixti et post sufficientem sepositionem decanthati, ad extracti consistentiam evaporent. (Han.)

A Radicem pluribus coctionibus succedentibus penitus extrahere et liquores commixtos post decanthationem in balneo aquae consumere jubet; — Br. Radicem coquere per horas duas cum Aquae partibus sex, tunc denuo cum nova Aqua et liquores commixtos inspissare; — Hass. ut extractum ligni campechiensis; — T. ut extractum cichorii.

Gabe, eine halbe bis zwei Drachmen.

Decoctum Saponariae officinalis. (B*, *Sw. Sy.*)

℞. Radicis Saponariae uncias duas.
Aquae fontanae . libras quatuor.
Decoque ad dimidii remanentiam. (B*.)

℞. Herbae Saponariae . semilibram.
Aquae . . . . . libras octo.
Decoque ad dimidiae partis remanentiam. (*Sw. Sy.*)

Bei Scropheln, venerischen und Hautkrankheiten empfohlen. — Gabe, zwei bis vier Pfund täglich.

Species resolventes. (Ful. Sar. *Pid.*)

℞. Radicis Taraxaci,
— Saponariae,
singularum uncias duas.
Herbae Centaurii minoris,
— Marrubii,
singularum unciam unam.
Florum Tanaceti,
— Chamomillae,
singulorum sesquiunciam.

Concisa misce. (Ful. *Pid.*)

℞. Radicis Taraxaci,
— Saponariae,
— Valerianae minoris,
singularum partes duas.
Herbae Centaurii minoris,
— Marrubii albi,
singularum partem unam.
Florum Chamomillae Romanae partem dimidiam.
— — vulgaris partes duas.
Seminum Lini . partes quatuor.

Zum Klystir bei Stockungen in den Unterleibseingeweiden.

Species Guajacinae compositae s. lignorum (RC.), vgl. Guajacum: Rasurae Ligni Guajaci partes tres, Radicis Bardanae, Caricis, Saponariae, singularum partes duas, Stipitum Dulcamarae partem unam; — *Decoctum:* Specierum uncias tres, Aquae bullientis libras tres, decoque ad duas, sub finem addendo Radicis Liquiritiae drachmas duas; — *Decoctum Specierum cum Mezereo:* singulis decocti libris Mezerei drachma una addatur, vel: Decocti specierum et Decocti Mezerei, singulorum partes aequales.

Sarcocolla.

Gummi Sarcocollae; Sarcocolla, Fischleimgummi; Sarcocolle (*Gal.*); Unzerat (*Ar.*); Sarcocolla (*His.*); Kunjudeh (*Pe.*).

Ams. Br. Fer. Gal. His. Wir. Würz. *A. Be. G. M. Sp. T. Z.*

In kleinen unregelmäßigen, eckigen, zerreiblichen Körnern von verschiedener Farbe, vom Blaßgelb bis zum dunkeln Granatroth und ganz- oder halbdurchsichtig und undurchsichtig, geruchlos und einen scharfen und brennenden Geschmack besitzend.

Es fließt aus allen Theilen und besonders aus den Kelchen von Penaea Sarcocolla, L., (Tetrandria Monogynia, L.; Acanthaceae. *J.*), einem Strauche Persien's und Arabien's. (Enc. méth. t. 78. fig. 2.)

Diese Substanz enthält, nach Pelletier, sehr wenig Schleimharz und Gallertstoff mit einer eigenthümlichen Substanz, dem Sarcocollin (Sarcocollinum), Sarcocolline.

Tinctura Sarcocollae. (Sar.)

℞. Sarcocollae . . . uncias duas.
Alcoholis . . . libram unam.

Post tres dies digestionis super arena tepida filtra.

Sarsaparilla.

Salsaparilla, Sarsa, Zarsa, Zarsaparilla; Sassaparille, Sarsaparille; Salsepareille (*Gal.*); Sarzaparilla (*Ang.*); Sarsaparylle (*B.*); Sarsaparil (*D.*); Zarzaparilla (*His.*); Sarzaparilla (*Bel.*); Salsapariglia (*I.*); Sasaparyle (*Pol.*); Salsaparilha (*Lus.*); Sassaparill (*Suec.*).

Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Würz. *A. Be. Br. C. G. M. Par. Pid Sp. Z.*

So nennt man die Wurzel der Smilax Salsaparilla, L., ♄ (Dioecia Hexandria, L.; Asparagineae, *J.*), einer Pflanze Peru's und Brasilien's (*Plenck* t. 712. *Blackw.* t. 393. Berl. Jahrb. XII. *Bert.* Bild. IV. 53. fig 2. Fl méd. VI. 308.) (Nach Willdenow, Berl. Jahrb. 1806, werden die Wurzeln von dieser Art fast gar nicht gebraucht, sondern vielmehr die von Smilax syphilitica, *Humboldt.*)

Es kommen davon vier Hauptsorten im Handel vor:

1) Sassaparille aus Brasilien oder Portugiesische: in sechs bis acht Fuß langen, etwa zwei Fuß im Umfang haltenden Bündeln, welche aus durcheinandergeflochtenen, schreibfederdicken, biegsamen, der Länge nach gerieften Wurzeln bestehen, welche eine dünne Rinde, aber gewöhnlich keinen Ausläufer und keine Behaarung haben. Sie ist außen röthlich oder schwärzlichbraun, inwendig weiß und mehlig. Der Geruch geht ihr ganz ab, der Geschmack ist etwas bitter. Diese ist am meisten geschätzt. Sie kömmt aus Peru und Maranham.

2) Sassaparille von Honduras. Die Rinde ist schmutzigbraun, bisweilen weißlich. Sie hat noch ihre Ausläufer und ist sehr lang und faseriger als die vorige. Inwendig ist die Rinde rosenröthlich weiß, das darunterliegende Holz ist weiß, von fadem, stärkemehlartigem Geschmack, die Rinde dagegen schleimig und oft deutlich bitter. Sie kommt aus der Hondurasbai.

3) Sarsaparille von Veracruz; mager, dunkelgefärbt und faserig, schlechter als die vorigen.

4) Rothe oder Jamaika-Sassaparille, mit Ausläufern versehen, sechs bis sieben Fuß lang, rund und durch das Trocknen zusammengedrückt, mit einer orangerothen, röthlichgrauen oder weißlichen Oberhaut bedeckt; die Rinde ist bisweilen feucht und der zunächst unter ihr liegende markige Theil weiß (mehr oder weniger dunkelroth). Man findet sie in kleiner Menge unter den von Honduras kommenden Bündeln. Sie ist zwar wenig geschätzt, verdient aber den Vorzug vor den beiden erstern, indem sie einen bitterern, stärkeren und gewürzhafteren Geschmack und einen deutlichen, schon durch Reiben bemerkbar werdenden Geruch besitzt.

Diese Wurzel verdankt, nach Palotta, ihre Arzneikräfte einem eigenthümlichen Alkaloid, dem Parillin (Parillina, Parillinum), Parigline, das jedoch Planche nicht darstellen konnte. Folchi hat auch aus dem Kern der Sassaparillwurzel ein anderes Alcaloid, das Smilacin (Smilacina, Smilacinum), Smilacine, gezogen.

Sie wird im Allgemeinen als harntreibend und besonders schweißerregend betrachtet, obgleich in beiden Beziehungen ihre Wirkung sehr schwach ist; offenbar wirkt sie reizend, eine Eigenschaft, welche das Parillin in einem noch weit höheren Grade besitzt. (Nach Palotta wirkt es zugleich deprimirend.) Man wendet sie vorzüglich in venerischen Krankheiten, chronischen Rheumatismen und verschiedenen Hautkrankheiten an. — In Pulver giebt man sie zu einer halben bis ganzen Drachme. Galläpfelaufguß, Kalkwasser, essigsaures Blei und salpetersaures Queckfilber dürfen weder mit dem Pulver, noch mit dem Aufguß und der Abkochung verbunden werden.

Die in Ostindien ansässigen Engländer führen unter dem Namen einheimische oder Indische Sassaparille, Country sarsaparilla, die Wurzel von Periploca indica, L. (Pentandria Monogynia,

L.; Apocynaceae, J.), einem in diesen Gegenden einheimischen Strauch, an. Diese Wurzel [Oshba (*Ar.*); Erramossumul, Irimusu (*Cy.*); Mugrabu (*Hin.*); Shariva (*Sa.*); Nunnarivayr (*Tam.*); Sugundapala (*Tel.*)] wird zu drei oder vier Unzen in Abkochung bei Scropheln, venerischen und Hautkrankheiten empfohlen.

Pulvis sudorificus et tonicus. (*Pie.*)

℞. Sarsaparillae,
Sassafras,
Radicis Rusci,
singulorum partes aequales.

Gabe, eine Drachme alle Morgen in weißem Wein.

Opiatum arabicum. (*Pie.*)

℞. Sarsaparillae,
Chinae,
Nucum Avellanarum tostarum
singularum uncias quatuor.
Caryophyllorum uncias quinque.
Mellis Narbonuensis
quantum sufficit.

Dieses Opiat wird in der Provence häufig gegen venerische Halsgeschwüre und sogenannte chronische oder ausgeartete Syphilis angewendet.

Extractum Sarsaparillae. (Ams. B. His. Lon. LonN. Sar. Wir. *E. Fi. T.*)

℞. Radicis Sarsaparillae libram unam.
Aquae bullientis . octarios octo.

Macera per horas viginti quatuor, decoque deinde ad octariorum quatuor remanentiam; cola liquorem bullientem et ad extracti consistentiam consume. (Lon. LonN. *C.*)

℞. Radicis Sarsaparillae partem unam.
Aquae bullientis . partes decem.

Digere per horas viginti quatuor, tunc coque per duas et cola; residuum coquatur per aequale tempus cum novae Aquae partibus quatuor; liquores commixti ad extracti consistentiam evaporent. (B. His.)

Ams. coctionem Radicis primum cum viginti, deinde cum quindecim partibus Aquae, qualibet vice ad dimidii remanentiam praescribit; — *Fi.* Sarsaparillam primum cum Aquae sextuplo coquere, colaturae novam Aquam addere et sic radicem penitus extrahere, tunc decocta consumere; — *T.* ut extractum ligni guajaci.

℞. Radicis Sarsaparillae libram unam.
Aquae bullientis . . libras sex.

Macera per tres dies, coque parumper, cola exprimendo et ad extracti consistentiam consume. (Wir.)

Sar. liquorem coquendo ad duos trientes consumere, colare et evaporare jubet.

Decoctum Sarsaparillae s. Sarsae s. Smilacis Sarsaparillae. (Am. B*. Du. Ed. Lon. LonN. Lus. Suec. *Br. E. Fi. Ra. Sa. Sw. Sy. T.*)

℞. Sarsaparillae . . . uncias sex.
Aquae . . . . . libras octo.

Digere modico calore per horas duas, exime deinde radicem et contusam lente in infusione ad dimidii aquae remanentiam coque.

Am. Du. et *C.* Sarsaparillae sesquiunciam, Aquae bullientis octarios duos, duas horas digestionis et coctionem radicis contusae ad dimidiae partis liquidi remanentiam; — *Sy.* Sarsaparillae uncias tres, Aquae bullientis libras tres, quatuor horas infusionis, infusionem radicis contusae per horas septem et coctionem ad librarum duarum liquidi remanentiam, vel: Radicis uncias tres, Aquae bullientis libras tres, duodecim horas digestionis et decoctionem ad librarum duarum liquidi remanentiam; — *Br.* Radicis uncias sex, Aquae libras sedecim et post certum tempus digestionis, coctionem ad dimidiae partis liquidi remanentiam; — Lus. eundem agendi modum, sed Aquae libras decem; — B*. et *Ra.* Sarsaparillae unciam unam et Aquae libras duas ad tertiam partem redigendas: — *Ra.* praeterea: Sarsaparillae unciam unam ad duas et Aquae libras quatuor ad duas redigendas; — B*. Lon. et LonN. Sarsaparillae uncias quatuor, Aquae octarios quatuor, quatuor horas infusionis, tunc duas macerationis radicis contusae et coctionem ad dimidiae partis liquidi remanentiam; — Suec. Sarsaparillae uncias quatuor, Aquae bullientis uncias sexaginta quatuor, horas quatuor macerationis, duas digestionis radicis contusae et evaporationem liquidi coctione ad unciarum triginta duarum remanentiam; — *Fi.* Sarsaparillae uncias quatuor, Aquae libras quinque cum dimidia, horas quatuor macerationis et coctionem ad libras tres; — *T.* Sarsaparillae uncias quatuor, Aquae libras sex, macerationem per horas quatuor vel sex et decoctionem ad dimidium.

Reizend, bei venerischen und rheumatischen Krankheiten angewendet. — Gabe, ein halbes Pfund drei oder vier Mal täglich.

Tisana de Saint-Marie.

℞. Sarsaparillae concisae
uncias quatuor.
Aquae . . . . . octarios sex.

Decoque ad octariorum quatuor remanentiam; ab igne removendo adde

Radicis Liquiritiae contusae
drachmas quatuor.

Post sufficientem infusionem refrigerata cola.

Reizend, bei venerischen Krankheiten empfohlen — Man trinkt die vorgeschriebene Menge, Morgens nüchtern, lauwarm, auf sechszehn Mal, alle Viertelstunden ein Glas.

Liquor antivenereus Roueni. (B*.)

℞. Decocti Sarsaparillae uncias triginta duas.
Nitri . . . . . drachmas tres.
Aetheris hydrochlorici semunciam.
Spiritus Camphorae drachmas duas.
Olei essentialis Anisi guttas quinque.

Gabe, ein Löffel zwei oder drei Mal täglich.

Syrupus Sarsaparillae. (GalF.)

℞. Sarsaparillae concisae libras tres.
Aquae bullientis libras triginta.

Infunde per horas viginti quatuor, tunc ad libras duodecim decoque et cola exprimendo; residuum coquatur in Aquae libris triginta ad duodecim remanentiam et cum expressione coletur, quo facto, decocta ambo commixta ad libras decem vaporatione redigantur et post sepositionem filtratis addantur

Syrupi Sacchari,
Mellis albi, singulorum libras tres.

Coque celeriter ad requisitam consistentiam.

Tisana arabica. (*Pie.*)

℞. Sarsaparillae . . uncias duas.
Chinae . . . . . unciam unam.
Aquae . . . . . libras octo.

Decoque ad librarum quatuor remanentiam.

In der Provence mit dem opiatum arabicum gegen Syphilis gebraucht.

Decoctum Sarsaparillae compositum s. sudoriferum s. Ligni Guajaci compositum, Apozema sudoriferum. (Gal. His. Sar. *Ca. Ra. Sp. Sw. Vm.*)

℞. Radicis Sarsaparillae sesquiunciam.
Aquae communis libras quinque.

Coque per semihoram et adde

Rasurae Ligni Guajaci sesquiunciam.

Post horae quadrantem ab igne remove et adde

Liquiritiae rasae . semunciam.
Ligni Sassafras drachmas duas.

Vase tecto, liquidum post refrigerationem cola, sepone et libras tres illius defunde. (*Vm.*)

℞. Radicis Sarsaparillae,
Rasurae Ligni Guajaci,
singularum sesquiunciam.
Aquae tepidae . libras quatuor.

Infunde per horas duodecim in vase tecto, coquendo ad libras tres consume, sub finem addendo

Rasurae Ligni Sassafras drachmas duas.
Liquiritiae rasae . semunciam.

Post semihoram infusionis cola. (Gal.)

His. Sarsaparillae uncias duas, Guajaci tantidem, Aquae libras octo ad quatuor redigendas, Sassafras unciam unam et Liquiritiae drachmam unam.

℞. Radicis Sarsaparillae uncias duas.
Rasurae Ligni Guajaci unciam unam.
Chinae . . . . . semunciam.
Aquae . . . . octarios duos.

Coquendo dimidium consume, sub finem addendo

Ligni Sassafras drachmas duas.

Cola leviter exprimendo. (*Ca.*)

℞. Radicis Sarsaparillae uncias triginta.
Aquae bullientis libras viginti quatuor.

Post horas viginti quatuor infusionis decoque ad librarum octo colaturam; qua operatione bis cum residuo repetita, decoctorum trium cunctorum mixtorum libris viginti adde

Florum Boraginis,
Petalorum Rosarum albarum,
Foliorum Sennae,
Seminum Anisi,
singulorum uncias duas.

Coquendo ad libras duodecim consume et cola. (*Sw*)

℞. Radicis Sarsaparillae,
— Chinae,
singularum uncias duas.
Rasurae Ligni Santali rubri drachmas sex.
— Cornu Cervi sesquiunciam.

Digere per horas viginti quatuor, coque tunc ad dimidii reductionem, sub finem addendo

Rasurae Ligni Santali citrini drachmas sex.
Sacchari albi . . . uncias sex.

Cola. (His.)

℞. Radicis Sarsaparillae unciam unam.
Aquae communis . . libras tres.
Sulphureti Antimonii in nodulo drachmas duas.
Collae Piscium drachmam unam.

Coquendo tertiam partem consume. (*Ra.*)

℞. Radicis Sarsaparillae,
— Chinae,
singularum semunciam.
Rasurae Ligni Guajaci,
Antimonii crudi,
singulorum uncias duas.
Aquae bullientis . . libras octo.

Macera per horas viginti quatuor, tunc per horam coque in vase tecto; adde deinde,

Rasurae Ligni Sassafras
unciam unam.
Radicis Caryophyllatae
semunciam.
Baccarum Juniperi contusarum
drachmas duas.

Coque per horae quadrantem et cola. (*Sp.*) — Durch Zusatz von einer Unze Semma, zu Ende der Kochung, kann man dieser Tisane eine laxirende Wirkung ertheilen, und sie unterscheidet sich dann nur wenig von der Tisana antivenerea purgans.

℞. Radicis Sarsaparillae uncias duas.
— Chinae,
Rasurae Ligni Guajaci,
singularum unciam unam.
Antimonii crudi in nodulo
sesquiunciam.
Aquae communis . . libras sex.

Digere per horas duodecim inter cineres calidos, tunc lente ad duas libras decoque, sub finem addendo

Liquiritiae rasae drachmas sex.

Cola decoctum et bulliens infunde in

Rasurae Ligni Sassafras
drachmas tres.

Vas ad perfectam refrigerationem usque tege, et cola. (Sar.)

Bei venerischen, catarrhalischen und exanthematischen Krankheiten empfohlen. — Gabe, mehrere Gläser täglich.

Tisana sudorifica. (*Pie. Ra. Sm.*)

℞. Sarsaparillae . . . uncias duas.
Chinae,
Dulcamarae,
singularum unciam unam.
Aquae . . . . . octarios tres.

Decoque ad tertiae partis consumptionem usque. (*Pie.*) — Gabe, ein Glas Morgens und Abends. — Man versetzt diese Tisane mit einem Drittheil Milch und versüßt sie mit Zucker.

℞. Sarsaparillae,
Dulcamarae,
singularum unciam unam.
Radicis Saponariae drachmas duas.
Aquae . . . . . vitra sex.

Coquendo tertia parte consumpta, adde

Lactis vaccini . . . vitra duo.

Misce bene. (*Sm.*) Täglich in sechs Gläsern zu nehmen.

℞. Sarsaparillae,
Chinae,
Guajaci, singularum semunciam.
Sassafras . . . drachmas duas.
Aquae . . . . . libras duas.

Coque. (*Ra.*)

So gebraucht, wie die vorigen.

Decoctum diaphoreticum incitans, Tisana sudorifica excitans. (*B.*)

℞. Radicis Sarsaparillae,
Ligni Guajaci,
singulorum drachmas tres.
Dulcamarae,
Foeniculi,
singulorum drachmas duas.
Aquae . . . quantum sufficit ut decocti libra una obtineatur. — Auf zwei oder mehrere Male zu nehmen.

Decoctum antisyphiliticum nutriens. (*B.*)

℞. Sarsaparillae . . unciam unam.
Lichenis Islandici abluti
sesquiunciam.
Aquae . . . quantum sufficit ut decocti unciae quatuordecim obtineantur. Colaturae adde
Syrupi Sacchari . unciam unam.

Auf zwei Mal, Morgens und Abends.

Decoctum Ichthyocollae compositum. (B*.)

℞. Radicis Sarsaparillae uncias tres.
Corticis Sassafras,
Ligni Sassafras,
singulorum unciam unam.
Aquae bullientis . libras novem.

Digere per horas duodecim, tunc coque et adde

Ichthyocollae . . . uncias tres, antea dissolutae in Aquae sufficiente quantitate, ut colatura sit unciarum octo.

Von Cimbke bei venerischen Krankheiten empfohlen. — Gabe, zwanzig bis fünfzig Unzen täglich.

Tisana Feltzii. (*Bo. Ca. Pie. Ra.*)

℞. Antimonii crudi in nodulo
uncias quatuor.
Aquae communis libras duodecim.
Sarsaparillae . . . uncias duas.
Chinae . . . . unciam unam.
Collae Piscium,
Corticis Buxi,
— Hederae,
singulorum sesquiunciam.

Decoque ad dimidii remanentiam, trajice per pannum, sepone, decantha et adde

Sublimati corrosivi . grana tria.

Dissolve. (*Bo. Ca. Pie.*)

Eine Formel von Baumé.

℞. Antimonii crudi pulverati in nodulo
uncias quatuor.

In ollam fictilem vitreatam immitte, ita ut fundum non attingat et infunde

Aquae . . . . . libras sex.

Coque per horas duodecim, tunc ad dimidii remanentiam et adde

Sarsaparillae . . . uncias tres.
Collae Piscium . . semunciam.

Ollam per horas viginti quatuor inter cineres calidos relinque et decoctum per linteum teneris texturae trajice. (*Ra.*)

Die letztere Formel wird heutzutage allein befolgt. Das Antimon ist unnöthig; wenn man es wegläßt, so wird die Tisane der vorigen ähnlich.

Wendet man durch Schwefelsäure gebleichten Fischleim an, so behält diese Substanz immer eine gewisse Menge Säure, welche auf die Schwefelbase wirkt und etwas rohes Spießglanz bildet. Daher die Koliken und das Erbrechen, welches diese Tisane bisweilen erregt. Chevallier und Idt schreiben jedoch diese Zufälle dem Arsenik zu, welches bisweilen in kleiner Quantität in der Schwefelbase enthalten ist und vom Wasser aufgelöst wird. Besser daher, man setzt den Spießglanz gar nicht zu, oder nimmt statt des Fischleims Arabisches Gummi, eine Unze auf anderthalb Pinten der eingekochten Tisane.

Tisana depurans de Vigarous. (*Bo. Pie.*)

℞. Sarsaparillae . . . uncias sex.
Foliorum Sennae mundatorum uncias tres.
Rasurae Ligni Guajaci,
— Sassafras,
Radicis Chinae,
— Iridis Florentinae,
Antimonii crudi,
Anisi viridis,
Cremoris Tartari,
Aristolochiae longae,
— rotundae,
Jalapae contusae,
Polypodii querni,
singulorum sesquiunciam.
Juglandium recentium cum putaminibus contusorum . no. 12.
Vini albi . . . octarios duos.

Infunde per horas viginti quatuor inter cineres calidos, tunc adde

Aquae fontanae . octarios sex.

Consume, modico calore, partem tertiam et per pannum cola.

Residuum cum Vini albi octariis duobus vel tribus et Aquae unciis sex vel septem pro tertia parte consumpta tisanam dilutiorem praebent.

Von der erstern Tisane nimmt man den Tag drei Gläser, die zweite dient zum gewöhnlichen Getränk.

Saint-Marie bereitet mit dieser Abkochung ein *Roob antisyphiliticum*, wozu folgendes die Formel ist:

℞. Tisanae de Vigarous octarium unum.
Sacchari libram unam ad duas.

Coque ad consistentiam roob.

Dieser Roob soll bei Syphilis gute Wirkung thun. — Gabe, ein Eßlöffel, täglich vier Mal. Nach jeder Gabe nimmt man ein großes Glas einer concentrirten Abkochung der Sarsaparille, und steigt damit, bis man täglich neun bis zehen Löffel Roob verbraucht.

Decoctum catholicum. (Sar.)

℞. Radicis Graminis sesquiunciam.
— Sarsaparillae unciam unam.
Foliorum Cichorii,
— Agrimoniae,
— Betonicae,
— Capilli Veneris Monspeliaci,
— Pimpinellae albae, singulorum manipulum dimidium.
— Sennae,
Cuscutae, singulorum semunciam.
Radicis Liquiritiae drachmas duas.
Seminum Anisi drachmam unam.
Aquae communis libras quatuor.

Coque sarsaparillam et radicem graminis in Aqua ad dimidii remanentiam adde liquiritiam et herbas, macera sennam, cuscutam et anisum per horas aliquot in Aquae bullientis unciis sex, cola et infusum cum decocto commisce.

Decoctum antivenereum laxans, Tisana antivenerea purgans, Decoctum Guajaci compositum et purgans. (Gal. *Ca. Sp.*)

℞. Radicis Sarsaparillae,
Rasurae Ligni Guajaci,
singularum unciam unam.
Subcarbonatis Potassae grana viginti quinque.
Aquae communis libras quatuor.

Macera per horas duodecim, subinde agitando, tunc ad libras tres coctione consume; infunde deinde in liquido per semihoram

Foliorum Sennae,
Rasurae Ligni Sassafras,
Liquiritiae,
singulorum drachmas duas.
Rhei,
Coriandri,
singulorum drachmam unam.

Cola leviter exprimendo et post refrigerationem decantha. (Gal. *Ca.*)

℞. Radicis Sarsaparillae,
— Chinae,
Rasurae Sassafras,
singularum uncias duas.
Antimonii crudi . unciam unam.
Aquae fontanae libras duas cum dimidia.

Decoque ad libras duas et adde

Radicis Polypodii . semunciam.
— Rhei . . . semidrachmam.
— Liquiritiae,
Foliorum Sennae mundatorum,
Ligni Sassafras,
singulorum drachmam unam.
Subcarbonatis Potassae
grana quatuor.
Coriandri . . . semidrachmam.
Post horas duodecim infusionis bis bulliant et colentur. (*Sp.*)

Den Tag über zu trinken.

Tisana de Vinache. (*Ca.*)

℞. Antimonii crudi in nodulo
uncias duas.
Sarsaparillae,
Chinae,
Ligni Guajaci,
singulorum sesquiunciam.
Aquae . . . . . octarios tres.
Decoque ad octarium unum et adde
Sassafras,
Sennae, singulorum semunciam.
Post sufficientem infusionem cola, sepone et decantha. — In venerischen und Hautkrankheiten gebraucht. — Gabe, mehrere Gläser täglich.

Tisana de Jausserand. (*Bo.*)

℞. Radicis Sarsaparillae,
— Chinae,
Sulphureti Antimonii in nodulo,
singulorum uncias duas.
Salis Tartari . drachmam unam.
Foliorum Sennae,
Ligni Sassafras,
singulorum unciam unam.
Rhei,
Corticis Chinae contusi,
singulorum semunciam.
Aquae . . . quantum sufficit.
Coque per horas octo, ignis exigui ope, in vase tecto, ad octariorum sex liquidi remanentiam, tunc per idem tempus infunde et cola. — Besonders bei Scropheln empfohlen. — Gabe, täglich drei Gläser.

Tisana sudorifica Astruc. (*Pie.*)

℞. Sarsaparillae,
Sassafras, singulorum uncias duas.
Guajaci,
Chinae, singulorum sesquiunciam.
Antimonii crudi in nodulo
drachmas duas.
Aquae . . . libras duodecim.
Infunde calide per horas duodecim, tunc lente coque, sub finem addendo
Foliorum Sennae . semunciam.
Radicis Liquiritiae sesquiunciam.

Decoctum antiarthriticum. (*Ca.*)

℞. Sarsaparillae . uncias quatuor.
Antimonii crudi in nodulo
uncias sex.
Aquae . . . . . libras duas.
Decoque ad dimidium; in reliquis infunde
Radicis Liquiritiae unciam unam.
Seminum Anisi . drachmas duas.

Von Quarin empfohlen. — Glasweise zu nehmen.

Decoctum Lusitanicum s. antivenereum Ulyssiponense s. Sarsaparillae compositum s. cum Mezereo. (Am. B*. Du. GalF. Lon. LonN. Lus. Suec. *C. Sp. Sw. Sy.*)

℞. Ligni Santali rubri,
— — albi,
— Guajaci,
— Rhodii,
Sassafras,
singulorum unciam unam.
Sarsaparillae . . . uncias tres.
Sulphureti Antimonii in nodulo
uncias duas.
Corticis Mezerei . semunciam.
Aquae bullientis . libras decem.
Infunde et coque deinde ad dimidii consumptionem, sub finem addendo
Liquiritiae rasae . semunciam.
Cola. (B*. GalF. *Sp.*)

℞. Sarsaparillae,
Ligni Sassafras,
— Santali rubri,
— Guajaci,
singulorum uncias tres.
Corticis Mezerei unciam unam.
Coriandri drachmas sex ad unciam unam.
Aquae fontanae . libras viginti.
Decoque ad dimidii remanentiam. (*Sy.*)

℞. Sarsaparillae . . . uncias sex.
Sassafras,
Guajaci, singulorum unciam unam.
Aquae . . . . libras decem.
Macera, blando calore, per horas sex, tunc ad dimidium decoque et sub finem adde
Liquiritiae rasae unciam unam.
Corticis Mezerei drachmas tres.
Cola. (*Sw.*)

Lon. LonN. Decocti Sarsaparillae ferventis octarios quatuor, Sassafras, Guajaci, Liquiritiae, singulorum unciam unam, Mezerei drachmas tres. Decoque per horae quadrantem et cola.

℞. Radicis Sarsaparillae uncias tres.
Corticis Mezerei drachmas duas.
Aquae fontanae . . libras tres.
Decoque ad libras duas et in fine adde
Liquiritiae rasae sesquiunciam.
Cola liquidi libras duas. (B*. *Sy.*)

In venerischen und Mercurialkrankheiten empfohlen. — Gabe, fünfzehen bis fünfzig Unzen täglich, allmälig gestiegen. — Die letztere Formel ist von Girtanner und den übrigen vorzuziehen.

Tisana antivenerea. (*Sm.*)

℞. Sarsaparillae concisae uncias duas.
Corticis Mezerei semidrachmam.
Aquae fontanae sesquioctarium.

Decoque ad octarium unum et colaturae adde Liquoris Swietenii cochlear majus. — In einem Tage zu verbrauchen. — Plenck rühmte sie sehr.

Tisana s. Ptisana Callaci, Decoctum Sarsaparillae ex Callac. (B*. His.)

℞. Sarsaparillae . . uncias duas.
Mercurii dulcis in nodulo drachmas duas.
Aquae . . . libras quindecim.

Decoque ad consumptionem tertiae partis, adde deinde

Foliorum Sennae mundatorum unciam unam.
Seminum Coriandri drachmas sex.
Aluminis . . . semidrachmam.

Coque denuo per horae quadrantem et ante perfectam refrigerationem cola. (His.)

B*. Coriandri drachmas duas.

Ehedem bei venerischen Krankheiten gebraucht. — Gabe, sechs Unzen zwei oder drei Mal täglich, einen Monat oder sechs Wochen lang.

Decoctum antivenereum Passerini vel Salvadorii. (*Fi. T.*)

℞. Sarsaparillae . . . uncias duas.
Fumariae,
Florum Cyani, singulorum drachmas duas.
Foliorum Sennae drachmas tres.
Aristolochiae rotundae semunciam.
Radicis Scolymi drachmas duas.

Coque in

Aquae pluvialis . . . libris sex addendo

Mercurii dulcis
Aluminis usti, singulorum drachmam unam.

Decoque ad librarum trium remanentiam, cola per linteum fortiter exprimendo.

Fi. Sarsaparillae uncias octo, Aristolochiae duas, Scolymi unam, Aquae libras viginti, decoque ad duarum partium remanentiam, adde Sennae sesquiunciam, Fumariae et Cyani, singularum unciam unam. Decoque ad libras duodecim, adde Mercurii dulcis, Aluminis usti, singulorum semunciam, mixta per duas horas igne blandissimo digere, cola fortiter exprimendo per pannum, ita ut librae decem remaneant.

Tisana sudorifica et purgans (*Sm.*)

℞. Sarsaparillae. . uncias quatuor.
Aquae purae' . . octavias tres.

Coque per horas tres igne perexiguo et sub finem adde

Sennae mundatae,
Salis Epsomensis, singulorum sesquiunciam
Liquiritiae contusae drachmas quatuor.

Post horas viginti quatuor cola. — Gabe, sechs Unzen drei Mal täglich, drei Wochen oder einen Monat lang. — Soll bei chronischem Rheumatismus sehr nützlich seyn. — Sie ist von Rost.

Decoctum Zittmanni. (B*. Bor4.)

℞. Sarsaparillae . uncias duodecim.
Aquae fontanae libras nonaginta (mensuras viginti quatuor Bor4.).

Digere per horas viginti quatuor, immitte deinde liquido in sacculum inclusa

Pulveris styptici (Ed.) (Sacchari aluminati Bor4.) sesquiunciam.
Mercurii dulcis . . semunciam.
Cinnabaris (Antimonii sublimati) drachmam unam.

Decoque ad libras triginta (mensuras octo) et sub finem adde

Seminum Anisi,
— Foenicul, singulorum semunciam.
Foliorum Sennae . uncias tres.
Radicis Liquiritiae sesquiunciam.

Liquor, nomen *Decoctum fortius* gerens, seponatur; residuo adde

Sarsaparillae . . . uncias sex.
Aquae libras nonaginta (mensuras viginti quatuor).

Coque (ad mensurarum octo remanentiam), sub finem addendo

Corticis Citri,
Cinnamomi (Cassiae cinnamomeae),
Cardamomi minoris,
Liquiritiae, singulorum drachmas tres.

Cola et liquorem, *Decoctum tenue s. debile s. mitius* nomen gerentem, sepone.

Ehedem rühmte dieses Präparat bei venerischen Krankheiten.

Roob antisyphiliticum. (*T. Vm.*)

℞. Sarsaparillae . partes quindecim.
Aquae . . partes centum viginti.

Coque ternis vicibus, singula quaque ad dimidii remanentiam; colaturas tres clarificatas ad octodecim partes redige et infunde in

Foliorum Sennae,
Florum Boraginis,
— Rosae moschatae,
Seminum Cumini, singulorum partem unam.

Cola et sepone, tunc decanthatis adde

Sacchari albi partes quindecim.
Solve leni calore et in refrigerationis momento adde
Mellis albi . partes quindecim.
℞. Sarsaparillae . . . libras tres.
Sassafras,
Rasurae Ligni Guajaci,
singulorum libras duas.
Chinae flavae . libram unam.
Aquae . . libras quinquaginta.
Decoque per horam circiter unam, filtra et decoctionem cum residuo quater vel quinquies repete, commisce liquores et in iis solve
Sacchari alb.,
Mellis optimi,
singulorum libras quindecim.
Despuma, filtra per linteum et sufficienter evaporata in urceolum effunde, continentem sacculos duos, cujus alter Anisi uncias quatuor alter Florum siccorum Boraginis tantidem continet, exprime sacculos ante refrigerationem, misce et syrupum para. (T.) — Hat viel Aehnlichkeit mit dem syrupus Cuisinieri.

Syrupus Sarsaparillae et Guajaci. (Am. C.)

℞. Sarsaparillae concisae,
Guajaci raspati,
singulorum libram unam.
Aquae . . . . octarios decem.
Coque per horam unam et exprime; residuum denuo coquatur cum
Aquae . . . . octariis decem per horas duas, sub finem addendo
Petalorum Rosarum,
Gummi Arabici,
Foliorum Sennae,
singulorum unciam unam.
Zingiberis . . . . semunciam.
Cola et adde
Mellis despumati,
Sacchari, singulorum libras tres.
Fiat syrupus. — Unterſcheidet ſich von dem folgenden Syrup nur durch den Namen.

Hierher gehört auch der

Syrupus Stevensii. (B*.)

℞. Sarsaparillae,
Ligni Guajaci,
singulorum libram unam.
Petalorum Rosarum rubrarum
unciam unam.
Aquae . . . quantum sufficit.
Coque per horam unam et liquorem decantha; residuum cum Aquae aequali quantitate per horas duas coquatur, sub finem additis
Gummi Arabici,
Foliorum Sennae,
singulorum uncia una.
Zingiberis . . . . semuncia.
Decoctis ambobus conjunctis adde
Mellis,
Sacchari, singulorum libras tres et syrupum para.
℞. Sarsaparillae,
Guajaci, singulorum libram unam.
Aquae . . . libras duodecim.
Mellis albi,
Sacchari crudi (cassonade),
singulorum sesquilibram.

Syrupus de Sarsaparilla compositus s. de Sarsaparilla et Senna compositus s. sudorificus s. Cuisinieri s. Smilacis Sarsaparillae s. depurans. (Am. An. B*. Gal. GalM. *C. Ca. Sw. T.*)

℞. Sarsaparillae . . . libras duas.
Aquae tepidae libras duodecim.
Infunde per horas viginti quatuor, tunc coque per horae quadrantem et cola exprimendo; residuum coquatur cum
Aquae communis . libris decem et ad sex consumatur. Qua operatione bis vel ter repetita, decocta commisce et leviter coque cum
Florum Boraginis,
— Rosarum albarum,
Foliorum Sennae,
Seminum Anisi,
singulorum unciis duabus.
Decoque ad dimidium, cola et colaturae adde
Mellis albi,
Sacchari albi,
singulorum libras duas.
Coque ad syrupi spissi consistentiam. (B*. Gal. *Ca.*)

GalH. Sarsaparillam diu maceratam leviter coquere, et Flores, Sennam Anisumque vel seorsim, vel in producto prioris operationis infundere jubet.

GalM. eundem agendi modum indicat ut Gal., sed loco florum boraginis et rosarum Folia Boraginis adhibendo; — Am. et *C.* loco florum boraginis eandem quantitatem Liquiritiae, Rosas tamen adhibet; — *Sw.* binis vicibus sequentibus coquere jubet Sarsaparillae libras duas in Aquae libris novem ad trium remanentiam, in ambobus decoctis conjunctis infundere Sennae sesquiunciam, Florum Boraginis, Rosarum moschatarum et Cumini, singulorum tantidem, colare et cum Sacchari, Mellisque boni, singulorum libris duabus syrupum parare et clarificare; — An. Infundere Sarsaparillae libras duas cum dimidia in Aquae fervidae libris viginti quatuor per horas viginti quatuor, tunc coquere ad colaturam librarum octo, operationem binis vicibus

sequentibus cum faecibus repetere, decocti hoc modo parati libras viginti quatuor evaporando ad dimidium redigere, sub finem addendo Florum Boraginis, Rosarum rubrarum, Sennae, Anisi, singulorum uncias duas et colaturâ lente vaporatâ, cum Sacchari et Mellis despumati, singulorum libris duabus syrupum parare.

Pelletan pluribus vicibus sequentibus coquere jubet Sarsaparillae libras duas in Aquae sufficiente quantitate ad duarum liquoris librarum remanentiam, tunc coquere Sennae uncias duas in Aquae libris duabus per horae quadrantem, liquores commiscere et in illis infundere Florum Boraginis, Buglossi, Rosarum albarum, Anisi, singulorum uncias duas, colare, addere Mellis et Sacchari albi, singulorum libras duas, clarificare et denique ad syrupi consistentiam coquere.

℞. Sarsaparillae concisae
libras viginti quatuor.
Aquae bullientis
libras centum et septuaginta.
Infunde per horas duodecim vel quindecim, tum coque per duas, addendo, horae quadrantem antequam ab igne removeatur
Foliorum Sennae
libram unam et uncias octo.
Cola; residuo infunde
Aquae bullientis libras quindecim.
Colaturae expressae adde
Mellis albi . . libras octodecim.
Sacchari crudi . libras triginta.
Clarifica albuminis ope, infunde supra
Cumini contusi
libram unam et uncias octo.
Coque ad consistentiam syrupi et adhuc bullienti adde
Extracti Boraginis libras quatuor.

Kürzer ist Keraudren's Formel:

℞. Syrupi Sarsaparillae vel Boraginis libras duodecim.
— Sennae . . uncias octo.
Calefac in balneo aquae et adde
Extracti Boraginis libram unam.
Roob Sambuci . . uncias tres.
Commisce ad perfectam usque solutionem et cola.

Noch kürzer ist folgende Formel von Lagneau:

℞. Syrupi Sarsaparillae libras quatuor.
Syrupi Sennae . . uncias tres.
Calefac et adde
Extracti Boraginis uncias quinque
Roob Sambuci . unciam unam.

Syrupus Sarsaparillae vinosus. (*Bo. Pie.*)

℞. Radicis Sarsaparillae sesquilibram.
— Aristolochiae rotundae,
Radicis Aristolochiae longae,
— Jalapae,
— Polypodii,
— Chinae,
Ligni Guajaci,
— Sassafras,
Cremoris Tartari,
Sulphureti Antimonii in nodulo,
Anisi viridis, singulorum uncias sex.
Foliorum Sennae uncias duodecim.
Vini albi . octarios duodecim.
Macera per horas sex in vase tecto; adde deinde
Aquae . . octarios quindecim.
Coque blando igne per horam unam, defunde et faecibus infunde
Vini albi . . . octarios sex.
Macera per horas tres, cola deinde
Aquae . . . . . octarios octo.
Coque per semihoram, defunde, liquores ambos commisce, sepone et decanthatis adde
Sacchari liquidi (melassen),
Sacchari crudi rubri,
singulorum libras novem.
Coque absque clarificando ad syrupi consistentiam.

Sassafras.

Laurus Sassafras, *L.*; Fenchelholz, Sassafras; Sassafras (*Gal.*); Sasafras (*Ar.*); Cay-vang-di (*Ce.*).

Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HasP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pal. R. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *Be. Br. C. Fi. G. M. Par. Sp.* Z.

Ein Baum (Enneandria Monogynia, L. Laurineae, *J.*) des südlichen America's. (*Blackw.* t. 267. *Plenck* t. 316. *Mich.* Arb. for. de l'Am. III. t. 7. *Big.* Am. med. Bot. t. 35. *Bert.* Bild. III. 29. fig. 1. Fl. méd. VI. 312.)

Das Holz (lignum Sassafras) ist leicht, von schwammigem Gefüge, brüchig, stahlgrau, geruchlos und von einem sehr schwachen Geschmack; das der Wurzel welches zum Theil noch mit der Rinde bedeckt, zum Theil davon entblößt ist, ist gelb oder fahlbräunlich, röthlich, von süßlichem, gewürzhaftem, etwas scharfem Geschmack und fenchelartigem Geruch.

Die Rinde (cortex ligni Sassafras) ist sehr dick, leicht, mürbe, runzlig, graulichbraunroth, innen rostbraun; hat einen angenehmen, fenchelartigen Geruch und einen gewürzhaften, etwas scharfen Geschmack.

Reizend, schweiß- und harntreibend, bei Gicht, Rheumatismen und venerischen Krankheiten angewendet. — Gabe des Pulvers, eine halbe bis eine Drachme.

Extractum Ligni Sassafras s. Sassafras. (Wir.)

℞. Rasurae Ligni Sassafras libram unam.
Alcoholis libras quinque ad sex.

Post sufficientem extractionem cola exprimendo, digere, tunc residuum paumper cum Aquae libris tribus coque, clarifica decoctum albuminis ope et alcohole destillatione separato, reliqua ad extracti consistentiam evaporent. — Gabe, von einem Scrupel bis zur Drachme.

Infusum Ligni Sassafras s. Sassafras. (B*. GalM. T.)

℞. Rasurae Ligni Sassafras semunciam.
Aquae bullientis . libram unam.

Infunde per horas sex et cola. (B*.) GalM. Sassafras unciam unam et Aquae bullientis quantum sati, ut post horas quatuor infusionis colaturae semilibra obtineatur; — T. Sassafras drachmam unam, Aquae bullientis libram unam.

Aqua Calcis composita, Aqua benedicta s. benedicta composita. (Br. Du. Lus. *Bo. Pie. Sp. Vm.*)

℞. Ligni Sassafras . . semunciam.
— Guajaci . . . semilibram.
Liquiritiae . . . unciam unam.
Coriandri . . . drachmas tres.
Aquae Calcis . . . octarios sex.

Post duos dies digestionis cola. (Br. Du. *Sp.*)

℞. Ligni Sassafras . . uncias duas.
Nucis moschatae drachmas tres.
Liquiritiae . . . unciam unam.
Aquae Calcis . . libras quatuor.

Macera per horas viginti quatuor et cola. (Lus.)

Vm. Sassafras uncias duas, Nucis moschatae drachmas tres, Liquiritiae unciam unam, Aquae Calcis uncias triginta sex et tres dies infusionis.

℞. Sassafras . . . . semunciam.
Liquiritiae . . unciam unam.
Aquae Calcis . . . libras sex.

Infunde per duos dies et cola. (*Pie.*)

℞. Radicis Althaeae,
— Saponariae,
singularum unciam unam.
— Sarsaparillae,
Ligni Sassafras, singulorum drachmas quatuor.
Aquae Calcis . . libras quatuor.

Post duos dies macerationis adde
Syrupi Quinque Radicum aperientium . . . . . uncias duas.
Misce. (*Bo.*)

Bei scrophulösen Krankheiten. — Gabe, täglich mehrere Tassen.

Syrupus e Cortibus s. Cortice Ligni Sassafras s. Sassafras. (Wir.)

℞. Corticis Ligni Sassafras uncias tres.
Vini albi . . uncias viginti duas.

Infunde et colaturae adde
Sacchari . uncias triginta duas.

Tinctura s. Essentia Ligni Sassafras. (Br. Wir. *Sw.*)

℞. Rasurae Ligni Sassafras uncias duas.
Aquae Vitae . uncias duodecim.

Digere per tres dies et filtra. (*Sw.*) Br. et Wir. Sassafras sesquiunciam. Alcoholis uncias octo et octo (tres) dies digestionis s. macerationis.

Reizend, ehedem als Mittel gegen Catarrh und als blutreinigend, jetzt besonders als schweiß- und harntreibend betrachtet und vorzüglich bei chronischen Rheumatismen angewendet. — Gabe, eine Drachme täglich vier Mal, in Sassafrasthee.

Essentia s. Tinctura Sassafras s. Ligni Sassafras composita. (Wir.)

℞. Corticis Ligni Sassafras uncias quatuor.
Foliorum Salviae . uncias duas.
Nucis moschatae . unciam unam.
Cinnamomi . . . semunciam.
Anisi stellati . . drachmas tres.
Alcoholis . . . . libras duas.

Post tres dies digestionis cola exprimendo et filtra. — Reizend, bei Catarrhalbeschwerden, Gicht, Krankheiten von Luftansammlung, manchen Arten von Krätze ꝛc. — Gabe, funfzig bis achtzig Tropfen.

Oleum Ligni Sassafras aethereum, Aethereoleum Sassafras Ligni. (Am. Ams. Du. Ed. Fer. Ful. Gal. Han. Hass. HassP. Li. Pal. Sar. Wir. Würr. *C. Fi. Pid. Sw. T.*)

℞. Ligni Sassafras . . quantum vis.
Aquae . . . . quantum sufficit.

Destillent. (Am. Ams. Du. Ed. *C.*) Ful. Würr. et *Sw.* Ligni partem unam et quatuor Aquae; — Pal. Ligni unam et sex Aquae; — Han. Ligni unam et octo Aquae; — *T.* Ligni partem unam quatuor Aquae, unum diem macerationis, destillationem dimidiae partis, cohobationem et separationem olei.

℞. Ligni Sassafras . partes decem.
Aquae . . . . partes viginti.
Salis culinaris . . partem unam.

Post horas duodecim destillent et oleum fundum petens colligatur (Gal.). Sar. Ligni partes tres, Aquae viginti quatuor et unam Salis; — Hass. Wir. et *Pid.* Ligni sex, Aquae triginta et Salis tres; — *Fi.* Salis unam cum dimi-

dia, caeterum ut Fer.; — Hass. Ligni, Salis, singulorum libras duas, Aquae sedecim et repetitionem operationis cum Aqua stillatitia etc.

℞. Ligni Sassafras . . libras duas.
Alcoholis . . . . uncias octo.
Post duos dies adde
Aquae . . . . libras duodecim.
Salis culinaris . libram unam.
Destillent. (Li.)

Gabe, zwei bis acht Tropfen.

Oleosaccharum s. Elaeosaccharum Sassafras. (B*.)

℞. Olei essentialis Sassafras guttas decem.
Sacchari albi . . drachmas tres.
Contere.

Aqua Ligni Sassafras s. Sassafras. (Gal. Sar. Fi.)

℞. Ligni Sassafras . partem unam.
Aquae . . . . . partes octo.
Post horas duodecim destillent partes quatuor. (Gal.)

Sar. Ligni partem unam, Aquae sex et Salis parvam quantitatem; — Fi. Ligni uncias sex, Aquae libras quatuor cum dimidia, destillent in balneo aquae calido librae tres.

Gabe, eine bis vier Unzen.

Aqua Ligni Sassafras s. Sassafras composita. (Wir.)

℞. Ligni Sassafras . . semilibram.
Cinnamomi . . . . uncias tres.
Vini generosi . . libras decem.
Post aliquot dies digestionis destillet sesquilibra.

Satureja.

In den Pharmacopöen werden drei Arten dieser Pflanzengattung angezeigt:

1) *Satureja hortensis, L.*; Gartensaturei, gemeines Pfefferkraut; Sarriette des jardins (*Gal.*); Savory (*Ang.*); Satureye (*B.*); Saer (*D.*); Ajedrea (*His.*); Keulen (*Bel.*); Santoreggia (*I.*); Ozabr (*Pol.*); Segurelha (*Lus.*); Kyndel (*Suec.*).

A. Ams. B. Br. Fer. Gal. His. Wir. Würt. *Fr. Fi. G. M. Pid. Sp. Z.*

☉ (Didynamia Gymnospermia, L.; Labiatae, J.) Eine Südeuropäische Pflanze. (*Blackw.* t. 419. *Plenck* t. 486. *Hayne* VI. t. 9. *Zorn* Ic. pl. t. 216.)

Das Kraut (herba Saturejae s. Cunilae sativae) besteht aus einem sehr ästigen, vierkantigen, dünnen Stängel mit gegenüberstehenden, sitzenden, einfachen, lanzettigen, linienförmigen Blättern. Es hat einen angenehmen, stark gewürzhaften Geruch und einen etwas scharfen, brennenden und gewürzhaften Geschmack.

Reizend.

2) *Satureja capitata, L.*; kopfförmige Saturei; Thym de Crète (*Gal.*).

Br. Gal His. Wir. *Be. Sp.*

♄ Eine Pflanze des südlichen und östlichen Europa's.

Man wendet das blühende Kraut (herba et spicae Thymi Cretici) an; es besteht aus einem dünnen Stängel mit kleinen, schmalen, entgegengesetzten, gekielten, punctirten Blättern und weißen, eine endständige Aehre bildenden Blüthen. Es hat einen starken und angenehmen Geruch und einen brennenden und gewürzhaften Geschmack.

Reizend.

3) *Satureja Thymbra, L.*; Cretische Saturei; Sarriette de Crète (*Gal.*).

Gal. His.

☉ Eine auf Creta wachsende Pflanze. Das Kraut hat kleine, eirunde und spitzige Blätter.

Oleum Saturejae aethereum. Aethereoleum Saturejae. (Pal.)

℞. Herbae florescentis Saturejae partes viginti quinque.
Aquae partes septuaginta quinque.
Salis culinaris . . . partes tres.
Post tres dies digestionis destillent.

Saxifraga.

Saxifraga granulata, L.; weißer Steinbrech, Hundsrebe, Kellhaut; Saxifrage blanche (*Gal.*); Common saxifrage (*Ang.*); Huid steenbraek (*D.*); Witte steenbreek (*Bel.*); Saxifraga branca (*Lus.*); Steenbraecke (*Suec.*).

Br. Gal. His. Wir. *Be. M. Sp.*

♃ (Hexandria Digynia, L.; Saxifrageae, J.) Eine in ganz Europa verbreitete Pflanze. (*Blackw.* t. 214. *Plenck* t. 345. *Hayne* III. t. 23. *Zorn* Ic. pl. t. 309.)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an.

Die Wurzel (radix Saxifragae albae) besteht aus kleinen rundlichen Körnchen von der Größe der Coriandersaamen, welche unter einander mittelst Fasern vereinigt und mit einem rothen Fellchen bedeckt sind, welche man ehedem mit dem unpassenden Namen semen Saxifragae albae belegte. Sie hat einen etwas styptischen und bittern Geschmack, welcher sich beim Trocknen verliert.

Das Kraut besteht aus einem ästigen Stängel mit nierförmigen, lappigen Blättern. Es hat einen scharfen, etwas sauern Geschmack, von welchem nach dem Trocknen fast keine Spur zurückbleibt.

Scabiosa.

Zwei Arten dieser Pflanzengattung werden in den Pharmacopöen angeführt:

1) *Scabiosa succisa, L.*; Teufelsabbiß; Mors du diable (*Gal.*); Devilsbitt (*Ang.*); Gaeatkins (*D.*); Djewelabid (*D.*); Mordisca de diabolo (*His.*); Duivelsbeet (*Bel.*); Morso del diavolo (*I.*); Cisyna (*Pol.*); Morso de diabo (*Lus.*); Engvaedd (*Suec.*).

An. Br. Gal. Wir. *Be. M. Sp.* Z.

♃ (Tetrandria Monogynia, L.; Dipsaceae, *J.*) Eine in Europa gemeine Pflanze. (*Hayne* V. t. 37. Dies. off. Pfl. VII. t. 20 *Zorn* Ic. pl. t. 140.)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an.

Die Wurzel (radix Succisae s. Morsus Diaboli) ist kurz, faserig, außen gelblich, inwendig weißlich und in der Mitte wie benagt, indem sie am Ende jedes Jahres zum großen Theil abstirbt.

Das Kraut besteht aus einem einfachen, runden, behaarten, ästigen Stängel mit gegenüberstehenden Zweigen, welche an jedem Gelenke zwei kleine entgegengesetzte, lanzettförmige, ganze Blätter tragen. Es hat einen kaum merklichen Geruch und einen bitterlichen, süßen, styptischen Geschmack.

Schwach adstringirend, aber wenig gebraucht.

2) *Scabiosa arvensis, L.*; Ackerscabiose; Scabieuse des champs (*Gal.*); Field scabious (*An.*); Kawias (*B.*); Scaburt (*D.*); Escabiosa (*His.*); Gemeen scharfkruid (*Bel.*); Scabiosa (*I.*); Dryakiew polne (*Pol.*); Escabiosa dos campos (*Lus.*); Akervaedd (*Suec.*).

A. Ams. Br. Fer. Gal. His. Wir. Würt. *Be. Br. M. Sp.* Z.

♃ (Tetrandria Monogynia, L.; Dipsaceae, *J.*) Eine in Europa gemeine Pflanze. (Fl. Dan. t. 447. *Blackw.* t. 185. *Schk.* t. 22. *Hayne* V. t. 38. *Zorn* Ic. pl. t. 141.)

Man wendet die Wurzel, das Kraut und die Blüthen an.

Die Wurzel ist lang, dünn, weiß und hat keinen merklichen Geruch und einen bittern, styptischen Geschmack.

Das Kraut besteht aus einem runden, behaarten, hohlen Stängel und eirundlanzettigen, gezähnten untern und wie gefiederten obern Blättern.

Die Blüthen sind blaßpurpurroth.

Aqua Scabiosae. (Pul.)

℞. Herbae Scabiosae partem unam.
Aquae . . . . . partes tres.
Destillet dimidia pars.

Scammonium.

Diacrydium; Σκαμμωνία; Scammonium, purgirendes Windensaft; Scammonée (*Gal.*); Scammony (*Ang.*); Skammonia (*B.*); Sukmunia (*Ar. Duk.*); Skammonium (*D. Suec.*); Escamonea (*His. Lus.*); Mehmudeh (*Hin.*); Scammoneum (*Bel.*); Seamonea (*I.*); Skammonia, Sok suznikowy (*Pol.*).

Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bort. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Gal. GalM. Han. HastP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Würt. *A. Be. Br. C. Fi. G. M. Par. Pid Sa. Sp. T.* Z.

Ein Gummiharz, von welchem man drei Sorten unterscheidet:

1) *Scammónium de Aleppo s. Aleppense s. Halepense s. Syriacum*, Scammonium von Aleppo, Scammonée d'Alep (*Gal.*), in regelmäßigen, aschgrauen, leichten, trocknen, sehr zerreiblichen Massen. Der Bruch ist glänzend, das Pulver bräunlichweiß, der Geruch stechend und etwas widerlich, der Geschmack scharf und bitter.

Es ist der getrocknete Milchsaft von Convolvulus Scammonia, L., ♃ (Pentandria Monogynia, L.; Convolvulaceae, *J.*), einer Pflanze Syrien's. (*Plenck* t. 92. *Mill.* Dict. t. 102. *Zorn* Ic. pl. t. 214.)

2) *Scammonium Smyrnaeum*, Scammonium von Smyrna, Smyrnisches oder Antiochisches Scammonium; Scammonée de Smyrne (*Gal.*) ist schwerer, dichter, weniger zerreiblich, dunkler, von unangenehmerm Geruch und nicht so geschätzt wie das vorige.

Es kommt von Periploca Secamone, L. ♄ (Pentandria Monogynia, L.; Apocyneae, *J.*), einer Pflanze Aegypten's (*Alp.* de pl. Aeg. t. 48.) — *Sibthorp* leitet es von Cynanchum monspeliacum her.

3) *Scammonium Monspeliacum*; Scammonium von Montpellier; Scammonée de Montpellier (*Gal.*), ist ganz schwarz, sehr hart und derb.

Es kommt von Cynanchum Monspeliacum, L., einem Strauche (Pentandria Monogynia, L.; Apocyneae, *J.*) des südlichen Frankreich's und Spanien's (*Sibthorp* Fl. graec. t. 251. *Jacq.* Coll. II. t. 340. *Cavan.* Ic. rar. I. t. 60.)

Ein drastisches Purgirmittel. — Gabe des Pulvers, drei bis funfzehn Gran.

Diacrydium sulphuratum. (Pal. Sax. Wir. *T.*)

℞. Scammonii pulverati quantum vis.

Supra chartam albam sparsum supra cratem, cui carbo vivus est subditus, in quem sulphuris uncia successive injiciatur, suffumigetur, agitando donec resina liquefieri et chartae adhaerere incipiat.

Diacrydium glycyrrhizatum s. Liquiritia edulcoratum. (Sar. Wir.)

℞. Scammonii . . . semilibram.
Decocti Liquiritiae libram unam.
Contere, sepone, liquorem vaporando ad siccum redige et residuum pulvera.

Diacrydium rosatum obtines, si loco decocti liquiritiae infusum Rosarum; *Diacrydium cydoniatum*, si loco infusi Succum Cydoniorum depuratum adhibes.

Resina Scammonii. (Ams. An. Br. Ful. Gal. Pal. R. Sax. Wir. *Br. T.*)

℞. Scammonii pulverati partem unam.
Alcoholis (0,907) . . partes sex.
Dissolve, filtra liquorem et destillando dimidium abstrahe; resinam e residuo Aquae ope praecipitatam bene ablue et blandissimi caloris ope sicca. (Ams. An. Br. Gal. R. Sax. Wir. *Br.*)

Pal. tincturam destillando ad perfectam siccitatem redigere, et residuum siccatum pulverare jubet; — *T.* Scammonii uncias sex cum Alcoholis diluti 25° B. per plures vices calide digerere, liquoribus commixtis destillatione ad dimidium redigere et residuum ad extracti consistentiam evaporatum in rotulas formare, quae super charta uncta aëris vel vaporatorii ope siccentur.

Gabe, drei bis zehen Gran.

Pulvis Scammonii s. Scammoneae compositus s. catholicus s. caryocostinus s. diacarthami s. purgans, Species caryocostinae. (Am. An. Ed. Fer. His. Lon. LonN. Lus. Sar. *C. Vm.*)

℞. Scammonii,
Cremoris Tartari,
singulorum partes aequales.
Misce triturando. (Am. Ed. Lus. *C.*)

Fer. Scammonii, Tartari, Sacchari, singulorum grana octo.

℞. Scammonii,
Extracti Jalapae sicci,
singulorum partes quatuor,
Zingiberis . . . partem unam.
Fiat pulvis. (Lon. LonN.)

℞. Scammonii . . . . . semunciam.
Radicis Mechoacannae,
— Jalapae,
singularum drachmas sex.
Cremoris Tartari drachmas tres.
Misce. (His.)

℞. Scammonii,
Hermodactylorum,
singulorum uncias duas.
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Zingiberis,
singulorum unciam unam.
Fiat pulvis. (An.)

℞. Cinnamomi,
Costi Arabici,
Zingiberis,
singulorum partem unam.
Hermodactylorum,
Scammonii,
singulorum partes duas.
Fiat pulvis. (*Vm.*)

℞. Seminum Carthami drachmas sex.
Gummi Tragacanthae,
Hermodactylorum,
Scammonii,
singulorum semunciam.
Cinnamomi,
Liquiritiae,
singulorum drachmas duas.
Turbith . . . unciam unam.
Fiat pulvis. (Sar.)

Dieses Pulver hat Aehnlichkeit mit dem pulvis cornachini. — Gabe, zehen bis fünfzehn Gran.

Pulvis antarthriticus s. antarthriticus purgans. (*Ca. Sp.*)

℞. Seminum Cardui Benedicti,
— Carthami,
Scammonii,
Radicis Sarsaparillae,
— Chinae,
Ligni Guajaci,
singulorum semunciam,
Cremoris Tartari,
Foliorum Sennae,
singulorum unciam unam.
Cinnamomi . . drachmas duas.
Fiat pulvis. (*Sp.*)

Ca. Seminum, singulorum drachmas decem, Salis et Sennae, singulorum semunciam, Scammonii, Sarsaparillae, Chinae et Guajaci, singulorum drachmas duas et Cinnamomi drachmam unam.

Pilulae resolventes. (*Ca.*)

℞. Extracti Gentianae semunciam.
Fellis Tauri . . drachmas tres.
Scammonii . . drachmas duas.
Fiant pilulae centum sexaginta duae.
— Gabe, vier bis sechs Stück täglich, nüchtern oder vor dem Mittagessen.

Pilulae Extracti catholici s. purgantes. (Ams.)

℞. Extracti Aloës gummosi
unciam unam.
— Hellebori nigri
drachmas duas.
— Colocynthidis
drachmam unam.
Scammonii . . drachmas tres.
Fiat massa pilularis.

Tabellae diacarthami s. Scammonii et Sennae purgantes s. purgantes compositae. (Gal. Sar. *Pie. T.*)

℞. Pulveris Diacarthami (Sar.)
uncias tres.

Sacchari pulverati libram unam.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae quantum sufficit.
Fiant tabellae. (Sar.)

℞. Cremoris Tartari . semunciam.
Scammonii . . drachmas tres.
Sacchari albi . . uncias octo.
Olei essentialis Cinnamomi guttas quatuor.
Aquae Rosarum quantum sufficit.
Fiant tabellae drachmae unius. (*Pie.*)

℞. Scammonii . . drachmas tres.
Foliorum Sennae drachmas quatuor cum dimidia.
Rhei . . . . sesquidrachmam.
Corticis Citri conditi unciam unam.
Sacchari . uncias sex et drachmas sex.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae cum Aqua Cinnamomi paratae quantum requiritur.
Fiant tabellae drachmarum sex. (Gal.)

T. tabellas scrupulorum quatuor parare jubet.

Gabe, zwei bis ſechs Drachmen und mehr.

Electuarium caryocostinum. (*Vm.*)

℞. Pulveris Scammonii compositi partem unam.
Mellis albi . . . . partes sex.
Misce. — Purgirend. — Gabe, eine bis ſechs Drachmen.

Electuarium hydragogum. (*Br*. Ca.*)

℞. Scammonii,
Radicis Jalapae,
singulorum drachmas duas.
Scillae . . . sesquidrachmam.
Resinae Jalapae semidrachmam
Syrupi Rhamni cathartici quantum sufficit.

Purgirend. — Gabe, bis vier und zwanzig Gran, bei ſogenannten aſtheniſchen Waſſerſuchten.

Electuarium Scammonii s. purgans, Confectio Scammoneae. (Am. Du. Lon. LonN. *C. Ra. Sp. Vm.*)

℞. Scammonii,
Zingiberis,
singulorum unciam unam.
Olei Caryophyllorum scrupulum unum.
Syrupi Corticum Aurantiorum quantum sufficit.
Misce. (Am. Du. *C.*)

℞. Scammonii . . . sesquiunciam.
Caryophyllorum,
Zingiberis,
singulorum drachmas sex.
Olei Carvi . . semidrachmam.
Syrupi Rosarum quantum sufficit.
Fiat electuarium. (Lon. LonN.)

℞. Coriandri . . . drachmas duas.
Caryophyllorum,
Zingiberis,
singulorum drachmas sex.
Scammonii . . . sesquiunciam.
Syrupi Rosarum quantum sufficit.
Misce. (*Vm.*)

℞. Scammonii . . . semunciam.
Radicis Jalapae uncias quatuor.
Amygdalarum dulcium . no. 20.
Foliorum Sennae . uncias duas.
Anisi,
Cremoris Tartari,
singulorum unciam unam.
Pulpae Prunorum uncias sedecim.
— Tamariudorum uncias octo.
Misce. (*Sp.*) — Gabe, eine bis zwei Drachmen.

Electuarium Diaphoenix s. Scammonii et Turpethi compositum. (Gal. Sar.)

℞. Pulpae Dactylorum libram unam.
Turbith . . uncias quatuor.
Liquiritiae . . . uncias duas.
Scammonii . . . sesquiunciam.
Mellis depurati libras duas cum dimidia.

Coque pulpam cum melle ad consumptionem humidi superflui et adde pulveres. (Sar.)

℞. Pulpae Dactylorum semilibram.
Amygdalarum dulcium excorticatarum uncias tres et dimidiam.
Sacchari pulverati . semilibram.
Mellis depurati . . libras duas.
Pulveris Zingiberis,
— Piperis,
— Macidis,
— Cinnamomi,
— Foliorum Rutae,
— Seminum Dauci Cretici,
— — Foeniculi,
singulorum drachmas duas.
— Radicis Turpethi uncias quatuor.
— Croci . . . . grana sex.
— Scammonii sesquiunciam.
Misce bene. (Gal.) — Gabe, von einer halben Drachme bis zur halben Unze.

Pruna praeparata s. purgantia. (*Fl.*)

Parantur e Prunis perniconis dictis, nucleum eximendo et loco ejus bolum e Scammonei granis decem et Conservae Violarum sufficiente quantitate paratum ingerendo. — Auf einmal.

Tinctura Scammonii. (Gal. *T.*)

℞. Scammonii grossiuscule triturati partem unam.
Alcoholis (22°) . partes quatuor.

Digere per tres dies et cola. — Gabe, zwanzig Tropfen bis eine Drachme.

T. Scammonii sesquiunciam, Alcoholis 25° libram unam et digestionem per dies decem. — Nicht über einen Scrupel und mit einer Emulsion.

Elixir polychrestum Halense. (Wir. *Sp.*)

℞. Extracti panchymagogi unciam unam.
Alcoholis . . . . uncias sex.
Dissolve et solutioni adde
Acidi sulphurici drachmas tres.
Filtra. (Wir. *Sp.*)

℞. Extracti panchymagogi unciam unam.
Mixturae simplicis . uncias sex.
Dissolve. (Wir.)

Purgirend. — Es war lange ein Geheimmittel. Die Formel ist von Triller. — Gabe, dreißig bis sechszig Tropfen und mehr.

Oleum purgans. (*Sw*.)

℞. Scammonii . scrupulos quatuor.
Olei Amygdalarum dulcium uncias quatuor.

Dissolve blandi caloris ope. — Mildes Purgirmittel. — Gabe, eine halbe bis anderthalb Unzen, in Emulsion oder mit syrupus papaveris.

Syrupus drasticus. (*Bo.*)

℞. Syrupi Limonum uncias quinque.
Scammonii pulverati drachmas quatuor.
Croci Martis aperientis,
Antimonii crudi porphyrisati, singulorum drachmas duas.
Misce exacte.

Syrupus de Scammonio, Syrupus ad arthritidem et hydropem s. antarthriticus vel antihydropicus. (Gal. *Ca. Fi. T. Vm.*)

℞. Scammonii pulverati semunciam.
Sacchari albi . uncias quatuor.
Alcoholis (22°) . . uncias octo.

In pelvim argenteam ingere, supra ignem collocandam et simulac massa aliquanto est calefacta, cerei flamma admoveatur ut liquor incendatur; agita continue cum spatula, donec flamma exstinguatur, ab igne vase remoto; liquori refrigerato et per pannum colato adde
Syrupi Violarum uncias quatuor.
Serva. (Gal.)

Fi. Alcoholem 20° adhibet; — *T.* Scammonii drachmas sex, Sacchari uncias sex, Alcoholis uncias duodecim, Syrupi Violarum uncias sex. — Gabe, zwei Drachmen bis eine halbe Unze; bis eine Unze. *T.*

℞. Scammonii pulverati partem unam.
Aquae Vitae . . partes sedecim.
Dissolve, liquori ignem admove et flammâ sponte extinctâ, per linteum trajice et adde
Syrupi Violarum . partes octo.
Serva. (*Vm.*)

℞. Gummi Arabici . partem unam.
Scammonii . . . partes duas.
Misce triturando et cum
Aquae . . sufficiente quantitate emulsionem spissam para, cum qua commisce
Syrupi Violarum partes viginti.
Serva. (*Vm.*)

Potio purgans, Mixtura cathartica Arabica. (*Ca.*)

℞. Aquae Florum Aurantiorum,
Syrupi Florum Persicae, singulorum unciam unam.
Spiritus Rorismarini drachmam unam.
Scammonii . . grana duodecim.
Misce.
℞. Syrupi Limonum unciam unam.
Sulphureti Antimonii grana duodecim.
Scammonii . scrupulum unum.
Misce. — Auf ein Mal. — Die zweite Formel wurde besonders gegen Wassersucht gepriesen.

Emulsio purgans. (Gal.)

℞. Scammonii . grana duodecim.
Sacchari albi . drachmas duas.
Vitelli Ovi . . . . . no. ½.
Tere, sensim addendo
Emulsionis simplicis uncias quinque.
Aquae Florum Aurantiorum drachmas duas.

Emulsio vermifuga. (*Sa.*)

℞. Nucleorum Persicarum
Amygdalarum amararum, singulorum drachmas duas.
Scammonii . . semiscrupulum.
Aquae Absinthii . uncias tres.

Scilla.

Scilla maritima, L.; Meerzwiebel, Mauszwiebel; Scille, Oignon marin (*Gal.*); Sea onion (*Ang.*); Alaschil (*Ar.*); Merska cybule (*B.*); Strandlaeg (*D.*); Escilla, Ceballa albarena (*His.*); Zeaujuin (*Bel.*); Scilla, Cipolla marina (*I.*); Korzen cebuli morskiey (*Pol.*); Albarra, Cebolla albarra (*Lus.*); Sjaelaek (*Suec.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass.

HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *Be. Br. C. Fi. G. M. Par. Pid. Sa. Sp.* Z.

♃ (Hexandria Monogynia, L.; Asphodeleae, J.) Eine im südlichen Europa am Meeresufer wachsende Pflanze. (*Blackw.* t. 591. *Plenck.* t. 271. *Bert.* Bild. VIII. 17. Fl. méd. VI. 318.)

Man wendet die Zwiebel (radix Scillae marinae s. Squillae s. Scillae rubrae s. Pancratii veri) an; sie ist birnförmig, sehr groß und mit mehrern trocknen, dünnen, papierartigen Häuten bedeckt, unter denen man eirunde, fleischige, rothe oder weiße Schuppen findet. Ihr Geruch ist beißend, der Geschmack anfangs schleimig, wird aber dann bitter, scharf und widerlich. Man wendet nur die rothe Spielart an.

Die Meerzwiebel enthält, nach Vogel, außer Schleimharz, holzigen Bestandtheilen ꝛc., einen eigenthümlichen bittern Stoff, Scillitin (Scillitinum) Scillitine (*Gal.*), welcher den Grund ihrer Wirksamkeit enthält. Nach Tilly besteht dieser Stoff aus nicht crystallisirbarem Zucker und zwei Stoffen, einem sehr bittern und einem außerordentlich scharfen.

In Indien braucht man, nach Ainslie, statt der Meerzwiebel die Zwiebel von

Erythronium Indicum, Rottler; Unsul, Iskil (*Ar.*); Nurriala (*Cy.*); Junglie piaz (*Duk.*); Kanda (*Hin.*); Peyaz ideschti (*Pe.*); Nurri vungyum (*Tam.*); Addivitella guddalu (*Tel.*).

Einige Schriftsteller haben behauptet, die Meerzwiebel wachse in Ceylan, allein White von Bombay ist der Meinung, daß man Amaryllis zeylanica dafür genommen habe.

Reizend, harntreibend, Brustmittel, bei Wassersucht und chronischen Catarrhen in Gebrauch. — Gabe des Pulvers, ein bis zehen Gran.

§. I. Präparate, welche die Meerzwiebel in Substanz enthalten.

Scilla praeparata. (RC. *Fi.*)

Bulbos Scillae, remotis squamis externis, virgulis penetratos in evaporatorio vel furno parum calido sicca, contunde in mortario, denuo in evaporatorio calefactos contunde et pulverem per setaceum trajiciens penitus siccatum serva. (*Fi.*) — RC. in taleolas transversim sectos leni calore vel balnei aquae vel aestivo soli expositos vel in loco temperate calido exsicca, ut fiant friabiles, tunc in pulverem terantur etc.

Pulpa Scillae. (Gal. *Fi. T.*)

℞. Bulborum Scillae quantum vis. Radicibus et tegminibus externis semotis, reliqua inter chartam inclusa coque inter cineres calidos, donec bulbus facile inter manus conteri possit; tunc partibus combustis separatis, medias in mortario marmoreo contunde et per cribrum arcte textum trajiciendo, pulpam para.

Involvi quoque potest bulbus strato tenui pastae farinaceae et sic inter cineres vel in furno coqui. (Gal. *T.*)

Trochisci de Scilla Damocratis s. scillitici. (His. Pal. Sar. Wir. *Sp.*)

℞. Scillae . . . uncias duodecim.
Contunde in mortario, addendo
Farinae Orobi vel Lupini
uncias octo.
Divide massam in trochiscos drachmarum duarum. (Pal. Wir. *Sp.*)

His. et Sar. loco farinae Pulverem Radicis Fraxinellae adhibent.

Pulvis Scillae compositus s. compositus Stahlii. (B*. BorC. Br. DD. Fenn. Ful. Gen. Pal. Sar. Suec. Wir. Wür. *Au. Ca. E. Pid. Sa. Sm. Sp. Sw. Vin.*)

℞. Scillae . . . . . partes sex.
Radicis Vincetoxici partem unam.
Fiat pulvis. (*Ca. Sw.*)

Br. Pal. Sar. Wir. et *Sp.* Scillae partes tres et unam Vincetoxici; — B*. Scillae partes duas et unam Vincetoxici.

℞. Scillae . . . . partem unam.
Radicis Vincetoxici . partes sex.
Nitri depurati . . partes octo.
Fiat pulvis. (*Pid.*)

℞. Scillae . . . . partem unam.
Nitri . . . . partes quatuor.
Fiat pulvis. (*Sm.*)

E. Scillae partem unam et Nitri sex; — Gen. Scillae unam et octo Nitri.

℞. Scillae . . . drachmam unam.
Nitri . . . . drachmas duas.
Cinnamomi . scrupulum unum.
Fiat pulvis. (Wür.)

Sa. Scillae grana decem, Nitri quindecim et Piperis Jamaicensis quinque; — *Sw.* Scillae, Piperis Jamaicensis, singulorum decem et Nitri quindecim.

℞. Scillae . . . . partem unam.
Nitri,
Cremoris Tartari,
singulorum partes sex.
Fiat pulvis. (*Pie.*)

Pie. praeterea Scillae partes sex, Nitri duodecim et Cremoris Tartari viginti.

℞. Scillae . . . . . partem unam.
Nitri . . . . . partes tres.
Cremoris Tartari partes quatuor.
Pulveris aromatici partes duas.
Fiat pulvis. (Fenn. Suec.)

℞. Scillae . . . . partem unam.
Cremoris Tartari
partes viginti quinque.
Elaeosacchari Foeniculi
partes quinque.
Fiat pulvis. (DD.)

℞. Scillae,
Zingiberis,
singulorum grana duodecim.
Kali sulphurici drachmas duas.
Fiat pulvis. (Ful.)

℞. Scillae . . . . partem unam.
Pulveris aromatici partes duas.
Nitri . . . . . partes tres.
Sulphatis Potassae partes quatuor.
Fiat pulvis. (*Vm.*)

℞. Natri acetici,
Elaeosacchari Juniperi,
singulorum drachmas tres.
Scillae . . . . . grana sex.
Radicis Calami . . semigranum.
Opii . . . . . grana tria.
Fiat pulvis in partes sex dividendus. (BorC.)

℞. Scillae . . . . . grana duo.
Foliorum Digitalis purpureae
granum unum.
Tartari depurati semidrachmam.
Fiat pulvis. (B*.)

℞. Scillae,
Digitalis purpureae,
singulorum granum unum.
Olei Juniperi . . . guttas duas.
Tartari boraxati,
Liquiritiae,
singulorum scrupulum unum.
Cinnamomi . . . . grana duo.
Misce. (B*.)
Harntreibend. — Gabe, zehen bis zwanzig Gran.

℞. Scillae . . . . . grana duo.
Baccarum Juniperi
grana octodecim.
Auf eine Gabe. (*Au.*)

℞. Scillae . . . grana quindecim.
Iridis Florentinae,
Liquiritiae,
singulorum grana decem.
Sacchari Lactis scrupulos duos.
Olei Anisi . . . . guttas tres.
Fiant doses tres. — Gabe, Morgens und Abends ein Stück. (*Au.*)

℞. Acetatis Sodae,
Elaeosacchari Juniperi,
singulorum drachmas tres.
Scillae . . . . . grana sex.
Calami aromatici semidrachmam.
Opii . . . . . grana tria.
Fiant doses sex. — Gabe, drei Stück täglich in Wachholderthee. (*Au.*)

Boli scillitici s. ad s. contra oedema pulmonum. (*Pie. Ra.*)

℞. Scillae pulveratae . grana sex.
Sulphatis Potassae . grana duo.
Oxymellis scillitici
quantum sufficit.
Fiat bolus. (*Ra.*)

℞. Radicis Vincetoxici semunciam.
— Scillae . drachmas duas.
Salis Absinthii drachmam unam.
Syrupi Valerianae quantum sufficit.
Fiant boli viginti quatuor. (*Pie.*)

Pilulae scilliticae s. scillinae. (Am. Ams. An. B*. Bel. BorC. Br. D. Du. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. His. Li. Lon. LonN. Lus. RC. Sar. Wir. Wür. *Au. Br. C. Ca. Fi. Huf. Pid. Pie. Sp. Sw. Vm.*)

1) Ohne Seife.

℞. Pulveris Scillae . sesquiunciam.
Gummi Ammoniaci semunciam.
Oxymellis scillitici
quantum sufficit.
Fiat massa pilularis. (Gal. GalM.)

Fer. Scillae pulveratae, Gummi Ammoniaci partes aequales et Balsami Copaivae quantum sufficit.

℞. Scillae pulveratae semidrachmam.
Gummi Ammoniaci drachmas tres.
Nitri depurati drachmam unam.
Syrupi Sacchari quantum sufficit ut fiant pilulae granorum quatuor. (Gen.)

℞. Gummi Ammoniaci,
Scillae siccatae,
singulorum partes duas.
Cardamomi minoris partem unam.
Oxymellis scillitici
quantum sufficit.
Fiat massa pilularis. (Ams.)

Ful. et Li. Trium substantiarum, singularum partes aequales, cum Oxymelle scillitico; — Lus. et *Ca.* Partes aequales cum Syrupo Sacchari; — Wür. et *Pie.* Partes aequales cum Balsamo Copaivae; — Hass. et *Pid.* Partes aequales absque syrupo et balsamo; — *Au.* Scillae, Gummi Ammoniaci, singulorum partes duas et unam Cardamomi absque oxymelle, syrupo et balsamo.

℞. Scillae pulveratae partem unam.
Gummi Ammoniaci,
Cardamomi minoris,
Extracti Liquiritiae,
singulorum partes tres.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.
Fiat massa pilularis. (An. *Br. Sw.*)

℞. Scillae pulveratae,

Gummi Ammoniaci,
Millepedum,
singulorum partes octo.
Cardamomi minoris partes duas.
Balsami Copaivae partem unam.
Fiat massa pilularis. (Br.)

2) Mit Seife.

℞. Scillae pulveratae drachmam unam.
Saponis albi grana viginti quatuor.
Fiant pilulae quadraginta. (Am. *C.*)

℞. Saponis albi . . partes septem.
Gummi Arabici . . partes tres.
Scillae pulveratae,
Balsami Copaivae,
singulorum partem unam.
Fiat massa pilularis. (His.)

℞. Saponis albi . . . partes duas.
Gummi Ammoniaci,
Scillae pulveratae,
singulorum partem unam.
Emulsionis spissae Balsami Copaivae . . . . quantum sufficit.
Fiat massa pilularis. (*Vm.*)

℞. Saponis . . . . partes duas.
Scillae pulveratae,
Nitri, singulorum partem unam.
Balsami Copaivae quantum sufficit.
Fiant pilulae granorum quatuor. (*Ca.*)

℞. Saponis Hispanici . partes octo.
Gummi Ammoniaci,
Radicis Vincetoxici,
Scillae, singulorum semunciam.
Balsami Copaivae drachmam unam.
Fiat massa pilularis. (D.)

℞. Saponis albi,
Gummi Ammoniaci,
singulorum drachmas duas.
Zingiberis . . . scrupulos duos.
Scillae siccatae grana duodecim.
Alcoholis . . quantum sufficit.
Fiant pilulae granorum duorum. (BorC. *Au.*)

Lon. LonN. Saponis, Zingiberis, singulorum partes tres, Gummi Ammoniaci duas, Scillae unam et Syrupi Sacchari quantum sufficit; — Du. et *C.* Scillae drachmam unam, Zingiberis duas, Olei Anisi guttas decem et Gelatinae Saponis quantum sufficit; — *Br.* Scillae drachmam unam, Zingiberis, Saponis, singulorum tres, Gummi Ammoniaci duas et Syrupi Zingiberis sufficientem quantitatem; — *Ca.* Saponis, Zingiberis, singulorum drachmas tres, Gummi Ammoniaci drachmas duas, Scillae unciam unam et Syrupi Sacchari quantum sufficit; — Han. Scillae drachmam unam, Zingiberis, Saponis, singulorum tres, Gummi Ammoniaci duas et Mucilaginis Gummi Arabici quantum sufficit.

℞. Scillae siccatae et pulveratae,
Gummi Ammoniaci, vel
Asae foetidae,
Pulveris aromatici, vel
— Zingiberis, vel
— Cardamomi,
Saponis oleosi,
singulorum partes aequales.
Tincturae aromaticae, vel
— Guajaci volatilis, vel
Syrupi simplicis quantum sufficit.
Fiat massa. (RG.)

℞. Scillae,
Gummi Ammoniaci,
Millepedum,
singulorum semunciam.
Saponis . . . . unciam unam.
Balsami Copaivae drachmam unam.
Fiant pilulae granorum decem. (B*. Sar. Wir. *Huf.*)

Fi. eandem formulam sed Balsami Copaivae quantum satis ut fiat massa pilularis.

℞. Saponis Veneti . drachmas duas.
Gummi Ammoniaci,
Scillae pulveratae,
Millepedum,
singulorum drachmam unam.
Olei Anisi . . . guttas septem.
Mellis rosati . quantum sufficit ut fiant pilulae ponderis grani unius. (B*.)

Bel. *Pie.* et *Sp.* eandem formulam sed loco balsami copaivae Oxymel scilliticum adhibent.

Die Gabe dieser Pillen ist im Allgemeinen sechs bis funfzehen Gran.

Pilulae desobstruentes s. diureticae resolventes. (*B. Ca. Sw.*)

℞. Gummi Ammoniaci,
Saponis medicinalis,
singulorum sesquidrachmam.
Scillae pulveratae,
Pulveris aromatici,
singulorum semidrachmam.
Olei essentialis Juniperi
guttas viginti.
Syrupi Corticum Aurantiorum
quantum sufficit.
Fiant pilulae quinque granorum. — Gabe, vier Stück alle drei Tage, bei Bleichsucht und chronischen Leberkrankheiten.

℞. Saponis medicinalis,
Extracti Taraxaci,
singulorum drachmam unam.
Natri sulphurici scrupulos quatuor.
Scillae . . . . grana sedecim.
Mellis . . . quantum sufficit.
Fiant pilulae quatuor granorum. — Gabe, ein Stück alle drei Stunden. (*B.*)

Pilulae pectorales. (*Sw*.*)

℞. Gummi Ammoniaci,

Sulphatis Potassae,
singulorum drachmas sex.
Radicis Iridis Florentinae
semunciam.
Scillae . . . . drachmas duas.
Saponis albi . . . uncias duas.
Extracti Rhoeados quantum sufficit.
Fiant pilulae quinque granorum. —
Gabe, fünf Stück täglich drei Mal.

Pilulae physagogae. (B*. Wür. *Sm. Sw.*)

℞. Scillae,
Extracti Elaterii,
singulorum semunciam.
Acidi succinici drachmam unam.
Sulphuris Antimonii aurati
semidrachmam.
Fiant pilulae granorum trium. (*Sw.*)
℞. Scillae . . . . . semunciam.
Sulphuris Antimonii aurati,
Acidi succinici,
singulorum drachmam unam.
Extracti Elaterii . . semunciam.
Olei Anisi . . . guttas aliquot.
Succi Liquiritiae quantum sufficit.
Fiant pilulae centum quinquaginta.
(B*. Wür. *Sm.*)

Pilulae hydragogae. (*Ca. Pid. Pie.*)

℞. Extracti Colocynthidis
drachmas quinque.
Scillae drachmas quinque cum dimidia.
Fiant pilulae ducentae. (*Pie.*)
℞. Scillae pulveratae,
Mercurii dulcis, singulorum drachmas duas cum dimidia.
Oxymellis scillitici
sufficientem quantitatem.
Fiant pilulae centum. (*Pie.*)
℞. Scillae,
Extracti Trifolii,
singulorum sesquidrachmam.
Digitalis purpureae,
Asae foetidae,
singulorum drachmam unam.
Fiant pilulae centum. (*Ca.*)
℞. Extracti Taraxaci
drachmas tres cum dimidia.
Saponis Hispanici sesquidrachmam.
Galbani . . . drachmas duas.
Scillae . grana viginti quatuor.
Mercurii dulcis . grana sedecim.
Camphorae . scrupulum unum.
Essentiae Aurantiorum
quantum sufficit.
Fiant pilulae granorum duorum (*Pid.*)
Gabe, vier Stück Morgens und Abends.
℞. Asae foetidae . drachmas duas.
Saponis medicinalis
drachmam unam.
Camphorae . . semidrachmam.
Scillae . . . grana duodecim.
Olei Juniperi . . . guttas viginti.
Fiant pilulae granorum duorum. —
Gabe, zehn Stück, Morgens und Abends.
(*Au.*)
℞. Asae foetidae,
Extracti Valerianae,
singulorum drachmas duas.
Scillae,
Opii, singulorum grana decem.
Fiant pilulae granorum duorum. —
Gabe, wie bei den vorhergehenden. (*Au.*)

Pilulae diureticae. (*B. Ca. Sm.*)

℞. Cremoris Tartari drachmas quatuor.
Gummi Ammoniaci drachmas duas.
Scillae . . . sesquidrachmam.
Croci pulverati . scrupulos duos.
Oxymellis scillitici quantum sufficit.
Fiant pilulae sexaginta. (*Ca. Sm.*)
℞. Scillae . . . . grana viginti.
Digitalis purpureae
grana octodecim.
Roob Juniperi . quantum sufficit.
Fiant pilulae decem. — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden. (*B.*)
℞. Pulveris Millepedum
drachmas duas.
Scillae pulveratae
grana triginta sex.
Gummi Ammoniaci drachmas tres.
Myrrhae . . drachmam unam.
Roob Juniperi drachmas quatuor.
Fiant pilulae trium granorum. (*Sm.*)

Pilulae expectorantes. (*E. Par.*)

℞. Myrrhae . . . sesquidrachmam.
Scillae . . . . semidrachmam.
Extracti Hyoscyami scrupulos duos.
Aquae . . . quantum sufficit.
Fiant pilulae triginta. — Gabe, zwei Stück Morgens und Abends.

Pilulae incisivae. (*Ca. Pie.*)

℞. Scillae . . . drachmam unam.
Kermetis mineralis . grana octo.
Extracti Opii gummosi grana sex.
Butyri Cacao . quantum sufficit.
Fiant pilulae triginta sex. (*Ca.*)
℞. Scillae . . . . . semunciam.
Ipecacuanhae . drachmas duas.
Extracti Opii gummosi
grana quindecim.
Butyri Cacao . . unciam unam.
Syrupi Gummi quantum sufficit.
Fiant pilulae granorum quatuor. (*Ca.*)
℞. Scillae . . . . . grana sex.
Succini . . . grana quindecim.
Ipecacuanhae . . . grana duo.
Conservae Inulae quantum sufficit.
Fiant pilulae novem. (*Pie.*) Gabe, zwei oder drei Stück täglich drei Mal.

Trochisci scillitici. (*Pie.*)

℞. Scillae . . . . semidrachmam.

Sacchari . . . . uncias duas.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae
quantum sufficit.
Fiant trochisci centum et vi inti.

Electuarium desobstruens s. aperiens. (*Sw.*)

℞. Pulveris Scillae compositi (*Sw.*),
Gummi Ammoniaci,
Tartratis Potassae,
singulorum drachmas duas.
Salis Ammoniaci scrupulum unum.
Syrupi Cinnamomi
quantum sufficit.

Bei Wassersucht. — Gabe, zwei Drachmen drei Mal täglich.

Looch ad asthma s. de Scilla. (Br. Pal. Wir. *Fi. Pie. Sp.*)

℞. Succi Scillae,
Mellis depurati,
singulorum uncias quatuor.
Misce bene. (*Pic.*)

Fi. Succi et Mellis, singulorum uncias sex.

℞. Scillae pulveratae . grana octo.
Gummi Ammoniaci grana viginti.
Syrupi Althaeae,
Oxymellis scillitici,
singulorum unciam unam.
Aquae Boraginis . . uncias duas.
Misce sedulo. (*Pie.*)

℞. Scillae siccatae . . semunciam.
Iridis Florentinae drachmas duas.
Marrubii,
Hyssopi,
singulorum drachmam unam.
Myrrhae,
Croci, singulorum semidrachmam.
Mellis despumati . . uncias sex.
Misce exacte. (Br. Pal. Wir. *Sp.*)

Unguentum Scillae. (B^a *Huf.*)

℞. Scillae . . . . . uncias tres.
Lixivii caustici quantum sufficit.
Coquendo in mucilaginem redactis adde
Axungiae Porci quantum sufficit ut fiat unguentum. — **Auflösend, in Einreibungen auf schmerzlose Geschwülste.**

Unguentum diureticum resolvens. (*B*)

℞. Unguenti mercurialis
drachmam unam.
Scillae . . . . semidrachmam.

In Einreibungen bei Wassersucht auf die innere Seite der Schenkel, in die Lenden und auf den Unterleib.

Linimentum diureticum s. diureticum gastro-scilliticum. (*B.*)

℞. Scillae pulveratae drachmam unam
Succi gastrici vitulini uncias duas.

Man reibt in Fällen von Wassersucht damit die Lendengegend ein, wenn der Kranke die passenden Mittel nicht durch den Mund nehmen kann.

§. II. Präparate, welche nur das wirksame Princip der Meerzwiebel, mehr oder weniger rein enthalten.

A. Auszug durch Wasser.

Extractum Scillae. (A. Ba. Bel. Bor4. Fer. Wür. *Br. T. Vm.*)

℞. Squamarum Scillae recentis
quantum vis.
Contunde in mortario, exprime succum et de tempore primum leni igne, deinde in balneo aquae vaporando consume. (A.)

Bel. contundere jubet Scillam cum Aquae sufficiente quantitate, ut massa fere liquida obtineatur, colare exprimendo, residuum cum Aquae pauxillo triturare et cum expressione colare, liquores tunc commiscere, seponere et decanthatos in balneo aquae consumere; — *Br.* Bulbos contundere, cum Aqua conterere, succum exprimere, residuum cum nova Aquae quantitate coquere et liquores commixtos evaporare; — *T.* macerando radicem siccatam in pondere Aquae quadruplo ut extractum columbo parari jubet, quod vide; — *Fi.* Squamarum recentium partem unam contundere, Aquae frigidae partes sex addere, in saccum ingerere et prelo submittere, residuum cum nova Aqua per horae circiter quadrantem coquere etc. et liquores consumere.

℞. Scillae concisae . quantum vis.
Coque per horam unam in Aquae sufficiente quantitate; cola exprimendo, sepone, decantha liquorem et ad mellis spissi consistentiam consume. (Fer. Wür.)

Bor4. Scillae quantum vis cum Aquae fervidae decuplo per horas triginta sex infundere, liquorem exprimendo separare, residuum iterum cum Aquae fervidae quintuplo infundere et post refrigerationem exprimere, liquores decanthando etc. depuratos primum leni igne ad tertiam partem, tum in balneo vaporis ad justam extracti spissitudinem consumere.

℞. Scillae recentis . partem unam.
Aquae . . . . partes quatuor.
Macera per horas viginti quatuor et cola absque expressione; liquorem tunc sufficienter consume. (Ba. *Vm.*)

Electuarium resolvens martiale diureticum s. diureticum. (*B.*)

℞. Saponis Veneti drachmam unam.
Extracti Cicutae grana duodecim.
— Scillae scrupulum unum.
Aethiopis martialis
drachmam unam.
Oxymellis simplicis
quantum sufficit.

Allmälig zu nehmen.

Decoctum Scillae. (Am. B*. C.)

℞. Scillae . . . . drachmas tres.
Juniperi . . . uncias quatuor.
Radicis Senegae . . uncias tres.
Aquae . . . octarios quatuor.
Decoque ad dimidium, cola et adde
Aetheris nitrici uncias quatuor.
Reizend, bei Waſſerſucht empfohlen. — Gabe, einen halben bis ganzen Löffel.

Decoctum hydragogum. (*Sa.*)

℞. Radicis Taraxaci integrae uncias duas.
— Althaeae drachmas decem.
Aquae . . . quantum sufficit.
Coque per horae quadrantem et adde
Scillae . . . . . sesquiunciam.
Florum Chamomillae uncias duas.
Post horam unam digestionis in vase tecto, unciis quatuordecim colaturae adde
Syrupi Liquiritiae . uncias duas.
Misce bene.

Apozema pectorale et incisivum. (*Bo.*)

℞. Radicis Taraxaci,
Florum Taraxaci,
singulorum uncias duas.
Radicis Althaeae . unciam unam.
Florum Chamomillae drachmas tres.
Scillae . . . sesquidrachmam.
Succi Liquiritiae . unciam unam.
Aquae . . . . quantum sufficit ut librae tres colaturae obtineantur, cui adde
Oxymellis scillitici,
Syrupi Althaeae,
singulorum drachmas sex.
Bruſtmittel, harntreibend. — Taſſenweiſe, ſtündlich.

Decoctum diureticum Hufelandi. (*Ca. Vm.*)

℞. Scillae . . . . semidrachmam.
Aquae . . . . . uncias sex.
Liquori postquam semel ebullierit, ab igne remoto adde
Radicis Valerianae drachmas duas.
Cola leviter exprimendo; post refrigerationem colaturam contere cum
Gummi Arabici,
Resinae Guajaci,
singulorum drachmis duabus ut fiat emulsio, cui denuo colatae adde
Tincturae Antimonii acris,
Spiritus Nitri dulcis,
singulorum drachmas duas.
Misce. (*Vm.*)
Ca. coquere jubet per sexagesimas viginti Scillae semunciam in Aquae unciis decem, sub finem addere Radicis Valerianae pulveratae drachmas duas, colare et colaturam commiscere cum Syrupi Corticum Aurantiorum uncia una, Mucilaginis Gummi Arabici drachmis tribus, Resinae Guajaci, Tincturae Antimonii acris, Spiritus Nitri dulcis, singulorum drachmis duabus et Laudani liquidi guttis viginti.
Gabe, ein Eßlöffel alle zwei Stunden.

Mel scilliticum. (Gal. *T. Vm.*)

℞. Squamarum Scillae uncias duas.
Aquae communis . . libras tres.
Coque leviter per aliquot sexagesimas, tunc digere per dies duos, cola exprimendo et colaturae adde
Mellis . . . . . sesquilibram.
Clarifica et coque ad syrupi consistentiam (Gal.)
T. Mellis 32° B. libras duas, caeterum ut Gal.; — *Fi.* Squamarum drachmas quindecim, Aquae et Mellis, singulorum libras duas cum dimidia.
℞. Scillae siccatae . partem unam.
Aquae . . . . quantum sufficit ad obtinendas infusi partes duodecim, quarum colaturae adde
Sacchari albi . partes duodecim.
Coque parumper, cola per pannum et post refrigerationem adde
Mellis . . . . partes duodecim.
Misce bene (*Vm.*)
Gabe, eine halbe bis zwei Drachmen.

Syrupus de Scilla s. scilliticus s. Scillae. (*T. Vm.*)

℞. Scillae siccatae . partem unam.
Aquae tepidae . partes duodecim.
Infunde per horas duodecim, cola exprimendo et adde
Sacchari albi . . partes sedecim.
Clarifica et coque ad syrupi consistentiam.
Fi. et *T.* ut mel scilliticum sed loco mellis cum Saccharo clarificato parare jubent.

Looch pectorale. (*Ra.*)

℞. Looch simplicis uncias quatuor.
Mellis scillitici . unciam unam.

Mixtura scillina. (RC.)

℞. Aquae Menthae piperitae uncias quatuor.
Syrupi Scillae, vel
Oxymellis ejusdem . uncias duas.
Misce. — Interdum additur Tincturae Opii camphoratae uncia una. — Gabe, eine halbe bis ganze Unze täglich vier Mal.

Potio diuretica. (*Ra.*)

℞. Aquae Valerianae uncias quatuor.

Aquae Menthae piperitae
unciam unam.
Aetheris nitrici drachmam unam.
Laudani liquidi . semidrachmam.
Mellis scillitici drachmas quatuor.
Syrupi Quinque Radicum
unciam unam.

Iſt nach dem decoctum diureticum Hufelandi gemodelt.

Mel Scillae s. scilliticum compositum, Syrupus Scillae compositus. (Am. B*. C. E.)

℞. Scillae siccatae et contusae,
Radicis Polygalae Virginicae,
singularum uncias quatuor.
Aquae . . . octarios quatuor.

Coque blando igne ad dimidiae partis aquae consumptionem, cola et adde
Mellis despumati . . libras duas.

Coque denuo ad octariorum trium remanentiam et in hujus syrupi unciis quatuor dissolve
Tartari stibiati . granum unum.

Reizend, auflöſend, harntreibend, bei ſchleimiger Engbrüſtigkeit gerühmt. — Gabe, von zehen Tropfen bis zu einem Kaffeelöffel und mehr, alle Viertels-, halbe oder ganze Stunden, je nach Alter des Kranken und nach der Indication.

Syrupus Scillae compositus. (Fenn. O. Suec. *Sp. Vm.*)

℞. Scillae siccatae . unciam unam.
Zingiberis . . . . semunciam.
Herbae siccatae Hyssopi
uncias duas.
Aquae Menthae piperitae
libras duas.

Macera per horas viginti quatuor in vase clauso, cola exprimendo et liquori sepositione depurato adde
Sacchari albi . . . libras tres.
Coque parumper. (Fenn. Suec. *Sp.*)

O. loco aquae menthae illam Hyssopi indicat; — *Vm.* Zingiberis partem unam, Scillae duas, Hyssopi quatuor, Aquae viginti, infusionem in balneo aquae et Sacchari partes triginta sex.

B. Auszug durch Wein.

Vinum Scillae s. Scillae maritimae s. scilliticum. (Ams. B*. Ful. Gal. GalM. Ham. Li. Lus. RC. Sar. Suec. Wür. *Au. Ca. Fi. Pie. Sa. T. Vm.*)

℞. Scillae siccatae . unciam unam.
Vini Malacensis . libram unam.

Macera per horas duodecim, cola ac filtra. (Gal.)

Lus. Scillae unciam unam et Vini libras duas; — Sar. Scillae semunciam et Vini libras duas.

T. Squamarum Scillae unciam unam, Vini albi generosi uncias sedecim, Spiritus Vini 36° uncias tres, macerationem per octo dies.

℞. Scillae concisae drachmam unam.
Corticis Aurantiorum
unciam unam.
Vini albi . . . . libras duas.

Digere per horas viginti quatuor et cola. (Ham.)

Fi. Scillae semunciam, Corticis drachmam unam, Vini albi uncias novem, infusionem frigidam per triduum.

℞. Scillae recentis . drachmas sex.
Cinnamomi . . drachmas tres.
Vini . . . . . sesquilibram.

Infunde frigide per horas duodecim et cola. (Wür.)

Vm. Scillae partem unam, Cinnamomi partem dimidiam, Vini Maderani partes quadraginta octo et octo dies macerationis.

℞. Scillae recentis . . semunciam.
Zingiberis . . drachmam unam.
Alcoholis (0,931) . uncias duas.
Vini albi . . . . . libras duas.

Post tres dies cola. (Ams.)

Suec. Scillae unciam unam, Zingiberis drachmam unam et Vini albi libras duas; — *Au.* Scillae drachmam unam, Calami drachmas duas et Vini libram unam.

℞. Scillae . . . . unciam unam.
Corticis Aurantiorum,
Radicis Calami,
singulorum drachmas duas.
Vini albi . . . . sesquilibram.

Post tres dies digestionis adde
Oxymellis scillitici drachmas duas.
Misce bene. (*Ca. Pie.*)

RC. Corticis et Radicis, singulorum drachmam unam, Vini albi libram unam, Oxymellis scillitici unciam unam, caeterum ut antea.

℞. Scillae siccatae,
Baccarum Juniperi,
singulorum drachmam unam.
Radicis Calami . drachmas duas.
Vini albi . . . . libram unam.

Post tres dies macerationis cola. (B*. Ful.)

Li. Vini albi unciam unam, Scillae grana quinque, Baccarum Juniperi scrupulos duos et Calami grana decem.

℞. Scillae . . . drachmam unam.
Baccarum Juniperi unciam unam.
Cardamomi minoris semidrachmam.
Vini albi . . . . semilibram.

Digere blando calore per tres dies. (B*.)

℞. Scillae,
Cardamomi minoris,
singulorum partem unam.
Baccarum Juniperi,

Seminum Dauci,
singulorum partes duas.
Vini Maderani partes triginta duas.
Post plures dies frigidae maceratio-nis cola leviter exprimendo et filtra. (*Vm*)

℞. Tincturae Scillae grana viginti.
Vini albi . . . . unciam unam.
Misce. (GalM.)

Reizend, zuweilen Ekel, selbst Brechen erregend. — Gabe, zwei oder drei Löffel täglich.

Vinum diureticum amarum s. amarum scilliticum compositum, *Infusum scilliticum vinosum compositum*. (Gal. *Ca. Ra. Sa.*)

℞. Scillae . . . . drachmas sex.
Cinnamomi,
Corticis Winteri, singulorum drachmas quatuor.
Radicis Inulae drachmam unam.
Vini . . . . . libram unam.
Post sufficientem extractionem cola. (*Sa.*)

℞. Squamarum Scillae,
Radicis Vincetoxici,
singularum semunciam.
Corticis Chinae,
— Winteri,
— Citri,
singulorum uncias duas.
Stipitum Angelicae Bohemicae semunciam.
Foliorum Absinthii,
— Melissae,
singulorum unciam unam.
Baccarum Juniperi,
Macidis, singulorum semunciam.
Vini albi generosi . libras octo.
Digere cortices, radices, scillam et macidem pulveratos et cribratos et baccas integras in vino, leni calore per dies quatuor, cola deinde, leviter exprimendo et filtra. (Gal.)

℞. Scillae siccatae,
Radicis Vincetoxici,
— Angelicae,
Chinae pulveratae,
singularum unciam unam.
Corticis Citri,
— Winteri,
singulorum uncias duas.
Baccarum Juniperi,
Macidis, singulorum drachmas duas.
Foliorum siccorum Absinthii,
— — Melissae,
singulorum semidrachmam.
Alcoholis . . . . uncias duas.
Vini albi . . . libras quatuor.
Digere in balneo arenae per horas viginti quatuor, subinde agitando, cola exprimendo ac filtra. (*Ca*)

℞. Corticis Winteri,
Chinae,
Cinnamomi,
. singulorum unciam unam.
Radicis Angelicae,
Squamarum Scillae,
Baccarum Juniperi,
Macidis, singulorum uncias duas.
Foliorum siccorum Absinthii,
— — Melissae,
singulorum manipulos duos.
Vini albi . . . . libras duas.
Macera per horas viginti quatuor. (*Ra.*)

Tonisch, in Fällen, wo Reizung des Magens nöthig ist und bei sogenannten passiven Wassersuchten empfohlen. — Gabe, eine bis vier Unzen täglich.

Infusum Kali carbonici cum Scilla vinosum, *Vinum Scillae alcalinum*. (*Au. T.*)

℞. Kali subcarbonici . semunciam.
Scillae . . . scrupulum unum.
Cinnamomi . . drachmas duas.
Vini albi . . . . uncias octo.
Infunde per horas duodecim et cola. — Gabe, einen oder zwei Löffel alle zwei oder drei Stunden.

T. Zedoariae drachmas duas, Squamarum Scillae, Rhei, Baccarum Juniperi, singularum drachmam unam, Cinnamomi drachmas tres, Kali subcarbonici sesquidrachmam et Vini albi austeri et vetusti uncias triginta duas.

C. Auszug durch Alcohol.

Tinctura Scillae s. Scillae maritimae. (An. B*. D. Du. Ed. Gal. GalM. Han. HassP. Lon. LonN. RC. *C. T. Vm.*)

℞. Squamarum Scillae siccatarum
. partem unam.
Alcoholis (22°) . partes quatuor.
Digere per dies sex et cola. (Gal. GalM.)

B*. Lon. et LonN. Scillae uncias quatuor, Alcoholis (0,930) octarios duos et quatuordecim dies infusionis; — Du. HassP. Scillae uncias quatuor, Alcoholis (0,930) (Spir. Vini rectificati HassP.) libras duas et octo dies infusionis (tinctura expressa unciarum viginti pondere par sit HassP.); — Ed. Scillae uncias duas, Alcoholis (0,935) sedecim et octo dies infusionis; — *Vm.* Scillae partem unam, et sex Aquae Vitae; — D. Scillae uncias sex et duas libras Aquae Vitae; — Han. Scillae uncias quinque et Aquae Vitae libras duas; — *C.* Scillae uncias quinque et Alcoholis (0,930) octarios duos; — RC. Scillae uncias duas, Alcoholis diluti libram unam et septem dies digest onis;

— *T.* Scillae unciam unam, Alcoholis 26° B. octo, digestionem per 12 vel 15 dies.

℞. Scillae recentis contusae uncias sex.
Alcoholis (36°) . . uncias octo.
Post quatuor dies digestionis cola exprimendo et residuo infunde
Alcoholis (36°) . . uncias duas.
Digere iterum blando calore et cola, colaturas mixtas filtra. (An.)

Reizend, harntreibend, besonders bei Wassersuchten gebraucht. — Gabe, zehen bis zwanzig Tropfen in Emulsion oder in einem schleimigen Wasser.

Mixtura anticatarrhalis. (*Ca.*)

℞. Elixir paregorici uncias quinque.
Tincturae Scillae unciam unam.

Gabe, ein Kaffeelöffel, Morgens und Abends.

Mixtura diuretica. (*E.*)

℞. Tincturae Scillae drachmas duas.
Aetheris nitrici . unciam unam.

Gabe, ein Kaffeelöffel, fünf oder sechs Mal täglich, in Wachholderthee.

Hierher gehört auch die von *Au.* sehr unpassend sogenannte *Tinctura Scillae:*

℞. Scillae . . . . sesquiunciam.
Aetheris muriatici,
Spiritus Juniperi,
singulorum semilibram.
Aquae . . . quantum sufficit.
Destillent librae sex. — Gabe, zehen bis dreißig Tropfen.

Tinctura Scillae aromatica. (Suec.)

℞. Scillae siccatae . unciam unam.
Cinnamomi pulverati drachmas duas.
Alcoholis Aqua diluti semilibram.
Infunde per tres dies ac filtra.

Man könnte statt des Zimmts auch das Gelbe der Pomeranzenschaale nehmen und die Tinctur auch auf der Stelle bereiten, indem man zu der einfachen tinct. Scillae eine größere oder geringere Menge tinct. Cort. Aurant. setzte. Die tinct. Scill. aromat. verdient den Vorzug vor der einfachen, sie schmeckt weniger unangenehm und ist vielleicht auch nicht so reizend.

Tinctura Scillae composita. (*Vm.*)

℞. Aceti scillitici . . partes tres.
Tincturae Corticum Aurantiorum partem unam cum dimidia.
Extracti Trifolii partem unam.
Post plures dies macerationis cola per pannum.

Tinctura Scillae kalina. (B*. Bor4. Fenn. Fer. Hass. Li. Wir. *Huf. Sw*. Vm.*)

℞. Scillae pulveratae,
Kali subcarbonici,
singulorum unciam unam.
Tritura simul in mortario et adde
Alcoholis . . . uncias quatuor.
Post horas sex digestionis cola leviter exprimendo. (Hass.)

B*. Bor4. et *Huf.* Scillae uncias tres (duas Bor4.), Potassae causticae drachmas duas, Alcoholis libram unam et tres dies digestionis; — Li. Scillae, Kali subcarbonici, singulorum unciam unam et octo uncias Alcoholis.

℞. Scillae siccatae . unciam unam.
Cinnamomi . . drachmas duas.
Solutionis Potassae causticae drachmam unam.
Alcoholis . . . . semilibram.
Digere per tres dies et filtra. (Fenn.)

Vm. Potassae causticae partem unam, Cinnamomi duas, Scillae octo et Aquae Vitae quadraginta octo.

℞. Kali subcarbonici . semunciam.
Aceti scillitici uncias duodecim.
Evaporent leni igne ad mellis consistentiam, tum residuum digere cum
Alcoholis . . . . uncias sex.
Post aliquot dies filtra. (Wir.)

Sw.* Aceti scillitici uncias octodecim et duodecim Alcoholis.

℞. Scillae,
Acetatis Potassae,
singularum unciam unam.
Alcoholis . . . . uncias sex.
Post tres dies filtra. (Fer.)

Reizend, eins der wirksamsten auflösenden und harntreibenden Mittel; bei Wassersuchten und Asthma empfohlen. — Man fängt mit dreißig Tropfen an und steigt alle zwei oder drei Stunden um fünf, bis der Kranke hundert und mehr nimmt.

Potio diuretica. (*E.*)

℞. Subcarbonatis Potassae drachmam unam.
Succi Citri . . quantum sufficit ad dissolutionem; adde
Tincturae Scillae . semunciam.
— Opii . . guttas triginta.
Aquae Cinnamomi uncias quatuor.

Gabe, alle zwei oder drei Stunden ein Löffel.

Elixir pectorale Wedelii. (B*. Br. Li. Wir. *Ca. Huf. Sp. Vm.*)

℞. Radicis Scillae,
— Iridis Florentinae,
— Inulae,
singularum unciam unam.
— Liquiritiae . semunciam.
Ligni Santali rubri unciam unam.
Herbae Roris Solis sesquiunciam.
Seminum Anisi . . semunciam.
Benzoës . . . . drachmas sex.

Myrrhae . . . . semunciam.
Gummi Ammoniaci
drachmas duas.
Croci . . . . drachmas tres.
Aquae Vitae . . . libras duas.
Digere seorsim gummi ammoniacum, myrrham et benzoën et post sufficientem extractionem tincturam cum ea reliquarum substantiarum commisce. (Br. Wir.)

B*. Rorellam omittit; — *Sp.* addit Radicis Althaeae unciam unam et Benzoës concisae drachmas quatuor.

℞. Radicis Scillae,
— Iridis Florentinae,
— Inulae,
singularum unciam unam.
Benzoës,
Myrrhae,
Anisi,
Succi Liquiritiae,
Gummi Ammoniaci,
singulorum semunciam.
Croci . . . . drachmas tres.
Alcoholis . . . libram unam.
Post sufficientem digestionem cola. (*Huf.*)

Elixir pectorale anglicum. (*Ca.*)

℞. Scillae,
Radicis Inulae,
Iridis Florentinae, singularum uncias tres et drachmam unam.
Benzoës . . . drachmas duas.
Liquiritiae,
Anisi,
Myrrhae, singulorum drachmam unam et grana octodecim.
Gummi Ammoniaci
scrupulos duos.
Croci . . . grana septemdecim.
Aquae Vitae (12°)
libram unam et uncias sex.
Macera per dies quatuordecim, subinde agitando et filtra.

℞. Croci concisi . scrupulos duos.
Aquae Vitae uncias triginta duas.
Infunde per dies duos et adde
Radicis Liquiritiae,
Seminum Anisi,
singulorum semunciam.
Radicis Inulae,
— Iridis Florentinae,
singularum unciam unam.
Gummi Ammoniaci
drachmas duas.
Myrrhae . . . . semunciam.
Infunde iterum per dies duos et adde
Scillae . . . . unciam unam.
Benzoës . . . drachmas tres.
Digere per aliquot tempus et filtra. (*Vm.*)

℞. Radicis Inulae,
— Iridis Florentinae,
— Scillae,
singularum semunciam.
— Liquiritiae,
Seminum Anisi,
Florum Rhoeados,
singulorum drachmas duas.
Alcoholis . uncias quatuordecim.
Digere blando calore per dies quatuor. Praeterea digere in Alcoholis unciis tribus per eundem temporis decursum
Gummi Ammoniaci
drachmam unam.
Myrrhae . . . drachmas duas.
Benzoës . . . . drachmas tres.
Cola leviter exprimendo et colaturam utramque commisce. (Li.)

Reizend, bei Aſthma, Catarrhen, Huſten und Heiſerkeit empfohlen. — Gabe, vierzig bis ſechzig Tropfen.

D. Auszug durch Weineſſig.

Acetum Scillae s. scilliticum, Acidum aceticum scilliticum s. cum Scilla maritima. (A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pal. Pol. R. RC. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. *Br. C. Fi. Pid. Sp. Sw. T. Vm.*)

℞. Scillae praeparatae et minutim concisae . . . partem unam.
Aceti boni . . partes duodecim.
Digere blando calore per dies septem, cola fortiter exprimendo et filtra. (Bor. BorC. D. Han. O. Sax. Suec. *Br. Sp.*)

Br. Scillae partem unam cum dimidia, Aceti duodecim, et horas quadraginta octo infusionis; — Pal. Scillae unam, Aceti novem et dies quadraginta infusionis; — DD. Sar. et Wir. Scillae unam, Aceti octo et quatuordecim dies infusionis; — A. Hass. Li. R. et *Pid.* Scillae unam, Aceti sex et tres dies digestionis; — Bor4. Scillae siccatae uncias duas, Aceti destillati quantum satis ut post macerationem per triduum colatura post lenem expressionem sit unciarum octodecim.

℞. Scillae concisae . partem unam.
Aceti albi ferventis
partes undecim.
Acidi acetici . . partem unam.
Macera per dies octo, cola exprimendo et post tempus aliquot decantha. (Fenn.)

GalM. Scillae partes octo, Aceti rubri nonaginta duas, Acidi acetici (10°) unam et quatuordecim dies infusionis.

℞. Scillae concisae . uncias duas.
Aceti . . . uncias duodecim.

Digere blando calore, per dies octo, in vase tecto, cola exprimendo et colaturae adde

Alcoholis . . . unciam unam.

Sepone, decantha et serva. (B. Ba. Bel.)

HassP. Scillae siccatae et concisae uncias duas, Aceti Vini libras duas, octo dierum macerationem, Spiritus rectificatissimi sesquiunciam; — Ams. Scillae semilibram, Aceti libras quatuor, viginti quatuor horas macerationis blando calore et ad colaturam partem duodecimam Alcoholis (0,907); — Wür. Scillae semilibram, Aceti libras quatuor, quatuor dies-digestionis leni calore et tres uncias Alcoholis; — RC. Scillae siccatae et contusae drachmas duas, Aceti libras duas cum dimidia, macerationem per quatriduum et Alcoholis uncias tres; — Lus. Scillae libram unam, Aceti libras sex, sex dies macerationis, levem ebullitionem et Alcoholis semilibram; — His. Scillae libram unam, Aceti sex, viginti quatuor horas digestionis blando calore et tres uncias Alcoholis; — Gal. Scillae siccatae semilibram, Aceti rubri libras sex, Alcoholis (22°) unciam unam et quatuordecim dies macerationis; — Pol. Scillae unciam unam, Aceti libram unam et Alcoholis sesquiunciam; — *Sw.* Scillae libram unam, Aceti libras octo, duos vel tres dies digestionis blando calore et Aquae Vitae uncias octo; — *Vm.* Scillae partem unam, quatuor Aceti et Aquae Vitae duas; vel Scillae unam, Aceti duodecim, unam Aquae Vitae et octo dies frigidae macerationis; — Am. Du. et *C.* Scillae semilibram, Aceti Vini octarios tres et Alcoholis (0,840) uncias quatuor; — Lon. LonN. Scillae libram unam, Acidi acetici octarios sex, macerationem per horas 24 et Alcoholis (0,930) semioctarium; — Ed. Scillae unciam unam, Aceti uncias quindecim et Alcoholis (0,835 sesquiunciam; — Gen. Scillae uncias quatuor, Aceti libras duas, Aquae Vitae uncias tres; — Ful. Scillae uncias quatuor, Aceti libras quatuor et Aquae Vitae uncias duas; — Fer. Scillae libram unam, Aceti libras sex et Alcoholis uncias tres; — *Fi.* Scillae uncias sex, Aceti fortis libras quatuor, Alcoholis 24° uncias duas; — *T.* Squamarum interiorum siccatarum uncias duodecim, Aceti communis libras octo, Spiritus Vini 34° B. uncias quatuor, et Aceti radicalis pondus aequale, expone soli vel balnei vaporis calori in vase clauso per dies quindecim et filtra

℞. Radicis Scillae recentis libram unam.

Aceti gelu concentrati sesquilibram.

Digere per septimanam in vase tecto, saepius agitando, cola cum expressione et residuo infunde

Aceti gelu concentrati semilibram.

Exprime, sepone colaturas ambas commixtas, filtra et adde

Alcoholis (38°) . . uncias duas.

Misce bene. (An.)

Reizend, besonders bei chronischen sogenannten schleimigen Lungenübeln und bei Wassersuchten angewendet. Man benutzt diesen Essig auch in Gurgelwasser, bei Entzündung der Mandeln und in gewissen Fällen von beschwerlichem Schlingen. — Gabe, von fünf Tropfen bis zu einer Drachme, täglich zwei Mal, in irgend einem aromatischen Wasser oder in einer Emulsion mit Ammoniakgummi.

Syrupus Scillae acetosus, Oxysaccharum scilliticum. (Am. B*. Br. Ed. Han. Lon. RC. Wir. Wür. WW. *Br. C. Sw.*)

℞. Aceti scillitici . . libras duas.
Sacchari contusi . . libras tres.
Dissolve blandi caloris ope. (B*. Lon. Am. Ed. et *C.* Aceti partes quatuor et septem Sacchari; — Wür. Aceti unam cum dimidia, Sacchari tres cum dimidia; — *Br.* RC. Aceti duas et Sacchari tres cum dimidia.

℞. Aceti scillitici . . sesquilibram.
Cinnamomi,
Zingiberis,
singulorum unciam unam.
Digere per tres dies, cola et adde
Sacchari albi . uncias triginta.
Ebulliant semel et colentur. (Br. Han. Wir.)

℞. Aceti scillitici . . semilibram.
Syrupi Cinnamomi,
— Zingiberis,
singulorum libram unam.
Misce. (*Sw.*)

Potio expectorans. (E.)

℞. Syrupi Scillae . . semunciam.
Tincturae Opii camphoratae drachmas duas.
Vini stibiati . drachmam unam.
Gummi Arabici semidrachmam.
Aquae . . . . uncias duas.

Gabe, ein Kaffeelöffel alle Stunden oder zwei Stunden. — Dieser Trank ist besonders für Kinder.

Mel Scillae acetatum, Oxymel scilliticum, Mel Aceti Scillae s. Scillae maritimae. (A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. DD. Du. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han.

Post dies octo macerationis coque, exprime et adde

Cerae flavae . . libram unam.
Liqua in balneo aquae. (Wir.)
℞. Olei Bryoniae compositi libras quatuor.
Cerae albae . . libram unam.
Liqua lente. (His.)

Ein nicht sehr starkes Reizmittel, jedoch, wie man glaubt, nicht ganz unwirksam; auflösend, schmelzend, gegen Wassersucht.

Scolopendrium.

Scolopendrium officinale, Sm.; Hirschzunge; Scolopendre, Langue de cerf, Langue de boeuf (*Gal.*); Hierstongue (*Ang.*); Gelenj gazyk, Psany trank, Cetarak (*B.*); Hiortetongue (*D.*); Lengua de ciervo (*His.*); Hertstong (*Bel.*); Lingua di cervo (*I.*); Jaleni szczaw (*Pol.*); Lingua cervina (*Lus.*); Hiorttunga (*Suec.*).

Br. Fer. Gal. GalM. Gen. His. Wir. Wür. *Be. Br. M. Sp.* Z.

4 (Cryptogamia, L.; Filices, J.) Eine Südeuropäische Pflanze. (*Zorn* Ic. pl. t. 47.)

Man wendet das Kraut (herba Scolopendrii s. Linguae cervinae s. Phyllitidis s. Lonchitidis) an; es besteht aus langen, am untern Theile herzförmigen Blättern mit behaarten Stielen. Es hat einen adstringirenden Geschmack.

Scorzonera.

In den Pharmacopöen werden zwei Arten dieser Pflanzengattung angeführt:

1) *Scorzonera humilis, L.*; Waldscorzonere, Rattermilch; Scorzonère d'Allemagne ou de Bohême (*Gal.*).

Ams. Bor. Br. Fer. Ful. Gal. Han. Li. O. Wir. Wür. *Fi. M.*

4 (Syngenesia Polygamia Aequalis, L.; Synantherae, J.) Eine im nördlichen Europa wachsende Pflanze. (*Jacq. Austr. VI. t. 56.*)

Man wendet die Wurzel (radix Scorzonerae latifoliae sinuatae s. Serpentariae) an; sie ist geringelt, dick, holzig, außen schwarz, inwendig weiß; und enthält, im frischen Zustande, einen Milchsaft. Sie hat einen etwas bittern und herben Geschmack.

2) *Scorzonera Hispanica, L.*; Gartenscorzonere, Schlangengras, Schwarzwurz, Rattengras; Scorzonère d'Espagne, Salsifis noir (*Gal.*); Garden scorzonera (*Ang.*); Hadj mordowy koren (*B.*); Skorzonera (*D.*); Escorzonera (*His.*); Spanische Skorzonere (*Bel.*); Scorzonera (*I.*); Escorzoneira (*Lus.*); Skorzonera (*Suec.*).

Bor. Fer. Gal. Han. His. O. Sax. *Be. Br. Fi. Sp.* Z.

4 Eine Pflanze des gemäßigten und südlichen Europa's, welche in Küchengärten gezogen wird. (*Blackw.* t. 406. *Plenck* t. 592. Düss. off. Pfl. I. t. 7. *Zorn* Ic. pl. t. 405.)

Man wendet die Wurzel (radix Scorzonerae) an; sie ist lang, fingerdick, außen schwarz, inwendig weiß, mit ringförmigen Runzeln besetzt, und mit einem Milchsaft angefüllt, welcher ausfließt, wenn man in sie einschneidet. Man verkauft sie, abgeschabt und getrocknet, in länglichen, bräunlichrothgelben Stücken. Sie hat keinen Geruch; der Geschmack ist im frischen Zustande süßlich, bitter und mehlig, getrocknet bloß schleimig.

Reizend, harntreibend.

Extractum Scorzonerae. (Br.)

℞. Radicis Scorzonerae libram unam.
Aquae fontanae . . libras sex.
Macera per dies quatuor in loco calido tunc coque parumper; cola exprimendo et colaturam ad aptam consistentiam consume.

Decoctum Scorzonerae bezoardicum, Bezoardicum Curvi incompletum. (His.)

℞. Radicis Scorzonerae unciam unam.
Seminum Citri contusorum drachmas duas.
Aquae . . . . . libras sex.
Decoque ad librarum quatuor remanentiam, cola et adde

Pulveris bezoardici Chinae semunciam.
Mellis Sambuci . . uncias tres.

Gabe, vier Unzen.

Decoctum Scorzonerae bezoardicum solutivum, Bezoardicum completum s. purgans Curvi. (E.)

℞. Decocti Scorzonerae bezoardici libras quatuor.
Foliorum Sennae mundatorum semunciam.
Coque lente, cola et colaturae adde
Syrupi Rosarum pallidarum uncias sex.
Pulveris bezoardici Chinae semunciam.

Purgirend. — Gabe, vier Unzen.

Scrophularia.

In den Pharmacopöen finden sich zwei Arten dieser Pflanzengattung angezeigt:

1) *Scrophularia aquatica, L.*; Wasser-

braunwurz, Wasserkropfwurz; Scrofulaire aquatique (*Gal.*); Water figwort (*Ang.*); Escrofularia acquatica (*His.*); Water speenkruid (*Bel.*); Scrofularia acquatica (*I.*); Escrofularia dos rios (*Lus.*).

Gal. Gen. His. Wir. *M.*

♂ (Didynamia Angiospermia, L.; Scrophulariae, *J.*) Eine Pflanze, welche in ganz Europa an dem Ufer von Bächen wächst. (*Blackw.* t. 86. *Hayne* V. t. 36. Fl. méd. VI. 321.)

Man wendet das Kraut (herba Scrophulariae aquaticae s. Betonicae aquaticae s. Ficariae s. Gastrangulae) an; es besteht aus einem glatten, vierseitigen, ästigen Stängel mit entgegengesetzten, gestielten, eirunden, fast herzförmigen, gekerbten, grünen, glatten Blättern und hat einen unangenehmen und widerlichen Geruch und einen bittern, etwas scharfen, ekelhaften Geschmack.

2) *Scrophularia nodosa, L.*; knotige, gemeine Braunwurz, Feigwarzenwurz, Knollenwurz; Scrofulaire noueuse (*Gal.*); Knotty rooted figwort (*Ang.*); Swinsky neb Kyticnjkowy koren, Rozchodnjk, Aneb prutrznik (*B.*); Millemorbia, Ferraria, Castrangola (*I.*); Fredewnik (*Pol.*).

Br. Du. Fer. Gen. His. Wir. Würr. *Be. Br. C. Fi. M. Sp.* Z.

♃ (Didynamia Gymnospermia, L.; Scrophulariae, *J.*) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (*Blackw.* t. 37. *Plenck* t. 504. *Hayne* V. t. 35. *Zorn* Ic. pl. t. 28.)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an.

Die Wurzel (radix Scrophulariae s. Scrophulariae foetidae s. vulgaris) ist dick, weiß, knotig, von unangenehmem Geruch und bitterm, etwas scharfem Geschmack, welcher durch Trocknen sich etwas verliert.

Das Kraut besteht aus einem knotigen Stängel mit ganzen, eirunden, dreilappigen Blättern. Es hat keinen Geruch und einen bittern, ekelhaften Geschmack.

Oleum Scrophulariae. (*Vm.*)

℞. Herbae et Radicis Scrophulariae recentium . . . partes tres.
Olei Olivarum . partem unam.
Infunde et cola exprimendo.

Secale.

Secale cereale, L.; Roggen; Seigle commun (*Gal.*); Rye (*Ang.*); Rug (*D.*); Centeno (*His.*); Rog (*Bel.*); Segale (*I.*); Rez (*Pol.*); Sontejo (*Lus.*); Raeg (*Suec.*).

Ba. BorC. Bor4. Fer. Gal. Gen. His. RC. Suec. Wür. *Be. Br. G. M. Sp.* Z.

⊙ (Triandria Digynia, L.; Gramineae, *J.*) Eine Pflanze, welche ursprünglich in Creta und an den Ufern des Caspischen Meeres einheimisch seyn soll. (*Plenck* t. 46. *Lam.* Ill. t. 49. *Blackw.* Herb. t. 424. *Bert.* Bild. II. 15. f. 2.)

Man wendet den Saamen (semen Secalis s. Frumentum) an; er ist länglich, walzig, etwas spitzig und röthlich und wird besonders als Mehl (farina) benutzt.

Farinae resolventes. (*Sp.*)

℞. Farinae secalitiae,
— triticeae,
— Hordei,
— Fabarum,
singularum partes aequales.
Misce exacte.

Pulvis absorbens pro usu externo. (*B.*)

℞. Farinae Secalis unuias quatuor.
— Lupini . . . uncias octo.

Bei Rothlauf, Morgens und Abends die ergriffenen Theile damit zu bedecken.

An den Aehren einiger Getraidearten, besonders aber des Roggens, entwickelt sich eine Art Horn oder Sporn, welcher unter dem Namen

Secale cornutum; Mutterkorn; Ergot (*Gal.*); Spurred, horned rye (*Ang.*).

Am. Bor4. HassP. *C.*

bekannt ist. Es ist gewöhnlich krumm und langgestreckt, selten rundlich, zeigt meist drei stumpfe Ecken und Längsrunzeln, und hat eine violette Farbe mit verschiedenen Schattirungen. Die innere Substanz ist schmutzigweiß und fest, zerbricht glatt und mit Geräusch; der Geruch ist, wenn das Mutterkorn frisch und in großer Menge vorhanden ist, unangenehm, der Geschmack etwas beißend und widerlich. Es wird bis einen und anderthalb Zoll lang und zwei bis drei Linien dick.

Nach Decandolle ist es eine Art Schwamm, Sclerotium Clavus (Mém. du Mus. 1816 t. XIV. fig. 8.), nach Andern, und mit größerer Wahrscheinlichkeit, eine bloße krankhafte Ausartung des Ovariums der damit behafteten Grasarten, welche, nach Martin Field, durch den Stich einer Fliege verursacht wird, die darin eine schwärzliche Flüssigkeit zurückläßt, aber ihre Eier nicht in die Stichwunde legt. Dr. Winkler (Geiger's Mag. 1825 Nov.) nimmt ebenfalls eine thierische Excretion, z. B. Honigthau, als Ursache an.

Es enthält, nach Vauquelin, einen gelbfärbenden, einen andern violetten Stoff, ein weißes Oel, eine freie Säure, welche Phosphorsäure zu seyn scheint, freies Ammoniak und einen stickstoffhaltigen Stoff.

Ein Reizmittel, dessen Gebrauch schwere Zufälle, Starrkrampf, Brand der Glieder und den Tod hervorbringt. In kleinen Gaben scheint es Zusammenziehung des Uterus zu bewirken. Auch hat man es bei schweren Niederkünften in Folge der Unthätigkeit dieses Organs, oder bei Mutterblutflüssen von Mangel an Ton desselben empfohlen. Nach Hall (vergl. v. Froriep's Notiz. b. Nat. u. Heilk. Nr. 322.) wirkt es durch Einsaugung in die Blutmasse und Langsamermachen der Circulation, wodurch das Blut unfähig wird, den Uterus und Fötus länger zu erhalten. — Gabe, zehen bis dreißig Gran in sechs Unzen Vehikel.

Infusum Secalis cornuti. (B*.)

℞. Secalis cornuti semidrachmam.
Aquae bullientis uncias quatuor.
Infunde et cola. — Gabe, den dritten Theil, und nöthigen Falls nach vier und zwanzig Stunden diese Gabe zu wiederholen.

Decoctum Secalis cornuti. (B*. *Au.*)

℞. Secalis cornuti . unciam unam.
Aquae fontanae sesquioctarium.
Decoque ad octarii unius remanentiam. — Von mehreren Practikern dem Aufguß vorgezogen. — Gabe, ein Löffel alle Viertelstunden.

Potio partum accelerans s. ocytica. (*Pie.*)

℞. Secalis cornuti pulverati drachmam unam.
Syrupi Sacchari . . uncias tres.
Laudani liquidi . guttas viginti.
Essentiae Bergamottae quantum sufficit.

Sedum.

In den Pharmacopöen werden drei Pflanzen dieses Namens angeführt:

1) *Sedum acre*, *L.*; Katzentäublein, Mauerpfeffer, kleines Hauslauch; Vermiculaire brûlante, Poivre de muraille (*Gal.*); Wallpepper (*Ang.*); Netresk, Tucny muzjk neymensjj (*B.*); Helleknop (*D.*); Siempreviva menor, Uvas de gato (*His.*); Sherp huislock (*Bel.*); Sedo acre o minore, Vermicolaria, Erba pignuola (*I.*); Vermicularia (*Lus.*); Motodile (*R.*); Fetknoppar, Haellegraes (*Suec.*).

Ams. An. B. Ba. Bel. Br. Fer. Gal. Gen. His. Sax. Suec. Wir. *Be. Fi. G. M. Pid. Sp. Z.*

♃ (Decandria Pentagynia, L.; Crassuleae, *J.*) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (Fl. méd. IV. 209.)

Das Kraut (herba Sedi minoris s. Illecebri vermicularis) besteht aus einem glatten Stängel mit zerstreuten, eirunden, fast dreieckigen, kurzen, saftigen, hellgrünen, nahe aneinander stehenden Blättern, hat keinen Geruch, aber einen scharfen, beißenden, pfefferartigen Geschmack, welcher sich beim Trocknen verliert.

Innerlich reizend, Brechen und Purgiren erregend, äußerlich hautröthend.

2) *Sedum Rhodiola*, *L.*; Rosenwurzel, Rhodiserwurzel; Orpin rose (*Gal.*); Rosewort (*Ang.*); Rosenrod (*D.*); Roozenwortel (*Bel.*); Rodiola (*I.*); Rosenrot (*Suec.*).

Br. Gal. Wir. *Be. M. Sp.*

♃ (Dioecia Octandria, L.; Crassuleae, *J.*) Eine auf hohen Gebirgen Europa's wachsende Pflanze. (*Zorn* Ic. pl. t. 180.)

Man wendet die Wurzel (radix Rhodiolae s. Rosariae) an; sie ist ästig, weiß, fleischig und knollig, besonders am obern Theil. Sie hat einen sehr angenehmen Rosengeruch und einen etwas scharfen, styptischen Geschmack.

Schwach adstringirend.

3) *Sempervivum tectorum*, *L.*; großer Hauslauch, Hauswurzkraut; Joubarbe des toits, grande Joubarbe (*Gal.*); Great common houseleek (*Ang.*); Netresk, Tucny muzjk wettsj (*B.*); Huuslaeg (*D.*); Siempreviva de tejados (*His.*); Donderbaard, Huuslook (*Bel.*); Siempreviva, Orchiella, Barba di Giove (*I.*); Hazi zoeld (*M.*); Rozchadnik wielki (*Pol.*); Sempreviva (*Lus.*); Tschesnok dikoi (*R.*); Huuslaek (*Suec.*).

Ams. An. B. Bel. Br. Per. Ful. Gal. Gen. Ham. His. Li. O. R. Wür. *Be. Br. Fi. G. M. Sp.* Z.

♃ (Dodecandria Dodecagynia, L.; Crassuleae, *J.*) Eine Pflanze, welche in ganz Europa wächst. (Fl. méd. IV. 208.)

Man wendet das Kraut (herba Sempervivi s. Sedi majoris) an; es besteht aus einer Rose zarter, fleischiger, eirunder, spitziger, grüner, auf beiden Seiten glatter, an den Rändern behaarter Blätter. Der Geruch ist kaum merklich, der Geschmack wässerig, kühlend, herb, styptisch, wie salzig.

Gabe des Safts, zwei Unzen. — Aeußerlich zum Pflaster. (*Fi.*)

Cerevisia antiscorbutica. (B*.)

℞. Sedi acris . . manipulos octo.
Cerevisiae . . . . libras octo.
Decoque ad dimidii remanentiam. — Gabe Morgens nüchtern drei bis vier Unzen.

Syrupus Sedi majoris s. Sempervivi. (Wir.)

℞. Succi Sempervivi decoctione ad dimidium redacti uncias decem.
Sacchari albi . uncias sedecim.
Ebulliant semel et colentur. — Kühlend, beruhigend.

Unguentum leniens, Pomatum sedans. (*Ca. Sm.*)

℞. Succi Sedi majoris,
Olei Olivarum,
singulorum partes aequales.
Subige. (*Sm.*)

Ca. Succi, Axungiae, singulorum uncias tres et Olei Amygdalarum dulcium uncias quatuor.

Vortrefflich bei Hautreizung und, wie man behauptet, auch zur Stillung von mit Krebsschäden verbundenen Schmerzen.

Selinum.

In den Pharmacopöen werden drei Arten dieser Pflanzengattung angezeigt:

1) *Selinum Cervaria, Ro.*; Hirschwurz, Hirschheil, Hirschpeterſilie, Bergpeterſilie; Carotte de montagne, Persil de montagne (*Gal.*); Broad leaved spignel (*Ang.*); Gekruiste beerwortel (*Bel.*).

Wir. *Sp.*

♃ (Pentandria Digynia, L.; Umbelliferae, *J.*) Eine Pflanze, welche auf den Gebirgen Europa's wächſt. (*Jacq.* Aust. I. t. 69.)

Man wendet die Wurzel (radix Cervariae nigrae s. Gentianae nigrae) an; ſie iſt lang, dick, geringelt, außen ſchwärzlich, innen weiß. Sie hat einen angenehmen und ſtarken Geruch und einen gewürzhaften, beißenden Geſchmack.

2) *Selinum palustre, L.*; Sumpfälſenich, Milchpeterling, Sumpfpeterſilie; Persil des marais (*Gal.*); Marsh selinum (*Ang.*); Wandmerke (*D.*); Apio lechal (*His.*); Wilde eppe (*Bel.*); Finsk ingfaera (*Suec.*).

Br. Wir. *Sp.*

♂ oder ♃ Eine in Europa an ſumpfigen Orten häufige Pflanze. (*Jacq.* Austr. II. t. 152.)

Man wendet die Wurzel (radix Tyllelini s. Olsnitii) an; ſie iſt ſpindelförmig, äſtig, außen gelblich oder ſchwärzlich, innen weiß. Sie hat einen ſtarken, gewürzhaften und unangenehmen Geruch und einen ſtarken, etwas bittern und brennenden Geſchmack.

3) *Selinum Oreoselinum, Ro.*; Bergpeterſilie, Grundheil; Selin de montagne, Persil de montagne (*Gal.*); Divariated spignel (*Ang.*); Vilde quale rodder (*D.*); Apio de montana (*His.*); Bergselie (*Bel.*); Apio de montagna (*I.*); Opich gorny, Pietruszka gorna (*Pol.*); Apio di montanna (*Lus.*); Vild morat (*Suec.*).

Bor. Br. Gal. Han. Pol. Sax. Wir. *M. Sp.*

♃ Eine Europäiſche Pflanze. (*Hayne* VII. t. 3. *Zorn* Ic. pl. t 400.)

Man wendet die Wurzel, das Kraut und den Saamen an.

Die Wurzel (radix Oreoselini s Apii montani) iſt fingerdick, ſehr lang, faſerig, mit einer ſchwärzlichen Oberhaut bedeckt, unter derſelben weiß und in der Mitte gelblich. Sie hat einen angenehmen, gewürzhaften Geruch und einen gewürzhaften, bitterlichen Geſchmack.

Das Kraut beſteht aus einem runden, ſchwach geſtreiften, glatten, röthlichbraunen Stängel mit dreifach gefiederten, hellgrünen, glatten, aus lanzettigen Blättchen beſtehenden Blättern. Der Geruch iſt angenehm, der Geſchmack bitter und gewürzhaft.

Der Saame iſt eirund, platt, auf einer Seite glatt, auf der andern gefurcht, roth und mit einem weißen Rande umgeben. Er hat einen ſtarken Geruch und einen bittern Geſchmack.

Reizend, harntreibend, nervenſtärkend.

Tinctura Oreoselini. (*Sw**.)

℞. Foliorum recentium Oreoselini uncias duas.
Seminum Selini . unciam unam.
Aquae Vitae uncias quatuordecim.
Post aliquot dies infusionis cola.

Reizend, blähungtreibend; in Fällen empfohlen, wo es paſſend iſt, beſonders den Magen zu reizen. — Gabe, eine Unze zweimal täglich, nach der Mahlzeit.

Senecio.

Zwei Arten dieſer Pflanzengattung werden in den Pharmacopöen angeführt:

1) *Senecio vulgaris, L.*; gemeines Kreuzkraut; Seneçon ordinaire (*Gal.*); Common grundsel (*Ang.*); Kaasurt (*D.*); Hierba cuna (*His.*); Gemeen kruiskruid (*Bel.*); Senecione (*I.*); Przymietowe ziele (*Pol.*); Tarneirinha (*Lus.*); Krastownik (*R.*); Stonaert (*Suec.*).

Br Gal. His. Wir. *M. Sp.*

⊙ (Syngenesia Polygamia Superflua, L.; Synantherese, *Cass.*) Eine in ganz Europa ſehr gemeine Pflanze. (*Hayne* VIII. t. 10 Fl. méd. VI. 324.)

Man wendet das blühende Kraut (herba Senecionis s. Erigeri) an; es beſteht aus einem röhrigen, faſt glatten, äſtigen Stängel mit ſitzenden, abwechſelnden, umfaſſenden, am Rande behaarten, buchtigen, gezähnelten, unregelmäßigen, glatten Blät-

tern und einen sehr schlaffen, endständigen Strauß bildenden Blüthen. Es hat keinen Geruch, der Geschmack ist krautartig, etwas sauer und salzartig.

Nach Finazzi dient ein Eßlöffel des Safts zur Verhütung hysterischer Zuckungen, wenn man ihn vor dem Eintritt derselben reicht.

2) *Senecio Jacobaea, L.*; Jakobskraut, Jakobskreuzkraut; Jacobée (*Gal.*); Ragwoot (*Ang.*); Jacobskruid (*Bel.*).

Gal. *Sp.*

♃ Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (*Hayne* VIII. t. 11. *Oed.* Fl. Dan. t. 944.)

Man wendet das Kraut (herba Jacobaeae) an; es besteht aus leyerförmigen, doppeltgefiedertgespaltenen, gezähnten, glatten Blättern von unangenehmem, scharfem und bitterem Geschmack.

Tonisch.

Senna.

Senna; Séné (*Gal.*); Senna (*Ang.*); Suna (*Ar.*); Sena (*B.*); Sana pat (*Beng.*); Nilaverie (*Cy.*); Senet (*D.*); Sen (*His.*); Suna mukki (*Hin.*); Senne (*Bel.*); Sena (*I.*); Liscia, Senesowe (*Pol.*); Senne (*Lus.*); Amschunatlydivandiva, Buttallapotaka (*Sa.*); Nilaverei, Nilavaghei (*Tam.*); Nayla tungadu, Nela ponna (*Tel.*).

A. Am. Ams. An. B. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HasP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Würt. WW. *A. Be. Br. C. Fi. G. M. Par. Pid. Sa. Sp.* Z.

Man wendet unter dem Namen Senna in der Medicin Blätter und Früchte (Folia et Fructus) an.

A. Folia. Die im Handel vorkommenden Sennesblätter sind eine Mischung von Blättern dreier verschiedenen Pflanzen:

1) *Cassia obovata, Coll.* (Decandria Monogynia, L.; Leguminosae, *J.*), stumpfblättrige Senna-Cassie; Casse à feuilles obtuses (*Gal.*), ein Strauch Syrien's und Aegypten's. (*Hayne* IX. t. 43. C. obtusata) (Fl. méd. VI. 323. *Bert.* Bild. IV. 32. f. 1.) Diese Pflanze liefert die Senna von Sayd, Thebais, die stumpfblättrige Senna, die Senna der Armen, von Aleppo, der Barbarei, die Spanische, Italische (Sena belady, (*Ar.*), welche aus eirunden, am Grunde verschmälerten, kurz stachelspitzigen, unten schrägen, mit deutlichen Seitenrippen versehenen Blättchen besteht.

2) *Cassia lanceolata, Forsk.*; lanzenblättrige Senna-Cassie; Casse lanceolée (*Gal.*), ein Halbstrauch Nubiens und Sennaars (Encycl. méth. t. 88. fig. 3.), welcher die Nubische, Bicharische, spitzblättrige, Alexandrinische, Morgenländische, Aegyptische, Palthische (de la Palthe) und, nach Hayne, auch die Tripolitanische (Sena guebelly, Mekky, Lissan alasfour, *Ar.*) Senna liefert, deren Blättchen unten behaart, lanzettförmig und kurz stachelspitzig sind.

3) *Cynanchum Arghel, Del*; Arghel; Argel, Arghel (*Gal.*) ♄ (Pentandria Monogynia, L.; Apocyneae, *J.*), eine Pflanze Oberägypten's (*Nect.* Voy. en Haute-Egypte t. 3.), welche allein von der Französischen Pharmacopöe aufgenommen ist. Die Blätter, unter dem Namen Séné de la pique bekannt, sind eirundlanzettförmig, ganz, ledrig, weißlich, fast sitzend, zwölf bis vierzehen Linien lang und am Grunde regelmäßig, mit einer unten hervorstehenden Mittelrippe ohne Seitenrippen.

Seit dem J. 1821 ist auch eine Sorte Sennesblätter unter dem Namen der Indischen (folia Sennae indicae s. de Mokka) im Handel vorgekommen, die sich durch größere Länge, blaß gelblichgrüne Farbe ꝛc. unterscheiden. Sie sollen von Cassia elongata, *Lemaire*, nach Hayne von Cassia acutifolia, kommen. —

Außerdem findet man noch in der käuflichen Senna Reste von Stielen oder Zweigen, bisweilen auch Bälge oder Früchte, Reste von Blättern, Blüthen ꝛc., fremde Stoffe, und besonders Blätter vom Blasenstrauch (Colutea arborescens). Ihr Geruch ist ekelerregend, anhaltend, eigenthümlich und sehr widerlich; der Geschmack etwas bitter.

2) Fructus, folliculi Sennae. Es sind eirunde, längliche, zusammengedrückte, bogenförmig gekrümmte, gelbliche Hülsen oder Bälge ohne ihre vier oder sechs herzförmigen Saamen.

Die Senna enthält, nach Lassaigne und Feneulle, Chlorophyll, eine geringe Menge fettes Oel, Eiweiß, einen gelbfärbenden Stoff, Aepfelsäure, Kali- und Kalksalze und endlich einen eigenthümlichen Stoff, welcher den Grund ihrer Wirkung zu enthalten scheint, das Cathartin (Cathartina, Cathartinum).

Mit starken Säuren, kohlensäuerlichen Alkalien, Kalkwasser, salpetersaurem Silber, essigsaurem Blei, Brechweinstein und dem Aufguß der gelben China darf man sie nicht verbinden.

Es ist ein sehr kräftiges Purgirmittel, dessen Wirkung auf die Verdauungswege fast immer Ekel und Koliken veranlaßt. Man wendet sie selten in Pulver und dann zu einem Scrupel bis zu einer Drachme an.

§. I. Präparate, welche die Senna in Substanz enthalten.

Species purgantes. (*Huf.*)

℞. Foliorum Sennae drachmam unam.
Natri sulphurici . unciam unam.

Man läßt diese Species in drei Tassen Wasser kochen und nimmt von dieser Abkochung alle Stunden eine halbe Tasse.

Pulvis pectoralis. (B*)

℞. Foliorum Sennae,
Seminum Anisi,
Radicis Liquiritiae,
singulorum semunciam.
Sacchari crystallisati
uncias duas cum dimidia.

Von Frize gerühmt. — Gabe, ein Kaffeelöffel, täglich vier Mal.

Pulvis Liquiritiae compositus s. pectoralis s. Sennae cum Sulphure. (Bor. BorC. Bor. GalM. Han. Pol. *Au.*)

℞. Foliorum Sennae . semunciam.
Florum Sulphuris,
Seminum Anisi,
singulorum unciam unam.
Radicis Liquiritiae
uncias duas cum dimidia.

Misce. (BorC. GalM. *Au.*)

℞. Foliorum Sennae,
Radicis Liquiritiae,
singulorum uncias duas.
Seminum Foeniculi,
Florum Sulphuris,
singulorum unciam unam.
Sacchari albi . . semilibram.

Misce. (Bor. Han. HasP. Pol.)

Au. Sennae, Sulphuris, singulorum sesquidrachmam, Foeniculi, Liquiritiae et Sacchari Lactis, singulorum drachmam unam; — Bor. Sennae, Glycyrrhizae, singulorum uncias sex, Sacchari libras tres, Anisi uncias duas, Florum Sulphuris quatuor.

Gabe, ein Kaffeelöffel alle drei Stunden.

Pulvis Guajaci cum Senna s. antiictericus. (*Au.*)

℞. Foliorum Sennae,
Radicis Guajaci,
singulorum partes aequales.

Gabe, zwei Kaffeelöffel, zwei oder drei Mal täglich. — Soll mit großem Erfolg bei Gelbsucht angewendet worden seyn.

Pulvis laxans s. lenitivus tartarisatus s. Sennae compositus. (O. Wir. *Sw. Vm.*)

℞. Pulveris Foliorum Sennae,
— Anisi,
— Sacchari albi,
— Cremoris Tartari,
singulorum unciam unam.
Misce bene. (O.)

℞. Foliorum Sennae,
Cremoris Tartari,
singulorum unciam unam.
Cinnamomi,
Anisi,
Foeniculi,
singulorum drachmas duas.

Fiat pulvis. (*Sw.*)

Wir. Anisi et Foeniculi, singulorum semidrachmam.

℞. Foliorum Sennae partes sedecim.
Cremoris Tartari partes quatuor.
Foeniculi . . . . partes duas.
Cinnamomi,
Macidis, singulorum partem unam.

Misce. (*Vm.*)

Pulvis antiarthriticus purgativus s. Sennae compositus, Pulvis diasennae, Pulvis gregorianus. (Gal. GalM. Lon. LonN. Sar. Suec. Wir. *C. Vm.*)

℞. Foliorum Sennae . uncias duas.
Scammonii . . . unciam unam.
Cremoris Tartari uncias quatuor.

Pulverata seorsim deinde misce. (Fenn. Suec.)

℞. Foliorum Sennae,
Cremoris Tartari,
singulorum uncias duas.
Scammonii . . . . semunciam.
Zingiberis . . . drachmas duas.

Pulveratis scammonio et reliquis seorsim, pulveres commisce. (Lon. LonN. *C.*)

Vm. Sennae, Cremoris Tartari, singulorum partes octo, Scammonii duas et unam Zingiberis.

℞. Foliorum Sennae,
Cinnamomi,
Cremoris Tartari,
Gummi Arabici,
singulorum partes quatuor.
Ligni Guajaci,
Sarsaparillae,
Scammonii, singulorum partes duas.

Fiat pulvis tenerrimus. (GalM.)

Gal. eandem formulam, Chinae tamen partes duas addendo.

℞. Foliorum Sennae . sesquiunciam.
Cremoris Tartari,
Mechoacannae,
singulorum semunciam.
Rhei . . . . . drachmas duas.

Fiat pulvis. (Sar.)

℞. Sennae . . . . . scrupulos duos.
Cremoris Tartari
grana viginti quinque.
Zingiberis,
Jalapae,
Baccarum Juniperi,
singulorum grana quindecim.
Sacchari . . . . . semunciam.

Fiat pulvis. (Wir.)

Pulvis longae vitae s. ad longam vitam. (*Bo. Ca.*)

℞. Foliorum Sennae mundatorum,
Rasurae Ligni betulini,
singulorum libram unam.
Seminum Anisi,
— Portulacae,
singulorum libras duas.
Ligni Santali albi,
— — rubri,
singulorum semilibram.

Fiat pulvis. — Gabe, ein Kaffeelöffel auf ſechs Taſſen kochendes Waſſer, welches man mit Zucker verſüßt und Morgens nüchtern trinkt. — Ein mildes Laxirmittel.

Nodulus purgans. (*Sa.*)

℞. Herbae Trifolii,
— Fumariae,
singularum manipulum unum.
Radicis Pimpinellae albae
drachmas tres.
— Gentianae,
Cascarillae,
singularum semunciam.
Corticis Aurantii Curassavensis
drachmas sex.
Seminum Dauci,
— Anethi,
singulorum drachmas duas.
Rhei . . . . . semunciam.
Foliorum Sennae drachmas sex.
Salis cathartici amari uncias duas.

Bolus purgans. (*Sp.*)

℞. Pulveris laxantis
grana viginti quatuor.
Mellis . . . quantum sufficit.
Fiat bolus.

Pilulae tonicae et purgantes. (*Pie.*)

℞. Foliorum Sennae,
Radicum Scrophulariarum ambarum, singulorum unciam unam.
Hermodactylorum,
Radicis Angelicae,
Turpethi vegetabilis,
singulorum drachmas duas.
Scammonii . scrupulos quatuor.
Syrupi Rosarum pallidarum
quantum sufficit

ut fiat massa pilularis. — Gabe bis zwei Drachmen, nöthigenfalls mit Zuſatz von zwanzig Gran mercurii dulcis.

Passulae lavativae, Confectio passulata. (*D. Pal. Sar. Wir. Sp. Vm.*)

℞. Foliorum Sennae uncias quatuor.
Aquae communis libras quatuor.
Sacchari albi,
Passularum minorum,
singulorum libram unam.
Olei essentialis Citri guttas viginti.

Digere sennam in aqua bullicute et in colatura coque passulas; pulpam per cribrum setaceum trajice, illam cum saccharo ad plumam cocto blando igne ad electuarii consistentiam inspissa et refrigeratae adde oleum cum sacchari pauxillo contritum (Sar.)

Addendo hujus electuarii semunciae drachmam unam Pulveris Jalapae *Confectio passulata cathartica* (Sar) obtinetur.

℞. Cinnamomi . . . drachmas tres.
Foliorum Sennae . uncias duas.
Passularum minorum,
Sacchari,
singulorum libram unam.

Macera sennam in Aquae unciis quatuor; post sufficientem extractionem adde liquidi uncias octo et passulas bene mundatas submergendo, cum saccharo syrupum spissum para; syrupo adhuc calido adde passulas et ad refrigerationem usque agita. (*Vm.*)

Wir. et *Sp.* Sennae uncias quatuor, Aquae decem, Cinnamomi drachmas duas, Zingiberis albi sesquidrachmam, Sacchari et Passularum minorum, singulorum uncias duodecim; — Pal. Sennae uncias octo, Foeniculi semunciam, Cinnamomi drachmas duas, Aquae satis ut sesquilibra colaturae obtineatur, Sacchari ad plumam cocti sesquilibram et Passularum minorum mundatarum tantidem.

℞. Foliorum Sennae uncias quatuor.
Aquae communis uncias decem.
Coque, sub finem addendo
Cinnamomi . . drachmas tres.

Cola exprimendo, colaturam coque cum
Sacchari albi . . . libra una.
Syrupum colatum infunde
Passularum minorum libras uni.
Serva. (D.)

Eodem modo praeparatur *Confectio de Prunis s. diaprunum* (Sar. Wir. *Sp*) loco passularum Pruna Damascena in Aqua ad mollitiem usque cocta adhibendo.

Electuarium Sennae s. e Senna s. Sennae cum Pulpis s. Sennae compositum, Electuarium aperiens s. catholicum commune s. diaprunum s. eccoproticum s. lenitivum, Electuarium Tamarindorum, Confectio Sennae. (A. Am. Ams. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Ful. Gal. GalF. Gen. Han. HassP His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pal. Pol. Sar. Sax. Suec. Wir. WW. *C. Fi. Sp. T. Vm.*)

1) Ohne Weinſteinrahm.

℞. Radicis Polypodii querni
uncias quatuor.

Foliorum Sennae mundatorum
uncias duas.
— Mercurialis manipulos tres.
Aquae communis . uncias octo.
Macera sennam per horas sex in Aquae bullientis unciis duabus et cola; infunde polypodium in reliqua aqua et coquendo dimidium consume; adde deinde folia mercurialis; post brevem ebullitionem exprime et cola; in colatura coque
Prunorum dulcium enucleatorum
uncias sex.
Pulpam per cribrum setaceum trajice et tunc
℞. Hujus Pulpae,
Pulpae Tamarindorum,
— Cassiae,
Conservae Violarum,
singularum uncias sex.
Sacchari albi in Tinctura Sennae soluti et ad syrupum spissum cocti . . . . . libras duas.
Coque pulpas et syrupum igne blandissimo et continue agitando ad humidi superflui consumptionem usque; adde conservam et tunc pro quaque libra electuarii refrigerati
Pulveris Sennae mundatae
sesquiunciam.
Misce bene. (Sar.)
℞. Radicis Polypodii querni
uncias duas.
— Liquiritiae . semunciam.
Herbae Capilli Veneris Monspeliaci,
— Mercurialis,
singularum unciam unam
Florum Violarum . semunciam.
Hordei mundati,
Passularum minorum,
singulorum uncias duas.
Jujubarum,
Sebestenarum,
singularum unciam unam.
Aquae fontanae
libras duas cum dimidia.
Coque ad librae unius liquidi remanentiam et in colatura solve
Pulpae Cassiae,
— Prunorum,
— Tamarindorum,
Sacchari albi,
singulorum uncias sex.
Coque ad consistentiam electuarii et adde
Pulveris Foliorum Sennae
uncias tres cum dimidia.
Conserve Violarum uncias sex.
Misce exacte. (Br. *Sp.*)
℞. Uvarum Passarum enucleatarum
uncias duas.
Adianti nigri,
Florum Violarum,
Hordei mundati,
singulorum manipulum unam.
Jujubarum,
Sebestenarum, singularum no. 20.
Liquiritiae . . . . semunciam.
Prunorum enucleatorum,
Tamarindorum,
singulorum drachmas sex.
Foliorum Sennae,
Polypodii quercini,
singulorum uncias duas.
Mercurialis manipulum unum cum dimidio.
Aquae . . . quantum sufficit.
Coque ad consumptionem liquidi trientium duorum, cola et in colatura dissolve
Sacchari albi . . . uncias sex.
Coque ad aptam consistentiam et adde
Pulpae Cassiae,
— Prunorum,
— Tamarindorum,
Conservae Violarum,
singularum uncias sex.
Pulveris Foliorum Sennae
uncias tres cum dimidia.
Misce bene. (Pal.)
℞. Hordei integri,
Radicis Polypodii,
Passularum minorum,
Tamarindorum,
singulorum uncias duas.
Prunorum Damascenorum,
Jujubarum,
Foliorum recentium Scolopendrii,
singulorum sesquiunciam.
Liquiritiae rasae et contusae
unciam unam.
Foliorum Mercurialis
uncias quatuor.
Coque hordeum, donec dirumpatur, tunc polypodium contusum et denique reliquas substantias in Aquae sufficiente quantitate; coque itidem seorsim
Foliorum Sennae . uncias duas.
Decocta commixta coque ad unciarum quinque liquidi remanentiam et adde deinde
Sacchari albi
libras duas cum dimidia.
In syrupo ad aptam consistentiam cocto solve
Extracti Cassiae,
Pulpae Tamarindorum,
singulorum uncias novem
et tunc, commixtis
Pulveris Foliorum Sennae
uncias quinque.
— Foeniculi contusi,
— Anisi contusi,
singulorum drachmas duas.

Commisce spathulae ligneae ope. (Gal.)

℞. Liquiritiae . . unciam unam.
Radicis Polypodii,
Sennae mundatae,
singularum uncias duas.
Succi Mercurialis depurati
uncias octo.

Infunde, cola leviter exprimendo et in colatura dilue
Passularum minorum contusarum
uncias quatuor.

Solve deinde in massa
Sacchari crudi teneris
uncias quadraginta.

Cola syrupum calidissimum per pannum et ad consistentiam roob inspissato adde
Pulpae Prunorum uncias quatuor.
— Cassiae,
— Tamarindorum,
singularum uncias septem.

Ad electuarii consistentiam consume, sub finem, calore diminuto, addendo
Seminum Anisi,
— Foeniculi,
singulorum drachmas duas.

Pulvera et parumper cum una pulparum tere. (*Vm.*)

℞. Radicis Polypodii contusae
uncias sex.
Aquae . . . . . libras decem.

Coque, sub finem addendo
Foliorum Malvae unciam unam.

In colatura dissolve
Mellis . . . . . libras novem.

Fiat syrupus spissus, cui adde
Pulpae Prunorum sesquilibram.
Pulveris Sennae . libram unam.
— Anisi . . . uncias duas.

Misce. (His.)

℞. Radicis Polypodii uncias quatuor.
Aquae . . . . libras quatuor.

Coque ad duorum trientium liquidi circiter remanentiam, adde
Foliorum Sennae . uncias duas
et ab igne remove, post refrigerationem cola et in liquido solve
Sacchari albi . . . libras duas
et ad syrupi spissi consistentiam consume; syrupo adde
Pulpae Prunorum,
— Tamarindorum,
— Cassiae,
singularum uncias sex.

Massam, addendo
Foliorum Sennae subtilissime pulveratorum . . . uncias duas
ad requisitam consistentiam redige. (*T.*)

Fi. sub finem addit Foliorum Sennae uncias duas cum dimidia.

℞. Caricarum . . . . uncias sex.
Radicis Liquiritiae uncias duas.
Aquae . . . . libras quatuor.

Decoque ad dimidii remanentiam, cola exprimendo et colaturae adde
Sacchari albi . uncias sedecim.

In syrupo dilue
Pulpae Tamarindorum,
— Prunorum,
singulorum uncias quinque.
Pulveris Foliorum Sennae
uncias quatuor cum dimidia.
— Anisi . . . semunciam.

Misce bene. (Bor. Han. O. Pol.)

Bor4. Caricarum uncias octo ex Aquae libris quatuor ad dimidium coquere, exprimere, colare, decoctum ad uncias duodecim consumere, dissolvere in eo Sacchari uncias sedecim et syrupi immiscere Pulpae Tamarindorum uncias octo, Foliorum Sennae et Anisi stellati ut Bor. absque liquiritia et pulpa prunorum.

℞. Foliorum Sennae . uncias octo.
Coriandri . . . uncias quatuor.
Liquiritiae . . . . uncias tres.
Caricarum siccarum libram unam.
Pulpae Tamarindorum,
— Cassiae,
— Prunorum,
singulorum semilibram.
Sacchari albi
libras duas cum dimidia.

Tere sennam cum coriandro et cribra, separa pulveris uncias decem; residuum cum caricis et liquiritia in Aquae libris (octariis) quatuor ad duas decoque; cola exprimendo, quartam colaturae partem consume, adde saccharum et syrupo pulpas et tunc pulverem immisce. (Am. B. Bel. Ed. Gen. Lon. LonN. *C.*)

℞. Pulpae Prunorum libram unam.
— Tamarindorum uncias duas.
Syrupi Sacchari sesquioctarium.

Coque ad mellis consistentiam et adde
Pulveris Foliorum Sennae
uncias quatuor
et post refrigerationem
Olei essentialis Carvi
drachmas duas.

Misce sedulo. (Du.)

℞. Pulpae Prunorum,
— Tamarindorum,
singulorum unciam unam.
Pulveris Foliorum Sennae
drachmas duas.
— Foeniculi . . semunciam.

Misce triturando. (Li.)

℞. Pulpae Prunorum libram unam.
— Cassiae,
— Tamarindorum, singularum
uncias duas cum dimidia.

Pulveris Foliorum Sennae
uncias quatuor.
— Coriandri . . semunciam.
Syrupi Sacchari . libram unam.
Misce. (Ams.)

℞. Pulpae Tamarindorum
libram unam.
Pulveris Foliorum Sennae
uncias quatuor.
— Coriandri . . semunciam.
Syrupi Sacchari . uncias octo.
Misce bene. (Fenn. GalP. Suec.)

℞. Pulpae Prunorum . libras duas.
Pulveris Foliorum Sennae
uncias octo.
— Coriandri uncias quatuor.
Syrupi Rosarum solutivi
quantum sufficit.
Misce. (Lus. Wir.)

℞. Pulveris Seminum Anisi grana sex.
— Foliorum Sennae
drachmam unam.
Pulpae Tamarindorum
drachmas duas.
Syrupi Althaeae . drachmas sex.
Misce ex tempore. (HassP.)

℞. Roob Sambuci . unciam unam.
Pulveris Foliorum Sennae
drachmas duas.
Pulveris Anisi . semidrachmam.
Misce. (Ful.)

2) Mit Weinsteinrahm.

℞. Pulpae Tamarindorum partes octo.
Syrupi Rhei . . . partes sex.
Commisce et adde
Pulveris Foliorum Sennae,
— Cremoris Tartari,
singulorum partem unam.
Misce. (Sax.)

℞. Pulpae Prunorum sesquiunciam.
Foliorum Sennae pulveratorum,
Cremoris Tartari,
singulorum sesquidrachmam.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.
Misce. (B*.)

Ba. Pulpae Tamarindorum partes octo, Sennae, Cremoris Tartari, singulorum unam, Syrupi Sacchari quatuor; — D. Pulpae Tamarindorum duodecim, Sennae sex, Cremoris Tartari tres et Syrupi Mannae viginti quatuor.

℞. Pulpae Prunorum
partes viginti quatuor.
Foliorum Sennae pulveratorum
partes tres.
Cremoris Tartari partem unam.
Mellis puri . partes duodecim.
Misce. (BorC. WW.)

Sp. Pulpae Tamarindorum, Prunorum, singulorum partes octodecim, Roob Sambuci duodecim, Sennae sex, quatuor Cremoris Tartari et Mellis quantitatem sufficientem.

Alle diese Präparate sind mehr oder weniger purgirend. Man wendet sie häufiger in Klystir als auf eine andere Weise an, und in allen Fällen ist die Gabe nach der verschiedenen Menge der darin enthaltenen Senna verschieden. Die folgenden Electuarien unterscheiden sich von diesem fast nur durch den Namen.

Electuarium diatartareum. (B*.)

℞. Sennae mundatae,
Tartari albi cribrati,
singulorum sesquiunciam.
Mannae electae,
Sacchari albi,
singulorum unciam unam.
Zingiberis,
Anisi,
Cinnamomi,
Galangae,
singulorum drachmam unam.
Syrupi Rosarum solutivi
uncias quinque.

Gabe, eine Unze, vor der Mahlzeit, worauf man vier Unzen Fleischbrühe trinkt.

Man kann es auch auf folgende Weise bereiten:

℞. Sennae electae . . uncias sex.
Zingiberis,
Galangae,
singulorum drachmas tres.
Infusi Rosarum pallidarum
libras tres.

Infunde per horas viginti quatuor in balneo aquae tepido, in vase tecto, et coque; cola, clarifica et colaturae adde
Sacchari albi . . uncias octo.
Cremoris Tartari . semunciam.
Olei essentialis Anisi
semiscrupulum.
Misce. — Gabe, eine halbe bis zwei Unzen.

Conditum tamarindinaceum. (*Sw**.)

℞. Foliorum Sennae drachmas tres.
Cremoris Tartari sesquidrachmam.
Mannae,
Pulpae Tamarindorum,
singularum sesquiunciam.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.

Bei Hämorrhoiden und Blutbrechen empfohlen. — Gabe, drei Kaffeelöffel, zwei, drei oder vier Mal täglich.

Man kann auch zwei Drachmen Schwefel zusetzen, wo dann diese Marmelade sich nicht von der folgenden Latwerge unterscheidet.

Electuarium antihaemorrhoidale. (*Vm.*)

℞. Foliorum Sennae,
Florum Sulphuris,

Cremoris Tartari,
singulorum partem unam.
Mannae . . . . . partes sex.
Pulpae Tamarindorum partes octo.
Syrupi Sennae quantum sufficit.

Tere mannam primò cum Syrupi pauxillo, dein cum pulpae parte una, adde pulveres triturando commixtos, tunc reliquam pulpam et syrupi quantitatem sufficientem.

Electuarium lenitivum cum Sulphure (*Sp.*). Electuario lenitivo *Sp.* addatur Florum Sulphuris uncia una. — Zu einer halben Unze täglich mehrmals, gegen Krätze empfohlen.

Electuarium mundificans. (Li.)

℞. Pulveris Radicis Patientiae
uncias tres.
— — Rhei semunciam.
— Sassafras . . uncias duas.
— Foliorum Sennae
drachmas sex.
— Resinae Guajaci,
Florum Sulphuris lotorum
unciam unam.
Mellis despumati . libras tres.

Gabe, eine halbe bis ganze Unze.

Electuarium e Senna cum Carbone. (*Au.*)

℞. Electuarii e Senna uncias quatuor.
Natri subcarbonici,
Carbonis,
singulorum drachmas duas.

Gabe, eine halbe bis zwei Unzen, zwei oder drei Mal.

Electuarium purgans. (*B.*)

℞. Confectionis Sennae,
— Cassiae,
singularum uncias duas.
Cremoris Tartari drachmas tres.
Syrupi Rosarum quantum sufficit.

Gabe, einer Muskatnuß groß, stündlich, bei Verstopfung Schwangerer.

℞. Pulpae Tamarindorum
unciam unam.
Foliorum Sennae drachmam unam.
Cremoris Tartari unciam unam.
Mellis despumati quantum sufficit.

Auf zwei Mal zu nehmen.

Electuarium catholicum s. catholicum duplicatum s. de Rhabarbaro s. diacatholicon s. Rhei compositum. (Gal. Pal. R. Wir. Wür. *Br. Ca. Pid. Sp. Vm.*)

℞. Radicis Polypodii . uncias sex.
Aquae fontanae
uncias quadraginta octo.

Coquendo parte quarta liquidi consumpta, in colatura dissolve
Pulpae Cassiae,
— Tamarindorum,
singularum uncias quatuor.
Sacchari uncias quadraginta octo.

Coque blando igne ad mellis consistentiam; adde sensim
Pulveris Radicis Polypodii,
— — Rhei,
singulorum uncias duas.
— — Liquiritiae,
drachmas duas.
— Foliorum Sennae
uncias quatuor.
— Florum Violarum,
— Seminum Anisi,
singulorum uncias duas.

Misce. (Wir.)

℞. Radicis Polypodii . uncias octo.
Aquae fontanae
uncias nonaginta sex.

Decoque ad dimidium et colaturam cum
Quatuor Seminum frigidorum majorum, singulorum semuncia,
Seminum Violarum unciis duabus ad emulsionem tere, cola et in liquore dissolve
Sacchari albi
uncias quadraginta octo.
Syrupo, coquendo parato paulatim adde
Pulpae Cassiae,
— Tamarindorum,
Pulveris Rhei,
— Foliorum Sennae,
singulorum uncias quatuor.
— Anisi . . . uncias duas.
— Liquiritiae unciam unam.

Misce. (*Sp.*)

Pal. coquere jubet Polypodii semilibram in Aquae octo ad dimidii remanentiam, in colatura dissolvere Sacchari libras quatuor, cum syrupo cocto commiscere Pulpae Cassiae et Tamarindorum, singularum uncias quatuor, massae denique addere mixturam pulverulentam e Sennae unciis quatuor, Rhei duabus, Violarum et Anisi, singulorum tantidem, Polypodii unciis duabus et Quatuor Seminum frigidorum majorum, singulorum semuncia.

℞. Radicis Polypodii contusae
semilibram.
— Cichorii . . uncias duas.
— Liquiritiae unciam unam.
Foliorum Agrimoniae,
— Scolopendrii,
singulorum uncias tres.
Aquae . . . . . libras sex.

Coque blando igne ad tertiae partis remanentiam; adde
Seminum Foeniculi drachmas sex.
Cola et exprime, colaturam coque cum
Sacchari albi . . libris quatuor

ad syrupi spissi consistentiam. Ab igne remotis adde

Pulpae Cassiae,
— Tamarindorum,
Pulveris Rhei,
— Sennae,
singulorum uncias quatuor.
— Seminum Violarum
uncias duas.
— Liquiritiae rasae,
— Quatuor Seminum frigidorum, singulorum unciam unam.
— Seminis Foeniculi
semunciam.

Misce sedulo. (Gal. *Ca.*)

℞. Radicis Polypodii . uncias sex.
Herbae Malvae,
— Mercurialis,
— Parietariae,
— Violarum,
singularum manipulos duos.
Aquae fontanae uncias centum
quadraginta quatuor.

Coquendo tertia parte consumpta, in colatura dissolve

Mellis . . uncias nonaginta sex.

Coque ad syrupi consistentiam et adde

Pulpae Prunorum
uncias viginti quatuor.
Pulveris Polypodii,
— Rhei,
singulorum uncias quatuor.
— Liquiritiae . semunciam.
— Sennae . . uncias octo.
— Florum Violarum
uncias quatuor.
— Foeniculi,
— Quatuor Seminum frigidorum majorum,
singulorum unciam unam.
— Anisi . . uncias quatuor.

Misce bene. (*Sp.*)

℞. Pulveris Rhei,
— Sennae,
singulorum drachmas duas.
— Foeniculi . drachmas tres.
— Liquiritiae . semunciam.

Tere cum Syrupi pauxillo et adde

Pulpae Cassiae,
— Tamarindorum,
singularum uncias duas.
Syrupi Polypodii
quantitatem sufficientem.

Misce. (*Vm.*)

Br. Commiscere jubet mixturam pulveratam Rhei, Jalapae, Anisi, Foeniculi, singulorum unciam unam et Sennae uncias duas cum Pulpae Cassiae unciis duabus, Pulpae Tamarindorum tantidem et Syrupi Polypodii unciis triginta sex.

℞. Foliorum Sennae unciam unam.
Rhei . . . . . semunciam.
Seminum Anisi drachmas duas.
Pulpae Tamarindorum,
Roob Sambuci,
singulorum uncias quatuor.

Misce. (R.)

℞. Pulveris Sennae . uncias duas.
— Rhei,
— Cremoris Tartari,
singulorum semunciam,
— Anisi . . drachmas tres.
Pulpae Tamarindorum
sesquiunciam.
Mellis despumati libram unam.

Misce bene. (Wür.)

Pid. eandem formulam sed absque cremore tartari.

Electuarium lenitivum (R. Wür. et *Pid.*) unterscheidet sich nur durch den Zusatz der Rhabarber. Es ist, zu einer halben bis ganzen Unze genommen, purgirend. Auch verordnet man es in Klystir.

§. II. Präparate, welche den wirksamen Stoff der Senna ohne das zu seiner Ausziehung angewendete Vehikel enthalten.

Extractum Sennae (*aquosum*). Gal. His. Sar. Wir. *T. Vm.*)

℞. Foliorum Sennae mundatorum
semilibram.
Aquae fontanae . . libras tres.

Digere per horas viginti quatuor in loco calido, cola exprimendo et igne blandissimo consume. (Sar. Wir.)

Gal. Macerationes duas succedentes frigidas Sennae librae unius in Aquae libris quatuor et evaporationem colaturae utriusque commixtae in balneo aquae; — His. Macerationem per tres dies et levem bullitionem Sennae librae unius in Aquae libris sedecim et infusionem lentam infuso-decocti sepositione purificati; — *T.* Foliorum libram unam cum Aquae bullientis octo per horas viginti quatuor infundere; colare cum leni expressione, per pannum vel melius per chartam emporeticam filtrare et ad extracti consistentiam consumere.

℞. Foliorum Sennae mundatorum et concisorum . . quantum vis.

Superfunde Aqua frigida et macera per horas duodecim; adde deinde Aquae ferventis duplum frigidae, post refrigerationem cola absque expressione; residuo infunde dimidium ejusdem copiae Aquae ferventis et refrigerata cola; albuminis ope clarificata evaporent absque ebullitione ad extracti consistentiam. (*Vm.*)

Sal essentiale Sennae. (Gal.)

℞. Foliorum Sennae . libras duas.
Aquae frigidae libras duodecim.

Macera per horas viginti quatuor, subinde agitando, et cola; residuum maceretur cum Aquae libris octo et itidem coletur; colaturae commixtae in balneo aquae ad syrupi consistentiam evaporent, quem linearum duarum crassitie supra patinas effusum in balneo aquae vel in furno ad siccum consume et tunc squamas separa.

Extractum Sennae alcoholicum. (Wür.)

℞. Foliorum Sennae,
Alcoholis, singulorum libram unam.
Aquae communis . libras octo.

Digere blando calore per tres dies, cola exprimendo, sepone et decantha liquorem, et alcohole destillando separato, residuum ad aptam consistentiam consume.

Extractum solutivum. (Br.)

℞. Foliorum Sennae,
Rhei, singulorum uncias tres.
Cinnamomi,
Anisi, singulorum drachmam unam.
Tartari tartarisati sesquidrachmam.
Aquae fontanae . libram unam.

Digere per horas viginti quatuor blando calore in balneo aquae, cola levi cum expressione et liquorem ad extracti consistentiam consume.

§. III. Präparate, in denen der wirksame Stoff der Senna mit dem zu seiner Ausziehung angewendeten Vehikel enthalten ist.

A. Auszug durch Bier.

Cerevisia purgans. (*Ca. Vm.*)

℞. Allii . . . . . octarios viginti.
Sennae . . . . . uncias duas.
Summitatum Centaurii minoris,
— Absinthii,
singularum sesquiunciam.
Aloës Socotrinae drachmas duas.

Post sufficientem digestionem cola. (*Ca.*)

℞. Allii octarios quadraginta quinque.
Polypodii quercini libram unam.
Rhapontici,
Sennae mundatae,
Uvarum passarum,
singularum semilibram.
Foliorum Cochleariae,
— Salviae,
singulorum uncias sex.
Rhei,
Raphani,
singulorum uncias tres.
Fructus Aurantiorum concisos . no. 4.

Infunde et cola. (*Ca.*)

℞. Rhei . . . . . partes tres.
Coriandri . . . partem unam.
Rhapontici,
Sennae, singularum partes quatuor.
Polypodii . . . . partes octo.
Cerevisiae fortis partes ducentas quinquaginta sex.

Post plures dies macerationis cola absque expressione. (*Vm.*)

Cerevisia antiicterica. (*Vm.*)

℞. Curcumae,
Rhei, singulorum semunciam.
Corticis Aurantiorum,
Foliorum Sennae,
singulorum drachmas sex.
Seminum Dauci sylvestris unciam unam.
Foliorum Absinthii,
— Marrubii,
Florum Centaurii minoris, singulorum manipulum dimidium.
Cerevisiae fortis uncias sexaginta quatuor.

Macera per aliquot dies in cerevisiae octantibus septem et per pannum cola; faeces cum reliqua cerevisia ablue et itidem cola; colaturas commisce.

B. Auszug durch Wein.

Vinum s. Elixir Sennae. (*Suec.*)

℞. Foliorum Sennae uncias quatuor.
Coriandri,
Foeniculi,
singulorum drachmas duas.
Vini Hispanici libras duas cum dimidia.

Post tres dies digestionis adde
Uvarum passarum enucleatarum uncias tres.

Macera per horas viginti quatuor et cola exprimendo.

Vinum purgans et tonicum. (*Pic.*)

℞. Foliorum Sennae mundatorum unciam unam.
Rhei . . . . . drachmas sex.
Caryophyllorum,
Croci, singulorum drachmam unam.
Vini Hispanici . . octarios duos.

Infunde frigide per dies quinque vel sex, saepius agitando et supra faeces relinque.

Bei Krankheiten von Schwäche des Magens. — Gabe, Morgens nüchtern zwei bis vier Löffel.

Vinum antiictericum. (*Sw*. Vm.*)

℞. Foliorum Sennae,
Corticis Aurantiorum,
singulorum partes tres.

Rhei,
Curcumae, singulorum partes duas.
Foliorum Absinthii,
— Marrubii,
singulorum partem unam.
Vini Rhenani partes ducentas quinquaginta sex.
Infunde frigide per dies octo, cola leviter exprimendo et filtra. — Toniſch, ſchwach purgirend. — Gabe, zwei bis vier Unzen täglich drei Mal. —

Vinum amarum et diureticum, Vinum aperiens et purgans, Vinum purgans. (*Bo. Ca. Pie.*)

℞. Foliorum Sennae mundatorum unciam unam.
Agarici albi . sesquidrachmam.
Cremoris Tartari drachmas tres.
Radicis Scillae,
— Inulae,
Herbae Marrubii,
singularum uncias tres.
Radicis Iridis Florentinae uncias sex.
Zingiberis . . . scrupulos duos.
Vini . . . . . libras tres.
Infunde, cola et colaturae adde
Tincturae Gentianae drachmas tres.
Misce. (*Ca.*)

℞. Foliorum Sennae sesquiunciam.
Algarici albi . . drachmas duas.
Corticis Sambuci,
— Ebuli,
singulorum unciam unam.
Radicis Scillae,
— Inulae,
— Iridis Florentinae,
singularum semunciam.
Herbae Marrubii manipulum unum.
Zingiberis . . drachmam unam.
Vini . . . . . libras quatuor.
Post sufficientem digestionem cola. (*Pie.*)

℞. Foliorum Sennae,
Agarici albi,
Radicis Jalapae,
— Hellebori nigri,
— Iridis Florentinae,
singulorum drachmas duas.
— Inulae,
— Scillae, singularum uncias duas cum dimidia.
Corticis Winteri,
— Sambuci,
— Ebuli,
singulorum unciam unam.
Vini albi . . . libras quatuor.
Post frigidam infusionem cola. (*Ca.*)

Bo. Iridis, Sennae, singularum uncias duas, Inulae, Scillae, Sambuci, Ebuli, singulorum unam, Jalapae. Hellebori, Agarici, singulorum drachmas duas, Vini albi libras sex, horae quadrantem ebullitionis et deinde horas duodecim infusionis.

Gabe, eine bis zwei Unzen, Morgens und Abends.

C. Auszug durch Alcohol.

Tinctura Sennae. (*Huf.*)

℞. Foliorum Sennae . uncias duas.
Alcoholis . . . libram unam.
Post tres dies digestionis cola.

Tinctura Sennae s. Sennae composita s. aromatica, Elixir salutis, Tinctura cathartica. (Am. Ams. B^{r}. Bor4. D. Du. Ed. Gen. Han. Lon. LonN. Lus. Pal. Sax. Suec. Wir. *C. Ca Sw. Vm.*)

℞. Foliorum Sennae . . partes sex.
Cardamomi minoris partem unam.
Aquae Vitae partes quadraginta octo.
Infunde frigide per dies octo, cola exprimendo et filtra. (*Vm.*)

℞. Foliorum Sennae . libram unam.
Seminum Carvi . sesquiunciam.
Cardamomi minoris semunciam.
Alcoholis (0,930) . octarios octo.
Post quatuor dies digestionis cola. (B^{r}. Du.)

Vm. Sennae sesquiunciam, Carvi sesquidrachmam, Cardamomi semidrachmam et Aquae Vitae uncias sedecim; — Gen. Sennae uncias tres, Anisi drachmas tres, Cardamomi drachmam unam et Aquae Vitae libras duas.

℞. Foliorum Sennae uncias quatuor.
Seminum Carvi drachmas tres.
Cardamomi minoris drachmam unam.
Passularum minorum enucleatarum uncias quatuor.
Aquae Vitae libras duas cum dimidia.
Macera et filtra. (Han.)

Sw. Sennae sesquilibram, Carvi drachmas sex, Cardamomi drachmas duas, Passularum uncias octo et Alcoholis (0,930) libras quatuor, — Lon. LonN. Sennae uncias tres, Carvi drachmas tres, Cardamomi drachmam unam, Passularum uncias quatuor et Alcoholis (0,930) octarios duos; — Suec. easdem ingredientium quantitates et Alcoholis Aqua diluti uncias triginta duas; — Bor4. Foliorum uncias tres, Passulas majores ut Han., Spiritus Vini Gallici fortioris libras tres, caeterum ut Han. et quatuordecim dierum macerationem.

℞. Extracti Liquiritiae semunciam.
Aquae bullientis uncias quinque.
Dissolve et liquori adde
Foliorum Sennae . sesquiunciam.
Anisi . . . . . drachmas duas.

Alcoholis . . . uncias quinque.

Digere per dies duos, blando calore, saepius agitando, et cola. (*Sw.*)

℞. Foliorum Sennae . uncias duas
Radicis Jalapae . unciam unam.
Coriandri . . . . semunciam.
Alcoholis (0,935)
libras tres cum dimidia.

Digere per tres dies, filtra et colaturae adde

Sacchari albi . uncias quatuor.

Dissolve. (B*. Ed.)

Lus. Sennae uncias duas, Jalapae unam, Anisi stellati drachmas duas, Aquae Vitae libras tres cum dimidia, octo dies macerationis et in colatura solvere Sacchari uncias quatuor; — Am. B*. et *C.* Sennae uncias tres, Rhei unam, Coriandri dimidiam, Carvi tantidem, Cardamomi drachmas duas, Alcoholis (0,930) octarios quatuor cum dimidio et Sacchari uncias quatuor; — *Vm.* Sennae partes quatuor, Jalapae duas, Coriandri unam, Aquae Vitae septuaginta duas et Saccharo octo; — D. Sennae uncias duas, Jalapae semunciam, Alcoholis libras tres, Sacchari albi uncias quatuor absque coriandro.

℞. Foliorum Sennae . partes octo.
Rhei . . . . . partes quatuor.
Coriandri,
Corticis Aurantiorum,
singulorum partem unam.
Aquae Vitae
partes centum duodecim.

Infunde frigide per dies octo, exprime et filtra. (*Vm.*)

℞. Foliorum Sennae . uncias duas.
Passularum minorum semilibram.
Radicis Inulae,
Coriandri,
Anisi, singulorum unciam unam.
Aquae Vitae . . . . libras tres.

Macera per dies octo, subinde agitando et cola. (Am.)

℞. Foliorum Sennae . uncias duas.
Radicis Inulae,
— Liquiritiae,
— Rhei,
Seminum Anisi,
— Carvi,
— Coriandri,
singulorum unciam unam.
Passularum minorum enucleatarum
uncias quatuor.
Subcarbonatis Potassae
drachmas duas.
Aquae bullientis . libram unam.

Digere et refrigeratis adde

Alcoholis . . . . libras duas.

Stent in digestione adhuc per dies octo, tunc cum expressione colentur. (B*. Wir. *Sw.*)

Sax. infundere jubet Sennae partes tres, Radicis Inulae, Liquiritiae, Rhei, Anisi, Carvi, Coriandri, singulorum unam et Subcarbonatis Potassae partem quartam in Aquae bullientis duodecim, refrigeratis addere Alcoholis concentrati partes viginti quatuor, digerere blando calore per dies sex, colare exprimendo et filtrare.

℞. Foliorum Sennae uncias quatuor.
Radicis Inulae,
— Rhei,
singulorum uncias duas.
Subcarbonatis Potassae
sesquidrachmam.
Aquae bullientis . . libras tres.

Digere per tres horas in vase tecto, tum

℞. Ligni Guajaci,
Anisi,
Carvi,
Coriandri, singulorum uncias duas.
Aquae Vitae . . . uncias tres.

Infunde frigide per tres dies, cola exprimendo et colaturam cum praemonita commisce. (Pal.)

Ca. Sennae uncias duas, Guajaci unam, Inulae, Anisi, Carvi, Coriandri, Liquiritiae, singulorum drachmas sex, Passularum uncias quatuor et Aquae Vitae libras tres.

Alle dieſe Präparate wirken mehr oder weniger purgirend, je nach der Menge der in ihnen enthaltenen Senna. — Die Gabe iſt ſehr verſchieden, im Allgemeinen von zwei Drachmen bis eine Unze.

Haustus oleosus laxans, Potio laxans oleosa. (Vm.)

℞. Tincturae Sennae,
Olei Amygdalarum dulcium,
singulorum unciam unam.

Tinctura Sennae amara. (Sw.)

℞. Foliorum Sennae partes quatuor.
Radicis Gentianae,
Corticis Aurantiorum,
singulorum partem unam.
Aquae Vitae
partes sexaginta quatuor.

Infunde frigide per plures dies, saepius agitando, tunc exprime leviter et filtra.

Guttae cordiales Warneri. (Am. B*. *C. Par*)

℞. Foliorum Sennae drachmas duas.
Coriandri,
Foeniculi,
singulorum drachmam unam.
Coccionellae,
Croci,

Liquiritiae,
singulorum semidrachmam.
Passularum minorum enucleatarum semilibram.
Aquae Vitae . . octarios duos.

Infunde per dies sex, saepius agitando et cola; faecibus reaffunde Aquae Vitae octarium unum, post sufficientem extractionem cola et colaturas ambas commisce. (*C.*)

Am. Rheum omittit; — B*. et *Par.* Rhei unciam unam, Sennae semunciam, Croci drachmam unam, Liquiritiae drachmas quatuor, Passularum libram unam, Aquae Vitae octarios tres et octo dies digestionis.

Reizend und herzstärkend, bei den Engländern berühmt. — Gabe, vier oder fünf Löffel in irgend einer Tisane, alle halbe Stunden. Cox führt dieses Präparat unter dem Namen *Tinctura Sennae aromatica* an, welchen es auch in der Americanischen Pharmacopöe führt. Seine Formel unterscheidet sich kaum von einigen deren, nach welchen das elixir salutis bereitet ist.

Tinctura s. Elixir Daffyi. (B*. *Ca. Sw.*)

℞. Foliorum Sennae . uncias duas.
Rhei . . . . . unciam unam.
Foeniculi,
Baccarum Juniperi,
Guajaci, singulorum semunciam.
Sacchari albi . uncias quatuor.
Aquae Vitae . . . libras duas.

Digere per dies octo, saepius agitando et cola. (B*.)

Sw. eandem formulam, sed Aquae Vitae uncias quinque.

℞. Foliorum Sennae unciam unam.
Radicis Jalapae,
Coriandri,
Cremoris Tartari,
singulorum semunciam.
Sacchari . . . . . uncias sex.
Aquae Vitae semisextarios (demisetiers) tres.

Digere et filtra. — Gabe, eine bis drei Unzen. (*Ca.*)

Elixir polychrestum purgativum. (Br.)

℞. Foliorum Sennae mundatorum unciam unam.
Rhei . . . . . semunciam.
Corticis Citri,
Kali subcarbonici,
singulorum drachmas duas.
Alcoholis . . . uncias decem.

Post sufficientem extractionem cola exprimendo et colaturae adde
Resinae Jalappae drachmas decem.
Spiritus Cochleariae . uncias sex.

Elixir Raulini. (*Ca.*)

℞. Folliculorum Sennae,
Rhei,
Summitatum Absinthii vulgaris,
— Chamaedryos,
Radicis Gentianae,
Corticis Aurantii amari,
singulorum uncias duas.
Cascarillae,
Aloës Socotrinae,
singularum drachmam unam.
Aquae Vitae (15°) libras quatuor.

Infunde frigide per dies octo ad duodecim et filtra. — Purgirend, bei Scrophelleiden empfohlen. — Gabe, ein Eßlöffel vor der Mahlzeit.

D. Auszug durch Weineſſig.

Acetum laxans s. laxativum. (*Pie.*)

℞. Foliorum Sennae unciam unam.
Cremoris Tartari . semunciam.
Corticis Citri,
Anisi,
Cinnamomi,
singulorum semdrachmam.
Acéti . . . octarium dimidium.

Infunde per horas quadraginta octo. — Purgirend, besonders bei innern Blutflüssen des Darmcanals empfohlen, um das Blut auszuführen.

E. Auszug durch Molken.

Serum Lactis Weissii. (*Bo. Ca. Pie. Ra.*)

℞. Folliculorum Sennae,
Salis Epsomensis,
singulorum semidrachmam.
Summitatum florescentium Hyperici,
— Galii lutei,
singularum scrupulum unum.
Florum Sambuci quantum sufficit.

Infunde per horas duodecim in loco calido et cola. (*Pie.*)

Bo. et *Ca.* Galii lutei, Florum Sambuci, Hyperici, Tiliae, singulorum scrupulum unum, Sulphatis Sodae, Folliculorum Sennae, singulorum drachmam unam, Seri Lactis bullientis libram unam et post semihorae vel horae infusionem filtrare; — *Ra.* Summitatum Hyperici, Florum Sambuci, singulorum scrupulum unum, Sennae, Galii lutei, Salis Epsomensis, singulorum drachmam unam, Seri Lactis libram unam et horas duodecim infusionis.

Nach Zanetti iſt folgendes die einzige authentiſche Formel:

℞. Radicis Aristolochiae longae,
— Filicis maris,
Calendulae,
singularum uncias quatuor.
Foliorum Betonicae,
— Pervincae,
— Verbenae,

Florum Serpylli,
— Tiliae,
— Galii,
— Primulae veris,
— Daphnes Laureolae,
— Hyperici,
Visci querni,
Radicis Patientiae,
— Scrophulariae,
singulorum uncias duas.

Cuncta anni tempore apto collecta, mundata, sedulo siccata atque grossiuscule pulverata exacte commisceantur, tunc adde

Pulveris Foliorum Sennae mundatorum uncias sex et drachmas quatuor.

Gabe, zwei Drachmen mit einer Drachme Bittersalz, Abends und Morgens zu zwei Gläsern abgeklärten Molken gethan; man seiht den Trank vorher durch, trinkt ein Glas und nach zwei Stunden das andere, und in der Zwischenzeit einen Aufguß von Capillus Veneris.

Dieses Präparat galt als ein vorzügliches Mittel zur Vertreibung der Milch; man muß zwanzig und selbst dreißig Tage damit fortfahren; gegen den zehnten oder fünfzehnten Tag verschreibt man ein gewöhnliches Mittel, welches man am Ende der Behandlung wiederholt.

F. Auszug durch Wasser.

Infusum Sennae s. Sennae simplex (compositum Lon.). (Am. B*. DD. Du. Ed. Fenn. Lon. LonN. Lus. RC. Suec. *Br. C. Fi. Ra. T.*)

℞. Foliorum Sennae mundatorum drachmas sex.
Aquae bullientis . semilibram.

Macera per horam unam et cola. (B*. Fenn. Suec.,

DD. et *Ra.* Foliorum unciam unam et duodecim Aquae.

℞. Foliorum Sennae sesquiunciam.
Anisi stellati pulverati drachmam unam.
Aquae bullientis uncias sedecim.

Digere per horam unam in vase clauso et post refrigerationem cola. (Lus.)

RC. Anisi vel Foeniculi semunciam, Cremoris Tartari drachmas duas et Aquae libram; — *Fi.* Foliorum uncias sex, Anisi sesquiunciam, Cinnamomi drachmas duas, Aquae bullientis libras sex; — *T.* Sennae unciam unam, Anisi drachmas duas, Cinnamomi scrupulum unum, Aquae bullientis uncias sex, infusionem per horas octo.

℞. Foliorum Sennae drachmas sex.
Zingiberis pulverati semidrachmam.
Aquae bullientis uncias duodecim.

Post unam horam macerationis cola. (*Br.*)

Am. Lon. LonN. et *C.* Sennae sesquiunciam, Zingiberis drachmam unam et Aquae octarium unum; — Ed. Sennae drachmas sex, Zingiberis scrupulum unum et Aquae uncias novem; — Am. Cremoris Tartari drachmas duas addit.

℞. Foliorum Sennae drachmas tres.
Cardamomi minoris semidrachmam.

Aquae bullientis quantum sufficit ut colaturae unciae sex obtineantur. Stent in digestione per horam unam et post refrigerationem colentur. (Du.)

Laxirend, in Fällen von hartnäckiger Verstopfung, oder wenn man eine Ableitung auf den Darmcanal machen will.

Syrupus Sennae s. Cassiae Sennae. (B. Bel. Bor4. Du. Ed. Fer. HassP. Lon. LonN. *C. Fi. T. Vm.*)

℞. Foliorum Sennae mundatorum uncias octo.
Aquae bullientis libras quatuor.

Macera per horas duas, cola exprimendo et colaturae sepositione depuratae adde

Sacchari albi . . . libras tres.

Fiat blando igne syrupus. (B. Bel.)

Du. Sennae semunciam, Aquae ferventis libram unam, duodecim horas macerationis, Sacchari et Mannae, singulorum libram unam.

℞. Foliorum Sennae . uncias duas.
Aquae bullientis . sesquilibram.

Macera per horas quatuor in vase tecto, cola et adde

Sacchari liquidi (melasse) uncias octo.

Coque leni igne ad syrupi (melasse) consistentiam. (Ed.)

Fi. Sennae unciam unam, Aquae bullientis libram unam, infusionem per horas duodecim et Sacchari libram unam; — *T.* Sennae et Aquae eadem quantitates, infusionem ad ebullitionem usque et Sacchari duplum pondus.

℞. Foliorum Sennae,
Aquae frigidae, singulorum partem unam.

Macera per tres horas et adde

Aquae bullientis . . partes tres.

Post refrigerationem cola, leviter exprimendo, et adde

Sacchari albi . partes quatuor.

Inspissa et despuma. (*Vm.*)

℞. Foliorum Sennae . semunciam.
Aquae bullientis octarium unum.

Macera per horas duodecim et adde

Mannae,
Sacchari, singulorum libram unam.

Fiat syrupus. (*C.*)

℞. Foliorum Sennae . uncias duas.
Foeniculi contusi unciam unam.
Aquae bullientis octarium unum.
Post horam unam macerationis, blando calore, cola et adde
Mannae . . . . . uncias tres.
Sacchari . . . . libram unam.
Coque sufficienter. (Lon. LonN.)

Fer. Sennae uncias quatuor; Foeniculi drachmas duas, Aquae bullientis libras duas, Mannae uncias sex et Sacchari libras duas; — Bor4 loco foeniculi Anisi semunciam, digestionem per horas aliquot et in liquoris expressi et colati unciis viginti solvere Sacchari libras tres absque manna, caeterum ut Fer.

Infusum Sennae cum Succo Citri s. citratum. (Gen. Suec.)

℞. Foliorum Sennae drachmas sex.
Aquae bullientis . semilibram.
Macera per horam unam, cola et colaturae adde
Succi Citri . . . . semunciam.
Misce. (Suec.)

℞. Foliorum Sennae sesquiunciam.
Corticis recentis Citri,
Succi Citri,
singulorum unciam unam.
Aquae bullientis . libram unam.
Digere et post refrigerationem cola. (Gen.)

Decoctum Prunorum cum Senna. (A*.)

℞. Foliorum Sennae unciam unam.
Prunorum . . . . semilibram.
Aquae . . . . . libras duas.
Digere per noctem inter cineres calidos et cola.
Ein gelindes Larirmittel, welches von Lieutaud empfohlen wird.

Syrupus Pomorum s. de Pomis compositus s. solutivus. (Gal. Sar.)

℞. Succi Pomorum fermentati libras quatuor.
Foliorum Sennae mundatorum uncias quatuor cum dimidia.
Digere per noctem; altero mane cola exprimendo et adde
Sacchari albi . . . libras tres.
Clarifica et coque ad syrupi consistentiam. (Sar.)

℞. Foliorum Sennae mundatorum semilibram.
Seminum Foeniculi unciam unam.
Caryophyllorum drachmam unam.
Succi depurati Pomorum Reinette dictorum . . libras quatuor.
— — Boraginis,
— — Buglossi,
singulorum libras tres.
Infunde per horas viginti quatuor, tunc leviter coque, cola et exprime; residuum iterum coque cum
Aquae communis libris quatuor.
Ad dimidium evaporata cola exprimendo, colaturas ambas commisce et in iis solve
Sacchari albi . . libras quatuor.
Coque ad consistentiam syrupi, quem adhuc ferventem supra
Seminum Foeniculi,
Caryophyllorum,
singulorum sesquidrachmam linteo inclusa infunde et per horas sex digere (Gal.)

Decoctum antihaemorrhoidale. (*Vm.*)

℞. Foliorum Sennae unciam unam.
Aquae . . . . . uncias duas.
Post unam horam infusionis adde
Aquae . . . . uncias sedecim.
Calefac per temporis momentum, cola et colaturae adde
Passularum minorum,
Sacchari crudi,
singulorum uncias duas.
Anisi . . . drachmam unam.
Post refrigerationem cola et liquori sepositione depurato adde
Rhei,
Cremoris Tartari,
singulorum drachmam unam.

Syrupus Sennae compositus s. Rhei cum Senna. (Am. *C. Sw. Vm.*)

℞. Foliorum Sennae mundatorum uncias duas.
Rhei . . . . . semunciam.
Coriandri . . . drachmas duas.
Aquae bullientis uncias quatuordecim.
Infunde in vase tecto, post refrigerationem cola et colaturae adde
Mannae . . . uncias quatuor.
Sacchari albi . . uncias viginti.
Despuma et per cribrum setaceum trajice. (*Sw.*)

℞. Rhei,
Sennae, singulorum sesquiunciam.
Cardamomi . . drachmas tres.
Aquae bullientis octarium unum.
Digere per horas viginti quatuor et evaporatione ad dimidium consumptis adde
Sacchari . . . . libram unam.
Fiat syrupus. (Am. *C.*)

℞. Syrupi Sennae . partes quatuor.
— Rhei . . . partes duas.
— Cinnamomi partem unam
Misce (*Vm.*)

Infusum Sennae et Tamarindi s. compositum s. tamarindatum s. tamarindinatum s. cum Tamarindo. (Am. Du. Ed. Suec. *C. Fi. T.*)

℞. Foliorum Sennae drachmam unam.

Tamarindorum . unciam unam.
Coriandri . . drachmam unam.
Sacchari . . . . semunciam.
Aquae bullientis . uncias octo.
Macera, subinde agitando, per horas quatuor. (Am. Du. Ed. *C.*)

℞. Foliorum Sennae drachmas sex.
Aquae bullientis . semilibram.
Macera per horam unam, cola et colaturae adde
Pulpae Tamarindorum semunciam.
Dissolve. (Suec.)

Fi. et *T.* Folia et Pulpam cum Aqua bullientè (omnium copiam eandem ut Suec.) per horam infundere et filtrare jubent.

Aqua s. Potio laxativa s. Viennensis, Infusum laxativum simplex s. Viennense, Infusum Sennae compositum sine aromatibus s. Foliorum Cassiae Sennae compositum, Decoctum laxativum Viennense, Infusum Sennae tartarisatum s. cum Manna, Ptisana laxativa s. passulata, Infusum Sennae laxativum s. purgans, Tisana regia. (A. Am. An. Ba. Bor. BorC. Bor4. Br. D. DD. Fer. Pul. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. HassP. Li. Lus. Pal. RC. Sar. Sax. Suec. *Bo. C. Ca. E. Fi. FarC. Sa. Sp. Sw. T. Vm.*)

1) Ohne ein Salz.

℞. Foliorum Sennae partem unam.
Aquae bullientis . partes octo.
Infunde per semihoram, tunc in infuso dissolve
Mannae . . . . partem unam.
Ham. bis coquere jubet Sennae partes tres in Aquae triginta sex et colaturis ambabus addere Mannae partes octo; — Sax. infundere Sennae partem unam in Aquae octo et addere Mannae partem unam cum dimidia.

℞. Foliorum Sennae drachmas tres.
Mannae . . . . uncias duas.
Fructum Citri . . . . no. 1.
Aquae tepidae . . uncias octo.
Infunde per horas duodecim et cola. (Fer.)

℞. Foliorum Sennae drachmas sex.
Cardamomi minoris
drachmas duas.
Aquae bullientis octarium unum.
Infunde per semihoram et cola. (*E.*)

℞. Foliorum Sennae drachmas sex.
Mannae . . . . unciam unam.
Rhei,
Cardamomi minoris,
singulorum drachmas duas.
Aquae bullientis octarium unum.
Infunde per horam unam. (*E.*)

℞. Foliorum Sennae sesquiunciam.
Coriandri . . . drachmas duas.
Aquae communis uncias sedecim.
Digere per horam unam, ignem fere ad bullitionem usque augendo; cola et in unciis quatuordecim colaturae dissolve
Mannae . . . uncias quatuor.
Cola, sepone et sedulo decantha. (An.)

℞. Foliorum Sennae drachmas duas.
Passularum minorum semunciam.
Corticis Aurantiorum
scrupulos duos.
Aquae bullientis . . uncias sex.
Ebulliant semel, tunc per sexagesimas decem digesta, leni cum expressione colentur. (Ful.)

℞. Sennae . . . . uncias duas.
Mannae . . . uncias quinque.
Aquae bullientis
uncias viginti octo.
Digere blando calore, per horas sex, cola et colaturae adde
Aetheris sulphurici drachmas duas.
Misce bene. (Li.)

2) Mit Weinsteinrahm.

℞. Foliorum Sennae . uncias duas.
Cremoris Tartari . . semunciam.
Aquae bullientis . . libras duas.
Macera per horas sex et cola leviter exprimendo. (Sar.)

℞. Foliorum Sennae drachmas sex.
Cremoris Tartari drachmam unam.
Aquae bullientis . . uncias sex.
Post horae quadrantem infusionis cola exprimendo et in colatura solve
Mannae electae . unciam unam.
Sepone et decantha. (A.)

℞. Foliorum Sennae drachmas tres.
Cremoris Tartari drachmam unam.
Anisi stellati . semidrachmam.
Aquae bullientis . . uncias sex.
Digere per horam unam, cola et colaturae adde
Mannae . . . . uncias duas.
Dissolve blando igne, sepone et decantha. (Lus.)

RC. Foliorum sesquiunciam, Anisi vel Foeniculi semunciam, Cremoris drachmas duas, Aquae libram unam, absque manna; — Fer. Sennae drachmas tres, Cremoris Tartari drachmam unam, Anisi stellati scrupulum unum, Aquae uncias sex et Mannae unciam unam; — Am. et *C.* Sennae sesquiunciam, Cremoris Tartari drachmas duas, Zingiberis drachmam unam et Aquae bullientis octarium unum; — *Fi. T.* Foliorum drachmas sex, Cremoris unam, Aquae bullientis uncias sex, post 1, 5 vel 20 sexagesimas infusionis, filtrare, addere Mannae unciam unam, et clarificare albuminis ope.

℞. Foliorum Sennae drachmas tres.
Cremoris Tartari drachmam unam.

Passularum minorum
drachmas tres.
Zingiberis albi scrupulum unum.
Aquae bullientis uncias quatuor.
Post horas viginti quatuor digestionis cola exprimendo et in colatura solvé
Mannae electae . unciam unam.
Clarifica albuminis ope. (Wir.)

℞. Foliorum Sennae . uncias tres.
Passularum minorum sesquiunciam.
Coriandri . . . drachmas duas.
Cremoris Tartari . semunciam.
Aquae bullientis
libras duas cum dimidia.
Macera per horam unam, cola exprimendo et colaturae adde
Mannae electae . . uncias octo.
Solutionem iterum cola. (Hun.)

HuseP. Sennae partes sex, Passularum tres, Cremoris unam, Coriandri dimidiam, Aquae fervidae sexaginta octo et Mannae sedecim; — Pal. Wir. *Ca. Sp.* et *Vm.* eandem indicant formulam, sed Radicis Polypodii drachmas tres addunt.

3) Mit Weinsteinkali.

℞. Foliorum Sennae sesquiunciam.
Zingiberis,
Corticis Citri,
singulorum drachmam unam.
Aquae communis uncias duodecim.
Alcoholis tenuis uncias quatuor.
Macera per dies octo, subinde agitando, cola et singulis unciis tribus adde Mannae unciam unam, vel Tartratis Potassae sesquidrachmam, vel Electuarii Scammonii drachmam unam. (*Sa.*)

℞. Foliorum Sennae
drachmas tres ad quatuor.
Cardamomi minoris
drachmam unam.
Tartratis Potassae drachmas sex.
Aquae bullientis . . uncias sex.
Digere per horas duas et colaturae adde
Syrupi Sacchari unciam unam.
Misce bene. (*Sw.*)

℞. Foliorum Sennae sesquiunciam.
Passularum minorum
drachmas sex.
Coriandri . . . drachmas duas.
Tartratis Potassae
drachmas quinque.
Aquae bullientis
uncias viginti quatuor.
Post aliquot horas digestionis coque leviter, cola exprimendo et colaturae unciis quatuordecim adde
Mannae . . . uncias quinque.
Cola iterum. (D. Suec.)

Br. Sennae sesquiunciam, Passularum tantidem, Coriandri, Tartari solubilis, singulorum semunciam et Mannae uncias quatuor.

℞. Foliorum Sennae drachmas sex.
Corticis recentis Citri,
Tartratis Potassae,
singulorum drachmas tres.
Succi Citri . . . semunciam.
Aquae bullientis . uncias octo.
Post refrigerationem cola et colaturae adde
Mannae electae drachmas decem.
Solutionem iterum cola et adde
Aetheris sulphurici guttas octo.
Misce bene. (Wür.)

4) Mit weinsteinsaurem Natron.

℞. Foliorum Sennae . semunciam.
Aquae bullientis uncias quatuor.
Post horam dimidiam cola exprimendo et in colatura solve
Tartari natronati drachmas duas.
Mannae . . . . drachmas sex.
Cola iterum. (Bor.)

Bor4. Tartari natronati semunciam et Elaeosacchari Citri drachmam unam.

5) Mit Glaubersalz.

℞. Foliorum Sennae drachmas duas.
Aquae bullientis uncias quatuor.
Post horam dimidiam cola exprimendo et in colatura solve
Natri sulphurici drachmas sex.
Mellis puri . . . semunciam.
Cola iterum. (BorC. WW.)

℞. Foliorum Sennae,
Sulphatis Sodae,
singulorum drachmas quatuor.
Anisi . . . . drachmam unam.
Infusi calidi Cichorii
octarium unum.
Post horas duodecim infusionis cola. (*ParC.*)

℞. Foliorum Sennae,
Sulphatis Sodae,
singulorum semunciam.
Anisi,
Coriandri,
singulorum drachmam unam.
Foliorum concisorum Cerefolii,
— — Pimpinellae,
singulorum semunciam.
Aquae frigidae . . libras duas.
Fructum Citri in taleolas concisum
no. 1.
Macera per horas viginti, subinde agitando; cola leviter exprimendo et filtra. (Gal.)

℞. Tamarindorum . . uncias duas.
Foliorum Sennae,
Sulphatis Sodae,
singulorum drachmas quatuor
Anisi,

Coriandri,
Cerefolii,
Pimpinellae,
singulorum pugillum unum
Aquae bullientis octarium unum.
Infunde per semihoram et cola. (*Bo. Ca.*)

℞. Foliorum Sennae partes quindecim.
— Cichorii partes decem.
Sulphatis Sodae
partes decem vel viginti.
Aquae bullientis quantum sufficit.
Post horas aliquot infusionis cola exprimendo et adde
Aquae Citri aromaticae
partes triginta.
Misce bene. (GalM.)

℞. Infusi Foliorum Sennae
uncias octo.
Sulphatis Sodae vel Magnesiae
drachmas tres.
Mellis crudi . . drachmas duas.
Liqua. (DD.)

6) **Mit Bittersalz.**

℞. Passularum minorum uncias duas.
Foliorum Sennae . semunciam.
Aquae . . . . quantum sufficit ut libra una decocti vel infusi obtineatur; colaturae adde
Salis cathartici amari semunciam.
Dissolve. (Gen.)

Alle diese Aufgüsse führen, je nach den verschiedenen Fällen oder der Anwendungsweise gelinder oder stärker ab. Die Gabe ist je nach den Formeln verschieden, im Allgemeinen von drei bis sechs Unzen. Auch die folgenden gehören eigentlich hierher.

Potio purgans s. laxans. (Gal. GalM. Hass. HassP. Li. Wür. *Au. Bo. Huf. Pie. Ra. Sa. Sm. Sw.*)

1) **Ohne ein Salz.**

℞. Foliorum Sennae . semunciam.
Aquae bullientis quantum sufficit ut semilibra colaturae obtineatur. Post horae quadrantem infusionis adde
Tincturae Aurantiorum, (sesquidrachmam HassP.)
Syrupi Cerasorum,
singulorum semunciam.
Misce bene. (Hass. HassP.)

℞. Foliorum Sennae drachmas sex,
Aquae frigidae quantum sufficit ad humectanda folia. Post horas duas adde
Aquae bullientis quantum sufficit ut exprimendo colaturae unciae sex obtineantur; cola liquorem refrigeratum et adde
Syrupi Sacchari . unciam unam.
Tincturae Corticum Aurantiorum
semunciam.
Misce. (*Sw.*)

℞. Infusi Sennae . . . uncias tres.
Aquae Piperis Jamaicensis
semunciam.
Syrupi Rhamni . unciam unam.
Misce. (*Sa.*)

℞. Mannae uncias duas cum dimidia.
Folliculorum Sennae drachmas duas.
Tamarindorum . . semunciam.
Florum Persicae pugillum unum.
Aquae fontanae . vitrum unum.
Infunde. (*Pie.*)

℞. Foliorum Sennae drachmam unam.
Rhei . . . . . semidrachmam.
Florum Persicae semipugillum,
Decocti Polypodii querni
uncias octo.
Coque leviter, cola exprimendo et colaturae adde
Mannae . . . . . uncias duas.
Solutionem iterum cola. (*Pie.*)

℞. Mannae uncias duas cum dimidia.
Folliculorum Sennae
drachmas duas.
Tamarindorum . drachmas sex.
Florum Persicae pugillum unum.
Corticis Aurantii amari
semidrachmam.
Coffeae Mokkaënsis drachmas duas.
Aquae fontanae quantum sufficit.
Fiat infusum. (*Pie.*)

2) **Mit weinsteinsaurem Kali.**

℞. Foliorum Sennae . semunciam.
Foeniculi . . drachmam unam.
Aquae . . . . quantum sufficit ut infusi unciae duae cum dimidia obtineantur; colaturae adde
Mannae . . . . unciam unam.
Cremoris Tartari drachmam unam.
Dissolve. (*Au.*)

℞. Sennae mundatae,
Rhei,
Cremoris Tartari,
singulorum drachmam unam.
Aquae . . . quantum sufficit.
Coque ad unciarum quatuor colaturam et adde
Mannae . . . . sesquiunciam.
Infusi Florum Persicae
unciam unam.
Misce bene. (*Pie.*)

℞. Corticis Aurantii siccati,
Foliorum Sennae,
singulorum drachmam unam.
Cremoris Tartari drachmas duas.
Salis cognetti . . drachmas sex.
Aquae communis . uncias octo.
Digere, blando calore, per horam unam et adde
Pulpae Tamarindorum uncias duas.
Cola exprimendo. (*Sa.*)

℞. Sennae,

Tartratis Potassae et Sodae,
singulorum drachmas duas.
Mannae . . . . uncias duas.
Aquae . . . . uncias quatuor.
Fiat infusum, cujus colaturae, pro re nata, adde Chinae drachmam unam, Syrupi Florum Persicae unciam unam vel Jalapae pulveratae grana octo. (*Ra.*)

℞. Rhei . . . . drachmam unam.
Foliorum Sennae drachmas duas.
Salis Seignetti . . semunciam.
Aquae . . . . quantum sufficit ut decocti unciae sex obtineantur; colaturae adde
Mannae . . . . . uncias duas.
Dissolve. (*Au.*)

℞. Foliorum Sennae drachmas sex.
Corticis recentis Citri,
Tartratis neutralis Potassae,
singulorum drachmas tres.
Succi Citri . . . . semunciam.
Rhei . . . . . drachmas duas.
Aquae bullientis . . uncias octo.
Infunde et post refrigerationem cola; colaturae adde
Mannae . . . drachmas decem.
Solutionem cola et adde
Aetheris sulphurici . guttas octo.
Misce bene. (Wür.)

3) Mit Bitterſalz.

℞. Folliculorum Sennae,
Sulphatis Magnesiae,
singulorum drachmas duas.
Tamarindorum . . semunciam.
Mannae . . . . . uncias duas.
Aquae . . . quantum sufficit ut infusi vitrum unum obtineatur. (*Bo.*)

℞. Foliorum Sennae drachmas duas.
Aquae bullientis . . uncias tres.
Post horam unam macerationis colaturae adde
Sulphatis Magnesiae drachmas tres.
Tincturae Sennae . semunciam.
Misce bene. (*Sw.*)

℞. Sennae . . . . drachmas tres.
Sulphatis Magnesiae semunciam.
Mannae uncias duas cum dimidia.
Succi Citri . . drachmam unam.
Aquae . . . . . uncias octo.
Fiat infusio. (*Ra.*)

℞. Sennae mundatae drachmas duas.
Salis Epsomensis drachmas tres.
Aquae . . . . . vitrum unum.
Infunde per semihoram inter cineres calidos et sub finem adde
Mannae uncias duas cum dimidia.
Essentiae Citri quantum sufficit.
Misce. (*Pie.*)

℞. Sennae mundatae drachmas duas.
Rhei . . . . drachmam unam.
Salis Epsomensis drachmas tres.
Florum Persicae . pugillos duos.
Mannae . . . . uncias duas.
Aquae . . . . quantum sufficit.
Fiat infusio. (*Pie.*)

℞. Folliculorum Sennae,
Salis Epsomensis,
singulorum drachmas duas.
Mannae uncias duas cum dimidia.
Tartari stibiati . granum unum.
Aquae . . . quantum sufficit.
Fiat infusio. (*Pie.*)

4) Mit Glauberſalz.

℞. Foliorum Sennae drachmas duas.
Sulphatis Sodae . . semunciam.
Syrupi Rhamni . unciam unam.
Aquae . . . . uncias quatuor.
Fiat infusio. (GalM. *Ra.*)

℞. Sennae mundatae drachmas duas.
Sulphatis Sodae
drachmas duas cum dimidia.
Mannae . . . . . uncias duas.
Infusi Cichorii . . . uncias sex.
Fiat infusio. (*Ra.*)

℞. Foliorum Sennae drachmas duas.
Aquae . . . . uncias quatuor.
Paullulum coque et colaturae adde
Sulphatis Sodae . unciam unam.
Syrupi Ribium . . uncias duas.
Misce. (Li.)

Huf. Sennae drachmas duas, Aquae bullientis uncias quatuor, horae quadrantem infusionis, Sulphatis Sodae semunciam et Mannae tantdem.

℞. Sennae mundatae,
Sulphatis Sodae,
singulorum drachmas duas.
Aquae bullientis . vitrum unum.
Colaturae adde
Mannae in lacrymis uncias duas.
Syrupi Cichorii compositi
unciam unam
et post refrigerationem
Essentiae Anisi . . guttas tres.
Misce. (*Sm.*)

℞. Foliorum Sennae . uncias duas.
Sulphatis Sodae . drachmas duas.
Aquae . . . . uncias quatuor.
Pulveris Jalapae
grana viginti quatuor.
Infunde et colaturae pulverem adde. (*Ra.*)

℞. Sennae mundatae drachmas duas.
Subcarbonatis Sodae crystallisati
semidrachmam.
Aquae destillatae . . uncias sex.
Infunde frigide per horas duodecim, cola et adde
Acidi sulphurici guttas viginti ad viginti quatuor.
Post effervescentiam adde
Syrupi de Cichorio compositi
uncias quatuor.
Jalapae pulveratae cum duplo Sacchari contritae grana duodecim ad viginti quatuor.

Aquae Cinnamomi quantum sufficit.
Misce. (*Pie.*)

℞. Foliorum Sennae,
Sulphatis Sodae,
singulorum drachmas duas.
Rhei . . . . . semidrachmam.
Mannae . . . . sesquiunciam.
Aquae . . . quantum sufficit.
Fiat infusum vel decoctum. (Gal.)

Der Aufguß wird bereitet, indem man die genannten Substanzen acht Stunden lang in fünf Unzen kochendem oder dieselbe Quantität zwölf Stunden lang in kaltem Wasser stehen läßt; die Abkochung, indem man die Rhabarber und Senna mit so viel Wasser kochen läßt, daß die Colatur fünf Unzen beträgt, worin man dann das Salz und die Manna auflöst. Man kann die Abkochung abklären, daß man sie zwei Minuten lang mit einem zu Schaum geschlagenen Eiweiß kochen läßt, indem man der Flüssigkeit, wenn sie im Kochen kommen will, zwei Drachmen Citronensaft zusetzt, hierauf sie vom Feuer nimmt und filtrirt.

℞. Folliculorum Sennae drachmas tres.
Rhei . . . . drachmam unam.
Ipecacuanhae . . grana decem.
Aquae . . . . quantum sufficit.
Coque et adde
Mannae,
Sulphatis Sodae,
singulorum drachmas duas.
Liquorem cola. (*Pie.*)

Clyster s. Enema laxans s. purgans.
(GalM. *ParC. Ra.*)

℞. Sennae . . . . . uncias duas.
Aquae . . . . . libram unam.
Coque et cola. (*Ra.*) — Addere potes Sulphatis Sodae semunciam et Mellis communis uncias tres vel quatuor.

ParC. Sennae drachmas quatuor, Aquae libram unam et Mellis Mercurialis annuae uncias duas.

℞. Sennae . . drachmas quatuor.
Sulphatis Sodae . drachmas sex.
Aquae . . . quantum sufficit.
Fiat decoctum. (GalM.) — Addunturi necesse est Tartari stibiati grana duo vel tria.

Potio purgans vermifuga. (*Pie. Sm.*)

℞. Sennae mundatae drachmas duas.
Coffeae tostae pulveratae
pugillos duos.
Lactis,
Aquae, singulorum quantum sufficit.
Coque et cola. (*Pie.*)

℞. Sennae mundatae
drachmas duas ad quatuor.
Helmintochortos drachmam unam.
Fructum Citri in taleolas concisum . . . . . no. 1.
Mannae . . . . . uncias duas.
Aquae bullientis . vitrum unum.
Post duodecim horas infusionis cola. (*Sm.*)

℞. Sennae mundatae
drachmas duas ad tres.
Seminis Contra pugillum unum.
Subcarbonatis Potassae
drachmam unam.
Aquae fontanae uncias duodecim.
Post horas duodecim infusionis inter cineres calidos adde
Mannae . . . . uncias duas.
Tartari stibiati . . grana duo.
Cola. (*Pie.*)

Potio purgans camphorata. (DD.)

℞. Infusi laxativi (DD.) uncias duas.
Mixturae camphoratae acidae
uncias sex.
Misce.

Julep diatartarum. (B*.)

℞. Sennae mundatae . uncias sex.
Zingiberis,
Galangae,
singulorum drachmas tres.
Infusi Rosarum pallidarum
libras tres.
Infunde in balneo aquae tepido, per horas viginti quatuor in vase tecto, tunc parumper coque; cola, clarifica et adde
Sacchari albi . . . uncias octo.
Cremoris Tartari . semunciam.
Olei Anisi . . semiscrupulum.
Gabe, eine halbe bis zwei Unzen.

Syrupus vermifugus et purgans. (*Ca.*)

℞. Sennae mundatae . semilibram.
Seminum Cinae,
Helminthochortos,
Rhei, singulorum uncias quatuor.
Corticis Aurantiorum unciam unam.
Cinnamomi . . . uncias duas.
Sacchari . . libras viginti sex.
Gabe, eine bis anderthalb Unzen.

Potio purgans et febrifuga. (*Bo.*)

℞. Chinae,
Folliculorum Sennae,
Cremoris Tartari,
singulorum drachmas duas.
Mannae uncias duas cum dimidia.
Florum Chamomillae
pugillum unum.
Aquae . . . . . vitrum unum.
Infunde et in infuso solve
Tartari stibiati . granum unum.

Apozema purgans. (Gal. *Ca.*)

℞. Foliorum recentium Cichorii,

Foliorum recentium Buglossi,
— — Boraginis,
singulorum unciam unam.
Sulphatis Sodae . . semunciam.
Foliorum Sennae mundatorum
drachmas duas.
Aquae bullientis . libras duas.
Infunde per horam unam, cola et colaturae adde
Syrupi Sennae . unciam unam.
Misce bene. (Gal.)

℞. Foliorum Cichorii,
— Taraxaci,
— Parietariae,
singulorum unciam unam.
— Sennae drachmas tres.
Sulphatis Sodae . . semunciam.
Pimpinellae,
Cerefolii,
Coriandri,
singulorum pugillum unum.
Aquae . . . . . libras duas.
Coque leviter per horae quadrantem, cola et adde
Syrupi Cichorii . . uncias duas.
Misce bene. (Ca.)
Glasweise des Morgens bis zur erfolgten Wirkung.

Decoctum pectorale solutivum. (Vm.)
℞. Seminum Anisi . semidrachmam.
Radicis Liquiritiae,
Foliorum Hyssopi, . singulorum
drachmam unam.
— Sennae drachmas tres.
Aquae . . . . . uncias sex.
Infunde frigide, cola exprimendo et adde
Syrupi Althaeae . unciam unam.

Decoctum anticachecticum. (Sw. Sy.)
℞. Radicis et Foliorum recentium Cichorii,
— — — Acetosae,
— — — Fragariae,
— — — Calcitrapae,
— — — Violarum,
Florum Nymphaeae albae,
singulorum unciam unam.
Petalorum Rosarum rubrarum
uncias duas.
Radicis Parietariae . semunciam.
Aquae . . . . libras duodecim.
Decoque ad librarum octo remanentiam et liquori bullienti adde
Foliorum Sennae uncias quatuor.
Anisi,
Nitri, singulorum semunciam.
Post horas infusionis viginti quatuor cola.
Einschneidend und blutreinigend, bei Dysurie, Ischurie, kalten Geschwülsten, hartnäckigen venerischen Uebeln, Scropheln und chronischen Hautkrankheiten empfohlen. — Gabe, acht Unzen nüchtern in vier Tagen und dann alle zwei Tage, drei Wochen hintereinander. Ist der Kr. stark, so kann man bis auf zehen und selbst zwölf Unzen steigen

Sericum.

Sericum crudum, Serici folliculi; Seidenbälglein, rohe Seide; Soie, Cocon de soie (*Gal.*); Capullo de seda (*His.*).
Gal. His. Wir. *G. Sp.*
Ein eirunder Balg von dichtem, sehr feinem Seidengewebe, meist von schön gelber, bisweilen weißer Farbe, welchen die Raupe des Seidenspinners (Bombyx Mori, L.), eines Nachtfalters (Nocturna, Bombycites, *Latr.*), welcher ursprünglich in Asien zu Hause ist, webt, um sich darin einzupuppen. (*Roes.* Ins. III. VII. IX. *Bert.* Bild. I. 5.

Serum.

Serum Lactis, Serum Lactis vaccinum; Molken; Petit-lait (*Gal.*).
Der seröse, wässerige, von dem Käse und Fett geschiedene Theil der Milch.

Serum Lactis depuratum. (Fl. T.)
℞. Seri Lactis vaccini recentis
libram unam.
Albumen Ovi . . . . . uo. 1.
Coque in vase cupreo, stanno obducto et post despumationem cola.
T. Seri uncias viginti, Albumen Ovi cum seri circiter unciis duabus in spumam conversum, Cremoris Tartari grana aliquot vel Succi Limonum guttas aliquot coquere per pauca momenta et ab igne remotis immergere corticis Citri vel Limonum frustula aliquot.

Serum Lactis pulveratum. (B*. Br.)
℞. Sacchari Lactis . drachmas duas.
— albi . . unciam unam.
Gummi Arabici . semidrachmam.
Misce. — Solve, si requiritur, in Aqua.

Serum Lactis dulce Hoffmanni. (Br.)
℞. Lactis vaccini . . quantum vis.
Evaporet ad sitcum in pelvi cuprea stanno bene obducta, blandō igne et sub continua agitatione; partem oleosam, pulveri plerumque supernatantem separa, tunc adde Aquae bullientis eandem quantitatem quantum lactis adhibueras; coque parumper, blandō igne, et filtra.

Serum Lactis dulce s. sincerum: (B*. Bor4. Fer. Ful. Gal. Hass. His. Li. Lus. Suec.)
℞. Lactis bullientis . libram unam.
Casei stomachi vitulini (présure),
Aquae diluti . drachmam unam.
Coque, cola, adde Albumen Ovorum trium in spumam conversum; ebulliant semel, tunc per linteum trajice. (B*, Fer. Ful. Hass.)

Bor4. Lactis vaccini recentis libras duas, Stomachi vitulini exsiccati et per horas sex Aquae communis frigidae unciis tribus immersi drachmam unam, una cum aqua maceratione adhibita, expone leni calori et digere, donec coagulatio facta sit; liquorem decantha et cola.

℞. Lactis vaccini . partes bis mille.
Casei stomachi vitulini Aquae pauxillo diluti
partes duas cum dimidia.

Supra cineres calidos ponantur et simulac lac coagulare coepit, ignem gradatim auge sed non ad bullitionem usque, ita ut pars caseosa magis magisque concrescat, serum deinde alii vasi infunde, coagulum vero craticulae vimineae imponatur, ut serum penitus exstillet, quod priori admisceatur. (Gal. Li. Lus. Suec.)

His. loco coaguli e stomacho vitulino Flores Scolymi adhibet.

Serum Lactis dulcificatum. (Bor4.)

℞. Lactis vaccini . . . libras tres.
Coque et sub initio bullitionis adde
Tartari depurati drachmam unam.
Coagulatione peracta liquorem semirefrigeratum cola et cum
Albuminis Ovorum in spumam redacti . . sufficiente quantitate ad albuminis coagulationem usque coque. Colato adde
Concharum praeparatarum quantum ad neutralisationem acidi requiritur
et filtra.

Serum Lactis chalybeatum. (Br.)

℞. Seri Lactis . . . quantum vis.
Exstingue in illo pluries Ferrum rubro excandescens et filtra deinde.

Serum Lactis vinosum. (Br. Ful. Hass. Li. Lus. *Au. Br. E. Sa. Sm. Sw.*)

℞. Lactis vaccini . . octarios duos.
Vini albi aciduli . uncias octo.
Coque simul, post coagulationem cola et clarifica. (Br. Ful. Hass. *Sm.*)

Li. Lactis partes tres et unam Vini; — *E.* Lactis semioctarium et Vini albi unciam unam ad duas.

℞. Lactis vaccini,
Aquae, singulorum libras duas.
Vini Rhenani . . sesquiunciam.
Coque simul, cola et post coagulationem clarifica. (*Sw.*)

℞. Seri Lactis . . uncias quatuor.
Vini albi . . . . uncias octo.
Coque parumper, cola et Albuminis ope clarifica. (*Sa.*)

Lus. et *Sm.* Lactis uncias octo et Vini libras duas; — *Au.* Seri Lactis libras tres et unam Vini.

Serum Lactis acidum s. tartarisatum. (B°. Bor4. Br. Ful. Gal. GalM. Han. Hass. HassP. His. Li. Lus. Suec. *Ra. Sp Vm.*)

℞. Lactis vaccini . octarios duos.
Cremoris Tartari scrupulos quatuor.
Coque lac et deinde sal superspargе; ab igne remove et spatulae ope hic et illic ac lente liquorem agitando, sepone, et post refrigerationem per pannum laneum (Flanell) trajice, in colatura Albumen Ovi unius in spumam conversum prope ignem repone et simulac ebulliat, faecibus sepositis superinfunde. (B°. Br. GalM. Hass. *Sp. Vm.*)

Li. Lactis partes octodecim et unam Cremoris Tartari; — Ful. Lactis triginta sex et unam Cremoris Tartari; — HassP. Lactis libras quatuor, Cremoris scrupulos quatuor usque sex, sero colato addere Albumen Ovorum no. 2., ebulliat deinde et filtretur; — Bor4. ut serum lactis dulcificatum sed absque conchis.

Loco cremoris tartari Acetum vel Succus Citri adhiberi potest. (Han. Hass. *Ra.*)

℞. Seri Lactis . . libras quatuor.
Albumina Ovorum . . . no. 3.
Cremoris Tartari
grana viginti quatuor.
Subige albumina cum seri pauxillo, adde hujus quod restat, coque et simulac bullire incipiant, cremorem tartari sensim adde, liquorem agitando; tunc cola et filtra. (Gal. His. Lus. Suec.)

Serum Lactis aluminatum s. aluminosum. (Bor4 HassP. RC. *Fi.*)

Loco cremoris Aluminis crudi pulverati eadem copia adhibetur; — RC. *Fi.* Lactis libram unam, Aluminis drachmam unam.

Serum Lactis tamarindinatum. (Bor4.)

Loco cremoris Pulpae Tamarindorum uncia una adhibetur.

Serum Lactis acetosum. (RC. *Sa. Sw.*)

℞. Lactis vaccini,
Aquae fontanae,
singulorum libras duas.
Coque et adde
Aceti . . . . . sesquiunciam.
Postquam coagulum ortum est, cola.

RC. Lactis, Aquae, singulorum libram unam, Acidi acetici impuri unciam unam; — Aceto substitui possunt subinde Cremoris Tartari drachmae duae vel Vini albi aciduli semilibra vel

pro re nata intercoquendum: Fructus Amlyeae Indicae si praesto est, sesquuncia vel Succi antiscorbutici unciae duae.

Serum Lactis compositum. (Bo.)

℞. Seri Lactis acidi
libras duas cum dimidia.
Succi recentis Citri unciam unam.
Conservae Rosarum vitriolatae
drachmas sex.
Misce.

Serum antiscorbuticum. (Fi.)

℞. Lactis vaccini recentis
libram unam.
Succi antiscorbutici uncias quatuor.
Coque et post coagulationem cola. — Gabe, drei bis sechs Unzen.

Sesamum.

Sesamum orientale, *L.*; Sesam; Sésame d'Orient (*Gal.*).

Am. Gal. His. RC. Wir. *A. C. M. Sp.*

☉ (Didynamia Angiospermia, L.; Bignoniaceae, *J.*) Eine Pflanze Syrien's und Aegypten's. (*Burm.* Zeyl. t. 38. f. 1.)

Man wendet den Saamen, Sesam; Sesamum; *Σησαμον*; Sésame (*Gal.*); Sesamum (*Ang.*); Sesam (*Bel.*); Sumsum (*Ar.*); Ellu (*Can.*); Tal (*Guz*); Till (*Hin.*); Kunjid (*Pe.*); Taila (*Sa.*); Yellu (*Tam.*); Nuwulu (*Tel.*) an. Er ist eirund, gelb, ölig, von süßem, angenehmem Geschmack.

Oleum Sesami orientalis. (His. Pal. RC. T.)

℞. Seminum Sesami . quantum vis.
Contunde in mortario et exprime. (His.)

Pal. antequam prelo subjiciantur, semina paullo torrere jubet.

Seseli.

Unter diesem Namen werden in den Pharmacopöen drei Pflanzen angeführt:

1) *Tordylium officinale*, *L.*; Cretisches Seseli; Séséli de Crète (*Gal.*).

Br. His. Wir. *Be. M. Sp. Z.*

♂ (Pentandria Digynia, L.; Umbelliferae, *J.*) Eine Pflanze Südeuropa's. (*Zorn* Ic. pl. t. 278.)

Man wendet die Wurzel und den Saamen an.

Die Wurzel (radix Tordylii s. Seseli Cretici s. montani) ist lang, dünn, faserig und weiß.

Der Saame ist lang, fast platt, rauh anzufühlen, mit drei hervorstehenden Linien bezeichnet und mit einem weißen Rande versehen. Er hat einen gewürzhaften Geruch und einen eben solchen aber schwachen Geschmack

Reizend.

2) *Seseli tortuosum*, *L.*; büschelblättriges Seseli; Séséli de Marseille (*Gal.*); Comino de Marsella (*Lus.*).

Br. Gal. His. Wir. *G. M.*

♂ oder ♃ (Pentandria Digynia, L.; Umbelliferae, *J.*) Eine Pflanze des südlichen Europa's. (*Reyn.* Bot. t. 313.)

Man wendet den Saamen (semen Seseleos Massiliensis) an; er ist langgestreckt, gestreift, grünlich, von gewürzhaftem Geruch und scharfem und gewürzhaftem Geschmack.

3) *Peucedanum Silaus*, *L.*; Silau, Mattensteinbrech; Séséli des prés, Saxifrage des Anglais (*Gal.*); Meadow solphurwort (*Ang.*); Weld minuin (*D.*); Haair streng (*Bel.*).

Gal.

♃ (Pentandria Digynia, L.; Umbelliferae, *J.*) Eine Pflanze Südeuropa's. (*Jacq.* Fl. Austr t. 15.)

Man wendet die Wurzel und den Saamen an.

Die Wurzel (radix Seselios pratensis s. Saxifragae Anglicae) ist groß, dick, oft gabelig und unten mit einem Büschel Haare versehen.

Der Saame ist auf der einen Seite platt, auf der andern gewölbt und mit fünf Streifen bezeichnet. Geruch und Geschmack sind scharf und gewürzhaft.

Silene.

Von dieser Pflanzengattung finden sich zwei Arten in den Pharmacopöen angezeigt:

1) *Silene Otites*, *Cand.*; feldliebender Taubenkropf; Silène Otites (*Gal.*); Field campion (*Ang.*).

Br. Wir.

♂ (Decandria Trigynia, L.; Caryophylleae, *J.*) Eine Europäische Pflanze. (*Oed.* Fl. Dan. t. 518.)

Man wendet das Kraut (herba Viscaginis) an; es besteht aus einem einfachen, klebrigen Stängel mit wenigen Blättern, von denen die untern spatelförmig, die obern lanzett- oder linienförmig sind. Es hat einen adstringirenden und etwas bittern Geschmack.

2) *Silene Virginica*, *L.*; Virginischer Taubenkropf; Silène de Virginie (*Gal.*).

C.

♃ Eine in Virginien einheimische Pflanze.

Die Wurzel, welche man anwendet, gilt für ein Wurmmittel.

Simaruba.

Simaruba amara, Aublet; Simarubarinde, Ruhrrinde; Simarouba (*Gal.*); Simaruba (*His. I. Lus.*).

Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Würr. *Be. Br. C. Fi. G. M. Par. Pid. Sp.* Z.

Ein Baum (Decandria Monogynia, L.; Simarubeae, *Cand.*) Südamerika's. (*Aubl.* Guian. t. 331. 332. *Lam.* Ill. gen. t. 343. f. 2. *Desc.* Fl. méd. d. Ant. t. 14. Fl. méd. VI. 327.)

Man wendet die Rinde (cortex Simarubae) an; sie besteht in langen, eingerollten, dünnen, biegsamen, zähen, faserigen, äußerlich gleichsam warzigen, blaßgelben, inwendig gelblichgrauen, geruchlosen Stücken. Sie hat einen bittern Geschmack.

Man nimmt fast immer die der Wurzel, selten die des Stängels.

Sie enthält, nach Morin, Quassiastoff, einen harzigen Stoff, ein flüchtiges Oel, Aluminium, Aepfelsäure, etwas Gallussäure und verschiedene Salze.

Tonisch, bei Wechselfiebern und Schleimflüssen aller Art. — Gabe des Pulvers, von einem Scrupel bis zu einer halben Drachme.

Decoctum Simarubae s. Corticis Simarubae. (B*. Ful. GalM. Gen. *Su. Sw.*)

℞. Corticis Simarubae . semunciam.
Aquae . . . quantum sufficit ut post coctionem librae duae colaturae obtineantur. Coque per horae quadrantem. (GalM.)

B*. Corticis drachmas duas ad semunciam, Aquae libras duas ad remanentiam unciarum octo; — *Su.* Radicis drachmas duas ad semunciam, Aquae sesquilibram ad horae unius remanentiam; — *Su.* Radicis drachmas duas, Aquae libras duas ad dimidii remanentiam; — Gen. Radicis drachmas duas et Aquae libram unam ad unciarum duodecim remanentiam; — Ful. Corticis semunciam et Aquae libram unam ad octo unciarum remanentiam.

Gabe, eine Unze, alle zwei oder drei Stunden, oder vier Unzen täglich drei Mal.

Infusum Simarubae. (B*. Lon. LonN. *C. Fi. T.*)

℞. Corticis Simarubae semidrachmam.
Aquae bullientis . semicongium.
Macera per horas duas in vase leviter tecto et cola.

T. Simaruhae semidrachmam, Aquae bullientis uncias sex. — Bitter, gewürzhaft.

Haustus adstringens. Potio adstringens. (B.)

℞. Corticis Simarubae semunciam.
Aquae . . . . quantum sufficit ut decocti unciae octo obtineantur, quarum colaturae adde
Emulsionis gummosae uncias duas.
Tincturae thebaicae guttas viginti.

Allmälig zu nehmen, bei sogenannter atonischer Diarrhöe.

℞. Corticis Simarubae . semunciam.
Aquae . . . . quantum sufficit ut decocti unciae octo obtineantur. Colaturae adde
Tincturae thebaicae
scrupulum unum.
Alcoholis . . . unciam unam.
Aquae Cinnamomi . semunciam.

Wie den vorhergehenden Trank und in denselben Fällen zu nehmen.

Sinapis.

Man findet in den Pharmacopöen zwei Arten dieser Pflanzengattung angezeigt:

1) *Sinapis alba, L.;* weißer Senf, Mostrich; Moutarde blanche (*Gal.*).

Bor. D. Du. Ed. Gal. Han. Li. Pal. Wir. *E. G. Sp.*

⊙ (Tetradynamia Siliquosa, L.; Cruciferae, *J.*) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (*Zorn* Ic. pl. t. 92.)

Man wendet die Saamen (semen Sinapis s. Sinapios albae s. Erucae) an; sie sind klein, rund, gelblich, von flüchtigem Geruch und scharfem, bitterem Geschmack.

2) *Sinapis nigra, L.;* Senf; Moutarde noire (*Gal.*); Mustard (*Ang.*); Sennep (*D.*); Mostaro (*His.*); Mosterd (*Bel.*); Senapa, Senevra (*I.*); Gorczyca czarna (*Lus.*); Mostarda (*Lus.*); Senap (*Suec.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. Du. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Würr. WW. *Be. Br. C. Fi. G. M. Par. Pid. Sa. Sp.*

⊙ Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (*Blackw.* t. 416. *Plenck* t. 524. *Hayne* VIII. t. 40. Düss. off. Pfl. XIII. 22. *Bert.* Bild. II. 77. f. 1. *Zorn* Ic. pl. t. 152.)

Man wendet den Saamen (semen Sinapis s. Sinapios nigrae s. Erucae nigrae) an; er ist sehr klein, rundlich, schwarz, oder schwärzlichbraun, von flüchtigem Geruch und scharfem, bitterem Geschmack.

Beide Arten Saamen sind stark reizend. Man zählt sie zu den antiscorbutischen Mitteln. — Henry und Garrot haben in denselben Schwefelsenfsäure gefunden, welche mit der Schwefelsäure Aehnlichkeit hat, aber sich durch ihre Grundbestandtheile unterscheidet

Unguentum Sinapis. (*Au.*)

℞. Seminum Sinapis , uncias tres.
Olei Amygdalarum semunciam.
Succi Citri . quantum sufficit.

Von Frank bei Erkältungen gerühmt.

Boli ad paralysin s. stimulantes. (*Ca. Sa. Sw.*)

℞. Seminum Sinapis semidrachmam.
Carvi,
Cinnamomi,
singulorum grana quatuor.
Zingiberis . . . grana duo.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.
Fiat bolus. (*Sa.*)

Ca. et *Sw.* omisso zingibere Syrupum Zingiberis loco simplicis adhibent.

Zwei Mal täglich, bei Lähmung.

Electuarium antiscorbuticum. (*Vm.*)

℞. Pulveris Cinnamomi,
— Sinapis,
singulorum partem unam.
Corticis Aurantiorum,
Extracti Trifolii,
singulorum partes duas.
Conservae Beccabungae,
— Armoraciae,
— Cochleariae,
— Nasturtii,
singularum partes tres.
Misce sedulo.

Cataplasma epispasticum s. Sinapis s. Sinapeos, Linimentum rubefaciens, Sinapismus, Sinapismus irritans. (Bor4. Br. DD. Du. Fer. Gal. GalM. Han. Hass. HassP. His. Lon. LonN. Lus. RC. Sax. WW. *Au. Br. C. Ca. E. Fi. ParC. Ra. Sa. Sw. T. Vm.*)

℞. Seminum Sinapis grossiuscule pulveratorum . . quantum vis.
Aceti . . . . quantum sufficit ut pasta satis spissa fiat. (DD. Gal. GalM. Han. *Ca. E. ParC. Ra.*)

HassP. Pulveris Sinapis partes quinque, Aceti crudi tres.

Die Quantität des Senfs wechselt von anderthalb bis vier Unzen.

℞. Farinae Sinapis,
Micae Panis,
singularum partes aequales.
Aceti . . . . quantum sufficit ut fiat pasta mediocris consistentiae. (Lus. *Br.*)

Sw. et *Vm.* Sinapis partem unam, Fermenti duas et Aceti calidi quantitatem sufficientem.

℞. Fermenti,
Farinae Sinapis,
singulorum partes aequales.
Aceti simplicis vel scillitici quantum satis ut fiat pulS spissa. (Sax.)

Ra. Fermenti partes quatuor et unam Sinapis; — *Fi. T.* Fermenti uncias quatuor, Sinapis duas, Aceti quantum satis.

℞. Farinae Sinapis,
— Seminis Lini,
singularum semilibram.
Aceti . . . . quantum sufficit.
Commisce. (Lon. LonN.)

Ra. Cataplasmatis Farinae Lini uncias quatuor et Farinae Sinapis semunciam; — Du. et *C.* Sinapis, Micae Panis, singulorum semilibram, Aceti sufficientem quantitatem et si requiritur Armoraciae uncias duas; — WW. Farinae secalitiae partes quatuor, Sinapis duas et Aceti sufficientem quantitatem; — Bor4. Farinae Sinapis unciam unam, Farinae Secalis semunciam, Aceti quantum satis, ut fiat emplastrum mollioris consistentiae; — *Sw.* Farinae secalitiae partes duas, Sinapis tantidem et Aquae sufficientem quantitatem; — *Sa.* Farinae triticeae, Farinae Sinapis, singularum partes duas et Aceti sufficientem quantitatem; — RC. Sinapis, Farinae avenaceae, vel triticeae, vel Micae Panis, vel Fermenti, singulorum partes aequales, Aceti quantum satis.

℞. Farinae avenaceae uncias quatuor.
Aceti . . . . . unnias sex.
Coque ad consistentiam cataplasmatis, sub finem addendo
Pulveris Florum Sambuci
uncias tres.
— Seminum Sinapis
drachmas tres.
Misce. (*Au.*)

℞. Fermenti,
Radicis Armoraciae rasae,
Sinapis contusae,
singulorum sesquiunciam.
Aceti . . . . quantum sufficit.
Misce simul. (Han.)

GalH. et *Sw.* Farinae triticeae partes quatuor, Farinae Sinapis tantidem, Armoraciae unam et Aceti sufficientem quantitatem.

℞. Fermenti,
Sinapis, singulorum uncias tres.
Piperis nigri contusi
unciam unam.
Aceti . . . . quantum sufficit ut fiat pasta. (Hass. HassP.)

Han. Sinapis sesquiunciam, Piperis drachmam unam, Armoraciae, Fermenti, singulorum unciam unam et Aceti sufficientem quantitatem; — *Ca.* Sinapis semilibram, Piperis, Zingiberis, singulorum drachmam unam et Oxymellis sufficientem quantitatem.

℞. Fermenti . . . . . uncias duas.

Salis culinaris,
Farinae Sinapis,
singulorum semunciam.
Aceti . . . . quantum sufficit ut fiat pasta. (Fer.)

Fi. Fermenti uncias sex, Farinae Sinapis unam, Salis marini semunciam, Aceti fortis quantum sufficit; — *T.* Fermenti uncias quatuor, Sinapis duas, Salis semunciam, Aceti quantum sufficit.

℞. Fermenti . . . sesquiunciam.
Farinae Sinapis uncias quatuor.
Salis Ammoniaci drachmam unam.
Herbae Rutae contusae
semunciam.
Aceti . . . . quantum sufficit ut fiat pasta mollis. (His.)

RC. Farinae avenaceae, vel Micae Panis, Sinapis, singulorum uncias duas, Armoraciae sesquiunciam, Salis Ammoniaci semunciam, Aceti quantum satis.

℞. Fermenti,
Saponis nigri,
singulorum drachmas duas.
Sinapis,
Herbae Rutae contusae,
singularum semunciam.
Ceparum contusarum
unciam unam.
Salis culinaris . . semunciam.
Aceti . . . . quantum sufficit.
Fiat pasta mollis. (Br.)

Aqua Sinapis. (Wür.)

℞. Seminum Sinapis partem unam.
Aquae . . . . . partes octo.
Macera per horas viginti quatuor et destillationi subjice.

Oleum Seminum Sinapi infusum. (B*.)

℞. Pulveris Sinapis ab oleo expressionis ope liberatae unciam unam.
Olei essentialis Rorismarini
uncias octo.
Post tres dies digestionis filtra. — In Einreibungen auf gelähmte Theile.

Vinum Sinapios, Collutorium Sinapi. (Wür. *Au.*)

℞. Seminum Sinapis contusorum
semunciam.
Vini . . . . . libram unam.
Post sex horas macerationis decantha. (Wür.)

℞. Seminum Sinapis unciam unam.
Vini albi . . . . . libram unam.
Post sex horas infusionis cola et colaturae adde
Tincturae Cinnamomi uncias duas.
Misce. (*Au.*)
Speichelabsonderung befördernd, auch innerlich bei Wassersuchten.

Serum Lactis sinapinum s. cum Sinapi. (B*. Ful. Hass. Li. Lus. RC. *Sa. Sw.*)

℞. Lactis vaccini . . libras duas.
Seminum Sinapis contusorum
uncias duas.
Coque, donec coagulum in fundum vasis descendit et filtra. (B*. Hass. Li. *Sa.*)

Lus. Sinapis unciam unam, Lactis libras duas; — Ful. Sinapis sesquiunciam, Lactis libras duas.

℞. Lactis vaccini . . libram unam.
Seminum Sinapis unciam unam.
Tritura simul paullatim; adde deinde
Vini Rhenani quantum sufficit.
Coque, ut in coagulum abeat et cola. (*Sw.*)

RC. Sinapis unciam unam, Lactis libram unam, Aceti vel Vini Rhenani quantum sufficit.

Reizend, bei Gliederreißen, Gicht und Lähmung empfohlen. — Gabe, ein oder zwei Pfund, die Nacht über zu verbrauchen.

Cerevisia diuretica. (*Ca. Sa. Vm.*)

℞. Cerevisiae Ale dictae
octarios quadraginta.
Seminum Sinapis,
Baccarum Juniperi,
singulorum semilibram.
Seminum Dauci . . uncias sex.
Post plures dies infusionis cola. (*Ca.*)

Sa. Sinapis, Baccarum Juniperi, singulorum unciam unam, Dauci drachmas tres, Absinthii duas et Cerevisiae octarios octo; — *Vm.* Dauci partem unam, Sinapis duas, Baccarum Juniperi duas et Cerevisiae fortis sexaginta quatuor.

℞. Radicis Armoraciae,
Seminum Sinapis,
singulorum unciam unam.
Baccarum Juniperi,
Subcarbonatis Potassae,
singulorum drachmas sex.
Cerevisiae fortis . . libras sex.
Macera frigide per dies quatuor et cola.
Bei Blasencatarrhen und Wassersuchten.

Cerevisia aperiens s. aperitiva. (*Sa. Sw.*)

℞. Sinapis nigrae . . unciam unam.
Aristolochiae longae drachmas sex.
Centaurii minoris drachmas duas.
Sabinae . . . drachmam unam.
Cerevisiae levis . octarios octo.
Post quatuor dies macerationis cola.

Cerevisia stimulans. (*Sw.*)

℞. Radicis Valerianae unciam unam.
Sinapis nigrae . drachmas sex.

Serpentariae Virginicae drachmas tres.
Foliorum Rorismarini semunciam.
Cerevisiae levis . . libras octo.
Macera frigide per dies duos et cola.

Gargarisma sialagogum. (*Sp.*)

℞. Aquae Angelicae,
— Hyssopi,
singularum uncias sex.
Spiritus Cochleariae semunciam.
— Salis Ammoniaci
scrupulos quatuor.
Pulveris Sinapis drachmam unam.
Mellis rosati . uncias quatuor.

Gargarisma adstringens. (*Pie.*)

℞. Seminum Sinapis drachmam unam.
Aceti rosati,
Sacchari albi,
singulorum unciam unam.
Aquae . . . . . uncias tres.

Collutorium excitans. (B*.)

℞. Pulveris Sinapis sesquidrachmam.
Aceti . . . . . unciam unam.
Aquae fontanae uncias quatuor.

Sison.

Sison Amomum, L.; Deutsches Amomum; Amome faux (*Gal.*); Field honewort (*Ang.*); Wssecko korenj (*B.*).
Gal. Wir. Wür. *Sp.* Z.

♂ (Pentandria Digynia, L.; Umbelliferae, *J.*) Eine Europäische Pflanze. (*Blackw.* Herb. t. 442.)

Man wendet den Saamen (semen Sisonis Amomi) an; er ist klein, grau, gekielt, süß, von gewürzhaftem Geruch und Geschmack.

Reizend, für harntreibend gehalten.

Sisymbrium.

Sisymbrium Sophia, L.; Sophienkraut; Sagesse des chirurgiens (*Gal.*); Flixweed sisymbrium (*Ang.*): Barbierforstand (*D.*); Talictro (*His.*); Fiekruid (*Bel.*); Talitro (*I.*); Herva Sophiae (*Lus.*); Stiltfrae (*Susc.*).
Gal. Wir. *Be. M. Sp.*

☉ (Tetradynamia Siliquosa, L.; Cruciferae, *J.*) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (*Zorn* Icon. pl. t. 333.)

Man wendet das Kraut und den Saamen an.

Das Kraut (herba Sophiae chirurgorum) besteht aus einem runden, ästigen, etwas behaarten Stängel mit abwechselnden, in kleine Läppchen zerspaltenen glatten Blättern.

Der Saame ist sehr klein, eirund, glatt und röthlichbraun. Er hat ebenso, wie das Kraut, einen scharfen und brennenden Geschmack.

Reizend, gegen Scorbut.

Sium.

In den Pharmacopöen findet man fünf Arten dieser Pflanzengattung angezeigt:

1) *Sium angustifolium, L.;* schmalblättriger Merk; Berle à feuilles etroites (*Gal.*); Narrow leav'd water parsnip (*Ang.*); Bernera de hoja angusta (*His.*); Smalbladiges wate reppe (*Bel.*).
Gal.

♃ (Pentandria Monogynia, L.; Umbelliferae, *J.*) Eine Europäische Pflanze. (*Jacq.* Fl. Austr. t. 67.)

Das Kraut, welches man anwendet, besteht aus einem hohlen Stängel mit eingeschnittenen, am Grunde fast geöhrten Blättern. Es hat einen bituminösen Geruch und einen bittern, etwas scharfen Geschmack.

Reizend, harntreibend.

2) *Sium latifolium, L.;* breitblättriger Merk; Berle à larges feuilles (*Gal.*).
Gal.

♃ Eine Europäische Pflanze. (*Moris.* Hist. II. 9. t. 5. f. 1.)

Das Kraut, welches man anwendet, besteht aus einem hohlen Stängel mit gefiederten, aus lanzettigen, sägezähnigen Blättchen bestehenden Blättern.

Diese Pflanze wird fast stets statt der vorigen angewendet.

3) *Sium nodiflorum, L.;* knotenblumiger Merk, kleiner Eppich; Berle nodiflore (*Gal.*); Creeping water parsnip (*Ang.*).
Du. *C.*

♃ Eine Europäische Pflanze. (*Moris.* Hist. II. 9. t. 5. f. 3.)

Man wendet das Kraut an; es besteht aus einem hohlen Stängel mit einfach gefiederten Blättern, deren Blättchen lanzettförmig und gezähnt sind.

Harntreibend. — Nach Morison ist der ausgedrückte Saft in verschiedenen Hautkrankheiten nützlich. Withering gab davon Erwachsenen Morgens drei oder vier Unzen, und jungen Personen drei Löffel täglich zwei Mal.

4) *Sium Sisarum, L.;* Zuckerwurzelmerk; Berle Chervi (*Gal.*); Sisara, Chirivia de quaresma (*His.*).
His.

♃ Eine Pflanze, welche in China zu Hause seyn soll. (*Schk.* t. 69. *Moris.* Hist. II. 9. t. 4. f. 8.)

Die Wurzel besteht aus mehrern länglichen, gerunzelten, in ein Bündel vereinigten Knollen.

Der Saame ist eiförmig, glatt und gestreift.

Diese Pflanze soll gegen Mercurialkrankheit von Nutzen seyn.

5) *Sium Ninsi, L.*; Ninsing, Ninsingwerk; Ninsi (*Gal.*); Ninsiwortel (*Bel.*). Br. Gal. Wir. *G. M. Sp.*

4. Eine auf den Gebirgen China's wachsende Pflanze. (*Burm.* Fl. Ind. t. 29. f. 1.)

Man wendet die Wurzel (radix Ninsi s. Ninsing s. Ninsini) an; sie ist spindelförmig, geringelt, weißlich, hornartig und halbdurchsichtig, oder gelblichbraun, oder undurchsichtig, je nachdem sie entweder in kochendem Wasser gebleicht und der Oberhaut beraubt ist oder nicht. Die Dicke ist verschieden, wie eine Schreibfeder oder kleinen Fingers dick. Sie hat einen starken und unangenehmen Geruch und einen anfangs süßlichen, hinterher etwas bittern Geschmack.

Die Chinesen schreiben dieser Wurzel fast wunderähnliche Kräfte zu, jedoch sind sie sehr beschränkt, und sie würde daher mehr unter die Küchengewächse zu verweisen seyn, übrigens kömmt sie auch selten vor.

Sodium.

Von diesem an sich selbst in der Medicin ungebräuchlichen Metall wendet man folgende Zusammensetzungen an:

Protoxydum Sodii, Soda caustica s. pura; kaustische, reine Soda.

§. I. Im flüssigen Zustande.

Lixivium causticum s. Sodae s. Sodae purae s. saponariorum, Soda caustica fluida, Liquor Sodae concentratus, Liquor Natri caustici s. Hydratis natrici; Seifensiederlauge; Lessive des savonniers (*Gal.*).

Bor4. Per. GalH. GalM. Lus. Sax. *Fi. Sw. Vm.*

℞. Subcarbonatis Sodae partes duas.
Calcis vivae . . partem unam.
Coque cum Aquae sufficiente quantitate, cola lixivium et consume, donec vas octo drachmas Aquae communis continens drachmas undecim contineat et refrigeratum 36° Ar. indicet.

Bor4. ut liquorem kali caustici parari jubet; — *Fi.* Subcarbonatis partes tres, Calcis duas, caeterum ut potassam causticam.

§. II. Im festen Zustande.

An. Fer. *Br. Fi. Vm.*

℞. Liquoris Sodae causticae
quantum vis.
Evaporet in tantum, donec olei instar fluat et gutta una, corpori frigido infusa concrescat; infunde deinde supra laminam marmoream vel in fusorium.

Die kaustische Soda kann ebenso benutzt werden, wie die Potasche.

Sapo Ceraë s. cereus. (*Vm.*)

℞. Ceraë flavae . . . partes tres.
Liqua et adde
Sodae causticae liquidae
partes duas.
Prope ignem relinque, agitare continuando, donec massa in aqua absque decompositione dissolubilis fiat.

Protoxysulphuretum Sodii, Deutoxysulphuretum Sodii, Sulphuretum Protoxydi Sodii, Sulphuretum Sodae, Natrum sulphuratum. (Am. Fer. *Br. C. Fi. Sw. T. Vm.*)

℞. Florum Sulphuris,
Subcarbonatis Sodae,
singulorum partes aequales.
Liquata simul super igne gradatim aucto supra tabulam marmoream effunde et post refrigerationem in frustula minora diffrange. (Am. Fer. *Br. C. Fi.*)

Sio. Sulphuris partem unam et duas Alcali mineralis.

℞. Sulphuris in baculis partes tres.
Sodae causticae
partes septem cum dimidia.
Mixta liqua in retorta balneo aremae imposita. (*Vm.*)

T. Florum Sulphuris partes duas, Sodae causticae vel Carbonatis Sodae partes quatuor, caeter. ut sulphuret. potassae.

Van Mons nennt dieses *Sulphuretum simplex Sodae*. Die Formel zu seinem *Supersulphuretum Sodae* ist folgende:

℞. Sulphuris in baculis
partes tres cum quadrante.
Sodae causticae fusae
partes quatuor.
Liqua in retorta vitrea balneo aremae gradatim calefaciendo imposita.

Die Eigenschaften des schwefligsauren Natron's oder der natrischen Schwefelleber sind dieselben, als die der kalischen. „Der Practiker, sagen Idt und Chevallier, sollte dieses Mittel immer der kalischen Schwefelleber vorziehen, da das kohlensaure Natron hinsichtlich seiner Reinheit nur wenig Veränderung zeigt und man daher sicher ist, immer ein in seiner Zusammensetzung sich gleichbleibendes Präparat zu erhalten, da hingegen die kalische Schwefelleber wegen der verschiedenen Reinheit des käuflichen Kali's von zwölf bis fünf und

zwanzig Procent Verschiedenheiten unterworfen ist." Man wendet es aber deßhalb selten an.

Aqua antipsorica. (*Vm.*)

℞. Sulphureti Sodae drachmam unam.
Salis Ammoniaci scrupulos duos cum dimidio.
Dissolve sales singulos seorsim in Aquae unciis sex, filtra et solutiones commisce.

Lotio ad s. contra tineam. (*Bo. Ca.*)

℞. Sulphureti Sodae . uncias tres.
Saponis medicinalis sesquidrachmam.
Aquae Calcis uncias septem cum dimidia.
Alcoholis . . . drachmas duas.
Man schlägt alle zwei Tage ein mit dieser Flüssigkeit getränktes leinenes Tuch um den Kopf.

Sapo sulphuratus Sodae. (*Vm.*)

℞. Saponis Medullae partem unam.
Sulphureti Sodae . partes duas.
Alcoholis . . . . . partes sex.
Dissolve et solutionem cola.

Unguentum antipsoricum. (*Sw.*)

℞. Sulphureti Sodae drachmas tres.
Axungiae Porci . sesquiunciam.
Misce triturando.

Linimentum sulphuro-saponaceum. (*Vm.*)

℞. Olei Amygdalarum dulcium,
Sulphuris pulverati, singulorum partem unam cum dimidia.
Sulphureti Sodae pulverati partes quatuor cum dimidia.
Axungiae Porci partes sex cum dimidia.
Contere pulveres cum axungia et adde sensim oleum. — In Einreibungen gegen Krätze.

Protoxychloruretum Sodii, Chloruretum Protoxydi Sodii, Chloruretum Sodae, Aqua „Eau de javelle" dicta (GalF. GalH. *Ma.*)

℞. Subcarbonatis Sodae libras quinque.
Aquae destillatae libras viginti.
Infunde liquorem, 12° R. indicantem in lagenam, cujus tres quadrantes ab illo solum implentur et torrentem Chlori e mixtura Salis marini libra una, Acidi sulphurici sesquilibra et Aquae tribus libras quadrantibus extricati immitte.

Die Chlorüre ist stark genug, wenn sie achtzehen Theile schwefelsauren Indigo entfärbt.

Man wendet sie, mit zehen bis fünfzehen Theilen Wasser verdünnt, zum Verbinden bei Hospitalbrand, ausgearteten, venerischen Geschwüren, brandigen Wunden, welche sie schnell zum Vernarben bringt, und bei Krebsgeschwüren an, wo sie den Gestank beseitigt und zu gleicher Zeit die Schmerzen lindert. *Klibert* benutzt sie mit Vortheil zum Waschen fressender Flechten. Man hat eine tinea favosa damit geheilt, auch ist sie mit Erfolg bei häutiger Bräune in Gurgelwasser gebraucht worden. Außerdem ist sie auch innerlich zu 25 oder 30 Tropfen in einer Pinte Tisane gegeben worden.

Chlorureum Sodii, Quadrichloruretum Sodii (*B*), *Chloretum Natrii, Murias Sodae, Murias Sodae fossilis, Hydrochloras Protoxydi Sodii. Protohydrochloras Sodii, Sal culinare, Sal Gemmae vel marinum, Hydrochloras natricus, Hydrochlorinus natricus, Muria, Natrum muriaticum, Sal commune s. communis, Soda muriatica* (*H.*); Küchensalz, Kochsalz, Steinsalz, Seesalz, salzsaures Natron; Chlorure de sodium, Quadrichlorure de sodium, Muriate de soude, Hydrochlorate de protoxide de sodium, Protohydrochlorate de sodium, Hydrochlorate de soude, Sel de cuisine ou de gabelle, Sel gemme ou marin, Soude muriatée (*Gal.*); Salt (*Ang. D. Suec.*); Melh (*Ar.*); Uyah (*Bali.*); Yen (*C.*); Luna (*Cy.*); Nimmuk (*Duk.*); Sal (*His. Lus. Pol.*); Lun (*Hin.*); Zout (*Bel.*); Sale (*I.*); Mit (*Mah.*); Garam (*Mal.*); Hemuck (*Pe.*); Lavana (*Sa.*); Uppa (*Tam.*); Lavanum (*Tel.*).

A. Am. Ams. Am. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Ham. Han. Hans. Hass. P. His. L. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wür. WW. *A. Fi. G. Par. Pid. Sp. T.*

Der häusliche Gebrauch des Kochsalzes ist zu häufig und so allgemein bekannt, daß es nicht nöthig ist, hier darüber Näheres anzugeben. In der Medicin benutzt man es nur wenig. Doch setzt man es oft zu Fußbädern, um diese reizender zu machen. Zuweilen hat man es auch innerlich bei Krankheiten, welche man von Schwäche herleitete, so wie äußerlich in verschiedenen Hautkrankheiten, besonders Kopfgrind und Krätze angewendet.

Sacculus resolvens. (*Sm.*)

℞. Salis culinaris,
— Gemmae, singulorum unciam unam.
— Ammoniaci drachmas quatuor.
Misce.

Pulvis vermifugus. (*E.*)

℞. Salis culinaris . drachmas tres.
Cocciomellae . grana quindecim.

Fiant doses sex. — Gabe, ein Stück alle Morgen. — Von Rush empfohlen.

Clysma s. Clyster ad ascarides, Enema vermifugum. (*Sw.*)

℞. Vini rubri . . . . uncias sex.
Salis culinaris . quantum sufficit
vel quantum vinum dissolvere potest.

Clysma s. Clyster s. Enema purgans. (*B. E. Ra.*)

℞. Salis culinaris . . unciam unam.
Tisanae emollientis libras duas.
Dissolve. (*Ra.*)

℞. Decocti Hordei . uncias quatuor.
Salis culinaris . . . semunciam.
Olei Olivarum . uncias quatuor.
Misce. (*B.*)

℞. Salis culinaris . . . semunciam.
Olei Ricini,
Syrupi Sacchari,
singulorum uncias duas.
Decocti Seminum Lini
octarium unum.
Misce. (*Sax.*)

Clysma s. Clyster s. Enema antispasmodico-resolvens s. antispasmodicum. (*B.*)

℞. Salis culinaris drachmas quatuor.
Olei Lini . . uncias quatuor.
Infusi Chamomillae uncias tres.

Solutio s. Mixtura citro-muriatica s. excitans. (*Bo. Ca. Pie. Sw.*)

℞. Succi Citri . . . quantum vis.
Salis culinaris . quantum sufficit
vel quantum succus dissolvere potest.

— Broussonet empfahl diese Mixtur bei sogenannten adynamischen Fiebern. — Gabe, stündlich ein Löffel.

Unguentum Salis marini. (*Sm.*)

℞. Salis culinaris . . sesquiunciam.
Cerati Galeni . . . uncias tres.
Unguenti rosati . unciam unam.

Morgens und Abends in die von tinea befallenen Stellen einzureiben.

Aqua marina s. marina artificialis. (*B*. Gen. RC. Au. Br. Fi. Sw.*)

℞. Salis culinaris . . semunciam.
— cathartici amari,
Syrupi Rhamni cathartici,
singulorum drachmam unam.
Aquae . . . . . libras duas.
Misce. (*Gen.*)

℞. Salis culinaris . . uncias decem.
Muriatis Magnesiae
drachmas decem.
— Calcis . . uncias duas.
Sulphatis Sodae,
— Magnesiae,
singulorum drachmas sex.
Aquae . . libras quinquaginta.
Dissolve. (*B*. RC. Sw.*)

Br. eandem formulam sed absque muriate calcis; — *Fi.* Aquae libras quinquaginta, Salis marini uncias novem, Muriatis Magnesiae unciam unam, Muriatis Calcis drachmas quatuordecim, Sulphatis Sodae, Sulphatis Magnesiae, singulorum drachmas sex; — *Au.* Aquae octarios duos, Salis communis grana viginti quatuor, Sulphatis Magnesiae quatuor, Sulphatis Calcis, Carbonatis Magnesiae, singulorum quindecim et torrentem Gasis acidi carbonici in liquorem immittere.

Dieses Wasser ist als ein vortreffliches auflösendes und schmelzendes Mittel empfohlen worden.

Aqua Selterana. (Suec.)

℞. Salis culinaris . grana centum.
Subcarbonatis Sodae
grana viginti quatuor.
— Magnesiae
grana viginti novem.
— Calcis
grana septemdecim.
Aquae . . uncias octoginta duas.
Satura cum Acido carbonico.

Aqua mineralis acidula. (RC.)

Aquae purae libras quinquaginta, Carbonatis Calcis drachmas duas, Subcarbonatis Magnesiae unciam unam, Subcarbonatis Sodae drachmas sex, Muriatis Sodae sesquiunciam trajice per solutionem Gasis acidi carbonici pollices cubicos 909 ad 1000.

Aqua Pyrmontana. (Suec.)

℞. Salis culinaris . semiscrupulum.
Sulphatis Magnesiae
grana triginta quinque.
— Calcis grana triginta sex.
Subcarbonatis Calcis
grana quindecim.
Limaturae Ferri . unciam unam.
Aquae . uncias octoginta duas.
Satura cum Acido carbonico.

Aqua mineralis sulphurata. (RC.)

℞. Aquae purae libras quadraginta.
Carbonatis Calcis
drachmas quinque.
Subcarbonatis Sodae
drachmas decem.
Muriatis Sodae drachmas septem.
Salis acidi carbonici,
— hydrogen. sulphurat., singulorum poll. cub. 900 ad 1000.

Aqua Selterani alia. (Gal. *Vm.*)

℞. Salis culinaris grana viginti duo.
Subcarbonatis Sodae grana quatuor.
— Magnesiae grano uno.

Aquae quintuplo volumine Acidi carbonici saturatae uncias viginti cum dimidia.
Dissolve. (Gal.)

℞. Aquae . . . . . libras tres.
Infunde in lagenam, in cujus fundum, tubi ope intromitte
Acidi hydrochlorici fumantis grana septuaginta.
Adde deinde, alterum post alterum
Subcarbonatis Calcis grana sex.
— Magnesiae grana decem.
Carbonatis neutri Sodae grana quinquaginta quatuor.
Lagenam bene claude. (*Vm.*)
Aqua Bellilucana (Balaruc). (Gal.)

℞. Salis culinaris sesquidrachmam.
Muriatis Calcis grana octodecim.
— Magnesiae grana quinquaginta sex.
Subcarbonatis Magnesiae granum unum.
Aquae duplum volumen Gasis acidi carbonici continentis uncias viginti duas.
Aqua Borvonensis (Bourbonne les Bains). (Gal.)

℞. Salis culinaris . drachmas duas.
Muriatis Calcis . grana decem.
Aquae duplum volumen Gasis acidi carbonici continentis uncias viginti cum dimidia.
Liquor Sodae oxymuriaticae s. Natri chlorici, Subchloruretum Sodae liquidum. (HassP.)

℞. Salis Sodae depuratae partem unam.
Aquae destillatae . partes tres.
Immitte ad saturationem usque Acidum Salis dephlogisticatum. Liquorem obtentum Aquae destillatae ea quantitate dilutum ut sit ponderis specifici 1,0429 = 7° Ar. Bk. serva in vitris pluribus, uncіarum circiter quatuor capacibus etc.
Liquor Natri muriatici (Bor4.) ut reagens.

Subprotocarbonas Sodii, Subcarbonas Protoxydi Sodii, Subdeutocarbonas Sodii impurum, Subcarbonas Sodae, Soda, Soda cretacea, impura aërata s. effervescens, Mephitis Sodae, Creta Sodae, Alcali minerale fixum, Natron, Natrum, Alcali minerale, Carbonas Sodae, Carbonas Sodae impurus, Subcarbonas Sodae impurus s. impura, Hypercarbonas Sodae, Natrum carbonicum s. subcarbonicum crudum, Subcarbonas natricum, Carbonas Sodae alcalinus s. incompletus, Hypocarbonas Sodae; kohlensaures Natron oder Natrum, Soda, mineralisches Laugensalz; Sousprotocarbonate de sodium, Souscarbonate de protoxide de sodium, Souscarbonate de soude, Soude crayeuse, aërée ou effervescente, Méphite de Soude, Craie de soude, Alcali fixe minéral (*Gal.*).

1) Wie man es im Handel findet.

Soda, Barilla, Carbonas natricum s. Sodae impurum s. venale, Sal Sodae crudum, Alcali minerale crudum, Natrum carbonicum crudum; Soda, Barille; Soude, Barille (*Gal.*).

A Am. Ams. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. O. Pol. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *Be. C. Fi. G. M. Par. Pid. Sp. T.*

Man unterscheidet im Handel vier Arten Soda:

A. Natürliche Soda in feinen Nadeln oder pulverartigen schneeigen Efflorescenzen. Sie ist in Aegypten, in der Wüste von Thaiat, westlich vom Delta und in den Ebenen Oberungarns sehr häufig.

B. Die durch Einäscherung einer großen Anzahl von Seepflanzen, besonders solcher zu der Familie der Atripliceen und der Tange gehöriger, wie von Salsola, Chenopodium, Atriplex, Fucus, gewonnene. Sie ist in derben, festen, halbgeschmolzenen, steinharten, bläulichgrauen Massen von salzigem und laugenartigem Geschmack. Sie enthält kohlensäuerliche Soda in sehr verschiedener Menge, schwefelsaure Soda, Seesalz, kohlensauren Kalk, Alaun, Kieselerde und Eisen, bisweilen auch schwefelsaures Kali, salzsaures und selbst Jodkali.

C. Die durch Zersetzung des Seesalzes mittelst Bleiglätte gewonnene.

D. Die, welche man durch Calcination des schwefelsauren Natrums mit Kohle und Kreide erhält. Sie besteht aus kaustischem Natron, kohlensauerm Kalk, Schwefelkalk mit Ueberschuß der Base und Kohle.

2) Reinigung des käuflichen. *Natrum carbonicum depuratum.*

℞. Natri venalis . . quantum vis.
Grossiuscule pulveratum dissolve in Aqua, lixivium vaporando in tantum consume, donec 28 vel 30° Ar. indicet et crystallisationi subjice.

Fi. Cinerum Sodae quantum vis, Aquae quantum sufficit, solve in vase idoneo, post tres dies decantha, filtra per chartam panno, pulvere carbonis recentis strato tectam et cum residuo, novam Aquam addendo pluries sic age; lixivia evaporent ad pelliculam ut crystallos praebeant vel ad siccum; — *T.* Cineres ter vel quater cum Aqua frigida tractare, liquida commixta ad cuticulam evaporare, ad crystallisandum seponere et crystallos nova solutione

etc. purificare; — praeterea (et *T*): Muriatis Sodae libras quinque, Salis Tartari libras tres cum dimidia, Aquae communis quantum sufficit, solve, filtra, crystallisationi subjice, sales adhuc humidos commixtos lento calori expone, quo facto carbonas sodae liquatur, murias potassae vero intactus erit; liquido decanthato, muriatem ablue ad separandum omnem carbonatem et totum fluidum ad siccum consume.

Das Verfahren ist sonst in allen Pharmacopöen fast gleich.

Das kohlensaure Natron wird bei Scropheln, sogenannten passiven Wassersuchten, Verstopfungen der Unterleibseingeweide, Harngries und Harnsteinen mit harnsaurer Basis angewendet. — Gabe, von zehen bis zwanzig Gran.

Sodae Subcarbonas exsiccata, Natrum carbonicum depuratum siccum, Carbonas natricus depuratus, Sal Sodae depuratum siccum. (Bor4. HassP. LonN)

Sal Sodae depuratum crasse tritum solis aut modico fornacis calori expone, donec in pulverem siccum fatiscat etc. (Vergl. vorher das Verfahren von *Fi*)

Boli stomachici. (*Sw**.)

℞. Subcarbonatis Sodae semiscrupulum.
Pulveris aromatici scrupulos quatuor.
Syrupi Chinae . quantum sufficit ut fiant boli tres.

Pilulae Subcarbonatis Sodae s. lithontripticae. (Am. B*. Ed. RC. *Au. C. K.*)

℞ Subcarbonatis Sodae sicci partes quatuor.
Saponis duri . . . partes tres.
Syrupi simplicis quantum sufficit.
Fiant pilulae granorum quinquaginta. — Gabe, wenigstens zehen Stück alle zwei Stunden.

Am. *C.* et *E.* Subcarbonatis drachmam unam et Saponis semidrachmam ut fiant pilulae quadraginta; — RC. Subcarbonatis semunciam, Saponis oleosi drachmas tres, Syrupi Zingiberis vel simplicis quantum sufficit ut fiant pilulae granorum quinque. (Gabe, zwei bis vier, täglich drei Mal, bei Steinkrankheit.)

Pilulae absorbentes. (*E.*)

℞. Subcarbonatis Sodae,
Rhei,
Extracti Gentianae,
singulorum scrupulum unum.
Mercurii dulcis . . grana tria.
Fiant pilulae viginti. — Gabe, zwei Stück auf einmal, bei Verdauungsbeschwerden.

Unguentum s. Pomatum alcalinum. (*Ra.*)

℞. Subcarbonatis Sodae drachmas duas.
Laudani Sydenhami drachmam unam.
Axungiae Porci . unciam unam.
Misce. — Cullerier wandte diese Salbe bei verschiedenen Hautkrankheiten an, bei welchen viel Schmerzen vorhanden waren.

℞. Subcarbonatis Sodae,
Sulphureti Potassae,
singulorum drachmas tres.
Axungiae Porci . . uncias tres.

Alibert läßt diese Salbe bei tinea täglich in den Kopf einreiben, nachdem er vorher die Krusten mittelst erweichender Umschläge erweicht und zum Abfallen gebracht hat.

Aqua nephritica s. antinephritica. (B*. Ful. Ham. Li.)

℞. Subcarbonatis Sodae drachmas duas.
Aquae Calcis . . . libras duas.
Gabe, zwei oder drei Löffel.

Liquor Natri carbonici. (Bor4.)

Ut reagens; paratio non indicatur.

Potio absorbens, Mixtura antacida. (*E. Sw**.)

℞. Subcarbonatis Sodae,
Sacchari albi,
singulorum drachmas duas.
Vitellos Ovorum . . . . no. 2.
Mellis albi . . drachmas duas.
Misce. (*Sw**.)

℞. Subcarbonatis Sodae scrupulos quatuor.
Infusi Gentianae,
Aquae Cinnamomi,
singulorum uncias tres.
Tincturae Cardamomi semunciam.
Gabe, alle zwei oder drei Stunden einen Löffel. (*E.*)

℞. Subcarbonatis Sodae drachmam unam.
Sacchari albi . . . semunciam.
Mucilaginis Gummi Arabici uncias duas.
Aquae . . . . uncias triginta.
Tincturae Piperis Jamaicensis uncias duas.
Gabe, zwei Unzen, drei oder vier Mal täglich. (*Siv.*)

℞. Subcarbonatis Sodae scrupulos duos.
Rhei . . . . . drachmas duas.
Syrupi Sacchari . unciam unam.
Aquae Menthae crispae uncias octo.
Gabe, zwei Löffel täglich drei Mal. (*Sw**.)

Infusum amarum cum Natro, Potio digestiva. (*Au.*)

℞. Radicis Gentianae drachmas duas.
Fructuum Aurantiorum viridium sesquidrachmam.
Cardamomi minoris semidrachmam.
Subcarbonatis Sodae drachmam unam.
Aquae bullientis . . uncias sex.

Post sex horas infusionis cola. — Gabe, ein Löffel täglich drei Mal.

Potio antiscrophulosa. (*Ra.*)

℞. Subcarbonatis Sodae semidrachmam.
Tincturae Gentianae semunciam.

Seit 1816 wendet Peschier eine mehr oder weniger starke Auflösung des kohlensauren Natrums gegen Kropf an, z. B. zwei bis vier Drachmen desselben in acht Unzen Wasser; er giebt davon täglich zwei Mal einen Löffel in einem halben Glase Wein oder gewürzten Zuckerwasser. Hufeland verordnet täglich vier Löffel einer Auflösung von zwei Drachmen des Salzes in sechs Unzen Melissenwasser und einer halben Unze Zimmtwasser.

Tisana ad urinam arenosam. (*Sm.*)

℞. Seminum Lini contusorum,
Capilli Veneris Monspeliaci,
Mesembryanthemi crystallini,
singulorum pugillum unum.
Aquae . . . octarium unum.

Coque per horae quadrantem et colaturae adde
Subcarbonatis Sodae scrupulum unum.

Den Tag über zu trinken.

Solutio balsamica alkalisata. (*Sw.*)

℞. Subcarbonatis Sodae,
Sacchari,
Myrrhae, singulorum sesquiunciam.
Balsami Peruviani . semunciam.
— Canadensis drachmas decem.
Aquae . . . . . sesquilibram.

Man vermischt von dieser Auflösung eine Unze mit einer Pinte Wasser und läßt drei oder vier Mal täglich ein halbes Pfund davon nehmen.

Injectio lithontriptica. (*Bo.*)

℞. Subcarbonatis Sodae drachmam unam.
Saponis . . . . . uncias duas.
Aquae communis uncias duodecim.

Zur Auflösung von harnsauren Blasensteinen empfohlen.

Potio lithontriptica. (*E.*)

℞. Subcarbonatis Sodae grana duodecim.
Vini Ipecacuanhae guttas viginti.
Tincturae thebaicae guttas quatuor.
Aquae . . . . unciam unam.

Bei Keuchhusten. — Alle zwei oder drei Stunden einen Kaffeelöffel voll.

Infusum Quassiae cum Natro, Aqua stomachica. (*Au.*)

℞. Ligni Quassiae sesquidrachmam.
Subcarbonatis Sodae drachmas duas cum dimidia.
Aquae bullientis . libram unam.

Infunde per horam et cola. — Gabe, täglich zwei bis vier Löffel bei Verdauungsbeschwerden.

Protocarbonas Sodii, Carbonas Protoxydi Sodii, Carbonas Sodae s. natricum, Bicarbonas Sodae s. natricus cum Aqua, Carbonas neutrum Sodae s. Sodae completum, Sodae Carbonas, Sal Sodae perfecte saturatum, Natrum carbonicum perfecte saturatum s. neutrale, Deutocarbonas Sodii, Alkali minerale perfecte saturatum, Natrum carbonicum acidulum; gesättigte luftsaure Soda, gesättigtes kohlensaures Natrum.

1) Im festen Zustande.

Am. B. Ba. Bel. Bor4. Ed. Fenn. HassP. Li. Lon. LonN. Suec. *C. Fi. T.*

℞. Subcarbonatis Sodae purificati partem unam.
Aquae calidae . . partes duas.

Transmitte per solutionem filtratam et refrigeratam Gasis acidi carbonici torrentem et crystallos exinde sponte enatas serva. (Am. B. Ba. Bel. Ed. Fenn. Suec. *C. T.*)

Fi. per solutionem Subcarbonatis in lagena Woulfiana torrentem gasis transmittitt ad saturationem usque etc.; — HassP. Salis partes duas, Aquae tres, solutioni filtratae torrentem Gasis acidi carbonici extricati e mixtura Cretae albae s. Lapidis calcarei purioris pulverati parte una et dimidia, Aquae communis partibus quatuor, Acidi Vitrioli diluti partibus affusis duodecim; — Bor4. Natri carbonici depurati sesquiunciam, Aquae destillatae tres cum dimidia, liquorem immitte in vas librarum decem capax, Gase Acidi carbonici repletum etc.; — LonN. Sodae Subcarbonatis libram unam, Aquae octarios tres, solutioni Gas ad saturationem completam immitte et ad crystallisandum sepone, crystallos sicca; liquorem reliquum consume cavendo ne calor gradum 120 excedat, ut iterum prodeant crystalli.

℞. Subcarbonatis Sodae libram unam.
Aquae . . . octarium unum.

Solutioni adde

Subcarbonatis Ammoniaci uncias tres.

Misce et per tres horas calori 80° C. expone, donec omne ammoniacum sit expulsum et liquorem ad crystallisandum sepone. (Am. Lon. *C. Fi.*)

2) Im flüſſigen Zuſtande.

Aqua Supercarbonatis Sodae s. Carbonatis Sodae acidula. (B*. Ed. Fenn. Han. Pol. R. RC. Suec. *Sm. Vm.*)

℞. Subcarbonatis Sodae uncias duas.
Aquae . . . . libras decem.

Per solutionem transmitte Gas acidum carbonicum e mixtura Cretae, Acidi sulphurici, singulorum unciarum trium et Aquae trium librarum.

Dieſes Salz, welches man heutzutage viel in Gebrauch zieht, unterſcheidet ſich in therapeutiſcher Hinſicht nicht viel von dem vorhergehenden.

Aqua Sodae, Aqua alcalina gasosa. (Am. *C. Ra.*)

℞. Subcarbonatis Sodae drachmas tres.
Aquae . . . . octarios octo.

Solutionem volumine Gasis acidi carbonici decuplo satura. (Am. *C.*)

℞. Subcarbonatis Sodae grana octodecim.
Acidi hydrochlorici semidrachmam.
Aquae . . . uncias duodecim.

Serva in lagena bene obturata. (*Ra.*)

Potio febrifuga. (*Bo.*)

℞. Aquae destillatae . uncias octo.
Acidi carbonici quantum sufficit ut sit volumen duplum Aquae; solutioni adde
Subcarbonatis . semidrachmam.
Camphorae . . . grana viginti.
Syrupi Papaveris drachmas sex.

Man läßt die Hälfte davon vier Stunden vor dem Anfall und das Uebrige im Augenblicke des Eintretens deſſelben nehmen. Man muß ſieben oder acht Tage damit fortfahren.

Trochisci digestivi. (GalP. GalH. *Ma.*)

℞. Bicarbonatis Sodae partes ducentas quinquaginta.
Sacchari albi partes quater mille septingentas quinquaginta.
Olei essentialis Menthae partes octo.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae quantum sufficit.

Fiant trochisci granorum octodecim. — Gabe, zwei oder drei Stück vor und nach der Mahlzeit bei Stein und Gicht.

Subprotoboras Sodii, Subboras Protoxydi Sodii, Subboras Sodae, Boras supersaturatus Sodae, Boras Sodae cum baseos excessu, Soda boraxata (*H.*), *Boras Sodae* (*B.*), *Borax, Borax crudus, Natrum subboracicum, Tinckal, Tinkar, Boras Sodae alcalescens s. alcalinum s. alcalinus, Boras supersodicus, natricus cum Aqua, Borax Venetus s. Veneta s raffinata, Hyposboras Sodae, Subboras natricum;* Borax, natürliches Sebativſalz; Sousprotoborate de sodium, Sousborate de protoxide de sodium, Sousborate de soude, Borate sur-saturé de soude, Borate de soude avec excès de base, Soude boratée (H), Borate de soude (B.), Borax, Borax brut, Tinckal, Tinkar (*Gal.*); Atinkal (*Ang.*); Buruk (*Ar.*); Piger (*Balt. Jav. Mal.*); Lansipuscara (*Cy.*); Sohaga (*Duk. Hin.*); Borace, Tinkal (*I.*); Chaularya (*Nep.*); Tunkar (*Pe.*); Borax (*Pol. Suec.*); Tincal (*Lus.*); Tunkana (*Sa.*); Velligarum, Vengarum (*Tam.*).

A. Am. Ams. B. Ba. Bel. Bor. Boré. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. WW. *A. Fi. G. Par. Sp. T.*

In hexaëdriſchen, mehr oder weniger abgeplatteten, in diedriſche Pyramiden endigenden, bald farbloſen, bald gelblichen oder grünlichen, ſtets mit einem erdigen, fett anzufühlenden, ſeifenartig riechenden Ueberzug bedeckten Prismen von glaſigem Bruche, mit Ausblühungen überzogen und von ſchwach alkaliſchem Geſchmack.

Borax pura (HassP.) vel crystallisata vel usta ut reageus adhibetur.

Species diaboracis. (Wir.)

℞. Boracis Veneti . . semunciam.
Cassiae ligneae,
Croci orientalis,
singulorum drachmam unam.
Rasurae Ligni Sabinae,
Succini albi praeparati,
singulorum semidrachmam.
Ossis Cordis cervini,
Visci querni,
Florum Cheiri,
singulorum scrupulum unum.

Fiat pulvis. — Mynſicht empfahl dieſe Species zur Erleichterung der Niederkunft. — Gabe, von einem Scrupel bis zur halben Drachme.

Pulvis ad partum promovendum. (Pal. Wir.)

℞. Boracis . . . . . semunciam.
Castorei,
Croci,
singulorum sesquidrachmam.
Olei Cinnamomi . guttas octo.
— Succini . . . guttas sex.

Misce ut fiat pulvis. (Wir.)

℞. Cassiae ligneae,

Cinnamomi,
singulorum drachmas duas.
Boracis,
Succini albi praeparati,
singulorum drachmam unam.
Croci . . . . semidrachmam.
Olei Cinnamomi . guttas tres.
Misce ut fiat pulvis. (Pal.)

Man ſchrieb dieſem Pulver ehedem denſelben Nutzen zu, als dem vorhergehenden. — Gabe, von einem Scrupel bis zur halben Drachme.

Mixtura ad partum. (*Sw.*)

℞. Boracis . . . drachmas duas.
Aquae Chamomillae Romanae
uncias quatuor.
Syrupi Corticum Aurantiorum
semunciam.
Succinatis Ammoniaci liquidi
drachmas duas.
Laudani Sydenhami
semidrachmam.

Gabe, alle halbe Stunden zwei Löffel.

Infusum Salep cum adstringentibus, Potio adstringens. (*Au.*)

℞. Salep . . . drachmam unam.
Aquae bullientis uncias decem.
Colaturae adde
Extracti Chinae,
— Ligni Campechiensis,
singulorum drachmam unam.
Boracis . . . semidrachmam.
Syrupi Althaeae unciam unam.

Löffelweiſe zu nehmen, bei chroniſcher Diarrhöe, beſonders aber bei ſogenannten aſthmatiſchen bösartigen Geſchwüren und Schwämmchen.

℞. Salep . . . . drachmas duas.
Seminum Lini . . semunciam.
Aquae bullientis uncias decem.
Post sufficientem extractionem cola et colaturae adde
Boracis . . . semidrachmam.
Extracti Ligni Campechiensis,
— Chinae,
singulorum drachmam unam.
Syrupi Althaeae unciam unam.

Löffelweiſe, in denſelben Fällen, wie das vorhergehende.

Linimentum de Borate s. ad aphthas, Mel Boracis s. boraxatum s. Subboratis Sodae, Linctus de Borace s. ad aphthas, Collutorium boraxatum s. adstringens. (DD. Ed. GalM. Ham. Lon. LonN. Suec. *Au. C. Pie. Sa. Sw. Sy. Vm.*)

℞. Boracis . . drachmam unam.
Olei Amygdalarum dulcium
unciam unam.
Vitellum Ovi . . . . . no. 1.
Misce triturando. (*Sa. Sw.*)

℞. Boracis . . . . partem unam
Mellis despumati . partes octo.
Misce. (Ed. Ham. Lon. LonN. *C.*)

GalM. Boracis partem unam, Mellis decem; — *Pie.* et *Vm.* Boracis unam et duodecim Mellis; — *Au.* Boracis et Mellis, singulorum partes aequales.

℞. Boracis drachmam unam vel duas.
Mellis despumati unciam unam.
Extracti Juglandis
drachmam unam vel duas.
Misce triturando. (*Sw.*)

℞. Boracis . . . drachmam unam.
Syrupi Mororum
unciam unam ad tres.
Misce. (*Au.*)

℞. Boracis drachmam unam ad duas.
Mucilaginis Seminum Cydoniorum,
Syrupi Mororum,
singulorum unciam unam.
Misce. (*Sw. Sy.*)

℞. Boracis . . . sesquidrachmam.
Aquae fontanae,
Mellis, singulorum unciam unam.
Misce triturando. (DD. Suec.)

Gargarisma e Borace s. ad aphthas s. boraxatum s. Subboratis Sodae, Mixtura boraxata, Liquor ad aphthas. (DD. Gen. Ham. RC. *Au. B. Ca. E. Pie. Ra. Sa. Sw. Sy.*)

℞. Boracis . . . . . semunciam.
Aquae . . . . . libram unam.
Mellis flavi . . . semunciam.

Interdum additur Alcoholis impuri uncia una vel sesquiuncia.

℞. Boracis . . . drachmas duas.
Mucilaginis Seminum Cydoniorum
semilibram.
Mellis rosati . . unciam unam.
Misce. (Gen. *Sa.*)

Sw. coquere jubet Seminum Cydoniorum unciam unam in Aquae sedecim ad duodecim remanentiam et colaturae addere Boracis drachmas tres et Mellis rosati sesquiunciam.

℞. Boracis . . . . drachmas sex.
Infusi Salviae . uncias decem.
Mellis despumati . uncias duas.
Misce. (Ham.)

DD. Boracis drachmas duas, Infusi Salviae uncias octo et Mellis unciam unam; — *B.* Boracis scrupulum unum, Decocti Salviae libram unam et Aquae Vitae unciam unam.

℞. Boracis . . . drachmas duas.
Aquae,
Tincturae Myrrhae,
singularum unciam unam.
Mellis rosati . . . uncias duas.
Misce. (*Ca. Sw.*)

Au. et *Sy.* Boracis unciam unam, Aquae libram unam, Tincturae Myr-

rhae uncias duas et Mellis tantidem; — *E.* Boracis drachmam unam, Aquae uncias quatuor, Tincturae Myrrhae semunciam et Mellis unciam unam.

℞. Boracis . . . drachmas duas.
Decocti Hordei . . sesquilibram.
Syrupi Gummi . unciam unam.
Misce. (*Ra.*)

℞. Boracis . . . drachmas duas.
Infusi Rosarum . uncias decem.
Syrupi Mororum . semunciam.
Misce. (*B.*)

℞. Boracis . . . . drachmas tres.
Decocti Chinae uncias duodecim.
Mellis . . . . . sesquiunciam.
Misce. (*Ra.*)

℞. Boracis drachmas duas ad tres.
Mellis . . . . unciam unam.
Extracti Juglandis . semunciam.
Alcoholis unciam unam ad duas.
Aquae bullientis libram unam.
Misce. (*Sw.*)

℞. Boracis,
Sulphatis Cupri,
singulorum grana octo.
Tincturae Coccionellae
drachmam unam.
Aquae . . . . unciam unam.
Spiritus Cochleariae uncias duas.
Syrupi Rubi Idaei
quantum sufficit.
Misce. (*Pie.*)

Collyrium boracicum. (*Au.*)

℞. Boracis . . . semidrachmam.
Sacchari . . drachmam unam.
Aquae Rosarum . uncias duas.
Aqua cosmetica. (*Au.*)

℞. Furfuris Amygdalarum
uncias duas.
Aquae Rosarum,
— Florum Aurantiorum,
singularum uncias octo.
Fiat emulsio, cui adde
Tincturae Benzoës drachmas duas.
Boracis . . . drachmam unam.

Subprotophosphas Sodii, †*Subphosphas Protoxydi Sodii*, *Subphosphas Sodae*, *Sal mirabile perlatum*, *Phosphas Sodae s. natricum*, *Soda phosphorata*, *Natrum phosphoricum s. oxyphosphorodes*, *Alcali minerale phosphoratum*, *Sal cathartic̃um Pearsoni s. perlatum.* (Am. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Gal. Han. HassP. O. Pol. Sax. Sueo. *Br. C. Fi. Sw. T. Vm.*)

℞. Acidi phosphorici partem unam.
Aquae . . . . . partes octo.
Mixturae sensim infunde
Solutionis Subcarbonatis Sodae
quantum sufficit
i. e. donec alcali levis excessus adsit; liquor filtratus evaporet, ut crystallos demittat, quas in loco bene sicco serva. (An. B. Bor. D. Han. O. Pol. Sax. *Br. Sw.*)

Bor4. Natrum carbonicum crudum adhibet

℞. Supersulphatis Calcis quantum vis.
Subcarbonatis Sodae
quantum sufficit
ad saturandum acidum; liquor clarus post decanthationem evaporet, donec 25° ar. indicet, quo facto crystallisationi subjiciatur. (Am. B. Ba. Bel. Du. Ed. Fenn. Fer. Gal. Suec. *C. Vm.*)

℞. Pulveris Cornu Cervi usti albi aut aliorum ossium animalium calcinatorum ad albedinem
libras quinque.
Misce in vase murrhino cum
Aquae communis libris quindecim.
Deinde sub assidua agitatione sensim adde
Olei Vitrioli Nordhusani
libras quatuor cum dimidia.
Post duodecim horas adde
Aquae communis fervidae libras quindecim usque viginti
et mixtionem, frequenter agitando, per horas quadraginta et octo super igne digere, cola fluidum per linteum ac residuum bene elotum in prelo laminis ligneis vel stanneis munito exprime. Liquori obtento in aheno stanneo, capace, calefacto, sensim affunde
Liquorem Salis Sodae depuratae concentratum
ad saturationem usque et donec soda paullulum praevaleat, tunc filtretur et residuum eluatur. Filtratum evaporet, donec gutta lapidi instillata, crystallos exhibeat, tunc ad crystallisandum seponatur; crystallos inter chartam bibulam siccatas statim serva. (HassP.)

Fi. Ossium calcinatorum libras quinque cum Aquae communis libris decem in vas ingerere, et bene commixtis addere Acidi sulphurici concentrati libras tres, per aliquot dies seponere, aliam Aquam addere, colare et filtrare, sedimentum abluere et liquores ad syrupi consistentiam consumere, novam Aquam affundere, filtrare et denuo ad syrupi consistentiam consumere, ut refrigeratione crystalli enascantur etc.; — vel: Salis Glauberi libras duas, Ossium calcinatorum libras duas cum dimidia et Aquae communis libras quatuor coquere per horam circiter unam, decanthare fluidum, residuum abluere, liquores filtrare et consumere ut crystallisent.

T. Solutionem Subcarbonatis Sodae iteratim Phosphato acido Calcis infundere, mixta per aliquot momenta calori modico exponere, praecipitatum

filtrando separare, addere solutionis filtratae Subcarbonatis Sodae parvum excessum, consumere ad pelliculam et in crystallos cogere.

Ein mildes Abführmittel. — Gabe, eine halbe bis anderthalb Unzen in Fleischbrühe.

Mixtura Natri phosphorici, Potio laxans. (*Au.*)

℞. Phosphatis Sodae,
Syrupi Althaeae,
singulorum semunciam.
Aquae . . . . uncias quatuor.
Portionenweise ſtündlich zu nehmen.

Phosphas Sodae et Ammoniaci. (Ba)

℞. Subphosphatis Sodae partes sex.
Liqua, leni igne, in
Aquae destillatae calidae
partibus duabus
in solutione tenentibus
Salis Ammoniaci partem unam.
Solutionem per horas viginti quatuor in loco frigido relinque et crystallos enatas collige atque sicca.

Superprotosulphas Sodii, Supersulphas Protoxydi Sodii, Sulphas Sodae acidulus s. acidus. (*Sw*. Vm.*)

℞. Acidi sulphurici,
Aquae, singulorum uncias quatuor.
Mixturae adde
Subcarbonatis Sodae uncias octo.
Filtra et ad crystallisandum repone. — Purgirend. — Gabe, zwei bis ſechs Drachmen.

Protosulphas Sodii, Sulphas Protoxydi Sodii, Sulphas Sodae, Hydrosulphas Sodae (*B.*), *Soda sulphurica* (*H.*), *Soda vitriolata, Alcali minerale sulphuricum s. vitriolatum, Natrum sulphuricum, Sal catharticum s. mirabile Glauberi, Sulphas natricus, Vitriolum Sodae;* ſchwefelſaures Natron, Glauberſalz.

1) Wie man es im Handel findet:

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. BorC. Bor4. DD. Du. Ed. Fenn. Ful. Gal. Han. HassP. His. Li. Lon. LonN. O. Sax. Suec. WW. *C. G. Par. T.*

In langen, ſechsſeitigen, in eine zweiſeitige Spitze endigenden, durchſichtigen, weißen, ausblühenden Prismen von anfangs kühlendem, dann bitterem Geſchmack.

2) Im Ganzen bereitet:

A. Ams. An. B. Bel. Bor. Bor4, Br. D. Du. Ed. Fer. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. Lon. LonN. Lus. O. R. Sar. Wir. *Br. Fi. Pid. Sp. Sw. T. Vm.*

℞. Residui e destillatione Acidi hydrochlorici . . quantum vis.
Dissolve in Aquae pondere triplo, satura liquorem cum Subcarbonate Sodae et filtratum ad crystallisandum pone. (A. Ams. B. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fer. Gen. Han. Hass. HassP. Lon. LonN. Lus. O. R. Sar. Wir. *Br. Fi. Pid Sp. Sw. T. Vm.*)

Bor4. praeterea Natrum sulphuricum crudum in Aquae s. q. solvere, filtrare et l. a. in crystallos redigere jubet.

℞. Subcarbonatis Sodae quantum vis.
Dissolve in Aqua et liquori infunde
Acidi sulphurici quantum sufficit ad neutralisandum alcali; solutionem consume ut crystallos demittat. (Ams. An. B. Bel. Fer. Gal. *Fi.*)

T. praeterea ut Sulphatem Potassae parari jubet.

Gabe, zu einer bis anderthalb Unzen, ein gelind reizendes Abführmittel; zu drei bis fünf Scrupel harntreibend. — Man wendet es auch als eröffnend an.

Sal mirabile Glauberi siccatum. (Bor4. HassP.)

Sal mirabile depuratum crasse tritum solis aut modico fornacis calori expone, donec in pulverem siccum fatiscat et cribra. — Bor4. ut Natrum carbonicum depuratum siccum.

Potio purgans. (B*. BorC. GalM. Ham. *Au. Ra. Sa.*)

℞. Sulphatis Sodae partes sedecim.
Aquae . . . partes quingentas.
Dissolve. (GalM.)

℞. Sulphatis Sodae unciam unam.
Aquae . . . . . uncias octo.
Mellis puri . . . semunciam.
Dissolve. (BorC.)

℞. Sulphatis Sodae . . semunciam.
Nitri . . . . drachmam unam.
Succi Citri . . . sesquiunciam.
Syrupi Rubi Idaei uncias duas.
Aquae Rubi Idaei uncias decem.
Misce. (*Sa.*)

℞. Sulphatis Sodae unciam unam.
Sacchari . . . . semunciam.
Succi Citri . . . semunciam.
Decocti Gruti octarium unum.
Glasweiſe ſtündlich. (*Au.*)

℞. Salis Glauberi . unciam unam.
Aquae Menthae piperitae,
Infusi Rhei,
singulorum uncias tres.
Oxymellis scillitici unciam unam.
Misce. (Ham.)

℞. Sennae . . . . drachmas tres.
Sulphatis Sodae drachmas duas.
Mannae . . . . unciam unam.
Aquae bullientis uncias quatuor.
Infunde et cola. (*Ra.*)

℞. Pulpae Tamarindorum
sesquiunciam.
Aquae . . . quantum sufficit ut unciae quatuor decocti obtineantur, quarum colaturae adde
Sulphatis Sodae . . semunciam.
Syrupi Rosarum solutivi
drachmas sex.

Misce. (*Sa.*)

℞. Sulphatis Sodae . sesquiunciam.
Mannae . . . . unciam unam.
Aquae . . . . . uncias sex.

Löffelweiſe. (*Au.*)

℞. Sulphatis Sodae drachmas duas.
— Magnesiae unciam unam.
Infusi Corticis Aurantiorum uncias octo.
Vini rubri parvam quantitatem.
Misce. (B*.)

Clyster s. Enema purgans. (Li. *Ra. Sa. Sy.*)

℞. Sulphatis Sodae unciam unam.
Olei Lini . . . . uncias duas.
Decocti Hordei . . uncias sex.
Misce. (*Sy.*)

℞. Specierum emollientium uncias duas.
Foliorum Sennae . semunciam.
Sulphatis Sodae drachmas duas.
Aquae bullientis . libram unam.
Infunde et cola. (*Ra.*)

Ra. praeterea Sennae drachmas duas, Sulphatis semunciam et Decocti emollientis libras duas, vel: Sennae semunciam, Sulphatis tantidem et Aquae libram unam; — Li. Decocti emollientis uncias octo, Oxymellis uncias tres et Sulphatis unciam unam.

℞. Herbae Rutae,
Florum Chamomillae,
— Sambuci,
singulorum semunciam.
Aquae . . . . libram unam.
Coquendo partem tertiam consume et colaturae adde
Salis Glauberi . drachmas tres.
Oxymellis simplicis,
Olei Chamomillae,
singulorum unciam unam.
Misce. (*Sa.*)

Apozema depurans et tonicum. (*Pie.*)

℞. Radicis Patientiae unciam unam.
— Fragariae . . semunciam.
— Inulae . drachmam unam.
Foliorum Cichorii,
— Cerefolii,
— Nasturtii,
singulorum manipulum unum.
Sulphatis Sodae drachmam unam.
Syrupi Cichorii compositi drachmam unam.

Alle Morgen zu nehmen.

Decoctum Carnis depurans, Brodium depurativum. (*Pie.*)

℞. Brodii gallinacei octarium unum.
Radicis Patientiae . uncias duas.
Coque per horae semiquadrantem et sub finem adde
Foliorum Nasturtii,
— Melissae,
— Primulae Veris,
singulorum manipulum unum.
Cola et adde
Sulphatis Sodae . uncias duas.

Apozema laxans. (Gal. *Ca. Fi.*)

℞. Foliorum viridium Cichorii,
— — Buglossi,
— — Boraginis,
singulorum unciam unam.
Aquae bullientis . . libras duas.
Infunde per horae quadrantem, cola et colaturae adde
Sulphatis Sodae drachmas duas.
Syrupi Violarum unciam unam.
Misce bene. (Gal.)

Fi. Aquae libras duas et uncias octo; caeterum ut Gal.

Lotio ad tineam s. excitans. (*Sw.*)

℞. Sulphatis Sodae . . uncias sex.
Saponis albi . . drachmas tres.
Aquae Calcis uncias octodecim.
— Vitae . . drachmas sex.

Solutio salina gelatinosa. (*Ca.*)

℞. Aquae . . . . libram unam.
Subcarbonatis Sodae,
Collae Flamandicae,
singulorum unciam unam.
Sulphatis Sodae,
Salis culinaris,
singulorum semunciam.
Petrolei . . . . guttas viginti.

Pulvis cathartico-diureticus. (*Sw*.*)

℞. Tartari stibiati,
Opii, singulorum granum unum.
Sulphatis Sodae . uncias duas.
Gummi Arabici,
Radicis Liquiritiae,
singulorum drachmas duas.

Drei oder vier Mal täglich in einem Glaſe Waſſer zu nehmen.

Sal Guindre. (B*. *Ca.*)

℞. Sulphatis Sodae unciam unam.
Nitri . . . . grana duodecim.
Tartari stibiati . . semigranum.

Purgirend. — Man läßt es in einer Pinte Biſane oder Kräuterbouillon auflöſen und am Morgen nehmen.

Aqua resolvens. (*Ca.*)

℞. Sulphatis Sodae unciam unam ad duas.
Nitri . . . . . grana decem.
Tartari stibiati . semigranum.
Aquae . . . . . libras duas.

Aqua purgans cum Tartaro emetico, Aqua mineralis. (GalM. *Ra.*)

℞. Sulphatis Sodae drachmas tres

Tartari stibiati . . grana tria.
Aquae calidae . uncias decem.

Potio cathartica. (*Ca.*)

℞. Sulphatis Sodae,
Mannae in lacrymis,
singulorum semunciam.
Tartari stibiati . . grana duo.
Aquae . . . . uncias quatuor.
Oxymellis scillitici unciam unam.
Gabe, alle zwei Stunden ein Löffel.

Sulphas Sodae et Magnesiae, Sal Astracanensis artificialis (*Sw**.) *Sulphas Magnesiae et Sodae* (*Fi.*).

℞. Supersulphatis Sodae
quantum vis.
Aquae tepidae quantum sufficit ad exactam salis dissolutionem, quam cum Magnesia calcinata saturatam filtra et ad crystallisandum sepone. — Laxirend oder harntreibend, je nach der Gabe. — Gabe, von einer halben bis zwei Drachmen, täglich mehrmals, bis auf eine oder zwei Unzen auf einmal.

Protosulphis Sodii, Sulphis Sodae. (*Vm.*)

℞. Subcarbonatis Sodae
partem unam.
Aquae . . . . partes quatuor.
Dissolve, satura Gase acido sulphuroso, calefac deinde in balneo aquae tepido et liquorem sepone ut crystallos demittat.

Protohyposulphis Sodii, Hyposulphis Sodae, Sulphites ; sulphuratus Sodae. (Gal. *Vm.*)

℞. Subcarbonatis Sodae partes octo.
Aquae . . . . partes sedecim.
Solutioni adde
Sulphuris sublimati partem unam.
In liquorem immitte torrentem Gasis acidi sulphurosi, filtra post saturationem, tunc evaporet liquor ut crystalli enascantur. (Gal.)

Vm. transmittere jubet torrentem Gasis Acidi hydrosulphurici in solutionem Sulphitis Sodae vel torrentem Gasis Acidi sulphurosi in illam Hydrosulphatis Sodae.

Protonitras Sodii, Nitras Protoxydi Sodii, Nitras Sodae s. natricum s. cubicum, Nitrum cubicum, Nitrum rhomboidale. (B*.)

℞. Subcarbonatis Sodae quantum vis.
Acidi nitrici tenuis
quantum sufficit ad saturandum alcali; solutionem ad crystallisandum sepone. — Man hat dieses Salz bei Ruhr empfohlen.

Solutio Nitratis Sodae. (B*.)

℞. Nitratis Sodae . . semunciam.
Gummi Arabici . grana decem.
Aquae . . . . uncias octo.
Gabe, alle Stunden einen Löffel.

Hydrosulphas Sodae. (*Vm.*)

℞. Sodae causticae calcinatae
partem unam.
Aquae . . . . . partes sex.
Post solutionem torrentem Gasis acidi hydrosulphurici in liquorem immitte et sepositione clarificatum serva.

Balneum sulphurosum. (*Ca.*)

℞. Hydrosulphatis Sodae
uncias decem.
Solutionis salinae gelatinosae
uncias quatuor.
Man thut es im Augenblicke des Badens in das Badewasser.

Protoacetas Sodii, Acetas Protoxydi Sodii, Acetas Sodae, Acetas Sodae crystallisatus, Acetis Sodae, Deutoacetas Sodii, Sal Sodae acetatum, Sal acetosum minerale, Acetas natricum, Alcali minerale acetatum, Natrum aceticum, Soda acetata s. acetosa, Terra foliata mineralis s. Tartari crystallisata. (A. Ams. B. Ba. Bel. Bor. D. Gal. Han. Hass. HassP. Li. O. Pal. R. Sar. *Fi. Sw. Vm.*)

℞. Subcarbonatis Sodae quantum vis.
Aceti destillati quantum sufficit ad saturandum alcali; cola liquorem, qui ad pelliculam evaporatus refrigeret ut crystalli enascantur.
Harntreibend oder cathartisch, je nach der Gabe; letztere von zwei bis vier Drachmen.

Pilulae antilacteae s. ad repulsionem lactis. (*Bo.*)

℞. Acetatis Sodae drachmas quinque.
Camphorae,
Nitri, singulorum drachmas duas.
Roob Sambuci quantum sufficit.
Fiant pilulae centum viginti. — Gabe, zwei Stück Morgens und zwei Abends.

Pulvis diureticus. (*Au.*)

℞. Acetatis Sodae,
Elaeosacchari Juniperi,
singulorum drachmas tres.
Scillae . . . . . grana sex.
Calami aromatici semidrachmam.
Opii . . . . . grana tria.
Fiant doses sex. — Gabe, täglich drei Stück in Wachholderthee.

Pilulae e Rheo cum Natro acetico s. laxantes. (*Au.*)

℞. Rhei,
Acetatis Sodae,
Fellis Tauri inspissati,
singulorum drachmam unam.

Gummi Arabici . semidrachmam. Fiant pilulae granorum duorum. — Gabe, zehen bis funfzehen Stück täglich zwei Mal.

Protomeconas Sodii, Meconas Protoxydi Sodii, Meconas Sodae. (Fer.)

℞. Acetatis Sodae . unciam unam. Tincturae Opii alcoholicae uncias quatuor.

Digere per dies aliquot, filtra ut crystalli enatae separentur, quae Alcoholis bullientis ope purificentur.

Man hat dieses Salz als ein sicheres Mittel gegen Bandwurm empfohlen; man muß es aber mit großer Vorsicht anwenden, da es schon, zu einem halben Gran gegeben, ein heftiges Gift ist.

Proto-Oleomargaras Sodii.

S. Proto-Oleomargaras Potassii.

Solanum.

Wir führen hier folgende vier Arten dieser Pflanzengattung an:

1) *Solanum Lycopersicum, L.*; Liebesapfel, Goldapfel; Tomate, Pomme d'amour (*Gal.*); Lovapple (*Ang.*); Elskobsaeble (*D.*); Tomates (*His.*); Appeltje der liefde (*Bel.*); Pomo d'amore (*I.*); Tomate (*Lus.*); Karleksaeple (*Suec.*).

Gal.

☉ (Pentandria Monogynia, L.; Solaneae, *J.*) Eine Südamericanische, in Europa cultivirte Pflanze. (*Rumph* Amb. V. t. 154. *Blackw.* t. 133. *Plenck.* t. 122.)

Man wendet die Früchte (Mala Lycopersica) an; es sind runde, verschiedenlappige, fleischige, saftige, glatte, glänzende, gelbe oder rothe Beeren, welche in einem säuerlichen Fleische eine große Anzahl Saamen enthalten.

2) *Solanum Melongena, L.*; Eierfrucht; Aubergine, Melongène (*Gal.*); Eggplunt (*Ang.*); Berinjela (*His.*); Eierdragende nagtschade (*Bel.*); Melanzana (*I.*); Beringela (*Lus.*).

His. Be.

☉ Eine im südlichen Europa cultivirte Pflanze. (*Plenck* t. 123.)

Man wendet die Frucht (pomum Melongenae s. Mala insana) an; sie ist von verschiedener Gestalt und Farbe, bald weiß und vollkommen eiförmig, bald langgestreckt und violett.

Nährend, lindernd. — Man wendet sie auf schmerzhafte Hämorrhoidalknoten an.

3) *Solanum nigrum, L.*; schwarzer Nachtschatten; Morelle noire (*Gal.*); Black nightshade (*Ang.*); Psy vjno (*B.*); Svineurt, Soebaer (*D.*); Hierba moiro (*His.*); Zwarte nagtschade (*Bel.*); Solano nero, Solatro, Erba morella (*I.*); Psiuki ziele (*Pol.*); Herba moira (*Lus.*); Hansletsgras (*Suec.*).

An. Ba. Br. D. Fer. Gal. GalM. Gen. His. Wir. Würt. *Be. Br. Fi. G. M. Sp. Z.*

☉ Eine in ganz Europa sehr gemeine Pflanze. (*Bull.* t. 67. *Blackw.* t. 107. *Plenck* t. 120. *Hayne* II. t. 40. *Zorn* Ic. pl. t. 44.)

Man wendet das Kraut (herba Solani nigri) an; es besteht aus einem rundlichen, wehrlosen, ästigen, glatten Stängel mit eirunden, eckig und spitzig gezähnten Blättern. Es hat einen unangenehmen, betäubenden Geruch und einen Ekel erregenden Geschmack.

Die Beeren enthalten, nach Desfosses, ein eigenthümliches Alcaloid, das Solanin (Solaninum, Solanina).

Leicht schweißtreibend, äußerlich erweichend und lindernd.

4) *Solanum tuberosum, L.*; Kartoffel; Pomme de terre (*Gal.*); Common potatoe (*Ang.*); Rata inuada (*Cy.*); Jordeable (*D.*); Patata de la Mancha (*His.*); Patata, Pomo di terra (*I.*); Aardappel (*Bel.*); Ziennce jablko (*Pol.*); Batata du terra (*Lus.*); Jordpaeron (*Suec.*); Wal arai kilangu (*Tam.*); Uralay gudda (*Tel.*).

Fer. Gal. *A. Fi. G. M.*

♃ Eine in America einheimische, von Walther Raleigh im Jahr 1584 nach Europa gebrachte Pflanze. (*Bauh.* Prodr. t. 39. *Plenck* t. 121. *Bert.* Bild. II. 56. fig. 2.)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an.

Der Gebrauch der Wurzel in der Küche ist allgemein bekannt.

In der Medicin wendet man das Stärkemehl an, welches diese Wurzel in großer Menge enthält.

Das Kraut gilt für krampfstillend. Latham empfiehlt das Extract davon.

Decoctum narcoticum. (*Ra.*)

℞. Foliorum siccorum Solani nigri uncias duas.
Capita Papaveris albi . . no. 4.
Aquae . . . . . libras duas.

Coque et cola. — Lindernd und besänftigend, in Bähungen, örtlichen Bädern, Einspritzungen und Klystiren anwendbar.

Oleum Solani nigri. (Gal. His. *T.*)

℞. Herbae Solani nigri cum seminibus . . . . . partem unam.
Olei Olivarum . . . partes tres.

Digere per aliquot tempus inter cineres calidos, tunc ad consumptionem humidi usque coque. (His.)

Gal. Foliorum partem unam et duas Olei; *T.* Herbae uncias duodecim,

Olei libras quatuor, digestionem per horas 24, filtrationem olei, expressionem faecum, novam cum aequali Summitatum et Florum copia, levem coctionem per aliquot momenta, novam filtrationem et expressionem et denique sepositionem olei ut clarificetur.

Unguentum Solani. (*Sp.*)

℞. Succi Foliorum et Baccarum Solani expressi uncias triginta sex.
Olei Olivarum
uncias quinquaginta quatuor.
Cerussae . . uncias octodecim.
Lithargyri . uncias triginta sex.
Coque et adde
Cerae albae . . . . uncias sex
Pulveris Olibani . . uncias tres.

Aqua Solani nigri. (Br. Gal. Pal.)

℞. Herbae Solani nigri partem unam.
Aquae . . . . . partes tres.
Destillet dimidia pars. (Br. Pal.)

Gal. Herbae partes quinque in Aquae duodecim cum dimidia submersas, destillando partes decem abstrahere, productum miscere cum Herbae partibus quinque et Aquae decem, destillando iterum partes decem abstrahere et operationem, si necessarium videtur, tertiò repetere.

Faecula s. Amylum Solani tuberosi. (B*. Bel. Fer. Gal. *Fi. T. Vm.*)

℞. Pomorum terrestrium lotorum
quantum vis.

Raspa, pulpam commisce cum Aquae tanta quantitate ut per cribrum e crinibus textum possit transmitti; liquorem turbidum exinde profluentem in vase porcellaneo (Fajence) excipe, sepone, faeculam lotionibus reiteratis purifica et blando calore in loco obscuro sicca.

Fi. Poma terrestria recentia rasa in vas Aqua repletum immittere, faeculam ad fundum descendentem pluries lavare et siccare jubet; — *T.* Poma terrestria rasa vel molita Aqua multa super cribro e crinibus confecto tractare etc. jubet.

Gelatina ex Amylo Solani tuberosi. (B*.)

℞. Faeculae Solani tuberosi
unciam unam.
Aquae . . . . . libram unam.
Syrupi Sacchari . unciam unam.
Coque sufficienter.

Soldanella.

Calystegia Soldanella, Röm. et *Sch.*; Meerkohl, Seekohl, Meerwinde, Meerstrandswinde; Soldanelle, Chou marin (*Gal.*); Seabindweed (*Ang.*); Zeeraerle (*D.*); Soldanella (*His. I. Lus*); Zeewinde (*Bel.*); Sjaevinda (*Suec.*).

Br. Gal. Wir. *Be. M. Sp.*

♃ (Pentandria Monogynia, L.; Convolvulaceae, *J.*) Eine in Europa am Meeresufer wachsende Pflanze. (*Lob.* Ic. t. 602 *Plenck* t. 93.)

Man wendet das Kraut (herba Soldanellae s. Brassicae marinae) an; es besteht aus einem ästigen Stängel mit rundlichen oder nierförmigen, am Grunde herzförmig ausgerandeten, glatten, sehr langgestielten Blättern.

Purgirend. — Gabe, von einem Scrupel bis zu anderthalb Drachmen.

Sonchus.

Sonchus oleraceus, L.; Kohlgänsedistel, Gemüsehaasenkohl; Laiteron commun (*Gal.*); Common sowthistle (*Ang.*); Svinetistel (*D.*); Corraja (*His.*); Melkdistel (*Bel*); Sonco (*I.*); Mlezne (*Pol.*); Serrutha (*Lus.*); Mjaelk tistel (*Suec.*).

Br. Gal. *G. M. Sp.*

☉ (Syngenesia Polygamia Aequalis, L.; Synantherae, *Cass.*) Eine in ganz Europa wachsende Pflanze. (*Zorn* Ic. pl. t. 148. *Blackw.* t. 30. 130. *Hayne* I. t. 48.)

Man wendet das Kraut (herba Sonchi laevis et asperi) an; es besteht aus einem ästigen, walzigen, glatten, hohlen Stängel mit abwechselnden, umfassenden, glatten, gewöhnlich schrotsägeförmig, in spitzige, gezähnte Lappen, mit dreieckigem, sehr großen Endlappen, getheilten Blättern. Es hat einen schwach bittern Geschmack.

Sorbus.

In den Pharmacopöen werden zwei Arten dieser Pflanzengattung angezeigt:

1) *Sorbus domestica, L.*; Spierlingsbaum, Eschröbleinbaum; Cormier (*Gal.*); Sorbo officinale (*I.*).

Gal. Wir. *Be. Br.*

Ein Baum (Icosandria Monogynia, L.; Rosaceae, *J.*) Europa's. (*Jacq.* Austr. V. t. 447.)

Man wendet die Frucht (fructus Sorbi) Corme, Sorbe (*Gal.*) an; es ist ein kleiner birnförmiger Apfel, welcher drei knorpelige längliche Saamen enthält. Sie ist anfangs sehr herbe, wird aber bei anfangender weinsäuerlicher Gährung süß, behält jedoch immer etwas Adstringirendes.

2) *Sorbus aucuparia, L.*; Vogelbeerbaum; Sorbier des oiseleurs (*Gal.*); Mountain ash (*Ang.*); Fuglebaer (*D.*); Serbar de cazador (*His.*); Sorbenboom (*Bel.*); Sorbo selvatico (*I.*); Jakszebina

(*Pol.*); Serveira brava (*Lus.*); Roenn (*Suec.*)

Br. Fer. Ful. Li. Suec. *Be. Sp.*

Ein Baum (Icosandria Trigynia, L.; Rosaceae, *J.*), welcher in ganz Europa wächst. (*Zorn* Ic. pl. t. 440. *Blackw.* t. 178.)

Man wendet die Früchte (baccae s. poma Sorbi aucupariae) an; es sind kleine runde, hellrothe, weiche, an der Spitze mit einem Nabel versehene Beeren, welche drei knorplige Saamen enthalten. Ihr Geschmack ist adstringirend, sauer und unangenehm.

Die Vogelbeersäure (Acidum sorbicum), von welchem er herrührt, ist nach Labillardière und Braconnot nichts anders als Aepfelsäure.

Adstringirend, harn-, wassertreibend, antiscorbutisch.

Pulpa baccarum Sorbi. (*T.*)

Fructus sicci coquantur cum Aquae bullientis sufficiente quantitate ad mollitiem usque, et nucleis separatis in mortario contundantur; trajice pulpam per crinium.

Conserva fructuum Sorbi. (*Fi. T.*)

℞. Fructuum Sorbi non maturorum quantum vis.

Coque ad mollitiem, tunc cum Sacchari pondere aequali ad conservae consistentiam.

T. Pulpae Sorbium libras quatuor, Syrupi parati cum liquido decocti fructuum et ad plumam evaporati libras sex ad consistentiam necessariam vaporando redigere.

Roob Sorbi aucupariae. (Ful. Li.)

℞. Baccarum Sorbi aucupariae contusarum . . . . libras octo.

Infunde tantam Aquae quantitatem ut digiti crassitiem tegantur et vase leni igni imposito coque per semihoram, cola fortiter exprimendo, colaturae adde Sacchari libram unam et blando igne ad consistentiam requisitam consume.

Kühlend, harntreibend. — Gabe, eine halbe bis ganze Unze.

Spigelia.

Von dieser Pflanzengattung werden zwei Arten in den Pharmacopöen angeführt:

1) *Spigelia anthelmia*, *L.*; wurmwidrige Spigelie; Spigélie anthelmintique (*Gal.*); Arapubaca (*Br.*); Espigelia (*Lus.*).

Ams. B. Br. D. Fer. Gal. R. Sax. Wir. Wür. *G. M.*

⊙ (Pentandria Monogynia, L.; Gentianeae, *J.*) Eine Nordamericanische Pflanze. (*Desc.* Fl. Ant. I. 61. *Lam.* Ill. t. 107. *Plenck.* t. 88. *Zorn* Ic. pl. t. 469.)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an.

Die Wurzel (radix Spigeliae anthelmiae) ist klein und faserig.

Das Kraut besteht aus einem runden Stängel, an dessen Spitze der große, wirtelförmig gestellte Blätter entspringen.

2) *Spigelia Marylandica*, *L.*; Maryland'sche Spigelie; Spigélie de Maryland (*Gal.*); Carolina pink, Indian pink, Snaake root (*Ang.*)

Am. Ams. B. Bel. D. Du. Ed. Fer. Ful. Gal. His Li. Lon. LonN. Lus. R. Sax. Suec. Wir. *Be. Br. C. M.*

4 Eine Nordamericanische Pflanze. (*Cat.* Carol. 2. p. 78. t. 78. *Plenck* t. 89. *Schk.* t. 57. *Hayne* Term. bot. t. 44. f. 5. *Bigel.* t. 14.)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an.

Die Wurzel (radix Spigeliae Marylandicae) ist einfach und faserig.

Das Kraut besteht aus einem vierseitigen Stängel mit gegenüberstehenden, sitzenden, eirundlänglichen, ganzen, spitzigen, glatten Blättern. Es hat einen häßlichen betäubenden Geruch und einen bittern ekelhaften Geschmack.

Reizend, wurmwidrig, laxirend. — Gabe des Pulvers, für Kinder von zwölf Jahren zwölf Gran, für Erwachsene eine Drachme.

Pulvis vermifugus. (*F.*)

℞. Spigeliae Marylandicae grana sedecim.
Mercurii dulcis . . grana octo.
Auf eine Gabe.

Decoctum Spigeliae. (Ful. Wür.)

℞. Herbae Spigeliae anthelmiae manipulos duos.
Aquae fontanae . . libras duas.
Coque et colaturae adde
Succi Citri recens expressi drachmas sex.
Syrupi Florum Persicae uncias duas.
Aquae . . . . . libras duas.

Gabe, alle sechs Stunden zwei bis drei Unzen für einen Erwachsenen.

Infusum anthelminticum s. Spigeliae anthelmiae. (Am. B*. Ful. *C. E. Sa. Sw.*)

℞. Herbae Spigeliae anthelmiae semunciam.
Aquae bullientis . . uncias sex.
Macera per horas duas et cola. (*E. Sa. Sw.*)

Am. et *C.* Spigeliae drachmas duas, Aquae semioctarium, et quatuor horas digestionis.

℞. Herbae Spigeliae drachmas tres.
Aquae bullientis uncias quatuor.
Adde colaturae
Olei Rutae . . . . guttas duas.
Misce bene. (Ful.)

Gabe, Abends anderthalb bis zwei Unzen. — Man kann zwei Drachmen Serpentaria zusetzen.

Infusum vermifugum. (*E.*)

℞. Spigeliae Marylandicae semunciam.
Foliorum Sennae drachmas duas.
Mannae . . . . unciam unam.
Foeniculi
drachmas duas ad quatuor.
Aquae bullientis octarium unum.

Gabe, ein Glas täglich drei oder vier Mal.

Syrupus Spigeliae. (*Ca.*)

℞. Foliorum Spigeliae anthelmiae uncias duas.
Seminum Anisi contusorum semidrachmam.
Aquae . . . . . uncias sex.
Infunde in balneo aquae per horas sex vel septem, cola fortiter exprimendo et adde
Extracti Jalapae gummosi semunciam.
Dissolve, filtra et colaturae adde
Sacchari albi . . . . duplum.

Gabe, zwei Kaffeelöffel täglich für Kinder; für Erwachsene ein Eßlöffel Morgens und Abends in einer halben Tasse Bohikel.

Spinacia.

Spinacia oleracea, *L.*; Spinat; Epinard commun (*Gal.*).

Br. Gal. *Be. M.*

⊙ oder ♂ (Dioecia Pentandria, L.; Atripliceae, *J.*) Eine Pflanze, deren Vaterland nicht bekannt ist, und welche man in Europa in Küchengärten baut. (Encycl. méth. t. 814. *Blackw.* t. 49. f. 2 — 4. *Schk.* t. 524.)

Man wendet das Kraut (herba Spinaciae s. Spinachiae) an; es besteht aus einem geraden, etwas ästigen Stängel mit gestielten, pfeilförmigen, dunkelgrünen Blättern. Sein Geschmack ist fade.

Erweichend.

Spiraea.

Von dieser Pflanzengattung werden in den Pharmacopöen zwei Arten angeführt:

1) *Spiraea Filipendula*, *L.*; Spierstaude; Filipendelwurz, rothe Steinbrechwurz; Filipendule (*Gal.*); Dropwort (*Ang.*); Roed steenbraek (*D.*); Roode steenbreck (*Bel.*); Filipendula (*I.*); Kropideleo mnicysze (*Pol.*); Brudbroed (*Suec.*).

Br. Gal. His. Li. Wir. Wür. *Be. G. M. Sp.*

♃ (Icosandria Pentagynia, L.; Rosaceae, *J.*) Eine Europäische Pflanze (*Zorn* Ic. pl. t. 394. *Hayne* VIII. t. 30.)

Man wendet die Wurzel (radix Saxifragae rubrae s. Filipendulae) an; sie besteht aus vielen dünnen, mit fleischigen, rundlichen oder länglichen Höckern besetzten Fasern, ist außen dunkelbraun oder schwärzlich und inwendig röthlichweiß, hat bloß im Herbst einen Orangengeruch und einen süßlichen Geschmack, welcher bei'm Trocknen adstringirend und bitterlich wird.

In Rußland wird von den Kosaken der Aufguß der Blätter gegen Bandwurm angewendet.

2) *Spiraea Ulmaria*, *L.*; Geisbartwurzel, Wiesenkönigin, Sumpfspierstaude; Reine des prés (*Gal.*); Queen of the meadows (*Ang.*); Miaeduru (*D.*); Reyno del prado (*His.*); Reynette (*Bel.*); Regina degli prati (*I.*); Rozia brodka (*Pol.*); Rainha dos prados (*Lus.*); Miaenaert (*Suec.*).

Br. Gal. Gen. His. Wir. *Be. M. Sp.*

♃ Eine Europäische Pflanze. (*Zorn* Ic. pl. t. 141. *Hayne* VIII. t. 31. Düss. off. Pfl. V. t. 6.)

Man wendet die Wurzel, die Blätter und die Blüthen an.

Die Wurzel (radix Barbae caprinae s. Barbulae caprinae s. Ulmariae s. Reginae pratensis) ist walzig, ungleich, mit reichlicher Behaarung versehen, außen schwärzlichbraun, inwendig röthlich oder gelblich, von etwas bitterem und styptischem Geschmack.

Die Blätter sind gefiedert, am Ende mit einem unpaarigen dreilappigen Blättchen, die Blättchen sind abwechselnd groß und klein.

Die Blüthen sind weiß und haben einen schwachen, aber angenehmen Geruch nach bittern Mandeln, welcher sich bei'm Trocknen verliert und einen süßen etwas adstringirenden Geschmack.

Spongia.

Spongia marina; Badeschwamm, Meerschwamm, Waschschwamm; Éponge de mer (*Gal.*); Sponge (*Ang.*); Isfenj (*Ar.*); Esponjas (*His.*); Muabadul (*Hin.*); Spons (*Bel.*); Spugna (*I.*); Univatta (*J.*); Abermurdeh (*Pe.*); Esponja (*Lus.*); Badswamp (*Suec.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O.

Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *A. Br. C. Fi. G. Par. Pid. Sp. T.*

Ein faseriges Geflecht oder vielmehr Filz von verschiedenen Seekörpern, welche hinsichtlich ihrer Organisation an den Gränzen des Thierreichs stehen.

Man wendet vorzugsweise den lappigen Seeschwamm, Spongia lacinulosa, *Lmk.* (*Esp.* Pflzth. II. t. 15 — 17), Eponge pluchée (*Gal.*), aus dem Mittelländischen, dem Rothen Meere und dem Indischen Ocean, an. Er ist rundlich, platt, kaum lappig, weich, filzig, sehr löcherig und auf der Oberfläche mit unzähligen Läppchen bedeckt.

Fyfe hat Jod darin gefunden.

Spongia praeparata. (A. Ams. An. Ba. Bor. Bor4. Br. D. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Han. Hass. HassP. His. Li. Lus. O. Sax. Suec. Wir. Wür. *Br. Fi. Pid. Sp. Sw. T. Vm.*)

1) Ohne Wachs. *Spongia praeparata absque cera, Spongiae compressae.*

℞. Spongiam tenerem lotam et mundam . . . . . no. 1.

Humidam adhuc funiculis circumductis constringe fortiter, gyris funiculi ita contiguis ut nullus intersit spongiae exitus, nodoque facile solubili retine, sicca sedulo et in loco bene sicco serva. (Fer. Gal. GalM. *Fi. Sw.*)

Bor4. Spongias in frustula oblonga scissas et Aqua fervida humectatas constringere; — His. Spongiam in longos lobos concisam Albumini Ovi immergere antequam funiculis circumstringitur, jubet; — *Vm.* Mucilagine Gummi Arabici illam imbibere jubet.

2) Mit Wachs. *Spongia cerata s. Spongiae ceratae.*

℞ Spongiam teneram, siccam, bene lotam et ab omnibus alienis liberatam . . . . . no. 1.

In ceram flavam igne liquatam immerge, interpositam deinde laminis duabus stanneis in balneo aquae calefactis comprime et post refrigerationem exime. (A. Ams. An. Ba. Bor. Bor4. Br. D. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Han. Hass. HassP. Li. Lus. O. Sax. Suec. Wir. Wür. *Br. Fi. Pid. Sp. Sw. T. Vm.*)

Man bedient sich desselben, um Fistelgänge und natürliche oder widernatürliche Oeffnungen zu erweitern.

Stachys.

Stachys recta, L.; Berufskraut; Crapaudine (*Gal.*); White stachys (*Ang.*); Estaquis recta, Yerba de feridura (*His.*). His. Wir. *Sp.*

♃ (Didynamia Gymnospermia, L.; Labiatae, J.) Eine Südeuropäische Pflanze. (*Jacq.* Austr. IV. t. 359.)

Das Kraut (herba Sideritidis hirsutae) besteht aus einem vierkantigen, wenig ästigen, schwach behaarten Stängel mit elliptischen oder lanzettförmigen, herzförmigen, gekerbten, rauh anzufühlenden Blättern. Es hat einen angenehmen Geruch und einen gewürzhaften Geschmack

Reizend, für ein Wundmittel geltend.

Stannum.

Jupiter; Κασσιτερος, Σταγγος; Zinn; Etain (*Gal.*); Tin (*Ang. Bel. D.*); Muster, Resas (*Ar.*); Bedil (*Ebr.*); Caimathar (*Chald.*); Xifilil (*Ind.*); Pazas (*Sarac.*); Yang-seih (*C.*); Runga (*Duk.*); Estanno (*His.*); Kulai (*Hin.*); Stagno (*I.*); Tima (*Mal.*); Urziz (*Pe.*); Cyna (*Pol.*); Estanho (*Lus.*); Olowo (*R.*); Trapu, Ranga (*Sa.*); Tenn (*Suec.*); Tagarum (*Tam*); Galai (*Tel.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. *A. C. Fi. G. Par. Sa. Sp. T.*

Ein derbes, fast silberweißes, weiches Metall, welches sich in Bleche schlagen läßt, wenig streckbar, bei 210° schmelzbar, nicht flüchtig ist und durch feuchte Luft nur wenig verändert wird. Spec. Gewicht = 7,291. Wenn man es biegt, läßt sich ein eigenes Geräusch hören.

Stannum pulveratum s. praeparatum s. granulatum s. raspatum, Limatura Stanni, Oxydulum Stanni, Pulvis Stanni philosophice praeparatus. (A. Am. An. B. Ba. Bel. Bor4. Br. Du. Fer. Ful. Gal. Hass. HassP. Li. O. Pal. R. Sax. Suec. Wür. *C. Fi. Sa. Sw.*)

℞. Stanni Anglici . . quantum vis.

Limae subtilis ope diminue et pulverem cribratum ad usum servа. (Am. Ba. Bor4. Br. Du. Fer. HassP. Pal. *C. Sw.*)

Li. antequam servetur, coquere in Aceto jubet, donec hoc supremum a subcarbonate potassae non amplius praecipitatur.

℞. Stanni puri . . . quantum vis.

Fusum in pyxidem ligneam interne hispidam et cretâ detritam ingere, quam clausam vehementer agita; pulverem per cribrum trajice. (A. B. Gal. O. Pal. Sar. Suec. Wür. *Fi.*)

℞. Limaturae Stanni . partes duas.
Cretae pulveratae partem unam.

Contere in mortario. (R.)

Sa. Stanni drachmas tres et Corallii unciam unam.

℞. Stanni foliati,
Sacchari albi,
singulorum partes aequales.

Contere, per cribrum trajice, coque pulverem in Aquae magna copia et deinde sicca. (An.)

Bel. Sal culinare contundere jubet in mortario calefacto illi superfundere deinde stannum fusum, pistillum celeriter et fortiter agitando, donec massa sit bene pulverata, tunc lotam et siccatam per cribrum trajicere.

℞. Limaturae Stanni . partes duas.
Oculorum Cancrorum
partem unam.

Contunde simul. (Ful.)

Pulvis vermifugus. (*Ca.*)

℞. Stanni pulverati . unciam unam.
Aethiopis mineralis scrupulos duos.

In sechs Gaben in Syrup, Theriak und Honig, zwei Mal täglich zu nehmen.

Pulvis Stanni martiatus s. ferratus. (*Au. Sa. Sw.*)

℞. Limaturae Stanni drachmas duas.
Sulphatis Ferri grana quinque.

Contrita in partes quinque divide. — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden.

Bolus e Stanno s. vermifugus. (*Sa. Sw.*)

℞. Pulveris Stanni semiscrupulum.
Conservae Corticum Aurantiorum scrupulum unum.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.

Electuarium vermifugum. (*Ca. E. Pic. Ra.*)

℞. Stanni pulverati drachmas sex ad unciam unam.
Mellis despumati uncias quatuor.

Gabe, Morgens zwei oder drei Löffel. (*E.*)

℞. Stanni pulverati unciam unam.
Extracti Artemisiae,
Pulveris Jalapae,
singulorum drachmam unam.
Syrupi Cichorii compositi
quantum sufficit.

Auf zwölf oder fünfzehen Mal im einer halben Stunde Zwischenraum, indem man eine Tasse Kräuterbouillon dazu trinkt. (*Ra.*)

℞. Stanni pulverati unciam unam.
Radicis Filicis maris drachmas sex.
Seminum Cinae . . semunciam.
Jalapae,
Sulphatis Potassae,
singulorum drachmam unam.
Mellis . . . quantum sufficit.

Gabe, Morgens alle halbe Stunden einen halben Kaffeelöffel voll. (*Au. Ca. Pic.*)

Amalgama Stanni. (Am. His. Wür. *C. Sa.*)

℞. Stanni . . . . . uncias duas.
Mercurii . . . . uncias tres.

Calefac mercurium in crucibulo, donec in vaporem converti coeperit, infunde stannum seorsim igne liquatum et miscellam in mortario marmoreo agita, Salis communis pauxillum addendo, abluc deinde bene et in linteo sicca. (His.)

Sa. conjungere simul jubet Mercurii drachmas tres et Stanni uncias duas et amalgama, triturando in mortario marmoreo, in pulverem redigere; — Am. et C. conjungere simul Stanni partes quinque et duas Mercurii et amalgama terere cum Cretae praeparatae parte una, donec splendorem metallicum penitus amiserit; — Wür. Stanni et Mercurii, singulorum unciam unam commiscere et mixturam refrigeratam simul cum Concharum praeparatarum uncia una pulverare.

Pulvis vermifugus. (*Sa.*)

℞. Amalgamatis Stanni
semidrachmam.
Rhei pulverati,
Antimonii diaphoretici non abluti,
singulorum grana decem.

Zweimal täglich.

Pilulae anthelminticae. (*Sw*.*)

℞. Amalgamatis Stanni quantum vis.

Inter cineres calidos impone ut metalla oxydentur adde

Extracti Absinthii quantum sufficit.

Fiant pilulae granorum sex. — Gabe, Morgens vier, sechs oder acht Stück.

Electuarium joviale ad taeniam s. vermifugum. (Br. Wür. *Ca. Sp. Vm.*)

℞. Stanni puri,
Mercurii,
singulorum unciam unam.

Fiat amalgama, quod cum
Concharum praeparatarum
uncia una
in pulverem redige, cui sensim adde
Conservae Absinthii uncias duas.
Syrupi Menthae quantum sufficit ut fiat electuarium. (Br. Wür. *Ca. Sp. Vm.* loco subcarbonatis calcis (conchar.) Magnesiam calcinatam et loco syrupi menthae illum Sacchari adhibet.

Gabe, zwei Drachmen täglich zwei Mal.

Unguentum empiricum Tlaki in tumoribus haemorrhoidalibus s. antihaemorrhoidale. (*B.*)

℞. Limaturae Stanni

Mercurii,
singulorum drachmas duas.
Fiat amalgama, cui adde
Unguenti rosati . unciam unam.
Praecipitati rubri drachmas duas.
Olei Menthae piperitae
guttas viginti.
Misce triturando.

Protoxydum Stanni, Suboxydum Stanni, Stannum suboxydatum s. pulveratum, Pulvis Stanni. (B*. Pal. *Sw. Vm.*)

℞. Stanni puri . . . quantum vis.
In fusione bene aëri aperto exposi tum, donec totum in pulverem griseum sit conversum, quem tritum cribra. (Pal. *Sw. Vm.*)

℞. Chlorureti Stanni in Aqua soluti
quantum vis.
Potassae causticae liquidae
quantum sufficit
ad praecipitandum et dissolvendum oxydum; filtra solutionem et Acidum hydrochloricum infunde ut oxydum praecipitetur. (B*.)

Wurmwidrig, purgirend, besonders gegen Bandwurm in Gebrauch, aber auch gegen Lungenschwindsucht gerühmt. — Gabe, fünf bis sechs Gran.

Antihecticum Potērii, Bezoardicum joviale. (Sar. Wir. *Sp. Vm.*)

℞. Reguli Antimonii partes quatuor.
Stanni subtilis
partes quinque cum dimidia.
Liquata igne in laminam metalli frigidam effunde et cum
Nitri pulverati partibus quindecim commisce; in crucibulum incandescens ingere et mixta et fusa prope ignem adhuc per aliquot tempus retine, tunc refrigerata cum Aqua frigida ablue et blando calore sicca. (*Vm.*)

Wir. et *Sp.* Reguli uncias sex, Stanni duas et Nitri viginti quatuor; — Sar. Reguli sex, Stanni tantidem et Nitri triginta sex.

Ehedem für geeignet gehalten, Blut- und Saamenflüsse zum Stillstand zu bringen und colliquative Schweiße Schwindsüchtiger zu mindern. — Gabe, eine halbe Drachme Morgens und Abends.

Persulphuretum Stanni, Oxydum Stanni hydrosulphureum, Stannum sulphuratum, Stannum praeparatum cum Sulphure, Protosulphuretum Stanni, Sulphuretum Stanni, Aurum mosaicum. (An. B*. Fer. *Br. Ca. Fi. Sw. T. Vm.*)

℞. Stanni pulverati . uncias tres.
Sulphuris sublimati unciam unam.
In crucibulum supra carbones ardentes ingesta calefac, donec flamma vivacissima appareat, ab igne remove, obtege crucibulum et massam refrigeratam porphyrisa et cribra. (An. Fer. *Br. Ca. Fi. T.*)

Vm. Calcinare simul jubet Oxydi Stanni partes septem et Sulphuris in baculis quatuor cum dimidia.

℞. Chlorureti Stanni quantum vis.
Infunde Hydrosulphatem Potassae liquidum, donec nullum amplius enascatur praecipitatum, quod siccatum ad ruborem usque calefac. (*Sw*. Vm.*)

℞. Stanni . . . partes duodecim.
Mercurii . . . . partes tres.
Florum Sulphuris partes septem.
Salis Ammoniaci . partes tres.
Tere lenteque calefac, quamdiu Gas acidum sulphuricum evolvatur, calcina deinde fortiter, donec massa squamosa, splendens flava remaneat. (B*.)

Pulvis vermifugus. (*Sw*.*)

℞. Persulphureti Stanni partes tres.
Mercurii . . . partem unam.
Tritura ad mercurii extinctionem usque. — Besonders bei Bandwurm empfohlen. Gabe, von zwei Drachmen bis eine halbe Unze, Morgens, in Wermuthcon serve.

Chloruretum Stanni, Liquor fumans Libavii, Butyrum Stanni, Murias superoxygenatus Stanni, Deutomurias Stanni, Deutohydrochloras Stanni, Murias Stanni s. Oxyduli Stanni. (B*. Ba. *Vm.*)

℞. Stanni . . . . partem unam.
Acidi hydrochlorici concentrati
partes tres.
Dissolve caloris ope et crystallisationi subjice.

Ein heftiges Purgirmittel. — Gabe, zwei Gran.

Ba. dilutum cum Aquae partibus novem ut reagens ad detegendum auri praesentiam indicat.

Liquor Stanni muriatici, Murias Oxyduli Stanni liquidus (HassP. sec. Ba.) Limaturae drachmas tres, Acidi Salis sex calore 30° vel 40° solvatur, liquorem saturatum a reliquo stanno defunde et cum Aquae destillatae duplo dilutum, clarum serva. — Ut reagens.

Stitzolobium.

Stitzolobium pruriens, P.; Kuhkräße, juckende Faseln; Pois à gratter (*Gal.*); Cowhage (*Ang.*); Kosambiliwail, Dewipughura (*Cy.*); Klaende baenne (*D.*); Kaumhkuri kebinge (*Duk.*); Kiwach (*Hin.*); Jeukboontjes (*Bel.*); Dolico pizzicaule (*I.*); Rawe (*Ja.*); Kapikachlin (*Sa.*); Punaykalie (*Tam.*); Piliadukugaila (*Tel.*).

D. Du. Ed. Fer. Lon. Sax. Suec. Wir. *A. Be. C. M.*

Ein Strauch (Diadelphia Decandria, L.; Legum nosae, *J.*) Südamerica's. (*Desc.* Fl. Ant. t. 49.)

Man wendet die Frucht (Siliqua hirsuta) an; eine zwei bis vier Zoll lange, fast fingerdicke, ledrige, gebogene, überall mit steifen, spröden, stechenden, leicht loszumachenden, glänzenden, braunrothen Borsten (Stilobium, setas s. lanugo Siliquae hirsutae) besetzte Hülse.

In America betrachtet man es als wurmwidrig. — Gabe, drei bis sechs Gran in einem Syrup.

Electuarium vermifugum. (*E.*)

℞. Setarum Siliquae hirsutae drachmam unam.
Mellis . . . quantum sufficit.

Gabe, ein Kaffeelöffel voll für ein Kind von zwei bis drei Jahren.

Stoechas.

Unter diesem Namen werden drei verschiedene Pflanzen in den Pharmacopöen angeführt:

1) *Lavandula Stoechas, L.*; Stöchas; Stoechas d'Arabie (*Gal.*); Stoechas (*Bel. D. Suec.*); French lavender (*Ang.*); Cantriosa (*His.*); Stecade (*I.*); Rosmarinho (*Lus.*).

Ams. An. B. Br. Fer. His. Wir. *Be. Br. Fi. G. M. Sp.*

Ein kleiner Strauch (Didynamia Gymnospermia, L.; Labiatae, *J.*) des südlichen Europa's. (*Zorn* Ic. pl. t. 486.)

Man wendet die Blüthen (flores Stoechadis purpureae s. Arabicae) an; sie sind dunkelpurpurroth und bilden eine gedrängte, eirundlängliche Aehre, über welcher ein Büschel gefärbter Blätter steht. Sie haben, besonders gerieben, einen angenehmen, kampherartigen Geruch; ihr Geschmack ist gewürzhaft und bitter.

2) *Helichrysum arenarium, Gärtn.*; gelber Stöchas; Stoechas citrin (*Gal.*).

Br. Gal. Wir. Wür. *Be. M. Sp.*

⊙ oder ♃ (Syngenesia Polygamia Superflua, L.; Synantherae, *Cass.*) Eine Europäische Pflanze. (*Zorn* Ic. pl. t. 352.)

Man wendet die Blüthen (flores Stoechadis citrinae, s. Germanicae s. Amaranthi lutei s. Helichrysi) an, welche strahlige, eiförmige, citrone oder goldgelbe Köpfchen bilden. Sie haben fast gar keinen Geruch und einen schwach hyssopischen Geschmack.

3) *Helichrysum Stoechas, Cand.*; gemeines Ruhrkraut; Stoechas de Naples (*Gal.*); Eternal flower (*Ang.*).

Gal.

♄ Eine Südeuropäische Pflanze. (*Zorn* Hist. pl. p. 92. t. 279.)

Man wendet die Blüthen (flores Stoechadis Neapolitanae) an; sie bilden strahlige, fast walzenförmige, etwa zwei Linien lange Köpfchen und sind gelb und geruchlos.

Syrupus de Stoechade. (Gal. *T.*)

℞. Spicarum Stoechadis Arabicae unciam unam.
Aquae destillatae Stoechadis libras duas.

Digere in balneo Aquae per duas horas et colaturae adde

Sacchari albi . . . . duplum.

Liqua in balneo aquae et cola per pannum.

Syrupus de Stoechade s. de Stoechade compositus. (Gal. Wir. *Vm.*)

℞. Cinnamomi . . partem unam.
Zingiberis,
Galani, singulorum partes duas.
Foliorum recentium Foeniculi,
— — Rutae,
— — Rorismarini,
— — Salviae,
— — Thymi,
Stoechadis, singulorum partes octo.
Aquae . . . partes quingentas.

Destillent partes septuaginta, cum quibus et

Sacchari albi
partibus centum viginti octo syrupum in balneo aquae para. (*Vm.*)

℞. Spicarum siccarum Stoechadis uncias tres.
Summitatum florescentium et siccatarum Thymi uncias quatuor cum dimidia.
— Salviae,
— Rorismarini,
singularum drachmas sex.
Seminum Rutae,
— Foeniculi, singulorum drachmas quatuor cum dimidia.
Cinnamomi,
Zingiberis,
Calami, singulorum drachmas duas.
Aquae communis . libras octo.

Macera per duos dies in vase tecto, tunc liquidi destillatione abstracti semilibrae adde

Sacchari albi . . libram unam.

Residuum exprimendo coletur; colaturae adde

Sacchari albi . . libras quatuor.

Fiat, coquendo syrupus; syrupum utrumque colligatum commisce. (Gal.)

℞. Stoechadis Arabicae . . . uncias duas.

Florum Rorismarini
drachmas duas.
Calaminthae montanae,
Origani,
Thymi, singulorum drachmas tres.
Betonicae,
Salviae, singulorum drachmas duas.
Seminum Anisi,
— Paeoniae, singulorum drachmas duas cum dimidia.
Calami,
Zingiberis,
singulorum drachmam unam.
Aquae bullientis . libram unam.
Macera per dies duos in loco calido, cola exprimendo et colaturae unciis novem adde
Sacchari albi . uncias sedecim.
Solve semel ebulliendo et cola. (Wir.)
Gabe, eine halbe bis zwei Drachmen.

Storax.

Styrax solidus, *Styrax Resina*, *Styracis Balsamum*; Storax, Judenweihrauch; Στύραξ; Storax, Styrax solide (*Gal.*); Storax (*An. D. Suec.*); Usteruk (*Ar.*); Estoraque (*His. Lus.*); Styrax (*Bel.*); Storace (*I.*).

A. Ams. An. B. Ba. Br. D. Du. Ed. Penn. Fer. Ful. Gal. Gen. Hass. HassP. His. Lon. Lus. O. Suec. Wir. Würt. *A. B. Br. C. Fi. G. M. Ped. Sp. Z.*

Man unterscheidet 1) *Styrax granulata s. in granis*; Storax in Körnern oder Tropfen; Storax en grains, en larmes (*Gal.*), in kleinen, durchsichtigen, glänzenden, etwas fettigen, unter den Zähnen sich erweichenden Körnern von angenehmem Geruch und harzigem Geschmack; 2) *Styrax in massis*; Storax in Stücken; Storax en pains (*Gal.*); in röthlichen, wohlriechenden, bisweilen erweichten und eine honigartige Flüssigkeit gebenden Massen von angenehmem Geruch und bitterem, harzigen Geschmack. Die erstere Varietät ist heutzutage sehr selten; den Alten war sie unter dem Namen Styrax Calamita oder cannulata, Calamites vera bekannt, welchen seitdem auch die zweite führt. Diese nennt man Mandelstorax (Storax amandé), wenn die Stücken die Größe einer Mandel haben.

Dieser Balsam soll von Styrax officinale, L., kommen, einem Baume (Decandria Monogynia, L.; Ebenaceae, *J.*) des südlichen Europa's und des Orients. (*Plenck* t. 341. *Lam.* Ill. t. 369. Encycl. méth. t. 369.) Vielleicht kommt er von Liquidambar orientalis, *Link*.

Reizend. — Gabe, von zehn Gran bis zu einem halben Drachmel

Strychninum.

Strychnina, *Strychna*; Strychnia; Strychnine (*Gal.*).

B*. Fer. Gal. *Ca. Fi. Ma. T.*

℞. Extracti alcoholici Nucis vomicae quantum vis.

In Aqua dissoluto adde liquori Acetatem Plumbi liquidum, donec nihil amplius praecipitetur; plumbum ope torrentis Gasis acidi hydrosulphurici separa, filtra, coque cum Magnesia, praecipitatum cum Aqua frigida ablue et in Alcohole dissolve; solutionem ad siccum consume.

T. proponit ad obtinendum strychninum magis album et purum, illud in Aqua cum Acido nitrico leviter acidulata fervida solvere, adhuc bulliens per carbonem animalem filtrare, evaporatione et refrigeratione obtentum strychninum nitricum denuo in Aqua solvere et solutioni Ammonium causticum infundere; praecipitatum exemtum in Alcohole solvere et vaporando in crystallos redigere.

Ein heftiges Reizmittel und sehr starkes Gift, von welchem schon ein Viertelgran oft einen heftigen Eindruck auf den Menschen macht. Man wendet es bei Lähmungen an, indem man mit einem Sechszehntheilgran anfängt und allmälig steigt.

Pilulae Strychnini. (B*. Fer. GalF. GalH. *B. Bo. Ca. E. Ma. Pie. Ra.*)

℞. Strychnini . . . . grana duo.
Conservae Rosarum
semidrachmam.

Fiant pilulae viginti quatuor, argento obducendae. (B* Fer. GalF. GalH. *Bo. Ca. E. Ma. Pie. Ra. T.*)

R. Strychnini semigranum ad grana sex, Micae Panis, Mellis despumati et Pulveris Liquiritiae quantum sufficit ut fiant pilulae quatuor; — Gabe, Morgens alle zwei Stunden ein Stück. Wahrscheinlich ist die Formel falsch.

Tinctura Strychnini. (B*. Fer. GalF. *Bo. Ma. Pie. Ra. T.*)

℞. Strychnini . . . . grana tria.
Alcoholis (36°) . unciam unam.

T. Strychnini purissimi semiscrupulum, Alcoholis 36° uncias quatuor.

Gabe, sechs bis zwanzig (*T.*) bis sechszig Tropfen.

Potio stimulans. (GalF. *Ma. Pie. Ra.*)

℞. Strychnini . . granum unum.
Aquae destillatae : uncias duas.
Sacchari albi . drachmas duas.
Acidi acetici . . . gutas duas.

Esslöffelweise Morgens und Abends.

Pulvis Strychnini. (*B.*)

℞. Strychnini
partem grani sedecimam.

Aethiopia martialis . grana sex.
Sacchari . . . semidrachmam.
Morgens und Abends zu nehmen.

Strychninum nitricum, Nitras Strychnini s. Strychninae; salpetersaures Strychnin. (Bor4. *T.*)

℞. Nucum vomicarum . libras octo.
Spiritus Frumenti libras sedecim.

Decoque in vesica destillatoria, donec dimidia pars fluidi destillata fuerit, tum nuces colando separatae siccentur et pulverentur; pulverem bis terve digere cum Spiritus Frumenti quantitate sufficiente, post digestionem semper exprimendo; tincturae destillationi subjiciantur et quod remanet, cum fluido a decocto residuo ad remanentiam librarum duodecim evaporet; adde Plumbum aceticum depuratum in Aquae destillatae s. q. solutum, quamdiu praecipitatum efficitur; liquor filtri ope, quantum fieri potest, separatus iterum igne ad dimidium evaporet, refrigeratum misce cum Magnesiae ustae unciis duabus et sepone per triduum, sedimentum filtratum edulcoretur, siccetur et in pulverem tritum cum Spiritus Vini alcoholisati sextuplo bis terve digeratur, tincturae destillent ad unciarum aliquot remanentiam; strychninum instar pulveris albi conspicuum, filtratione separatum bis terve Spiritu Vini rectificato cum Aquae communis quantitate aequali diluto ad separationem lixivii adhaerentis usque lava et cum Acidi nitrici dilutioris quantitate sufficiente neutralisa. Liquorem filtra et blandissimo calore in crystallos redige caute dispensandas.

T. Obtinetur, infundendo per vices Acidum nitricum 36° B. cum Aquae pondere quintuplo vel sextuplo dilutum in solutionem Strychnini aquosam, videndo ut sit baseos excessus, evaporare deinde et seponere ut crystalli dejiciantur.

Ist noch giftiger als das Strychnin.

Strychnos.

Strychnos colubrina, L.; Schlangenholz; Bois de couleuvre (*Gal.*); Snakewood (*Ang.*); Kuchila-luta (*Beng.*); Mahapenala (*Cy.*); Widero-pait (*Jav.*); Modira caniram (*Mal.*).

Br. Gal. His. Pal. Wir. *A. Br. G. M. Sp.*

Ein Baum (Pentandria Monogynia, L.; Apocyneae, *J.*), welcher auf den Molucken wächst. (*Rumph* Amb. 2. c. 46. t. 57. *Blackw.* t. 403. *Plenck.* t. 118.)

Man wendet die Wurzel (Lignum colubrinum) an; sie besitzt, wenn sie alt ist, eine sehr große Bitterkeit. Es sind schwere, etwas gelblichweiße, mit einer bräunlichen, runzlichen, höckerigen Rinde bedeckte Stücken, welche gar keinen Geruch haben.

Pelletier und Caventou haben Strychnin darin gefunden.

Man hält sie für ein specifisches Mittel gegen den Biß giftiger Thiere; jetzt ist sie in Vergessenheit gekommen, müßte aber ohne Zweifel mit großer Vorsicht angewendet werden. Boerhaave rühmte sie gegen Wechselfieber.

Styrax.

Styrax Liquidambar, Styrax liquida, Styrax liquidus, Ambra liquida; flüssiger Storax; Styrax liquide, Liquidambar (*Gal.*); Liquide storax (*Ang.*); Tekaucy sstyrax (*R.*); Estoraque liquido (*His.*); Vloejende storax (*Bel.*); Storax rzadki (*Pol.*).

Ams. An. B. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Fenn. Fer. Gal. GalM. Han. HassP. His. O. Pol. Sax. Suec. Wir. WW. *Be. Br. Fi. G. M. Sp. Z.*

Man unterscheidet zwei Balsame dieses Namens:

1) Den Storax von Louisiana, Copalmbalsam, Copalmöl (Copalme, Baume ou Huile de Copalme, Copalme de la Louisiane), von honigartiger Consistenz, durchsichtig, röthlichgelb mit der Zeit dunkel- oder schwärzlichroth werdend, von sehr angenehmem Geruch und scharfem, gewürzhaftem Geschmack, und zu einem braunen, schwärzlichen und brüchigen Harz verhärtend.

2) Den gemeinen Storax (Styrax commun), von der Consistenz einer dicken Salbe, röthlich, graulich oder bräunlich, kaum durchscheinend, von starkem, angenehmem Geruch und scharfem und bitterem Geschmack.

Dieser Balsam fließt aus dem Styraxbaum, Liquidambar styraciflua, L., einem Baume (Monoecia Polyandria, L.; Amentaceae, *J.*) Mexico's. (*Blackw.* t. 485. *Plenck* t. 676. *Schk.* t. 307. *Lam.* t. 783. Fl. méd. VI. 331.)

Bonastre hat darin einen eigenthümlichen harzigen und crystallisirbaren Stoff, welchen er Styracin (Styracinum) Styracine nennt, entdeckt.

Reizend, fast ausschließlich zum äußern Gebrauch.

Unguentum Styracis resinosum s. e Styrace compositum. (An. B*. Bel. Br. Gal. GalM. Gen. Han. HassP. Sar. Wir. Wür. *Ca. Sp. Vm.*)

℞. Olei Juglandis partes trecentas quinquaginta.
Styracis . . . . partes octo.
Liqua blando calore, subinde agitando; sepone, cola et adde

Colophonii. partes quadringentas octoginta.
Elemi,
Cerae flavae, singulorum partes centum nonaginta duas.
Cola per linteum. (Gal. GalM.)

Gen. Sar. et *Sp.* Olei Juglandis libram unam, Styracis semilibram, Colophonii libram unam, Elemi et Cerae, singulorum semilibram.

℞. Olei Olivarum uncias duas et dimidiam.
Styracis,
Elemi,
Cerae flavae, singulorum uncias septem et dimidiam.
Colophonii . . . uncias duas.
Liqua simul. (B*. Br. Han. Wir.)

Wür. et *Vm.* Olei, Styracis, Elemi, Cerae, singulorum partem unam et duas Colophonii; — Suec. Olei unam cum dimidia et reliquarum substantiarum, singularum septem; — HassP. Elemi, Cerae, singulorum drachmas quindecim, Colophonii semunciam, Styracis drachmas quindecim, Olei uncias septem cum dimidia.

℞. Terebinthinae uncias quindecim.
Olei Juglandis . uncias undecim.
Elemi,
Cerae flavae, singulorum uncias septem.
Liqua leni calore et ab igne remotis adde
Styracis . . . uncias septem.
Evaporet liquidum blando calore. (Au. Bel.)

℞. Axungiae,
Colophonii, singulorum libram unam.
Olei Juglandis uncias quindecim.
Elemi,
Cerae flavae, singulorum uncias sex.
Massae igne liquatae adde
Styracis . . . . uncias septem.
Misce sedulo. (*Ca.*)

Emplastrum Styracis stomachicum s. de Styrace. (His.)

℞. Cerae flavae,
Olibani, singulorum libras duas.
Terebinthinae . . . libras tres.
Mixtis et liquatis adde
Styracis,
Mastichis,
Ladani, singulorum uncias tres et dimidiam.
Benzoës uncias duas et scrupulos duos.
Piperis Jamaicensis uncias quatuor cum dimidia.
Olei Menthae,
— Absinthii, singulorum drachmas duas.
Misce exacte.

℞. Cerae flavae libras duas cum dimidia.
Terebinthinae . . . libras tres.
Tacamahacae libras duas et dimidiam.
Styracis,
Mastichis,
Ladani, singulorum uncias quatuor cum dimidia.
Benzoës,
Caryophyllorum,
Nucis moschatae, singulorum drachmas octodecim.
Olei Menthae,
— Absinthii, singulorum drachmas duas.
Styracem mollefactam cum ladano contunde, cerae pauxillum addendo, liqua cum cera et terebinthina, cola, tum adde pulveres et olea

Unguentum digestivum. (*Ra.*)

℞. Unguenti de Styrace libram unam.
Olei Olivarum . . semilibram.
Misce.

Unguentum antiscorbuticum. (*Sm*).

℞. Unguenti de Styrace uncias quinque.
Balsami Fioravanti unciam unam.
Misce.

Balsamum ad loricandum cadaver conditum. (*Sp.*)

℞. Balsami Peruviani,
— Copaivae,
Styracis, singulorum uncias viginti quatuor.
Olei Nucis moschatae uncias octo.
— Lavandulae . uncias duas.
— Thymi . . . semunciam.
Liqua blando igne.

Succinum.

Succinum album et citrinum, Electrum, Ambra flava; Ἤλεκτρον; Agtstein, Bernstein; Succin, Ambre jaune, Karabé (*Gal.*); Yellow amber (*Ang.*); Kernülbehr (*Ar.*); Hambar (*Ba.*); Ambar (*Cy. Mal.*); Beensteen (*D.*); Karuba (*Duk. Pc.*); Succino (*His.*); Kepur (*Hin.*); Barnsteen (*Bel.*); Ambra gialla, Succino, Carabe (*I.*); Barsztyn (*Pol.*); Alumbre (*Lus.*); Jantar (*R.*); Bernsten (*Suec.*); Umbir (*Tam. Tel.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW *A. C. Fi. G. Pid. Sp. T.*

Ein fester, mehr oder weniger dunkelgelber, weißer, rother, bisweilen rothbräunerer, fast schwarzer, durchsichtiger, durchscheinender oder undurchsichtiger, bisweilen wolki-

ger Körper mit muscheligem, glänzendem Bruche, welcher sich poliren läßt, nicht sehr hart ist, leicht bricht, erwärmt einen schwachen Geruch verbreitet, erhitzt electrisch wird und mit gelber und grünlicher Flamme brennt, indem er einen dicken Rauch und einen starken, durchdringenden, nicht unangenehmen Geruch verbreitet.

Succinum praeparatum. (*Fi.*)

Succinum pulveratum in mortario porphyreo cum Aqua laevigatur et in pastam tenerrimam redigitur inter chartam siccandam.

Pulvis fumalis s. ad suffiendum s. pro suffimigio s. pro suffimento. (BorC. Br. Li. RC. *T.*)

℞. Olibani,
Succini, singulorum partes aequales.
Grossiuscule pulvera. (BorC.)

RC. Substantiarum dictarum, singularum partes tres, Florum Lavandulae Spicae partem unam.

℞. Baccarum Juniperi,
Mastichis,
Succini, singulorum uncias quatuor.
Cascarillae . . . unciam unam.
Fiat pulvis grossus. (Li.)

T. Benzoës, Succini, Cascarillae, Coffeae tostae, Sacchari albi, pulveratorum singulorum partes aequales.

℞. Succini . . . . uncias viginti.
Olibani . . . . uncias decem.
Mastichis . . . uncias quatuor.
Ladani,
Benzoës,
Storacis,
Ligni Rhodii,
Santali citrini,
singulorum uncias duas.
Petalorum Rosarum rubrarum
uncias quatuor.
Florum Lavandulae uncias tres.
Baccarum Juniperi
uncias duodecim.
Fiat pulvis grossus. (Br.)

Tinctura Succini aetherea s. balsamica. (B°. Sax. Suec. Wir. Wür. *Siw. T. Vm.*)

℞. Succini flavi . . uncias duas.
Aetheris sulphurici . libras duas.

Digere per dies quatuor super arenae balneo, blando calore, et cola. (Wür.)

T. Succini drachmas duas, Aetheris sulphurici 56° Ar. unciam unam macerare per duos dies et sepositione clarificata decanthare.

℞. Succini pulverati et leviter tosti
uncias duas.
Alcoholis
uncias septem cum dimidia.

Post aliquot dies digestionis in vase tecto, filtra et adde

Aetheris sulphurici
uncias duas cum dimidia.

Serva. (B°.)

℞. Succini pulverati et leviter tosti
unciam unam.
Liquoris anodyni mineralis
uncias quinque.

Digere per dies quatuor in vase tecto et cola. (*Siw.*)

℞. Succini grossiuscule pulverati
partem unam.
Liquoris anodyni mineralis
partes tres.

Macera frigide per dies octo, saepius agitando et filtra. (Sax. *Vm.*)

Suec. Succini unciam unam et Liquoris quatuor; — Wir. Succini unciam unam et Liquoris tres cum dimidia; — Ful. Succini partem unam et Liquoris sex.

Reizend, krampfstillend, nervenstärkend, anticatarrhalisch und auf den Uterus wirkend. — Gabe, funfzehen bis dreißig Tropfen auf Zucker oder in einem Glase Wasser.

Tinctura s. Essentia Succini s. alcoholica, Alcohol cum Succino. (Ams. Aa. Bel. Bor. Bor4. Br. Gal. Gen. Han. Li. O. Pal. Pol. Sax. Wir. *Fi. T. Vm.*)

℞. Succini albi pulverati
unciam unam.
Alcoholis (38°) . . uncias sex.

Digere blando calore per tres dies, decantha et residuo infunde

Alcoholis (38°) . . uncias duas.

Post duos dies digestionis cola, colaturas misce et filtra. (An.)

℞. Succini albi . . partem unam.
Alcoholis (32°) . . partes octo.

Digere frigide per dies decem, cola exprimendo et filtra. (Bel.)

Ams. Succini partem unam, Alcoholis (0,835) octo et octo dies digestionis blando calore; — Wir. Succini sesquiunciam, Alcoholis concentrati uncias sex et aliquot dies frigidae digestionis; — Pal. Succini unciam unam, Alcoholis concentrati octo et aliquot dies digestionis blando calore; — Br. et Li. Succini unciam unam, Alcoholis libram unam et octo dies digestionis leni calore; — Gal. Succini unam, Alcoholis (26°) sedecim et sex dies digestionis, tunc sepositionem per dies sex; — Gen. Succini unciam unam, Alcoholis decem et octo dies digestionis.

℞. Succini pulverati et leviter in pelvi ferrea tosti . partem unam.
Alcoholis concentrati
partes quatuor.

Post aliquot dies digestionis blando calore in vase clauso et subinde agi-

tando, filtra. (Bor. Bor4. Br. Han. O. Pol. Sax. *Vm.*)

Fi T. Succini flavi pulverati uncias tres, Alcoholis 30° libram unam digerere in retorta vitrea foramine parvo instructa, subinde agitando et blando calore, et post sex dies filtrare.

Schwach reizend, gegen Catarrh, balsamisch, nervenstärkend und Wundmittel. — Gabe, fünfzehen bis dreißig, vierzig bis sechzig Tropfen.

Julep s. Julapium succinatum. (Gen.)

℞. Tincturae Succini drachmas duas.
Sacchari . . . . unciam unam.
Aquae . . . . . uncias sex.
Misce.

Tinctura s. Essentia Succini alcalisata. (Br. Sar. Wir. *Sp.*)

℞. Succini pulverati . uncias duas.
Subcarbonatis Potassae liquidi semunciam.
Fiat pasta, cui siccatae infunde
Alcoholis . . . . uncias octo vel quantum satis, ut trium vel quatuor digitorum crassitiem tegatur. Post aliquot dies digestionis super arena tepida filtra. (Br. Sar.)

℞. Succini . . . uncias quatuor.
Subcarbonatis Potassae uncias sex.
Tritura simul et infunde
Aquae Vitae . uncias sedecim.
Post aliquot dies maceralionis destillent liquidi circiter unciae octo; evaporent reliqua ad siccum, residuo infunde spiritum primo obtentum et post sufficientem digestionem liquorem filtra. (Wir.)

℞. Pulveris Succini,
Subcarbonatis Potassae,
singulorum uncias duodecim.
Alcoholis concentrati uncias viginti quatuor.
Spiritui destillato per octo dies in balneo aquae infunde pulverem e
Succini . . . . . unciis octo.
Olei Tartari per deliquium quantitate sufficiente
ut fiat pasta quae deinde siccetur. Filtra. (*Sp.*)

Reizend, nervenstärkend, gegen Catarrh und auflösend. — Gabe, zwanzig bis vierzig Tropfen.

Resina Succini. (Li.)

℞. Succini . . . . . libras duas.
Alcoholis . . . libras quatuor.
Post tres dies digestionis in arenae balneo decantha et residuum itidem cum novo Alcohole tracta, donec hic non amplius coloretur; tincturae commixtae destillent, resina abluta lente siccetur.

Oleum Succini crudum. (Bor4.)

In officinis chemicis paratur. Pond. spec. = 0,886.

Oleum Succini aethereum, Oleum Succini rectificatum s. depuratum, Oleum Succini, Aethereoleum s. Pyroleum Succini. (Am. Ams. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fer. Ful. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. H s. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pal. Pol. RC. Sar. Sax. Wir. Wür. *Br. C. Fi. Pid. Sw. T. Vm.*)

℞. Succini contusi . quantum vis.
In retortam arenaceam luto obturatam immitte, quae tubi ope cum vasto recipiente tubulato communicat; tunc destillationem, igne gradatim aucto, continua, donec nihil amplius prodeat, quo facto oleum infundibuli ope separetur.

RC. Oleum a liquore acido separatum e retorta vitrea Aquae sextuplo addito, destillet, donec trientes duo aquae prodierint; — *Fi.* Oleum in paratione Salis volatilis succini obtentum, separatum pluries cum Aqua calida lavare, donec omnis saporis aciduli expers sit, et iterum destillare, donec dimidia pars ponderis prodierit.

Man wendet dieses Oel nur rectificirt an. Es giebt dazu mehrere Verfahrungsweisen.

℞. Olei empyreumatici Succini quantum vis.
In retortam infunde ad dimidium usque inde replendam, destillent, levi sub bullitione, donec oleum magis colore tinctum prodire coeperit. (Ba. GalH. Pal. *Br. Vm.*)

Lon. LonN. duas rectificationes successivas; — Pal. tres; — Gen. et Wür. quatuor.

℞. Olei Succini . . partem unam.
Cinerum Lignorum partes duas.
Destillent lente. (Br. Fer. Hass. Li. Pal. Wir. *Pid.*)

℞. Olei Succini,
Carbonis Lignorum s. vegetabilis, singulorum partes aequales.
Destillent in retorta vitrea. (Penn. Ful. HassP. Suec.)

℞. Olei Succini,
Carbonis Lignorum, singulorum partem unam.
Aquae . . . . . partes sex.
Destillent lente. (O.)

Sar. Cretam puram vel Cornu Cervi calcinatum; — *T.* Oleum cum mixtura e Pulvere Carbonum et Calcis ad aërem extinctae in globulos redigere, hos cum Aquae quadruplo vel quintuplo olei adhibiti in retortam tubula-

tam ingerere et in balneo arenae moderato calore destillare.

℞. Olei Succini . . partem unam.
Aquae . . . . . partes sex.

Destillent partes quatuor et oleum ab aqua separetur. (Am. B. Bel. Bor. D. Du. Ed. Han. Sax. *C. Sw.*)

Bor4. Oleum Succini crudum cum Aquae fontanae octuplo destillet, ita ut tertia pars prioris remaneat.

℞. Olei Succini . . libram unam.
Aquae . . . . . libras sex.

Destillent lente unciae quatuor, quo facto recipiente mutato denuo unciae quinque destillent, quae cum Aqua redestillentur, ita ut unciae tres abstrahantur; commisce productum secundum cum priore et totum denuo cum Aqua destillet. (Ams.)

His. destillationem Olei cum Aquae partibus duodecim repetere jubet, donec illud perfecte liquidum sit.

Reizend, krampfstillend, nervenstärkend, auflösend, schweiß- und harntreibend, Monatsfluß befördernd. — Gabe, fünf bis fünfzehen Tropfen. — Man braucht es nur wenig.

Elaeosaccharum s. Oleosaccharum Succini. (Pal. Wir.)

℞. Sacchari albi . . unciam unam.
Olei Succini . . guttas sedecim.
Misce triturando.

Balsamum Succini. (Wir.)

℞. Olei Succini drachmam unam.
— Nucis moschatae
drachmas duas cum dimidia.
Misce. — Aeußerlich bei Hysterie und Kopfschmerz angewendet.

Moschus artificialis, Resina Succini balsamica, Oleum Succini oxydatum, Succinum oxygenatum, (Am. B*. Li. O. RC. Suec. *Br. C. Vm.*)

℞. Olei Succini . . partes duas.
Acidi nitrici . . . partes sex.

Stent in reactione per horas viginti quatuor, tunc cum Aqua frigida lava. (B*. Li.)

Am. et *C.* Olei partem unam et duas Acidi; — O. Olei duas et Acidi quinque; — *Vm.* Olei unam et tres Acidi; — Suec. et *Br.* Olei unam et quatuor Acidi; — RC. Olei rectificati drachmam unam, Acidi nitrico-nitrosi drachmas tres cum dimidia.

Reizend, als Ersatzmittel des wahren Moschus empfohlen.

Tinctura Moschi artificialis s. Resinae Succini s. Succini balsamica. (B*. Li. Suec. *Vm.*)

℞. Moschi artificialis partem unam.
Alcoholis concentrati partes octo.
Dissolve blando calore. (B*. Li.)

Suec. Moschi partem unam et septem Alcoholis; — *Vm.* Moschi unam et Alcoholis sedecim.

Reizend, bei Epilepsie empfohlen. — Gabe, vierzig Tropfen.

Tinctura Succini foetida. (Fer.)

℞. Olei Succini rectificati
drachmas duas.
Subcarbonatis Potassae,
Saponis medicinalis,
singulorum drachmam unam.
Alcoholis . . . uncias quatuor.

Post aliquot dies filtra.

Hujus liquoris guttas aliquot Ammoniaco infundendo, aquam *Aquae Lucae* (Eau de Luce) aliquanto similem obtines.

Potio expectorans. (*E.*)

℞. Olei Succini . guttas octoginta.
Gummi Arabici,
Sacchari, singulorum semunciam.
Tincturae Balsami Tolutani
drachmas duas.
Aquae . . . . uncias quatuor.

Gabe, ein Löffel alle zwei oder drei Stunden, bei krampfhaftem Husten.

Liquor succinicus anodynus s. anodynus succinatus. (*Sw.*)

℞. Spiritus Succini oleosi rectificati
sesquilibram.
Acidi sulphurici concentrati
semilibram.

Destillet in retorta vitrea libra una. — Gegen Epilepsie in Deutschland gerühmt. — Gabe, zwanzig bis dreißig Tropfen in Wermuth- oder Münzensyrup.

Sulphur.

Θειον; Schwefel; Soufre (*Gal.*); Sulphur (*Ang.*); Kubrit (*Ar.*); Lew (*C.*); Gundaka (*Cy.*); Svolv (*D.*); Gunduck (*Duk.*); Azufre (*His.*); Gundhuk (*Hin.*); Schwavel (*Bel.*); Zolfo (*I.*); Gunduk (*Mah.*); Blerong (*Mal.*); Gowgird (*Pe.*); Siarka (*Pol.*); Enxofre (*Lus.*); Sura (*R.*); Gandhaka (*Sa.*); Skafvel (*Suec.*); Gendagum (*Tam.*); Ghendagum (*Tel.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. Hi. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *A. C. Fi. G. Par. Pid. Sa. Sp. T.*

Ein derber, citrongelber, beim geringsten Stoß sehr zerreiblicher Körper mit glänzendem Bruche, welcher in Nadeln oder

Octaëdern crystallisirt, sich schmelzen, verflüchtigen und entzünden läßt, geschmack- und geruchlos ist, gerieben jedoch einen schwachen Geruch verbreitet. Man findet ihn im Handel unter zwei Formen.

1) als Stangenschwefel (Sulphur citrinum s. in baculis), Soufre en canon (*Gal.*), in walzenförmigen, mehr oder weniger schmutzig- oder graulichgelben Stükken, welche fast immer in ihrer Mitte nadelförmige Crystalle enthalten.

2) als Schwefelblüthen (Flores Sulphuris) Fleurs de soufre, Soufre sublimé (*Gal.*), in sehr feinem, schön gelbem Pulver.

An. Br. Fer. Ful. Hass. HassP. His. Pal. Sar. Wir. Wür. *Fi. Pid. Sw. T.* et *Vm.* Flores Sulphuris pharmaceutam ipsam praeparare jubent, sublimando Sulphur venale vel solum, vel antea cum Arenae lotae certa (aequali) quantitate mixtum. Abluere illos deinde bene jubent, ut ab Acido sulphuroso forte inhaerenti liberentur.

Reliquae pharmacopoeae quae Flores Sulphuris venales indicant, illos antequam adhibeantur abluere jubent. Nomen deinde accipiunt: *Sulphur depuratum s. lotum*, *Flores Sulphuris loti s. depurati*.

Alius, Sulphur purum obtinendi modus, quod deinde *Sulphur praecipitatum*, *Lac s. Magisterium Sulphuris*, *Hydras Sulphuris*; Schwefelmilch; Soufre précipité, Magistère de soufre, Hydrate de soufre (*Gal.*) nominatur (An. B. Ba. Bel. Bor. Br D Fenn. Fer. Ful. Gal. Han. Li. Lon. LonN. O. Sax. Suec. Wir. Wür. *Br. C. Pid. Sp. Sw*. T. Vm.*), in eo constat, ut solutio aquosa Sulphureti Potassae vel Sodae (An. *T.*), vel Sulphureti Calcis (Lon. *C.*) Aceti destillati vel Acidi hydrochlorici ope decomponatur et praecipitatum sedulo ablutum siccetur; — Bor4. et HassP. Liquorem e Solutione saturata Sulphuris depurati in Liquore Kali caustici cum Aquae calidae triplo mixtum per horas viginti quatuor seponere, tunc decanthatione et filtratione depurato instillare Acidi sulphurici diluti quantum ad praecipitandum sulphur requiritur, praecipitatum Aqua tepida ablutum sicca.

Ein Reizmittel, welches je nach der Gabe, und besonders nach dem Subject, als aufregendes, Auswurf beförderndes, Schweiß und Harn treibendes und als Purgirmittel wirkt. Es ist eins der kräftigsten und schätzbarsten Agentien der Materia medica; auch wendet man es unter einer großen Anzahl verschiedener Formen und zur Erfüllung mannichfaltiger Indicationen an. — Gabe des Pulvers, zwölf bis zwanzig Gran, zwei oder drei Mal täglich, als Reizmittel, eine bis zwei Drachmen und mehr als Purgirmittel.

Carburetum Sulphuris.

Alcohol Sulphuris (*Vm.*)

℞. Sulphureti Ferri pulverati partes quinque cum dimidia.
Carbonis partem unam cum dimidia.
Misce diu triturando, imple partem quartam retortae et destillationem institue ad incandescentiam usque calefaciendo; liquidum in fundo aquae in recipiente contentae existens sepone.

Man hat mit dieser Substanz einige Versuche gemacht: sie scheinen aber keinen Erfolg gehabt zu haben.

Pulvis dentifricius. (*Pie.*)

℞. Florum Sulphuris unciam unam.
Lacoae pulveratae quantum sufficit.
Fiat pulvis tenerrimus.

Pulvis contra scabiem s. antipsoricus. (Ham. Wür. *Au. Ca. Sw*.*)

℞. Sulphuris,
Radicis Liquiritiae,
singulorum drachmas sex.
Camphorae . . semidrachmam.

Gabe, eine halbe Drachme zwei Mal täglich. (*Au.*)

℞. Sulphuris sublimati,
Carbonis Lignorum,
Lateris contusi,
singulorum partes aequales.
Fiat pulvis. (*Ca.*)

℞. Florum Sulphuris,
Antimonii crudi,
singulorum semunciam.
Magnesiae . . drachmas duas.
Fiat pulvis. (Ham.)

℞. Florum Sulphuris,
Aethiopis antimonialis,
— mineralis,
singulorum unciam unam.
Fiat pulvis tenerrimus. (Wür.)

℞. Nitri,
Sacchari,
singulorum drachmas duas.
Cremoris Tartari drachmas sex.
Florum Sulphuris sesquiunciam.
Fiat pulvis. (*Sw*.*)

Das zweite dieser Pulver dient nur äußerlich, mit etwas Oel vermischt. Die beiden folgenden können sowohl äußerlich, als innerlich angewendet werden. Das letzte wird nur innerlich benutzt.

Pulvis diaphoreticus. (*Huf. Sm.*)

℞. Florum Sulphuris
drachmas quatuor.

Camphorae . . scrupulum unum.
Fiant doses duodecim. — Gabe, ein oder zwei Stück täglich in einer Tasse Thee. (*Sm.*)

℞. Sulphuris puri . drachmas duas.
— aurati Antimonii,
Camphorae,
singulorum grana octo.
Sacchari . . scrupulos duos.
Gabe, eine halbe Drachme, drei oder vier Mal täglich. (*Huf.*)

Pulvis pleureticus Mynsichti s. antipleureticus. (Wir.)

℞. Florum Sulphuris . semunciam.
Dentium Apri,
Maxillarum Lucii piscis,
singulorum unciam unam.
Florum Papaveris . semunciam.
Gabe, von einem Scrupel bis zur halben Drachme.

Pulvis laxans. (*E. Ra.*)

℞. Florum Sulphuris,
Cremoris Tartari,
singulorum unciam unam.
Sacchari albi . quantum sufficit.
Misce. (*Ra.*)

E. Sulphuris semunciam et Cremoris Tartari unciam unam.
Man vermischt dieses Pulver mit Honig und giebt Kindern etwa einen Kaffeelöffel voll vier oder fünf Mal täglich.
Empfindliche Magen vertragen eine Mischung von Sulphur praecipitatum und Magnesia, singulorum partes aequales besser; man läßt davon täglich vier oder fünf Mal einen Löffel in Milch nehmen. (*E.*)

Pulvis Sulphuris sublimati compositus. (RC.)

℞. Florum Sulphuris,
Cremoris Tartari,
singulorum partes duas.
Pulveris Zingiberis vel
— aromatici, vel
Elaeosacchari Carvi, vel
— Foeniculi . partem unam.
Bei Krätze, Hautkrankheiten, Verschleimung der Lunge, Hämorrhoiden. — Gabe, eine bis zwei Drachmen bei Schlafengehen, mit Syrup.

Pulvis antiasthmaticus s. incisivus. (Gal. GalM.)

℞. Sacchari albi . . . partes tres.
Florum Sulphuris . partes duas.
Scillae siccatae . partem unam.

Pulvis antidysentericus. (*Vm.*)

℞. Florum Sulphuris . partes octo.
Foeniculi . . . partem unam.
Gummi Arabici,
Sacchari albi,
singulorum partes sedecim.

Pulvis catharticus absorbens s. purgans absorbens. (*Sw.*)

℞. Subcarbonatis Calcis,
Florum Sulphuris,
singulorum unciam unam.
Gabe, zehen bis zwanzig Gran für Kinder; eine halbe bis ganze Drachme für Erwachsene.

Pulvis sulphurosus s. sulphureus s. catarrhalis s. anticatarrhalis. (BorC. Pul. Ham. *Ca. Huf.*)

℞. Florum Sulphuris,
Liquiritiae pulveratae,
singulorum drachmas sex.
Camphorae . . semidrachmam.
Fiat pulvis. (BorC.)

℞. Florum Sulphuris,
Nitri purificati,
Radicis Liquiritiae,
Foeniculi,
singulorum drachmas duas.
Fiat pulvis. (Ful.)
Ham. eandem formulam, sed loco nitri Sal Ammoniacum.

℞. Florum Sulphuris drachmas duas.
Cremoris Tartari drachmas sex.
Sulphuris aurati Antimonii
grana quindecim.
Fiat pulvis. (Ham.)

℞. Sacchari . . . . uncias tres.
Radicis Iridis Florentinae
. scrupulos novem.
Florum Sulphuris
scrupulos quatuor.
Croci . . . drachmam unam.
Gummi Arabici,
Amyli,
Liquiritiae,
singulorum scrupulum unum.
Fiat pulvis. (*Ca.*)

℞. Florum Sulphuris sesquiunciam.
Foeniculi,
Iridis Florentinae,
Liquiritiae,
singulorum unciam unam.
Foliorum Sennae drachmas sex.
Fiat pulvis. (*Huf.*)
Gabe, eine oder zwei Drachmen.

Pulvis pectoralis resolvens. (Br. Pal. Wir.)

℞. Specierum diaereos simplicium,
— diatragacanthae frigidarum,
singularum semunciam.
Liquiritiae,
Althaeae,
singularum drachmas tres.
Boli Armenae,
Florum Sulphuris,
singulorum drachmas duas.

Terrae sigillatae sesquidrachmam.
Sacchari crystallisati (Candis) albi uncias sex.
Fiat pulvis. (Pal.)

℞. Radicis Ari,
— Iridis Florentinae,
Antimonii diaphoretici,
Florum Sulphuris,
Cinnabaris nativi,
Oculorum Cancrorum,
singulorum semunciam.
Fiat pulvis. (Br. Wir.)

Gabe, von einem Scrupel bis zur halben Drachme.

Pulvis pectoralis s. pectoralis Balsamicus s. expectorans. (B*. Br. Wir. *Bo. Ca. Pie. Sp. Sw.*)

℞. Radicis Liquiritiae unciam unam.
— Iridis Florentinae drachmas duas.
Florum Sulphuris . semunciam.
— Benzoës scrupulum unum.
Sacchari albi . . . uncias duas.
Olei essentialis Anisi,
— — Foeniculi,
singulorum guttas decem.
Fiat pulvis. (B* Br. Wir.)

Sp. Liquiritiae, Iridis, singularum drachmas sex, Sulphuris unciam unam, Acidi benzoici drachmam unam, Sacchari uncias duas et Oleorum, singulorum guttas decem; — *Ca.* et *Sw.* Liquiritiae, Iridis, singularum drachmas duas, Sulphuris semunciam, Acidi benzoici scrupulum unum, Sacchari uncias duas et Oleorum, singulorum guttas decem.

℞. Acidi benzoici . . . grana sex.
Florum Sulphuris grana decem.
Cascarillae . . grana duodecim.
Sacchari crystallisati grana viginti.
Fiat pulvis. (*Pie.*)

Das letztere ist auf eine Gabe.

Pulvis di gambello. (*Fi.*)

℞. Muriatis Sodae,
Sulphuris,
Cinerum Vegetabilium non maritimorum,
singulorum partes aequales.
Pulverata seorsim commisce. — Mit Wasser vermischt, zum Waschen der Hände.

Bolus Sulphuris. (GalM.)

℞. Sulphuris loti . . . grana octo.
Mellis . . . quantum sufficit.
Fiat bolus.

Bolus Sulphuris compositus. (GalM.)

℞. Sulphuris loti,
Anisi pulverati,
singulorum grana octo.
Foliorum Sennae pulveratorum grana quatuor.
Mellis . . . quantum sufficit.
Fiat bolus.

Boli diaphoretici. (*Ca.*)

℞. Florum Sulphuris,
Cremoris Tartari, singulorum scrupulum unum.
Resinae Guajaci . grana decem.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.
Fiant boli duo. — Ein Stück Morgens, bei Hautkrankheiten und chronischen Rheumatismen.

Boli in cystitide lenta. (*B.*)

℞. Florum Sulphuris drachmam unam.
Terebinthinae Venetae scrupulos duos.
Fiant boli sex. — Gabe, alle drei Stunden ein Stück. — Diese Bissen sollen sich vorzüglich nützlich beweisen, wenn eine Hautkrankheit entweder als Ursache oder als Complication vorhanden ist.

Boli antiasthmatici. (*Ca.*)

℞. Conservae Apii,
Extracti Inulae,
singulorum drachmam unam.
Florum Sulphuris,
Gummi Ammoniaci,
singulorum semidrachmam.
Oxymellis scillitici quantum sufficit.
Fiant boli granorum decem. — Gabe, ein, zwei oder drei Stück fünf oder sechs Mal täglich.

Boli antihaemorrhoidales. (*Ca. Sa. Sm.*)

℞. Florum Sulphuris scrupulos quatuor.
Electuarii catholici scrupulos octo.
Fiant boli quatuor. (*Ca. Sm.*)

℞. Florum Sulphuris scrupulos duos.
Electuarii lenitivi drachmas duas.
Syrupi Rhamni cathartici quantum sufficit
ut fiant boli duo. (*Sa.*)

Gabe, Morgens ein Stück.

Rotulae pectorales, Trochisci e Sulphure, Tabellae pectorales s. e Sulphure. (Ams. Br. Gal. *Au. Ca. Fi. Pie. Sm. Sw. T. Vm.*)

℞. Florum Sulphuris partem unam.
Sacchari albi . . partes octo.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae quantum sufficit
ut fiant tabellae. (Gal.)

Pie. Sulphuris partem unam, Sacchari sex; — Ams. *Pie.* et *Sm.* Sulphuris unam et duas Sacchari; — *T.* Quantitates non indicat.

℞. Florum Sulphuris partem unam.
Sacchari albi . partes duodecim.
Tere sulphur cum sacchari parte

una et admisce saccharo reliquo ad plumam cocto. (*Vm.*)

℞. Pulveris Iridis Florentinae semunciam.
— Liquiritiae scrupulos octo.
— Angelicae scrupulos duos.
Florum Sulphuris drachmam unam.
Extracti Inulae,
— Marrubii,
singulorum scrupulos duos.
— Croci scrupulum unum.
Sacchari albi . uncias sedecim.
Olei essentialis Foeniculi guttas quindecim.
Fiant trochisci. (Br.)

℞. Pulveris Liquiritiae,
— Iridis Florentinae,
Florum Sulphuris,
singulorum drachmam unam.
Croci . . . . . grana decem.
Sacchari albi . . . semunciam.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae quantum sufficit
ut fiant trochisci ponderis scrupuli dimidii. (*Au.*)

℞. Florum Sulphuris drachmas duas.
Acidi benzoici . grana duodecim.
Iridis Florentinae semidrachmam.
Olei Anisi . . guttas duodecim.
Sacchari albi uncias quinque et dimidiam.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae quantum sufficit
ut fiant tabellae. (Gal. *Ca.*)

℞. Pulpae Radicis Althaeae,
— — Consolidae majoris,
singularum unciam unam.
Florum Sulphuris drachmas duas.
— Benzoës semidrachmam.
Sacchari in Aqua Liliorum alborum dissoluti . uncias octo.
Fiant tabellae. (*Pie.*)

℞. Sulphuris praecipitati uncias duas
Acidi benzoici scrupulum unum.
Sacchari albi . uncias quatuor.
Mucilaginis Gummi Arabici quantum sufficit
ut fiant tabellae (290 *Fi.*). (*Sw*)

℞. Acidi oxalici . . partem unam.
Florum Sulphuris partes sedecim.
Commisce cum
Sacchari lenis caloris ope soluti partibus centum viginti octo.
Fiant tabellae. (*Vm.*)

Morsuli ad scabiem, Tabellae antipsoricae. (*Sp.*)

℞. Florum Sulphuris unciam unam.
Antimonii crudi,
Specierum Imperatoris,
singulorum drachmas duas.
Amygdalarum dulcium concisorum unciam unam.
Sacchari albi ad plumam cocti uncias octo.
Essentiae Citri . guttas decem.
Fiant morsuli.

Opiatum sulphuratum s. cum Sulphure. (GalH. *Ra.*)

℞. Florum Sulphuris partes centum sexaginta sex.
Mellis albi partes trecentas quinquaginta.
Misce sedulo. (GalH.)

Ra. Mellis partem unam et tres Sulphuris.

Electuarium purgans. (*E.*)

℞. Florum Sulphuris . semunciam.
Confectionis Sennae sesquiunciam.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.
Gabe, ein Kaffeelöffel Morgens und Abends.

Electuarium s. Conditum pectorale, Marmelada pectoralis. (*Sm. Sw*.*)

℞. Florum Sulphuris,
Foeniculi, singulorum semunciam.
Liquiritiae . . unciam unam.
Syrupi Rhoeados quantum sufficit.
Misce sedulo. (*Sw*.*)

℞. Mellis Narbonnensis uncias octo.
Florum Sulphuris,
Radicis Inulae,
Extracti Liquiritiae,
Aquae Rosarum,
singulorum drachmas duas.
Misce. (*Sm.*)

℞. Florum Sulphuris,
Croci,
Roob Sambuci,
Extracti Liquiritiae,
singulorum drachmas duas.
Mellis Narbonnensis uncias quatuor.
Misce. (*Sm.*)
Gabe, einer Muskatnuß groß, täglich drei oder vier Mal.

Electuarium antirheumaticum. (E*.)

℞. Resinae Guajaci,
Rhei, singulorum drachmas duas,
Cremoris Tartari unciam unam.
Florum Sulphuris . uncias duas.
Nucem moschatam . . no. 1.
Mellis despumati . libram unam.

Opiatum antiphthisicum. (B*. *Pie.*)

℞. Cetacei,
Florum Sulphuris,
Oculorum Cancrorum,
singulorum drachmas duas.
Conservae Rosarum semunciam.
Mellis Narbonnensis quantum sufficit.
Gabe, eine oder zwei Drachmen den Tag über. — Dufresnoy schlägt vor, drei

Drachmen Agaricus piperatus hinzuzusetzen, um es wirksamer zu machen.

Looch expectorans. (Han. *Bo. Pie, Sm.*)

℞. Florum Sulphuris drachmam unam.
Sacchari pulverati drachmas duas.
Olei Lini . . . unciam unam.
Syrupi balsamici . sesquiunciam.
Misce. (Han.)

℞. Syrupi Violarum . sesquiunciam.
Oxymellis simplicis unciam unam.
Florum Sulphuris semidrachmam.
— Benzoës grana quindecim.
Misce. (*Bo. Pie.*)

℞. Mellis Narbonnensis,
Pulpae Uvarum,
singulorum uncias duas.
Florum Sulphuris,
— Benzoës,
singulorum drachmam unam.
Syrupi Erysimi quantum sufficit.
Misce. (*Pie.*)

Sm. eandem formulam sed loco pulpae uvarum illam Pomorum Rosetiorum adhibet.

Mixtura Sulphuris praecipitati, Potio sulphurata. (*Au.*)

℞. Sulphuris praecipitati
drachmas duas.
Aquae Foeniculi . . uncias tres
— Cinnamomi unciam unam.
Syrupi Opii . . . semunciam.

Gabe, alle zwei Stunden einen Löffel, bei zuckerartiger Harnruhr und Mercurialkrankheit.

Tinctura Sulphuris. (Wir.)

℞. Sulphuris . . . sesquiunciam.
Liqua lenti ignis ope in patina fictili et adde sensim
Subcarbonatis Potassae uncias tres,
Ignem auge, ut massa magis liquescat, tunc illam in mortarium calidum effunde et pulveratae infunde
Alcoholis concentrati uncias decem.
Post sufficientem digestionem cola. — Reizend: bei Brustkrankheiten, Krätze und scorbutischen Geschwüren empfohlen. — Gabe, funfzig bis sechszig Tropfen in einem passenden Vehikel.

Balsamum Sulphuris simplex, Oleum sulphuratum, Oleum Lini sulphuratum, Corpus pro Balsamo Sulphuris, Linimentum e Sulphure. (Ams. An. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Ed. Pul. Han. HassP. His. Li. Lon. LonN. O. Pal. Sar. Sax. Wir. *Br. Ca. Pid. Sp. Sw. T. Vm.*)

℞. Florum Sulphuris partem unam.
Olei Amygdalarum dulcium
partes sex.

Digere in balneo arenae per aliquot dies et decantha. (Sar. Wir.)

Sp. eandem quantitates, sed loco olei amygdalarum illud Juglandium adhibet; — An. Bel. Bor. D. Fer. Han. O. Sax. et *Vm.* Sulphuris partem unam et quatuor Olei Lini; — Bor4. Sulphuris citrini partes duas, Olei Lini partes octo; — Br. Sulphuris unam et quatuor Olei Amygdalarum dulcium; — Pul. et *C.* Sulphuris unam et quatuor Olei Olivarum; — His. et *Pid.* Sulphuris unam et quatuor Olei Juglandis; — Li. Sulphuris unam et quatuor Olei Lini; — *Ca.* Sulphuris unam et tres Olei Juglandis; — Br. Sulphuris unam et Olei Lini duas; — HassP. Florum Sulphuris uncias tres, Olei Lini sesquilibram; — Ams. Ed. Lon. LonN. *Br.* et *Sw.* Sulphuris unam et octo Olei Olivarum; — *Sw.* Sulphuris et Olei Olivarum, singulorum partes aequales; — *T.* Florum uncias tres, Olei Juglandis vel Amygdalarum dulcium viginti: (*Balsamum Rulandi.*) Olei octodecim. (*Fi.*)

℞. Florum Sulphuris . uncias duas.
Olei Papaveris . . sesquilibram.
Vini generosi . . . semilibram.

Post octo dies digestionis coque ad humidi consumptionem usque. (Pal.)

Balsamum Sulphuris anisatum. (An. B*. Br. D. Gal. His. Li. Pal. Sar. Wir. *Ca. Fi. Pie. T. Vm.*)

℞. Florum Sulphuris partem unam.
Olei essentialis Anisi
partes quatuor.

Digere ex arenae balneo. (An. Br. Gal. His. *Ca. Fi. Pie, T. Vm.*)

Pal. Sar. et Wir. Sulphuris partem unam et sex Olei.

℞. Balsami Sulphuris simplicis
partem unam.
Olei essentialis Anisi
partes quinque.
Misce sedulo. (B*. D. Li.)

Emulsio cum Balsamo Sulphuris anisato (*Vm.*)

℞. Gummi Arabici drachmas duas.
Balsami Sulphuris anisati
drachmam unam.
Mellis Narbonnensis unciam unam.
Aquae Hyssopi . . uncias octo.

Balsamum Sulphuris succinatum. (His. Sar. *Vm.*)

℞. Olei Succini rectificati partes sex.
Florum Sulphuris partem unam.
Digere super arena. (Sar. *Vm.*)

His. Olei partem unam et quatuor Sulphuris; — *Fi.* Florum unciam unam, Olei quatuor.

Balsamus Vitae Rulandi, Balsamum Sulphuris terebinthinatum, Oleum Terebinthinae sulphuratum. (An. B. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Fer. Han. His. Li.

O. Pal. Sax. Suec. Wir. Würt. *Ca. Pid. T. Vm.*)

℞. Florum Sulphuris partem unam.
Essentiae (Olei) Terebinthinae
partes quatuor.

Dissolve in balneo arenae. (Fer. His. *Fi. Vm.*)

Br. et Würt. Sulphuris partem unam et Essentiae quinque; — Pal. Sax. Wir. et *Ca.* Sulphuris unam et Essentiae quinque; — *T.* Florum unam, Olei octo.

℞. Florum Sulphuris . partes duas.
Olei Lini . . . . . partes sex.

Dissolve et solutionis partibus tribus adde

Essentiae Terebinthinae
partes octo.

Misce. (Suec.)

Am. B. Bel. Bor. Han. et *C.* Balsami Sulphuris simplicis partem unam et tres Essentiae; — *Pid.* Balsami unam et quatuor Essentiae; — D. Balsami unam et Essentiae octo; — Li. Balsami unam et Essentiae quinque; — Fer. Balsami tres et Essentiae triginta duas; —. Bor♃. Olei Lini sulphurati partem unam, Terebinthinae partes tres.

℞. Sulphuris . . . . uncias duas.
Essentiae Terebinthinae uncias tres.
Olei Lini . . . . libras duas.

Liqua sulphur in oleo, adde essentiam et digere blandissimo calore. (Br. Wir.)

Reizend, ehedem für harntreibend gehalten. — Gabe, sechs bis zwölf Tropfen.

Balsamum aethereum. (*Au.*)

℞. Balsami Sulphuris terebinthinati,
Aetheris sulphurici,
singulorum semidrachmam.
Olei animalis Dippelii guttas sex.

Von Bucking bei colica pituitosa von Atonie des Magens empfohlen. — Gabe, zwei bis zehen Tropfen, täglich drei Mal, auf Zucker oder in etwas Wasser.

Ceratum e Sulphure. (*Ra. Sw.*)

℞. Florum Sulphuris uncias quatuor.
Cerati . . . . libram unam.

Misce. (*Ra.*)

℞. Florum Sulphuris,
Baccarum Lauri,
singulorum unciam unam.
Butyri recentis quantum sufficit.

Misce triturando. (*Sw.*)

Unguentum Sulphuris s. e Sulphure s. sulphuratum simplex s. ad scabiem, Pomatum Sulphuris s. sulphuratum simplex s. antipsoricum. (Am. Ba. Bor. BorC. Bor♃. Du. Ed. Ham. Han. Lon. LonN. Lus. RC. Sax. *Au. C. Ca. Ra. Sw. T.*)

℞. Florum Sulphuris . partem unam.
Axungiae Porci . . . partes duas.

Misce triturando. (Bor. BorC. Bor♃. Han. Sax. *Ra. Sw.*)

Ba. Sulphuris partem unam et tres Axungiae; — Am. Du. Ed. Lon. RC. et *C.* Sulphuris unam et quatuor Adipis; — LonN. Sulphuris sublimati uncias tres, Adipis praeparatae libram dimidiam; — Ham. Sulphuris unam et Axungiae octo; — *Au.* Sulphuris unciam unam et Axungiae quantum sufficit; — *T.* Florum uncias sex, Axungiae octo, Sebi quatuor.

℞. Sulphuris . . . partem unam.
Unguenti rosati . . partes duas.

Contere. (Lus.)

℞. Olei Juglandis . . semilibram.
Florum Sulphuris . uncias duas.

Dissolve in balneo aquae et adde
Axungiae Porci . . . semilibram.
Cerae flavae . . unciam unam.
Alcannae . . quantum sufficit ad colorandum. Cola per linteum. (*Ca.*)

Linimentum psoricum, Pomatum sulphuro-saponaceum s. antipsoricum. (B*. DD. GalH. *Au. Ra.*)

℞. Florum Sulphuris,
Saponis albi,
singulorum partem unam.
Aquae purae . . . partes tres.

Dissolve saponem in Aqua, per cribrum trajice et adde sulphur, continue agitando. (GalH. *Ra.*)

℞. Subcarbonatis Potassae
uncias duas
Aquae bullientis unciam unam.
Olei Olivarum . uncias quatuor.

Fiat sapo, cui continue terendo, sensim adde

Florum Sulphuris uncias quinque.

Misce bene. (*Ra.*)

℞. Saponis nigri . . . partes duas.
Florum Sulphuris partem unam.

Misce triturando. (DD.)

B*. Sulphuris et Saponis nigri, singulorum partes aequales cum Aquae sufficiente quantitate.

℞. Florum Sulphuris,
Saponis mollis,
singulorum semilibram.
Radicis Hellebori albi uncias duas.
Nitri . . . drachmam unam.
Axungiae . . . sesquilibram.

Misce. (*Au.*)

Lotio sulphuro-saponacea. (*Ra.*)

℞. Saponis albi . . . uncias tres.
Aquae . . . libras quindecim.

Solutioni adde

Sulphuris pulverati uncias tres.

Unguentum sulphuratum s. Sulphuris s. Sulphuris compositum s. antipsoricum s. contra scabiem s. ad scabiem s. Po-

matum Sulphuris compositum, Pomatum s. Unguentum antipsoricum Jasseri. (A. Am. Ams. An. B. Bel. Bor. Bor4. D. Ful. Gal. GalM. Han. His. Li. Lon. LonN. Pol. R. Sar. Sax. WW. *Au. Bo. Br. C. Ca. Pid. Pie. Ra. Sa. Sm. Sp. Sw. T. Vm.*)

℞. Florum Sulphuris . partes duas.
Subcarbonatis Potassae
partem unam,
Axungiae Porci . . partes octo.
Misce triturando. (Gal. *Ca. Sw.*)

Sa. Sulphuris uncias duas, Subcarbonatis semunciam et Essentiae Citri semiscrupulum; — D. Sulphuris, Baccarum Lauri, singulorum unciam unam, Radicis Imulae uncias duas, Subcarbonatis semunciam et Axungiae uncias decem.

℞. Florum Sulphuris,
Sulphatis Zinci,
singulorum partes sex.
Axungiae Porci partes sedecim.
Contere. (WW.)

D. et R. Sulphuris partes duas, Sulphatis unam et duodecim Axungiae.

℞. Florum Sulphuris . partes duas.
Oxydi Zinci
partem unam cum dimidia.
Olei Lauri . . . . partes tres.
Axungiae Porci . . partes sex.
Misce simul. (*Vm.*)

℞. Florum Sulphuris,
Sulphatis Zinci,
Olei Lauri,
singulorum partem unam.
Axungiae Porci . . partes sex.
Contere. (Sax.)

His. Sulphuris partes duas, Sulphatis tantidem, Olei Lauri quatuor et quatuor Axungiae; — B. Bel. et Li. Sulphuris duas, unam Sulphatis, Olei Lauri tres et Axungiae sex; — *Sw.* Sulphuris, Sulphatis et Olei Lauri, singulorum partes aequales absque axungia; — Ful. Sulphuris partes duas, Sulphatis unam et sex Axungiae absque oleo; — Bor. Bor4. et Pol. Sulphuris, Sulphatis, singulorum duas, et octo Axungiae absque oleo; — A. Sulphuris sesquianciam, Sulphatis tantidem et Unguenti simplicis libram unam.

℞. Florum Sulphuris,
Sulphatis Zinci,
Baccarum Lauri,
singulorum partem unam.
Unguenti rosati partes quatuor.
Misce bene. (Han.)

Sm. Sulphuris, Sulphatis, Baccarum Lauri, singulorum unciam unam et Olei Lini quantum sufficit.

℞. Florum Sulphuris . uncias duas.
Cerussae pulveratae semunciam.
Praecipitati albi drachmas duas.
Axungiae cum Aqua Rosarum ablutae . . . . libram unam.
Misce bene. (Sar.)

℞. Radicis Lapati aquatici uncias octo.
Foliorum Fumariae,
— Lauri,
— Nicotianae, singulorum manipulum dimidium.
Aquae . . . quantum sufficit.
Coque, postea contunde, cola per cribrum et unciis sex pulpae adde
Florum Sulphuris . semunciam.
Salis marini decrepitati
drachmas sex.
Axungiae Porci . . uncias tres.
Misce triturando. (*Bo.*)

℞. Florum Sulphuris . partes duas.
Salis marini decrepitati
partem unam.
Axungiae Porci . . partes octo.
Pulveres cum axungia liquata commisce. (GalM.)

℞. Florum Sulphuris,
Salis marini decrepitati,
singulorum uncias quatuor.
Adipis suilli praeparati
sesquilibram.
Sevi bovilli . . . uncias sex.
Olei essentialis Lavandulae
drachmas duas.
Fiat l. a. unguentum (*Fi.*)

T. Florum libram unam, Salis uncias sex, Axungiae libras tres, Sebi unam, Olei Lavandulae semunciam.

℞. Florum Sulphuris partes sedecim,
Salis Ammoniaci partem unam.
Axungiae Porci partes triginta duas.
Commisce bene. (*Pid.*)

Ams. et B*. Sulphuris partes octo, Salis Ammoniaci unam et Axungiae sedecim; — *Ra.* Sulphuris uncias duas, Salis Ammoniaci drachmam unam, Axungiae uncias quatuor et Essentiae Citri scrupulum unum; — *Pie.* Sulphuris uncias duas, Salis Ammoniaci drachmas duas, Axungiae uncias duas et Olei essentialis Florum Aurantiorum quantum sufficit; — *Au.* Sulphuris uncias tres, Salis Ammoniaci drachmas duas et Axungiae Porci quantum sufficit ut fiat unguentum.

℞. Florum Sulphuris partes sexaginta.
Salis Ammoniaci,
Aluminis,
singulorum partes quatuor.
Misce. (Gal.)

℞. Florum Sulphuris unciam unam.
Pulveris Hellebori albi
drachmas duas.
Axungiae Porci . . uncias duas.
Commisce. (Au.)

℞. Florum Sulphuris,

Saponis, singulorum semilibram,
Radicis Hellebori nigri
uncias duas.
Axungiae libras duas cum dimidia.
Misce sedulo. (Sax.)

℞. Sulphuris . . . . semilibram.
Radicis Hellebori albi uncias duas.
Nitri . . . drachmam unam.
Saponis mollis vel nigri
semilibram.
Axungiae Porci . sesquilibram.
Misce. (Han. HassP. Lon. LonN.)

Sw. Sulphuris libram unam, Hellebori albi uncias tres, Nitri sesquiunciam, Saponis libram unam et Axungiae libras tres.

℞. Florum Sulphuris unciam unam.
Praecipitati albi,
Acidi benzoici,
singulorum drachmam unam.
Olei essentialis Citri unciam unam.
Acidi sulphurici guttas sedecim.
Nitri . . . . drachmas duas.
Axungiae . . . . semilibram.
Axungiae liquatae reliquas substantias, continue ad refrigerationem usque agitando, admisce. (*Am. C.*)

℞. Axungiae Porci uncias octodecim.
Olei rosati . . . . uncias sex.
Florum Sulphuris uncias novem.
Pulveris Caryophyllorum,
— Granorum Paradisi,
— Zingiberis,
singulorum sesquiunciam.
Misce bene. (*Sp.*)

℞. Axungiae Porci . libram unam.
Extracti Fellis Tauri uncias duas.
Florum Sulphuris,
Aloës hepaticae,
Colocynthidis,
singulorum semunciam.
Olei Absinthii . drachmas tres.
Axungiae leni igne liquatae admisce reliqua. (*Br.*)

℞. Succi Elaterii . . partem unam.
Coagulet blandi caloris ope, tunc faeculam separatam et exstillatam commisce cum
Olei Olivarum . parte dimidia.
Butyri . . . partis quadrante, et supra ignem relinque, donec humidum consumptum sit; contunde deinde et adde
Cerae . . . . partis decimam.
Extracti Fellis,
Galbani,
singulorum partis nonagesimum.
Massae semiconcretae deinde adde
Scammonii,
Aloës,
Colocynthidis,
Corticis Mezerei, singulorum partis quinquagesimum.
Euphorbii,
Myrrhae,
Piperis longi,
Zingiberis,
singulorum partis centesimum.
Misce bene. (*Br.*)

Unguentum s. Pomatum antiherpeticum. (*Pic.*)

℞. Florum Sulphuris
drachmam unam.
Pulpae Radicis Patientiae
unciam unam.
Axungiae Porci . . uncias duas.
Succi Citri . . cochlearia duo.
Misce sedulo.

℞. Florum Sulphuris,
Benzoës, singulorum uncias duas.
Butyri recentis quantum sufficit.
Misce triturando.

Unguentum s. Pomatum contra tineam. (*Bo.*)

℞. Florum Sulphuris,
Carbonis pulverati,
singulorum uncias duas.
Puliginis pulverati,
Chinae pulveratae,
singulorum unciam unam.
Cerati . . . quantum sufficit.
Contere et bene misce.

Emplastrum resinosum sulphuratum s. Guillermi servitoris s. sulphuratum. (His.)

℞. Resinae Pini,
Colophonii,
singulorum libras duas.
Cerae flavae . . libram unam.
Terebinthinae . . uncias octo.
Mixturae liquatae adde
Pulveris Zingiberis sesquiunciam.
— Baccarum Lauri,
— Sulphuris,
— Anisi,
— Pulegii,
— Olibani,
— Croci,
— Mastichis,
singulorum unciam unam.
— Piperis Jamaicensis
uncias duas.
Misce exacte.

Swietenia.

Von dieser Pflanzengattung werden in den Pharmacopöen zwei Arten angezeigt:

1) *Swietenia Mahagoni, L.*; Mahagoniholz; Mahogon d'Amérique, Acajou à meubles (*Gal.*).
D. *Br. G. M.*
Ein großer Baum (Decandria Monogynia, *L.*; Meliaceae, *J.*) Cubameriko's

(*Plenck* t. 326. *Hayne* I. t. 19. *Cav.* Carol. II. t. 20.)

Man wendet die Rinde des Stamms und der Zweige (cortex ligni Mahagoni), an; es sind fast platte, fußlange, rauhe, graubraune Stücke, die von den Zweigen ist gerollt, handlang und kürzer, außen hellweißlichgrau, inwendig dunkelrothbraun; sie hat keinen Geruch, aber einen sehr adstringirenden, etwas bittern Geschmack.

2) *Swietenia febrifuga*, *Roxb.*; Fieberbaum; Mahogon febrifuge (*Gal.*); Röhuh (*Beng.*); Swamy (*Can.*); Patränga (*Sa.*); Schemmarum (*Tam.*); Soimida (*Tel.*):

D. Du. *C. G.*

Ein Baum der Küste Coromandel. (*Roxb.* Fl. Corom. I. t. 17. *Hayne* I. t. 20.)

Man wendet die Rinde (cortex Soymidae) an; sie kommt in Stücken von verschiedener Größe, von meist einem bis zwei Fuß Länge, auf einen bis acht Zoll Breite und von mäßiger Dicke vor, hat eine dünne, rauhe, aschgraue, einigermaaßen punctirte Oberhaut und ist feuerroth, bricht leicht, ist aber übrigens hart und der Politur fähig. Sie hat einen angenehmen, schwach gewürzhaften Geruch und einen sehr bittern, adstringirenden und etwas balsamischen Geschmack.

Fiebermittel. — Gabe des Pulvers, ein Scrupel.

T.

Tacamahaca.

Zwei Harze führen in den Pharmacopöen diesen Namen:

1) *Tacamahaca*; Hackundtack, Takamahakharz; Tacamahaca ordinaire (*Gal.*); Tukamahaka (*B.*); Hak og tak (*D.*); Tacamaca (*His.*); Taccamacca (*I.*).

Ams. An. B. Bor. Bor4. Br. D. Fer. Ful. Gal. GalM. Han. Hass. HassP. His. O. R. Sax. Wir. Wür. *Ac. Ax. Fi. G. M. Sp. T. Z.*

In unregelmäßigen Massen, welche aus aneinanderklebenden Stücken zu bestehen scheinen, von gelblicher oder grünlicher Farbe, innerlich halbdurchscheinend, außen mit wellenförmigen, weißlichen, graulichen Binden; sie lassen sich leicht zerreiben und haben einen gewürzhaften, terpentinartigen Geruch und keinen besonders merkbaren, nach einiger Zeit scharf werdenden Geschmack.

Außer dieser Sorte, welche gemeiner Takamahak (Tacamahaca communis s. in sortis), Tacahamaca commun ou en sorte (*Gal.*), genannt wird, kennt man noch eine andre, Tacamahaca sublimis s. in testa, Tacamahaca sublime, angélique ou en coques, in Tropfen oder kleinen Körnern, außen von weißlichgrauer, innen von gelblicher oder röthlicher Farbe.

Dieses Harz fließt aus Einschnitten, welche man in die Rinde von Fagara octandra, L. (Octandria Monogynia, L.; Terebinthaceae, *J.*), einem Baume Südamerica's und, wie behauptet wird, auch Madagascar's (*Jacq.* Am. t. 71. fig. 1 et 3.), macht. Man hat es fälschlich von Populus balsamifera, L., einem Baume (Dioecia Octandria, L.; Amentaceae, *J.*), des Nordens beider Continente (*Hall.* H. Rosm. I. 3. 41. *Plenck* t. 714.) hergeleitet, welcher ein wohlriechendes Harz, den sogenannten Focothalsam oder das Nordamericanische Takamahak, Baume focot, Tacamahaca de l'Amérique septentrionale, liefert, wenn dieser nicht vielleicht, wie Einige meinen, von Calophyllum Inophyllum, L., einem Baume (Peutandria Monogynia, L.; Guttiferae, *J.*), Ostindien's (*Rheede* Hort. Malab. 4. t. 38.) kömmt.

2) *Balsamum Mariae s. viride s. Calaba, Oleum Mariae;* Marienbalsam; Tacamahaca de l'île Bourbon, Baume vert, Baume Marie, Baume de Calaba (*Gal.*); East indian balsam (*Ang.*); Balsamo de Maria (*His.*).

His.

Eine weiche, klebrige, dunkelgrüne, starkriechende, salbenartige Masse, welche langsam an der Luft verhärtet.

Dieses Harz fließt aus Einschnitten, welche man in den Stamm und die Zweige von Calophyllum Calaba, *Jacq.*, einem Baume (Polyandria Monogynia, L.; Guttiferae, *J.*) der Antillen macht. (*Jacq.* Amer. t. 166.)

Reizend, auflösend.

Oleum Tacamahacae. (Wir.)

℞. Tacamahacae . . . partem unam.
Arenae albae lotae
partem unam cum dimidia.

Destillens super balneo arenae, è retorta vitrea; oleum à liquore acido cum illo transeunte separatum rectificetur.

Emplastrum stomachicum s. de Tacamahaca s. tacamahacinum s. de Crusta Panis. (Br. Ful. Pal. Sar. Sax. Wir. *Au. Fi. Sp.*)

℞. Tacamahacae . . . uncias tres.

Gummi Carannae drachmas sex.
Balsami Peruviani,
Terebinthinae,
singulorum sesquiunciam.
Liqua blando igne. (Sar.)

℞. Cerae flavae . . . uncias octo.
Terebinthinae . unciam unam.
Liqua et mixturae semirefrigeratae adde
Pulveris Tacamahacae uncias quatuor.
— Balsami Peruviani,
Olei essentialis Menthae crispae,
singulorum drachmas duas.
— — Caryophyllorum drachmam unam.
Misce bene. (Sax. Wir. *Sp.*)

Ful. Cerae sesquilibram, Terebinthinae semilibram, Tacamahacae, Nucis moschatae, singularum uncias tres, Balsami Peruviani semunciam et Olei Menthae crispae drachmas duas; — *Vm.* Cerae partes sexaginta quatuor, Terebinthinae octo, Tacamahacae triginta duas, Olei Caryophyllorum unam, Olei Nucis moschatae duas et Balsami Peruviani duas.

℞. Galbani,
Tacamahacae,
Cerae flavae,
Asae foetidae,
Cumini,
Terebinthinae,
singulorum partes aequales.
Fiat emplastrum. (*Au.*)

℞. Tacamahacae . . unciam unam.
Mastichis,
Storacis Calamita,
singulorum semunciam.
Macidis,
Nucis moschatae,
Caryophyllorum,
singulorum drachmam unam.
Balsami Peruviani drachmas duas.
Olei essentialis Carvi,
— — Menthae,
singulorum guttas vigint.
Cerae flavae . uncias quatuor.
Terebinthinae . . uncias duas.
Fiat emplastrum. (Br.)

℞. Crustae Panis tostae uncias duas.
Tacamahacae . unciam unam.
Mastichis,
Caryophyllorum,
Nucis moschatae,
Olei Menthae,
singulorum semunciam.
Cerae flavae . . . uncias sex.
Terebinthinae,
Olei Mastichis,
— Cydoniorum,
singulorum unciam unam.
Fiat emplastrum. (Pal. Wir. *Sp.*)

Man legt dieses Pflaster auf die Oberbauchgegend, um Erbrechen und Diarrhöe zu hemmen, auch um Luft fortzutreiben, und gegen Krankheiten, welche man von Schwäche des Magens abhängig glaubt.

Tamarindus.

Tamarindus indica, L.: Tamarinden, Sauerdattelbaum; Tamarinier (*Gal.*).

Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Ham. Hass. HassP. His. Li. Lon. Lon V. Lus. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Würd. *Be. Br. C. Fi. G. M. Par. Pid. Sa. Sp. Z.*

Ein schöner Baum (Triandria Monogynia, L.; Leguminosae, J.) Ostindiens. (*Blackw.* t. 201. *Lam.* Ill. t. 25. *Plenck* t. 81. *Descourt.* Fl. méd. d. Ant. t. 226. Düss. off. Pfl. VII. t. 11. Fl. méd. VI. 338.)

Man wendet die Früchte

Tamarindi, *Fructus Tamarindorum*; Tamarinden, Sauerdatteln; Tamarins (*Gal.*); Tamarind (*Ang.*); Umblie (*Ar. Duk. Hin.*); Tamaryndy, Indyanske daktyle (*B.*); Tamalaki (*Band.*); Cayme (*Co.*); Mahasi ambala (*Gy.*); Tamarin (*D. Suec.*); Tamarindo (*His I. Lus.*); Tamarinde (*Bel.*); Kamal (*Ja.*); Heghka (*Mal.*); Tumiri hindi (*Pe.*); Amlika, Tintili (*Sa*); Pullie (*Tam.*); Chinta punddo (*Tel.*)

an. Es sind längliche, etwas zusammengedrückte, drei bis fünf Zoll lange, geschlossene Hülsen von graubrauner Farbe, welche mit einem dicken Fleisch angefüllt sind, in dem mehrere sehr große, glänzende, eckige und zusammengedrückte Saamen liegen. Dieses Fleisch oder Mark ist von weicher, schlüpfriger Beschaffenheit, schwärzlichbraun, und hat einen weinartigen Geruch und einen angenehmen, mit der Zeit ekelerregenden Geschmack.

Es enthält, nach Vauquelin, Satzmehl, Zucker, Gallerte (pectische Säure), Schleimharz, Citronensäure, Weinstein, Weinsteinsäure und Aepfelsäure.

Pulpa Tamarindorum. (Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Fenn. Ful. Gal. Han. Hass. HassP. Lus. O. Pal. Pol. Sax. Suec. Wir. Würz. *Fi. Pid. Sp. Sw. T. Vm.*)

℞. Tamarindorum . quantum vis.
Tritura cum Aqua ut in massam homogeneam redigantur, quam deinde in dorso cribri setacei, dorsi spathulae ope tere, pulpam trajectam spatulae argenteae ope separa et in olla chartâ tecta serva. (An. B. Bel. *Vm.*)

Fi. Medullam cum seminibus Aquae pauxillo humectatam per cribrum setaceum trajicere et consumere; — Ams. et Gal. Tamarindos cum Aqua bulliente triturare jubent; — Lus. illos ante ebullitiones in Aqua mollefacere.

℞. Tamarindorum . quantum vis.

Tritura cum Aquae bullientis pauxillo, cola per cribrum setaceum, vaporando ad mellis consistentiam inspissa, adde Sacchari partem sextam et nova evaporatione ad consistentiam pulpae redige. (Bor. Han. O. Pol. Sax. *Sw.*)

Br. Hass. Pal. Wir. et *Pid.* Pulpae partes duas et unam Sacchari; — D. R. et Wür. Pulpae tres et unam Sacchari; — *Sp.* Pulpae quatuor et unam Sacchari; — Fenn. Pulpae viginti quatuor et unam Sacchari; — Bor4. HassP. Fructus in Aquae communis pari quantitate macerare et per cribrum trajicere, pultem ad mellis consistentiam evaporare et unicuique librae addere Sacchari uncias duas.

℞. Tamarindorum contusorum
quantum vis.
Aquae . . . quantum sufficit.

Coque per tempus aliquot, cola per pannum; singulis colaturae libris adde Limaturae Ferri semunciam, sepone per horas viginti quatuor, decantha partem limpidam, immerge laminam ferream politam et quando nulla cupri particula hujus superficiei adhaeret, liquorem ad mellis consistentiam consume; adde deinde pro libra una decocti Sacchari albi uncias tres et ad consistentiam pulpae consume. (Ful Li.)

Laxirend, kühlend, fäulnißwidrig, Alcalien neutralisirend. — Gabe, von zwei Drachmen bis zwei Unzen.

Conserva Tamarindorum. (Lus. *T.*)

℞. Pulpae Tamarindorum
partem unam.
Sacchari albi pulverati partes duas.

Misce exacte.

T. Pulpae libram unam, Sacchari uncias quatuor; vel: Pulpae uncias sedecim, Syrupi Violarum duodecim, Sacchari uncias tres.

Infusum Tamarindorum. (*Ca.*)

℞. Tamarindorum
unciam unam ad duas.
Aquae bullientis . libras duas.

Infunde per decem sexagesimas et cola absque expressione.

Potio laxans. (*Ca.*)

℞. Tamarindorum . . uncias duas.
Aquae bullientis . libras duas.

Commisce et colaturae adde
Mellis despumati unciam unam.

Infusum Tamarindorum compositum. (Br. Lus.)

℞. Pulpae Tamarindorum,
Mannae, singularum sesquiunciam.
Corticis Aurantiorum
drachmas duas.
Aquae bullientis . uncias octo.

Digere ut pulpa et manna solvantur et cola. (Lus.)

℞. Tamarindorum a seminibus liberatorum . . . . semilibram.
Elaeosacchari Citri unciam unam.
Succi Citri . . . . semunciam.
Cremoris Tartari drachmas duas.
Aquae bullientis . . libras octo.

Infunde et cola. (Br.)

Laxirend.

Decoctum Tamarindorum. (An. B*. Pul. Gal. *Fi. T. Vm.*)

℞. Tamarindorum . . uncias duas.
Aquae communis . libras tres.

Coque per horae quadrantem et cola. (*Ra.*)

T. Pulpae uncias duas, Aquae libras duas.

℞. Tamarindorum
unciam unam vel duas.
Aquae communis . libras duas.

Coque per horae semiquadrantem; cola absque expressione et adde
Syrupi Capilli Veneris
unciam unam.

Misce bene. (Gal. *Fi.*)

B*. Tamarindorum uncias duas, Aquae libras quatuor, coctionem ad trium remanent. et Syrupi Rubi Idaei sesquiunciam.

℞. Tamarindorum . unciam unam.
Passularum minorum uncias duas.
Aquae . . . . quantum sufficit

ut colaturae unciae sedecim obtineantur; ebulliant aliquoties, tunc absque expressione colentur. (*Vm.*)

An. Tamarindorum uncias duas, Passularum uncias quatuor, Aquae libras duas cum dimidia, ut librae duae colaturae obtineantur.

℞. Pulpae Tamarindorum
uncias duas.
Aquae . . . . libras quatuor.

Coque ad quartae partis consumptionem et adde
Nitri . . . . . drachmas tres.
Roob Ribium . . sesquiunciam.

Misce bene. (Ful.)

Glaswelfe.

Decoctum Tamarindi compositum. (Wür. *Sw**.)

℞. Tamarindorum,
Passularum minorum,
singulorum uncias tres.
Aquae bullientis quantum sufficit

ut ebulliendo librae tres colaturae obtineantur; adde

Tartari stibiati . . semigranum.
Syrupi Mororum sesquiunciam.
Misce. (*Sw*.)

℞. Tamarindorum . . unciae sex.
Cremoris Tartari drachmas tres.
Aquae fontanae quantum sufficit ut ebulliendo libra una colaturae obtineatur, cui calidae adde
Foliorum Sennae,
Rhei, singulorum sesquidrachmam.
Post horas quatuor digestionis in liquore solve
Mannae electae drachmas decem.
Cola et adde
Aetheris sulphurici . guttas sex.
Misce bene. (Wür.)

Gabe, ſtündlich zwei bis vier Unzen.

Serum Lactis tamarindinatum s. temperans. (Bor4. Han. Li. *Au. B. Sw.*)

℞. Lactis vaccini . . libras duas.
Tamarindorum . . uncias duas.
Coque et post coagulationem cola. (Han. *Sw.*)

Li. et *Au.* coquere jubent Seri Lactis partes quatuor cum una Tamarindorum et colare; — *B.* Pulpae sesquiunciam et Lactis quantum satis ad obtinendas duas colaturae libras; — Bor4. ut serum lactis dulcificatum sed loco tartari Pulpae unciam unam et absque conchis.

Säuerlich, angenehm kühlend und gelind laxirend.

Serum Lactis antiscorbuticum. (Pal. *Bo.*)

℞. Acetosellae,
Betonicae,
singularum manipulum unum.
Caryophyllorum rubrorum
manipulum dimidium.
Tamarindorum . sesquiunciam.
Seri Lactis clarificati libras tres.
Infunde per horam unam, blando calore et adde colaturae
Syrupi Limonum,
— Violarum,
singulorum sesquiunciam.
Misce. (*Bo.*)

℞. Tamarindorum . . semunciam.
Acetosellae,
manipulum unum cum dimidio.
Betonicae,
Cerefolii,
singulorum manipulum dimidium.
Seri Lactis . . . . libras tres.
Infunde blando calore per horam unam sed absque bullitione; cola exprimendo et adde
Syrupi Succi Citri,
— Rubi Idaei,
— Violarum,
singulorum unciam unam.
Misce. (Pal.)

Gabe, eine Unze alle halbe Stunden.

Potio s. Mixtura laxans, Potio purgans, Tisana laxans s. purgans. (Ful. Ham. *B. Pie, Sm.*)

℞. Tamarindorum . . uncias tres.
Aquae . . . uncias duodecim.
Decoque ad unciarum decem remanentiam et colaturae adde
Mannae . . . . uncias duas.
Cola iterum. (Ham.)

℞. Pulpae Tamarindorum
unciam unam.
Aquae . . . . quantum sufficit ut decocti unciae octo obtineantur, quarum colaturae adde
Cremoris Tartari unciam unam.

Auf zweimal zu nehmen. (*B.*)

℞. Pulpae Tamarindorum
sesquiunciam.
Sulphatis Sodae . unciam unam.
Aquae bullientis uncias novem.
Solutioni adde
Syrupi Mannae . unciam unam.
Misce bene. (Ful.)

℞. Pulpae Tamarindorum,
Mannae, singularum uncias duas.
Nitri . . . . drachmas duas.
Aquae . . . . . libras duas.
Cola solutionem. (Ful.)

℞. Tamarindorum . unciam unam.
Santali citrini drachmam unam.
Mannae uncias duas cum dimidia.
Aquae . . . . uncias novem.
Colaturae adde
Tincturae Ipecacuanhae aquosae
unciam unam.
Misce. (*Pie.*)

℞. Cremoris Tartari drachmas sex.
Salis Prunellae . drachmas duas.
Tamarindorum uncias quatuor.
Aquae . . . . octarium unum.
Coque per semihoram et adde colaturae
Syrupi Violarum . uncias duas.
Misce sedulo. (*Sm.*)

℞. Tartari solubilis drachmas duas.
Sennae mundatae drachmas tres.
Tamarindorum . unciam unam.
Liquiritiae . . drachmas duas.
Fructus Citri cum Cortice
partem dimidiam.
Cerefolii . . manipulum unum.
Scammonii Monspeliaci
grana septem.
Aquae bullientis octarium unum.
Infunde per horas duodecim et cola cum expressione. (*Pie.*)

Glasweiſe zu nehmen.

Electuarium laxativum s. Tamarindorum. (Pal. Wir. *Fi. Sw. Sy. Vm.*)

℞. Pulpae Tamarindorum
uncias quatuor.
— Uvarum,
— Prunorum,

Foliorum Sennae,
singulorum sesquiunciam.
Cremoris Tartari drachmas sex.
Cinnamomi,
Foeniculi,
singulorum drachmas duas.
Olei essentialis Nucis moschatae
guttas decem.
Syrupi solutivi quantum sufficit.
Fiat electuarium. (Wir.)

℞. Foliorum Sennae . uncias sex.
Foeniculi . . . drachmas duas.
Vini albi,
Aquae, singulorum libras duas.
Decoque ad dimidii remanentiam, exprime et adde
Pulpae Prunorum,
— Uvarum,
— Tamarindorum,
singularum semilibram.
Cremoris Tartari unciam unam.
Foliorum Sennae . uncias tres.
Olei essentialis Anisi,
— — Nucis moschatae,
singulorum semidrachmam.
Misce sedulo. (Pal.)

℞. Cremoris Tartari drachmam unam.
Sennae . . . . drachmas tres.
Mannae uncias tres cum dimidia.
Pulpae Cassiae,
— Tamarindorum,
singularum sesquiunciam.
Syrupi Violarum quantum sufficit.
Misce. (*Vm.*)

℞. Pulpae Tamarindorum uncias tres.
Foliorum Sennae sesquidrachmam.
Nitri,
Sulphuris,
singulorum drachmas tres.
Syrupi Corticum Aurantiorum
quantum sufficit.
Misce. (*Sw.*)

Sy eandem formulam indicat sed absque senna.

℞. Pulpae Tamarindorum cum Sacchari aequali quantitate commixtae,
Cremoris Tartari,
singulorum libram unam.
Conservae Prunorum simplicis
libras duas.
Misce. (*Fl.*)
Gabe, eine halbe bis eine Unze.

Tamarix.

Von dieser Pflanzengattung findet man in den Pharmacopöen zwei Arten angeführt:

1) *Tamarix Germanica, L.*; Deutscher Tamariskenbaum; Tamaris d'Allemagne (*Gal.*).
Ams. Fer. Wir. Würt. *Sp.*

Ein Baum (Pentandria Trigynia, L.; Portulaceae, J.) Deutschland's. (*Pall.* Fl. Ross. II. t. 80.)

Man wendet die Rinde und die Blätter an.

Die Rinde (cortex Tamarisci s. Tamaricis), des Stammes, und besonders der Wurzel, ist außen grau oder braungrau, inwendig gelb und röthlich, ungleich, rissig. Sie hat einen angenehmen balsamischen Geruch und einen sehr adstringirenden, etwas bittern Geschmack.

Die Blätter sind sitzend, linienlanzettförmig und dachziegelförmig.

2) *Tamarix Gallica, L.*; Französische Tamariske; Tamaris de France (*Gal.*); French tamarisk (*Ang.*); Taray (*Ar.*); Fransche tamarisk (*Bel.*); Tamarisco (*I.*); Tamarqueira (*Lus.*).
An. B. Br. Fer. Gal. His. *Be. Br. G. M.*
Ein Strauch des südlichen Europa's. (*Zorn* Ic. pl. t. 312.)

Man wendet ebenfalls die Rinde und die Blätter an.

Die Rinde (cortex Tamarisci s. Tamarisci Gallici) ist dünn, gerollt, außen braun, inwendig hellgelb und hat einen bittern, etwas adstringirenden Geschmack.

Die Blätter sind lanzettförmig, sehr klein, spitzig, umfassend und dachziegelförmig.

Tonisch, aber jetzt wenig in Gebrauch, ehedem zu den eröffnenden Mitteln gezählt.

Tamus.

Tamus communis, L.; Jungferwurzel; Schmeerwurzel, Schmeerwurzschwarzrebe; Sceau de Notre Dame, Vigne noire, Bryone noire (*Gal.*); Common tamus (*Ang.*). Gal. *G.*

4 (Dioecia Hexandria, L.; Alismaceae, J.) Eine in dem südlichen Europa wachsende Pflanze. (*Blackw.* Herb. t. 457. *Lamk.* Ill. t 817. *Schk.* t. 327.)

Man wendet die Wurzel (radix Tami s. Tamni s. Bryoniae nigrae) an; sie ist rund, höckerig, auswendig schwarz, inwendig weiß. Ihr Geschmack ist scharf und etwas unangenehm.

Man betrachtet sie als harntreibend.

Tanacetum.

Tanacetum vulgare, L.; Rainfarn; Tanaisie (*Gal.*); Tantay (*Ang.*); Wratje (*B.*); Rheinfan (*D.*); Tanaceto (*His.*); Tanaceto, Erba pennina (*I.*); Reinevaren (*Bel.*); Wratycz (*Pol.*); Tanasia (*Lus.*); Renfana (*Suec.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bord. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *Be. Br. C. Fi. G. M. Pid. Sp.* Z.

♃ (Syngenesia Polygamia Superflua, L.; Synantherae, *Cass.*) Eine Europäische Pflanze. (*Blackw.* t. 464. *Plenck* t 611. *Hayne* II. t. 6. Düss. off. Pfl. t. 12. Fl. méd. VI. 329.)

Man wendet das Kraut, die Blüthen und die Saamen an.

Das Kraut (herba Tanaceti s. Athanasiae) besteht aus einem gestreiften, walzenförmigen, ästigen Stängel und großen, abwechselnden, gestielten, ebenen, glatten Blättern, von denen die untern doppelt gefiederten, dreilappige, fast sitzende, schmale, linienförmige, spitzige, etwas herablaufende Blättchen besitzen. Der Geschmack ist gewürzhaft, brennend und bitter.

Die Blüthen (flores Tanaceti) bilden strahlige Köpfchen, sind glänzend gelb und haben einen balsamischen, bittern Geschmack.

Die Saamen sind klein, länglich, etwas gekrümmt, tief gefurcht und am obern breitern Ende mit einem kleinen Rande versehen. Ihr Geschmack ist bitter und kampherartig.

Der Geruch ist stark und balsamisch; der der Blüthen unangenehm, kampherartig und gewürzhaft.

Reizend, harntreibend, Wurmmittel. — Gabe des Pulvers, zwanzig bis vierzig Gran.

Conserva Tanaceti, Confectio Florum Tanaceti sicca. (Ful. Sar. *Vm.*)

℞. Foliorum Tanaceti contusorum partem unam.
Sacchari albi . . partes duas.

Contere et in balneo aquae liquare fac. (*Vm.*)

Sar. Florum et Sacchari, singulorum partes aequales.

℞. Florum Tanaceti absque calycibus partem unam.

In sartaginem cupream, lento igne, ingere, injice sensim
Sacchari ad plumam cocti partes duas.

Agita, donec massa bene sit siccata et hoc repete, donec flores penitus sint saccharo tecti. (Ful.)

Pulvis Tanaceti compositus. (Suec.)

℞. Summitatum Tanaceti,
Seminum Cinae,
Gummi Guttae,
Nucis vomicae,
Sulphatis Ferri,
singulorum drachmam unam.

Pulverata seorsim commisce.

Species nervinae pro cucuphis. (Hass. *Pid.*)

℞. Herbae Menthae piperitae,
— Rutae,
— Serpylli,
— Majoranae,
— Thymi,
— Salviae,
— Sabinae,
— Melissae,
Baccarum Juniperi,
singularum uncias duas.
Florum Rosarum rubrarum,
— Lavandulae,
singulorum uncias tres.
— Tanaceti uncias quatuor.
Baccarum Lauri . uncias duas.
Cardamomi minoris unciam unam.
Anisi,
Carvi, singulorum sesquiunciam.
Macidis . . . . . semunciam.

Concisa et contusa misce.

Extractum Tanaceti aquosum. (Br. Ful. HassP. Li. Sar. Sax. Wir. *T. Vm.*)

℞. Herbae Tanaceti libram unam.
Aquae fontanae . . libras sex.

Digere per dies quatuor in loco calido, tunc coque parumper; cola exprimendo et colaturam ad extracti consistentiam consume. (Br. Ful Wir.)

Li. coquere jubet Herbae libram unam cum octo Aquae per horam unam et exprimere; residuo Aquae frigidae pauxillum superfundere et itidem exprimere, tunc colaturas ambas commixtas consumere.

℞. Herbae Tanaceti . partem unam.
Aquae communis . partes octo.

Macera per horas viginti quatuor, tunc coque per horae quadrantem et cola fortiter exprimendo; residuum coquatur cum Aquae partibus quatuor, commisce ambos liquores et post viginti quatuor horarum sepositionem ad aptam consistentiam consume. (Sax.)

℞. Herbae Tanaceti contusae . libras octo.

Macera per tres dies in alembico, tunc destillando Aquae uncias circiter duas abstrahe; residuo infunde Aquae triplum et coquendo ad tertiam partem redige; liquorem clarificatum et colatum ad electuarii consistentiam consume, et huic nonnisi tepido Aquam destillatam affunde. (Sar.)

Fer. coquere jubet Herbae libram unam in Aquae tribus, colaturam Albuminis ope clarificare et sufficienter consumere.

℞. Foliorum Tanaceti quantum vis.

Contusa cum Aquae pauxillo, diu terendo commisce; cola cum expressio-

ne et postquam coagulaverit, faeculam sepone; infunde deinde blando calore succum limpidum cum residuo, cola exprimendo, iterum clarificia et liquorem vaporando ad extracti consistentiam redige, adde faeculam et denuo calefac, donec massa consistentiam necessariam acquis verit. (*Vm.*)

HassP. ut extractum cardui benedicti, centaurii minoris etc.; — *T.* Tanaceti libram unam, Aquae bullientis octo per horas viginti quatuor infundere, colare leviter exprimendo, filtrare et ad extracti consistentiam inspissare.

Gabe, sechs bis zwanzig Gran.

Extractum Tanaceti alcoholicum. (Wür.)

℞. Summitatum Tanaceti,
Alcoholis, singulorum libram unam.
Aquae communis . libras octo.

Digere, blando calore, per tres dies, cola exprimendo, sepone et decantha liquorem, et alcohole destillando separato, residuum ad aptam consistentiam consume.

Linimentum vermifugum. (*Vm.*)

℞. Faeculae viridis recentis Tanaceti
partem unam.
Axungiae Porci
partem unam cum dimidia.

Liqua leni calore, lava in Aqua calida, decantha et tunc iterum iterumque fundendo et decanthando Aquam quam fieri potest consume.

Infusum Tanaceti. (B*.)

℞. Herbae Tanaceti . semunciam.
Aquae bullientis . uncias decem.

Infunde et cola. — Ausdünstung befördernd. — Gabe, alle zwei Stunden eine Tasse. — Der Aufguß mit Milch in Klystir gegen Ascariden.

Enema ad ascarides, Clyster vermifugus. (*Sw.*)

℞. Herbae Tanaceti . semunciam.
Aquae . . . . . uncias octo.

Coquendo ad unciarum sex remanentiam consume.

Tinctura Tanaceti. (Ful.)

℞. Summitatum Tanaceti
partem unam.
Alcoholis . . . partes quatuor.

Post tres dies digestionis, blando calore, cola exprimendo. — Gabe, dreißig bis sechzig Tropfen.

Essentia contra vermes s. vermifuga. (Br. *Vm.*)

℞. Herbae Tanaceti,
— Absinthii,
— Centaurii minoris,
Radicis Gentianae,
singularum semunciam.
Florum Tanaceti,
Seminum Cinae,
Myrrhae electae,
singulorum drachmas duas.
Spiritus Menthae . libram unam.

Digere, exprime et filtra. (Br.)

℞. Foliorum recentium Tanaceti
partem unam.
Radicis recentis Inulae,
Rhei,
Santolinae, singuloram partes tres.
Vini Maderani . . partes duas.
Aquae Vitae . . partes viginti.

Infunde frigide per dies octo, cola exprimendo et filtra. (*Vm.*)

Oleum Tanaceti aethereum, Aetheroleum Tanaceti (A. Ams. An. B. Bel. Bor. Br. D. Fenn. Fer. Ful. Han. Hass. HassP. Li. O. R. Sax. Suec. Wür. *Br. Pid. Sw. T.*)

℞. Herbae Tanaceti cum floribus
quantum vis.
Aquae . . . quantum sufficit.

Destillent. (Ams. B. Bel. Fenn. Fer. R. Suec. *Br.*)

Ful. et Li. Herbae partem unam et tres Aquae; — *Sw.* Herbae partem unam et quatuor Aquae; — D. Herbae unam et Aquae sex; — Han. HassP. O. et Sax. Herbae unam et octo Aquae; — A. Herbae unam et duodecim Aquae; Gal. Herbae quinque et septem Aquae; — An. Herbae tres et decem Aquae; — *T.* Herbae unam, Aquae bullientis pondus duplum.

℞. Herbae Tanaceti
partes viginti quinque.
Aquae partes septuaginta quinque.
Salis culinaris . . . partes tres.

Post tres dies macerationis destillent. (Br. Hass. *Pid.*)

℞. Herbae Tanaceti . quantum vis.
Aquae destillatae Tanaceti
quantum sufficit.

Destillent. (Wür.)

Bor. Oleum venale indicat. Pond. spec. = 0,932.

Aqua Tanaceti. (A. Wür. *Pid.*)

℞. Herbae Tanaceti cum floribus
partem unam.
Aquae . . . . . partes sex.

Destillent et oleum ab aqua separetur. (Wür.)

A. Herbae partem unam et duodecim Aquae; destillent partes quatuor; — *Pid.* Herbae partem unam et Aquae octo; destillent partes quatuor.

Tapioka.

Faecula Tapioka; *Panis Cassaviensis*; Cassavabrodt, weißer Sago; Tapioca, Pain de Cassave, Sagou blanc (*Gal.*).

Am. Fer. His. *C. G. T.*

Eine stärkemehlartige, körnige, weiße

oder gummiche Substanz in eckigen, unregelmäßigen Stücken von verschiedener Größe, an der Oberfläche etwas mehlig, aber durchsichtig oder halbdurchsichtig.

Es ist der ausgewaschene und getrocknete Satz des ausgepreßten Safts der Wurzel von Janipha Manihot, *K.*, einem Strauche (Monoecia Decandria, L.; Euphorbiaceae, *J.*) der heißen Gegenden America's. (*Pluk.* Alm. t. 205. fig. 1.)

Wird als nährendes Mittel, in Gallerte, mit Zuckerwasser oder Bouillon längere oder kürzere Zeit gekocht angewandt.

Taraxacum.

Taraxacum Dens Leonis, Desf.; Löwenzahn, Pfaffenröhrlein, Pappenkraut; Pissenlit (*Gal.*); Dandelion (*Ang.*); Plesska (*B.*); Laevetand (*D.*); Dente de leon (*His.*); Paapenkruid (*Bel*); Dente di leone (*I.*); Wolowe oczy, Swini mlecz (*Pol.*); Dente de leao (*Lus.*); Lejontand, Maskrosor (*Suec.*)

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Würr. *Be. br. C. G. M. Par. Pid. Sp. Z.*

♃ (Syngenesia Polygamia Aequalis, L.; Syanthereae, *Cass.*) Eine Pflanze, welche in ganz Europa wächst. (*Bull.* t. 217. *Blackw.* t. 1. u. 501. *Plenck* t. 598. *Schk.* t 219. *Hayne* II. 4. Düss off. Pfl. II. 21 *Zorn* ic. pl. t. 69.)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an.

Die Wurzel (radix Taraxaci s. Dentis leonis) ist walzig, lang, fingerdick, bisweilen ästig, behaart, außen schwarzbraun inwendig weiß und enthält einen Milchsaft. Sie hat keinen Geruch, aber einen bittern, süßen und etwas salzigen Geschmack. Getrocknet verliert sie ihre Bitterkeit.

Das Kraut (herba Taraxaci) besteht aus einer Rose langer, wie benagter, gezähnelter, glatter, hellgrüner Blätter ohne Geruch und von einem bittern Geschmack.

Succus Taraxaci. (Hass. Sar. Wür. *T.*)

℞. Herbae et Radicum recentium Taraxaci . . . . quantum vis.

Contunde in mortario lapideo, exprime fortiter, et succum sepositum filtra. (Hass.)

Wür. addere jubet Succi libras cuique Alcoholis drachmam unam; — Sar. clarificare eum in balneo aquae.

Gabe, zwei bis vier Unzen.

Decoctum Taraxaci s. Leontodontis Taraxaci. (An. B*.)

℞. Radicis Taraxaci . uncias duas.
Aquae . . . . . libras duas.
Decoque ad dimidii circiter remanentiam et liquorem sepositum decantha. (An.)

B*. Radicis sesquiunciam, Aquae libras tres et decoctionem ad tertiae partis remanentiam.

Harntreibend, einschneidend. — Gabe, ein Pfund täglich.

Decoctum Taraxaci compositum s. resolvens. (B*. DD. *Sw.*)

℞. Radicis Taraxaci uncias quatuor.
Herbae Trifolii . . semunciam.
Aquae purae
uncias quadraginta octoginta.
Decoque ad dimidii aquae remanentiam, exprime fortiter et colaturae refrigeratae adde
Salis Ammoniaci depurati
drachmas duas, vel
— Sedlitzensis . unciam unam.
Aetheris sulphurici drachmas duas.
Misce. (DD.)

Sw. Herbae et Radicis sesquil bram. Graminis tantidem, Aquae libras sex ad trium remanentiam et colaturae addere Oxymellis semilibram, Sulphatis Potassae drachmas sex et Aetheris sulphurici alcoholisati guttas viginti quinque; — B*. Graminis, Radicis Taraxaci, Radicis Cichorii, singularum uncias duas et dimidiam, Aquae quantum sufficit ut libra una colaturae obtineatur et huic addere Syrupi Quinque Radicum aperientium uncias tres, Sulphatis Potassae drachmas duas et Liquoris anodyni mineralis guttas viginti quinque.

Von Stoll in viertägigen rebellischen Wechselfiebern, Verstopfungen der Unterleibseingeweide, Gelbsucht und Gallensteinen empfohlen. — Gabe, ein halbes Pfund vier bis sechs Mal täglich.

Decoctum resolvens s. aperiens. (Ful. Ham. *Sm. Vm.*)

℞. Radicis Taraxaci,
— Graminis,
singularum uncias duas.
Aquae . . . . . libras tres.
Decoque ad librarum duarum remanentiam, cola et colaturae adde
Sulphatis Potassae . semunciam.
Oxymellis . . . . uncias duas.
Misce. (*Sm. Vm.*)

℞. Radicis Taraxaci uncias quatuor.
Aquae fontanae . . libras duas.
Decoque ad dimidium et colaturae adde
Cremoris Tartari unciam unam.
Boracis . . . drachmas tres.
Mellis glyzyrrhizati uncias duas.
Dissolve. (Ham.)

℞. Radicis Taraxaci . uncias duas.
Aquae fontanae . libram unam.

Decoque ad dimidium et adde colaturae
Extracti Chelidonii majoris
drachmas duas.
Tartari stibiati . . grana duo.
Dissolve. (Ham.)

℞. Radicis Taraxaci uncias quatuor.
Cremoris Tartari,
Boracis, singulorum semunciam.
Aquae . . . . . libras tres.
Decoque ad dimidii remanentiam et colaturae adde
Mellis despumati . uncias duas.
Misce bene. (Ful.)

Extractum s. Mellago s. Extractum liquidum Taraxaci s. Leontodontis Taraxaci. (A. Ams. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Fenn. Fer. Ful. Gal. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. Sax. Suec. Wür. *Br C. Pid. Sw. Vm.*)

℞. Herbae recentis Taraxaci
quantum vis.
Contunde in mortario lapideo, Aquae pauxillum adspergendo; exprime succum et statim in balneo aquae sub finem spathulae ope continue agitando, inspissa. (Br. Gen. His. Lus.)

D. et *Sw.* contundere jubent Radicis et Herbae libras duas, addere Aquae libras sex, exprimere succum et illum postquam semel ebullivit, ad syrupi spissi consistentiam consumere; — Bor4. Radicum libras duodecim contundere jubet, Aquae libras novem sensim addendo, succum exprimere et subsidendo depuratum ad separationem substantiae albuminosae decoquere, tunc colatum ad mellis consistentiam redigere.

℞. Radicis Taraxaci,
Herbae Taraxaci,
singularum libras octo.
Contunde in mortario lapideo, exprime succum, coque sedimentum cum Aquae duplo, exprime et ambos liquores commixtos, post horas duodecim sepositionis ad syrupi consistentiam consume. (Li.)

℞. Herbae et Radicis Taraxaci
partem unam.
Aquae bullientis . . partes octo.
Coque leviter per horae quadrantem et cola exprimendo: residuum coquatur cum Aquae partibus quatuor et itidem coletur; liquores commixti post sufficientem sepositionem decantha et blando igne ad extracti consistentiam consume. (Han.)

Suec. Radicem cum Aquae duplo paullulum, tunc cum nova Aqua coquere et ambos liquores vaporationi in balneo aquae subjicere; — Fenn. et Ful. eundem agendi modum indicant, sed primum cum Aquae partibus sex et per horae quadrantem coquere jubent; — *Br.* priorem bullitionem per horas duas continuare; — HassP. Herbam et Summitates cum Aquae sufficiente quantitate in pultem redigere et in dolio per horas duodecim seponere etc. ut extractum cardui benedicti.

℞. Radicis et Herbae recentium Taraxaci . . . . libram unam.
Aquae purae . . libras decem.
Coque per horas duas, cola exprimendo, liquorem sepone et per pannum colatum consume, donec massa non amplius digitis adhaereat. (Ams.)

R. coquere jubet Herbae et Radicis partem unam in Aquae duabus vel tribus, colare exprimendo et liquorem filtratum sufficienter consumere; — Du. Hass. et *Pid.* coquere Herbae et Radicis partem unam in Aquae tribus, colare exprimendo et liquorem blando igne consumere; — A. Coquere Radicis et Herbae partes aequales in Aquae sufficiente quantitate et decoctum decanthatum ad extracti liquidi consistentiam inspissare; — Bor. O. Pol. et Sax. contundere Radicis libras duodecim, Aquae libras sex sensim addendo, exprimere succum, illum postquam semel ebulliverit, per pannum colare et ad mellis consistentiam inspissare; — His. Radicem coquere in Aquae sufficiente quantitate et decoctum decanthatum, continue agitando lente consumere; — Wür. bullitionem per horam continuare et decoctum ad mellis spissi consistentiam redigere; — An. coquere per horae quadrantem Radicis et Herbae libras duas in Aquae decem et decoctum decanthatum inspissare; — Lon. LonN. et *C.* coquere post horas viginti quatuor macerationis Radicis libram unam in Aquae octariis octo ad quatuor remanentiam et colaturam vaporando consumere; — Ba. coquere Radicis et Herbae partem unam cum Aquae sex per horae quadrantem et colaturam consumere; — Fer. coquere Radicis libram unam cum Aquae libris tribus et decoctum Albuminis ope clarificatum consumere; — Bor4. Taraxacum cum Aquae fervidae decuplo per horas 36 infundere, liquorem exprimendo separare, residuum cum quintuplo Aquae fervidae infundere, exprimere et liquores inspissare.

℞. Herbae et Radicis recentium Taraxaci . . . . . libras duas.
Aquae bullientis . libras decem.
Digere per horas viginti quatuor,

tunc per unam coque; decantha post refrigerationem et herbam exprime, liquores ambos commixtos et sepositione depuratos ad aptam usque consistentiam consume. (B. Bel.)

℞. Radicis siccatae Taraxaci
quantum vis.

Macera in Aqua frigida, tunc bis digere in Aqua fervente, clarifica liquores commixtos Albuminis ope et ad extracti consistentiam consume. (*Vm.*)

HassP. Mellaginem cum Extracto et Aquae sufficiente quantitate ad syrupi spissioris consistentiam redactis parare jubet.

T. Succum cum Aquae modica quantitate commixtum Albuminis et caloris ope clarificare et inspissare.

Schwach reizend oder tonisch, bei Stokkungen im Unterleibe und Wassersuchten sehr gerühmt. Das flüssige und syrupartige Extract wendet man zu einem Löffel mehrmals täglich an.

Pilulae resolventes. (*Sm.*)

℞. Extracti Taraxaci,
Saponis albi,
singulorum unciam unam.
Liquoris Terrae foliatae Tartari
quantum sufficit.

Fiant pilulae granorum quatuor. — Gabe, vier bis sechs Stück täglich zwei Mal.

Elixir resolvens s. aperitivum. (Ful. Ham.)

℞. Extracti Taraxaci drachmas tres.
— Chelidonii majoris
drachmas duas.
Aquae Menthae crispae uncias octo.
Dissolve. (Ham.)

Ful. Extracti Taraxaci drachmas sex, Extracti Chelidonii majoris drachmas duas, Aquae destillatae uncias sex et duas Aquae Menthae piperitae.

Löffelweise.

Terebinthina.

Man belegt mit diesem Namen im Allgemeinen bloß folgende vier Harzsubstanzen:

1) *Terebinthina Cypria s. Chia s. pistacina*; Cyprischer Terpentin; Térébenthine de Chio, de Scio, de Chypre ou de térébinthe (*Gal.*); Cyprian turpentine (*Ang.*); Terebinto di Cipro (*I.*).

Ba. Fer. Gal. GalM. Lon. LonN. Wir. *Be. C. Fi G. M. Par. Sa. Sp. T.*

Eine sehr dicke, klebrige, durchsichtige Substanz von grünlichcitrongelber Farbe, angenehmem Geruch und einem balsamischen Geschmack ohne Bitterkeit und Schärfe.

Sie fließt von Pistacia Terebinthus, L., einem kleinen Baum (Dioecia Pentandria, L.; Terebinthaceae, *J.*) des Archipels. (*Blackw.* Herb. t. 478. *Plenck* t. 709.)

2) *Terebinthina communis s. Pini sylvestris s. pinea, Balsamum nativum Pini sylvestris*; gemeiner Terpentin; Térébenthine commune, de Bordeaux ou de pin (*Gal.*); Common turpentine (*Ang.*); Ratinge ruime (*Ar.*); Almindelig terpentin (*D.*); Trementina comun (*His.*); Gemeen terpentin (*Bel.*); Trementina commune (*I.*); Kota (*N.*); Zungharie (*Pe.*); Tjok terpentin (*Suec.*).

Am. An. B. Bel. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Ham. Han. HassP. Li. Lon. LonN. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *A. B. C. G. M. Par. T.*

Eine syrupartige, weißliche, trübe, consistente Flüssigkeit von unangenehmem Geruch und scharfem, bitterm und widerlichem Geschmack.

Dieses Harz kommt von Pinus sylvestris, L., einem Baume (Monoecia Monadelphia, L.; Coniferae, *J.*) des nördlichen Europa's (*Blackw.* t. 190. *Plenck.* t. 677. *Schk.* t. 330. Fl. méd. V. 272.) und von Pinus maritima, *Lam.*, einem andern Baume aus denselben Gegenden. (*Duham.* t. 28. no. 2. t. 29. no. 4. *Zorn* Ic. pl. t. 526.)

3 *Terebinthina laricea s. larigna s. laricina s. Veneta, Balsamum s. Resina liquida Pini Laricis, Terebinthina s. Balsamum nativum*; Venetianischer Terpentin; Térébenthine de mélèze ou de Venise (*Gal.*); Venice turpentine (*Ang.*); Venedisk terpentin (*D. Suec.*); Trementina de Venecia (*His. I.*); Terpentyna modrzewowa (Pol. *Lus.*).

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. Lus. O. Pol. R. RC. Suec. Wir. WW. *B. C. Fi. G. M. Par. Pid. Sp. T.*

Dieses Harz ist sehr flüssig, durchsichtig, etwas grünlich von Farbe, von starkem, nicht unangenehmem Geruch und brennendem, scharfem und bitterem Geschmack.

Man erhält es durch Anbohren des Stamms von Larix Europaea, *Cand.*, einem Baume (Monoecia Monadelphia, L.; Coniferae, *J.*), welcher auf den Alpen gemein ist. (*Blackw.* Herb. t. 477. *Lamk.* t. 785. *Plenck* t. 681.)

4) *Terebinthina abiegna s. abietina s. Argentoratensis*; Strasburger Terpentin; Térébinthine de sapin ou de Strasbourg (*Gal.*); Strasburgh turpentine (*Ang.*); Trementina de abeto (*His.*); Olio d'Abezzo (*I.*).

An. Gal. GalM. HassP. His. Li. *Be. C. Fi. G. Par. Sp. T.*

Ein sehr flüssiges, durchsichtiges oder et-

was trübes Harz von starkem Geruch und scharfem, sehr bitterem Geschmack.

Man zieht es von Abies pectinata, *Cand.*, einem Baume (Monoecia Monadelphia, L.; Coniferae, *J.*), welcher in der Schweiz wächst. (*Blackw.* t. 203. *Plenck* t. 682. *Lam.* Ill. 785. 1. *Zorn* Ic. pl. t. 528.)

Der Terpentin ist, wie alle Harze, ein kräftiges Reizmittel, dessen Wirkung bei'm innern Gebrauch, in gewisser nach den Individuen verschiedener Gabe, nicht auf die Verdauungsorgane allein sich beschränkt, sondern sich auf eine größere oder geringere Zahl andrer Organe verbreitet, je nachdem sie entweder durch Sympathie mit jenen in Verbindung stehen oder der Terpentin nach der Einsaugung wirkt. Zu diesen secundären Wirkungen gehören die auf die Urinwerkzeuge, aber auch, wie man erst später beobachtet hat, auf die Athemwerkzeuge und das Gefühlsorgan oder die Nerven. Man wendet ihn bei'm Tripper, besonders chronischem, bei weißem Fluß, alten Blasencatarrhen, chronischen Brustcatarrhen und Nervenschmerzen an.

Der Terpentin besteht hauptsächlich aus zwei Substanzen, einem Harze und einem flüchtigen Oele. Die Wirkung ist verschieden, je nachdem beide mit einander vereinigt oder jede einzeln angewendet werden. Vorzüglich kräftig wirkt das Oel, dann der Terpentin, dann der harzige Stoff.

§. I. Präparate, welche den Terpentin in Substanz enthalten.

A. In einer alcoholischen Flüssigkeit aufgelöst.

Tinctura s. Essentia Terebinthinae, Balsamum vulnerarium commune. (Gal. *Vm.*)

℞. Terebinthinae clarae partem unam.
Alcoholis (26°) partes quatuor.
Digere per dies sex, subinde agitando, et cola.

B. Präparate, welche den Terpentin mit einer wässerigen Flüssigkeit vermischt enthalten.

Lac terebinthinaceum, Emulsio terebinthinacea s. cum Terebinthina, Lac diureticum. (B*. *Pie. Sa. Sw. Vm.*)

℞. Terebinthinae Chiae sesquiunciam.
Cum Aqua Vitae bene lotam in mortario marmoreo commisce cum
Vitello Ovi . . . . . no. 1.
addendo sensim
Aquae Parietariae uncias duodecim
ut fiat emulsio. (*Pie.*)

℞. Gummi Arabici drachmas tres.
Aquae . . . quantum sufficit
ut fiat mucilago spissa, quam contere cum
Terebinthinae drachmis duabus
addendo sensim
Aquae puree . . uncias novem.
Syrupi Sacchari . sesquiunciam.
Fiat emulsio. (*Sw**.)

Vm. Gummi drachmam unam, Terebinthinae duas, Aquae uncias octo, Syrupi unam

℞. Therebinthinae Chiae drachmas duas.
Contere cum Vitelli Ovi sufficiente quantitate, addendo
Julapii communis . uncias octo.
Misce bene. (*Sa*)

B*. Terebinthinae semunciam, Vitellos Ovorum duorum, Syrupi Althaeae uncias duas et Aquae vel Vini albi, pro arbitrio, uncias octo.

℞. Terebinthinae . drachmas duas.
Mucilaginis Gummi Arabici semunciam.
Contere, sensim addendo
Mellis albi . . . sesquiunciam.
Aquae Juniperi . uncias novem.
Spiritus Nitri dulcis drachmam unam.
Misce. (*Sw**.)

Ein Reizmittel, welches man bei chronischen Blasen- und Harnröhrenkrankheiten gepriesen hat. — Gabe, täglich zwei bis vier Löffel.

Looch leniens balsamicum s. terebinthinatum. (*Sp.*)

℞. Pulveris Gummi Tragacanthae grana sedecim.
Tisanae communis . semunciam.
Fiat mucilago, cui sub continua agitatione adde
Syrupi Althaeae,
Olei Amygdalarum dulcium, singulorum drachmam unam.
Terebinthinae cum Vitello Ovi tritae scrupulum unum.
Tisanae pectoralis uncias tres cum dimidia.

Potio s. Aqua terebinthinata. (*Sw.*)

℞. Terebinthinae Venetae libras quatuor.
Myrrhae . . . unciam unam.
Tritura, sensim addendo
Aquae . libras viginti quatuor.
Sepone et liquorem decanthatum in lagenis duodecim serva.

In Krankheiten der Urin- und Respirationswege, Hautkrankheiten, beschwerlicher Menstruation, weißem Fluß, Hysterie, in der Eiterungsperiode der Blattern ꝛc. empfohlen. — Man wendet diese Potion ebenso an, wie das Theerwasser. — Bisweilen setzt man mit Vortheil eine Unze kohlensaure Potasche zu.

Mixtura diuretica. (*Bo. Pie.*)
℞. Terebinthinae drachmam unam.
Vitellum Ovi . . . . . no. 1.
Contere et adde sensim
Aquae Petroselini,
— Fragariae,
singularum uncias tres.
Mellis Narbonnensis semunciam.
Syrupi Althaeae unciam unam.
Löffelweiſe täglich vier Mal. — Barthez benutzte dieſe Mixtur häufig.

Mixtura balsamica. (*Bo.*)
℞. Terebinthinae . drachmas duas.
Vitellum Ovi . . . . . no. 1.
Contere et adde
Extracti Rhei,
Salis Prunellae,
singulorum drachmam unam.
Infunde sensim
Infusi Liquiritiae uncias decem.
Syrupi Althaeae unciam unam.
Boerhaave gab dieſe Mixtur bei Gonorrhöe. — Gabe, ein Löffel alle halbe Stunden.

Mixtura terebinthinata. (B*. *Sa.*)
℞. Terebinthinae Argentoratensis drachmas tres.
Contere cum Vitelli Ovi sufficiente quantitate et adde sensim
Infusi spissi Seminum Lini libram unam.
Fiat emulsio. (*Sa.*)
℞. Terebinthinae Venetae semunciam.
Aquae destillatae . uncias octo.
Contere et adde
Tincturae Benzoës drachmas duas.
Misce bene. (B*.)
Detharding empfahl letztere Einſpritzung bei Schwerhörigkeit und Taubheit. Die andere wird bei weißem Fluß gerühmt.

Clyster terebinthinatus, *Enema terebinthinatum.* (B*. GalM. RC. *Sa. Sp. Sw.*)
℞. Terebinthinae Venetae semunciam ad unciam unam.
Tere cum Vitelli Ovi vel Mucilaginis alicujus sufficiente quantitate et adde sensim
Aquae fontanae uncias sex ad octo.
Misce bene. (B*. GalM.)
℞. Terebinthinae Venetae unciam unam.
Contere cum Vitello Ovi unius et adde
Decocti Hordei . . uncias sex.
Misce sedulo. (*Sw.*)
℞. Terebinthinae Venetae quantum vis.
Vitelli Ovorum quantum sufficit.
Decocti Hordei . . uncias sex.
Mellis vel Electuarii lenitivi drachmas sex.
Fiat emulsio. (*Sa.*)
℞. Terebinthinae Venetae semunciam.
Decocti Hordei, vel
Infusi Seminum Lini uncias decem.
Olei Lini . . . unciam unam.
Interdum Tincturae Opii guttae quinquaginta adduntur. (RC.)
℞. Terebinthinae cum Vitello Ovi tritae semunciam.
Decocti emollientis uncias decem.
Olei Seminum Lini unciam unam.
Commisce terendo. (*Sp.*)
℞. Terebinthinae Venetae cum Vitello Ovi tritae drachmam unam ad semunciam.
Decocti emollientis libram unam.
Olei Seminum Lini,
Syrupi Rhamni cathartici, singulorum unciam unam.
Misce bene. (*Sw.*)
Bei Verſtopfung, Nierenentzündung, Iſchurie von Steinen, Nieren- und Blaſenſteinen empfohlen.

Clyster leniens. (*Au. Sm.*)
℞. Terebinthinae drachmam unam.
Vitellum Ovi recentis . . no. 1.
Contere in mortario et adde
Theriacae . drachmas quatuor.
Commisce deinde totum cum
Lactis calidi . unciis quatuor.
Van Swieten wendet dieſes Klyſtir an, um Koliken und Tenesmus, welche mit den Diarrhöen Schwindſüchtiger verbunden ſind, zu beruhigen. Auch hat man es mit Erfolg bei ſogenannten Darmſchwindſuchten, d. h. ſolchen, welche die Folge hitziger oder chroniſcher Darmentzündung ſind, angewendet. (*Sm.*)
Au. Lactis uncias octo, Terebinthinae cum Vitello Ovi tritae semunciam, Theriacae tantidem et Mellis rosati unciam unam.

Fi. Clyster balsamicus cum Opio s. Enema terebinthinatum cum Opio: Opii puri granum unum, Terebinthinae semunciam, Lactis uncias sex, Vitellum Ovi unius, vel Gummi Arabici eandem quantitatem quam terebinthinae.

Clyster adstringens. (*Sm.*)
℞. Terebinthinae communis drachmas quatuor.
Olei Lini . . . . uncias duas.
Vitelli Ovi recentis drachmas duas.
Tere in mortario, sensim addendo
Aquae Calcis . . . uncias sex.
Von Wintringham in denſelben Fällen verordnet, wie das vorige.

Clyster balsamicus adstringens. (*Bo. Pie.*)
℞. Florum Chamomillae manipulos duos.

Lactis . . . quantum sufficit.
Coque ad unciarum octo remanentiam et adde
Terebinthinae cum Vitello Ovi tritae drachmas tres.
Mellis rosati . . unciam unam.
Misce bene. (*Bo.*)

℞. Croci,
Hyperici,
singulorum pugillum unum.
Lactis . . . quantum sufficit.
Coque simul et colaturae adde
Terebinthinae cum Vitello Ovorum duorum trituratae semunciam.
Theriacae . . drachmas duas.
Misce. (*Bo. Pie.*)

Dieses Klystir kann in denselben Fällen nützlich seyn, wie die vorhergehenden.

Injectio terebinthinacea. (*Au.*)

℞. Terebinthinae . . uncias duas.
Vitelli Ovi . . . unciam unam.
Mellis . . . . . uncias duas.
Alcoholis . . . . semunciam.
Aquae . . . . uncias novem.
Misce.

℞. Saponis medicinalis unciam unam.
Terebinthinae . . . semunciam.
Aquae . . . . . uncias octo.
Tincturae Benzoës drachmas tres.
Misce sedulo.

C. Präparate, welche den Terpentin mit fetten Körpern vermischt enthalten.

Mixtura adstringens. (B°.)

℞. Terebinthinae Venetae,
Balsami Copaivae,
Olei Succini rectificati,
singulorum partes aequales.

Bei Blennorrhöe und Pollutionen empfohlen. — Gabe, dreißig bis sechszig Tropfen, täglich drei Mal, mit einem Kaffeelöffel Zucker, indem man zugleich ein halbes Glas guten Wein trinkt.

Conditum nephreticum, *Marmelada antinephritica.* (*Sw°.*)

℞. Terebinthinae scrupulos quatuor.
Olei Amygdalarum dulcium uncias duas.
Contere et adde
Roob Juniperi absque saccharo uncias quatuor.
Oculorum Cancri porphyrisatorum semunciam.

Bei chronischer Nierenentzündung von Ruzen. — Gabe, zwei Drachmen mehrmals täglich.

Unguentum terebinthinatum. (A.)

℞. Unguenti simplicis uncias novem.
Terebinthinae . . libras duas.
Liqua blando igne et agita ad refrigerationem usque.

Sparadrap commune. (A. GalM. Pal. *T. Vm.*)

℞. Terebinthinae . partem unam.
Olei Olivarum . partes quatuor.
Cerae flavae . . . partes octo.
Liqua simul in balneo aquae et supra fascias linteas extende. (GalM.)

Vm. Terebinthinae partem unam, Sebi vervecini unam cum dimidia et Cerae albae quatuor; — A. Cerae flavae uncias sex, Sebi vervecini duas, Axungiae unam cum dimidia et Terebinthinae tantidem; — Pal. Cerae albae semilibram, Sebi cervini uncias quatuor, Terebinthinae sesquiunciam et Olei Rosarum quantum sufficit; — *T.* Olei Amygdalarum dulcium unciam unam, Cerae albae duas, Terebinthinae Venetae drachmas duas.

Unguentum lenitivum s. emolliens. (Gen. *Sw.*)

℞. Mucilaginis alicujus libram unam.
Butyri recentis . . . libras duas.
Cerae flavae . . . semilibram.
Coque blando igne ad humidi consumptionem usque et adde
Terebinthinae Venetae unciam unam.

Adduntur interdum librae cuique hujus unguenti Essentiae Terebinthinae unciae tres et Opii drachma una. — Bei Milchknoten, Nierenschmerzen, Ischurie und Gelenksteifigkeit empfohlen.

Gen. Olei Olivarum libras tres cum dimidia, Cerae flavae 1 bram unam, Colophonii semilibram et Terebinthinae uncias tres.

Diese Salbe hat große Aehnlichkeit mit einigen der für die Bereitung des unguentum althaeae oder mucilaginis angeführten Formeln.

Charta ad cauterium. (*Ca.*)

℞. Terebinthinae purae,
Cerae albae,
singularum sesquiunciam.
Cetacei . . . drachmam unam.
Liqua in balneo aquae, tunc supra chartam bene laevigatam extende.

Pisa pro fonticulis. (B°.)

℞. Terebinthinae Venetae quantum vis.
Cerae flavae . . sesquiunciam.
Pulveris Radicis Curcumae unciam unam.
— — Iridis semunciam.

Unguentum depilatorium. (*Sw.*)

℞. Terebinthinae Venetae drachmas decem.
Resinae Pini . . unciam unam.

Liqua et in Aqua frigida serva. — Man nimmt davon etwas zwischen die befeuchteten Finger, faßt die Haare und reißt sie in einem raschen Zuge aus.

Emplastrum Gratia Dei. (*Vm.*)

℞. Cerae flavae,
Resinae Pini,
singularum partes novem.
Liqua simul et adde
Terebinthinae . partes quinque,
tunc momento, quo massa concrescere coepit
Pulveris Olibani . . partes tres.

Unguentum terebinthinatum s. Balsami et Olei Laricis, Balsamum Frahmii, Linimentum digestivum. (B*. Ba. *Sw. Vm.*)

℞. Cerae flavae . . partem unam
Liqua blando igne et adde, mixta seorsim
Terebinthinae Venetae,
Essentiae Terebinthinae,
singularum partem unam.
Misce bene. (B*. Ba. *Vm.*)

Sw. Essentiae partem unam, Terebinthinae et Cerae, singularum quatuor.

Bei alten Fußgeschwüren viel gerühmt.

Linimentum antihaemorrhoidale. (*Ca.*)

℞. Terebinthinae Venetae,
Mellis Narbonnensis,
Olei Olivarum,
singulorum unciam unam.
Misce triturando.

Digestivum liquefactum. (*Sp.*)

℞. Terebinthinae claree uncias duas.
Vitelli Ovi . . unciam unam.
Tere, sensim addendo
Mellis . . . . . uncias duas.
Aquae fontanae uncias quatuor.
Alcoholis . . . . . uncias sex.

Von Pleuck in Einspritzungen bei Fisteln angewendet.

Unguentum s. Pomatum leniens et balsamicum. (*Sm.*)

℞. Aquae Vitae,
Amyli triticei,
Sacchari albi,
Albuminis Ovi recentis,
Terebinthinae,
Olei Olivarum,
Mellis albi,
singulorum unciam unam.
Melli et terebinthinae mixtis adde deinde sensim, continue agitando, reliquas substantias.

Bei Geschwüren, Excoriationen und Wunden, welche heftige Schmerzen verursachen, empfohlen.

Balsamum Arcaei, Unguentum Amyridis elemiferae s. Arcaei s. balsamicum s. digerens balsamicum s. basilicum s. digestivum flavum s. Elemi s. Elemi compositum s. Elemi et Terebinthinae s. Resinae flavae s. Resinae Elemi s. Sebi Arcaei s. de Terebinthina et Adipibus. (Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. Du. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Pal. Pol. R. Sar. Sax. Wir. *Br. Ca. Fi. Pid. Sp. Sw. T. Vm.*)

℞. Terebinthinae . uncias sedecim.
Elemi . . . . . libras duas.
Resinae Pini
libras duas cum dimidia.
Olei Olivarum . . sesquilibram.
Cerae flavae . uncias quatuor.
Liqua simul. (Fer.)

℞. Terebinthinae Venetae,
Elemi,
Sevi cervini,
singulorum uncias duas.
Olei Hyperici . unciam unam.
Ligni Santali rubri
drachmam unam.
Liqua igne lenissimo elemi in terebinthina, adde sensim sevum et oleum simul liquata et admisce lignum pulveratum. (Sar. Wir.)

℞. Terebinthinae,
Elemi, singulorum partes sex.
Liquefac blando igne, saepius agitando; remove ab igne et adde sensim
Sebi cervini ad ignem liquati
partes sex.
Olei Hyperici . . partes duas.
Per pannum laneum (Flanell) transmissa in mortario ad perfectam refrigerationem usque tere. (Li.)

A. Ams. An. Ba. Bel. Bor. Bor4. HassP. O. Pol. et Sax. Terebinthinae, Elemi, Axungiae et Sebi vervecini, singulorum partes aequales; — Lus. et *C.* Terebinthinae uncias decem, Elemi libram unam, Olei uncias duas et Sebi libras duas; — Gal. GalM. *Fi.* et *T.* Terebinthinae, Elemi, singulorum partes tres, Axungiae duas et Sebi quatuor; — His. Terebinthinae, Elemi, Axungiae, singulorum quinque et Sebi sex; — R. Terebinthinae, Elemi, singulorum sex, Axungiae octo et Sebi quatuor; — Terebinthinae, Elemi, singulorum unam cum dimidia, Axungiae unam et duas Sebi; — Ful. Hass et *Pid.* Terebinthinae, Elemi, Sebi cervini, singulorum tres et Olei Hyperici duas; — *Sp.* Terebinthinae, Elemi, singulorum sex, Sebi cervini novem et duas Olei Hyperici; — Br. et Pal. Terebinthinae, Elemi, singulorum sex, Sebi hircini duas et Olei Hyperici, singulorum unam.

℞. Terebinthinae,

Elemi, singulorum partes sex.
Sebi vervecini . . partes decem.
Liqua simul. (Lon. *Br.*)

An. Terebinthinae, Elemi, singulorum partem unam et Sebi vervecini duas; — Gen. Terebinthinae quatuordecim, Elemi duodecim et Sebi vervecini viginti quatuor; — LonN. Terebinthinae vulgaris, Elemi, singulorum uncias decem, Sebi libras duas, Olei Olivarum uncias duas.

℞. Terebinthinae Venetae uncias sex.
Olei Olivarum . . drachmas sex.
Adde mixturae liquatae ex
Elemi,
Sebi vervecini, singulorum unciis sex
Cerae flavae . . drachmis sex.
Misce bene. (Du.)

Reizend, in der chirurgischen Praxis sehr in Gebrauch und eine der bessern Salben. — Die zweite Formel ist die des Erfinders.

Balsamum vulnerarium. (B*. Wir.)

℞. Terebinthinae Venetae
sesquiunciam.
Elemi . . . . . semunciam.
Mixturae liquatae adde
Olei Hyperici . . sesquiunciam.
— Cerae . . scrupulos duos.
Misce. (Wir.)

℞. Terebinthinae Venetae,
Elemi, singulorum sesquiunciam.
Sebi hircini . . . uncias duas.
Balsami Tolutani unciam unam.
Fiat unguentum. (B*.)

Gebrauch, wie bei der vorhergehenden Salbe und kaum davon in der Wirkung verschieden.

Unguentum Terebinthinae camphoratum. (GalM.)

℞. Balsami Arcaei
partes centum quinquaginta.
Camphorae . . partem unam.
Contere sedulo.

Balsamum Arcaei liquidum, Digestivum Plenckii. (*Ca. Sp. Vm.*)

℞. Balsami Arcaei,
Vitelli Ovi,
singulorum unciam unam.
Tritura bene et adde
Aquae Vitae . . . uncias octo.
Misce et serva. (*Sp.*)

℞. Terebinthinae clarae,
Mellis communis,
singulorum uncias duas.
Vitelli Ovi . . unciam unam.
Alcoholis . . . . uncias sex.
Aquae . . . . uncias quatuor.
Misce triturando. (*Ca.*)

℞. Balsami Arcaei . . partes duas.
Petrolei rectificati partem unam.
Contere. (*Vm.*)

Zeitigend. — Man kann diesen Balsam in Einspritzungen anwenden.

Unguentum digestivum s. digestivum simplex s. luteum, Unguentum Terebinthinae s. de Terebinthina s. de Terebinthina et Ovorum Vitellis, Balsamum terebinthinatum. (BorC. D. Ful. Gal. Hass. HassP. Li. R. WW. *Br. Fi. Pid. Ra. T.*)

℞. Terebinthinae Venetae
libram unam.
Vitellos Ovorum . . . no. 80.
Misce. (R.)

℞. Terebinthinae Venetae libram unam.
Vitellos Ovorum . . . no. 12.
Misce bene et adde
Mellis rosati . . . semilibram.
Serva. (WW.)

℞. Terebinthinae . . semilibram.
Vitellos Ovorum . . . no. 14.
Tritura et adde
Olei Hyperici . . sesquiunciam.
Misce bene. (Hass. *Pid.*)

HassP. Terebinthinae Venetae semilibram, Vitellos Ovorum duorum, Olei Hyperici cocti uncias duas; — Gal. Terebinthinae partes duas, Vitelli Ovi unam et Olei Hyperici infusi quantum sufficit ut unguentum diffluens obtineatur; — Li. Terebinthinae libram unam, Vitellos Ovorum no. 8 et Olei Olivarum uncias tres; — *T* Terebinthinae uncias quatuor, Vitellos no. 4, Olei Hyperici quantum sufficit.

℞. Terebinthinae Venetae,
Olei Olivarum,
singulorum libram unam.
Cerae albae . . semilibram.
Liqua et ad perfectam refrigerationem usque agita. (*Br.*)

Fi. Olei, Terebinthinae, singulorum libras duas cum dimidia, Cerae albae, libram unam et uncias octo; — BorC. Cerae partes duas, Terebinthinae tantidem et Axungiae Porci sex.

℞. Terebinthinae Venetae
drachmas duas.
Cerae flavae . sesquidrachmam.
Liqua blando calore et adde
Essentiae Terebinthinae
drachmas duas.
Misce bene. (D.)

℞. Terebinthinae Venetae semunciam.
Mellis rosati . . unciam unam.
Olei Hyperici . drachmas tres.
Vitellum Ovi . . . . . no. 1.
Misce bene. (Ful.)

℞. Balsami Arcaei . unciam unam.
Cerati . . . . . uncias duas.
Vitellum Ovi . . . . . no. 1.
Misce. (*Ra.*)

Reizend, zum Verbinden der Wunden und Geschwüre, zur Belebung der Vitalität der Oberfläche.

Unguentum digestivum aloëticum s. myrrhatum s. digestivum animatum s.

digestivum compositum. (Bor. Bor4. Br. Pul. Han. Li. O. Pal. Pol. Sax. Suec. Wir. *Pid. Ra. Sp Sw. Vm.*)

1) Mit Aloë.

℞. Aloës . . . . . partem unam.
Mellis rosati . . partes quatuor.
Contere et adde
Terebinthinae clarae (Venetae) partes duodecim.
Olei Hyperici . . . partes tres.
Misce bene. (Bor. Han. *Vm.*)

Bor4. eandem formulam sed loco olei hyperici Oleum Olivarum.

℞. Terebinthinae Venetae semilibram.
Mellis crudi . . uncias quatuor.
Tincturae Aloës . . uncias tres.
Vitellos Ovorum . . . no. 4.
Misce exacte. (Pol.)

℞. Terebinthinae . . uncias duas.
Olei Hyperici . . semunciam.
Misce et tunc cum
Vitello Ovi . . . . . no. 1
in emulsionem redige, cui sensim adde
Tincturae Aloës,
— Myrrhae,
singularum sesquidrachmam.
Misce bene. (*Vm.*)

2) Ohne Aloë.

℞. Terebinthinae Venetae semilibram.
Vitellos Ovorum . . . no. 4.
Tritura simul et adde
Pulveris Myrrhae drachmas sex.
Olei Olivarum . sesquiunciam.
Misce bene. (Suec.)

℞. Terebinthinae Venetae uncias novem.
Olei Myrrhae . . sesquiunciam.
Adde
Vitellos Ovorum . . . no. 2.
Misce sedulo. (*Sw.*)

℞. Terebinthinae Argentoratensis uncias octo.
Vitellos Ovorum . . . no. 4.
Tritura simul et adde
Olei Hyperici . . sesquiunciam.
Pulveris Olibani,
— Myrrhae,
singularum drachmas tres.
Misce bene (Br. Wir. *Pid. Sp.*)

Pal. Terebinthinae libram unam, Vitellos Ovorum no. 3, Olei Hyperici uncias tres et Pulverum amborum, singulorum semunciam; — Sax. Terebinthinae partes quatuor, Vitelli Ovi sufficientem quantitatem, Olei Hyperici partem unam et Pulverum amborum, singulorum partis octantem; — *T.* Unguento digestivo simplici Myrrham, Olibanum et Mastichem, singulorum scrupulos quatuor addere jubet.

℞. Terebinthinae . . semilibram.
Vitellos Ovorum . . . no. 4.
Tere exacte et adde
Olei Hyperici . . sesquiunciam.
Pulveris Myrrhae,
— Olibani,
singulorum drachmas tres.
Croci in Alcohole macerati quantum sufficit
ut massa colorem flavescentem praebeat. (O.)

℞. Balsami Arcaei . . uncias duas.
Vitellos Ovorum . . . no. 2.
Olei Olivarum . . uncias duas.
Commisce bene. (*Ra.*)

℞. Balsami Arcaei,
Unguenti Styracis,
singulorum drachmas duas.
Vitellos Ovorum . . . no. 2.
Essentiae Terebinthinae unciam unam.
Misce sedulo. (*Ra.*)

Ful. Unguento digestivo simplici Myrrhae et Olibani, singulorum drachmas duas addere jubet; — Li. Unguenti simplicis drachmae cuique Myrrhae et Olibani, singulorum grana quatuor addit. — Vis detersiva unguenti augetur, addendo Unguentum aegyptiacum (Gal.) vel Aeruginem (*Sw.*)

Unguentum digestivum opiaceum. (*Ra.*)

℞. Unguenti digestivi simplicis uncias quatuor.
Laudani liquidi Sydenhami unciam unam.
Commisce bene. — Loco laudani Opii pulverati drachmae duae addi possunt.

Balsamum Locatelli s. Italicum s. Italicum rubrum. (Ams. B*. Br. Ful. GalH. Gen. Li. Pal. Sar. Sax. Wir. *Fi Sp. T. Vm.*)

℞. Olei Olivarum . libram unam.
Terebinthinae,
Cerae flavae,
singularum semilibram.
Ligni Santali rubri unciam unam.
Liqua ceram in olei pauxillo, adde reliquum olei et terebinthinam, tunc lignum pulveratum et agita ad refrigerationem perfectam usque. (Gen.)

℞. Terebinthinae . partes quatuor.
Ligni Santali rubri partem unam.
Digere per horam unam super cinere calido in vase tecto; tunc liqua seorsim
Cerae flavae . . . partes sex.
Adde
Olei Olivarum partes duodecim
tunc lignum et resinam. Prope ignem relinque iterum per horae quadrantem, cola fortiter exprimendo et momento quo massa refrigescere coepit, adde
Balsami Peruviani partem unam.
Agita, donec balsamum concreverit. (*Vm.*)

℞. Cerae flavae . . uncias quatuor.
Olei Olivarum . . . uncias sex.
Liqua blando igne et adde
Terebinthinae Venetae uncias sex.
Ligni Santali rubri . semunciam.
Cola et adde
Balsami Peruviani drachmas duas.
Serva. (B.)

Ams. Cerae uncias quatuor, Olei et Terebinthinae, singulorum sex, Ligni et Balsami, singulorum unam; — Pal. Cerae uncias sex, Olei novem, Terebinthinae quinque, Ligni quantum sufficit et Balsami drachmas sex.

℞. Olei Olivarum . . uncias sex.
Cerae flavae . . uncias quatuor.
Vini Maderani . uncias quinque.
Coque blando igne ad consumptionem humidi usque et adde
Terebinthinae Venetae uncias sex.
Balsami Peruviani drachmas duas.
Ligni Santali rubri . semunciam.
Serva. (Wir. *Sp. T.*)

GalH. *Fi.* Cerae uncias sex, Olei novem, Vini Hispanici duas, Terebinthinae novem, Ligni Santali rubri unam et Balsami Peruviani (drachmam?) unam cum dimidia.

℞. Olei Olivarum . . libras duas.
Vini Maderani . libram unam.
Terebinthinae Venetae uncias octo.
Coque blandissimo igne ad humidi consumptionem usque et adde
Balsami Peruviani,
Sanguinis Draconis,
Storacis Calamita,
singulorum unciam unam.
Agita ad perfectam refrigerationem usque. (Sar.)

℞. Cerae flavae . . partem unam.
Olei Olivarum
partem unam cum dimidia.
Mixturae liquatae adde
Terebinthinae Venetae
partem unam cum dimidia.
Adde ab igne removendo
Balsami Peruviani nigri
partis sedecimum.
Kino . . . partis duodecimum.
Serva. (Br. Sax.)

℞. Olei Olivarum . uncias quatuor.
Cerae flavae . . sesquiunciam.
Liqua lente et adde
Terebinthinae . . . . uncias tres.
Ab igne remove et adde, continue agitando,
Balsami Copaivae . semunciam.
Kino . . . . . drachmas tres.
Serva. (Ful. Li.)

Aeußerlich als balsamisches, austrocknendes und Wundmittel. Heutzutage braucht man es nur noch wenig.

Balsamum Genovevae, Unguentum Terebinthinae camphoratum. (Gal. *Ca. Fi. Vm.*)

℞. Vini rubri,
Olei Olivarum,
singulorum libras tres.
Cerae flavae,
Aquae Rosarum,
singularum semilibram.
Ligni Santali rubri uncias duas.
Coque per horam dimidiam, spathulae ligneae ope agitando et adde
Terebinthinae Venetae libram unam.
Commisce exacte et massae paullulum refrigeratae adde
Camphorae pulveratae uncias duas.
Cola et post aliquot horas sepositionis exprime. (*Ca.*)

℞. Cerae flavae . . . semilibram.
Olei Olivarum . . libram unam.
Liqua et mixturam per horam unam prope ignem relinque cum
Ligni Santali rubri unciis duabus.
Adde deinde
Terebinthinae . . libram unam.
Cola fortiter exprimendo et massae fere refrigeratae adde
Camphorae pulveratae
drachmas duas.
Agita ad perfectam refrigerationem usque. (*Vm.*)

℞. Olei Olivarum . partes trecentas octoginta quatuor.
Cerae flavae
partes sexaginta quatuor.
Ligni Santali rubri
partes quatuordecim.
Terebinthinae
partes centum viginti octo.
In digestione relinque leni calore et paullo antequam refrixerint, adde
Camphorae . . . partes duas.
Misce bene. (Gal.)

Fi. Olei libras quatuor, Cerae uncias octo, Santali duas, Terebinthinae sedecim, Camphorae drachmas duas.

Man empfahl diese Salbe ehedem bei gerissenen Wunden, Geschwüren und selbst Brand.

Balsamum Chironis. (GalH.)

℞. Olei Olivarum . . uncias sex.
Terebinthinae . . uncias duas.
Cerae flavae . . unciam unam.
Radicis Alcannae quantum sufficit.
Calefac, tunc succedentim adde
Balsami Peruviani nigri
sesquidrachmam.
Camphorae pulveratae
grana duodecim.

Ist wenig von dem vorigen verschieden und heutzutage eben so vergessen.

Balsamum pectorale. (*Sp.*)

℞. Terebinthinae

Olei Amygdalarum dulcium, singulorum drachmas octodecim.
— Hyperici . . uncias duas.
Cetacei . . . . . semunciam.
Sanguinis Draconis,
Extracti Opii aquosi,
Balsami Peruviani,
singulorum drachmas duas.
Butyri . . . . . sesquiunciam.
Misce sedulo.

Meibom ließ bei drohender Lungenschwindsucht zehen bis funfzehen Tropfen täglich nehmen; ob er das Uebel verhüthet hat?

Sparadrap de Emplastris. (Gal.)

℞. Emplastri communis,
— Diachyli gummosi,
— Cerae flavae,
singulorum partes quindecim.
Liquata simul in balneo aquae supra fascias e tela textas extende.

Emplastrum ad s. contra apoplexiam. (Wir. *Sp.*)

℞. Terebinthinae Venetae drachmas tres.
Galbani,
Opopanacis,
singulorum drachmas duas.
Radicis Pyrethri,
Piperis longi,
Castorei,
singulorum drachmam unam.
Olei Succini . scrupulum unum.
Fiat emplastrum. (Wir.)

℞. Olei Juglandis uncias duodecim.
Terebinthinae,
Resinae Pini,
singularum uncias quatuor.
Colophonii . . uncias duodecim.
Cerae flavae
uncias sexaginta quatuor.
Liquatis simul adde
Pulveris Succini,
— Tacamahacae,
— Gummi Carannae,
— Sandaracae,
singulorum sesquiunciam.
— Olibani,
— Mastichis,
— Storacis,
— Benzoës,
singulorum unciam unam.
— Radicis Cyperi rotundi,
— — Pyrethri,
— — Angelicae,
— — Iridis Florentinae,
singulorum semunciam.
Misce bene et massae semirefrigeratae adde
Axungiae Castoris,
Camphorae,
singulorum drachmas duas.
Olei essentialis Macidis,
— — Majoranae,
— — Caryophyllorum,
— — Ligni Rhodii,
— — Lavandulae, singulorum scrupulos duos.
— — Salviae,
— — Rorismarini,
— — Chamomillae,
— — Succini,
singulorum guttas duodecim.
Misce sedulo. (*Sp.*) — Ehedem wandte man dieses Pflaster bei Schlagfluß und Lähmung auf den abgeschornen Kopf an.

Balsamum viride. (Pal.)

℞. Herbae Lavandulae cum floribus,
— Salviae,
— Hyssopi,
— Majoranae,
— Thymi,
— Carvi cum semine,
— Menthae aquaticae,
— — crispae,
— Plantaginis,
— Rorismarini,
— Leontopodii,
— Virgaureae,
Florum Chamomillae,
— Rosarum rubrarum,
singulorum semunciam.
Olei Olivarum,
— Rosarum,
singulorum libras duas.
— Lini . . . libram unam.
Infunde seorsim et adde deinde
Terebinthinae,
Sagapeni, singulorum libram unam.
Olibani . . . . . semilibram.
Digere in balneo aquae, cola fortiter exprimendo et massae semirefrigeratae adde
Olei Lavandulae,
Essentiae Terebinthinae,
Petrolei,
singulorum uncias quatuor.
Post aliquot dies decantha. — Ehedem innerlich und äußerlich als reizendes, reinigendes und zusammenklebendes Mittel.

D. Präparate, welche den Terpentin mit trocknen Substanzen gemischt enthalten.

Pilulae cum Terebinthina s. diureticae s. balsamicae aperientes. (DD. Gen. *Ca. E. Pie. Sm. Sw.*)

℞. Guajaci . . . drachmam unam.
Terebinthinae . quantum sufficit ut fiant pilulae quindecim. — Gabe, ein Stück täglich drei Mal. (*E.*)

℞. Terebinthinae . semidrachmam.

Balsami Tolutani scrupulos duos.
Oculorum Cancri quantum sufficit.
Fiant pilulae trium granorum. (Gen.)

℞. Terebinthinae communis,
Rhei pulverati,
singulorum drachmas duas.
Fiant pilulae granorum duorum. (DD.)

Gabe, fünf Stück auf einmal.

℞. Gummi Arabici . . semunciam.
Aquae . . . . quantum sufficit ut fiat mucilago, cui adde
Terebinthinae . . drachmas sex ut fiat emulsio spissa; adde
Pulveris aperientis quantum sufficit ut fiant pilulae quinque granorum. (*Sw*.)

Gabe, drei Stück täglich vier Mal. — Man kann nöthigenfalls statt des Terpentins Copaivabalsam nehmen.

℞. Terebinthinae . drachmas duas.
Liquiritiae pulveratae
quantum sufficit.
Fiant pilulae granorum quatuor. (*Ca. Sm.*)

Diese verschiedenen Pillenmassen, von denen die dritte von de Haen ist, sind vorzüglich als harntreibend gepriesen worden.

Boli antigonorrhoici. (*Pie. Sm.*)

℞. Terebinthinae Venetae
scrupulum unum ad duos.
Contere cum Vitello Ovi unius et adde
Pulveris Liquiritiae quantum sufficit ut fiant boli quatuor. — Gabe, ein Stück alle sechs Stunden. — Diese Bissen unterscheiden sich von den vorhergehenden Pillen nach de Haen's Formel nicht. — Sie sind von Astruc.

Pilulae adstringentes. (*Sm.*)

℞. Terebinthinae Venetae uncias duas.
Extracti Rhei . . drachmas tres.
Camphorae . . drachmas duas.
Fiant pilulae quatuor granorum. — Gegen Leukorrhöe und Blennorrhöe. — Gabe, neun Stück täglich auf drei Mal.

Pilulae traumaticae. (Ful.)

℞. Terebinthinae Venetae,
Succi Liquiritiae,
Extracti Millefolii,
singulorum drachmam unam.
Pulveris Mastichis,
— Olibani,
singulorum semidrachmam.
Fiat massa pilularis. — Gabe, zehen bis zwanzig Gran.

Pilulae balsamicae. (*Ca.*)

℞. Terebinthinae Chiae,
Cetacei, singulorum semunciam.
Myrrhae . . . drachmas duas.
Olibani pulverati quantum sufficit.
Fiant pilulae trium granorum. — Gabe, ein Stück alle drei Stunden bei Lungenschwindsucht.

Pilulae balsamicae terebinthinatae. (*Fi.*)

℞. Terebinthinae coctae unciam unam.
Olibani,
Mastichis,
singulorum drachmas duas.
Cum terebinthina liquata reliqua commisce ut fiant pilulae granorum sex, quae pulvere Liquiritiae conspergantur. — Gabe, ein Scrupel bis Drachme.

Pilulae resolventes. (*Pie. Sm.*)

℞. Terebinthinae . . guttas viginti.
Extracti Liquiritiae drachmas duas.
Saponis albi . drachmas quatuor.
Syrupi quinque Radicum
quantum sufficit.
Fiant pilulae granorum quatuor. (*Pie. Sm.*) — Gabe, drei Stück auf einmal, täglich drei Mal, bei Gallensteinen.

℞. Terebinthinae . scrupulos duos.
Extracti Rhei . drachmam unam.
— Taraxaci
drachmas quatuor.
Saponis albi . . drachmas duas.
Syrupi Quinque Radicum
quantum sufficit.
Fiant pilulae granorum quatuor. (*Sm.*) — Gabe, wie bei der vorigen Formel, in Unterleibsstockungen

Beide Formeln sind von Tronchin.

Pilulae contra s. ad taeniam. (*Au.*)

℞. Terebinthinae Venetae
drachmam unam.
Saponis jalapini . semidrachmam.
Extracti Hyoscyami grana quatuor.
Mercurii dulcis . . grana octo.
Fiant pilulae granorum duodecim. — Hufeland ließ davon alle drei Stunden vier Stück nehmen und zwei oder drei Tage damit fortfahren.

Trochisci Cypheos, Cyphoides Galli. (Pal. *Sp.*)

℞. Terebinthinae Chiae drachmas sex.
Pulpae Uvarum
uncias duas cum dimidia.
Bdellii . . . . . semunciam.
Myrrhae,
Ligni Aloës,
Croci,
Cinnamomi,
Nardi Indicae,
Cassiae lignеae,
singulorum drachmam unam.
Schoenanthi . . drachmas tres.
Calami aromatici drachmas duas.
Mellis . . . . uncias quinque.
Vini Graeci . quantum sufficit.

Misce sedulo. (*Sp.*)
℞. Uvarum Passarum,
Terebinthinae coctae,
singularum uncias tres.
Schoenanthi,
Myrrhae, singulorum sesquiunciam.
Calami aromatici drachmas novem.
Cinnamomi drachmas quatuor.
Bdellii,
Nardi Indicae,
Gassiae ligneae,
Cyperi rotundi,
Baccarum Juniperi,
singulorum drachmas tres.
Asphalti
drachmas duas cum dimidia.
Croci . . . . drachmam unam.
Mellis,
Vini Cretici,
singulorum quantum sufficit.

Dissolve bdellium, myrrham et terebinthinam in vino, redige liquorem ad mellis consistentiam, commisce residuum et mel cum uvis diu simul trituratis et adde reliquas substantias subtilissime pulveratas, trochiscos in loco umbroso sicca. (Pal.) — Diese Trochisken kommen mit zum Mithridat.

§. II. Präparate, welche ausschließlich oder doch vorzüglich Terpentinöl enthalten.

Aethereoleum s. Spiritus s. Alcohol s. Oleum Terebinthinae, Oleum volatile s. aethereum Pini s. Laricis, Spiritus Olei Terebinthinae aethereus, Essentia Terebinthinae, Oleum essentiale s. Epyretum Terebinthinae.

1) Wie man es im Handel findet.

Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. GalM. HassP. Li. Lon. LonN. R. RC. Suec. *C. G. M. Par. Sp.*

Eine farblose Flüssigkeit von unangenehmem, sehr starkem Geruch und scharfem, brennendem Geschmack. Specif. Gewicht 0,870.

Man erhält von Pinus Mughus ein ähnliches Product, aber grünlich von Farbe und angenehmem Geruch, das Oleum templinum.

Rectificatur s. depuratur Oleum venale destillationis cum Aqua ope ab An. Ba. Fenn. et *Br.* Olei partem unam et duas Aquae; — HassP. Olei unam et Aquae tres; — Du. Ed. Lon. LonN. et *C.* Olei unam et quatuor Aquae; — *Fi.* Olei unam, Aquae sex; — Bor4. Olei unam, Aquae octo; destillent ad tertiae olei partis remanentiam.

Van Mons bemerkt, daß bei einer öfters wiederholten Rectification ein Theil des Oels zersetzt wird, daß sich Essigsäure erzeugt, mehr oder weniger Rückstand bleibt und daß das Oel immer weniger in Alcohol auflöslich wird.

2) Durch den Apotheker bereitet:

A. An. Bor. Br. Du. Fer. Ful. Gen. Han. Hass. His. Li. Lus. O. Pal. Pol. R. Sar. Sax. Suec. Wir. Würt. *C. Fi. Pid. Sw. Vm.*

℞. Terebinthinae Venetae,
Aquae communis,
singularum pondus aequale.

Immitte in cucurbitam vitream supra arenae balneum; luto affixâ galeâ destillent et oleum ab aqua separetur. (*Vm.*)

A. Bor. Han. O. Pol. R. et *Sw.* Aquae et Terebinthinae quantitatem relativam non indicant; — Am. et *C.* Terebinthinae partes quinque et quatuor Aquae; — Hass. Suec. Wür. et *Pid.* Terebinthinae unam et tres Aquae; — Ful. Li. Pal. Sax. et Wir. Terebinthinae unam et quatuor Aquae; — Br. Gen. Sar. et *Fi.* Terebinthinae unam et Aquae sex; — Lus. Terebinthinae quinque et Aquae sex; — His. Terebinthinae unam et Aquae quadraginta.

Implendo per duas partes retortam vitream lutatam cum Terebinthina liquefacta et ignis reverberarii ope destillando, primo prodibit phlegma acidum (*Acetum* vel *Spiritus Terebinthinae*), tunc *Oleum volatile*, nova destillatione depurandum et in fine *Oleum densum empyreumaticum.* (*Fi.*)

Das Terpentinöl ist reizender als der Terpentin selbst, und wird unter denselben Umständen empfohlen und angewendet.

A. Präparate, welche das Terpentinöl in Aether aufgelöst enthalten.

Aether terebinthinatus. (*Ca. Sw*. Vm.*)

℞. Acidi sulphurici,
Alcoholis rectificati,
singulorum partes aequales.

Misce sensim et aetherem destillando separa; infunde ei
Essentiae Terebinthinae
quantum sufficit
ad saturandum; agita bene, per unum diem sepone et destillationi subjice. (*Vm.*)

℞. Alcoholis . . . . libras duas.
Essentiae Terebinthinae
semilibram.

Misce et adde sensim
Acidi nitrici concentrati
libras duas,

Destillet blando calore dimidia pars. (*Ca. Sw**.)

Sowohl äußerlich als innerlich bei Gallensteinen, Gelbsucht, Leberverstopfungen, Rheumatismen. — Gabe, zwanzig bis vierzig Tropfen, oder in einem mit Zucker versetzten Eigelb.

Linimentum Terebinthinae aethereum. (*Vm.*)

℞. Essentiae Terebinthinae quantum vis.
Spiritus Nitri dulcis quantum sufficit
ad oleum agitationis ope solvendum.

Gebrauch, wie beim vorigen.

Mixtura resolvens. (B*. DD. *Au. Ca. Pie.*)

℞. Essentiae Terebinthinae partem unam.
Aetheris sulphurici partes tres.
Dissolve. (B*. *Au.*)

DD. et *Ca.* Essentiae partem unam et duas Aetheris; — *Pie.* Essentiae duas et Aetheris tres; — *Ca.* praeterea Essentiae unam et Aetheris quatuordecim.

Von Durande gegen Gallensteine empfohlen. — Gabe, von zwei Scrupel bis eine Drachme täglich, in Molken oder Fleischbrühe.

Mixtura diuretica. (*Ca.*)

℞. Essentiae Terebinthinae unciam unam.
Alcoholis Cochleariae semunciam.
Acidi hydrochlorici,
— nitrici alcoholisati,
singulorum drachmas tres.
— succinici,
Elixir proprietatis,
singulorum drachmas duas.

Gabe, vier bis fünfzehen Tropfen in weißem Wein, mehrere Tage hintereinander.

B. Präparate, welche das Terpentinöl in alcoholischen Flüssigkeiten aufgelöst oder mit ihnen gemischt enthalten.

Vinum diureticum. (*Pie.*)

℞. Essentiae Terebinthinae drachmas duas.
Succi Citri . . unciam unam.
Vini albi . . . uncias quatuor.

Auf einmal zu nehmen.

Spiritus antiictericus. (B*. Gen. *Au.*)

℞. Essentiae Terebinthinae sesquiunciam.
Alcoholis . . . . semilibram.

Destillent blando calore et oleum producto supernatans separatum servetur. — Gabe, fünf Tropfen auf Zucker.

Lotio terebinthinata. (B*.)

℞. Essentiae Terebinthinae,
Alcoholis,
singulorum uncias quatuor.
Camphorae
uncias (drachmas)] quatuor.

Heberden und Riemann rühmen sie bei phthiriasis alter Leute.

Liquor vulnerarius, Essentia s. Tinctura vulneraria Stahlii, Balsamum vulnerarium. (B*. Ful. Wir. *Sp.*)

℞. Essentiae Terebinthinae partem unam.
Tincturae Myrrhae partes duas.
— Succini . partes quatuor.

Digere in loco calido.

Ehedem in Einspritzungen bei Behandlung fistulöser Geschwüre und zum Verbinden von Wunden und Geschwüren sehniger (blanches) Theile. — Kann das balsamum Commendatoris sehr gut ersetzen.

Balsamum Fioravanti, Alcohol terebinthinatum compositum. (B. Gal. GalM. *Br. Fi. Sp. T. Vm.*)

℞. Caryophyllorum,
Nucis moschatae,
Cinnamomi,
Zingiberis,
singulorum partem unam.
Myrrhae,
Galbani,
Styracis liquidae,
singulorum partes duas.
Baccarum Lauri . . partes tres.
Terebinthinae Venetae
partes quatuor.
Alcoholis (10°),
Aquae, singulorum partes ducentas sedecim.

Destillent partes centum et octo et productum servetur. (B.)

℞. Baccarum recentium Lauri uncias quatuor.
Elemi,
Tacamahacae,
singulorum unciam unam.
Galbani,
Olibani,
Myrrhae,
Gummi Hederae,
singulorum uncias tres.
Styracis liquidae . uncias duas.
Ligni Aloës . . . uncias tres.
Galangae minoris,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Nucis moschatae.
Zedoariae,
Zingiberis,
Dictamni albi,
Aloës Socotrinae,
Succini, singulorum unciam unam.

Alcoholis uncias nonaginta sex. Digere per dies aliquot, tunc adde Terebinthinae . uncias sedecim. Destillent. — Spiritus transiens nomen *Balsamum Fioravanti spirituosum* gerit. Residuum, leni igne in retorta destillatum, oleum flavum suppedit, *Balsamum Fioravanti oleosum.* Augendo ignem, magma nigrum et empyreumaticum, *Balsamum Fioravanti nigrum* obtinetur. (*Sp.*)

Fi. Terebinthinae uncias sedecim, Elemi, Tacamahacae, Succini, Galbani, Myrrhae, singulorum uncias tres, Aloës Socotrinae unam, Styracis liquidae duas, Baccarum Lauri recentium quatuor, Galangae, Zedoariae, Zingiberis, Cinnamomi, Caryophyllorum, Nucis moschatae, singulorum sesquiunciam, Foliorum Dictamni cretici unam, Alcoholis 24° libras octo; destillent fluidi libras sex cum dimidia; — Balsamum *oleosum* et *nigrum* ut antea obtinentur.

℞. Terebinthinae
partes quingentas et sedecim.
Elemi,
Tacamahacae,
Succini,
Galbani,
Myrrhae, singulorum partes nonaginta sex.
Styracis liquidae
partes sexaginta unam.
Foliorum Dictamni,
Aloës,
singulorum partes triginta duas.
Baccarum Lauri recentium
partes centum viginti octo.
Galangae,
Zedoariae,
Zingiberis,
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Nucis moschatae, singulorum partes quadraginta octo.
Alcoholis (22°) partes tricies mille.

Macera per dies sex, tunc in balneo aquae destillent partes bis mille quingentae. (Gal. GalM.)

℞. Terebinthinae . . partes octo.
Baccarum Lauri,
Myrrhae, singularum partes tres.
Styracis liquidae . partes duas.
Nucis moschatae,
Caryophyllorum,
Zingiberis,
Cinnamomi,
singulorum partem unam.
Aquae Vitae
partes ducentas et sedecim.

Destillet quarta circiter pars. (B*. *Br. Vm.*)

Reizend, ehedem sehr berühmt, als analeptisches, nervenstärkendes, gegen Nierenleiden wirksames, harntreibendes, giftwidriges, antihysterisches, Wund- und blähungtreibendes Mittel betrachtet.

Aqua Anhaltina, Spiritus Anhaltinus. (B*. Br. Han. Pal Sar. Wir. *Ca. Sp. Vm.*)

℞. Terebinthinae . . semilibram.
Olibani . . . . unciam unam.
Ligni Aloës pulverati uncias tres.
Granorum Mastichis,
Caryophyllorum,
Nucis moschatae,
Cubebarum,
Cinnamomi,
singulorum drachmas sex.
Croci Austriaci
drachmas duas cum dimidia.
Seminum Foeniculi,
Baccarum Lauri,
singulorum semunciam.
Alcoholis . . . libras quinque.

Post sex dies digestionis destillent in balneo aquae. (Pal.)

Sp. Oleum producto supernatans separare jubet et pro arbitrio Moschi grana quindecim in nodulo inclusa immergere.

℞. Foliorum Rorismarini
unciam unam.
Herbae Rutae,
Seminum Foeniculi,
Baccarum Lauri,
singulorum semunciam.
Caryophyllorum,
Cubebarum,
Nucis moschatae,
Cinnamomi,
singulorum drachmas sex.
Mastichis . . . . uncias duas.
Terebinthinae Venetae semilibram.
Alcoholis rectificati libras quinque.

Post sex dies digestionis adde
Aquae fontanae . . libras duas.

Destillent in balneo aquae libras quinque. (Br.)

℞. Radicis Galangae minoris,
Florum Rorismarini,
singulorum drachmas sex.
Seminum Foeniculi,
Baccarum Lauri,
singulorum unciam unam.
Caryophyllorum,
Cubebarum,
Nucis moschatae,
Cinnamomi,
Mastichis,
singulorum drachmas sex.
Olibani . . . . unciam unam.
Terebinthinae Venetae semilibram.
Alcoholis rectificati . libras sex.

Post sex dies digestionis adde
Aquae purae . . libram unam.
Destillent in balneo aquae libras quinque (Ham. Sar. Wir.)
℞. Baccarum Lauri,
Seminum Foeniculi,
singulorum semunciam.
Cinnamomi,
Cubebarum,
Galangae minoris,
Caryophyllorum,
Mastichis,
Nucis moschatae,
Rorismarini,
singulorum drachmas sex.
Olibani . . . uncias quatuor.
Aquae Vitae uncias nonaginta sex.
Aquae
uncias ducentas octoginta octo.
Destillent spiritus unciae octoginta et hoc productum denuo destilletur cum
Terebinthinae . unciis quatuor.
Aquae unciis centum sexaginta
ut spiritus unciae sexaginta obtineantur. (*Vm.*)

Die Formel von *Ca.* ist falsch und wird daher hier übergangen.

Dieses Wasser unterscheidet sich kaum von dem balsamum Fioravanti und hat dieselbe Wirkung, wie dieser. Es ist ein magenstärkendes, blähung- und urintreibendes Mittel. Man wendet es ebenfalls äußerlich in Einreibungen auf den Unterleib, um Erbrechen und Diarrhöe zu stillen, oder in die Glieder bei Lähmung, an. — Gabe, sechszig Tropfen und mehr.

Balsamus Schauerianus. (B*. Br. *Sp.*)
℞. Terebinthinae Venetae
sesquiunciam.
Galbani . . drachmas novem.
Radicis Consolidae majoris,
— Fraxinellae,
singulorum drachmas sex.
— Imperatoriae,
Mastichis, singulorum semunciam.
Radicis Calami aromatici,
— Galangae,
Storacis Calamita,
Olibani,
Zingiberis,
Cinnamomi,
Benzoës,
singulorum drachmas tres.
Nucis moschatae,
Cubebarum,
Caryophyllorum,
Santali albi,
Cardamomi minoris,
Camphorae, . . .
Ligni Aloës,
singulorum drachmas duas.
Radicis Caryophyllatae,
— Inulae,
Aloës hepaticae,
singularum drachmam unam.
Myrrhae . . . semidrachmam.
Radicis Angelicae
grana quindecim.
Alcoholis concentrati libras octo.
Post sufficientem digestionem destillent in balneo aquae ad siccum.

Auch dieser Balsam hat Aehnlichkeit mit dem Fioravanti'schen, und ist ebenfalls reizend, auflösend, schmelzend und Wundmittel. Ehedem rühmte man ihn besonders bei Quetschungen und Ekchymosen, in Einreibungen.

Balsamum vitae album, Spiritus balsamicus. (Wir.)
℞. Olibani,
Myrrhae,
Galbani, singulorum uncias tres.
Ligni Aloës,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Nucis moschatae,
Galangae,
Zedoariae,
Zingiberis,
singulorum unciam unam.
Baccarum Lauri uncias quatuor.
Terebinthinae Venetae
uncias duodecim.
Alcoholis . . libras duodecim.
Post sufficientem digestionem destillent in balneo aquae. — Dieser Balsam, welcher nicht viel von dem Fioravantischen verschieden ist, gilt, für magenstärkend, harn-, blähungtreibend, nervenstärkend, sowohl äußerlich als innerlich; im letztern Falle ist die Gabe vierzig bis sechszig Tropfen.

Aqua contra gonorrhoeam. (Wir.)
℞. Terebinthinae Venetae
uncias decem.
Radicis Iridis Florentinae
uncias duas.
Herbae siccatae Menthae piperitae
uncias tres.
— — Dictamni Cretici
unciam unam.
Seminum Agni casti,
— Rutae, singulorum uncias
duas et dimidiam.
Vini albi . . . libras decem.
Destillet in balneo aquae dimidia pars. — Dieses Wasser hat ebenfals Aehnlichkeit mit dem Fioravanti'schen Balsam. Hoffmann gab es bei Gonorrhöe und Leukorrhöe zu vier Löffel täglich, auf zwei Mal.

Elixir aromaticum adstringens. (*Bo.*)
℞. Florum Lamii albi libram unam.

Florum Rosarum pallidarum
uncias duas.
Summitatum Rorismarini
unciam unam.
Seminum Urticae . uncias octo.
Foliorum Plantaginis uncias duas.
Glandes Quercus . . . no. 24.
Radicis Bistortae . uncias duas.
Vini albi . . . . libras octo.
Post horas viginti quatuor infusionis adde
Terebinthinae Venetae
uncias quatuor.
Destillent in balneo aquae ad siccum, producto adde
Subcarbonatis Potassae
unciam unam.
Roob Sambuci . uncias quatuor.
Sacchari albi . . libram unam.
Reizend, gegen Leukorrhöe gerühmt. — Gabe, Morgens nüchtern zwei oder drei Unzen.

C. Präparate, welche das Terpentinöl oder Essenz mit wässerigen Flüssigkeiten vermischt enthalten.

Clyster terebinthinatus, Enema terebinthinatum. (B*. *E. Ra.*)

℞. Essentiae Terebinthinae
unciam unam.
Contere cum Vitello Ovi unius, sensim addendo
Aquae fontanae . uncias octo.
Misce bene. (B*.) — Von Groß gegen Askariden gerühmt.

℞. Essentiae Terebinthinae
unciam unam.
Vitellum Ovi . . . . . no. 1.
Decocti Capitum Papaveris
uncias octo.
Von Récamier bei nervösem Lendenweh gerühmt. (*Ra.*)

℞. Essentiae Terebinthinae
sesquiunciam.
Vitellos Ovorum . . . no. 2.
Solutionis Gummi Arabici
octarium unum.
Misce. (*E.*)

Linimentum diureticum. (B*. Han. *Ca.*)

℞. Essentiae Terebinthinae
semunciam.
Tere cum Vitello Ovi unius et adde sensim
Aquae Menthae piperitae
uncias sex.
Misce bene. (B*. Han.)

Ca. Essentiae unciam unam et Aquae Menthae tres.

In Einreibungen auf die Inguinalgegend bei sogenannter krampfhafter Ischurie.

Julep diureticum. (*Bo. Pie.*)

℞. Essentiae Terebinthinae
guttas quindecim.
Millepedum pulveratorum
semidrachmam.
Succi Summitatum Asparagi
unciam unam.
Decocti Asparagi,
Aquae Herniariae,
singulorum uncias tres.
Syrupi Capilli Veneris
drachmas sex.
Bei Ischurie, Rheumatismus und Gicht. — Auf zwei Mal, Morgens und Abends.

Looch terebinthinatum. (*Ra.*)

℞. Essentiae Terebinthinae
drachmas tres.
Vitellum Ovi . . . . . no. 1.
Contere et adde
Syrupi Menthae . uncias duas.
— Florum Aurantiorum,
— Aetheris,
singulorum unciam unam.
Tincturae Cinnamomi
semidrachmam.
Von Récamier bei Nervenschmerzen angewendet. — Gabe, täglich drei Löffel. — Zuweilen setzt man, zur Verhütung des Erbrechens, eine Drachme Laudanum zu. (*Ra.*)

Potio contra taeniam. (*Ca.*)

℞. Essentiae Terebinthinae uncias tres.
Mellis . . . drachmas sex.
Aquae destillatae Menthae
drachmas tres.
Auf drei Mal den Tag über.

Emulsio terebinthinata. (B*. *Vm.*)

℞. Essentiae Terebinthinae
drachmam unam.
Contere cum Vitello Ovi unius vel cum Mucilaginis Gummi Arabici drachmis duabus et adde sensim
Aquae communis uncias sex ad octo.
Misce bene. (B*.)

℞. Essentiae Terebinthinae
semunciam.
Gummi Arabici drachmas duas.
Aquae . . . quantum sufficit.
Fiat emulsio, cui adde
Mellis albi . . . uncias duas
et Aquae quantum satis ut fiat potio unciarum sex. (*Vm.*)
Gabe, ein Löffel täglich mehrmals.

Aqua cosmetica. (Pal.)

℞. Albuminis Ovorum recentium in Aqua ad duritiem cocti
libras duas.
Terebinthinae Venetae semilibram.
Mellis . . . . . uncias octo.
Styracis . . . . unciam unam.

Benzoës . . . drachmas duas.
Aquae Rosarum pallidarum
uncias decem.
Destillent in balneo aquae ad siccum.

Potio diuretica. (*E.*)

℞ Essentiae Terebinthinae
guttas centum.
Gummi Arabici,
Sacchari albi,
singulorum drachmam unam.
Aquae Menthae uncias quatuor.
Gabe, vier oder fünf Löffel täglich.

Potio stimulans. (*E.*)

℞. Essentiae Terebinthinae
guttas centum viginti.
Gummi Arabici,
Sacchari,
singulorum drachmas duas.
Tincturae Opii guttas sexaginta.
— Lavandulae compositae
drachmas duas.
Aquae Menthae uncias quinque.
Gabe, ein Löffel alle zwei Stunden.

D. Präparate, welche das Terpentinöl mit zuckerhaltigen Körpern vermischt enthalten.

Pulvis terebinthinatus, Elaeosaccharum s. Oleosaccharum Terebinthinae. (B*. *Au.*)

℞. Essentiae Terebinthinae
scrupulum unum.
Acidi pyrotartarici grana decem.
Sacchari albi . quantum sufficit ad saturandum. Tere ut fiat pulvis.

Von Goeze gegen Bandwurm gepriesen. — Gabe, drei Mal täglich, in kaltem Wasser. — Man führt dann mit Gummi Gutti ab.

Electuarium s. Opiatum terebinthinatum. (Gen. *Ra.*)

℞. Essentiae Terebinthinae
drachmas duas.
Pulveris Gummi Arabici
sesquiunciam.
Sacchari pulverati . semunciam.
Syrupi Florum Aurantiorum
unciam unam.

Von Récamier bei Neuralgien angewendet. — Gabe, den dritten Theil täglich, auf drei Mal, zwischen zwei Oblaten. (*Ra.*)

℞. Essentiae Terebinthinae
semunciam.
Mellis . . . . unciam unam.
Liquiritiae pulveratae
quantum sufficit.
Misce exacte. (Gen.)

Conditum febrifugum, Marmelada febrifuga. (*Sw*.*)

℞. Essentiae Terebinthinae
drachmas duas.
Terebinthinae purae sesquianciam.
Misce triturando cum Vitello Ovi unius et adde
Terebinthinae . . uncias duas.
Gegen Bandwurm. — Gabe, ein Kaffeelöffel, Morgens und Abends.

Bolus antiarthriticus. (Sar.)

℞. Essentiae Terebinthinae
guttas viginti quatuor.
Mellis electi grana triginta sex.
Misce.

Linctus Olei Terebinthinae, Mel terebinthinatum. (B*. *E. Ra. Sw.*)

℞. Essentiae Terebinthinae
semunciam.
Contere cum Vitello Ovi unius et adde
Mellis albi . . . . uncias tres.
Misce. (*Sw.*)
℞. Essentiae Terebinthinae
drachmas duas.
Mellis crudi . . unciam unam.
Misce. (B*. *E.*)

Von Home bei rheumatischem Lendenweh empfohlen; von Récamier in allen Neuralgien angerathen; letzterer nimmt, statt des reinen Honigs, Rosenhonig zu einer bis vier Unzen. — Gabe, drei Löffel täglich.

E. Präparate, welche das Terpentinöl mit fetten Körpern gemischt enthalten.

Potio vermifuga. (*B.*)

℞. Essentiae Terebinthinae
drachmas duas.
Olei Juglandis . sesquiunciam.
Auf eine Gabe
℞. Essentiae Terebinthinae
drachmas quinque.
Olei Juglandis . . uncias tres.
Auf eine Gabe.

Oleum anthelminticum. (B*.)

℞. Olei Terebinthinae partes quatuor.
— Cornu Cervi partem unam.
Destillent mixturae trientes duo.

Neurohr will dieses Oel zu zehen bis hundert Tropfen mit Erfolg gegen Bandwurm angewendet haben.

℞. Olei Terebinthinae partes tres.
— Cornu Cervi partem unam.
Destillent tres quadrantes.

Chabert ließ es zu einem bis zwei Kaffeelöffel Morgens und Abends, oder in Klystir und zu zwei Kaffeelöffeln in einer schleimigen Abkochung nehmen. Bremser gab es Morgens und Abends zu zwei Kaf-

feelöffeln in einem Wenig Waſſer (wohl zu ſtark, beſonders im Anfange). Chabert wollte mit dem Terpentinöl nur den Geſchmack des Hirſchhornöls verſtecken; es war aber wohl das Hauptingrediens darin.

Linimentum terebinthinatum s. Terebinthinae. (Am. Lon. LonN. *C. Ra.*)

℞. Essentiae Terebinthinae semioctarium.
Liqua et adde
Cerati Resinae . libram unam.

In Einreibungen auf an Rheumatismen leidende Theile. (Am. Lon. LonN. *C.*)

℞. Essentiae Terebinthinae unciam unam.
Olei Chamomillae . uncias duas.
Laudani liquidi Sydenhami drachmam unam.

Von Récamier bei Neuralgien angewendet. (*Ra.*)

Oleum de Tribus. (*Vm.*)

℞. Olei Terebinthinae,
— Lavandulae,
— lateritii,
singulorum partes aequales.
Misce.

F. Präparate, welche das Terpentinöl mit Säuren gemiſcht enthalten.

Balsamum narcoticum. (*Vm*)

℞. Essentiae Terebinthinae,
Acidi sulphurici fumantis,
singulorum partes aequales.

Commisce sensim; post refrigerationem massam cum Aqua calefac et lava, donec nihil acidi libri remaneat.

Achard fand, daß das Terpentinöl mit Schwefelſäure ſich verbinden läßt, und daß dadurch eine beſondre Subſtanz, die ſogenannte ſaure Seife (Sapo acidus), Savon acide, entſteht, welche in Alcohol und in Waſſer ganz löslich iſt. Dieſe Seife bildet die Baſis des folgenden Präparats.

Balsamum adstringens s. ischaematicum. (Br. Ful. *Au. Ca. Pie. Sp. Vm.*)

℞. Acidi sulphurici drachmas decem.
Infunde guttatim
Essentiae Terebinthinae semunciam.

Cessata effervescentia et refrigerato liquore adde caute
Alcoholis . . . uncias quatuor.
Serva. (Br.)

Pie. et *Sp.* Acidi, Essentiae, singulorum semunciam et Alcoholis uncias tres; — *Ca.* Acidi semunciam, Essentiae uncias quatuor et Alcoholis tres.

℞. Terebinthinae claree partes duas.
Acidi sulphurici concentrati partes duas et dimidiam.

Misce sensim in mortario vitreo in balneo aquae tepido; post refrigerationem per plures vices adde
Alcoholis . . . . partes octo.
Separa per aliquot dies, decantha et serva. (*Vm.*)

Ful. et *Au.* Terebinthinae partes tres, Acidi sulphurici quinque et Alcoholis rectificati viginti quatuor.

Reizend, abſtringirend, bei Blutſpucken empfohlen. — Gabe, ein bis zwei Scrupel in einem paſſenden Getränk.

Camphora artificialis. (*Vm.*)

℞. Salis communis pulverati partes quinque cum dimidia.
In retortam ingesto infunde
Acidi sulphurici concentrati partes quinque.

Gas exinde evolutum tubi ope in lagenam transmitte continentem
Essentiae Terebinthinae partes decem.

Stent in frigida reactione per plures dies, tunc blandissime calefac, continuela genam fasciis linteis Aqua frigida humefactis circumdando; gase transire cessante, apparatu refrigerato liquidum decantha, partem concretam exstillare fac et inter chartam josephinam pressam in lagena clausa serva.

Liquor Camphorae artificialis. (*Vm.*)

℞. Camphorae artificialis lotae partem unam.
Alcoholis rectificati . partes sex.
Dissolve frigide.

Sapo s. Liquor s. Spiritus arthriticus Pottii, Linimentum resolvens, Spiritus Salis terebinthinatus. (B*. Li. Sax. Wür. *Ca. Sw.*)

℞. Salis communis pulverati,
Essentiae Terebinthinae, singulorum uncias duas.
Infunde sensim et caute
Acidi sulphurici concentrati unciam unam.

Mixturam destillationi in balneo aquae subjice. (B*. Li. Sax. Wür.)

Ca. et *Sw.* Acidi hydrochlorici partem unam et duas Essentiae.

Die Salzſäure reagirt faſt eben ſo auf das Terpentinöl wie die Schwefelſäure. Sie bildet damit zwei verſchiedene Zuſammenſetzungen; eine, welche weniger Säure enthält, iſt der künſtliche Kampher, von dem oben die Rede war; die andere, mehr Säure enthaltende iſt, nach Houton-Labillardière's Beobachtung, flüſſig; letztere bildet die Baſis des liquor arthriticus.

Lotus ad rheumatismum, Linimentum antirheumaticum. (*Sp.*)

℞. Essentiae Terebinthinae,

Acidi hydrochlorici,
singulorum unciam unam.
Aquae Vitae camphoratae
uncias sex.
Misce.

Resolvens s. Fundans Richardi. (*Vm.*)

℞. Essentiae Terebinthinae,
Acidi hydrochlorici concentrati,
singulorum partem unam.

In retortam immitte, agita saepius mixturam et post unum vel duos dies infunde

Alcoholis . . . . partes octo.

Destillent partes octo; in producto solve

Camphorae . partem dimidiam.

Balsamum ad s. contra pernones. (GalH. *Bo. Ra.*)

℞. Balsami Fioravanti uncias quatuor.
Acidi hydrochlorici
guttas triginta duas.

Misce exacte.

Ra. Olei Olivarum uncias duas, Balsami Peruviani drachmam unam, Cerati cetacei, Cerae albae, Acidi hydrochlorici, singulorum drachmas duas et Aquae purae drachmas sex.

℞. Olei Olivarum . partes quinque,
— Terebinthinae . partes duas.
Acidi sulphurici partem dimidiam.
Misce. (*Ca.*)

GalH. Olei partes centum sexaginta, Essentiae sexaginta quatuor et sedecim Acidi.

In Einreibungen Morgens und Abends auf Theile, wo Frostbeulen entstehen wollen.

G. Präparate, welche das Terpentinöl mit Alkalien verbunden enthalten.

Sapo Starkeyanus s. tartareus s. chemicus pro casu externo s. Potassae terebinthinaceus s. tartareus Starkeyi, Corrector Starkeyi s. Opii, Sapo Olei volatilis Terebinthinae et Potasshae. (Br. Fer. Ful. Gal. Hass. His. Li. Sar. Wir. Wür. *Au. Fi. Pie. Sp. Sw.*)

℞. Subcarbonatis Potassae
quantum vis.

Calcina fortiter, massam adhuc calidam in mortarium calefactum immitte, pulvera et ei infunde, bene triturando, Terebinthinae Venetae pauxillum; addere terebinthinam per partiunculas drachmae circiter unius continua, donec absorberi cessaverit; dissolve deinde massam in Alcohole concentrato, sepone et filtra liquorem, qui tunc lente evaporet. (Ful. Li.)

Br. Sar. et Wir. calcinare jubent Subcarbonatem Potassae per horam unam vel duas, pulverare, infundere deinde guttatim Essentiae Terebinthinae quantum sufficit, evitando ne aër accedat, totum deinde in cavam seponere, addere post aliquot tempus Olei calidi pauxillum et ita continuare, donec alcali absorbuerit Essentiae circiter pondus triplum.

℞. Subcarbonatis Potassae sicci,
Essentiae Terebinthinae,
Terebinthinae Venetae,
singulorum partes aequales.

Tritura sal in mortario marmoreo pistilli vitrei ope, addendo primum essentiam et deinde resinam; mixturam, apta consistentia acquisita, porphyrisa. (Gal. *Fi.*)

℞. Terebinthinae communis
unciam unam.
Liqua in vase fictili et adde
Potassae causticae liquidae
semunciam.

Agita subinde, donec mixtura saponis consistentiam acceperit. (His.)

Pie. Potassae siccae uncias tres, Aquae duas et quatuor Essentiae Terebinthinae.

℞. Potassae causticae unciam unam.
Liquatae blandissimo igne adde
Essentiae Terebinthinae uncias tres.

Agita bene ut perfecte commisceantur. (Hass. Wür. *Sp.*)

Fer. et *Sw.* Potassae partes decem et octo Essentiae.

℞. Terebinthinae . unciam unam.
Essentiae Terebinthinae
semunciam.
Olei Amygdalarum dulcium,
Lixivii Saponariorum,
singulorum unciam unam.

Misce. (*Au.*)

Diese Seife verdankt ihren Namen dem Vermögen, welches ihr zugeschrieben wurde, die schädlichen Eigenschaften des Opiums, der Nieswurz und andrer ähnlicher Substanzen zu verbessern. Balsamisch, reizend, eröffnend, harntreibend, krampfstillend, besonders bei Gonorrhöe und Wassersuchten empfohlen. — Gabe, acht bis zwölf Gran, in einem wässerigen Vehikel oder in Pillen.

H. Präparate, welche das Terpentinöl mit Seife verbunden enthalten.

Balsamum saponaceum terebinthinatum s. vitae externum, Linimentum stimulans, Sapo terebinthinatus s. ex Oleo Terebinthinae volatili et Potassa, Spiritus Saponis compositus, Balsamum Terebinthinae, Balsamum Saponis.

1) Ohne Alcohol.

℞. Saponis Veneti sicci
partes sedecim.

Essentiae Terebinthinae
partes triginta duas.
Solutioni adde
Subcarbonatis Potassae liquidi
partes tres.
Misce bene. (BorC. Ful. Hass. Li. Wür.)

Br. Saponis, Essentiae, singulorum **partes viginti quatuor et unam Subcarbonatis**; — B*. Bor. Bor4. D. Han. HassP. et Sax. Saponis, Essentiae, singulorum sex et unam Subcarbonatis; — B*. secundum *Theden*, Saponis octodecim, Essentiae quindecim et unam Subcarbonatis; — *Sp.* Saponis novem, Essentiae octodecim et unam Subcarbonatis; — Wür. et *Sw.* Saponis quatuor, Essentiae octo et unam Subcarbonatis.

℞. Saponis rasi . . . partes duas.
Olei Terebinthinae partes tres.
Triturando dissolve et adde
Potassae caustioae calcinatae
partem unam cum dimidia
dissolutae in
Aquae . . . . parte dimidia.
Misce bene. (*Vm.*)

℞. Saponis albi . . partes quatnor.
Camphorae . . . partem unam.
Contere, sensim addendo
Essentiae Terebinthinae
partes sedecim.
Solutionem serva.

2) Mit Alcohol.

℞. Saponis Medullae partes quatuor.
Terebinthinae . partem unam.
Tincturae Sodae partes quatuor.
Dissolve in balneo aquae tepido, in vase clauso et cola. (*Vm.*)

℞. Saponis albi,
Essentiae Terebinthinae,
singulorum partem unam.
Conteré et adde
Alcoholis . . . . . partes octo.
Digere in Aqua tepida, sepone per dies aliquot et soluta filtra. (Hase. Li. Wir. *Pid. Vm.*)
Solutio Saponis in Essentia, seorsim praeparata a pluribus pharmacopoeis (Hass. *Pid.*) *Corpus pro Balsamo Saponis* apellatur.

℞. Camphorae pulveratae
partem unam.
Alcoholis rectificati
partes sedecim.
Solutioni adde
Saponis albi rasi partes quatuor.
Digere blando igne et adde
Essentiae Terebinthinae
partem unam.
Misce agitando. (DD.)

℞. Subcarbonatis Potassae
sesquiunciam.
Aquae fontanae
uncias viginti quatuor.
Solutioni adde
Essentiae Terebinthinae
uncias tres.
Saponis Veneti . . uncias duas.
Spiritus Juniperi . uncias duas.
Olei Culilaban . . uncias tres.
Misce bene. (*Sp.*)

℞. Saponis,
Essentiae Terebinthinae,
singulorum semilibram.
Solutioni adde
Alcoholis Serpylli libras quatuor.
Ammoniaci liquidi
uncias duas ad octo.
Misce bene. (*Sw.*)

Sa. Saponis unciam unam, Essentiae semilibram, Alcoholis Serpylli uncias quinque et Ammoniaci drachmas duas ad unciam unam.

℞. Saponis Medullae partem unam.
Alcoholis ammoniacalis
partes quatuor.
Essentiae Terebinthinae
partes octo.
Spiritus Serpylli
partes sexaginta quatuor.
Solutionem filtra. (*Vm.*)

Mehrere dieser Formeln haben Aehnlichkeit mit dem Opodeldoc, dem übrigens hinsichtlich der Wirkungs- und Anwendungsart der balsamus vitae externus sehr nahe steht. — Reizend, schmelzend, auflösend. — Aeußerlich bei Curationen und zur Vertreibung mancher Geschwülste.

Fomentatio resolvens. (Ful. Ham. Li. *Sp.*)

℞. Balsami vitae externi
partem unam.
Aquae communis
partes viginti quatuor.
Dissolve.

Balsamum Basvillianum. (B*. *Au.*)

℞. Essentiae Terebinthinae
uncias tres.
Subcarbonatis Potassae
sesquiunciam.
Saponis Alicantini rasi uncias duas.
Aquae destillatae sesquiunciam.
Spiritus Juniperi . uncias duas.

Dieser Balsam ist kaum von dem balsamus vitae externus verschieden, besonders wenn dieser nach *Sp.*'s Formel bereitet ist. Noch weniger unterscheidet er sich von dem folgenden.

Liquor nervinus Pereboomii. (B*. Han. *Vm.*)

℞. Subcarbonatis Potassae partes tres.
Saponis Alicantini partes quatuor.

Contere et humecta cum
Aquae purae . partibus duabus.
Admisce sensim
Essentiae Terebinthinae
partes sex.
Olei Cajeput . . partem unam.
Adde deinde pluribus vicibus
Aquae tepidae
partes quadraginta sex.
Post plures dies filtra. (*Vm.*)

B*. et Han. Subcarbonatis Potassae partes tres, Saponis quatuor, Aquae quadraginta, Essentiae sex, Olei Cajeput unam et Spiritus Juniperi quatuor.

Reizend, äußerlich bei Lähmung angewendet.

Linimentum antiarthriticum. (*Ca.*)

℞. Camphorae . scrupulum unum.
Essentiae Terebinthinae
drachmas duas.
Solutioni adde
Saponis nigri . . unciam unam.
Unguenti nervini . semunciam.
Cumini pulverati drachmas duas.
Salis Cornu Cervi succinati
grana quindecim.

Von Home in Einreibungen bei langwierigen rheumatischen Affectionen, besonders ischias, empfohlen.

§. III. Präparate, welche den harzigen Theil des Terpentins ausschließlich oder vorzugsweise enthalten.

Der harzige Bestandtheil des Terpentins stellt sich unter verschiedenen Formen dar, welche im Allgemeinen von seiner größern oder geringern Reinheit abhängig sind und unter denen einige von verschiedenen Pharmacopöen in ihre materia medica gestellt werden. Die letztern sind:

1) *Pix s. Resina Burgundica, Resina s. Pix alba;* Burgundisches, weißes Pech oder Harz; Poix blanche, Poix de Bourgogne (*Gal.*).

A Am. Ams. Au. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *B. Fi. G. M. Par. Pid. Sp. T.*

Man erhält es, wenn man den gemeinen, an der Oberfläche der Einschnitte verhärteten Terpentin schmelzt und so geschmolzen durch ein Strohbett filtrirt.

2) *Resina Pini s. communis;* gemeines Pech, Fichtenharz; Poix résine, Résine commune (*Gal.*).

HassP.

Man bereitet es, indem man das vorhergehende schmelzen oder geschmolzenes Colophonium stark mit einem Viertel weißem Pech in Wasser kochen läßt, wodurch es seine Durchsichtigkeit verliert und eine schmuzziggelbe Farbe erhält. Es unterscheidet sich kaum vom vorigen und wird fast in allen Pharmacopöen damit verwechselt.

3) *Colophonium, Resina flava s. Resina Pini fusa, Pix graeca;* Colophonium, Geigenharz, griechisches Pech; Colophane, Arcanson, Poix sèche (*Gal.*).

Ams. B. Bel Bor. Bor4. Br. D. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Han. Hass. HassP. His. Li. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *Be. Fi. G. M. Pid. Sp. T.*

Der Rückstand, welcher nach der Destillation des gemeinen Terpentins, um ihn zu rectificiren, erhalten wird, welchen man dann schmelzen und ruhig wieder erkalten läßt.

4) *Terebinthina cocta, Resina flava;* gekochter Terpentin, gelbes Harz; Térébenthine cuite (*Gal*).

A. Bor. Bor4. Br. Du. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. O. Pal. Pol. Sax. Wir. Wür. *Br, Sw*, Vm.*

Er unterscheidet sich vom Colophonium nur dadurch, daß er Wasser enthält und von dem gemeinen Pech durch die größere Menge desselben, welche in ihm enthalten ist. Man gewinnt ihn, indem man entweder das bei der Destillation des Terpentins mit Wasser, um das Oel zu bereiten, in dem Kolben Zurückbleibende sammelt oder einen Theil Terpentin mit drei Theilen Wasser kochen läßt, bis die Masse, in kaltes Wasser gegossen, einen etwas weichen Teig darstellt.

Gal. in pilulas granorum sex, in Aqua servandas redigere jubet.

5) *Pix solida s. atra s. navalis s. vegetabilis, Resina Pini empyreumatica solida, Palampissa;* schwarzes Pech, Schiffspech; Poix noire (*Gal.*).

Ams. B. Ba. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. R. Sax. Suec. Wir. Wür. *Be. C. Fi. G. M. Par. Pid. Sp. T.*

Man erhält es durch abwärtsgehende Verbrennung des Stroh's, welches zum Filtriren des gemeinen Terpentin's benutzt wurde.

Es ist zum Theil durch das Feuer veränderter und mit Kohle vermischter Harz, hat also Verwandtschaft mit dem Theer; es ist aber weit unreiner und scheint keine Essigsäure zu enthalten.

Innerlich wendet man nur den gekochten Terpentin an; er gilt als balsamisches und harntreibendes Mittel, welches, besonders bei rebellischer Gonorrhöe, Gicht und hart-

nächtigen Rheumatismen, zu einer halben Drachme, mehrmals täglich, in Gebrauch ist. Die übrigen Arten dienen besonders zum äußern Gebrauch.

A. Präparate, welche gekochten Terpentin enthalten.

Conditum corroborans, Marmelada adstringens. (*Sw**.)

℞. Terebinthinae coctae unciam unam.
Misce in mortario calefacto exacte cum
Balsami Copaivae . . semuncia.
Adde deinde
Mucilaginis Gummi Arabici unciam unam.
Conservae Rosarum rubrarum uncias quatuor.

Gabe, zwei bis drei Drachmen, täglich drei Mal, bei veralteten Gonorrhöen.

Pilulae e Terebinthina s. diureticae roborantes s. stimulantes ad gonorrhoeam. (B*. BorC. Sar. Wir. *Au. Sp. Sw. Sy.*)

℞. Terebinthinae coctae drachmas duas.
Pulveris Rhei drachmam unam.
Fiant pilulae triginta. (*Sy.*) — Gabe, vier bis sechs Stück, Morgens und Abends.

℞. Terebinthinae coctae uncias duas.
Rhei pulverati . unciam unam.
Syrupi balsamici quantum sufficit.
Fiant pilulae granorum quatuor. (*Sw.*) — Gabe, wie bei den vorhergehenden.

℞. Terebinthinae coctae,
Saponis,
singulorum drachmam unam.
Pulveris Rhei . . semunciam.
Fiant pilulae granorum duorum. (B*. BorC.) — Gabe, zehen bis fünfzehen Stück, Morgens und Abends.

Au. Terebinthinae coctae, Saponis, singulorum semidrachmam, Rhabarbari drachmam unam.

℞. Terebinthinae coctae unciam unam.
Rhei . . . . drachmas duas.
Succini albi,
Mastichis,
Liquiritiae,
Ossis Sepiae,
singulorum drachmam unam.
Terebinthinae Venetae quantum sufficit.
Fiat massa pilularis. (Sar.)

℞. Terebinthinae coctae sesquiunciam.
Succini,
Mastichis,
Olibani
Succi Liquiritiae,
Rhei,
Ossis Sepiae,
Boli Armenae,
singulorum drachmas duas.
Fiat massa pilularis. (Wir.)

℞. Terebinthinae coctae sesquiunciam.
Boli Armenae,
Ossis Sepiae,
singulorum semunciam.
Succini,
Mastichis,
singulorum drachmas duas.
Rhei . . . . drachmam unam.
Syrupi balsamici quantum sufficit.
Fiat massa pilularis. (*Sp.*) — Die drei letztern Formeln sind mit Recht verlassen. — Gabe, ein Scrupel, täglich drei Mal, bei Tripper.

Pilulae adstringentes. (*Sm.*)

℞. Terebinthinae coctae,
Sanguinis Draconis,
singulorum drachmas duas.
Terebinthinae clarae quantum sufficit.
Fiant pilulae quatuor granorum. — Gabe, drei Stück täglich, auf drei Mal, bei Gonorrhöe.

℞. Terebinthinae coctae drachmas quatuor.
Succini . . . . drachmas duas.
Ossis Sepiae . drachmam unam.
Resinae Guajaci scrupulos quatuor.
Balsami Copaivae quantum sufficit.
Fiant pilulae centum quinquaginta. — Gabe, zwölf Stück täglich auf drei Mal, bei Leukorrhöe und Gonorrhöe.

Pilulae balsamicae Junckeri. (B*. *Au. Sp.*)

℞. Mastichis,
Myrrhae,
singulorum partem unam.
Terebinthinae coctae,
Succini flavi, singulorum partem unam cum dimidia.
Jalapae pulveratae . partes tres.
Extracti Fumariae,
— Cardui benedicti,
— Absinthii,
— Cochleariae,
singulorum partes duas.
Fiat massa pilularis. (B*.) — Diese von Junker mitgetheilten Pillen wurden ehedem für emmenagogisch angesehen.

℞. Terebinthinae coctae semunciam.
Saponis rasi . . unciam unam.
Resinae Jalapae,
Extracti Aloës aquosi,
— Centaurii minoris,
— Gentianae,
singulorum drachmas tres.
Fiant pilulae granorum duorum. (*Sp.*) — Man gab ehedem bis zu vierzig Stück.

Unguentum contra perniones. (*Sw.*)

℞. Terebinthinae coctae,
Butyri Cacao,
singulorum uncias tres.
Liquatis simul, blando igne, adde
Balsami Peruviani semidrachmam.

Ceratum oleo-resinosum. (*Sw*.*)

℞. Cerae albae,
Terebinthinae coctae,
singularum partem unam.
Olei Olivarum . . partes duas.
Liqua leni igne, cola et ad perfectam usque refrigerationem agita. — Zum Verbinden leichter Excoriationen von Ruß zen.

Sparadrap adhaesivum. (*Vm.*)

℞. Terebinthinae coctae,
Cerae albae,
singularum partes aequales.
Liqua et super telam vel chartam extende.

℞. Terebinthinae coctae
partem unam.
Emplastri simplicis partes tres.
Liqua et ut antea extende.

Balsamum Fourcroyi. (*Ca.*)

℞. Olei Olivarum . libras quatuor.
Pulveris Radicis Angelicae,
— — Scorzonerae,
— Hyperici,
— Baccarum Hederae,
singulorum uncias duas.
Coque blandissimo igne, macera per noctem, altero mane ad ignem repone et oleo bullire incipienti adde
Theriacae,
Croci,
Extracti Juniperi,
singulorum drachmas duas.
Aloës . . . drachmam unam.
Coque, cola, per aliquot horas sepone, et ad ignem repositis adde
Terebinthinae . . uncias decem.
Coque, donec nullus terebinthinae amplius odor exhaletur; ab igne deinde remove et adde
Pulveris Olibani,
— Storacis,
— Benzoës,
singulorum sesquidrachmam.
Misce, donec penitus refrixerint, per duos vel tres dies sepone ut subsideant, cola per pannum gossypinum (Serviette) et in lagena serva. — Gegen Hautrisse, Geschwüre, Frostbeulen, Rheumatismen und Verrenkungen, in Einreibungen oder Umschlägen.

B. Präparate, zu denen das eigentliche Harz kommt.

Fumigatio resinosa. (*Sm.*)

℞. Resinae communis,
Cerae flavae,
singularum partes aequales.
Immitte in vas fictile craticulae impositum vel supra lampadem a spiritu vini alitam.

Diese Räucherung hat man bei Lungenschwindsucht empfohlen. — Bei manchen chronischen Catarrhen mit reichlichem eiterartigen Auswurf.

Unguentum contra tineam. (GalH. *Ca.*)

℞. Farinae Tritici partes quinque.
Aceti . . . partes quadraginta.
Fiat pasta; adde mixturam igne liquatam et colatam de
Picis Burgundicae,
— nigrae,
singulorum partibus quatuor.
Misce exacte. (GalH.)

Ca. Farinae partes quinque, Picis Burgundicae et nigrae, singulorum tantidem et Aceti partes triginta.

Auf ein Stück Leder gestrichen auf den kranken Theil gelegt und nach zwölf Stunden wieder abgenommen.

Cera arborea, Ceratum citrinum s. nigrum s. Resinae s. Resinae Pini s. Resinae Pini Burgundicae resinosum, Emplastrum adhaesivum s. commune attrahens s. cereum s. Cerae s. citrinum s. Cerae terebinthinatum s. Picis s. piceum s. adhaesivum s. Picis navalis s. sticticum s. simplex s. roborans, Unguentum flavum s. Resinae albae s. resinosum s. simplex. (A. Am. Ams. B. Bor. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Han. Hass. HassP. Li. Lon LonN. O. Pal. R. Sax. Suec. Wir. Würt. *C. Huf. Pid. Sp. Sw. Vm.*)

℞. Resinae Pini . . partem unam.
Sevi ovilli . . . . partes duas.
Cerae flavae . . . partes tres.
Liquata simul cola. (*Vm.*)

Ed. et *C.* Resinae albae partes duas, Sebi duas et Cerae tres (*Emplastrum simplex*); — Am. Ed. et *C.* Resinae albae partes quinque, Axungiae octo et Cerae flavae duas (*Unguentum s. Ceratum resinosum*); — Lon. LonN. Würt. *C.* et *Sw.* Resinae flavae partem unam, Sevi et Cerae flavae, singulorum tres (*Emplastrum commune s. Cerae*); — *Sp.* Resinae, Cerae flavae, singularum duas et Sevi unam (*Emplastrum attrahens*); — Du. Resinae albae duas, Axungiae quatuor et Cerae unam (*Unguentum Resinae albae*); — *Sw.* Resinae sedecim, Sevi unam et Cerae sex, vel Resinae sedecim, Sevi unam et Cerae decem (*Emplastrum adhaesivum s. roborans*); — Bor4. Resinae Burgundicae, Cerae flavae, sin-

guloram libram dimidiam, Adipis suilli libras octo (*Unguentum Resinae Pini Burgundicae*).

℞. Axungiae Porci . . libras octo.
Radicis Curcumae pulveratae uncias duas.
Aquae . . . . uncias quatuor.
Coque lente ad humidi usque consumptionem et adde
Cerae flavae,
Resinae Pini,
singularum semilibram.
Liquefacta cola. (Bor. Sax., *Unguentum flavum.*

℞. Resinae Pini . partes octodecim.
— Burgundicae partes viginti octo.
Cerae flavae . . partes viginti.
Liqua leni igne. (B.)

Vm. Picis nigrae partes quatuor cum dimidia, Resinae Pini quinque et Cerae flavae sex; — Ams. Resinae Pini duodecim, Picis Burgundicae quatuordecim et Cerae decem; — Sax. Resinae Pini novem, Picis Burgundicae quatuordecim et Cerae decem. (*Emplastrum Picis s. piceum*).

℞. Resinae Pini . partes quatuor.
Cerae flavae . partem dimidiam.
Terebinthinae . . partes duas.
Liqua simul. (*Vm.*) *Unguentum simplex s. Ceratum Resinae.*

Siw. Picis Burgundicae partes triginta duas, Cerae et Terebinthinae, singularum unam (*Emplastrum piceum*); — *Vm.* Resinae Pini partem unam cum dimidia, Cerae flavae tres et unam Terebinthinae (*Emplastrum citrinum*).

℞. Resinae Pini . uncias sedecim.
Cerae flavae . . uncias decem.
Terebinthinae . . uncias tres.
Massae liquatae adde
Pulveris Curcumae drachmas tres.
Misce bene. (*Sp.*) *Emplastrum citrinum.*

℞. Resinae Pini,
Cerae flavae,
Picis nigrae,
singulorum partes duodecim.
Sevi hircini
partem unam cum dimidia.
Liqua et cola. (D. DD. Wür.) *Emplastrum piceum s. sticticum.*

Li. Resinae Pini, Picis Burgundicae, singulorum partes sex, Cerae flavae quatuor et Sevi cervini duas (*Emplastrum piceum s. adhaesivum*).

℞. Resinae Pini
partes viginti quatuor.
— nigrae . partes sedecim.
Cerae flavae . . . partes octo.
Terebinthinae . partes quatuor.
Liqua simul. (Fenn. Suec.) *Emplastrum Picis.*

Vm. Resinae Pini partes sex, Picis nigrae duodecim, Cerae flavae tres et Terebinthinae unam. (*Ceratum nigrum.*)

℞. Resinae Pini . . . partes octo.
Cerae flavae . . partes quatuor.
Sevi . . . . . partes duas.
Terebinthinae . partem unam.
Liqua et cola. (Ful. Hass. Li. *Pid.*) *Emplastrum citrinum s. cereum s. attrahens, Ceratum citrinum s. Resinae Pini;* — HassP. Resinae albae libram unam, Cerae citrinae libras duas, Sevi vervecini, Terebinthinae Venetae, singulorum semilibram.

A. Bor. et Bor4. Resinae Pini partes duas, Cerae flavae quatuor, Sevi et Terebinthinae, singulorum unam (*Ceratum s. Emplastrum citrinum*); — Han. et Sax. Resinae Pini partes duas, Cerae quatuor, Sevi unam et unam Terebinthinae (*Ceratum s. Emplastrum citrinum, Cera arborea*); — *Vm.* Resinae Pini partes quatuor, Cerae tres, Sevi et Terebinthinae, singulorum unam (*Ceratum adhaesivum*); — *Huf.* Resinae partes sex, Cerae quatuor, Sevi duas et unam Terebinthinae (*Emplastrum citrinum*); — Per. Cerae sedecim, Resinae quatuordecim, Sevi duodecim et tres Terebinthinae (*Ceratum citrinum*).

℞. Resinae Pini
partes viginti quatuor.
Cerae flavae . . partes sedecim.
Sevi ovilli . . . . partes octo.
Terebinthinae . partes quatuor.
Liqua et adde
Pulveris Radicis Curcumae
partem unam.
Misce bene. (Bor. Br. O. Pal. R. Wir. Wür.) *Emplastrum s. Ceratum citrinum.*

℞. Picis navalis,
Resinae Pini,
Sevi ovilli,
Terebinthinae,
singulorum partes duas.
Cerae flavae . . . partes tres.
Liqua simul. (B*.) *Emplastrum Picis navalis s. sticticum Hamburgense.*

℞. Cerae flavae . . libram unam.
Resinae Pini . . . semilibram.
Sevi ovilli . . uncias quatuor.
Olei Olivarum,
Terebinthinae,
singulorum uncias duas.
Radicis Curcumae pulveratae drachmas duas.
Liqua et cola. (Fenn.) *Emplastrum Cerae terebinthinatum s. citrinum.*

Einige dieſer Formeln haben viel Aehn-

lichkeit mit der Basilicumsalbe, entweder in Ansehung der Beschaffenheit und der Zahl der Bestandtheile oder in Ansehung der verhältnißmäßigen Menge derselben zu einander.

Emplastrum Picis compositum, Unguentum Abbatiae du Bec. (Lon. LonN. *C. Ca. Vm.*)

℞. Resinae Burgundicae libras duas.
Olibani . . . . libram unam.
Resinae Pini,
Cerae flavae,
singularum uncias quatuor.
Olai Nucis moschatae
unciam unam.

Liqua picem, ceram et resinam et adde olibanum, tunc oleum. (Lon. *C.*)

Vm. Picis Burgundicae partes quatuor, Resinae Pini duodecim, Picis nigrae tantidem, Cerae flavae quatuor et Olei Nucis moschatae unam; — *Ca.* Axungiae, Picis Burgundicae, singularum libram unam, Cerae flavae uncias decem, Resinae Pini, Picis navalis, singularum quinque et Olibani drachmas decem; — LonN. Picis libras duas, Abietis Resinae libram unam, Resinae flavae, Cerae flavae, singulorum uncias quatuor, Olei Myristicae expressi unciam unam, Olei Olivarum, Aquae, singularum fluiduncias duas; pici, resinae et cerae simul liquefactis primum abietis resinam, dein olea et aquam adjice, misce et ad idoneam crassitudinem decoque.

Emplastrum defensivum viride. (Br. Wir.)

℞. Cerae flavae . . libram unam.
Resinae Pini . . uncias duas.
Sevi hircini . . . uncias sex.
Terebinthinae . unciam unam.
Pulveris Herbae Leontopodii
uncias sex.

Misce. — Addere potes, ut colorem magis saturatum obtineas, librae cuique Indigo pulverati scrupulum unum.

Br. Leontopodio Rutam substituit.

Emplastrum contra rachitidem. (B'.)

℞. Resinae Pini . . unciam unam.
Cerae flavae . . . semunciam.
Olei empyreumatici Tartari
drachmam unam.

Liqua simul. — Man will dieses Pflaster bei Rachitis der Kinder mit Erfolg gebraucht haben; es wird auf das Rückgrat gelegt.

Sparadrap resinosum. (*Vm.*)

℞. Resinae Pini,
Terebinthinae,
singularum partem unam.
Cerae albae . . partes quatuor.

Liqua simul et supra pannum e tela vel chartam extende.

Emplastrum Andreae a Cruce s. Resinarum glutinans s. Picis et Resinae. (GalM. His. *Ca. Vm.*)

℞. Picis albae . . . partes octo.
Elemi . . . . . partes duas.
Terebinthinae,
Olei laurini,
singulorum partem unam.

Liqua et cola. (GalM. *Ca. Vm.*)

His. Picis partes sedecim, Elemi quinque, Terebinthinae, Olei Olivarum, singulorum duas et Cerae albae unam.

Emplastrum maturans. (*Sw.*)

℞. Resinae Pini . . . semilibram.
Emplastri de Gummi-Resinis
libram unam.

Liqua simul.

Unguentum basilicum s. tetrapharmacum s. Picis s. Picis empyreumaticum s. piceum compositum s. regium s. Terebinthinae resinosum s. Picis et Cerae s. Terebinthinae et Picis.

1) *Unguentum basilicum flavum s. pallidum, Unguentum Resinae flavae, Ceratum Resinae, Unguentum emolliens s. aureum s. citrinum.* (Ams. Bor. Bor. D. DD. Fenn. Ful. Gen. Han. Hass. HassP. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. Sar. Sax. Suec. Wir. *Sw. Vm.*)

℞. Colophonii,
Cerae flavae,
singulorum partem unam.
Olei Olivarum . . partes tres.

Liqua simul. (Ams.)

Lus. Trium substantiarum partes aequales; — Lon. LonN. Resinae flavae, Cerae flavae, singularum libram unam et Olei octarium unum.

℞. Olei Palmae,
— Lini,
singulorum libras duas.
Cerae flavae . . . semilibram.
Resinae flavae . . sesquiunciam.

Liqua lente. (Ams.) — *Unguentum emolliens.*

℞. Colophonii,
Cerae flavae,
singulorum partem unam.
Axungiae Porci,
Olei Olivarum,
singulorum partes quatuor.

Liquefac blando igne. (Ful.)

Sw. Colophonii, Cerae, singulorum partem unam, Axungiae et Olei, singulorum sex.

℞. Colophonii,
Resinae Pini,

Cerae flavae,
Sevi hircini,
singulorum partes duas.
Olei Olivarum . . partes tres.
Liqua simul et cola. (His.)

Sw.* et *Vm.* Quatuor priorum substantiarum partem unam et Olei duas.

℞. Resinae Pini,
Cerae flavae,
Terebinthinae,
singularum partem unam.
Olei Napi . . . partes duas.
Liqua leute et cola. (DD.)

℞. Colophonii,
Cerae flavae,
Sevi ovilli,
singulorum partem unam.
Axungiae Porci . . partes tres.
Liqua et adde, ab igne removendo,
Terebinthinae partem dimidiam.
Misce bene. (Bor. D. Han. Hass. O. Pol. Sax.)

Bor. HassP. loco axungiae Oleum Olivarum; — R. Colophonii, Cerae, Sevi, Terebinthinae, singulorum partem unam et quatuor Axungiae; — Fenn et Suec. Colophonii, Cerae, Sevi, Terebinthinae, singulorum tres et Olei duodecim; — Li. Resinae Pini, Cerae, Sevi, Terebinthinae, singulorum unam et quinque Olei; — Gen. Colophonii, Picis Burgundicae, Cerae flavae, singulorum partes duodecim, Terebinthinae uncias tres et Olei Olivarum quatuordecim.

℞. Olei Olivarum . . libras duas.
Terebinthinae . libram unam.
Cerae flavae,
Colophonii,
singulorum uncias septem.
Mastichis,
Olibani, singulorum uncias duas.
Oroci . . . . . drachmas duas.
Liqua ceram, colophonium, mastichem, terebinthinam in oleo et mixturae semirefrigeratae adde olibanum et crocum pulverata. (Sar.)

Wir. Olei libras duas cum dimidia, Cerae flavae semilibram, Terebinthinae uncias duas, Colophonii, Resinae Pini, singulorum semunciam, Mastichis, Olibani, singulorum et Croci drachmam unam.

2) *Unguentum basilicum nigrum s. Resinae nigrae.* (Ams. An. B. Ba. Bel. Br. Gal. GalM. HassP. His. Lon. LonN. Pal. Sar. Wir. *Br. Sp. Sw. Vm.*)

℞. Picis nigrae,
Colophonii,
Cerae flavae,
singulorum partem unam
Olei Olivarum . partes quatuor.

Liqua simul picem et colophonium, adde ceram et oleum et per linteum trajice. (Ams. B. Ba. Bel. Gal. GalM. Sar. *Sp.*)

Lon. LonN. Picis uncias novem, Colophonii, Cerae, singulorum tantidem et Olei octarium unum.

℞. Picis nigrae,
Resinae Pini,
Cerae flavae,
Axungiae Porci,
singularum partem unam.
Olei Olivarum . . partes duas.
Liqua simul. (*Au. Sw*. Vm.*)

His. Quatuor priorum substantiarum partes duas et Olei tres.

℞. Picis nigrae,
Resinae Pini,
Cerae flavae,
Terebinthinae,
singularum partem unam.
Olei Olivarum . . partes octo.
Liqua simul. (*Br.*)

Br. praeterea Picis nigrae, Colophonii, Terebinthinae et Olei, singulorum partes aequales; — *Fi.* Quatuor priorum substantiarum et Sevi ovilli, singulorum partem unam, Olei duas.

℞. Cerae flavae,
Sevi vervecini,
Colophonii,
Picis nigrae,
Terebinthinae,
singulorum uncias tres.
Olei Olivarum . libram unam.
Liqua et adde
Pulveris Olibani . sesquiunciam.
Misce bene. (Br. HassP. Wir.)

Sw. Picis nigrae, Colophonii, Cerae flavae, singulorum semilibram, Olei libram unam cum dimidia, Terebinthinae uncias tres et Olibani unciam unam.

℞. Cerae flavae . . . uncias duas.
Croci . . . . . scrupulos duos.
Mastichis,
Myrrhae,
Picis navalis,
Sevi,
Olibani,
singulorum drachmas duas.
Colophonii,
Terebinthinae,
singulorum semunciam.
Olei Olivarum . . uncias tres.
Fiat unguentum. (Pal.)

Unguentum fuscum. (Br. Wir.)

℞. Olei communis . sesquilibram.
Cerae flavae . . uncias quatuor.
Colophonii,
Picis navalis,
singulorum uncias duas
Mastichis

Terebinthinae,
singulorum unciam unam.
Liqua et colaturae refrigeratae adde
Pulveris Galbani,
— Sagapeni,
— Olibani,
singulorum unciam unam.
— Aristolochiae rotundae
semunciam.
Misce sedulo.

Emplastrum adhaesivum s. simplex agglutinans s. glutinans Lithargyri s. Oxydi Plumbi semivitrei) cum Resina s. cum Resina Pini s. resinosum s. commune s. cum Resina s. Resinae s. polychrestum s. commune adhaesivum s. simplex s. lithargyricum cum Resina Pini, Ceratum resinosum. (Am. Ams. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Han. Hass. His. Lon. LonN. Lus. Pol. RC. Sax. Suec WW. *Au. Br. C. Fi. Pid. Sw. T. Vm.*)

℞. Olei Olivarum . . libras duas.
Lithargyri . . . libram unam.
Cerussae . . . uncias quatuor.
Coque lente, continue agitando et subinde Aquae pauxillum affundendo, ad consistentiam emplastri; adde deinde
Cerae flavae . . . uncias octo.
Terebinthinae communis
uncias duas.
Misce bene. (Fenn. Suec.)

Ba. coquere jubet Lithargyri partes octo in Axungiae duodecim et addere Resinae Pini partes sex et Picis nigrae tres.

℞. Emplastri simplicis partes sex.
Liqua blando calore et adde
Picis albae (Resinae flavae Lon.)
partem unam.
Misce exacte. (Ams. B. Bel. Gal. Gen. Lon. LonN. Lus. *Vm.*)

Br. Emplastri partes octo et unam Resinae; — Am. Ed. RC. et *C.* Emplastri quinque et Resinae unam; — R. Wir. et *Sp.* Emplastri duas et unam Resinae; — Bor4 Emplastri Lithargyri simplicis partes duas, Terebinthinae coctae unam, liqua et misce; — Du. Emplastri partes septem et unam Terebinthinae coctae; — *Vm.* Emplastri quinque et Terebinthinae coctae unam; — Fer. Emplastri simplicis sex, Emplastri Cerussae unam et Resinae Pini tantidem; — *Fi.* Cerati diapalmae libram unam, Cerati Cerussae, Resinae Pini, Terebinthinae, singulorum uncias duas; — *Au.* Emplastri Picis et Colophonii, singulorum partes aequales.

℞. Emplastri simplicis
partes viginti quatuor.
Picis Burgundicae . . partes sex.
Terebinthinae . partem unam.
Liqua. (Hass.)

Bor. Han. Pol. et *Vm.* Emplastri partes viginti quatuor, Picis duodecim et unam Terebinthinae; — HassP. Terebinthinae partem dimidiam, caeterum ut Bor; — *Sw.* Emplastri sedecim, Picis quatuor et unam Terebinthinae; — Sax. Emplastri duodecim, Picis sex et unam Terebinthinae; — Ful. Emplastri quatuor, Resinae sedecim et quatuor Terebinthinae; — *Pid.* Emplastri sex, Resinae duodecim et Terebinthinae quatuor.

℞. Emplastri simplicis libras duas.
Resinae Pini . . libram unam.
Cerae flavae . . sesquiunciam.
Liqua. (WW.)

℞. Emplastri simplicis
partes triginta octo.
Cerae flavae . . partes sedecim.
Liqua et adde
Terebinthinae . . partes tres.
Axungiae Porci . partem unam.
Misce bene. (*Vm.*)

℞. Emplastri simplicis sesquilibram.
Unguenti Althaeae,
Olei Olivarum,
singulorum uncias sex.
Terebinthinae . . uncias tres.
Cerae flavae . . . uncias duas.
Misce bene. (Br.)

℞. Emplastri simplicis . libras sex.
Ichthyocollae in Aquae Vitae unciis duabus dissolutae semunciam.
Oesypi . . . . uncias quatuor.
Resinae Pin,
Cerae flavae,
singularum uncias quatuor.
Terebinthinae . . semilibram.
Liqua simul resinam, ceram et terebinthinam, adde emplastrum liquatum, tunc oesypum cum ichthyocolla tritum et ad humidi totius evaporationem calefac. (His.)

Unguentum Lithargyri resinosum martiale s. agglutinans martiale. (Sax.)

℞. Colophonii . . . . . partes sex.
Terebinthinae . partes quatuor.
Liqua et adde.
Pulveris Mastichis partes duas.
Croci Martis . . partem unam.
Malaxa cum
Emplastri simplicis
partibus duodecim.

Emplastrum roborans s. stypticum. (Ful.)

℞. Emplastri adhaesivi (Ful.)
uncias duas.
Liqua et adde
Camphorae pulveratae,
Olei essentialis Carvi,
singulorum drachmam unam.
Misce sedule.

Teucrium.

Von dieser Pflanzengattung werden in den Pharmacopöen neun Arten angeführt:

1) *Teucrium Chamaedrys*, L.; Gamander, Gamanderlein; Germandrée commune, petit Chêne (*Gal.*); Garmander (*Ang.*); Kamanderle, Ozanka menssj (*B.*); Camedrio (*His. Lus.*); Gamanderlyn (*Bel.*); Camèdrio, Erba Querciola, Calamandrina (*I.*); Ozanka (*Pol.*); Ekegraes (*Suec.*).

Ams. An. B. Ba. Bel. BorC. Br. Du. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Li. Lus. R. Sax. Wir. Wür. WW. *Be. Br. Fi. G. M. Sp. Z.*

♃ (Didynamia Gymnospermia, L.; Labiatae, J.) Eine Pflanze des gemäßigten und südlichen Europa's. (*Blackw.* t. 180. *Plenck.* t. 477. *Hayne* VIII. 4. Fl. méd. III. 183.)

Man wendet das blühende Kraut (herba Chamaedryos s. Trissaginis s. Querculae minoris) an; es besteht aus einem viereckigen, dünnen, behaarten Stängel mit entgegengesetzten, gestielten, eirunden, glatten, oben graugrünen, unten blässern, tiefgekerbten Blättern und 2 oder 3 purpurrothen, kurzgestielten, in den Achseln der obern Blätter entspringenden Blüthen. Es hat einen sehr schwachen, gewürzhaften Geruch, welcher sich durch Trocknen verliert, und einen mäßig bittern, etwas styptischen Geschmack.

Reizend.

2) *Teucrium flavum*, L.; Gelber Gamander; Germandrée jaune (*Gal.*); Yellow flowered shrubby garmander (*Ang.*).

His.

♄ Eine Pflanze Spanien's und Italien's. (*Lob*, Icon. 490. 1.)

Man wendet das blühende Kraut (herba Teucrii flavi) an: es besteht aus einem behaarten Stängel mit eirunden, unten gekerbten, an der Spitze ganzen Blättern und gelben, seitenständige Trauben bildenden Blüthen. Es hat einen bittern Geschmack.

Reizend.

Extractum Chamaedryos. (Gal. GalM. Sax.)

℞. Summitatum Chamaedryos quantum vis.
Aquae bullientis quantum sufficit.
Infunde, cola et blando igne ad extracti consistentiam consume. (Gal. GalM.)

℞. Herbae Chamaedryos recentis et contusae . . . . libras octo.
Macera per tres dies in alembico et destillatione uncias circiter duas aquae abstrahe; residuo infunde Aquae triplum et post sex horas digestionis coquendo ad tertiae partis remanentiam consume; clarifica liquorem et cola; tunc ad electuarii consistentiam evaporato tepido solum aquam destillatam adde. (Sar.)

Decoctum Chamaedryos amarum. (His.)

℞. Summitatum Chamaedryos semunciam.
— Absinthii,
— Centaurii minoris, singulorum drachmas duas.
Aquae . . . . libras duas.
Decoque ad dimidii remanentiam et sub finem adde
Florum Chamomillae drachmas duas.
Foliorum Sennae sesquiunciam.

Man läßt oft die Senna, durch welche die sonst bittere und tonische Abkochung laxirend wird, weg. — Gabe, vier bis sechs Unzen.

Infusum Chamaedryos. (Gal. GalM. *Sp.*)

℞. Herbae Chamaedryos unciam unam.
Aquae bullientis octarium unum.
Infunde. (GalM. *ParC.*)

℞. Foliorum recentium Chamaedryos unciam unam.
Aquae bullientis . libras duas.
Infunde et colaturae adde
Syrupi Capilli Veneris aut Mellis unciam unam.
Misce. (Gal.)

3) *Teucrium Chamaepitys*, L.; Schlagkraut, Feldcypresse, Erdweihrauch; Ivette commune (*Gal.*); Ground pine (*Ang.*); Ywa, Polnj cypris (*B.*); Camepiteos, Pinillo oloroso (*His.*); Veldcypress (*Bel.*); Camepizio (*I.*); Iwinka, Piznowa (*Pol.*); Chamepite (*Lus.*).

Ams. An. B. Ba. Bel. Br. Fer. Ful. Gal. Gen. His. Li. R. Sax. Wir. Würt. *Be. Br. G. M. Sp. Z.*

⊙ Eine Pflanze, welche in ganz Europa wächst. (*Blackw.* t. 528. *Plenck* t. 475. *Hayne* VIII. 1. *Zorn* Ic. pl. t. 120.)

Man wendet das blühende Kraut (herba Chamaepityos s. Ivae arthriticae s. Chamaemori) an; es besteht aus einem ästigen, behaarten Stängel mit bis über die Hälfte in drei linienförmige Lappen getheilten Blättern und einzelnen, gelben, stiellosen, in den Achseln der obern Blätter sitzenden Blüthen. Es hat einen harzigen und schwach balsamischen Geruch, welcher sich beim Trocknen verliert. Der Geschmack ist scharf, bitter und styptisch.

Tonisch, magenstärkend.

4) *Teucrium Iva*, *L.*; Bisamginsel; Ivette musquée (*Gal.*).

Gal.

☉ Eine Pflanze des mittägigen Europa's. (*Cav.* II. t. 120.)

Man wendet das Kraut (herba Ivae s. Chamaepityos Monspeliacae) an; es besteht aus einem ästigen Stängel mit ganzen, bloß an der Spitze mit zwei Zähnen versehenen Blättern. Es hat einen starken, harzigen, etwas moschusartigen Geruch, besonders bei großer Hitze, und einen bittern Geschmack.

Extractum Ivae (Sar.)

℞. Herbae Ivae (arthriticae) recentis et contusae . . libras octo.

Digere per tres dies in alembico, tunc destillationis in balneo aquae ope aquae uncias duas abstrahe; residuo infunde Aquae triplum et coctione ad tertiae partis remanentiam consume, clarifica et cola liquorem, cui ad electuarii consistentiam evaporato et nonnisi tepido aquam adde.

5) *Teucrium Marum*, *L.*; Amberkraut, Katzenkraut; Marum (*Gal.*); Lathhymo (*Ch.*); Kocicj korenj (*B.*); Maro cortuso (*His.*); Maro, Erba gatta (*I.*); Ambrowe ziele (*Pol.*); Katgraes (*Suec.*).

Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. Du. Fer. Ful. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. His. Li O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. *Be. Br C. Fi. G. M. Pid. Sp.* Z.

♃ Eine Pflanze, welche im südlichen Europa und in der Levante wächst. (*Blackw.* t. 47. *Plenck* t. 474. *Hayne* VIII. 2. *Zorn* Ic. pl. t. 60.)

Man wendet das blühende Kraut (herba Mari veri s. Syriaci) an; es besteht aus dünnen, filzigen Aesten mit kleinen, eirundlanzettigen, gestielten, oben graulichgrünen, unten weißfilzigen Blättern und purpurrothen, einzeln in den Achseln der obern Blätter, aber genähert stehenden und so eine lange, nach einer Seite gewendete Traube bildenden Blüthen. Es hat einen sehr gewürzhaften und durchdringenden Geruch und einen brennenden, scharfen, gewürzhaften, etwas bittern Geschmack.

Reizend, Ausdünstung befördernd, harntreibend, emmenagogisch, Brust- und Nießmittel. — In Pulver, zehen bis dreißig Gran.

Tinctura Mari veri aetherea. (B*. O.)

℞. Herbae Mari,
Liquoris anodyni mineralis,
singulorum unciam unam.
Alcoholis concentrati uncias tres.

Digere per dies quatuor temperatura depressa in vase tecto, saepius agitando et filtra.

Reizend, bei Lähmungen gerühmt und da anwendbar, wo der Aufguß der Pflanze Ekel erregt. — Gabe, vierzig Tropfen.

Aqua vulneraria s. styptica Clementina s. aromatica composita cum Acido acetico, Aquâ del carcerato di Roma. (Fer. *Fi.*)

℞. Succi Majoranae,
— Saniculae,
— Verbenae,
— Sedi majoris,
— Pimpinellae albae,
— Millefolii,
— Bryoniae,
singulorum uncias tres.
Mari . . . . uncias quatuor.
Salis culinaris,
Subcarbonatis Potassae,
singulorum uncias sex.
Cremoris Tartari uncias quatuor.
Aloës . . . . . sesquiunciam.
Aceti . . . . . libram unam.

Post horas viginti quatuor digestionis destillent ad siccum, residuum pulveratum producto adde, novae destillationi subjice et sic ter repete.

Fi. Succi Saniculae, Verbenae, Betonicae, Sedi majoris, Millefolii, singulorum uncias septem, Mari, Serpylli, singulorum uncias tres, Cremoris quatuor, Aloës unam, Aceti libram unam; productum tribus destillationibus obtentum per pulverem carbonis recens paratum filtra.

Gabe, bis zu einer halben Unze.

6) *Teucrium Creticum*, *L.*; Cretischer Gamander; Polium de Crète (*Gal.*).

Gal. Wir *Be. M. Sp.*

♃ Eine Pflanze Creta's und Aegypten's. (*Abp.* Exot. p. 105. t. 102.)

Man wendet das blühende Kraut (herba et summitates Teucrii s. Polii Cretici s. Rorismarini stoechadis facie) an; es besteht aus einem vierkantigen Stängel mit sitzenden, ganzen, lanzettförmigen Blättern und violetten, gestielten zu je drei in achselständigen Trauben vereinigten Blüthen. Es hat einen starken, gewürzhaften, angenehmen Geruch und einen sehr bittern Geschmack.

7) *Teucrium montanum*, *L.*; Bergpolei; Polium de montague (*Gal.*).

Gal.

♃ Eine Pflanze des südlichen Europa's. (*Zorn* Ic. pl. t. 362.)

Man wendet die Spitzen (summitates Polii montani) an; sie bestehen aus weißlichfilzigen Zweigen mit lanzettförmigen, ganzen, an den Rändern eingerollten, unten filzigen Blättern und weißlichen oder gelblichen, fast sitzenden Blüthen, welche

faft eine ausdauernde zwiebliche Staude bilden. Sie haben einen sehr angenehmen Geruch und einen bittern Geschmack.

8) *Teucrium Scordium, L.*; Knoblauchsgamander, Scordienkraut, Lachenknoblauch; Germandrée d'eau (*Gal.*); Watergamander (*Ang.*); Plany neb wodnj cesnek (*B.*); Scordio, Erba d'odor d'aglio (*I.*); Laegsurt (*D.*); Scordio (*His.*); Waterbock (*Bel.*); Czosnkowe ziele (*Pol.*); Escordio (*Lus.*); Gamander (*Suec.*).

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Fenn. Fer. Pul. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. Li. Lus. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. *Be. Br. Fi. G. M. Pid. Sp. Z.*

4 Eine in ganz Europa wachsende Pflanze. (*Blackw.* t. 475. *Bull.* t 205. *Plenck.* t. 476. *Hayne* VIII. 3. *Zorn* Ic. pl. t. 36.)

Man wendet das Kraut (herba Scordii s. Chamaedrys aquaticae) an; es besteht aus einem behaarten, ästigen Stängel und eirunden, länglichen, sitzenden, gekerbten oder gezähnten Blättern. Gerieben hat es einen knoblauchartigen und balsamischen Geruch, welches nach dem Trocknen weniger merklich ist und einen bittern, scharfen und etwas styptischen Geschmack.

9) *Teucrium Scorodonia, L.*; falsches Scordienkraut; Scordium faux (*Gal.*).

Gal. Wir. *G.*

4 Eine Europäische Pflanze. (*Bull.* Herb. t. 301.)

Man wendet das Kraut (herba Scorodoniae s. Sabinae sylvestris s. agrestis) an; es besteht aus gestielten, herzförmigen, gezähnten und gerunzelten Blättern.

Reizend, tonisch, Ausdünstung befördernd.

Conserva Scordii. (His.)

℞. Foliorum recentium Scordii partem unam.

Contunde in mortario marmoreo, cum pistillo ligneo, addendo sensim

Sacchari pulverati partes duas.

Extractum Scordii. (Br. Pal. Sar. Wir.)

℞. Herbae Scordii . libram unam.
Aquae fontanae . . libras sex.

Digere per dies quatuor in loco calido, tunc parumper coque, cola exprimendo et colaturam ad aptam consistentiam consume. (Br. Pal. Wir.)

℞. Herbae Scordii . . libras octo.

Digere per tres dies in alembico, destillando deinde uncias circiter duas abstrahe, residuo triplum Aquae infunde, coquendo partes duas consume, clarifica et cola liquorem, ad electuarii consistentiam consume et huic nonnisi tepido Aquam destillatam adde. (Sar.)

Gabe, eine halbe bis ganze Drachme.

Aqua Scordii. (Br. Gal. Pal. Sar.)

℞. Herbae Scordii florescentis partem unam.
Aquae . . . partes quatuor.

Destillet dimidia pars et denuo supra novam herbam destilletur. (Sar.)

Gal. Herbae partes quinque et Aquae viginti; destillent partes decem; — Br. Herbae partem unam et Aquae tres; destillet dimidia pars; — Pal. Herbae partem unam, Aquae quatuor; destillet dimidium.

Gabe, eine bis drei Unzen.

Syrupus Scordii s. de Scordio. (Gal. Wir. *Fi.*)

℞. Herbae Scordii uncias quatuor.
Aquae bullientis . libram unam.

Infunde per noctem; exprime deinde, clarifica et in novem unciis colaturae solve

Sacchari albi . uncias sedecim.

Fiat syrupus. (Wir.)

℞. Herbae siccatae Scordii unciam unam.
Aquae destillatae Scordii libras duas.

Digere in balneo aquae per horas duas in vase tecto, cola, filtra et colaturae adde

Sacchari albi . . . . duplum.

Liqua in balneo aquae et cola per pannum. (Gal. *Fi.*)

Gabe, eine halbe bis eine Unze.

Infusio anthelmintico-incitans, Infusum vermifugum. (*B.*)

℞. Foliorum Scordii . semunciam.
Aquae . . . quantum sufficit ut unciae octo infusi obtineantur. Colaturae adde

Aetheris sulphurici semidrachmam.

Löffelweise.

Mixtura anthelmintico-incitans, Potio vermifuga. (*B.*)

℞. Helmintochortos drachmas duas.
Foliorum Scordii . semunciam.
Aquae . . . quantum sufficit ut unciae decem infusi obtineantur; colaturae adde

Aetheris sulphurici semidrachmam.
Syrupi Cinnamomi semunciam.

Allmälig zu nehmen.

Decoctum antisepticum. (*Ca.*)

℞. Foliorum Scordii,
— Alliariae,
— Marrubii albi,
singulorum uncias duas.

Aquae . . . . uncias quatuor.
Coque et adde
Oxymellis scillitici semilibram.
Aceti theriacalis unciam unam.
Nitri . . . . . drachmas tres.

Reizend, bei fauligen Krankheiten mit beschwerlicher Expectoration empfohlen.

Fomentum aromaticum. (*Au.*)

℞. Herbae Scordii,
Florum Chamomillae,
singulorum unciam unam.
Aquae bullientis . . libras tres.
Coque parumper et adde colaturae
Aquae Vitae camphoratae
uncias quatuor.

Tinctura s. Essentia Scordii. (Br. Pal. Wir.)

℞. Herbae Scordii . . uncias tres.
Alcoholis . . . uncias sedecim.

Post tres dies digestionis colaturam infunde in

Herbae Scordii . uncias duas.

Macera denuo per aliquot tempus, exprime et filtra. (Pal. Wir.)

Br. digerere jubet Scordii unciam unam in Alcoholis concentrati quatuor.

Reizend, für giftwidrig und Ausdünstung befördernd gehalten. — Gabe, sechszig Tropfen.

Essentia alexipharmaca Stahlii. (Br. Li. Pal. Wir. *Ca. Sp.*)

℞. Radicis Pimpinellae albae,
— Vincetoxici,
— Carlinae,
singularum sesquiunciam.
— Angelicae,
— Imperatoriae,
— Inulae,
singularum unciam unam.
Herbae Scordii . . uncias tres.
Alcoholis libras duas cum dimidia.

Digere, exprime et filtra. (Br. Wir.)

Pal et *Sp.* Pimpinellae sesquiunciam, Vincetoxici tantidem, Carlinae semunciam, Angelicae, Imperatoriae, Inulae, singularum unciam unam; sed *Sp.* Scordii uncias sex et Alcoholis libras duas, *Pal.* Scordium omittens, Alcoholis libram unam indicat.

Die Formel von *Ca.* ist verstümmelt und wird daher nicht besonders angeführt.

℞. Radicis Angelicae,
— Imperatoriae,
— Inulae,
singularum semunciam.
— Carlinae . drachmas duas.
— Vincetoxici,
— Pimpinellae albae,
singularum drachmas tres.
Herbae Scordii . . uncias duas.
Alcoholis . . . libram unam.

Post duos dies digestionis, blando calore, cola exprimendo.

Reizend, tonisch, magenstärkend, blähungtreibend, harntreibend und Ausdünstung befördernd. — Gabe, vierzig bis fünfzig Tropfen.

Essentia alexipharmaca temperata Stahlii. (Wir. *Sp.*)

℞. Radicis Pimpinellae albae,
— Vincetoxici,
singularum uncias tres.
Herbae Scordii . uncias duas.
Alcoholis . . . . libras tres.

Post sufficientem extractionem filtra, spiritus trientem destillando in balneo aquae abstrahe et reliquum serva. (Wir.)

℞. Tincturae Pimpinellae albae,
— Vincetoxici,
singularum unciam unam.
— Scordii . . uncias duas.

Misce. (*Sp.*)

Reizend, weniger kräftig als das vorhergehende — Gabe, vierzig bis sechszig Tropfen.

Essentia de Scordio composita, Diascordium liquidum, Tinctura Scordii composita. (Sax. Wir. *Vm.*)

℞. Herbae Scordii . . uncias duas.
Corticis Citri . unciam unam.
Myrrhae electae,
Radicis Gentianae,
singularum drachmas sex.
— Angelicae,
— Vincetoxici,
— Levistici,
— Zedoariae,
— Contrayervae,
— Tormentillae,
— Valerianae,
singularum semunciam.
Succini,
Ligni Aloës,
singulorum drachmas tres.
Croci drachmas duas cum dimidia.
Florum Sambuci drachmas duas.
Opii . . . . drachmam unam.

Fiat e toto pulvis, cui infunde

Spiritus Juniperi . . libras tres.

Digere blando calore, in vase clauso, et filtra. (Wir.)

℞. Herbae siccatae Scordii
partem unam.
— Cardui benedicti
partem dimidiam.
Radicis Angelicae
partis quadrantem.
Alcoholis . . . . partes octo.

Post dies octo digestionis in vase tecto, cola exprimendo et filtra. (Sax.)

℞. Foliorum Scordii partes quatuor.

Poliorum Cardui benedicti partes duas.
Radicis recentis Angelicae partem unam.
Aquae Vitae partes triginta duas.
Infunde frigide per plures dies, cola exprimendo et filtra. (*Vm.*)

Reizend, giftwidrig, schmerzstillend und magenstärkend. — Eine Unze enthält etwa zwei Gran Opium.

Elixir balsamicum spirituosum Hoffmanni. (Br. Wir. *Sp.*)

℞. Herbae Scordii . unciam unam.
— Centaurii minoris,
Corticis Aurantiorum,
Myrrhae electae,
singulorum sesquiunciam.
Radicis Zedoariae,
Nucis moschatae,
singulorum drachmas tres.
Ligni Aloës . sesquidrachmam.
Croci . . . drachmam unam.
Succini . . . drachmas tres.
Alcoholis . . . . sesquilibram.

Post sufficientem digestionem cola exprimendo, filtra liquorem et adde
Olei Cardamomi,
— Caryophyllorum,
singulorum guttas decem, dissolutas in
Alcoholis ammoniacalis uncia una.

Reizend, ehedem als giftwidrig, anticatarrhalisch, magenstärkend gerühmt und besonders von Hoffmann bei chronischen Diarrhöen empfohlen. — Gabe, sechzig Tropfen, täglich zwei Mal.

Thalictrum.

Thalictrum flavum, L.; Wiesenrauteheilblatt, Wiesenrautewurz; Pigamon jaune, Rue des prés, Fausse rhubarbe, Rhubarbe des pauvres (*Gal.*); Common meadow rue (*Ang.*); Kneppanden (*D.*); Waterruid (*Bel*); Wrzodowiec (*Pol.*); Torrvaeckgraes (*Suec.*).
Br. Gal. Gen. *Br. M. Sp.*

♃ (Polyandria Polygynia, L.; Ranunculaceae, *J.*) Eine in Europa auf Wiesen sehr gemeine Pflanze. (*Zorn* Ic. pl. t. 406.)

Man wendet die Wurzel (radix Thalictri flavi s. magni s. Rhabarbari pauperum) an; sie ist frisch hellbraun, nach dem Trocknen dunkelbraun, inwendig gelb und voll eines süßlichen, hintennach bitter und scharf schmeckenden Saftes. Speichel, Excremente und Urin werden dadurch gelb gefärbt.

Purgirend. — Gabe, eine bis zwei Unzen.

Thapsia.

Thapsia Asclepium, L.; schmalblättrige Thapsie; Thapsie Asclepion (*Gal.*); Narrow leav'd carrot (*Ang*); Tapsia, Comino rostico (*His.*).
His.

♃ (Pentandria Digynia, L.; Umbelliferae, *J.*) Eine Pflanze des mittägigen Europa's. (*Mor.* Hist t. 18.)

Wurzel und Saamen, welche man anwendet, sind reizend und gelten für auflösend.

Oleum Thapsiae antirheumaticum. (His.)

℞. Radicis Thapsiae,
Foliorum Rorismarini,
Vini rubri,
singulorum libram unam.
Olei Olivarum . libras quatuor.

Post quatuor dies digestionis coque ad consumptionem humidi usque et cola.

Thea.

Thea viridis, L.; Thee; Thee (*B. Bel. Suec*); Tea (*Ang.*); Cha (*Ar. G. Duk. Pe.*); The (*D.*); Te (*His. I. Lus.*); Tjao (*Ja.*); Fjcha (*R.*).
Br. Fer. Gal. His. *A. Be. Br. Fi. G. M. Sp Z.*

Ein Strauch (Polyandria Monogynia, L.; Aurantiaceae, *J.*) Chinas. (*Blackw.* t. 352. et 51. *Plenck* t. 427 et 26. *Hayne* VII. t. 28. 29. 27. Düse, off. Pfl. VIII. t. 2. 1. 3. *Bert.* Bild. I. 46. f. 2. Fl. méd. VI. 339.)

Die Blätter, welche man anwendet, sind grün, etwas glänzend, hart, glatt, eirundlanzettförmig oder elliptisch, am obern Theile mit Sägezähnen versehen, am Grunde ganz, mit mittelmäßig langen Stielen, getrocknet und eingerollt, entweder der Länge nach oder mehr auf sich selbst; bisweilen, wenn sie geschnitten sind, zeigen sie sich in kleinen, länglichen oder rundlichen, grünlichen, runzlichen Stücken von sehr angenehmem, gewürzhaftem Geruch und einem bittern, etwas styptischen Geschmack.

Im Handel kommen viele Sorten Thee vor, von denen die vorzüglichsten den Namen Hayson, Schulang-, Perlthee, poudre à canon, saot-chaon oder Bouy- und Pekaothee führen; die beiden letztern sind weniger geschätzt und kommen von Thea Bohea, L., welche man als eine bloße Varietät von viridis betrachtet.

Reizend, Ausdünstung befördernd. — Gabe, eine oder zwei Drachmen auf die Pinte kochendes Wasser.

Thlaspi.

Wir führen hier folgende drei Arten die-

ser Gattung, welche in den Pharmacopöen angezeigt sind, an:

1) *Thlaspi campestre*, *L.*; Feldtäschelkraut; Thlaspi champêtre (*Gal.*).
Gal.
♂ (Tetradynamia Siliculosa, L.; Cruciferae, *J.*) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (*Blackw.* Herb. t. 409.)
Man wendet den Saamen (semen Thlaspeos) an, er ist rundlich, platt, dunkelbraun und von scharfem, brennendem Geschmack.

2) *Thlaspi arvense*, *L.*; Bauernsenf, Ackertäschelkraut; Thlaspi des champs (*Gal.*); Penny cress (*Ang.*); Penjzek aneb sedlska horvice (*B.*); Pengeurt (*D.*); Wilde mosterd (*Bel*); Penninge graes (*Suec.*).
Br. Gal. Wir. *Be. Br. M. Sp.* Z
Man wendet den Saamen (semen Thlaspeos) an; er ist sehr klein, rundlich und etwas platt und hat einen starken, knoblauchartigen Geruch und einen etwas scharfen und bittern Geschmack.

3) *Thlaspi Bursa pastoris*, *L.*; Täschelkraut Taschenkraut, Hirtentasche, Hirtentäschelkraut; Bourse à pasteur (*Gal.*); Shepherd's burse (*Ang.*); Bolsa de pastor (*His.*); Bearsjes kruid (*Bel.*).
Br. Gal Gen. His. Wir. *Be. M. Sp.*
⊙ Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (*Blackw.* t. 5. *Plenck* t. 516. *Zorn* Ic. pl. t. 138.)

Man wendet das Kraut (herba Bursae pastoris s. Cancri s. Sanguinariae) an; es besteht aus einem Büschel fiederspaltiger Wurzelblätter und hat einen faden, etwas kohlartigen Geruch und einen scharfen, adstringirenden Geschmack.
Ein schwach adstringirendes Mittel, welches nur wenig in Gebrauch ist.

Thymus.

Unter den Arten dieser Pflanzengattung werden in den Pharmacopöen besonders folgende vier angeführt:

1) *Thymus Alpinus*, *L.*; Alpenthymian, Alpenquendel; Thym des Alpes (*Gal.*); Alpine thyme (*Ang.*).
Br.
♃ (Didynamia Gymnospermia, L.; Labiatae, *J.*) Eine auf den Alpen wachsende Pflanze. (*Jacq.* Flor. Austr. I. t. 97.)
Man wendet das blühende Kraut (herba Clinopodii montani) an; es besteht aus einem rundlichen, ästigen Stängel mit gestielten, rundlichen, stumpfen, etwas sägezähnigen und hohlen Blättern und hat einen sehr angenehmen, gewürzhaften Geruch und Geschmack.

2) *Thymus mastichina*, *L.*; Mastix Thymian; Thym collé, Marjolaine sauvage (*Gal.*); Mastic thyme (*Ang.*); Mejorana silvestre (*His.*)
His.
♄ Eine Pflanze Spanien's und Italien's. (*Blackw.* Herb. t. 134.)
Man wendet das blühende Kraut (herba Mastichinae Gallorum s. Mari vulgaris) an; es besteht aus einem walzigen Stängel mit kurzgestielten, eirunden, ganz kurz sägezähnigen, auf beiden Seiten glatten Blättern und wirtelförmig gestellten weißen Blüthen. Es hat einen angenehmen Geruch und Geschmack.

3) *Thymus vulgaris*, *L.*; gemeiner Thymian; Thym commun (*Gal.*); Garden thyme (*Ang.*); Wlaska neb kzjmska materj dausska (*B.*); Thymian (*D.*); Tomillo (*His.*); Gemeen thym (*Bel.*); Timo (*L.*); Tymian, Szmer wloski (*Pol.*); Tomilho (*Lus.*); Timjan (*Suec.*).
Ams. An. B. Bel. Bor. Bor4. Br D. Fer. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. Lus. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. WW *Be. Br G. M. Pid. Sp.* Z.
♄ Eine Pflanze des südlichen Europa's. (*Blackw.* t. 221. *Plenck* t 489. *Zorn* Ic. pl. t. 458.)
Man wendet das blühende Kraut (herba et flores Thymi vulgaris s. hortensis) an; es besteht aus einem walzigen, wenig ästigen, sehr behaarten Stängel, an welchem kleine gegenüberstehende, stiellose, an den Rändern etwas zurückgerollte, schmale, fast stumpfe, unten etwas behaarte, oben graugrüne Blätter sitzen; die purpurrothen, gedrängte, von Deckblättern begleitete Köpfe oder Aehren an der Spitze der Zweige bildenden Blüthen haben einen angenehmen, starken, gewürzhaften Geruch und einen brennenden, gewürzhaften Geschmack.

4) *Thymus Serpyllum*, *L.*; Quendel, Feldkümmel, wilder Thymian; Serpolet (*Gal.*); Mother of thyme (*Ang.*); Materj dausska (*B.*); Wild thymian (*D.*); Serpol (*His.*); Wild tym (*Bel.*); Sermolina, serpillo (*J.*); Maciezanka (*Pol.*); Serpao (*Lus.*); Schadownik (*R.*); Backtimian (*Suec.*).
A. Ams. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. Li. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Wir. Wür. WW. *Be. Br. G. M. Pid. Sp.* Z.
♄ Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (*Blackw.* t. 418. *Plenck* t. 490. Fl. méd. VI. 326.)

Man wendet das blühende Kraut (herba et flores Serpylli) an; es besteht aus einem ästigen, etwas behaarten Stängel mit kleinen, fast sitzenden, an den Rändern behaarten, eirunden oder lanzettförmigen Blättern und sehr kurzen, achselständigen, gestielten, büschelweise stehenden Blüthen, welche in sehr kurze Aehren und oft auch in eine Art endständigen Kopf vereinigt sind. Der Geruch ist angenehm, der Geschmack bitter und balsamisch.

Infusum Thymi. (GalM.)

℞. Summitatum Thymi,
Liquiritiae rasae,
singulorum drachmas duas.
Aquae bullientis quantum sufficit ut colaturae octarius (litre) obtineatur.

Oleum Thymi aethereum s. essentiale, Aethereoleum Thymi. (Ba. Bor4. Br. D. Gal. Han. HassP. Pal. Sar. Sax.)

℞. Herbae florescentis Thymi
partes quinque.
Aquae . . . . partes septem.
Destillent. (Gal.)

D. Florum partem unam et Aquae sex; — Han. HassP. et Sax. Florum unam et octo Aquae; — Ba. Florum unam et novem Aquae.

℞. Herbae florescentis Thymi
partes viginti quinque.
Aquae partes septuaginta quinque.
Salis culinaris . . partes tres.
Post tres dies fiat destillatio. — Gabe, zwei bis vier Tropfen.

Bor4. Oleum venale. Pond. spec. = 0, 902.

Oleum Serpylli aethereum, Aethereoleum Serpylli. (A. Ba. Br. Han. Pal. Sax.)

℞. Herbae florescentis Serpylli
partem unam.
Aquae purae . . . partes octo.
Destillent. (Han. Sax.)

Ba. Serpylli partem unam et Aquae novem; — A. Serpylli unam et Aquae duodecim.

℞. Herbae florescentis Serpylli
partes viginti quinque.
Aquae partes septuaginta quinque.
Salis culinaris . . partes tres.
Post tres dies macerationis fiat destillatio. (Br. Pal.)

Aqua Thymi. (Gal. Wür.)

℞. Herbae florescentis Thymi
partes quinque.
Aquae . . . . partes viginti.
Destillent partes decem. (Gal.)

Wür. Herbae partem unam et Aquae sex. — Gabe, zwei bis vier Unzen.

Aqua Serpylli. (Sar.)

℞. Herbae florescentis Serpylli
partem unam.
Aquae . . . . partes quatuor.
Destillata parte dimidia denuo destillent supra novam herbam.

Spiritus s. Alcohol Thymi. (Br.)

℞. Herbae florescentis Thymi libram unam et uncias duas.
Aquae Vitae . . . libras octo.
Destillent tres quadrantes. — Gabe, eine halbe bis eine Drachme.

Spiritus aromaticus. (Li.)

℞. Herbae Thymi . . uncias tres.
— Mari . . unciam unam.
Radicis Zedoariae,
Carvi, singulorum uncias duas.
Alcoholis . . . . uncias octo.
Post horas viginti quatuor macerationis adde
Aquae . . . . . libras octo.
Destillent lente librae octo.

Spiritus Serpylli. (A. Bor. Bor4. Br. D. Ful. Han. Hass. HassP. Li. Pal. Pol. Sar. Sax. Wir. Wür. *Pid. Sw.*)

℞. Herbae florescentis Serpylli
partem unam.
Alcoholis . . . partes quatuor.
Post tres dies destillet dimidia pars. (Bor. Br. Han. Hass. Pal. Pol. Sax. Wir. *Pid.*)

Li. Herbae partem unam et sex Alcoholis; destillet dimidia pars; — D. et Ful. Herbae partem unam et sex Alcoholis; destillent trientes duo et denuo supra partem novae herbae dimidiam destilletur; — Wür. Herbae sesquilibram et decem Alcoholis; productum supra uncias tres novae herbae denuo destilletur; — Sar. Herbae partem unam et quatuor Alcoholis; denuo supra novam herbam destilletur.

℞. Herbae recentis Serpylli
partem unam,
Alcoholis (0,910)
partes quatuor cum dimidia.
Aquae . . . . . partes sex.
Post horas viginti quatuor destillent partes quatuor. (0, 913). (A.)

Vm. Serpylli partem unam, Aquae Vitae quatuor, Aquae duodecim; destillent partes tres cum dimidia; — *Sw.* Herbae partes duodecim, Alcoholis sex et Aquae duas; destillent partes sex; productum supra partes duodecim Herbae recentis, cum Aquae duabus infunde et destillando partes sex abstrahe; — Bor4. HassP. Serpylli libram unam, Spiritus rectificati quatuor, Aquae quantum satis; post ma-

cerationem per viginti quatuor horas destillent libras quatuor.

Aqua benedicta Serpylli s. Serpylli composita. (Sar. Wir. *Sp.*)

℞. Herbae florescentis Serpylli manipulos quatuor.
Florum Chamomillae,
Summitatum Saturejae,
— Thymi,
singulorum manipulum unum.
Vini . . . . . libras sex.

Post tres dies macerationis destillet dimidium; in producto infunde
Calami aromatici,
Cassiae ligneae,
Cinnamomi,
Macidis, singulorum semunciam.

Post horas viginti quatuor destillent ad siccum. (Sar.)

℞. Herbae florescentis Serpylli libras duas.
— — Saturejae,
— — Thymi,
Florum Chamomillae, singulorum uncias duas.
Cinnamomi . . . uncias tres.
Macidis . . . . . semunciam.
Vini albi . . libras octodecim.

Stent in digestione per duos dies, tunc lente librae octo destillent. (Wir.)

℞. Radicis Zedoariae,
— Galangae,
singularum drachmam unam.
— Paeoniae . sesquiunciam.
Herbae Serpylli manipulos sex.
— Foeniculi manipulos quatuor.
— Verbenae,
— Melissae,
Florum Tiliae,
— Liliorum Convallium,
— Lavandulae,
— Rorismarini,
singulorum manipulos duos.
Cubebarum . drachmam unam.
Cinnamomi . . semidrachmam.
Macidis,
Nucis moschatae,
singulorum drachmas duas.
Visci querni . . sesquiunciam.
Vini generosi uncias centum nonaginta duas.

Destillent. (*Sp.*)

Kopfschmerz lindernd, herzstärkend, blähungtreibend, Menstruation befördernd. — Gabe, eine halbe bis eine Unze.

Tilia.

Tilia Europaea, L.; Linde; Tilleul (*Gal.*); Limetree (*Ang.*); Ljpa (*B.*); Lind (*D. Suec.*); Linde (*Bel.*); Tilio (*His.*); Tiglio (*I.*); Lipo (*Pol.*).

Ams. An. Ba. Bel. Br. D. Fer. Pul. Gal. GalM. Gen. HassP. His. O. Pol. Sax. Wir. Würr. *Be. Br. Fi. G. M. Sp.* Z.

Ein Baum (Polyandria Monogynia, L.; Tiliaceae, *J.*), welcher in ganz Europa wächst. (*Hayne* III. 47. 48. *Blackw.* t. 469. *Plenck* t. 424. Düss. off. Pfl. IV. t. 18. *Bert.* Bild. V. 68. *f.* 1. *Zorn* Ic. pl. t. 287.)

Man wendet die Blüthen (flores Tiliae) an; sie sind gelblich und haben einen sehr angenehmen, bei'm Trocknen sich grossentheils verlierenden Geruch und einen süßen, schleimigen Geschmack.

Krampfstillend, schwach die Ausdünstung befördernd, besonders wenn viel wässeriges und sehr warmes Vehikel genommen wird.

Conserva Florum Tiliae. (Sar.)

℞. Florum Tiliae . partem unam.
Sacchari ad plumam cocti partes tres.
Serva.

Infusum Tiliae. (Gal. GalM. *ParC. Ra.*)

℞. Florum Tiliae . drachmas duas.
Aquae bullientis . libras duas.
Infunde et cola. (GalM. *Ra.*)

℞. Infusi Florum Tiliae libras duas.
Aquae Florum Aurantiorum uncias duas.
Misce. (*Ra.*)

℞. Florum Tiliae . drachmas duas.
Aquae bullientis . libras duas.
Post infusionem per horae quadrantem cola et colaturae adde
Syrupi Althaeae unciam unam.
Misce bene. (Gal.)

ParC. Florum, Liquiritiae, singulorum drachmas duas et Aquae bullientis octarium unum.

Schwach krampfstillend. Gemeiniglich setzt man zum ersten dieser Aufgüsse etwas Sauerhonig oder Syrupus tartaricus und versüßt ihn mit Gummisyrup, bisweilen auch mit syrupus diacodion. Der zweite wird von Chaussier bei nervösen Affectionen mit hysterischem Krampf empfohlen. Oft setzt man zwei Drachmen l. q. Hoffm. zu. Beide müssen heiß genommen werden.

Aqua Tiliae, Aqua Florum Tiliae. (Ful. Gal. Gen. O. Pal. Sar. Sax. Wür. *Fi. Sw.*)

℞. Florum Tiliae . . partes duas.
Aquae . . . quantum sufficit.
Destillent partes viginti. (*Sw.*)

Pal. Florum partem unam et Aquae tres; destillet pars una cum dimidia; — Gal. et Sar. Florum partem unam et Aquae quatuor; destillet dimidia

pars; — Wür. Florum partem unam et Aquae sex; — Sar. Florum partem unam et Aquae viginti; destillent trientes duo; — O. Florum partem unam et Aquae triginta; destillent partes viginti; — Gen. Florum partes quatuor et Aquae quantum sufficit; destillent partes sex; — *Fl.* Florum tres, Aquae quindecim; destillent partes sex.

℞. Florum Tiliae . . partes tres.
Aquae . . . partes duodecim.

Floribus in saccum cucurbitae medio ita suspensum ut aquam non attingat immissis, destillent absque bullitione aquae, partes sex.

Gabe, zwei bis vier Unzen.

Tormentilla.

Tormentilla erecta, L.; Tormentillwurz, Blutkraut, Feigwarzkraut, Siebenfingerkraut; Tormentille (*Gal.*); Tormentil (*Ang. Bel. D.*); Natrznjk, Trzene korenj (*B.*); Tormentilla (*His. I. Lus.*); Korze ziele pepawy (*Pal.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *Be Br. C. Fl. G. M. Par. Sp.* Z.

2l (Icosandria Polygynia, L.; Rosaceae, J.) Eine Pflanze Europa's. (*Hayne* II. 48. *Blackw.* t. 445. *Plenck.* t. 411. *Schk.* t. 136. Diss. off. Pfl. VI. t. 2. *Zorn* Ic. pl. t. 358.)

Man wendet die Wurzel (radix Tormentillae sylvestris s. Heptaphylli s. Septifolii) an; sie ist knotig, fingerdick, länglich, mit zahlreichen Fasern besetzt, außen rothbraun, inwendig blaßroth oder gelblichbraun, bisweilen gefleckt und geruchlos; ihr Geschmack ist stark adstringirend und etwas bitter.

Adstringirend. — Gabe des Pulvers, eine halbe bis eine Drachme.

Pulvis Tormentillae compositus s. adstringens. (Gen.)

℞. Terrae sigillatae . uncias sex.
Cinnamomi . . uncias quatuor.
Tormentillae,
Gummi Arabici,
singulorum uncias tres.
Piperis longi . . . semunciam.

Nöthigenfalls setzt man den acht und vierzigsten Theil Opium zu.

Extractum Tormentillae. (A. Ams. An. B. Ba. Br. His. Li. Lus. RC. Sar. Sax. Wir. Wür. *Fl.*)

℞. Radicis Tormentillae
libram unam.
Aquae fontanae . . libras sex.

Digere per dies quatuor in loco calido, tunc parumper coque; cola exprimendo et colaturam ad aptam consistentiam consume. (Br. Pal. Wir.)

Sar. Liquoris coquendo tertiam partem consumere, colare et evaporando inspissare.

℞. Radicis Tormentillae
partem unam.
Aquae communis . partes octo.

Macera per horas viginti quatuor, tunc coque per horae quadrantem et cola fortiter exprimendo; residuum coquatur cum Aquae partibus quatuor, tunc liquores commixti, per horas viginti quatuor sepositi ad aptam consistentiam evaporent. (An. Li.)

B. Horas viginti quatuor digestionis et duas bullitionis cum Aquae partibus decem, deinde novam bullitionem cum Aquae partibus octo; — Ams. Coctionem primam cum viginti, secundam cum quindecim partibus Aquae, quaque vice ad dimidii remanentiam; — His. Digestionis horas viginti quatuor et duas bullitionis primum cum partibus decem, deinde cum nova quantitate Aquae ad dimidii remanentiam.

℞. Radicis Tormentillae quantum vis.
Aquae . . . quantum sufficit.

Radice pluribus ebullitionibus sequentibus penitus extracta, liquores commixti post decanthationem ad extracti consistentiam evaporent. (A.)

Wür. solum unam bullitionem per horas duas indicat; — Bo. Radicis partem unam post horas viginti quatuor macerationis coquere jubet primum cum octo, deinde cum quatuor partibus Aquae; — RC. Radicis quantum vis, Aquae octuplum ad dimidium decoquere, exprimere, filtrare et ad mellis spissioris consistentiam redigere; — *Fl.* duas bullitiones, primam cum Aquae sextuplo, secundam cum nova Aqua, donec decoctum saporis expers evadat.

Gabe, von einem Scrupel bis zur halben Drachme.

Pilulae adstringentes. (*Ca.*)

℞. Extracti Tormentillae
drachmam unam.
Mastichis . . . drachmas duas.
Gummi Arabici . . semunciam.
Terebinthinae coctae
quantum sufficit.

Fiant pilulae granorum quatuor. — Von Quarin am Ende von Senorrhöe empfohlen. — Gabe, fünf bis sechs Stück Morgens und Abends.

Aqua Tormentillae. (Pal.)

℞. Radicis Tormentillae
partem unam.
Aquae . . . . . partes duas.

Destillet pars una cum dimidia.

Essentia traumatica. (Wir. *Sp.*)

℞. Radicis Tormentillae,
Herbae Saniculae,
singularum semunciam.
— Roris Solis,
Florum Hyperici,
— Rosarum rubrarum,
singulorum drachmas duas.
Sanguinis Draconis,
Mumiae Aegyptiacae,
Catechu,
Myrrhae,
singulorum drachmas tres.
Santali rubri . drachmas duas.
Nucis moschatae drachmam unam.
Alcoholis . . . uncias sedecim.

Post tres dies digestionis blando calore, exprime et filtra. (Wir.)

℞. Radicis Tormentillae semunciam.
Florum Rosarum rubrarum,
— Hyperici,
singulorum drachmas duas.
Ligni Santali rubri,
Mumiae Aegyptiacae,
Sanguinis Draconis,
singulorum unciam unam.
Catechu,
Myrrhae, singulorum semunciam.
Nucis moschatae drachmam unam.
Alcoholis . . . uncias viginti.

Post sufficientem digestionem filtra. (*Sp.*)

Adstringirend, zur Stillung von innern Blutflüssen und Diarrhöen empfohlen. — Gabe, fünfzig bis sechszig Tropfen.

Tinctura Tormentillae. (Bel.)

℞. Radicis Tormentillae
partem unam.
Alcoholis (15°) . . partes octo.

Macera frigide per dies sex, cola exprimendo et filtra. — Adstringirend.

Decoctum Radicis Tormentillae. (B*.)

℞. Radicis Tormentillae semunciam.
Aquae fontanae . sesquilibram.

Coque et cola. — Adstringirend. — Gabe, alle zwei Stunden zwei Löffel.

Decoctum adstringens. (Sar. *Fi. Sw. Vm.*)

℞. Radicis Tormentillae,
Corticis Quercus,
— Granati,
singulorum drachmas duas.
Aquae,
Lactis, singulorum libram unam.

Coque per horae quadrantem, sub finem addendo
Cinnamomi . . drachmas duas.

Post refrigerationem cola. (*Fi. Sw. Vm.*)

℞. Radicis Tormentillae,
Florum Granati siccatorum,
Corticis Granati,
singulorum semunciam.
Chinae . . . . . unciam unam.
Aquae fontanae quantum sufficit ut post ebullitionem librae duae colaturae obtineantur. (Sar.)

Bei Diarrhöe und Blennorrhöe empfohlen. — Gabe, zwei Unzen, drei oder vier Mal täglich. — Wenn man den Zimmt wegläßt, so kann die Abkochung auch als Klystir oder Einspritzung angewendet werden.

Tisana adstringens. (*Ca. Pie. Sp.*)

℞. Radicis Tormentillae
drachmas sex.
Aquae fontanae libras duodecim.

Coque per semihoram, in fine addendo
Radicis Consolidae majoris
drachmas sex.
— Liquiritiae . semunciam.

Cola. (*Sp.*)

Pie. Tormentillae uncias tres, Aquae libras triginta quatuor, Consolidae uncias tres et Liquiritiae uncias duas.

℞. Radicis Tormentillae,
— Graminis,
singularum semunciam.
Corticis Granati,
Berberidis,
Rhois, singulorum drachmas duas.
Rasurae Cornu Cervi
drachmas tres.
Aquae . . . . . octarios tres.

Decoque ad duorum octariorum remanentiam et colaturae adde
Mellis . . . . . uncias duas.

Cola. (*Pie.*)

℞. Aquae bullientis . libras duas.
Petalorum siccorum Rosarum rubrarum . . . . semunciam.
Radicis Tormentillae,
— Bistortae,
singularum unciam unam.

Coque radices, petala solum infundendo, cola et colaturae adde
Syrupi Granati . sesquiunciam.
— Gummi . unciam unam.
Acidi sulphurici tenuis
guttas viginti.

Misce. (*Ca.*)

Gargarisma adstringens. (*Sa.*)

℞. Radicis Tormentillae uncias duas.
Aquae . . . quantum sufficit ut post semihoram bullitionis colaturae libra una obtineatur, cui adde
Mellis rosati . . sesquiunciam.
Spiritus Sulphuris per campanam
guttas decem.

Tragacantha.

Tragacanthae Gummi; Τραγάκανθα; Tragath, Tragant; Gomme adragant

(*Gal.*); Tragant (*Bel. D.*); Gom of goatstorn, Tragacanth (*Ang.*); Kasira, Samaghulkatad (*Ar.*); Kattira (*Duk. Hin.*); Tragacanto, Alquitira (*His.*); Dragante (*I.*); Guma dragant (*Pol.*); Alcatria (*Lus.*); Vadomocottay pisin (*Tam.*).

Am. Ams. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. *A. Be. Br. C. Fi. G. M. Par. Pid. Sp.* Z.

In dünnen, gedrehten und wurmförmigen Fäden oder in zusammengerollten Lappen. Es ist graulichweiß, undurchsichtig, etwas zähe, schwer zu pulvern, ohne Geruch und von einem faden und schleimigen Geschmack.

Es fließt von mehreren Arten Astragalus, wie A. verus, *Oliv., Voy.* d. l'emp. Othom. t. 44. Düss. off. Pfl. XI. t. 256.; A. gummifer, *Lab.*, und A. Creticus, L., *Bert.* Bild. t. 99. f. 2, welche sämmtlich im Orient wachsen, aus.

Es besteht, nach Guibourt, aus einer in Wasser löslichen, aber ganz vom Arabischen Gummi verschiedenen und noch einer andern unlöslichen Substanz.

Man wendet es fast nur an, um Pulver mit Wasser zu mischen, oder manchen Präparaten die Form zu geben.

Pulvis mucilaginosus s. Tragacanthae compositus. (Gen. Lon. LonN. *C.*)

℞. Gummi Tragacanthae semunciam.
Amyli,
Sacchari albi,
singulorum drachmas duas.
Divide in partes octo. (Gen.)

℞. Gummi Tragacanthae,
— Arabici,
Amyli, singulorum sesquiunciam.
Sacchari . . . . uncias tres.
Fiat pulvis. (Lon. LonN. *C.*)

Mucilago Astragali Tragacanthae s. Gummi Tragacanthae s. Tragacanthae. (A. Ams. An. Ba. Bel. Da. Ed. Ful. HassP. Li. Lus. Sar. Sax. *Bn. C. Fi. Sw. Vm.*)

℞. Gummi Tragacanthae
partem unam.
Aquae frigidae . . partes octo.
Digere per horas duodecim, tere et cola. (Ful. Lus.)

Li. Aquae partes duodecim; — *C.* viginti; — D. triginta duas; — An. triginta sex; — Ba. et Sax. sexaginta; — *Sw.* et *Vm.* sexaginta duas; — A. ducentas quadraginta; — Sar. quantum sufficit; — HassP. Gummi unam, Aquae quadraginta octo.

℞. Gummi Tragacanthae
partem unam.
Aquae bullientis
partes quatuordecim.
Contere. (B. Bel.)

Ams. Aquae partes sedecim; — Ed. triginta duas; — *Br.* quantum sufficit; — *Fl.* Tragacanthae drachmas duas, Aquae tepidae uncias tres cum dimidia.

Potio gummosa. (*Sp.*)

℞. Gummi Tragacanthae
grana decem.
Aquae . . . . uncias quatuor.
Solutioni adde
Syrupi Sacchari unciam unam.

Solutio mucilaginosa. (*Sw.*)

℞. Mucilaginis Gummi Tragacanthae
uncias duas ad tres.
Aquae bullientis . libram unam.
Syrupi Althaeae unciam unam.
Gabe, drei bis vier Unzen, täglich mehrmals, bei Husten, Dysurie, Nierenentzündung, Gonorrhöe.

Liquor ophthalmicus anodynus. (Pal.)

℞. Gummi Tragacanthae
drachmas duas.
Mucilaginis Seminum Psyllii
drachmas tres.
Aquae Rosarum,
— Plantaginis,
singularum quantum sufficit ut fiat liquor mediocris consistentiae.

Potio oleosa. (*Ra.*)

℞. Olei Amygdalarum dulcium
semunciam.
Gummi Tragacanthae
grana decem.
Aquae . . . . uncias duas.
Syrupi Sacchari . unciam unam.
Misce.

℞. Olei Amygdalarum dulcium,
Syrupi Sacchari,
singulorum sesquiunciam.
Gummi Tragacanthae
grana quindecim.
Aquae Florum Aurantiorum
drachmas quatuor.
— Lactucae uncias quatuor.
Misce.

Electuarium diatragacanthae s. Gummi Tragacanthae. (*Sp.*)

℞. Aquae Paeoniae . uncias duas.
— Menthae,
— Melissae,
Syrupi Rhoeados,
Sacchari pulverati,
singulorum unciam unam
Gummi Tragacanthae pulverati
drachmas duas.
Zur Stillung von Kolikschmerzen bei Rindern.

Judas (*Gal.*); Jew's ear (*Ang.*); Bezowa hauba (*B.*); Judasoor (*Bel.*).

Br. Gal. Lus. Wir. Würr. *Be. M. Sp.* Z.

Ein Pilz (Auricula Judae s. Fungus Sambuci), welcher an faulen Bäumen wächst. (*Zorn* Ic. pl. t. 500.)

Er hat eine ohrförmige Gestalt und eine grünlichgraue Farbe.

Ehedem wendete man ihn, in Milch oder Weineßig gekocht, gegen Bräune an.

Trifolium.

Unter diesem Namen werden besonders folgende beide Pflanzen angeführt:

1) *Trifolium pratense, L.*; rother Wiesenklee; Trèfle des prés (*Gal.*); Purple trifoil (*Ang.*); Raedklever (*D.*); Roedkaepling (*Suec.*).

Gal. Wir.

♃ (Diadelphia Decandria, L.; Leguminosae, *J.*) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (*Zorn* Ic. pl. t. 98.)

Man wendet das blühende Kraut (herba cum floribus Trifolii pratensis s purpurei) an; die Blätter desselben sind dreiblättrig, die Blättchen eirund, ganz, behaart, oft mit einem weißen oder schwarzen Flecke gezeichnet; die Blüthen roth und bilden rundliche, stumpfe, von häutigen Deckblättern umgebene Aehren.

Wird für etwas laxirend gehalten.

2) *Menyanthes trifoliata, L.*; Wasserklee, Fieberklee, Bitterklee; Trèfle d'eau, Trèfle des marais (*Gal.*); Common back-bean (*Ang.*); Horky, Wodnj getel (*B.*); Bukkeblade, Beskeklaever, Gedeklov (*D.*); Trifolio palustre (*His.*); Water drieblad (*Bel.*); Trifoglio fibrino, aquatico (*I.*); Vidra fu (*M.*); Troglist (*Pol.*); Trevo d'agua (*Lus.*); Trilistnik (*R.*); Vattukloefver (*Suec.*).

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Würr. WW. *Be. Br. Fi. G. M. Pid. Sp.* Z.

♃ (Pentandria Monogynia, L.; Lysimachiae, *J.*) Eine Europäische Pflanze. (*Bull.* t. 181. *Blackw.* t. 474. *Plenck* t. 87. *Hayne* III. 14. *Bert.* Bild. VII. 27. f. 2. Fl. méd. V. 234.)

Man wendet das Kraut (herba Trifolii s. Trifolii fibrini s. aquatici s. palustris s. paludosi s antiscorbutici) an; es besteht aus einem Büschel langstieliger, je aus drei glatten, eirunden, stumpfen, ganzen, am Rande etwas wellenförmigen Blättchen gebildeter Wurzelblätter. Es hat keinen Geruch, aber einen außerordentlich bittern Geschmack.

Bitter, tonisch, magenstärkend, die Menstruation befördernd. Besonders hat man es gegen Scorbut, Gicht und Wechselfieber angewendet.

Conserva Trifolii fibrini. (Ful.)

℞. Foliorum Trifolii fibrini contusorum et per cribrum trajectorum partem unam.
Sacchari albi pulverati partes duas.
Contere simul.

Thea amara, Species pro thea amara. (D. DD. *Vm.*)

℞. Rasurae Ligni Guajaci,
Baccarum Juniperi,
Foliorum Sennae,
— Trifolii fibrini,
singulorum partes aequales.
Concisa et contusa misce. (D. *Vm.*)

℞. Foliorum Trifolii fibrini,
— Sennae,
Radicis Bardanae,
Baccarum Juniperi,
singulorum unciam unam.
Concisa et contusa misce. (DD.)

Succus Trifolii fibrini. (Hass. Sar.)

℞. Herbae Trifolii aquatici recentis quantum vis.
Contunde in mortario lapideo, Aquae pauxillo humectando, exprime fortiter, sepone succum et filtra.
Sar. clarificare in balneo aquae jubet. — Gabe, zwei bis drei Unzen.

Syrupus de Menyanthe trifoliata s. Trifolio fibrino. (Gal.)

℞. Succi Trifolii fibrini bullitione clarificati et colati,
Sacchari albi,
singulorum partes aequales.
Coque, blando igne, ad syrupi consistentiam.

Syrupus de Menyanthe s. Trifolio compositus. (Br*.)

℞. Succi Trifolii fibrini recenter expressi . . . . partes duas.
Succorum recenter expressorum Lactucae, Sonchi, Cichorii et Nasturtii,
singulorum partem unam.
Post aliquot horas sepositionis ut faecula desideat, commisce, clarifica, filtra et adde liquori
Sacchari albi . . . . duplum.
Liqua in balneo aquae.

Extractum Trifolii fibrini aquosum, Succus concretus Trifolii. (A. Ams. An. B. Bor. Bor4. Br. D. Fenn. Fer. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. Li. Lus. O. Pal. Pol. Sar. Sax. Wir. Würr. *Fi. Pid. T. Vm.*)

℞. Foliorum recentium Trifolii fibrini quantum vis.

Succum expressum et clarificatum in balneo aquae ad consistentiam extracti vaporando consume. (Gal. Lus.)

℞. Foliorum recentium Trifolii fibrini quantum vis.

Contunde in mortario et exprime succum, qui absque despumatione in tantum evaporet, donec quarta pars Foliorum Trifolii fibrini siccatorum sufficiat ad ei extracti spissitudinem praebendam. (B.)

℞. Foliorum recentium Trifolii fibrini libras duodecim.

Contunde in mortario ferreo, sensim addendo Aquae libras sex et exprime succum, qui semel ebulliat et tunc colatus leni calore ad mellis consistentiam evaporet. (Han. O.)

℞. Foliorum recentium Trifolii fibrini libram unam.
Aquae frigidae . libras decem.

Macera per duos dies, subinde agitando; cola, sepone et deçantha liquorem, tunc vaporando ad consistentiam requisitam inspissa. (Pol.)

℞. Foliorum Trifolii fibrini partem unam.
Aquae communis . partes octo.

Macera per horas viginti quatuor, tunc coque per horae quadrantem et cola fortiter exprimendo; residuo deinde cum Aquae partibus quatuor cocto, liquores ambos commisce et post horas viginti quatuor sepositionis ad aptam consistentiam vaporando inspissa. (Sax.)

℞. Foliorum recentium Trifolii fibrini,
Aquae frigidae,
singulorum partem unam.

Macera per horas duodecim, tunc adde

Aquae bullientis . . . duplum ponderis massae totius. Post refrigerationem cola, clarifica Albuminis ope, supra ignem impone et simulac liquor spissescere coepit, per pannum cola et continue agitando, probe consume. (*Vm.*)

℞. Foliorum Trifolii fibrini libram unam.
Aquae fontanae . . libras sex.

Digere per dies quatuor in loco calido, coque parumper, cola exprimendo et colaturam vaporando ad extracti consistentiam inspissa. (Br. Li. Pal. Wir.)

℞. Herbae Trifolii fibrini libram unam.
Aquae purae . . libras decem.

Coque per horas duas, cola exprimendo, sepone liquorem et per pannum colatum vaporando in tantum consume, donec massa non amplius digitis adhaereat. (Ams. Gen.)

Hass. et *Pid.* coquere jubent Trifolii partem unam in Aquae sex, exprimendo colare et liquorem post sepositionem per horas viginti quatuor decanthatum vaporationi subjicere; — Wür. coquere Folia per horam unam in Aquae sufficiente quantitate et liquorem decanthatum ad mellis spissi consistentiam consumere; — An. coquere per horae quadrantem Foliorum libras duas in Aquae decem et liquorem decanthatum consumere; — Fer. coquere Herbae partem unam in Aquae tribus et decoctum Albuminis ope clarificatum consumere.

℞. Herbae Trifolii fibrini partem unam.
Aquae bullientis . partes octo.

Coque leviter per horae quadrantem et cola exprimendo; residuum denuo coque in Aquae partibus quatuor et itidem cola; liquores commixti et post sufficientem sepositionem decanthati ad extracti consistentiam evaporent. (Bor. D. Han.)

A. Herbam pluribus coctionibus sequentibus penitus extrahere, liquores commiscere et decanthatos in balneo aquae vaporando consumere; — Fenn. coquere illam per horae quadrantem cum Aquae partibus sex, tunc secundo cum nova Aqua et liquores ambos commixtos in balneo aquae vaporando consumere; — Bor4. Herbam cum Aquae fervidae decuplo per horas triginta sex seponere, liquorem exprimendo seponere, residuum cum Aquae fervidae quintuplo infundere, post refrigerationem exprimere, liquores consumere; — *T.* ut extractum sennae.

℞. Foliorum Trifolii fibrini contusorum . . . . . libras octo.

Macera per tres dies in alembico, tunc destillando uncias circiter duas Aquae abstrahe; residuo infunde Aquae triplum, coquendo ad trientis remanentiam redige, clarifica et cola liquorem, vaporando ad electuarii consistentiam inspissa et huic nonnisi tepido Aquam destillatam adde. (Sar.)

HassP. ut extractum cardui benedicti etc.; — *Fi.* ut extractum cichorii.

Gabe, von einem Scrupel bis zur Drachme.

Extractum Trifolii fibrini alcoholicum. (Ful.)

℞. Herbae Trifolii fibrini,
Aquae Vitae,
singularum libram unam.
— purae . . . libras octo.

Post tres dies digestionis cola exprimendo, destillando alcoholem abstrahe et reliqua probe inspissa.

Extractum amarum. (RC.)

℞. Herbae Absinthii,
— Trifolii fibrini,
Radicis Gentianae,
singularum quantum vis.
Coque, exprime et consume. — Gabe, zehen bis dreißig Gran; — Stärkend, Verdauung befördernd.

Elixir amarum vinosum. (Ham.)

℞. Extracti Trifolii fibrini semunciam.
Vini albi . . . . uncias duas.
Dissolve.

Elixir antiscorbuticum. (Ful.)

℞. Extracti Trifolii fibrini,
— Fumariae,
— Graminis,
singulorum semunciam.
Aquae Chamomillae uncias decem.
— Cochleariae compositae uncias quatuor.
Acidi sulphurici semidrachmam.
Löffelweise zu nehmen.

Mixtura Trifolii aquatici foetida, Potio hydragoga. (*Au.*)

℞. Extracti Trifolii fibrini semunciam.
Aceti scillitici . . uncias duas.
Tincturae Asae foetidae semunciam.
Gabe, zwanzig Tropfen täglich drei Mal.

Infusum Menyanthis s. Trifolii fibrini. (GalM. *Sa. Sw.*)

℞. Foliorum Trifolii fibrini unciam unam.
Aquae bullientis . libram unam.
Macera per horas duas et cola. — Bitter, tonisch. — Gabe, vier Unzen zwei Mal täglich.

Infusum ad s. contra hemicraniam. (*Sm.*)

℞. Foliorum Trifolii fibrini scrupulos duos ad drachmam unam.
Aquae bullientis uncias duodecim.
Infunde per horas duodecim, cola et colaturae adde
Syrupi Valerianae . uncias duas.
Täglich auf drei Gläser zu nehmen.

Vinum Trifolii fibrini s. excitans. (*Au.*)

℞. Herbae recentis Trifolii fibrini semunciam.
Seminum Sinapis unciam unam.
Vini rubri . . . . libras tres.
Post sufficientem digestionem filtra. — Glasweise, bei Verdauungsbeschwerden und Wassersuchten.

Tinctura s. Essentia Menyanthis s. Trifolii fibrini. (Br. D. DD. Ful. Han. Li. Wir. *Pid. Sw*)

℞. Herbae siccatae Trifolii fibrini partem unam.
Alcoholis . . . partes quatuor.
Post tres dies digestionis exprime et filtra. (D. DD. Ful. Li.)

Pid. Herbae partem unam et Alcoholis quinque; — Han. Herbae unam et sex Alcoholis.

℞. Herbae Trifolii fibrini uncias quatuor.
Alcoholis . . . . libras duas.
Post sufficientem digestionem cola exprimendo et liquorem infunde supra Herbae Trifolii fibrini uncias duas.
Digere denuo, exprime et filtra. (Br. Wir.)

℞. Herbae Trifolii fibrini libram unam.
Spiritus Trifolii fibrini libras tres.
Macera per dies duos et cola exprimendo. (*Sw.*)

℞. Spiritus Trifolii fibrini libras tres.
Extracti Trifolii fibrini sesquidrachmam.
Dissolve.
Bitter, magenstärkend, antiscorbutisch, fieberwidrig. — Gabe, fünfzig bis sechszig Tropfen.

Tinctura diuretica. (DD.)

℞. Aceti scillitici . . semunciam.
Essentiae Trifolii fibrini drachmas duas.
Misce.
Piderit Extracti semunciam, Aceti scillitici uncias duas, Tincturae Aurantiorum vel Juniperi semunciam.
Reizend, bitter, harntreibend. — Gabe, sechszig Tropfen.

Tinctura s. Essentia amara. (B*. Br. Li.)

℞. Herbae Trifolii fibrini,
— Tanaceti,
singularum semunciam.
Radicis Angelicae,
— Pimpinellae albae,
— Gentianae,
Gummi Hederae,
Succini flavi,
singulorum drachmam unam.
Aquae Vitae . uncias duodecim.
Macera per dies aliquot et cola. (B*. Br.)

℞. Herbae Trifolii fibrini,
— Scordii,
— Tanaceti,
singularum uncias quatuor.
Aquae bullientis . sesquilibram.
Post horas duodecim digestionis trajice per linteum, abjice aquam et faecibus infunde
Alcoholis . . . . libras duas.
Adde deinde
Fructuum Aurantii viridium contusorum . . . unciam unam.

Digere per dies quatuor, exprime leviter et filtra. (Li.)

Bitter, tonisch. — Gabe, vierzig bis sechszig Tropfen.

Spiritus Trifolii fibrini. (Wir. *Sw.*)

℞. Herbae recentis Trifolii fibrini partes sex.
Aquae Vitae . . partes quatuor.
— purae . . partem unam.

Destillet pars una cum dimidia et denuo supra novam herbam destilletur. (Wir.)

Sw. miscere Herbae libras duodecim, Alcoholis sex et Aquae tres et destillare jubet libras sex, productum infundere supra Herbae recentis libras duodecim, addere Aquae libras duas et denuo destillando libras sex elicere.

Triosteum.

Triosteum perfoliatum, L.; Bastardbrechwurzel; Trioste perfolié (*Gal.*); Feverroot, Bastard ipecacuanha, Tinkerweed (*Ang.*).

Am. Br. *C.*

♄ (Pentandria Monogynia, L.; Caprifoliaceae, *J.*) Eine Pflanze Nordamerica's. (*Dill.* Elth. t. 293. f. 378.).

Die Rinde der Wurzel, welche man anwendet, bewirkt Purgiren und bisweilen Erbrechen.

Tripela.

Tripolitana terra; Trippel, Trippelerde; Tripoli (*Gal.*).

Br. Wir. *G. Sp.*

Eine harte, rauh und trocken anzufühlende Substanz von weißer, gelber, rother, grüner oder brauner Farbe. Die geschätzteste Trippelerde, die sogenannte Venetianische, kommt von Corfu; sie ist schieferartig, durchlöchert und gelblichroth.

Turpethum.

Convolvulus Turpethum, L.; Turpethrinde; Turbith (*Gal.*); Square stalked bind-weedroot, Indian Jalap (*Ang.*); Turbit (*B. His.*); Teori (*Beng.*); Trasta walu (*Cy.*); Tikura (*Duk.*); Dudh-kulmi, Niswut (*Hin.*); Turbith (*Bel.*); Tassia (*I.*); Athapsia (*Lus.*); Triputu (*Sa*); Schevadie vayr (*Tam.*); Tegadu vayru, Tella tagada vayru (*Tel.*).

Ams. An. Br. Fer. Gal. His. Wir. *A. Be. Br. G. M. Sp. Z.*

♃ (Pentandria Monogynia, L.; Convolvulaceae, *J.*) Eine Pflanze Ceylan's und Malabar's. (*Blackw.* Herb. t. 397. *Plenck.* t. 105.)

Man wendet die Wurzel (radix Turpethi albi s. vegetabilis) an; sie ist lang, dick, holzig, ästig, von der Dicke eines Fingers und darüber. Sie hat eine dicke, derbe, außen grauliche, inwendig weißliche Rinde, unter welcher eine weiße, mehr löcherige Substanz liegt. Sie kömmt in vier bis fünf Zoll langen Stücken zu uns. Bloß die Rinde ist wirksam, das Mark besitzt fast gar keine Kräfte. Sie hat keinen Geruch; der Geschmack ist anfangs fast unmerklich, wird aber dann sehr stark widerlich.

Ein drastisches Purgirmittel, welches selten für sich allein angewendet wird.

Extractum Turpethi. (Wir.)

℞. Radicis Turpethi libram unam.
Alcoholis libras quinque ad sex.

Post sufficientem extractionem cola exprimendo; macera et tunc parumper coque residuum in Aquae libris tribus, clarifica decoctum Albuminis ope, liquores ambos commisce et alcohole destillando separato, quod reliquum est ad extracti consistentiam inspissa.

U.

Ulmus.

Man wendet in der Medicin zwei Arten dieser Pflanzengattung an:

1) *Ulmus fulva, Mich.*; rauhblättrige Ulme; Orme d'Amérique (*Gal.*); Rough leav'd elmtree, red elm, slippery elm (*Ang.*).

Am. *C.*

Ein Baum (Pentandria Digynia, L.; Amentaceae, *J.*) Nordamerica's.

Man wendet die innere Rinde, welche schleimig und erweichend ist, an.

2) *Ulmus campestris, L.*; Ulme, Rüster; Orme pyramidal (*Gal.*); Elm (*Ang.*); Alm (*D. Suec.*); Olmo (*His. I. Lus.*); Olm (*Bel.*); Korawiazowa (*Pol.*).

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. Ll. Lon. LonN. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. *Br. C. Sp.*

Ein großer Baum Europa's. (*Schk.* t. 57. *Plenck* t. 72. *Lam.* Ill. t. 185. *Hayne* III. 15.)

Man wendet die innere Rinde der Zweige (cortex Ulmi interior) an; sie ist

glatt, dünn, röthlichbraun und geruchlos und hat einen bittern, adstringirenden, etwas scharfen und sehr schleimigen Geschmack, wenn man sie länger kaut. Man hat sie bei Hautwassersucht, Hautkrankheiten, Scropheln, Scorbut und Wechselfiebern gerühmt.

Extractum Ulmi. (A.)

℞. Corticis Ulmi interioris quantum vis.
Aquae . . . quantum sufficit.

Corticem pluribus coctionibus successivis penitus extrahe; liquores commisce, decantha et vaporando in balneo aquae consume.

Infusum Ulmi. (Am. B*. *C*)

℞. Corticis Ulmi concisi unciam unam.
Aquae bullientis octarium unum.

Macera per horas duodecim, in vase tecto, saepius agitando et cola.

Decoctum Ulmi campestris. (B*. Du. Ed. Gen. Lon. LonN. RC. *C. Sa. Sw. Sy. T.*)

℞. Corticis Ramorum Ulmi interioris uncias quatuor.
Aquae libras (octarios) quatuor.

Coque ad dimidii remanentiam.

RC. Corticis unciam unam, Aquae libram ad sesquilibram; — T. Corticis uncias tres, Aquae libras quatuor, ad dimidii remanentiam.

Bei Aussatz und andern Hautkrankheiten empfohlen. — Gabe, vier bis acht Unzen zwei oder drei Mal täglich.

Decoctum diaphoreticum. (*B.*)

℞. Corticis Ulmi interioris uncias duas.
Patientiae . . unciam unam.
Aquae . . . quantum sufficit

ut libras tres colaturae obtineantur. — Bei chronischen Exanthemen in Gebrauch.

Urtica.

In den Pharmacopöen werden drei Pflanzen dieser Gattung angezeigt:

1) *Urtica urens, L.*; kleine Brennnessel, Eiternessel; Ortie brûlante (*Gal.*).

An. Ba. Br. Fer. Gal. Li. *Br. M.*

☉ (Monoecia Tetrandria, L.; Urticeae, *J.*) Eine in Europa sehr gemeine Pflanze. (*Oed.* Fl. Dan. t. 739. *Bull.* t. 233. *Plenck* t. 661.)

Man wendet das Kraut, die Blüthen und den Saamen an.

Das Kraut (herba Urticae minoris) besteht aus einem ästigen Stängel mit eirunden, tiefgezähnten und mit sehr stechenden Haaren besetzten Blättern. Es hat einen bitterlichen Geschmack.

Die Blüthen sind grün und in kurze, achselständige, fast sitzende Trauben vereinigt.

Der Saame ist eirund, glänzend und hellbraun.

2) *Urtica dioica, L.*; große Brennnessel; Ortie dioique (*Gal.*); Common nettle (*Ang.*); Kopruca puliwa neb wettsj (*B.*); Stor braendenelde (*D.*); Ortiga mayor (*His.*); Groote brandenatel (*Bel.*); Ortica (*I.*); Pokrzywa (*Pol.*); Ortiga major (*Lus.*); Braennaetsla (*Suec.*).

Ams. Ba. Br. D. Fer. Gal. Gen. Hass. His. Wir. Wür. *Be. M. Sp. Z.*

♃ Eine Europäische Pflanze. (*Zorn* Ic. pl. t. 465.)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an.

Die Wurzel (radix Urticae majoris) ist lang, linienförmig, ästig, außen bräunlich, inwendig weißlich.

Das Kraut besteht aus einem vierkantigen Stängel mit gestielten, herzförmigen, spitzigen, sägezähnigen, mit vielen sehr stechenden Haaren besetzten Blättern.

3) *Urtica pilulifera, L.*; römische Brennnessel; Ortie romaine (*Gal.*).

Bel. Wir. *M. Sp.*

☉ Eine Pflanze des mittägigen Europa's. (*Blackw.* Herb. t. 321.)

Man wendet den Saamen (semen Urticae Romanae s. pilulíferae) an; er ist rundlich, platt, schwärzlichbraun, dem Leinsaamen ähnlich, aber kleiner.

Sucous Urticae. (*T.*)

Herbam contundendo in mortario lapideo in pultem redige et succum exprime.

Inspissamentum Urticarum, Extractum Urticae. (His.)

℞. Foliorum et stipitum Urticae quantum vis.

Contunde in mortario marmoreo et exprime succum, qui sepositione depuratus in balneo aquae ad spissi mellis consistentiam evaporet.

T. Succum cum Aqua dilutum et albuminis calorisque ope clarificatum ad extracti consistentiam inspissare.

Syrupus de Urtica s. Urticarum. (Gal. His.)

℞. Succi Urticae coctione depurati et colati,
Sacchari albi,
singulorum partes aequales.

Coque blando calore ad syrupi consistentiam (Gal.)

His. Succi Urticae et Sacchari albi partes aequales cum Aquae sufficiente quantitate clarificare et coquere ad consistentiam syrupi.

Dieser Syrup wird als harntreibend betrachtet.

Uva Ursi.

Arbutus Uva ursi, L.; Bärentraube; Bousserole, Raisin d'ours (*Gal.*); Tral-

ling bearberry (*Ang.*); Miaelnebaer, Mealbär-riis (*D.*); Gayuba, Uba de orso (*His.*); Beerendruif (*Bel.*); Uva d'orzo (*I.*); Niedzwiedzego, Grona, Borowkowe (*Pol.*); Uva de urso (*Lus.*); Miaelonris (*Suec.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. *Be. Br. C. G. M. Par. Pid. Sp.* Z.

Ein Strauch (Decandria Monogynia, L.; Ericineae, *J.*, Europa's. (*Oed.* Fl. Dan. t. 33. *Hayne* IV. 20. *Blackw.* t. 592. *Plenck* t. 340. *Bigel.* I. t. 6.)

Man wendet die Blätter (folia s. herba Uvae Ursi) an; sie sind kurzgestielt, eirundlänglich, stumpf, glatt und ledrig. Sie haben einen schwachen, balsamischen Geruch und einen bittern und angenehmen Geschmack.

Ein reizendes und harntreibendes Mittel, dessen Arzneikräfte ganz besonders übertrieben worden sind. — Gabe des Pulvers, ein bis zwei Scrupel.

Pulvis anticalculosus. (B*.)

℞. Olei essentialis Corticis Aurantiorum . . . . . guttas sex.
Sacchari albi . . . semunciam.
Fiat elaeosaccharum, cui adde
Pulveris Uvae Ursi semunciam.
— Gummi Arabici drachmas duas.
Gummi Jalapae drachmam unam.

Gabe, eine Drachme täglich oder alle zwei Tage. — Von Quarin bei Nierenkolik empfohlen.

Pulvis Uvae Ursi s. diureticus. (*Au.*)

℞. Herbae Uvae Ursi scrupulum unum.
Elaeosacchari Foeniculi grana quinque.

Divide in doses duodecim. — Gabe, drei oder vier Stück täglich.

Pulvis lithontripticus. (*E.*)

℞. Herbae Uvae Ursi,
Chinae, singulorum drachmas duas.
Opii . . . . . grana tria.

Fiant doses sex. — Gabe, ein Stück drei oder vier Mal täglich und zwei Unzen Kalkwasser hinterdrein.

Decoctum Foliorum Uvae Ursi. (B*. *Au.*)

℞. Foliorum Uvae Ursi semunciam.
Aquae fontanae . uncias decem.
Decoque ad unciarum octo remanentiam. — Gabe, alle zwei Stunden zwei Löffel. (B*.)

℞. Foliorum Uvae Ursi semunciam.
— Theae . drachmam unam.
Gummi Senegalensis unciam unam.
Aquae . . . . . uncias sex.
Coque et adde colaturae
Mellis . . . . drachmas sex.
T. ut decoctum ulmi.

Gabe, ein Löffel vier bis sechs Mal täglich.

V.

Vaccinium.

Von dieser Pflanzengattung werden in den Pharmacopöen drei Arten angeführt:

1) *Vaccinium Myrtillus, L.*; Heidelbeere; Airelle, Myrtille, Raisin des bois (*Gal.*); Common blue berry (*Ang.*); Myrtus, Gahody cerne, Wranj oka (*B.*); Blaebar (*D.*); Mirtillo, Arandano (*His.*); Blaaw bessen (*Bel.*); Mirtillo (*I.*); Borowkiczarna (*Pol.*); Blabeer (*Suec.*).

Ams. Br. Fenn. Ful. Gal. His. Li. R. Suec. Wir. *Be. Br. M. Pid. Sp.* Z.

Ein kleiner Strauch (Octandria Monogynia. L.; Ericineae, *J.*) des nördlichen Europa's. (*Blackw.* t. 465. *Plenck* t. 298. *Hayne* II. t. 7. Düss. off. Pfl. VI. t. 11. *Zorn* Ic. pl. t. 81.)

Man wendet die Früchte, Beeren (baccae Myrtilli) an; sie sind von der Größe einer Erbse und enthalten einen dunkelrothen Saft. Ihr Geschmack ist süß, sauer und etwas adstringirend.

Sie sind schwach styptisch, kühlend und antiscorbutisch.

2) *Vaccinium Oxycoccos, L.*; Moosbeere; Canneberge des marais (*Gal.*); Cranberry (*Ang.*); Tranebaer (*D.*); Vacernia lagonusa (*His.*); Veen bessen (*Bel.*); Ossicocos (*I.*); Canaberga (*Lus.*).

D. Fenn. Gal. R. RC. Suec. Wir. *Be. M. Sp.*

Ein kleiner Strauch des nördlichen Europa's. (*Oed.* Fl. Dan. t. 80. *Hayne* IV. t. 18.)

Man wendet die Beeren (baccae Oxycocci) an; sie sind eiförmig, roth, purpurroth punctirt, mit einem rothen Safte angefüllt und von sehr saurem Geschmack.

Kühlend, antiscorbutisch.

3) *Vaccinium Vitis Idaea, L.*; Preißelbeere, Mehlbeere, rothe Bernitzbeere;

Canneberge ponctuée (*Gal.*); Red bilberry (*Ang.*); Tyttebaer (*D.*); Arandona de frato encarnado (*His.*); Vossebessen (*Bel.*); Vite del monte Ida (*I.*); Lingon (*Suec.*).

D. Ful. Gal. Li. R. Suec. *Bc. G.*

Ein kleiner Strauch des nördlichen Europa's und der Alpen. (*Hayne* IV. t. 19. Düss. off. Pfl. V. t. 14. *Zorn* Ic. pl. t. 87.)

Man wendet die Früchte (baccae Vitis Idaeae) an; es sind runde, schön rothe Beeren von saurem und etwas bitterem Geschmack.

Die Blätter galten lange Zeit als lithontripticum und werden noch heutzutage den harntreibenden Mitteln beigezählt. Sie sind schwach adstringirend.

Succus e baccis Myrtillorum. (Ful. *Pid. T.*)

℞. Baccarum Myrtillorum maturorum quantum vis.

Contusas per aliquot dies in cavam sepone; exprime deinde succum et adhuc per aliquot dies in cava relinque, cola et in lagenis longicollibus penitus replendis a strato olei tectum in loco frigido serva.

T. Baccas inter manus conterens, succum ad locum frigidum seponere, filtrare, cuique librae Sulphitis calcarei grana sex addere et servare.

Säuerlich, zu einigen Unzen als Zusatz zu Mixturen; statt des Weinessigs zu gebrauchen.

Succus e baccis Oxycocci s. Oxycocci. (B*. Suec.)

℞. Baccarum Oxycocci quantum vis.
Sacchari albi . . . libras duas.
Fiat blando calore syrupus.

Succus Oxycocci cum Nitrate Potassae. (R C.)

℞. Nitratis Potassae unciam unam.
Succi Oxycocci . libram unam.
Misce solvendo. — Si libet, duas vel tres uncias Tincturae Calami utiliter addes. — Gabe, eine Unze bis ein halbes Pfund in getheilten Dosen täglich; bei Scorbut und scorbutischer Ruhr.

Roob Myrtillorum s. Vaccinii Myrtilli. (Ful. Li. *Sw.*)

℞. Baccarum Myrtilli quantum vis.
Contunde in mortario, sepone per dies aliquot, exprime succum et eum, igne ardente, cum Sacchari quadrante ad mellis consistentiam usque consume.

Im nördlichen Europa statt des roob mororum gebraucht.

Roob Oxycocci s. Vaccinii Oxycocci. (R. *Sw.*)

℞. Baccarum Oxycocci quantum vis.
Contunde in mortario, sepone per tres dies et exprime succum, qui cum Sacchari quadrante blando igne ad consistentiam mellis coquatur. (*Sw.*)

R. RC. Sacchari libram unam pro sex Succi.

Säuerlich, kühlend; statt des roob mororum zu gebrauchen. — Gabe, bis eine Unze.

Roob baccarum Vitis Idaeae s. Vitis Idaeae. (Ful. Li. Sax. *Sw.*)

℞. Baccarum Vitis Idaeae quantum vis.
Contunde in mortario, sepone per tres dies, exprime succum et sepone, qui decanthatus, blando igne cum Mellis quadrante ad consistentiam mellis coquatur. (Ful. Li. *Sw.*)

Sax. Sacchari partem unam et sedecim Succi.

Säuerlich, kühlend, kann ebenfalls statt des roob mororum benutzt werden.

Syrupus Myrtilli s. Myrtillorum. (Br. Ful. His. Pal. Suec. Wir. Würt. *Pid.*)

℞. Succi Baccarum Myrtillorum recens expressi . libram unam.
Sacchari albi . . . libras duas.
Dissolve blandi caloris ope. (Suec.)

His. Succi libras duas et uncias duas, Sacchari libras quatuor; — Br. Pal. Wir. Würt. et *Pid.* Succi uncias decem, Sacchari sedecim; — Ful. Cujusque partes aequales.

Syrupus adstringens Joubertt. (*Pie.*)

℞. Baccarum Myrtillorum drachmas triginta.
— Berberidis,
Foliorum Rhois,
Balaustiorum,
singulorum drachmas viginti.
Fructuum Mespili,
— Sorbi immaturorum,
singulorum uncias tres.
Succi Granati,
— Cydoniorum,
singulorum libras duas.
Coque simul et colaturae adde
Sacchari albissimi libras quinque.
Adde
Santali citrini . semunciam, vel
Cinnamomi . . drachmas duas.

Syrupus baccarum Oxycocci. (B*. Suec.)

℞. Succi Oxycocci . libram unam.
Sacchari albi . . . libras duas.
Fiat blando calore syrupus.

Valeriana.

Wir führen hier besonders zwei Arten dieser Pflanzengattung an:

1) *Valeriana Phu, L.*; grosser Baldrian; Grande valeriane (*Gal.*); Garden valerian (*Ang.*); Koultjk velsij (*B.*); Storbaldrian (*D.*).

Br. D. Fer. His. Suec. Wir. *Be. G. M.*

♃ (Triandria Digynia, L.; Valerianeae, *J.*) Eine Pflanze der gemäßigten Theile Europa's. (*Blackw.* Herb. t. 250. *Plenck* t. 28. *Hayne* III. t. 35.)

Man wendet die Wurzel (radix Valerianae majoris) an; sie ist dick, lang, runzelig, faserig, außen blaßbraun, inwendig weißlich, und hat einen widerlichen Geruch und einen unangenehmen, bittern und scharfen Geschmack.

2) *Valeriana officinalis*, L.; gemeiner Baldrian; Valériane sauvage (*Gal.*); Officinal valerian, Wild valerian (*Ang.*); Kozlik obecky (*B.*); Baldrian, Aeienrod valerian, Vildnardus, Valandsrod, Venderod, Vendmosrod (*D.*); Valeriana (*His. I. Lus.*); Wilde valerian (*Bel.*); Kozlki, Kozlkowy (*Pol.*): Balderjan (*R.*); Ulvendeirot (*Suec.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor. BorC. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pal. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *Be. Br. C. G. M. Par. Pid. Sa. Sp. Z.*

♃ Eine Pflanze, welche in ganz Europa wächst. (*Hayne* III. 32. *Blackw.* t. 271. *Plenck* t. 27. Düss. off. Pfl. VII. t. 10. *Lam.* Ill. t. 24. fig. 1. Fl. méd. VI. 343.)

Man wendet die Wurzel (radix Valerianae minoris s. sylvestris) an; sie ist außen gelblich, inwendig weißlich, besteht aus vielen länglichen Fäserchen, ist frisch fast geruchlos, bekommt aber nach dem Trocknen einen übeln, durchdringenden, eigenthümlichen Geruch und hat einen scharfen und bittern Geschmack.

Sie enthält, nach Trommsdorf, ein flüchtiges, kampherartiges, grünliches Oel, Schleimharz, Satzmehl, Harz und einen eigenthümlichen Stoff.

Ein sehr kräftiges Reizmittel, welches besonders auf das Nervensystem wirkt und welches man vorzüglich in Nervenkrankheiten anwendet; auch hat man es als Fiebermittel benutzt. — Gabe des Pulvers, eine halbe Drachme bis eine Unze und selbst mehr, zwei oder drei Mal täglich.

§. I. Präparate, welche den Baldrian in Substanz enthalten.

Species antispasmodicae. (Wür. *Huf. Pid.*)

℞. Radicis Valerianae uncias tres.
Foliorum Aurantiorum uncias duas.
Herbae Millefolii unciam unam.
Concisa misce. (Wür. *Pid.*)

℞. Radicis Valerianae,
— Caryophyllatae,
Herbae Menthae piperitae,
Foliorum Aurantiorum,
singulorum partes aequales.
Concisa misce. (*Huf.*)
Gabe, zwei Kaffeelöffel zum Aufguß.

Pulvis nervinus s. antispasticus s. epilepticus s. roborans antispasmodicus s. antispasmodicus s. Valerianae aromaticus. (B. BorC. DD. Ful. GalM. Ham. *Au. B. Huf. Sm.*)

℞. Radicis Valerianae,
Foliorum Aurantii,
singulorum drachmas duas.
Fiat pulvis (Ful.)

℞. Radicis Valerianae partes viginti.
Cinnamomi . . . partes tres.
Fiat pulvis. (GalM.)

Au. Valerianae drachmas duas, Cinnamomi scrupulum unum et Elaeosacchari Valerianae sesquidrachmam.

℞. Radicis Valerianae unciam unam.
Ligni Quassiae . . semunciam.
Fiat pulvis. (Ham.)

℞. Radicis Valerianae scrupulum unum.
Camphorae . . granum unum.
Pulvera. (DD.)

℞. Radicis Valerianae semidrachmam.
Cinnamomi . . grana quinque.
Elaeosacchari Valerianae scrupulum unum.
Fiat pulvis. (BorC.)

℞. Radicis Valerianae semunciam.
Corticis Aurantiorum,
Sacchari albi,
singulorum drachmas duas.
Olei Valerianae . . guttas sex.
Fiat pulvis. (Ham.)

℞. Oculorum Cancri,
Rasurae Cornu Cervi,
Radicis Valerianae,
Visci querni,
singulorum partes aequales.
Fiat pulvis tenerrimus. (B*. *Huf.*)

℞. Radicis Valerianae semunciam.
— Paeoniae drachmas duas.
Rasurae Cornu Cervi drachmas tres.
Olei Nucis moschatae grana tria.
Sacchari . . . . uncias tres.
Fiat pulvis. (*Sm.*)

℞. Radicis Valerianae semunciam.
Corticis Aurantiorum,
Tartari tartarisati,
singulorum drachmas duas.
Fiat pulvis. (Ful.)

℞. Radicis Valerianae drachmam unam.

Foliorum Aurantii
. scrupulum unum.
Salis Ammoniaci . . grana duo.
Olei Cajeput . guttas quatuor.
Fiat pulvis. (B*.)

℞. Valerianae . . semidrachmam.
Subcarbonatis Magnesiae,
Salis Ammoniaci,
singulorum grana tria.
Olei Cajeput . . . guttas duas.
Fiat pulvis. (B*. *Au.*)

℞. Valerianae . . drachmam unam.
Iridis Florentinae sesquidrachmam.
Liquiritiae . . drachmas duas.
Anisi . . . . semidrachmam.
Croci . . . . . grana octo.
Subcarbonatis Magnesiae
drachmam unam.
Fiat pulvis. (*Au.*)

℞. Valerianae . . unciam unam.
Florum Zinci scrupulum unum.
Moschi . . . . grana decem.
Fiat pulvis. (*B.*)

Im Allgemeinen ist die Gabe aller dieser Pulver zwanzig Gran.

Pulvis anthelminticus. (*Au.*)

℞. Radicis Valerianae drachmas duas.
Jalapae,
Sulphureti Mercurii nigri,
singulorum drachmam unam.

Gabe, von Zeit zu Zeit einen Kaffeelöffel.

Pulvis ad epilepticos s. Valerianae. (GalM. *Ra. Sa. Sw.*)

℞. Radicis Valerianae partes decem.
Cinnamomi . . . partes tres.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.
Fiat massa. (GalM.)

℞. Radicis Valerianae semidrachmam.
Syrupi Sacchari sesquidrachmam.
Commisce. (*Sa.*)

Sw. Syrupum Florum Aurantiorum adhibet. — Si requiritur, Castorei grana decem, vel Oxydi Ferri nigri septem adduntur.

℞. Radicis Valerianae grana viginti.
Sulphatis Potassae . grana duo.
Syrupi Corticum Aurantiorum
quantum sufficit.
Misce bene. (*Ra.*)

Pilulae antispasmodicae s. antiepilepticae. (*Ca. Ra. Sm.*)

℞. Valerianae . . . drachmas sex
Galbani,
Sagapeni,
singulorum sesquidrachmam.
Asae foetidae . drachmam unam.
Fiant pilulae trium granorum. (*Ca.*)

℞. Valerianae . . grana triginta.
Castorei . . . grana quatuor.
Oxydi Zinci . . grana viginti.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.
Fiant pilulae tres. (*Ra.*) — Von Duputren angewendet.

℞. Butyri Cacao drachmas quatuor.
Acetatis Potassae,
Valerianae,
singulorum drachmas duas.
Castorei . . . . drachmam unam.
Cinnabaris . . scrupulum unum.
Syrupi Florum Aurantiorum
quantum sufficit.
Fiant pilulae trium granorum. (*Sm.*)

℞. Valerianae . . . unciam unam.
Limaturae Ferri,
Catechu,
Cascarillae,
singulorum drachmas duas.
Syrupi Chinae quantum sufficit.
Fiant pilulae trium granorum. (*Sm.*)

Conditum epilepticum, Electuarium antispasmodicum s. antiepilepticum. (*Fi. Sm. Sw*.*)

℞. Radicis Valerianae uncias duas.
Subcarbonatis Magnesiae
drachmas duas.
Syrupi Paeoniae quantum sufficit.
Misce. (*Sm.*)

℞. Radicis Valerianae,
Foliorum Aurantii,
singulorum drachmas sex.
Syrupi Absinthii quantum sufficit.
Misce. (*Sw*.*)

Gabe, ein Kaffeelöffel zwei oder drei Mal täglich.

℞. Pulveris Chinae,
— Valerianae,
— Foliorum Aurantii,
singulorum unciam unam.
Mellis despumati uncias novem.

Gabe, von zwei bis vier Drachmen. (*Fi.*)

Electuarium anthelminticum. (B*. Ham. Han. R. WW.)

℞. Sulphatis Potassae,
Radicis Jalapae,
— Valerianae,
singulorum drachmam unam.
Oxymellis scillitici uncias quatuor.
Misce. (B*. R.)

℞. Radicis Valerianae drachmas duas.
— Jalapae . scrupulos duos.
Seminis Cinae . drachmas duas.
Mellis Liquiritiae . . uncias tres.
Misce. (Ham.)

℞. Seminis Cinae . unciam unam.
Valerianae,
Jalapae,
singulorum drachmas duas.
Sulphatis Potassae . . semunciam.
Oxymellis scillitici uncias quinque.
Misce. (Han.)

WW. Valerianae sesquidrachmam, Jalapae drachmam unam, Seminis Cinae semunciam, Sulphatis drachmas duas, Oxymellis scillitici drachmas sex et Mellis despumati sufficientem quantitatem.

Gabe, eine bis zwei Drachmen für Kinder, eine halbe Unze für Erwachsene, täglich vier Mal.

Linctus vermifugus, Looch vermifugum. (*Sa.*)

℞. Pulveris Valerianae drachmam unam.
Olei Olivarum . unciam unam.
Subige bene.

Potio antiepileptica. (*Bo.*)

℞. Aquae Cerasorum nigrorum,
— Tiliae,
— Florum Aurantiorum, singulorum uncias duas.
Pulveris de gutteta,
— Valerianae, singulorum semidrachmam.
Syrupi Kermetis vegetabilis drachmas tres.

Auf zwei Mal zu nehmen.

Potio excitans et antispasmodica. (*Pie.*)

℞. Radicis Valerianae grana viginti quatuor.
Liquoris anodyni Hoffmanni guttas triginta.
Aquae Menthae,
— Cinnamomi hordeatae, singularum uncias duas.

§. II. Präparate, welche nur den wirksamen Stoff des Baldrians enthalten.

A. Auszug durch Wasser.

Infusum Valerianae. (Am. B*. BorC. Du. Ham. GalM. RC. WW. *C. Huf. ParC. Ra. Sa. Siv.*)

℞. Radicis Valerianae drachmas duas.
Aquae bullientis uncias septem.
Digere per horam unam et post refrigerationem cola. (Am. Du. *C.*)

Ra. Radicis unciam unam et Aquae libras duas; — B*. DD. et RC. Radicis unciam unam et Aquae libram unam (interdum adduntur Aetheris sulphurici alcoholisati drachmae duae, vel Tincturae aromaticae, vel Tincturae Calami semuncia RC.); — Ham. Radicis unciam unam et Aquae quantum satis ut colaturae unciae octo obtineantur; — BorC. et WW. Radicis sesquiunciam et Aquae sesquilibram; — *ParC.* Valerianae, Liquiritiae, singularum drachmas duas et Aquae octarium unum; — *Huf.* Valerianae semunciam et Aquae quantum satis ut unciae octo infusi obtineantur.

Reizend, nervenstärkend, Ausdünstung befördernd. — Gabe, alle Stunden einen bis zwei Löffel.

℞. Radicis Valerianae unciam unam.
Aquae bullientis uncias duodecim.
Post duas horas macerationis colaturae adde
Spiritus Lavandulae compositi drachmas sex, vel
Tincturae Valerianae ammoniatae drachmas tres.
Misce. (*Sa. Siv.*)

Syrupus Valerianae s. Valerianae Radicis. (Han. *T.*)

℞. Radicis Valerianae uncias octo.
Aquae bullientis . . libras tres.
Infunde per horas aliquot, cola et colaturae unciis viginti adde
Sacchari albi . libras quatuor.

T. Aquae bullientis libras duas, horas duodecim infusionis et Sacchari libras quatuor.

Infusum Valerianae compositum s. tonico-nervosum. (DD. *Au.*)

℞. Radicis Valerianae,
— Calami, singularum unciam unam.
Florum Arnicae drachmas duas.
Aquae bullientis uncias duodecim.
Digere ad refrigerationem usque, cola fortiter exprimendo et colaturae adde
Essentiae Trifolii fibrini drachmas tres.
Aetheris sulphurici drachmas duas.
Misce bene. — Gabe, eine halbe Unze. (DD.)

℞. Radicis Valerianae drachmas duas ad sex.
Aquae bullientis . uncias octo.
Infunde et colaturae refrigeratae adde
Aquae Cinnamomi simplicis uncias duas.
Liquoris Hoffmanni drachmas duas.
Syrupi cujuslibet unciam unam.
Misce. (*Au.*) — Gabe, alle zwei Stunden oder selbst stündlich einen Löffel.

℞. Radicis Valerianae drachmas duas.
Aquae bullientis unciam unam.
Infunde et colaturae adde
Aquae Cinnamomi unciam unam.
Millepedes viventes . . no. 50.
Post horas duodecim digestionis super arenae balneo, cola exprimendo et adde
Syrupi Corticum Aurantiorum unciam unam.
Tincturae Opii . . guttas sex.
Misce et momento quo uteris adde Gasis hydrogenii puri pollucem cubicum. — Man hat diesen Trank bei Amaurose empfohlen. (*Au.*)

Infusum nervinum. (*Sa.*)

℞. Radicis Valerianae sesquiunciam.
Decocti Chinae . . libras duas.
Infunde et colaturae adde
Syrupi Chamomillae sesquiunciam.
Camphorae cum Mucilagine Gummi Arabici tritae grana viginti.
Misce.

Clyster anthelminticus, Enema anthelminticum.

℞. Herbae Absinthii,
Radicis Valerianae,
singularum unciam unam.
Tanaceti,
Corticis Aurantiorum,
singulorum semunciam.

Man gießt auf zwei Eßlöffel dieses Pulvers ein Pfund kochendes Waſſer, läßt es eine Nacht lang ziehen und ſeiht und drückt es dann aus. Dieß iſt für zwei Klyſtire, zu deren jedem man einen Löffel Hirſchhornöl ſetzt. — Von Bremſer gerühmt.

Potio antispasmodica. (*Sm.*)

℞. Visci querni,
Radicis Valerianae,
— Paeoniae,
singulorum drachmas duas.
Foliorum Aurantii pugillum unum.
Aquae . . . . octarium unum.
Decoque ut quarta pars consumatur.

Potio excitans. (GalM. *Au. B.*)

℞. Valerianae
drachmas duas cum dimidia.
Aquae . . . quantum sufficit ut decocti unciae quatuor obtineantur; colaturae adde
Syrupi Sacchari unciam unam.
Tincturae Cinnamomi
grana decem.
Misce. (GalM.)

℞. Valerianae . . drachmam unam.
Decocti Chinae quantum sufficit ut infusi unciae octo obtineantur; colaturae adde
Aetheris sulphurici semidrachmam.
Tincturae thebaicae
guttas triginta.
Misce bene. (*B.*)

℞. Camphorae . scrupulum unum.
Aetheris sulphurici drachmas duas.
Solutioni adde
Extracti Valerianae drachmas sex.
Aquae Menthae piperitae
uncias sex.
Laudani Sydenhami
drachmam unam.

Gabe, alle zwei oder drei Stunden einen halben Löffel.

Extractum Valerianae aquosum s. frigide paratum. (A. An. B. Ba. Bor. Bor4. Br. Du. Ful. Gal. Han. His. Li. Sax. Suec. *Fi. Pid.*)

℞. Radicis Valerianae quantum vis.
In pannum laneum involutae Aquam fervidam infunde, donec haec saporis expers prodeat; liquorem deinde lente ad extracti consistentiam consume. (Ful.)

℞. Radicis Valerianae partem unam.
Aquae . . . . . partes sex.
Macera per horas viginti quatuor et cola exprimendo; sepone per horas duas, decantha et ad consistentiam requisitam inspissa. (Ba.)

℞. Radicis Valerianae libram unam.
Aquae frigidae . libras quatuor.
Macera per horas viginti quatuor, subinde agitando et cola; residuum itidem cum nova Aqua maceratum colatur; tunc colaturae commixtae ad extracti consistentiam evaporent. (Gal.)

Bor. Han. et Sax. duos dies macerationis in Aquae partibus duodecim, evaporationem ad sextam usque partem, filtrationem et evaporationem in balneo aquae; — Bor4. Radicis libram unam, Aquae destillatae quantum satis ut aqua ad pollicem usque emineat, macerare per horas quadraginta octo saepius agitando et liquorem exprimere, hanc operationem bis terve repetere, liquores etc. ad mellaginis consistentiam inspissare, massam refrigeratam Aquae destillatae ea quantitate diluere ut filtrari possit, tunc liquorem in balneo vaporis iterum ad mellaginis consistentiam inspissare.

℞. Radicis Valerianae libram unam.
Aquae fontanae . . libras sex.
Digere per dies quatuor in loco calido, tunc parumper coque, cola exprimendo et colaturam ad extracti consistentiam consume. (Br.)

Pid. coquere jubet Radicis libram unam in Aquae octo et dimidium consumere.

℞. Radicis Valerianae pulveratae
uncias sex.
Aquae bullientis . . libras tres.
Post horas viginti quatuor digestionis in loco calido, cola exprimendo et liquorem ad aptam consistentiam consume. (Du.)

℞. Radicis Valerianae partem unam.
Aquae bullientis . partes octo.
Coque leviter per horae quadrantem et cola exprimendo; residuum coquatur cum Aquae partibus quatuor et itidem coletur; tunc liquores ambos commisce, post sufficientem sepositionem decantha et ad extracti consistentiam consume. (An. Fer. *C.*)

A. Radicem pluribus coctionibus repetitis penitus extrahere, liquores commiscere, post sufficientem digestionem decanthare et in balneo aquae consumere; — Suec. Valerianam cum Aquae duplo, tunc secundo cum nova Aqua decoquere et liquores ambos commixtos in balneo aquae consumere; — B. digerere illam per horas viginti quatuor et per duas coquere in Aquae partibus decem et residuum denuo coquere per horas duas cum Aquae novae partibus decem; — Ams. coquere illam primo cum viginti, deinde cum quindecim partibus Aquae, qualibet coctione ad dimidias partes redigendis; — His. digererе Radicem per horas viginti quatuor et tunc coquere per duas cum Aquae partibus decem et residuum cum nova Aquae quantitate ad dimidium decoquere; — *Fi.* Radicis libram unam cum Aquae pluvialis duodecim in alembico per horam coquere, post refrigerationem colare et exprimere, fluidum clarissimum decanthare et ad remanentiam partis sextae, tunc ad extracti consistentiam consumere.

T. ut extractum trifolii fibrini; — *Extractum siccum* (*T.*) ut extractum siccum chinae.

Gabe, von einem Scrupel bis eine Drachme.

B. Auszug durch Bier.

Cerevisia antispasmodica. (*Vm.*)

℞. Radicis Valerianae partes quinque.
Foliorum Rorismarini,
— Salviae, singulorum partem unam et dimidiam.
Serpentariae Virginicae partem unam.
Cerevisiae fortis partes centum viginti octo.

Post octo vel decem dies macerationis cola.

Cerevisia cephalica. (*Ca. Sa.*)

℞. Radicis Valerianae unciam unam.
Sinapis . . . . drachmas sex.
Rorismarini . drachmas quatuor.
Serpentariae Virginicae drachmas tres.
Cerevisiae . . . octarios octo.

Macera per duos dies et cola. (*Sa.*)

Ca. Valerianae uncias decem, Sinapis sex, Rorismarini tres, Salviae tantidem, Serpentariae duas et Cerevisiae octarios quadraginta.

C. Auszug durch Wein.

Infusum Valerianae vinosum, Vinum Valerianae. (B.)

℞. Radicis Valerianae unciam unam.
Vini albi . . . libram unam.

Digere per horas viginti quatuor et cola. — Gabe, alle Stunden oder zwei Stunden einen Löffel.

D. Auszug durch Alcohol.

Tinctura s. Essentia Valerianae sylvestris s. officinalis. (A. Am. Ams. An. Bel. Bor. Bor4. Br. DD. Du. Ful. Han. HassP. Lon. LonN. Pol. Sax. *Br. Huf. Sw. Vm.*)

℞. Radicis Valerianae sylvestris siccatae et in frustula concisae uncias duas.
Alcoholis (0,910) libram unam.

Post sufficientem digestionem filtra. (A. Ams. *Huf.*)

An. Valerianae partem unam et Alcoholis 20° sex; — B. et Bel. Radicis unam et Alcoholis 15° sex; — Ams. Du. Lon. LonN. et *C.* Radicis uncias quatuor et Alcoholis (0,980) octarios duos; — *Vm.* Radicis partem unam et sex Aquae Vitae; — Br. Radicis unam et quinque Alcoholis; — Bor. Bor4. Han. et Pol. Radicis uncias quinque et Alcoholis (Spiritus Vini rectificatissimi) libras duas; — Sax. Radicis partem unam et quatuor Alcoholis; — DD. et *Sw.* Radicis unam et sex Alcoholis; — HassP. Radicis uncias quatuor, Spiritus Vini rectificati libras duas; — *T.* easdem quantitates, sed Alcoholem 25° et digestionem per octiduum.

℞. Radicis Valerianae uncias duas.
Aquae Chamomillae uncias sex.
Alcoholis . . . . uncias duas.

Post sufficientem infusionem cola exprimendo. (Ful.)

Reizend, krampfstillend, nervenstärkend, wurmtreibend und Ausdünstung befördernd. — Gabe, dreißig bis sechzig Tropfen.

Extractum Valerianae alcoholicum. (B. D. HassP. Li. Pol. Wür.)

℞. Radicis Valerianae,
Alcoholis, singulorum libras duas.
Aquae communis libras novem.

Digere per horas duodecim, cola exprimendo, alcoholem destillando separa et residuum ad aptam consistentiam consume. (Pol.)

B. HassP. Radicis partes duas, Alcoholis tres et novem Aquae; — D. Radicis partem unam, Alcoholis duas et quatuor Aquae.

℞. Radicis Valerianae quantum vis.
Alcoholis . . quantum sufficit ut quatuor digitorum crassitiem tegatur.

Digere in loco calido et decantha; coque per horam unam in Aqua et cola exprimendo; tincturam consume ad mellis consistentiam usque, colaturam in fine addendo et continue agitando, ut massa sit homogenea neque grumosa. (Li. Wür.)

Tinctura Valerianae camphorata. (Hann.)

℞. Radicis Valerianae sylvestris uncias duas.
Camphorae . drachmam unam.
Alcoholis . . . . uncias octo.
Digere ad perfectam extractionem usque et cola.

Tinctura s. Essentia Valerianae composita. (Br. Wir. *Pid. Vm.*)

℞. Radicis Valerianae,
— Serpentariae Virginicae singularum unciam unam.
Camphorae . drachmam unam.
Alcoholis . . . . uncias octo.
Post sufficientem digestionem exprime et filtra. (Br. Wir. *Pid.*)

℞. Radicis Valerianae unciam unam.
— Serpentariae Virginicae semunciam.
Aquae Vitae . . . uncias octo.
Infunde, tunc exprime, filtra et colaturae adde
Camphorae . drachmam unam.
Solutionem serva. (*Vm.*)

Reizend, giftwidrig, auf den Uterus und gegen Epilepsie wirksam. — Gabe, vierzig bis sechszig Tropfen.

Tinctura antispasmodica et tonica. (*Pie.*)

℞. Radicis Valerianae,
Pulveris Chinae,
singulorum drachmas duas.
— Ipecacuanhae grana triginta.
Decocti bullientis Capitum Papaveris albi contusorum uncias sedecim.
Infunde per horas viginti quatuor in vase tecto et adde deinde
Syrupi Hederae terrestris unciam unam

Reizend. — Gabe, ein Eßlöffel täglich drei Mal.

Tinctura nervina (nervalis) et tonica. (*Ca. Vm.*)

℞. Radicis Valerianae,
Herbae Menthae piperitae,
singularum sesquiunciam.
Castorei . . . unciam unam.
Croci . . . . semidrachmam.
Essentiae Menthae drachmam unam.
Alcoholis . . . . libras duas.
Digere, cola exprimendo et filtra. (*Ca.*)

℞. Castorei . . . . partes duas.
Croci . . . . . partem unam.
Aquae Vitae,
— Menthae piperitae,
singularum partes viginti.
Infunde frigide per plures dies et adde
Radicis Valerianae partes duas.
Post aliquot dies exprime fortiter et filtra. (*Vm.*)

Reizend, bei Leiden von Schwäche und Magenkrampf. — Gabe, zwanzig bis dreißig Tropfen.

Tinctura s. Essentia Valerianae ammoniata s. volatilis. (Am. An. B*. Bor. Bor4. D. Du. Ed. Gen. Han. Lon. LonN. Lus. O. Pol. RC. Sax. Suec. Wür. *C. Sw. Vm.*)

℞. Radicis Valerianae sylvestris partem unam.
Alcoholis ammoniacalis partes sex.
Digere frigide per plures dies in vase tecto, subinde agitando et cola deinde. (B*. Bor. Bor4. D. Gen. Han. O. Pol. RC. Sax. Wür. *Sw.*)

Du. Radicis uncias duas et Alcoholis ammoniacalis octarium unum; — Ed. Radicis uncias quatuor et Alcoholis ammoniacalis octarios duos cum dimidio; — *Vm.* Radicis partem unam et octo Alcoholis ammoniacalis.

℞. Radicis Valerianae uncias quatuor.
Tincturae aromaticae ammoniatae octarios duos.
Post quatuordecim dies frigidae macerationis cola. (Am. Lon. LonN. *C.*)

Lus. Radicis uncias quatuor, Tincturae libras duas cum dimidia et octo dies macerationis.

℞. Radicis Valerianae pulveratae uncias duas.
Solutionis Subcarbonatis Ammoniaci alcoholicae libram unam.
Macera per dies octo, vas saepius agitando et cola. (Suec.)

℞. Valerianae grossiuscule pulveratae sesquiunciam.
Alcoholis (30°) uncias quatuor.
Ammoniaci liquidi (19°) uncias duas.
Macera per dies sex in vase tecto, subinde agitando, tunc cola frigide et filtra. (An.)

Ein Reizmittel, welches man in mehreren krampfhaften Krankheiten, besonders bei Epilepsie und Hysterie empfohlen hat. — Gabe, eine bis drei Drachmen in einem passenden Vehikel, z. B. Milch oder Hafergrütze. — Niemann schlägt als ein milderes Mittel eine Mischung aus Subcarbonatis Ammoniaci liquidi pars una, Tincturae Valerianae alcoholicae simplicis partes duae, vor.

Tinctura ammoniacea Valerianae composita. (*Pie. Vm.*)

℞. Radicis Valerianae uncias duas.
Olei essentialis Citri drachmam unam.

Caryophyllorum semidrachmam.
Spiritus Salis Ammoniaci semunciam.
Alcoholis . . . uncias sedecim.
Digere in balneo aquae per duos vel tres dies et filtra. (*Pie.*)

℞. Radicis Valerianae unciam unam.
Caryophyllorum,
Macidis,
singulorum drachmam unam.
Corticis recentis Citri sesquidrachmam.
Tincturae aromaticae ammoniacalis uncias viginti quatuor.
Post aliquot dies frigidae reactionis exprime et filtra.

Reizend, gegen Epilepsie empfohlen. — Gabe, zwanzig bis dreißig Tropfen in einem Baldrianaufguß.

Aqua acustica Ludovici. (Pal. *Sp.*)

℞. Radicis Valerianae,
— Levistici,
Herbae Rorismarini,
Florum Lavandulae,
singulorum semunciam.
Baccarum Lauri,
Castorei,
Camphorae,
singulorum drachmas duas.
Spiritus Juniperi libram unam.
Post quatuor dies macerationis adde
Ammoniaci liquidi . semunciam.
Olei Juniperi . semidrachmam.

Man bringt einige Tropfen davon auf Baumwolle in den Gehörgang ein.

E. Auszug durch Aether.

Tinctura Valerianae aetherea s. anodyna, Tinctura antispasmodica Keupii. (B*. Bor. Bor4. Fenn Ham. Han. Hass. HassP. Li. O. Pol. RC. Sax. Suec. WW. *Au. Br. Ca. Pie. Sw. T. Vm.*)

℞. Radicis Valerianae grossiuscule pulveratae . . . unciam unam.
Liquoris anodyni mineralis uncias octo.
Digere frigide per dies tres in vase tecto et filtra. (B*. Bor. Bor4. Fenn. Han. Pol. Sax. *Sw.*)

Hass. Valerianae uncias duas et Liquoris anodyni libram unam; — *Pie.* Radicis uncias octo, Liquoris sesquilibram; — *Vm.* Radicis partem unam et decem Liquoris; — *Br.* Radicis uncias tres, Liquoris libram unam et digestionem blando calore; — Ham. Li. O. et *Ca.* Radicis partem unam et quatuor Liquoris; — HassP. Valerianae unciam unam, Liquoris sex; — RC. Radicis unam et Aetheris sulphurici octo; — *T.* Valerianae drachmas duas et Aetheris 56° unciam unam per duos dies macerare.

℞. Radicis Valerianae pulveratae unciam unam.
Alcoholis concentrati uncias sex.
Digere blando calore in vase tecto et colaturae filtratae adde
Aetheris sulphurici drachmas duas.
Commisce bene. (Suec. WW.)

Au. Valerianae uncias sedecim, viginti Alcoholis et Acidi sulphurici duodecim.

Reizend, bei sogenannten nervösen Krankheiten, insbesondere Convulsionen, Krämpfen und Hysterie, empfohlen. — Gabe, ein bis vier Scrupel drei oder vier Mal täglich in einer Tasse Melissen- oder Pfefferminzthee.

Tinctura Valerianae camphorata s. Valerianae aetherea camphorata. (*Au.*)

℞. Camphorae . . . semidrachmam.
Tincturae Valerianae aethereae drachmas tres.

Gabe, fünfundzwanzig bis dreißig Tropfen in anomaler Gicht.

Tinctura anodyna. (B*.)

℞. Radicis Valerianae unciam unam.
Corticis Aurantii Curassavici drachmas duas.
Aetheris sulphurici uncias quatuor.
Digerantur blandissimo calore per dies octo et sub finem leviter ebullíant. — Reizend, krampfstillend. — Gabe, vierzig bis sechzig Tropfen.

Tinctura antispasmodica. (B*.)

℞. Radicis Valerianae,
Herbae Mari,
singularum unciam unam.
Liquoris anodyni mineralis uncias sex.
Post sex dies digestionis filtra.

Riemann hat diese Formel auf folgende Weise verändert:

℞. Radicis Valerianae,
Herbae Mari,
singularum semunciam.
Alcoholis . . . uncias quatuor.
Acidi sulphurici Aqua diluti drachmam unam.
Digere blando calore per horas quatuor.

Reizend, krampfstillend, gegen Epilepsie. — Gabe, ein Kaffeelöffel in Wein.

Elixir antispasmodicum. (Ful. *Sw*. Vm.*

℞. Tincturae Valerianae uncias duas.
Liquoris anodyni mineralis drachmas duas.
Misce et in illis dissolve
Camphorae pulveratae drachmam unam.
Serva. (*Vm.*)

℞. Radicis Valerianae,

Radicis Serpentariae Virginicae, singularum unciam unam.
Alcoholis . . uncias duodecim.
Post sufficientem infusionem cola exprimendo, filtra et adde
Aetheris sulphurici uncias duas.
Camphorae . drachmam unam.
Dissolve. (*Sw*.)

℞. Camphorae . drachmam unam.
Aetheris sulphurici uncias duas.
Solutioni adde
Extracti Valerianae unciam unam.
Aquae Chamomillae uncias sex.
Misce. (Ful.)

Gabe, ein bis zwei Scrupel täglich mehrmals.

F. Auszug durch Destillation.

Oleum Valerianae aethereum, Aethereoleum Valerianae. (A. Ba. Bel. Bor. Bor4. Han. Hass. HassP. Li. O. Pol. R. Sax. *Sw. T.*)

℞. Radicis Valerianae quantum vis.
Aquae . . . quantum sufficit.
Destillent. (Bel. R.)

Sw. T. Radicis partem unam et quatuor Aquae (*T.* post macerationem per unum diem dimidium destillando abstrahere et super novam materiam cohobare); — Bor. Bor4. Han. HassP. O. Pol. et Sax. Radicis partem unam et Aquae octo; — Ba. Radicis unam et novem Aquae; — A. Radicis unam et Aquae duodecim.

℞. Radicis Valerianae partes quatuor.
Aquae . . . . partes sedecim.
Post tres dies macerationis adde
Salis culinaris . . partem unam.
Destillent. (Hass.)

℞. Radicis Valerianae . libras sex.
Alcoholis . . . libram unam.
Post duos dies adde
Aquae . . . libras octodecim.
Destillent. (Li.)

Oleosaccharum s. Elaeosaccharum Valerianae. (A. Bor. Bor4. Han. HassP.)

℞. Sacchari albi drachmam unam.
Olei essentialis Valerianae grana tria.
Tritura simul. (A.)

Bor. Bor4. et Han. Sacchari unciam unam et Olei guttas viginti quatuor; — HassP. Sacchari drachmas duas, Olei guttas tres.

Aqua Valerianae. (A. B*. Ba. Br. Gal. Han. Hass. HassP. Li. Pol. Sax. *Fi. Vm.*)

℞. Radicis Valerianae partem unam.
Aquae . . . quantum sufficit.
Post horas viginti quatuor destillent sex (Hass.) vel septem (Han.) partes.

Br. Radicis partem unam et tres Aquae; destillet dimidia pars; — Gal. *Fi.* Radicis partem unam et quinque Aquae; destillent partes duae; — *Vm.* Radicis partem unam et Aquae decem; destillent partes duae; — A. Radicis partem unam et Aquae duodecim; destillent partes quatuor; — Pal. et Sax. Radicis partem unam et Aquae duodecim; destillent partes novem; — B*. et Ba. Radicis partem unam et Aquae octodecim; destillent partes decem; — HassP. Valerianae libras tres, Aquae quantum sufficit; destillent librae viginti quatuor.

℞. Radicis Valerianae libras duas.
Aquae . . . libras duodecim.
Radicem in saccum include, medio cucurbitae ita suspensum ut aquam non attingat et destillando libras sex abstrahe. (Li.)

Aqua Valerianae composita, Spiritus Valerianae compositus. (*Pid.*)

℞. Radicis Valerianae uncias novem.
— Levistici . . uncias tres.
Herbae Pulegii . . uncias duas.
— Sabinae . unciam unam.
Aquae fontanae,
Alcoholis, singulorum libras octo.
Post duos dies digestionis destillent librae octo.

Valerianella.

Valerianella olitoria, Dufr.; Gemüserapunzel; Doucette, Mache (*Gal.*).

Gal. *Be.*

☉ (Triandria Monogynia, L.; Valerianeae, *J.*) Eine in Europa gemeine Pflanze.

Man wendet das Kraut an; es besteht aus einem ästigen Stängel mit länglichen, sitzenden, ganzen oder kaum gezähnten Blättern, welcher aus einer Rose ähnlicher, ausgebreiteter Wurzelblätter hervorkommt. Der Geschmack ist fade.

Erweichend.

Vanilla.

Vanilla aromatica, Sw.; Vanille; Vanille (*Gal.*); Vanilla (*Ang.*); Wanylie (*B.*); Vagnilla (*His.*); Banilje (*Bel.*); Vaniglia (*I.*); Tlilxachitl (*Me.*); Waniliia (*Pol.*); Vanilj (*Suec.*).

An. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Fenn. Fer. Gal. Han. HassP. His. Pol. R. Sax. Suec Wir. Wür. *Be. Br. Fi. G. M. Pid. Sp. Z.*

Eine rankende Schmarotzerpflanze (Gynandria Diandria, L.; Orchideae, *J.*) Südamerica's. (*Blackw.* t. 590. *Plenck* t. 646. Fl. méd. VI. 345.)

Man wendet die Früchte (siliquae Vanillae s. Vanilliae s. Vanigliae s. Banillae s. Araci aromatici) an; es sind

vier bis acht Zoll lange, zwei bis drei Linien breite, gerade, am Grunde gekrümmte, walzenförmige, gefurchte, glänzende, zusammengedrückte, in eine Art gestieltes Wärzchen endigende Schooten von schwärzlichbrauner Farbe, mit zwei dicken, leicht brechenden, obgleich nicht besonders weichen Klappen, welche in einem weichen braunen Mark sehr viele rundliche, schwärzliche, glänzende Saamen enthalten. Der Geruch ist stark und angenehm, der Geschmack brennend und beißend.

Reizend. — Gabe des Pulvers, von fünfzehen Gran bis zu einer Drachme.

Pulvis Vanillae. (Gal. GalP. GalH.)

℞. Vanillae in frustula parva concisae partem unam.
Sacchari albi . . . partes duas.
Contundendo in mortario ferreo in pulverem subtilissimum redige, quem per cribrum setaceum trajice; quod supra cribrum remanet, denuo contunde, donec cribrari possit.
GalP. et GalH. Sacchari partes quatuor.

Wakaka Indorum. (*Ca.*)

℞. Sacchari pulverati uncias quatuor.
Cacao mundati pulverati sesquiunciam.
Sacchari Vanillae pulverati semunciam et drachmas duas.
Pulveris Cinnamomi,
— Orleanae,
singulorum drachmam unam.
Misce. — Gabe, ein Eßlöffel in Milch, Chocolate oder Suppe.

Syrupus Vanillae. (*Br*. Vm.*)

℞. Vanillae pulveratae partes quatuor.
Gummi Arabici . partem unam.
Aquae . . . . . partes sex.
Tritura simul ut fiat emulsio, cola fortiter exprimendo et colaturae adde syrupum refrigeratum e
Sacchari albi partibus viginti duabus.
Aquae . . . partibus duodecim.
Liqua blando calore in mixtura
Sacchari albi partes viginti duas.

℞. Vanillae electae . uncias duas.
Sacchari albi uncias septemdecim.
Aquae fluvialis . uncias decem.
Alcoholis (21°) . drachmas sex.
Vanillam in frusta minora concisam porphyrisa, saccharum et alcoholem sensim addendo ut fiat pasta mollis et homogenea; in retortam immitte cum reliquo sacchari et aquae; adde Albumen Ovi unius, balneo aquae immitte per horas octodecim vel viginti, subinde agitando, sepone deinde per unum diem et per pannum cola.

Tinctura Vanigliae s. Vanillae. (B*. HassP. Sax.)

℞. Vanillae . . . partem unam.
Alcoholis . . . partes decem.
Digere blando calore per dies octo. (Sax.)
B*. secundum *Pfaff* Vanillae partem unam et Alcoholis sex; — HassP. Vanillae unam et Spiritus rectificati octo; digere per quatriduum; tinctura pondus unciarum sex habeat.
Reizend, nervenstärkend und analeptisch. — Gabe, vierzig Tropfen in Wein.

Alkermes liquidum, Alcohol cum Coccionella compositum. (*Fi. Vm.*)

℞. Ambrae griseae scrupulum unum.
Caryophyllorum semidrachmam.
Cinnamomi . . drachmas duas.
Vanillae,
Coccionellae,
singularum semunciam.
Aquae Vitae . . . libras tres.
Infunde per dies duos in balneo aquae tepido, filtra deinde et in liquore balnei aquae ad 60° R. ope calefacto solve mixturam e
Sacchari albi . . libris tribus.
Mellis Narbonnensis libris sex.
Syrupum postquam clarus prodiit, decantha et per pannum laneum cola.
Fi. Caryophyllorum, Vanillae, singulorum drachmas duas, Cinnamomi, Coccionellae, singulorum semunciam, Aluminis de Rocca scrupulum unum, Alcoholis 24° libras tres cum dimidia, Aquae Florum Aurantiorum libras duas, Aquae Cinnamomi lacteae libram unam, Sacchari libras quinque.

Aqua Vanillae. (B*.)

℞. Vanillae . . . . libram unam.
Subcarbonatis Potassae uncias tres.
Aquae . . . libras duodecim.
Post horas viginti quatuor digestionis destillet dimidia pars.

Spiritus Vanillae. (B*.)

℞. Vanillae . . . . . uncias sex.
Subcarbonatis Potassae sesquiunciam.
Alcoholis . . . . . libras sex.
Post horas viginti quatuor macerationis adde
Aquae . . . . . libras sex.
Destillent lente librae sex.

Variolaria.

Variolaria orcina, Ach.
Von dieser Pflanze, doch besonders von

Roccella tinctoria, *Cand.*, einem Cryptogam, welches auf den Felsen der Canarischen Inseln, des grünen Vorgebirgs und des Archipels wächst (*Pluk* Alm. t. 255. f. 6), bereitet man die Orseille,

Roccella; Orseille (*Gal.*).

Ba. Du. Gal. *Be. C. G. M.*

einen festen, dunkelvioletrothen Farbeteig von starkem unangenehmem Geruch; der von der zweiten Pflanze ist von besserer Qualität.

Veratrinum.

Veratria, Veratrina; Veratrin; Veratrine (*Gal.*).

Fi. Ma. T

℞. Granorum Sabadillae quantum vis. Alcoholis bullientis ope penitus extrahe, filtra statim et post refrigerationem denuo filtra; colaturam ad consistentiam extracti consume, in Aqua solve, solutionem filtra et vaporando lente consume; praecipitatum inde exortum separa, colaturae Acetatem Plumbi liquidum infunde, praecipitatum nova filtratione separa, torrentem Acidi hydrocyanici per liquorem transmitte, denuo filtratum vaporatione concentra, per Magnesiam tracta, praecipitatum formatum Alcohole bulliente penitus extrahe et tincturas alcoholicas vaporando ad siccum consume.

Ein heftiges Reizmittel und fürchterliches Gift, welches in der Gabe zu einem Viertelgran purgirt.

Solutio Veratrini. (*Ma.*)

℞. Sulphatis Veratrini granum unum.
Aquae destillatae . uncias duas.

Tinctura Veratrini. (*Ma.*)

℞. Veratrini . . uncias quatuor.
Alcoholis . . . unciam unam.

Gabe, zehen, fünfzehen, zwanzig und fünf und zwanzig Tropfen in einer Potion. — Aeußerlich in Einreibungen bei Gicht, Hautwassersucht, innerer Wassersucht und Leukophlegmatie.

Pilulae Veratrini. (Ma.)

℞. Veratrini . . . . semigranum.
Gummi Arabici,
Syrupi Gummi,
singulorum quantum sufficit.

Fiant pilulae sex grani unius. — Gabe, anfangs eine, bis auf drei Stück täglich gestiegen.

Unguentum s. Pomatum Veratrini. (*Ma.*)

℞. Veratrini . . . grana quatuor.
Axungiae Porci . unciam unam.

In Einreibungen bei chronischen Rheumatismen, Hautwassersucht und Gicht.

Verbascum.

Von dieser Pflanzengattung werden in den Pharmacopöen zwei Arten angeführt:

1) *Verbascum Thapsus, L.*; Wollkraut, Königskerzenkraut; Bouillon blanc (*Gal.*); Great mullein (*Aug.*); Diwizna (*B.*); Kongelys (*D.*): Gordolobo (*His.*); Wollekruid (*Bel.*); Verbasco (*I.*); Dziewanna ziele (*Pol.*); Verbasco branco (*Lus.*); Kungsljis (*Suec.*).

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor. Br. D. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. Li. O. Pol. R. Sar. Suec. Wir. Wür. WW. *Be. Br. Fi. G. M. Pid. Sp.* Z.

♂ (Pentandria Monogynia, L.; Solaneae, *J.*) Eine in Europa gemeine Pflanze. (*Blackw.* t. 3. *Schk.* t. 42. *Plenck* t. 109. *Zorn* Ic. pl. t. 197.)

Man wendet die Blätter und die Blüthen an.

Die Blätter (folia s. herba Verbasci albi) sind lanzettförmig, auf beiden Seiten stark filzig, gezähnt und weich. Sie haben einen angenehmen Geruch und einen schleimigen, etwas bittern und schwach styptischen Geschmack.

Die Blüthen (flores Verbasci) sind gelb, sehr groß, und haben einen angenehmen Geruch und einen süßen, schleimigen Geschmack.

Erweichend.

Man kann statt desselben auch das Verbascum phlomoides, L. (*Gal.*), eine Europäische Pflanze (*Lob.* Ic. 560. 661.), nehmen, dessen Blätter eirundlänglich, spizzig, die untern in einen geflügelten Stiel verdünnt, die obern herzförmig ausgerandet, und dessen Blüthen gelb oder weiß sind.

Nach Morin's Analyse gaben die Blüthen ein gelbliches ätherisches Oel, einen fetten, der Oelsäure ähnlichen Stoff, Phosphorsäure, Aepfelsäure, uncrystallisirbaren Zucker, Schleimharz, Chlorophyll, gelbes Harz und Salze.

2) *Verbascum nigrum, L.*; schwarze Königskerze, schwarzes Wollkraut; Bouillon noir (*Gal.*).

Gal. *M.*

♃ Eine in ganz Europa wachsende Pflanze. (*Zorn* Ic. pl. t. 25.)

Man wendet die Wurzel und die Blüthen an.

Die Wurzel (radix Verbasci nigri) ist ästig, wenig behaart, außen hellbraun, inwendig gelblichbraun.

Die Blüthen sind gelb, sehr klein, geruchlos und von schleimigem Geschmack.

Erweichend.

Extractum Verbasci (albi). (Wür.)

℞. Florum siccorum Verbasci
quantum vis.

Alcoholis . . quantum sufficit. Digere blando calore, in vase tecto, et decantha liquorem; novum Alcoholem adde, donec non amplius tingatur; tincturis commixtis trientes duo in balneo aquae destillent et reliqua ad mellis consistentiam evaporent.

Decoctum Verbasci (albi) anodynum s. compositum, Fotus anodynus.

℞. Foliorum Verbasci albi,
— Malvae,
ℵ singulorum sesquiunciam.
Seminum Lini . . uncias duas.
Capitum Papaveris albi
scrupulum unum.
Aquae . . . . libras quatuor.

Coque per horae quadrantem. — Besonders äußerlich in Waschungen angewendet.

Oleum Verbasci (albi). (Br. Wir. Wür.)

℞. Florum Verbasci albi
partem unam.
Olei Olivarum . . partes duas.

Digere per tres dies igne leni, tunc ad humidi consumptionem coque et exprimendo cola. (Ful. Wür.)

Br. et Wir. Florum et Olei partes aequales et octo dies digestionis.

Lindernd, schmerzstillend, in Fällen von Hämorrhoiden und Frostbeulen empfohlen.

Verbena.

Man findet von dieser Pflanzengattung zwei Arten in den Pharmacopöen angezeigt:

1) *Verbena officinalis, L.;* Eisenhart, Eisenkraut; Verveine commune (*Gal.*); Vervaine, Holy herb (*Ang.*); Wrbynka (*B.*); Ma-pien-tsac (*C.*); Jernurt (*D.*); Verbena (*His. I. Lus.*); Yzerhard (*Bel.*); Zeletnik (*Pol.*); Schelesnik (*R.*); Jaernaert (*Suec.*).

An. Fer. Gal. Gen. His. Li. Wir. Wür. *Br. G. M. Sp.* Z.

⊙ oder ♂ (Diandria Monogynia, L.; Verbenaceae, J.) Eine Europäische Pflanze. (Fl. méd. VI. 346.)

Man wendet das Kraut (herba Verbenae) an; es besteht aus einem vierseitigen, harten, einfachen oder in einige gegenüberstehende, sehr ausgebreitete Zweige getheilten Stängel mit entgegengesetzten, gestielten, eirundlänglichen, etwas runzligen, mit einigen kurzen Haaren besetzten, tief in ungleiche, stumpfe, ganze Lappen, von denen der Endlappen größer ist, getheilten Blättern. Es hat keinen Geruch und einen etwas bittern und abstringirenden Geschmack.

2) *Verbena triphylla, L.;* dreiblättriges Eisenkraut; Verveine citronelle (*Gal.*); Yerba luisa (*His.*).

Per. Gal. His. *Br.*

ħ Decandria Monogynia, L.; Verbenaceae, J.) Eine Pflanze Chili's.

Man wendet die Blätter (folia Aloysiae) an; sie sind dreizeilig und verbreiten einen angenehmen, citronähnlichen Geruch.

Extractum. (*T.*) E succo expresso cum aquae modica quantitate diluto et evaporato.

Veronica.

Fünf Arten dieser Pflanzengattung finden sich in den Pharmacopöen angeführt:

1) *Veronica Beccabunga, L.;* Bachbungen, Bachbohnen, Wasserbungen; Grand Beccabunga, Véronique cressonée (*Gal.*); Brooklime (*Ang.*); Lemmike, Ledmye, Bekbung (*D.*); Becabunga (*His*); Backebom (*Bel.*); Becabunga (*I.*); Patocznik (*Pol.*); Beccabunga (*Lus.*); Baekabunga (*Suec.*).

Ams. An. B. Ba. Bel. Br. D. Du. Fer. Ful. Gal. Gen. His. RC. Wir. *Bc. Br. C. Fi. G. M. Pid. Sp.* Z.

♃ (Diandria Monogynia, L.; Rhinantheae, J.) Eine in Europa an dem Ufer von Bächen wachsende Pflanze. (Fl. méd. II. 60.)

Das Kraut (herba Beccabungae) besteht aus einem walzenförmigen, unten röthlichen, oben grünen, saftigen Stängel mit entgegengesetzten, kurzgestielten, eirunden, glatten, etwas fleischigen, klein gezähnten Blättern. Man wendet es nur frisch an.

Reizend, antiscorbutisch.

2) *Veronica Anagallis, L.;* Wasserliebender Ehrenpreis; Petit Beccabunga (*Gal.*); Long leav'd brooklime (*Ang.*).

Gal His.

♃ Eine Europäische Pflanze. (*Oed.* Fl. Dan. t. 903.)

Man wendet das blühende Kraut (herba Anagallidis aquaticae) an; es besteht aus einem aufrechten Stängel mit lanzettförmigen, spitzigen, gezähnten Blättern und seitlichen blauen Blüthentrauben. Es hat keinen Geruch, aber einen bittern, scharfen Geschmack.

Reizend

Man giebt beide Pflanzen im Aufguß, eine bis zwei Hände voll auf die Pinte Wasser.

3) *Veronica officinalis, L.;* Ehrenpreis; Véronique officinale, Véronique mâle (*Gal.*); Male speedwell (*Ang.*); Weronyka (*B.*); Oerenpriis (*D.*); Veronica (*His. I. Lus.*); Gemeene eerenprys (*Bel.*); Przetacznik (*Pol.*); Ernpris (*Suec.*).

A. Ams. An. B. Ba. Bor. Bor4. Br. D. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. HasP. His. Lon. LonN. Lus. O. Pol.

B. Sax. Suec. Wir. Wür. Be. Br. Fi. G. M. Pid. Sp. Z.

4 (Diandria Monogynia, L.; Pedicularіae, J.) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (Fl. méd. VI. 345.)

Man wendet das blühende Kraut (herba Veronicae) an; es besteht aus einem walzenförmigen, behaarten Stängel mit gegenüberstehenden, ziemlich kurzgestielten, eirunden, stumpfen oder etwas spitzigen, am Grunde verschmälerten, rauhen, behaarten, wie chagrinartigen, sägezähnigen Blättern. Es hat keinen Geruch; der Geschmack ist etwas bitter und schwach styptisch.

Schwach tonisch, antiscorbutisch. — Gabe des Saftes, eine bis zwei Unzen.

4) *Veronica Teucrium, L.*; Brustthee-kraut, Erdbathengel; Véronique teucriette (*Gal.*).

4 Eine Europäische Pflanze. (*Lob.* Ic. t. 478.)

Man wendet das blühende Kraut (herba Veronicae teucriifoliae) an; es besteht aus eirunden, runzligen, gezähnten, stumpfen, von einem runden, behaarten Stängel getragenen Blättern und hellblauen, lange Trauben bildenden Blüthen. Es hat keinen Geruch, aber einen bittern, adstringirenden Geschmack.

5) *Veronica Virginica, Willd.*, Virginischer Ehrenpreis; Véronique de Virginie (*Gal.*).

Am. C.

Man wendet die Wurzel an, deren Arzneikräfte noch nicht genau bekannt sind.

Conserva Beccabungae. (Wir. T.)

℞. Herbae Beccabungae cum floribus partem unam.
Sacchari albi pulverati partes duas.
Contunde bene simul.

T. Herbam recentem cum Sacchari parte aequali in pulpam redigere et hanc cum Sacchari in dimidio pondere Aquae cocti libris duabus commiscere.

Conserva Veronicae. (Wir.)

℞. Herbae Veronicae recentis et contusae . . . . . partem unam.
Sacchari . . . . . partes duas.
Contere.

Succus Beccabungae. (Wür. T)

℞. Herbae Beccabungae quantum vis.
Contunde in mortario lapideo, exprime fortiter, sepone succum, decantha et in lagenis serva, cuique librae liquoris Alcoholis drachmam unam addendo.

Succus Veronicae. (T.) Simili modo ut succus beccabungae paratur.

Species pectorales s. pro The s. pro Thea. (Li. R. Ca. Pid.)

℞. Radicis Graminis sesquiunciam.
Herbae Millefolii . uncias duas.
Herbae Veronicae . uncias tres.
Concisa misce. (*Pid.*)

℞. Herbae Farfarae,
— Veronicae,
singularum uncias quatuor.
Radicis Liquiritiae,
— Polypodii,
singularum uncias duas.
— Althaeae . unciam unam.
Foeniculi . . . . drachmas sex.
Concisa et contusa misce. (Li.)

℞. Foliorum Veronicae,
— Hederae terrestris,
— Tussilaginis,
— Scabiosae,
singulorum uncias tres.
— Melissae,
— Salviae,
singulorum semunciam.
Concisa misce. (*Ca.*)

℞. Florum Chamomillae vulgaris,
Herbae Veronicae,
singulorum partes sex.
Foliorum Salviae . partes duas.
Concisa misce. (R.)

Aqua Beccabungae. (A. Sar.)

℞. Herbae Beccabungae contusae partem unam.
Aquae . . . . . partes duas.
Destillent trientes duo. (Sar.)

℞. Succi depurati Beccabungae quantum vis.
Destillent fere ad siccum. (A.)
Gabe, zwei bis vier Unzen.

Aqua Veronicae. (Gal. Pal. T.)

℞. Herbae Veronicae partes quinque.
Aquae . . . . partes viginti.
Destillent partes decem. (Gal.)

Pal. Herbae partem unam et tres Aquae; destillet dimidia pars; — T. Herbae partem unam, Aquae quatuor; destillet dimidium.

Gabe, zwei bis vier Unzen.

Aqua Veronicae vinosa. (Br. Wir. Sp.)

℞. Herbae Veronicae cum floribus libras tres.
Vini albi . . . . libras octo.
Post aliquot dies macerationis destillet dimidia pars.

Infusum Veronicae. (GalM. Ra.)

℞. Florum Veronicae . semunciam.
Aquae bullientis . libras duas.
Infunde et cola. (Ra.)

℞. Florum Veronicae partes centum.
Liquiritiae rasae . partes octo.
Aquae bullientis quantum sufficit.
Infunde et cola. (GalM.)

Extractum Beccabungae. (Sar.)

℞. Herbae recentis Beccabungae quantum vis.
Contunde in mortario, exprime succum et in balneo aquae ad extracti consistentiam inspissa.

Gabe, von einem Scrupel bis zu einer Drachme.

Extractum Veronicae. (Br. Sar. Wir. *T.*)

℞. Herbae Veronicae libram unam.
Aquae fontanae . . libras sex.

Macera per dies quatuor in loco calido, tunc coque parumper, cola exprimendo et colaturam ad extracti consistentiam consume. (Br. Wir.)

℞. Herbae Veronicae recentis et contusae . . . . . libras octo.

Macera per tres dies in alembico, tunc destillatione in balneo aquae uncias circiter duas Aquae abstrahe; residuo triplum Aquae infunde, coque ad tertiae partis remanentiam, clarifica et cola liquorem, ad electuarii consistentiam vaporando redige et illi nonnisi tepido Aquam destillatam adde. (Sar.)

T. ut extractum verbenae.

Gabe, von einem Scrupel bis zu einer Drachme.

Syrupus de Veronica. (Wir.)

℞. Herbae Veronicae . uncias sex.
Aquae Veronicae alcoholicae destillatae . . . libram unam.

Infunde in loco calido, cola fortiter exprimendo et in liquore solve
Sacchari albi . uncias sedecim.

Gabe, eine halbe bis zwei Unzen.

Syrupus pectoralis. (Li.)

℞. Specierum pectoralium (Li.) uncias octo.
Caricarum . . uncias quatuor.
Aquae . . . . libras quinque.

Coquendo tertiam partem consume, cola exprimendo et colaturae adde
Sacchari albi . libras quatuor.

Solutionem, postquam semel vel bis ebulliverit, cola.

Vicia.

Zwei Arten dieser Pflanzengattung findet man in den Pharmacopöen angeführt:

1) *Vicia sativa, L.*; Futterwicke; Vesce commune (*Gal.*).

Gal.

☉ (Diadelphia Decandria, L.; Leguminosae, *J.*) Eine ursprünglich in der Levante einheimische, in ganz Europa gebaute Pflanze. (*Oed.* Pl. Dan. t. 522)

Man wendet den Saamen (semen Vicine) an; er ist schwarz und zusammengedrückt.

2) *Vicia Ervilia, Cand*; Erve; Ers (*Gal.*); Ervilia, Tare (*Ang.*); Erve (*D.*); Erven (*Bel.*); Erwa (*Suec.*).

Per. Wir. *Br. M. Sp.*

☉ Eine in Europa wachsende Pflanze. (*Blackw.* Herb. t. 208. f. 3.)

Man wendet den Saamen (semen Ervi s. Orobi) an; er ist etwas platt, braun, geruchlos und von einem unangenehmen, etwas bittern Geschmack.

Das Mehl wird bisweilen zu erweichenden Breiumschlägen genommen.

Vinca.

Zwei Arten dieser Pflanzengattung werden in den Pharmacopöen angeführt:

1) *Vinca major, L.*; großes Singrün; Pervenche majeure, Grande Pervenche (*Gal.*).

Gal.

♃ (Pentandria Monogynia, L.; Apocyneae, *J.*) Eine Pflanze des mittägigen Europa's. (Nouv. Duh. *I.* 14.)

Man wendet das Kraut an; es besteht aus eirunden, am Rande schwach behaarten am Grunde herzförmig ausgerandeten Blättern.

2) *Vinca minor. L.*; Singrün; Pervenche mineure, petite Pervenche (*Gal.*); Small pervincle (*Ang.*); Vingraen (*D.*; Pervinca (*His. I. Lus.*); Vinkoorde (*Bel.*); Barwinck (*Pol.*).

Br. Gal. His. Wir. *Be. M. Pid. Sp.*

♃ Eine in einem großen Theile Europa's gemeine Pflanze. (*Zorn* Ic. pl. t. 67.)

Man wendet das Kraut (herba Vincae s. Pervincae s. Clematidis s. Daphnoidis) an; es besteht aus einem dünnen und rankenden Stängel mit eirundlänglichen, glatten, glänzenden, kurzgestielten Blättern: Es hat keinen Geruch; der Geschmack ist bitter und adstringirend.

Beide Pflanzen sind schwach adstringirend.

Vinum.

Olvos; Wein; Vin (*Gal.*); Wine (*Ang.*); Khumar (*Ar.*); Winny (*S.*); Scherab unghury (*Duk.*); Vino (*His. I.*); Drakhka mud (*Hi.*); Mey (*Pc.*); Wino (*Pol.*); Winho (*Lus.*); Mada, Madira (*Sa*); Win (*Suec.*).

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. Lus. O. Pol. RC. Sax. Suec. *A. Be. C. M. Par. Sa. T.*

Eine rothe oder weiße Flüssigkeit, welche man durch Gährung des Weintraubensafts oder Weinmosts erhält.

Der Wein besteht aus Wasser, Alcohol, Schleim, Essigsäure, Weinsteinkali, weinsteinsaurem Kalk und färbenden Stoffen, deren verschiedene Mengenverhältnisse zu einander die fast unzähligen Verschiedenheiten dieser Flüssigkeit hervorbringen, welche man im Handel antrifft.

Die Wirkungsart des Weines auf den Organismus ist sehr verschieden, je nachdem Alcohol, Zucker, Essigsäure oder Kohlen-

säure in demselben vorherrscht. Da man aber in der Therapie nur solche Weine anwendet, welche viel Alcohol, oder mehr oder weniger herbes Wesen besitzen, wie der Bordeauxwein (Vinum Bordegalense), der Burgunder (V. Burgundicum), der Madera (V. Maderanum), der Alicantewein (V. Alicantinum), der Xeres (V. Xerense), der Malagawein (V. Malacense s. Hispanicum), der Ungarische (V. Hungaricum), der Rheinwein (V. Rhenanum), der rothe und weiße Franzwein (V. Gallicum rubrum et album), so wirken sie meist zugleich tonisch und erregend. Doch wendet man den Wein selten für sich allein an, sondern er dient in den meisten Fällen als Vehikel andrer Substanzen, deren Wirkung kräftiger ist oder dafür gehalten wird.

Cataplasma exsiccans. (Fer. *Fi.*)

℞. Farinae Lupini . . . uncias octo.
— Secalis . . . uncias quatuor.
Vini albi . . . libras quatuor.
Coque sufficienter.

Lotio vinosa, Fomentatio vinosa. (GalM. *Ra.*)

℞. Vini rubri . . . libram unam.
Mellis . . . . . uncias duas.
Dissolve. (*Ra.*)

℞. Tincturae aromaticae partem unam.
Vini rubri . . . partes viginti.
Misce. (GalM.)

Balsamum Samaritanum. (*Ca. Pie. Sp.*)

℞. Vini generosi,
Olei Olivarum,
singulorum partes aequales.
Misce exacte.

Posca Galeni, Potio s. Limonada vinosa. (*E. Ra. Sm. Sp.*)

℞. Vini . . . . . partes tres.
Aquae . . . . . partes duas.
Leviter coque. (*Sp.*)

℞. Vini Hispanici,
Aquae fontanae,
Syrupi Rihium,
singulorum drachmas duas.
Misce. (*Sm.*)

℞. Vini albi,
Aquae, singulorum libram unam.
Alcoholis,
Syrupi tartarici,
singulorum unciam unam.
Misce. (*Ra.*)

℞. Glaciei contusae mensuram (Untertasse) dictam.
Vini Maderani
cochlear majus (Eßlöffel).
Aquae Cinnamomi hordeatae
cochlear minus (Kaffeelöffel).
Sacchari pulverati quantum vis.
Misce. (*Sm.*)

℞. Vitellum Ovi . . . . no. 1.
Olei Cinnamomi guttas viginti.
Vini albi,
Aquae Cinnamomi,
singulorum guttas tres.
— purae . . . uncias duas.
Sacchari . . . drachmas duas.
Misce. (*E.*)

Man giebt von letzterer Potion drei Löffel auf einmal.

Viola.

In den Pharmacopöen werden vorzüglich folgende drei Arten dieser Pflanzengattung angeführt:

1) *Viola odorata, L.*; Märzveilchen; Violette de Mars (*Gal.*); Sweet violet (*Ang.*); Manischor (*Arm.*); Fiola wonna neb modra (*B.*); Kiet-tuong-hoa (*C.*); Martsfioler (*D.*); Violetta (*His. Lus.*); Tamme viool (*Bel.*); Viola (*I.*); Fiolki (*Pol.*); Par lutschaja (*R.*); Aekta fioler (*Suec.*).

Ams. Au. B. Ba. Bel. Bor. Bord. Br. D. Du. Ed. Fer. Kul. Gal. Gen. Han. His. Li. O. Pol. R. Sax. Wir. Würt. *Be. Br C. Fi. G. M. Sp.* Z.

♃ (Syngenesia Monogamia, L.; Violaceae, J.) Eine in ganz Europa wachsende Pflanze. (Fl. méd. VI. 369.)

Man wendet die Wurzel, das Kraut, die Blüthen und den Saamen an.

Die Wurzel (radix Violariae s. Martiae) besteht aus vielen bäschligen Fasern und hat einen scharfen, widerlichen Geschmack.

Das Kraut besteht aus einem Strauß herzförmiger, fein gekerbter, grüner, graugrüner, stumpfer oder etwas spitziger Wurzelblättern. Es ist geruchlos und hat einen krautartigen, schleimigen, etwas bittern Geschmack.

Die Blüthen besitzen die ihnen eigenthümliche blaue Farbe, verlieren beim Trocknen ihren angenehmen Geruch und haben einen bittern, etwas schleimigen Geschmack.

Der Saame ist klein, rundlich und weißlich.

Die ganze Pflanze ist mehr oder weniger reizend, Ekel und Erbrechen erregend.

2) *Viola canina, L.*; Hundsveilchen; Violette sauvage (*Gal.*); Dog's violet (*Ang.*); Wilde fioler (*D.*); Wilde Viool (*Bel.*); Skogsfioler (*Suec.*).

Gal. *M.*

♃ (Pentandria Monogynia, L.; Violaceae, J.) Eine in Europa sehr gemeine Pflanze. (*Curt.* Fl. Lond. t. 108.)

Die Wurzel (radix Violae caninae) ist scharf und Ekel erregend.

3) *Viola pedata, L.*; Violette digitée (*Gal.*).

Am. *C.*

♃ Eine Nordamericanische Pflanze. (*Pu.* Fl. Amer. p. 171.)

Das Kraut, welches man anwendet, besteht aus einem Büschel handförmiger, kammförmig gezähnter, mit Nebenblättern versehener Blätter.

Aqua Violarum. (Fer. Pal. Sar.)

℞. Florum Violarum partem unam.
Aquae . . . . partes quatuor.
Post horas sex destillent partes duae. (Sar.)

Pal. Florum partem unam et Aquae tres; destillet pars una cum dimidia; — Fer. Florum partes tres et sedecim Aquae; destillent partes octo.

Julapium Violarum, Julep violatum. (Pal. Wir. *Sp.*)

℞. Sacchari albi 9
libras duas cum dimidia.
Aquae Violarum uncias viginti.
Ebulliant semel, tunc colentur.

Emulsio violata s. Violarum. (Wir. *Sp.*)

℞. Amygdalarum dulciam
unciam unam.
Seminum Violarum drachmas duas.
— Papaveris albi semidrachmam.
Aquae Violarum,
— Nymphaeae,
— Lactucae,
singularum uncias tres.
Emulsioni adde
Syrupi Violarum unciam unam.

Succus Violarum. (His. Sar.)

℞. Florum Violarum a calio bus liberatorum . . . quantum vis.
Contunde in mortario fictili, cola exprimendo, succum in locum frigidum sepone et post aliquot tempus partem limpidam decantha.

Tabellae violatae s. Violarum. (Sar.)

℞. Succi Violarum . . uncias tres.
Sacchari pulverati . libras duas.
Pulveris Iridis Florentinae
unciam unam.
Fiant tabellae.

Conserva Violarum. (His. Pal. Sar. Wir. *Fi. T.*)

℞. Florum recentium Violarum
partem unam.
Sacchari albi . . partes duas.
Contere simul. (Pal. Wir.)

Sar. *Fi.* Petalorum partem unam cum Sacchari pauxillo tritorum in Sacchari clarificati partes tres inficere et unam ebullitionem jubet; — His. Contundere Petalorum partem unam, addere Syrupi spissi partes duas et lente ad aptam consistentiam usque evaporari; — *T.* ut conservam rosarum, praeterea et *Conservam siccam* cum Petalorum siccorum parte una, Sacchari quinque et Aquae Violarum q. s. confer. cons. rosar.

Infusum Violarum. (Sar, *ParC. Ra. T.*)

℞. Florum Violarum drachmas duas.
Aquae bullientis . libras duas.
Infunde et cola. (*Ra.*)

℞. Florum Violarum . libras duas.
Aquae bullientis . libras octo.
Digere per horas octo et cola leviter exprimendo; operationem novies cum novis floribus repete. (Sar.)

T. 1) easdem quantitates, sed digestionem per horas duodecim; — praeterea 2) Aquae pondus duplum, digestionem per horas 24 et bis repetere infusionem cum novis floribus.

℞. Florum Violarum,
Liquiritiae,
singulorum drachmas duas.
Aquae bullientis octarium unum.
Post refrigerationem cola. (*ParC.*)

Bei Brustentzündungen empfohlen.

Mel Violarum. (Pal. Sar. Wir.)

℞. Florum Violarum mundatorum,
Aquae bullientis,
singulorum libras sex.
Macera per horas viginti quatuor, cola exprimendo et colaturae adde
Mellis albi . . . . libras sex.
Coque despumando ad syrupi spissi consistentiam. (Pal. Wir.)

℞. Succi depurati Violarum,
Mellis communis,
singulorum partes aequales.
Coque simul, despuma, cola et ad syrupi consistentiam redige. (Sar.)

Ebenso werden diesen Honig besonders in Klystir, zu anderthalb bis zwei Unzen, da.

Syrupus Violarum s. Violae odoratae s. Petalorum Violarum. (Ams. An. B. Ba. Bel. Boy. Bor. Br. Du. Ed. Fer. Fuk. Gal. Gen. Ham. Hass. His. Isi. O. Pal. Pol. R. Sar. Wir. Wiir. *C. Fi. Sw. T. Vm.*)

℞. Petalorum recentium Violarum
uncias octo.
Aquae bullientis uncias sedecim.
Digere per horas viginti quatuor, blando calore; cola levissima expressione et partibus octo liquoris adde
Sacchari albi partes quindecim.
Fiat syrupus. (Ams.)

B. et Bel. Petalorum uncias octo, Aquae bullientis viginti, horas sex macerationis et Sacchari libras tres; — Sar. Infusi partes duas et unam Sacchari; — Ba. Petalorum partem unam, Aquae tres, duodecim horas infusioni et colaturae parti uni addere Sacchari partes duas; — Gal. Petalorum libras quatuor, Aquae octo, horas duodecim infusionis et Sacchari duplum colaturae; — *Sw.* Petalorum partem unam, Aquae duas, infusionis horas viginti quatuor et Sacchari partes quinque pro tribus colaturae; — His. Petalorum libram unam, Aquae duas, octo horas infusionis et quatuor libras Sacchari; — Hass.

Petalorum uncias octo, Aquae viginti, horas sex infusionis et Sacchari libras tres; — Bor. et Han. easdem quantitates, sed horas duodecim infusionis;

Bor. O. et Pol. Petalorum uncias octo, Aquae libras duas, duodecim horas macerationis et pro unciis viginti colaturae Sacchari libras tres; — Wür. Violarum libram unam, Aquae tres et septem Sacchari; — Ed. C. Violarum partes duas, Aquae octo, horas viginti quatuor macerationis et Sacchari partes quindecim; — Du. libras duas Violarum, Aquae quinque et Sacchari uncias viginti novem; — R. Violarum libram unam, Aquae tres et Sacchari duplum colaturae; — Ful. Violarum uncias duodecim, Aquae bullientis uncias octodecim et duodecim horas digestionis; alias horas duodecim macerationis liquoris expressi cum unciis sex Petalorum recentium et Sacchari contusi uncias duodecim; — Fer. Fl. Violarum libram unam, Aquae tantidem, duos dies digestionis et Sacchari libras duas; — T. Infusum [T. 1)] cum Sacchari libris quindecim ad syrupi consistentiam redigere.

His. *Syrupus Violarum communis*: Violarum libram unam, Aquae bullientis libras quatuor, infunde per horae quadrantem et in colatura solve Sacchari libras sex.

℞. Sacchari albi . libras quatuor.
Aquae fontanae, quantum sufficit.

Coque ad syrupi spissi consistentiam et infunde in

Petalorum recentium Violarum libras duas.

Macera per tres dies in vase tecto, coque deinde leviter et cola fortiter exprimendo. (Gen.)

℞. Petalorum Violarum recentium et mundatorum . . libram unam.

Contere in mortario lapideo et infunde

Aquae bullientis uncias octodecim.

Post horas viginti quatuor digestionis cola exprimendo et colaturae unciis viginti adde

Sacchari albi uncias triginta duas.

Coque lente. (Br. Pal. Wir.)

An. Violarum in pastam redactarum libram unam, Aquae libras duas, viginti quatuor horas digestionis et Sacchari libras tres cum dimidia; — Li. Florum libram unam contundere, calidae digestioni subjicere per horas duodecim in Aquae libris tribus, et cum libra una hujus infusi et Sacchari pulverati unciis viginti syrupum parare.

℞. Petalorum Violarum quantum libet.
Aquae frigidae q. s.

Macera per horas quatuor, sicca deinde flores, in linteo fortiter uno vasculo, contunde et in pastam redactis infunde

Aquae frigidae pondus illisaequale; tunc

Aquae bullientis aequale pondus.

Post refrigerationem cola leviter exprimendo, sepone, decantha et partibus quatuor colaturae adde

Sacchari albi . . partes septem.

Dissolve absque bullitione. (*Vm.*)

Syrupus Violarum solutivus. (Wir. *T.*)

℞. Florum Violarum mundatorum uncias quatuor.
Foliorum Sennae mundatorum uncias duas.
Aquae fontanae bullientis libram unam.

Digere per noctem in loco calido; altero mane exprime et colaturae unciis novem adde

T. Syrupum solutivum cum Infuso [*T.* 2)] parare jubet.

Sacchari albi . uncias sedecim.

Oleum Violarum. (Br. Sar. Wir.)

℞. Florum Violarum mundatorum partem unam cum dimidia.
Olei Olivarum . . partes tres.

Post duos dies digestionis in balneo aquae cola exprimendo et digestionem cum novis Floribus repete. (Sar.)

℞. Florum Violarum,
Olei Olivarum,
singulorum partes aequales.

Coque lente ad humidi consumptionem usque et cola exprimendo. (Br. Wir.)

Virga aurea.

Solidago Virgaurea, *L.*; Goldruthe, Heidenwundkraut; Verge d'or (*Gal.*); Saracens woundwort (*Ang.*); Swalnjk prostrednj, Wysokytrans (*B.*); Heidensche wondkruid (*Bel.*).

A. Ams. Br. Du. Ful. Gal. Gen. His. Li. Wir. Wür. *Be. C. M. Pid. Sp.* Z.

♃ (Syngenesia Polygamia Superflua. Synantherae *Cass.*) Eine in Europa gemeine Pflanze. (*Zorn* Ic. pl. t. 883.)

Das Kraut (herba Virgae aureae s. Consolidae saracenicae s. Solidaginis saracenicae) besteht aus einem behaarten, äſtigen Stängel, deſſen untere Blätter elliptiſch, die obern lanzettförmig ſind. Es hat einen bittern, ſtyptiſchen und etwas gewürzhaften Geſchmack.

Harntreibend.

Extractum Virgae aureae. (Wür.)

℞. Herbae Virgae aureae quantum vis.

Coque per horam unam in Aquae communis sufficiente quantitate, cola exprimendo, sepone et decantha liquo-

rem, qui ad mollis spissi consistentiam evaporet.

Viscum.

Viscum album, L.; Mistel; Gui blanc (*Gal.*); Mistel (*Ang. Suec.*); Dubowe melj (*B.*); Fugleli'm (*D.*); Visco (*His.*); Marentakken (*Bel.*); Vischio (*I.*); Jemiel (*Pol.*); Visgo (*Lus.*).

A. Ams. Ba. Bor. Br. Fer. Gal. Gen. Han. His. Li. O. Pol. Sax. Wir. Wür. *Be. Br. Fi. G. M. Sp. Z.*

Ein Schmarotzerhalbstrauch (Dioecia Tetrandria, L.; Lorantheae, *J.*), welcher in ganz Europa wächst. (*Blackw.* t. 184. *Plenck* t. 708. *Hayne* IV. t. 24. Düss. off. Pfl. II. t. 14. *Zorn* Ic. pl. t. 54.)

Man wendet die Stängel (Viscum quernum s. quercinum s. lignum Visci) an; sie sind holzig, walzenförmig, fast vom Grunde an in zahlreiche Gabelzweige getheilt, von hellgrüner oder schwach gelblicher Farbe. Der Geruch ist schwach und eigenthümlich unangenehm; der Geschmack widerlich, etwas herbe und schleimig; beide verlieren sich beim Trocknen.

Adstringirend, Ekel und Brechen erregend, seit lange gegen Epilepsie berühmt. — Gabe des Pulvers, eine halbe bis ganze Drachme, drei oder vier Mal täglich, in Syrup. Colbath verbindet es mit Stinkasand, Hufeland und Tissot mit Baldrian.

Pulvis antispasmodicus infantum. (Au. Huf.)

℞. Oculorum Cancrorum,
Cornu Cervi raspati,
Radicis Valerianae,
Visci albi,
singulorum partes aequales.

Bei Diarrhöe, Erbrechen und schwerem Zahnen der Kinder empfohlen. — Gabe, ein halber Scrupel. (*Huf.*)

℞. Visci querni,
Radicis Paeoniae,
— Fraxinellae, singulorum drachmas duas cum dimidia.
Ligni Aloës,
Oculorum Cancrorum,
singulorum drachmam unam.
Succini albi . . semidrachmam.
Carbonis . . . drachmas duas.

Extractum Visci albi aquosum. (Fer.)

℞. Stipitum Visci querni
libram unam.
Aquae . . . . . libras tres.

Coque, cola exprimendo, colaturam Albuminis ope clarifica et lentae vaporationi subjice.

Extractum Visci albi vinosum. (Sar.)

℞. Stipitum Visci . libram unam.
Vini albi generosi
libras quinque ad sex.

Post tres dies digestionis super arenae balneo cola fortiter exprimendo; residuum coquatur cum novi Vini sufficiente quantitate ad dimidii usque consumptionem, quo facto liquores ambo commixti lente ad extracti consistentiam evaporent.

Decoctum Visci albi. (Bs. *T.*)

℞. Visci . unciam unam ad duas.
Aquae fontanae . octarios duos.

Decoque ad dimidiae partis remanentiam. *T.* Visci uncias tres, Aquae libras quatuor. — Bei Epilepsie empfohlen.

Decoctum antivenereum Musitani (Fi.). Sarsaparillae unciam unam, Ligni Visci, Cornu Cervi raspati, Antimonii crudi, Pumicis, singulorum semunciam, Aquae communis libras tres ad dimidium decoquere. Gabe: auf einen Tag in kleinen Quantitäten.

Decoctum del Pomponaccio (Fi.). Sarsaparillae, Ligni Visci, singulorum uncias duas, Sulphureti Antimonii, Pumicis pulv., singulorum sesquiunciam, Aquae communis libras 24. Antimonium cum pumice in nodulum inclusae cum reliquis substantiis in Aquam demersa coquantur ad dimidium et colentur. Gabe, sechs Unzen bis ein Pfund.

Vitis.

Vitis vinifera, L.; Weinstock; Vigne (*Gal.*); Vine (*Ang.*); Inub (*Ar.*); Otrik (*Arm.*); Kmen winny (*B.*); Pu-tao (*C.*); Sur medan (*Ca.*); Well mudika gheddie (*Cy.*); Wuntrae (*D.*); Ungur (*Duk. Pe.*); Vid (*His.*); Dakh (*Hin.*); Wyngaard (*Bel.*); Vite (*I.*); Buangur (*Ma.*); Winna macica (*Pol.*); Videira (*Lus.*); Winegrad (*R.*); Drakscha (*Sa.*); Winstock (*Suec.*); Kodimundrie pullum, Dividatsi pullum (*Tam.*); Drachupundu (*Tel.*).

Ein Strauch (Pentandria Monogynia, L., Viniferae, *J.*), welcher wahrscheinlich aus Asien stammt. (*Blackw.* t. 155. *Schk.* t. 49. *Jacq.* Ic. rar. t. 50. *Zorn* Ic. pl. t. 276.)

Man wendet die Weinranken mit den Blättern und die Früchte an.

Die Blätter sind groß, anfangs oben behaaret, unten filzig und weiß, dann fast glatt, am Grunde herzförmig, mit drei oder fünf eingeschnittenen spitzigen Lappen. — Man hält sie für stärkend.

Die Früchte,

Uvae; Weintrauben, Rosinen; Raisin (*Gal. Ang.*); Zibib (*Ar. Mal.*); Vebiteha mudika gheddie (*Cy.*); Kischmisch (*Duk. Hin.*); Pasas (*His.*); Rozynen (*Bel.*); Mewur (*Pe.*); Uvas passadas (*Lus.*); Russin (*Suec.*); Dividatsi palavuttil (*Tam.*).

E. G. M.

sind bekannt genug. Die unreifen heißen *Omphacium*, *agresta*; Verjus (*Gal.*). Sie haben dann einen sauren und adstringirenden Geschmack. Man wendet sie selten an, und stets in Fällen, wo säuerliche Mittel angezeigt zu seyn scheinen.

Reif ist ihr Geschmack süß und zuckerig. Der ausgepreßte Saft giebt den Most, Mustum; Moût (*Gal.*). Unter dieser Gestalt gehören sie weniger der eigentlichen Medicin an. Häufiger bedient man sich ihrer in der Sonne getrocknet. Man unterscheidet zwei Sorten getrockneter Weinbeeren:

1) *Passulae majores, Uvae passae, Zibebae*; große Rosinen, Zibeben; gros raisins, Raisins de caisse (*Gal.*).

Ams. An. B. Ba. Bel. Br. D. Du. Ed. Penn. Per. Ful. Gen. Ham. Hass. Hisp. Lon. Lus. R. Sax. Suec. Wir. Würt. *Be. C. G. M. Pid. Sp.*

Man findet davon mehrere Varietäten.

A. Smyrnaer oder Damascener Rosinen; Raisins de Smyrne, de Damas (*Gal.*); fast so groß, wie kleine Pflaumen, länglich, zusammengedrückt, runzlich, bräunlichgelb.

B. Französische oder Spanische; Raisins de France, d'Espagne (*Gal.*), kleiner und dicker und von bräunlicher Farbe.

C. Calabrische; Raisins de Calabre (*Gal.*), dick, dunkelgefärbt und etwas klebrig.

2) *Passulae minores* s. *Corinthiacae* s. *Corinthinaceae*; kleine Rosinen, Corinthen; petits raisins, Raisins de Corinthe (*Gal.*).

Ams. An. B. Ba. Bel. Br. D. Fer. Ful. Gen. Ham. Hass. Lus. R. Sax. Suec. *Be. G. M. Pid. Sp.*

Sie sind schwarz, von der Größe kleiner Linsen und ohne Kerne.

Die getrockneten Weinbeeren oder Rosinen sind erweichend.

Pulpa Passularum. (Br. Pal. Wir. Würt. T.)

℞. Passularum minorum quantum vis.
Aquae . . . quantum sufficit.

Coctione mollefactis passulis, pulpam per cribrum e cribus confectum trajice, adde aquam decocti et totum ad aptam consistentiam vaporando consume. (Gal. *T.*)

Br. Pal. et Wir. Pulpae addere jubent Sacchari dimidium; — Würt. Sacchari trientem.

Roob s. Sapa Uvarum. (Gal. Sar. Würt.)

℞. Succi Uvarum . . quantum vis.
Coque modico igne, ad mellis consistentiam. (Gal. Sar.)

℞. Succi Uvarum depurati . . libram unam.
Sacchari albi . . . uncias tres.
Coque simul ad mellis consistentiam. (Würt.)

Decoctum Passularum majorum. (B*. *Au.*)

℞. Passularum minorum lotorum et enucleatorum uncias quatuor.
Aquae fontanae . . . libras tres.
Coquendo tertiam partem consume et cola. (B*.)

℞. Passularum minorum . . uncias quatuor.
Hordei mundati,
Liquiritiae, singulorum semunciam.
Aquae . . . . . libras sex.
Coque et colaturae refrigeratae adde
Syrupi Succi Citri uncias duas.
Misce. (*Au.*)

Syrupus Uvarum. (A.)

℞. Succi Uvarum recenter expressi libras centum.

Coque in vase cupreo stanno obducto, donec spuma nulla amplius prodeat, tunc ab igne removendo et continue agitando, sensim adde

Cretae pulveratae libram unam vel quantum satis ad saturandum acidum. Sepone per horas duodecim in loco frigido, decantha succum clarum et coque, despumando, ad syrupi spissitudinem.

Species bechicae. (Br. Pal. Wir. *Sp.*)

℞. Passularum minorum . . unciam unam.
Siliquae dulcis,
Jujubarum,
singularum drachmas sex.
Dactylorum . . . uncias duas.
Caricarum pinguium,
Hordei mundati,
singulorum unciam unam.
Liquiritiae,
Capilli Veneris Monspeliaci,
singulorum semunciam.
Hyssopi . . . drachmas duas.
Concisa misce. (Br. Wir. *Sp.*)

Pal. eandem formulam sed loco siliquae Sebestenas indicat.

Succus Agrestae, Omphacium. (Gal. His. Sar. *T.*)

℞. Omphacii . . . quantum vis.

Contunde in mortario porphyreo, cola per pannum, sepone succum, decantha et in lagena longicolli sub strato olei serva.

T. ut succum myrtillorum. — Angenehm sauer, in allen Fällen, wo säuerliche Mittel angezeigt sind.

Syrupus Agrestae s. de Agresta. (Gal. His. Lus. Sar. Wir. *T.*)

℞. Succi Agrestae recentis, depurati et filtrati . . . libras duas.
Saccheri libras tres cum dimidia.

Liqua blando calore. (Gal.)

Wir. Succi sesquilibram et Sacchari libras duas; — Pal. Succi libras quinque et tres Sacchari; — His. Succi libram unam et duas Sacchari; Suec. Succi et Syrupi communis quantum sufficit ut fiat vaporatione in balneo aquae syrupus; — T. Succi libras quatuor, Sacchari septem et si placet addere Oleosacchari Limonum vel de Cedro pauxillum.

Unguentum s. Pomatum adstringens. (Bo.)

℞. Omphacii . . . . uncias octo.
Unguenti rosati . libram unam.
Cerae flavae . . uncias quatuor.

Coque ad liquidi aquosi consumptionem, post refrigerationem faeces separa, denuo liquefac et Essentiam Rosarum adde.

Extractum Vitis Pampinorum. (Bor.) Ut extractum aconiti, calendulae etc.

X.

Xanthium.

Xanthium strumarium, L.; Kropfklette, Kropfbetterlaus, Klissen; Lampourde, Petit Glouteron, Petite bardane (*Gal.*); Lesser burdock (*Ang.*); Gänseskreppe (*D.*); Lampazo pequeno (*His.*); Kleine Klissen (*Bel.*); Lappola minore (*I.*); Bardune menor (*Lus.*); Sjetsborre (*Suec.*).

Br. Gal. Lus. Wir. *M. Sp.*

☉ (Monoecia Pentandria, L.; Synantherene, *Juss.*) Eine in ganz Europa wachsende Pflanze. (*Zorn* Ic. pl. t. 269.)

Man wendet das Kraut und den Saamen an.

Das Kraut (herba Xanthii s. Bardanae s. Lappae minoris) besteht aus einem kantigen, ästigen Stängel, abwechselnden, gestielten, fast rundlichen, herzförmigen, gezähnten, buchtigen, etwas lappigen, behaarten, scharf anzufühlenden, am Grunde dreinervigen Blättern.

Der Saame ist klein, länglicheirund, an beiden Enden spitzig, auf einer Seite eben, auf der andern gewölbt, röthlich und steckt in einer festen, länglichen, an der Spitze eingeschnittenen, außen mit Spitzen besetzten Hülle.

Der Geruch ist angenehm, der Geschmack scharf und bitter.

Ehedem wendete man den Saft zu sechs Unzen gegen Kropf an.

Z.

Zantorrhiza.

Zantorrhiza aplifolia, l'Her.; Gelbwurz; Zanthorrhize à feuilles d'ache (*Gal.*); Yellow root, Parsley leaved yellow root, Shrub yellow root (*Ang.*).

Am. *C.*

Ein kleiner Strauch (Pentandria Monogynia, L.; Ranunculaceae, J.) Virginien's. (*L'Her.* St. nov. p. 79. t. 38.) Die Wurzel ist länglich, von der Stärke des kleinen Fingers, mit vielen kleinen Fasern besetzt und gelb. Sie hat einen bittern Geschmack.

Zanthoxylum.

Zanthoxylum clavatum, L.; Zahnwehholz; Clavalier à feuilles de frêne, Frêne épineux (*Gal.*); Prickly ash, Toothach-tree (*Ang.*).

Am. *C.*

Ein Baum (Dioecia Pentandria, L.; Terebinthaceae, *J.*) der Antillen.

Die Rinde, welche man anwendet, ist braun und scharf; sie dient gegen Zahnschmerzen. Die Tinctur benutzt man in America bei chronischen Rheumatismen.

Zea.

Zea Mays, L.; Mais, Türkischer Waizen; Mais, Blé d'Espagne, Blé d'Inde, Blé de Turquie (*Gal.*); Indian korn (*Ang.*); Tyrkisk korn (*D.*); Mais (*His.*); Mays (*Bel.*); Gran turco (*I.*); Maiz, Milho de Turquia (*Lus.*); Turkisk korn (*Suec.*)

Gal.

☉ (Monoecia Triandria, L.; Gramineae, *J.*) Eine in America einheimische Pflanze. (*Blackw.* Herb. t. 547.)

Man wendet den Saamen (semen Mays) an; er ist rundlich, eckig, von der Größe

einer gewöhnlichen Gröſſe, außen gelbgrau, innen weiß und glänzend.
Mehlig, nährend.

Zedoaria.

Radix Zedoaria; Zittwerwurzel, Zittweringwer, Gittwerwurzel; Zédoaire (*Gal.*); Zedoary (*Ang.*); Judwar, Bar (*Ar.*); Bhuchampa, Junglie huldie, Bun huldie (*Beng.*); Cycwar (*B.*); Nagai mio (*Ca.*); Kaha, Wulkaha (*Cy.*); Ambie huldie (*Duk.*); Zedoaria (*His.*); Nirbisi (*Hin.*); Bokzedoar (*Bel.*); Matan kua (*Malab.*); Cytwar (*Pol.*); Bhu champaka, Nirvischa, Vanaharidra (*Sa.*); Sittwer (*Suec.*); Castarie munjel (*Tam.*); Castorie passapu (*Tel.*).

Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. Du. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. HassP. His. Li. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. *A. Be. Br. C. Fi. G. M. Pid. Sa. Sp.* Z.

Man unterſcheidet zwei Sorten Zittwer.

1) *Zedoaria longa*, langer Zittwer, einige Zoll lang, fingerdick, runzlig, knotig, außen graulich, inwendig bräunlich.

2) *Zedoaria rotunda*, runder Zittwer, einen Zoll lang mit rauher, runzliger, mit Faſern bedeckter Oberfläche.

Der Zittwer kommt in harten, weiſſlichen, von der Oberhaut entblößten Stükken zu uns. Er iſt gewürzhaft, ſcharf und beißend.

Er enthält viel Satzmehl und ein weſentliches kampherartiges Oel.

Der lange Zittwer wird allgemein für die Wurzel von Amomum Zedoaria, *Willd.*, angeſehen, einer Pflanze 4 (Monandria Monogynia, L.; Amomeae, J.) Oſtindien's (Fl. méd. VI. 349.). Was den runden anlangt, ſo ſind einige Schriftſteller, unter andern Kinslie und Guibourt, der Meinung, daß er von Kaempferia rotunda, L., abſtamme. Andere, z. B. Mérat, glauben, beide ſeyen bloße Spielarten der Wurzel einer und derſelben Pflanze, durch Oertlichkeit und Art des Wachsthums bedingt.

Reizend, tonisch, magenſtärkend. — Gabe des Pulvers, von einem halben Scrupel bis zur halben Drachme.

Extractum Zedoariae. (Br. Pal. Sar. Wir. T.)

℞. Radicis Zedoariae libram unam.
Alcoholis . libras quinque ad sex.

Post sufficientem extractionem cola exprimendo; residuum digere, tunc coque parumper cum Aquae libris tribus, clarifica decoctum Albuminis ope; liquores commisce et alcohole destillando separato, residuum lenta vaporatione consume. (Br. Pal. Wir.)

℞. Zedoariae . . . . libram unam.
Vini albi generosi
libras quinque ad sex.

Digere per tres dies super arenae balneo, tunc residuum coque cum novi Vini sufficiente quantitate ad dimidii remanentiam; liquores commixti lente ad extracti consistentiam evaporent. (Sar.)

T. Zedoariae libram unam, Aquae bullientis octo, infunde per horas 24, filtra et consume.

Tinctura s. Essentia Zedoariae. (Ams. Br. Han.)

℞. Radicis Zedoariae partem unam.
Alcoholis (0,907) . partes octo.

Digere per dies octo et filtra (Ams.)

Br. Radicis partem unam et quinque Alcoholis; — Han. Radicis uncias quinque et Alcoholis libras duas.

Reizend. — Gabe, ſechzig Tropfen täglich zwei Mal.

Tinctura Zedoariae composita, Essentia carminativa Wedelii. (B°. Br. Han. Pal. Sax. Wir. *Ca. Sp.*)

℞. Radicis Zedoariae uncias quatuor.
— Carlinae,
— Calami,
— Galangae,
singularum uncias duas.
Florum Chamomillae Romanae,
Seminum Anisi,
— Carvi,
singulorum unciam unam.
Caryophyllorum,
Baccarum Lauri,
singulorum drachmas sex.
Macidis . . . . . semunciam.
Corticis Aurantiorum unciam unam.
Spiritus Corticis Citri
libras quatuor et dimidiam.
— Nitri dulcis
uncias duas cum dimidia.

Infunde per dies sex, exprime et filtra. (B°. Br. Han. Sax. Wir. *Sp.*)

℞. Radicis Zedoariae unciam unam.
— Carlinae,
— Galangae,
singularum semunciam.
Corticis Aurantiorum,
Seminum Anisi,
— Carvi,
Florum Chamomillae Romanae,
Caryophyllorum,
Baccarum Lauri,
Acori veri,
singulorum sesquidrachmam.
Macidis . . . drachmam unam.
Spiritus Corticis Citri libras duas.
Acidi nitrici . . . semunciam.

Post sufficientem digestionem filtra. (B°. Pal.)

℞. Radicis Zedoariae unciam unam.
— Carlinae,
— Calami aromatici,
— Galangae,
singulorum semunciam.
Florum Chamomillae,
Seminum Anisi,
— Carvi,
Corticis sicci Aurantii,
singulorum drachmas duas
Baccarum Lauri,
Caryophyllorum,
singulorum sesquidrachmam.
Macidis . . . drachmam unam.
Spiritus Citri . . libram unam.
Acidi nitrici drachmas quinque.
Reizend, magenstärkend, blähungtreibend, Menstruation beförderud und harntreibend. — Gabe, eine halbe bis ganze Drachme.

Tinctura bezoardica. (Pal. Wir. *Sp.*)

℞. Radicis Zedoariae,
— Serpentariae Virginicae,
— Angelicae,
— Pimpinellae albae,
Herbae Scordii,
— Dictamni Cretici,
Baccarum Juniperi,
Corticis Citri,
Myrrhae, singulorum drachmas sex.
Spiritus Florum Sambuci rectificati . . . . . libram unam.
Post sufficientem digestionem cola exprimendo et liquori adde
Spiritus Tartari . . uncias sex.
— Vitrioli . . uncias duas.
Camphorae . . . . semunciam.
Digere, filtra et serva. (Pal. Wir.)

℞. Radicis Zedoariae . uncias duas.
— Angelicae,
— Pimpinellae albae,
— Valerianae,
— Vincetoxici,
— Calami aromatici,
singularum unciam unam.
— Costi Arabici,
Corticis Citri recentis,
Baccarum Juniperi,
singulorum uncias duas.
Myrrhae . . . . uncias tres.
Herbae Scordii . sesquiunciam.
— Melissae,
— Millefolii,
— Rutae, singularum uncias septuagintà duas.
Camphorae . . . unciam unam.
Theriacae . . . libram unam.
Alcoholis . . . . libras sex.
Post octo dies digestionis adde
Aquae fontanae . . libras duas.
Destillentur; tunc
℞. Hujus Spiritus . . libras duas.
Spiritus Tartari . semilibram.
Acidi sulphurici . . uncias tres.
Misce, Succum Baccarum Paridis ad colorandum adde et filtra. (Wir. *Sp.*)
Reizend, ehedem bei fauligen Fiebern empfohlen. — Gabe, eine halbe Drachme.

Oleum Zedoariae aetherum, Aetheroleum Zedoariae. (Br. Pal. Wir. *T.*,

℞. Zedoariae . . . . partes sex.
Aquae . . . . partes triginta sex.
Salis culinaris . . partem unam.
Post quatuor vel quinque dies macerationis destillatio fiat et oleum in fundo recipientis subsidens eximatur.
T. ut oleum valerianae.

Aqua Zedoariae vinosa. (Br. Wir.)

℞. Zedoariae . . . partem unam.
Vini generosi . partes duodecim.
Destillet dimidia pars. (Wir.)

℞. Zedoariae . . . . uncias sex.
Vini . . . . . libras tres.
Alcoholis,
Aquae, singulorum sesquilibram.
Destillent libras quatuor. (Br.)

Aqua Zedoariae anisata. (Pal. Sar. Wir. *Pid.*)

℞. Zedoariae . . . . uncias sex.
Anisi . . . . . uncias tres.
Corticis Citri . . . uncias duas.
Alcoholis . . . . . libras sex.
Destillet dimidia pars. (*Pid.*)
Pal. Sar. et Wir. Zedoariae uncias sex, Anisi uncias tres, Corticis Citri unciam unam et Vini albi libras octo; post octo dies infusionis destillet dimidia pars.

Zibethum.

Zibetha; Zibeth; Civette (*Gal.*); Civet (*Ang.*); Zibeto (*His.*); Sivet (*Bel.*); Zibetto (*I.*).

Br. Gal. His. Wir. *Br. G. Pid. Sp. T.*

Eine halbflüssige, salbenartige, weißliche oder gelbliche, an der Luft braun und sehr dick werdende Substanz von sehr starkem Geruch, welche von Drüsen abgesondert und in einem zwischen After und Geschlechtstheilen des Zibeththiers, Viverra Zibetha, L, eines nagenden Säugthiers Asien's und Africa's, befindlichen Beutel abgesetzt wird.
Reizend, krampfstillend. — Gabe, fünf bis sechs Gran.

Zincum.

Stannum indicum; Zink; Spiauter; Zinc (*Gal.*); Zinc (*Ang.*); Pisyuen (*C.*); Sungbusrie (*Duk.*); Zinco (*I. Lus.*); Cynk (*Pol.*); Spiagter (*R.*); Tutunagum (*Tam.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor.

Bor4. Br. D Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wür. *A. C. Fi. Pid. Sv. T.*

Ein derbes, bläulichweißes, blättriges, sehr streckbares, aber eher zu Blechen zu schlagendes als zu Draht ziehbares Metall, welches die Feile fettig macht und daher nicht sehr hart, schon bei Rothglühhitze schmelzbar ist, sich verflüchtigen läßt, mit sehr heller Lichtentwickelung brennt und auf feuchte Luft nur eine sehr schwache Wirkung ausübt. Specif. Schw. = 6,8 — 7,1.

Zincum purum; reines Zink. (HassP.)

Vel laminatum vel fundendo et moduli ferrei aurichalcivé canaliculati infusorii ope in cylindros formatum.

Chloruretum Zinci.
Murias s. Butyrum Zinci. (B*.)

℞. Acidi hydrochlorici puri uncias tres.

Injice sensim. Zincum granulatum donec nihil amplius d ssolvatur, solutionem unciis tribus Aquae dilue, filtra liquorem et ad siccum consume.

Adstringirend, Brechen erregend.

Aether Zinci, Solutio Muriatis s. Hydrochloratis Zinci aetherea. (B*. Pm.)

℞. Hydrochloratis Zinci sicci semuncium.
Alcoholis absoluti unciam unam.
Aetheris sulphurici uncias duas.

Post aliquot dies decantha. — Krampfstillend. — Gabe, vier bis acht Tropfen, täglich zwei Mal.

Cyanuretum Zinci, Hydrocyanas Zinci. (B*. Ma.)

℞. Hydrocyanatis Potassae quantum vis.

Injice solutioni salis hujus Sulphatem Zinci, donec nullum amplius praecipitatum provocetur, quod siccatum ad ruborem usque obscurum calcina.

Das Product ist ein Gemisch von blausaurem Zink und Potassium. — Man hat es bei nervöser Gardialgie gerühmt. — Gabe, von einem Viertel- bis zu anderthalb Gran in einem Trank, löffelweise.

Pulvis antispasmodicus. (*Ma.*)

℞. Cyanureti Zinci granum dimidium.
Magnesiae calcinatae grana quatuor.
Cinnamomi . . . grana tria.

Alle vier Stunden zu nehmen.

Protoxydum Zinci, Oxydum s. Oxodes Zinci s. zincicum, Zincum oxydatum.

A. Wie man es im Handel findet.

1) *Nihil album*; weißes Zinkoxyd.

B. BorC. Br. Fenn. Sax. Suec. Wir. Würr. *Par. Sp. T.*

In wolligen, sehr weißen und leichten, geschmack-, geruchlosen und in Wasser unlöslichen Flocken, welche sich bei'm Verbrennen des Zinks in freier Luft bilden.

2) *Tutia, Tuthia, Tutia Alexandrina, Botrytis, Cadmia, Cadmia factitia, Nihilum griseum, Oxydum zincicum griseum;* Tutie, graues Zinkoxyd; Cadmie des fourneaux (*Gal.*).

Am. An. B. Bel. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Gal. Han. Hass. HassP. His. Lon. Lus. O. Sax. Suec Wir. Würr. *C. Fi. Sp T.*

In dicken, derben, schweren, aschgrauen, harten, schwer brechenden, narbigen und rauhen Schuppen, welche sich in den Rauchfängen der Oefen erzeugen, wo man Bleierze, die Schwefelzink enthalten, schmilzt. Es ist das Protoxyd, mit fremden Stoffen gemischt.

Tutia praeparata, Protoxydum Zinci impurum. (*Fi.*) Tutiam excandescentem in Aquam frigidam injice; his vel ter repetendo, pulvera et cum Aqua laevigatam in pastam redige, quam sicca.

3) *Calamina, Calaminaris Lapis, Carbonas Zinci impurus s. impura, Carbonas zincicum terreum s. Oxydi Zinci, Oxydum Zinci nativum, Zincum terreum, Cadmia fossilis, Zincum oxydatum calaminare* (*H.*), *Hydrosilicas Zinci* (*B.*); natürliches Zinkoxyd, Galmeistein; Calamine, Cadmie fossile, Pierre calaminaire, Zinc oxydé calaminaire (*H.*), Hydrosilicate de zinc (*B.*).

Am. Ams. An. B. Bel. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Ham. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Sax. Suec. Wir. Würr. *C. G. Pid. Sp. T.*

In unregelmäßigen, schweren, weißlichen, graulichen oder röthlichen Stücken. Benennung ist sehr bezeichnend, da es in der That ein Wasserstoffzinksilicat ist, welches zufällig Eisenoxyd, Talkerde und kohlensauren Kalk beigemischt enthält.

Oxycarbonas Zinci impuri praeparatus, Lapis calaminaris praeparatus (RC.) torrefaciendo Oxycarbonatem impurum, ut carbonas calcis paratur.

B. Im Ganzen bereitet.

1) Auf trockenem Wege. *Flores Zinci, Nihil album, Pompholix, Lana philosophica, Oxydum zincicum s. Zinci s. Zinci album s. Zinci per se, Oxodes Zinci album, Calx Zinci, Zincum oxydatum album.*

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor4. Br. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN.

Lus. Pal. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Würt. *Br. C. Fi. Pid. Sp. Su. T. Vm.*

℞. Zinci . . . . . quantum vis.

In crucibulum amplum et profundum immitte, pranis superponendum, igneum ad fusionem metalli et donec flammam emittat auge; crucibulum deinde alio, obverse imposito tege et floccos in hoc concrescentes collige.

2) Auf feuchtem Wege. *Magisterium Zinci, Zincum praecipitatum, Zincum oxydatum via humida paratum;* Zinkpräcipitat; Magistère de zinc (*Gal.*).

Ams. Bor. Bors. D. Fer. Gal. Han Li. O. Sax. *Fi. T. Vm.*

℞. Sulphatis Zinci . quantum vis.

Dissolve in Aquae sufficiente quantitate et in solutionem sensim infunde Subcarbonatem Potassae vel Sodae, donec non amplius elicitatur praecipitatum, quod lotum siccetur.

Das Product ist Zinksubcarbonat; Gal. spricht zweimal davon als *Oxydum Zinci per praecipitationem* und *Carbonas Zinci*. Durch viertelstündiges Calciniren des Präcipitats, welches Sax. anwendet, wird es gelb und nicht völlig rein.

℞. Zinci sulphurici siccati . . . partes novem.
Kali nitrici . . . partem unam.

Mixta in crucibulo ure donec portiunculae exemtae solutio filtrata additis tinctura gallarum et liquore ammonii caustici praecipitatum album nec tempore in colorem violaceum vergens demittat. Post refrigerationem massam remanentem a crucibulo separatam et tritam cum

Aquae fervidae decuplo

misce et saepius agitando digere, ut solubile solvatur et ferrum separetur. Filtra et liquori limpido adde

Natrum carbonicum depuratum in Aquae communis q. s. solutum

quamdiu praecipitatum producitur, quod bene edulcoratum et siccatum excandescat in crucibulo tecto, donec portiunculae cum aqua mixtae acidum quodlibet affusum nullam efficiat effervescentiam, tam adhuc calidum in vitrum ingestum serva. (Borè.)

Das Zinkoxyd wird äußerlich als adstringirendes, innerlich als krampfstillendes und Brechmittel angewendet. Man empfiehlt es bei Epilepsie, Hysterie und Neuralgien. — Gabe, von sechs Gran bis eine halbe Drachme. — Man giebt es auch in Pillenform.

Pulvis Zinci oxydati albi s. antispasmodicus. (Ful. *Au.*)

℞. Florum Zinci grana duodecim.
Sacchari . . drachmam unam.

Divide in sex partes. — Gabe, Morgens und Abends ein Stück, bei Keuchhusten und convulsivischen Krankheiten der Kinder. (*Au.*)

℞. Florum Zinci . . . grana unum
Laudani Sydenhami guttam unam.
Sacchari . . . scrupulum unum.

Alle drei Stunden, bei Krämpfen der Kinder. (*Au.*)

℞. Florum Zinci drachmam unam.
Opii . . . . . grana decem.
Chinae,
Foeniculi,
singulorum unciam unam.

Divide in partes quinquaginta. — Gabe, alle zwei Stunden ein Stück, bei Keuchhusten. (*Au.*)

℞. Florum Zinci . . . grana tria.
Saccharum pulveratae,
Sulphuris aurati Antimonii,
singulorum semigranum.
Subcarbonatis Magnesiae
drachmam unam.

Divide in partes sex. — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden, bei rheumatischem krampfhaftem Asthma. (*Au.*)

℞. Florum Zinci grana duodecim.
Opii . . . . . grana tria.
Extracti Chinae flavae aquei
drachmam unam.
Elaeosaccharo Anisi drachmas duas.

Pulvera et divide in partes duodecim. (Ful.)

Pulvis stomachicus. (*Ru.*)

℞. Florum Zinci . . granum unum.
Magnesiae calcinatae
scrupulum unum.

Alle zwei Stunden, bei Verdauungsbeschwerden.

℞. Florum Zinci . grana quatuor.
Colombo . . . grana triginta.

Divide in partes quatuor. — Gabe, alle drei Stunden ein Stück.

Collyrium siccum. (*Ca. Ra.*)

℞. Tutiae,
Sacchari crystallisati,
singulorum semidrachmam.

Fiat pulvis tenerrimus. (*Ra.*)

℞. Tutiae,
Iridis Florentinae,
Sacchari crystallisati,
singulorum partes aequales.

Fiat pulvis tenerrimus. (*Ca.*)

Pulvis cephalicus niger. (Li.)

℞. Florum Zinci drachmam unam.
Pulveris Visci,
— Carbonis,
singulorum unciam unam.

Gabe, fünfzehn bis zwanzig Gran für ein Kind von einem Jahre.

Pulvis antistrumaeus. (*Au. Sm.*)
℞. Oxydi Zinci . . uncias quatuor.
Ossis Sepiae,
Testarum Ovorum,
singulorum uncias duas.
Telae laneae scarlatinae (drap d'écarlate) . . . sesquiunciam.
Combure simul in vase clauso et residuum pulvera. (*Sm*)
Au. Oxydi semunciam, Testarum drachmas duas et Telae sesquidrachmam.

Gabe, achtzehen Gran, täglich zwei Mal für einen Erwachsenen. — Dieses Mittel wird von Dehaen empfohlen.

Boli diaphoretici sedantes. (*B.*)
℞. Florum Zinci,
Extracti Aconiti,
singulorum grana quatuor.
Sulphuris Antimonii aurati
grana duo.
Liquiritiae pulveratae,
Mellis,
singulorum quantum sufficit.
Fiant boli quatuor. — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden, bei Hüftweh, Veitstanz, Hysterie, Rheumatismen und chronischer Gicht.

Pilulae lenientes s. sedantes. (Gen. *B. E.*)
℞. Florum Zinci . scrupulos duos.
Conservae Cynorrhodontis
quantum sufficit
ut fiant pilulae viginti quatuor. (Gen. *E.*)
℞. Florum Zinci . . grana octo.
Extracti Aconiti . . grana sex.
Fiant pilulae sex. — Gabe, ein Stück alle vier Stunden. (*B.*)

Diese Pillen werden bei Epilepsie, Veitstanz und chronischen Exanthemen empfohlen.

Collyrium adstringens. (*Sw.*)
℞. Florum Zinci . drachmam unam.
Mucilaginis Seminum Cydoniorum
cum Aqua Rosarum praeparati
uncias decem.
Contere simul.

Lotio e Zinco et Cupro composita s. adstringens. (*Au. E. Sp. Sw.*)
℞. Florum Zinci . grana duodecim.
Sulphatis Cupri
grana tria ad quatuor.
Mellis rosati . drachmam unam.
Aquae Calcis . . . uncias duas.
Zum Verbinden venerischer Geschwüre empfohlen. (*E. Sp. Sw.*)
℞. Florum Zinci . unciam unam.
Aquae Florum Sambuci
sesquiunciam.
Thuessink rühmte dieses Präparat bei pustulösem Erysipelas. (*Au.*)

Collyrium resolvens. (*Pic. Sp.*)
℞. Tutiae . . . . semidrachmam.
Aloës . . . drachmam unam.
Aquae Rosarum,
— Foeniculi,
— Euphrasiae,
singulorum unciam unam.
Misce. (*Pic.*)

Sp.'s folgende Formel, welche er unter dem Namen *Aqua ophthalmica* anführt, enthält sicher kein Atom Zink.
℞. Tutiae praeparatae,
Caryophyllorum,
Sacchari crystallisati,
singulorum unciam unam.
Camphorae,
Aloës, singulorum sesquidrachmam.
Vini Hispanici
uncias quadraginta octo.
Aquae Rosarum albarum
uncias sex.
— Chelidonii,
— Foeniculi,
— Euphrasiae,
— Rutae,
singularum uncias duas.
Post quatuordecim dies macerationis in sole, decantha.

Aqua ophthalmica usualis. (Br.)
℞. Aquae Rosarum,
— Foeniculi,
singularum uncias quinque.
Tutiae praeparatae drachmas sex.
Acetatis Plumbi sesquidrachmam.
Camphorae . drachmam unam.
Sulphatis Zinci scrupulos duos.
Misce exacte et serva.

Ceratum Calaminae s. calaminare s. epuloticum s. e Zinco, Collyrium Nihili s. zincicum s. e Zinco, Unguentum calaminare s. Lapidis calaminaris s. e Lapide calaminari s. Carbonatis Zinci impuri s. Oxycarbonatis Zinci impuri s. Oxydi Zinci s. Oxydi Zinci impuri s. nativi s. de Nihilo s. Tutiae s. Zinci s. griseum s. Nihili ad oculos s. ophthalmicum album s. diapompholigos, Pomatum Oxydi Zinci. (Am. Ams. B. Bor. Bor4. Du. Ed. Fenn. Ful. Gal. Gen. Ham. Han. HassP. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pal. Pol. RC. Sax. *Au. Br. C. Ca. E. Fi. Huf. Pic. Sp. T. Sw.*)
℞. Olei Olivarum . . partes duas.
Cerae flavae . . partem unam.
Liquatis et mixtis adde
Calaminae pulveratae
partem unam.
Agita ad refrigerationem usque. (Am. B*. Han Lon. Lus. *C. Sw.*)
Ful. Olei partes duodecim, Cerae sex, et Calaminae quatuor cum dimidia; — Ams. Olei duas, Cerae unam et Calaminae unam cum dimidia; — *Ca.* Olei sex, Cerae albae unam et unam Calaminae; — RC. Adipis suilli

semilibram, Cerae flavae, Calaminae, singularum unciam unam, Olei Napi semunciam; — LonN. Calaminae, Cerae flavae, singulorum semilibram, Olei Olivarum octarium unum.

℞. Axungiae Porci
partes triginta duas.
Cerae albae . . partem unam.
Liquatis adde
Tutiae . . . . . partes octo.
Misce exacte. (Lus.)

℞. Cerati . . . . . partes octo.
Oxydi Zinci . . partem unam.
Tere et sedulo misce. (B. Bor. Han. HassP. O. Pol. Sax.)

Du. Cerati partes duodecim et Oxydi Zinci unam cum dimidia; — Du. Ed. et C. Cerati quinque et unam Oxydi; — Gen. Cerati duodecim et Oxydi unam; — *Au.* Oxydi drachmas duas et Unguenti rosati unciam unam; — Bor4. Zinci oxydati drachmam unam, Unguenti simplicis drachmas novem.

℞. Axungiae Porci . . partes sex.
Oxydi Zinci . . partem unam.
Misce triturando. (Fenn. Lon. *C.*)

Pie. Axungiae partes duas et unam Oxydi; — Pal. Adipis anserini duas et unam Oxydi; — Ham. Axungiae tres et unam Oxydi; — *Ful.* Butyri tres et unam Oxydi; — *Br.* et *Sw.* Axungiae quatuor et unam Oxydi; — *Pie.* Butyri quatuor et Oxydi unam; — Am. Br. et *C.* Axungiae quinque et Butyri unam; — An. et Bel. Axungiae octo et Oxydi unam; — Li. Axungiae tres, Butyri recentis sex et unam Oxydi; — *Huf.* Axungiae octo et Oxydi unam; — *E.* Butyri sex et unam Oxydi.

℞. Oxydi Zinci . . partem unam.
Butyri cum Aqua Rosarum loti,
Unguenti rosati,
singulorum partes duas.
Misce exacte. (Gal.)

℞. Axungiae Porci
partes viginti quatuor.
Matris Perlarum,
Corallii rubri,
singulorum partem unam.
Tutiae,
Nihili albi,
singulorum partes duas.
Misce sedulo. (*Sp.*)

Fi. T. Cerae flavae, Olei Rosarum, singulorum uncias sex, Cerussae uncias duas, Tutiae porphyrisatae unam, Sulphureti Plumbi tantidem, Olibani semunciam. (*Unguentum Tutiae.*) Si loco tutiae Flores Zinci vel potius Carbonatem Zinci per praecipitationem adhibes, *Unguentum vel Ceratum diapompholigos* nominatur.

Unguentum Nihili s. Nihili ad oculos s. ophthalmicum s. Zinci, Pomatum Oxydi Zinci camphoratum. (Br. D. Pal. Wir. *Sw. Vm.*)

℞. Oxydi Zinci . . unciam unam.
Camphorae . scrupulum unum.
Axungiae Porci . . uncias sex
Misce triturando. (D.)

℞. Axungiae . . . . uncias sex.
Olei Amygdalarum dulcium
uncias tres.
Cerae albae . . . . uncias duas.
Liquatis adde
Oxydi Zinci . . . uncias tres.
Camphorae cum Oleo tritae
drachmas tres.
Misce exacte. (*Sw**.)

Vm. Olei Amygdalarum dulcium unciam unam, Axungiae, Cerae, singularum semunciam, Calaminae sesquiunciam, Tutiae drachmas duas et Camphorae semidrachmam.

℞. Tutiae praeparatae,
Nihili albi,
singulorum unciam unam.
Corallii rubri,
Nacrae Perlarum,
singulorum semunciam.
Camphorae . drachmam unam.
Axungiae Porci . libram unam.
Misce triturando. (Br. Pal. Wir.)

Unguentum s. Pomatum antihaemorrhoidale, Unguentum desiccativum, Ceratum Hufelandi, Pomatum contra intertriginem. (B*. *Au. Ca. Pie.*)

℞. Florum Zinci,
Pulveris Lycopodii,
singulorum drachmam unam.
Cerati . . . . . semunciam.
Contere. (*Au. Pie.*)

B*. Oxydi, Lycopodii, singulorum drachmam unam et Unguenti rosati uncias quatuor; — *Ca.* Oxydi, Lycopodii, singulorum grana triginta sex et Cerati Cetacei albi unciam unam.

℞. Florum Zinci,
Pulveris Lycopodii,
singulorum grana quindecim.
Axungiae Porci . . semunciam.
Aquae Rosarum,
— Plantaginis,
singulorum quantum sufficit.
Triturando exacte misce. (*Pie.*)

Ceratum s. Unguentum exsiccans s. ophthalmicum s. ad ambusta. (B*. Han. *Bo. Ca.*)

℞. Olei Olivarum . . uncias octo.
Cerae flavae . . sesquiunciam.
Liquatis adde
Boli Armenae . . unciam unam.
Florum Zinci . . . semunciam.
Misce bene. (Han.)

℞. Olei Olivarum . uncias quatuor.
Cerae albae,
Calaminae,
singularum unciam unam.
Acetatis Plumbi drachmas duas.
Fiat ceratum. (*Bo.*)

℞. Tutiae,
Acetatis Plumbi,
Calaminae,
singularum scrupulos duos.
Camphorae . . grana quatuor.
Unguenti rosati quantum sufficit.
Tritura simul. (B*.)

Unguentum ophthalmicum Sloani s. rubrum. (*Sp.*)

℞. Tutiae . . . . unciam unam.
Haematitis . . scrupulos duos.
Aloës . . . . grana duodecim.
Margaritarum praeparatarum
grana quatuor.
Axungiae Viperarum
quantum sufficit
ut fiat unguentum.

Unguentum oculare Keiseri s. ophthalmicum viride. (Ams.)

℞. Tutiae . . . . . semunciam.
Camphorae . drachmam unam.
Aeruginis . . grana duodecim.
Axungiae Porci . . uncias duas.
Misce.

Unguentum oculare album s. ophthalmicum album. (*Vm.*)

℞. Oxydi Zinci . . drachmas tres.
Mercurii dulcis . semidrachmam.
Camphorae . scrupulum unum.
Cerae albae . drachmas duas.
Butyri Cacao,
Olei Amygdalarum dulcium,
singularum unciam unam.
Misce triturando.

Emplastrum griseum s. de Lapide calaminari s. consolidans, Pamphilus Chirurgorum. (Ams. B*. Bor4. Br. D. DD. Ful. Han. Li. Pal. Sax. Suec. Wir. Wür. *Sp Vm.*

℞. Calaminae . . . libram unam.
Lithargyri . . . . semilibram.
Olei Olivarum . . sesquilibram.
Coque, continue agitando. (B*. Ful.)

℞. Emplastri simplicis sesquilibram.
Cerae flavae,
Olei Olivarum,
singularum uncias novem.
Liquatis adde
Calaminae pulveratae sesquilibram.
Misce bene. (Ams.)

℞. Emplastri simplicis,
Calaminae pulveratae,
singularum sesquilibram.
Cerae flavae . . . uncias sex.
Sevi hircini,
Terebinthinae,
singularum sesquiunciam.
Liquefac et misce exacte. (D.)

Suec. et *Vm.* Emplastri simplicis, Calaminae, singularum libras duas, Cerae uncias quinque, Sevi sesquiunciam et Terebinthinae tantidem.

℞. Emplastri simplicis . uncias sex.
Liqua et adde
Calaminae pulveratae uncias duas.
Pulveris Mastichis,
— Olibani,
singularum drachmam unam.
Misce bene. (Sax.)

℞. Emplastri simplicis libram unam.
Olei Olivarum . uncias quinque.
Liqua et adde
Pulveris Calaminae uncias quatuor.
— Myrrhae,
— Olibani,
singularum drachmas duas.
Misce exacte. (Han.)

Li. Emplastri simplicis uncias decem, Olei Olivarum octo, Calaminae sex, Mastichis unam et Olibani dimidiam.

℞. Olei Napi . . uncias octodecim.
Calaminae . . uncias duodecim.
Lithargyri . . . . uncias sex.
Cerae flavae . . unciam unam.
Liqua et exacte misce. (DD.)

℞. Calaminae,
Lithargyri,
Cerussae, singularum semilibram.
Olibani . . . . . semunciam.
Mastichis . . . unciam unam.
Olei Olivarum quantum sufficit.
Fiat emplastrum. (Wür.)

Bor4. Emplastri Cerussae, Emplastri Lithargyri simplicis, singularum uncias duodecim, Lapidis calaminaris, Olibani, Mastichis, singularum semunciam.

℞. Cerae . . . . . uncias tres.
Sevi cervini . . uncias quatuor.
Terebinthinae . . sesquiunciam.
Liqua et adde
Pulveris Calaminae,
— Lithargyri,
singularum sesquiunciam.
— Tutiae,
— Mastichis,
— Olibani,
singularum semunciam.
Camphorae cum Olei pauxillo tritae . . . . drachmam unam.
Misce sedulo. (*Sp.*)

Br. et Wir. Cerae uncias tres, Sevi quatuor, Terebinthinae unam cum dimidia, Calaminae unam, duas Lithargyri, Tutiae, Mastichis, Olibani, singulorum dimidiam, Myrrhae drachmas duas et Camphorae drachmam unam cum dimidia; — Pal. Cerae, Sevi, sin-

gulorum uncias octo, Terebinthinae sex, Calaminae quatuor, Lithargyri, Cerussae, singulorum tres, Tutiae, Masticchis, Olibani, Myrrhae et Camphorae, singulorum semunciam.

Emplastrum Diapompholigos s. zincico-plumbicum. (Ams. Bc. Br. Fenn. Han. Sax. Suec. Wir. *Sp. Vm.*)

℞. Emplastri grisei partes sedecim
Plumbi usti . . partem unam.
Liqua et misce bene. (Sax.)

℞. Olei Solani partes triginta quatuor.
Cerussae . . . . partes decem.
Coque et adde
Cerae . partes triginta quatuor.
Plumbi usti . . . . partes sex.
Pompholigis,
Olibani, singulorum partes quatuor.
Misce exacte. (*Sp.*)

Br. et Wir. Olei Solani libras duas cum dimidia, Cerussae sesquiunciam, Cerae albae uncias triginta, Plumbi usti sesquiunciam, Pompholigis et Olibani, singulorum quatuor; — *Vm.* Olei Olivarum partes sex, Cerussae decem, Cerae octo, Resinae Pini unam, Plumbi usti duas, Pompholigis et Tutiae, singulorum tantidem.

℞. Olei Olivarum . . semilibram.
Cerae flavae . . libram unam.
Liqua et adde
Plumbi usti . . . semilibram.
Cerussae . . . uncias quatuor.
Pompholigis . . . uncias tres.
Olibani . . . . sesquiunciam.
Misce sedulo. (Penn. Suec.)

Bl Olei partes septem, Cerae duodecim, Plumbi usti sex, Cerussae quatuor, tres Pompholigis et Olibani unam cum dimidia; — Ams. Olei triginta, Cerae triginta sex, Plumbi usti duodecim, Cerussae octo, Pompholigis sex et Olibani duas cum dimidia; — Han. Olei quindecim, Cerae sedecim, Plumbi usti, Cerussae, singulorum tres, Pompholigis, Olibani, singulorum duas.

Emplastrum saturninum, Emplastrum saturninum Mynsichti. (Ral. Wir.)

℞. Sevi hircini,
Cerae albae,
singulorum sesquiunciam.
Terebinthinae . . drachmas sex.
Liqua et adde
Pulveris Plumbi usti uncias duas.
— Calaminae,
— Cerussae,
singulorum semunciam.
— Nihili albi,
— Tutiae,
singulorum drachmas duas.
— Myrrhae,
Pulveris Masticchis,
Olibani,
singulorum drachmam unam.
— Aloës,
— Camphorae,
— Nitri,
singulorum semidrachmam.
Misce. (Pal.)

Wir. Sevi, Cerae flavae, singulorum uncias quinque, Terebinthinae, Plumbi usti, singulorum duas, Calaminae, Cerussae, singularum semunciam, Pompholigis, Tutiae, singulorum drachmas duas, Myrrhae, Masticchis, Olibani, Aloës, Nitri, singulorum drachmam unam et Camphorae semidrachmam

Unguentum Diapompholigos s. Pompholigis s. exsiccans s. ad ambusta s. Lapidis calaminaris. (Br. O. Pal. Sar. Wir. *Sp. T. Vm.*)

℞. Unguenti nutriti
uncias triginta duas.
Calaminae pulveratae
uncias quatuor
Misce exacte. (O.)

℞. Camphorae . drachmam unam.
Cerussae . . . . semunciam.
Cerae flavae,
Calaminae, singulorum uncias duas.
Olei Olivarum . uncias quinque.

Tere cerussam et calaminam cum olei pauxillo, adde reliquum olei ceram in solutione tenens, tunc camphoram cum olei pauxillo tritam et ad refrigerationem usque agita. (*Vm.*)

℞. Olei Solani . . uncias sedecim.
Cerae . . . . uncias quinque.
Liqua lente et adde
Pulveris Cerussae . uncias duas.
— Pompholigis,
— Plumbi usti,
— Olibani,
singulorum unciam unam.
Misce. (*Sp.*)

T. Cerae flavae, Olei rosati, singulorum uncias sex, Cerussae duas, Florum vel Carbonatis Zinci unam, Plumbi usti unam, Olibani dimidiam.

℞. Olei rosati . . . . libras duas.
Succi baccarum Solani
uncias quatuor.
Coque ad humidi consumptionem et adde
Cerae albae . . . . uncias sex.
Pulveris Cerussae . uncias duas.
— Plumbi usti,
— Tutiae,
— Olibani,
singulorum unciam unam.
Misce exacte. (Sar.)

Br. et Wir. Olei rosati uncias sex, Succi Solani, Cerae, singulorum quatuor, Plumbi usti, Pompholigis, Olibani, singulorum unam — Pal. easdem

quantitates, sed Cerae uncias tres et loco plumbi usti Cerussae uncias duas.

Unguent. exsiccans (*Dulk*): Olei Olivarum libras tres, Cerae flavae unam, Boli Armenae, Calaminae, singularum semilibram, Lithargyri, Cerussae, singulorum uncias sex, Camphorae drachmas sex, fiat s. a. ung.

Unguentum Calaminae compositum s. exsiccans ruhrum Acrelii. (Fenn. Suec.)

℞. Calaminae,
Lithargyri,
Cerussae, singulorum semilibram.
Minii,
Acetatis Plumbi,
singulorum uncias tres.
Sevi hircini . . . libram unam.
Olei Lini . . . . uncias octo.

Liqua sevum, adde oleum, tunc pulveres et massae refrigeratae
Camphorae pulveratae
drachmas tres.

Ammoniuretum Zinci. (*Vm.*)

℞. Acetatis Zinci liquidi quantum vis.

Infunde sensim Ammoniacum liquidum, donec nullum amplius provocatur praecipitatum, quod lotum et siccatum in Ammoniaci quam minima quantitate solve, filtra, lente consume et crystallisationi subjice.

Vitriolum album s. Goslariense s. Zinci, Sulphas Zinci s. zincicum, Zincum oxydatum sulphuricum s. sulphuricum, Gilla Vitrioli s. Theophrasti, Sal vomitorium Vitrioli, Chalcantum album; weißer Vitriol, Zinkvitriol.

1) Wie man ihn im Handel findet.

Vitriolum album s. Zincum sulphuricum venale, Sulphas zincicus venalis.

Am. Ams. B. Bel. BorC. Bor4. Br. D. DD. Fenn. Per. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Hass. HassP. His. Li. Lns. R. Suec. Wir. Wür. WW. *C. Fi. Par. Pid. Sa. Sp. T.*

2) Reinigung des käuflichen.

℞. Vitrioli albi . . quantum vis.

Calcinatum in Aqua dissolve et pluribus crystallisationibus subjice. (Gal.)

Wir. eundem agendi modum indicat, calcinationem tamen omittens; — Ful. Li. et Wür. dissolvere Salis libram unam in duabus Aquae bullientis, liquorem in digestione relinquere per sex horas cum Zinci granulati drachmis sex, tunc consumere et crystallisationi subjicere.

3) Bereitung.

A. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Du. Ed. Fenn. Fer. Han. HassP. His. Lon. LonN. O. Pol. RC. Sax. Suec. *Br. C. Fi. Sw. T. Vm.*

℞. Acidi sulphurici (20°)
quantum vis.

In capsula vitrea balneo arenae immitte, calefac leviter, adde sensim Zincum granulatum, liquorem Aquae paucillo dilue, satura, consume et in crystallos coge.

Bor4. Acidum sulphuricum crudum cum Aquae communis partibus quinque dilutum indicat; — *Fi.* et *T.* Acidi concentrati partem unam et Aquae sex vel septem; — LonN. Zinci uncias quatuor, Acidi uncias sex, Aquae destillatae octarios quatuor; misce, finita effervescentia cola, coque ad pelliculam et sepone ut fiant crystalli; — HassP. Zinci Indici in frustula comminuti vel granulati libram unam in Acidi Vitrioli sufficiente quantitate dissolvere, liquorem saturatum filtrare et vaporationi subjicere, donec vitriolum album secerni incipiat, addere deinde Acidi Nitri uncias duas, et post aliquot ebullitiones admiscere Florum Zinci sesquiunciam; liquorem tunc cum Aquae destillatae partibus quatuor diluere, denuo per semihoram coquere, filtrare, ad pelliculam consumere et in crystallos cogere, quod toties repetendum est, quoties crystalli formantur, quas loco tepido cito siccatas serva.

Man wendet dieses Salz theils äußerlich als adstringirendes, theils innerlich als tonisches und adstringirendes Mittel zu einem bis fünf Gran, zwei oder drei Mal täglich, und als Brechmittel zu zehen bis zwanzig Gran in destillirtem Wasser an.

Pilulae expectorantes. (*E. Par.*)

℞. Sulphatis Zinci semiscrupulum.
Conservae Rosarum
quantum sufficit.

Fiant pilulae viginti. — Gabe, ein Stück täglich drei Mal, bei Keuchhusten und Lungenschwindsucht. (*E.*)

℞. Sulphatis Zinci . grana decem.
Myrrhae . . . sesquidrachmam.
Confectionis Rosarum
quantum sufficit.

Fiant pilulae viginti. — Wie die vorigen, bei Keuchhusten von Nutzen. (*E. Par.*)

Solutio Sulphatis Zinci aquosa simplex. (Am. Br. RC. *Au. C.*)

1) Zum innern Gebrauch.

℞. Sulphatis Zinci . . grana duo.
Aquae Chamomillae uncias tres.

Dissolve. — Gabe, ein Löffel täglich zwei oder drei Mal.

Wyllie wendet bei bösartigen Fiebern alle zwei oder drei Stunden einen Löffel einer Auflösung von neun Gran schwefel-

saurem Zink in sechs Unzen Aqua Sambuci an. Mosely empfiehlt ebenfalls gegen chronische fieberlose Ruhr eine Auflösung von drei Drachmen schwefelsaurem Zink und zwei Drachmen Alaun in einer halben Unze Lavendelgeist und einer Pinte Wasser, zu vier bis sechs Drachmen in Wasser gegeben, und dieses selbst bisweilen nach drei Stunden wiederholt.

Am. und C. haben eine ähnliche Formel:

℞. Ligni Quassiae drachmam unam.
Sulphatis Zinci . . grana octo.
Aquae . . . . semioctarium.
Post duodecim horas macerationis cola.

2) Zum äußern Gebrauch.

A. In Gestalt von Collutorium.

℞. Sulphatis Zinci drachmam unam.
Aquae destillatae . uncias sex.
Solutioni adde
Mellis crudi . . unciam unam.
Misce. (B*.)

℞. Sulphatis Zinci grana quinque.
Infusi Salviae . . . uncias sex.
Dissolve. (*Au.*)

RC. Sulphatis scrupulum unum, Aquae ferventis sesquiunciam.

B. In Gestalt von Collyrium.

Aqua ophthalmica s. ophthalmica adstringens s. vitriolica s. e Vitriolo Zinci, Aqua Vitrioli albi, Solutio Sulphatis zincici, Mixtura Zinci Sulphatis, Collyrium vitriolicum s. e Zinco sulphurico s. e Vitriolo albo s. Zinci, Collyrium adstringens s. detergens s. detersivum. (Am. B*. BorC. DD. Ed. Gal. GalM. Ham. Lus. RC. Sar. Suec. WW. *Au. Bo. C. Ca. ParC. Ra. Sa. Sp. Sw. T.*)

℞. Sulphatis Zinci . partem unam.
Aquae partes ducentas quadraginta.
Dissolve. (BorC. DD. WW.)

GalM. Salis partem unam et Aquae ducentas; — Lus. Suec. et *Sp.* Salis unam et Aquae nonaginta sex; — DD. Salis unam et Aquae sexaginta quatuor; — Am. et *C.* Sulphatis grana duodecim et Aquae semioctarium; — *ParC.* Sulphatis grana quatuor ad sex et Aquae uncias sex.

℞. Sulphatis Zinci . partem unam.
Aquae partes ducentas quadraginta.
Dissolve. (B*.)

Man kann das Doppelte Wasser nehmen und nöthigenfalls zwei Drachmen Quittenschleim zusetzen.

Ham. Salis partem unam et Aquae trecentas viginti; — *Ra.* Salis unam et Aquae centum viginti; — *Ra.* et *Sw.* Salis partem unam et Aquae nonaginta sex; — *Sa.* et *Sw.* Salis partem unam et Aquae quadraginta octo; — *Au.* Salis granum unum, Aquae Rosarum unciam unam et Mucilaginis Seminum Cydoniorum drachmam unam.

℞. Sulphatis Zinci scrupulum unum.
Infusi Sambuci . libram unam.
Dissolve. (*Ra.*)

Ra. praeterea Sulphatis granum unum et Aquae Plantaginis unciam unam; — Am. et *C.* Sulphatis drachmas duas, Spiritus Lavandulae uncias duas et Aquae uncias sex (*Mixtura Zinci Sulphatis* (*C.*); — Sar. Vitellum Ovi coctione concreti eximere, Sulphatem Zinci ingerere et liquorem post aliquot tempus profluentem commiscere cum Aquae Rosarum et Plantaginis, singularum unciis sex; — *Au.* Sulphatis grana tria dissolvere in Aquae Rosarum cum Albumini ovi unius subactae sesquiuncia.

℞. Sulphatis Zinci grana quinque.
Aquae Plantaginis uncias quatuor.
Mucilaginis Seminum Cydoniorum semunciam.
Dissolve. (*Ca.*)

℞. Sulphatis Zinci grana sedecim.
Aquae . . . . . uncias octo.
Acidi sulphurici Aqua diluti guttas sedecim.
Dissolve sal in aqua et adde acidum. (Ed. RC. *C.*)

℞. Sulphatis Zinci drachmam unam.
Aquae Rosarum . . libras duas.
Alcoholis 22° . unciam unam.
Dissolve. (Gal.)

T. Sulphatis, Sacchari raff., singulorum scrupulum unum, Aquae Rosarum uncias quatuor, Spiritus Vini guttas quatuor vel sex.

℞. Sulphatis Zinci . . grana sex.
Camphorae . . grana quatuor.
Aquae Euphrasiae,
— Rosarum,
— Plantaginis,
singularum unciam unam.
Dissolve. (*Bo.*)

℞. Sulphatis Zinci . . grana sex.
Aquae destillatae . uncias sex.
Mucilaginis Cydoniorum unciam unam.
Aquae Vitae camphoratae guttas duodecim.
Misce. (*Sw.*)

C. In Gestalt von Bähung oder Waschung. (B*. *Au. Sw. Sy.*)

℞. Sulphatis Zinci . . grana duo.
Aquae destillatae uncias quatuor.
Dissolve. (*Sy.*)

B*. Sulphatis drachmam unam et Aquae unciam unam; — *Au.* Sulphatis drachmas tres et Aquae unciam unam.

℞. Sulphatis Zinci,

Aquae Vitae camphoratae,
singulorum semunciam.
— bullientis . . libras duas.
Dissolve. (*Sw. Sy.*)

D. In Einſpritzung. (B*. DD. His. *Sw. Sy.*)

℞. Sulphatis Zinci . granum unum.
Aquae . . . unciam unam.
Dissolve. (B*.)

B*. praeterea Salis grana triginta quinque et Aquae uncias quatuor; vel Salis scrupulum unum ad semidrachmam et Aquae unciam unam.

℞. Sulphatis Zinci drachmam unam.
Aquae camphoratae uncias duas.
purae . . . libras duas.
Dissolve. (*Sw. Sy.*)

Injectio adstringens. (*B.*)

℞. Aquae Plantaginis . uncias sex.
Laudani Sydenhami guttas triginta.
Sulphatis Zinci scrupulum unum.
Mucilaginis Gummi Arabici
unciam unam.

Bei Blennorrhöe. (*B.*)

℞. Sulphatis Zinci scrupulum unum.
Boli Armenae . scrupulos duos.
Gummi Arabici drachmas duas.
Aquae . . . . uncias octo.

Bei Gonorrhöe. (*E.*)

℞. Sulphatis Zinci . grana decem.
Gummi Arabici drachmas duas.
Tincturae Opii drachmam unam.
Aquae . . . . uncias octo.

Bei Gonorrhöe. (*E.*)

Gargarisma adstringens. (*E.*)

℞. Sulphatis Zinci drachmam unam.
Mellis . . . . semunciam.
Tincturae Myrrhae,
Aquae Vitae,
singularum unciam unam.
Aquae Rosarum uncias quatuor.

Fomentatio adstringens, Fomentum tonico-adstringens. (*B.*)

℞. Decocti Granati Corticis
libras quatuor.
— Chinae . . libras duas.
Sulphatis Zinci sesquidrachmam.
Tincturae Opii . unciam unam.

Bei äußern Hämorrhoiden und Blennorrhöe der Scheide.

Collyrium resolvens, Liquor ophthalmicus detersivus. (Pal. *Ca. Sm.*)

℞. Radicis Iridis Florentinae pulveratae
drachmas tres.
Sulphatis Zinci sesquidrachmam.
Aquae Rosarum,
— Plantaginis,
singularum sesquilibram.
Digere per dies duos et cola. (Pol.)

℞. Iridis Florentinae,
Sulphatis Zinci,
singulorum semidrachmam.
Sacchari crystallisati
scrupulos duos.
Aquae Rosarum . libram unam.
Digere per tres dies et cola. (*Ca. Sm.*)

℞. Vitellos Ovorum recentium no. 2.
Aquae Rosarum . libram unam.
Tritura simul et adde
Sulphatis Zinci grana duodecim ad viginti quatuor.
Dissolve. (*Sm.*)

Injectio sedativa adstringens. (*Ca. Sy.*)

℞. Sulphatis Zinci . . grana sex.
Oxydi Plumbi grisei grana viginti.
Aquae Rosarum uncias quatuor.
Misce agitando. (*Ca.*)

Sy. Sulphatis grana octodecim, Pulveris Cerussae compositi grana sexaginta et Aquae Tiliae vel Rosarum uncias duodecim.

Collyrium adstringens. (*Au. B. C. Pie.*)

℞. Sulphatis Zinci . grana viginti.
Tutiae . . . . semidrachmam.
Aquae Rosarum,
— Plantaginis,
singularum uncias tres.
Misce. (*Pie.*)

℞. Aquae Rosarum . . uncias tres.
Sulphatis Zinci . . grana tria.
Laudani Sydenhami
scrupulum unum.
Misce. (*B.*)

℞. Sacchari crystallisati albi
unciam unam.
Radicis Iridis Florentinae
drachmas tres.
Tutiae praeparatae,
Sarcocollae,
Sulphatis Zinci,
Aloës,
singulorum drachmam unam.
Caryophyllorum scrupulum unum.
Aquae Euphrasiae,
— Foeniculi,
— Rosarum,
singularum uncias octo.
Vini Hispanici
uncias viginti quatuor.
Post quatuordecim dies infusionis solis calore, decantha.

Aqua s. Liquor s. Injectio adstringens s. Sulphatis Zinci aluminosa, Liquor Aluminis compositus, Solutio Zinci aluminosa, Injectio ad leucorrhoeam, Aqua aluminosa Bateana s. Batiana Solutio vitriolica, Aqua styptica, Errhi-

num haemastatieum. (DD. Fer. His. Lon. LonN. Lus. RC. *Au. B. Ca. E. Pie. Sa. Sw*.*)

℞. Sulphatis Zinci,
Aluminis calcinati,
singulorum semunciam.
Aquae purae
libras duas (octarios duos).
Dissolve. (DD. Lon. LonN. RC. *Au. C. Ca. Sw*.*)

Ca. praeterea, Salium, singulorum quantitatis antea dictae dimidium; — Fer. et Lus. Salium, cujusque semunciam et Aquae bullientis libras duas cum dimidia; — *Sa.* Salium, singulorum drachmam unam et Aquae libram unam; — *E.* Sulphatis sesquidrachmam, Aluminis semidrachmam et Aquae bullientis semioctarium.

℞. Sulphatis Zinci,
Aluminis, singulorum semunciam.
Aquae Rosarum . libram unam.
Solutionem filtra. (His.)

℞. Sulphatis Zinci,
Aluminis,
singulorum drachmam unam.
Succi Urticae . uncias quatuor.
Dissolve. (*Pie.*)

℞. Sulphatis Zinci semidrachmam.
Aluminis . . drachmam unam.
Boracis . . . grana quatuor.
Aquae Rosarum , . uncias sex.
Dissolve. (*Pie.*)

℞. Decocti Corticis Quercus
uncias decem.
— Cynorrhodontis uncias sex.
Sulphatis Zinci drachmam unam.
Aluminis . . sesquidrachmam.
Solutioni adde
Alcoholis . . . drachmas duas.
Tincturae Opii aquosae
semidrachmam.
Misce. (*B.*)

Adstringirend, äußerlich gegen Ekchymosen, leichte Blutflüsse und chronische Schleimflüsse. — Gabe, ein Löffel für einen Erwachsenen, Morgens nüchtern.

Collyrium tonicum. (*Bo.*)

℞. Rutae recentis,
Florum Arnicae,
singulorum manipulum dimidium.
Baccarum Juniperi drachmas duas.
Ipecacuanhae . grana triginta.
Vini albi . . uncias duodecim.
Stent in infusione per horas viginti quatuor inter cineres calidos; tunc adde colaturae
Sulphatis Zinci . grana viginti.
Salis Ammoniaci grana triginta.

Aqua d'Alibour. (*Ca. Sm. Vm.*)

℞. Sulphatis Zinci uncias duas et drachmam unam cum dimidia.
Sulphatis Cupri drachmas quinque.
Camphorae
drachmas duas cum dimidia.
Croci . . . drachmam unam.
Post horas viginti quatuor digestionis filtra. (*Ca.*)

Ca. praeterea sub titulo *Aquae ad oculos d'Yvel:* Sulphatis Zinci drachmas tres, Sulphatis Cupri unam, Camphorae scrupulos duos, Croci grana viginti et Aquae octarium unum.

℞. Aquae . . . . octarios duos.
Sulphatis Zinci . . uncias duas.
— Cupri . drachmas quatuor.
Camphorae . drachmam unam.
Dissolve. (*Sm.*)

℞. Foliorum Rutae . . partes sex.
Aquae fervidae
partes quatuordecim.
Post semihoram infusionis colaturae adde
Sulphatis Zinci partes quatuor.
— Cupri . . partem unam.
Aquae Vitae camphoratae
partis quadrantem.
Dissolve. (*Vm.*)

Vm. hanc formulam sub titulo: *Collyrium de Saint-Jerneron* indicat.

Collyrium Stiernoronense s. Decoctum Rutae zincatum s. Aqua ophthalmica Ohdelii. (B*. et Suec.) Rutae partes duas, Aquae triginta sex, ad dimidium redigendas et Colaturae unciis duodecim addere Sulphatis Zinci unciam unam, Sulphatis Cupri drachmas tres et Aquae Vitae camphoratae semidrachmam.

Lapis vulnerarius externus. (Ful.)

℞. Aluminis,
Sulphatis Zinci,
singulorum uncias sex.
Acetatis Cupri,
Salis Ammoniaci,
singulorum drachmam unam.
Misce triturando, liqua, prope ignem relinque ad perfectam desiccationem usque et sub finem adde
Croci . . . . semidrachmam.

Dieses Präparat ist zum Reinigen, Austrocknen und Kräftigen von Geschwüren empfohlen worden.

Unguentum ophthalmicum s. ad oculi defluxiones catarrhosas ex relaxatione, Collyrium molle. (Br. Ful. *Pie.*)

℞. Sulphatis Zinci . partem unam.
Butyri recentis . partes septem.
Contere simul. (Ful.)

Br. Sulphatis partem unam et Butyri sex; — *Pie.* Sulphatis unam et quatuor Butyri.

Unguentum s. Pomatum virginale, Pomatum Comitissae. (*Ca.*)

℞. Sulphatis Zinci drachmas quatuor.

oder drei Mal täglich, bei Husten mit reichlichem Auswurf.

Confectio aromatica. (*Vm.*)

℞. Zingiberis conditi . partes sex.
Corticis Aurantiorum conditi partes quatuor.
Nucis moschatae . partem unam.
Syrupi Caryophyllorum rubrorum quantum sufficit.

Opiatum stomachicum (*Ca. Pie.*)

℞. Zingiberis conditi . uncias duas.
Limonum conditorum,
Caryophyllorum conditorum,
singulorum unciam unam.
Opiati Salomonis . semunciam.
Nucum moschatarum conditarum,
Cinnamomi,
singulorum drachmas tres.
Cascarillae . . semidrachmam.
Olei essentialis Caryophyllorum scrupulos duos.
— — Cinnamomi guttas decem.
Syrupi Caryophyllorum rubrorum quantum sufficit.

Aphrobisiacum. — Gabe, einen bis drei Scrupel.

Morsuli stimulantes. (*Sm. Sp*)

℞. Zingiberis . . drachmas duas.
Croci orientalis drachmam unam.
Moschi,
Caryophyllorum,
singulorum semidrachmam.
Mastichis . . . drachmas tres.
Ambrae griseae grana duodecim.
Sacchari . . . . . semilibram.
Fiant morsuli drachmae unius. (*Sm.*)

℞. Cinnamomi . . drachmas duas.
Nucis moschatae drachmam unam.
Caryophyllorum scrupulos duos.
Macidis . . . scrupulum unum.
Zingiberis . . . drachmas sex.
Sacchari . . . uncias sedecim.
Fiant morsuli. (*Sp.*)

Syrupus Zingiberis. (Am Ams. B. Bel. Bor4. Du. Ed. Fenn. Ful. Gen. Han. Li. Lon. LonN. Lus. RC. Suec. Wür. *C. Sw. T. Vm.*)

℞. Zingiberis pulverati uncias duas.
Aquae bullientis . . libras tres.
Digere per horas viginti quatuor in vase tecto. Cola et adde
Sacchari albi . . . libras sex.
Ad syrupi consistentiam redige. (B.)

Das Verfahren iſt überall ganz oder doch faſt daſſelbe, jedoch wechſeln die Mengenverhältniſſe unendlich, nämlich:

Lus. Zingiberis uncias quatuor, Aquae libras quatuor, horas sex infusionis et Sacchari sufficientem quantitatem; — Bor4. Han. Zingiberis uncias duas, Aquae uncias sedecim, horas quatuor infusionis et Sacchari libras duas; — Wür. Zingiberis uncias tres, Aquae libras tres et Sacchari libras septem cum dimidia; — Penn. Suec. Zingiberis unciam unam, Aquae libram unam, horas sex infusionis et Sacchari sufficientem quantitatem; — Ed. Zingiberis drachmas sex, Aquae libram unam, viginti quatuor horas infusionis et Sacchari uncias viginti duas; — Du. Zingiberis uncias quatuor, Aquae octarios tres, viginti quatuor horas infusionis et Sacchari uncias viginti novem; — Lon. LonN. et *C.* Zingiberis uncias duas, Aquae octarium unum, viginti quatuor (quatuor) horas infusionis et Sacchari libras duas; — Ams. Zingiberis uncias tres, Aquae libras quatuor, viginti quatuor horas infusionis et pro colaturae libris quatuor Sacchari libras quindecim; — Gen. Zingiberis uncias quatuor, Aquae libras duas cum dimidia, viginti quatuor horas infusionis et Sacchari libras quinque; — *Sw.* Zingiberis uncias tres, Aquae libras quatuor, viginti quatuor horas infusionis et Sacchari libras septem cum dimidia; — *Vm.* Zingiberis partem unam, Aquae tepidae octo et Sacchari duodecim; — Ful. et Li. Zingiberis unciam unam, Aquae bullientis libram unam et unam libram Sacchari; — Am. Zingiberis uncias tres, Aquae bullientis uncias quatuor et Sacchari libras septem cum dimidia; — RC. Zingiberis sesquiunciam, Aquae bullientis libras duas, Sacchari puri libras tres cum dimidia et viginti quatuor horas macerationis; — *T.* Zingiberis uncias octo, Aquae bullientis libras duas, infusionem per horas duodecim et Sacchari libras quatuor.

Gabe, von einer Drachme bis zur halben Unze.

Tinctura Zingiberis s. Amomi Zingiberis. (B*. Du. Ed. Han. Lon. LonN. *C. Sw. Vm.*)

℞. Zingiberis . . . uncias duas.
Alcoholis (0,930) octarios duos.
Post dies octo vel quatuordecim infusionis cola. (B*. Du. Lon. LonN.)

Ed. Radicis uncias duas et Alcoholis (0,935) libras duas cum dimidia; — *C.* Radicis uncias duas et Alcoholis (0,930) libras duas; — *Sw.* Radicis unciam unam et Alcoholis (0,935) libram unam; — *Vm.* Radicis partem unam et Spiritus Sacchari octo; — Han. Radicis uncias quinque et Spiritus rectificati libras duas.

Reizend, gewürzhaft. — Gabe, ſechszig

Tropfen täglich zwei Mal. — Auch soll diese Tinctur die Zahnschmerzen lindern, wenn man damit getränkte Baumwolle in die hohlen Zähne bringt.

Elixir de Mittié. (*Ca.*)

℞. Zingiberis . . . . semunciam.
Cinnamomi,
Piperis longi,
Galangae minoris,
singulorum drachmas duas.
Nucis moschatae,
Caryophyllorum,
singulorum drachmam unam.
Cardamomi minoris
scrupulum unum.
Alcoholis . . . . uncias sex.

Reizend, magenstärkend. — Gabe, zwei bis vier Drachmen.

Oleum Zingiberis aethereum, *Aetheroleum Zingiberis.* (Br. Wir.)

℞. Zingiberis . . . . partes sex.
Aquae purae partes triginta sex.
Salis culinaris . partem unam.

Digere per dies quatuor vel quinque, destillationem institue et oleum in fundo subsidens collige.

Zirconium.

Eine Substanz, welche man als ein Metalloxyd betrachtet und wovon man in der Medicin nur folgende Zusammensetzung angewendet hat:

Silicas Zirconii, *Hyacinthus*; Hyacinth; Hyacinthe (*Gal.*); Jacintho orientale (*His.*).

His. Wir. *G. Sp.*

Ein sehr harter, glasartiger, nicht schmelzbarer Stein von orangengelber Farbe.

Quinque Lapides pretiosi. (Wir.)

℞. Granati,
Hyacinthi,
Sapphiri,
Carneoli,
Smaragdi,
singulorum partes aequales.

Misce et pulvera. — Eine ganz wirkungslose Mischung, welche man schon seit lange aus allen rationellen Vorschriften verbannt hat.

Nachträge und Verbesserungen.

(Den Hauptartikeln nach in alphabetischer Ordnung. Das Register hierzu so wie Nachträge s. am Ende des Registers.)

Absinthium — Elaeosacch. (HassP.) ut elaeos. anisi.

Acidum nitricum — Aqua Acidi nitrici diluti (RC.): Acidi diluti drachmas duas, Aquae font. vel Decocti Hord. vel Dec. Furfuris vel Infusi Calami vel Infusi Chamomill. libras duas, Syrupi simpl. vel Mellis puri uncias duas. — Bei Cacherie, chron. hepatitis, typhös. Fieb., asthen. Exanth., herpetischen, syph. Geschwüren, Krätze, Wassersucht, ansteck. Krankh. ꝛc. Gabe, 1 bis 2 Pfund täglich mittelst einer Glasröhre zu nehmen.

Acidum nitrosum. (Gal. GalH. *T.*) ℞. Limaturae Cupri partes sex immitte in lagenulam ostio duplici instructam, quorum alter tubo recurvato et infundibuliforme, alter alio tubo instructum est, qui lagenae immergit, Aquae partes novem continenti et cum alia communicanti, in qua Acidi nitric. (49°) partes quinque continentur, et ex qua tubus immergit in aquam. Cupro infundantur paulatim Acidi nitrici (18°) partes viginti. Operatione absoluta acidum nitrosum 38° indicans et densitate 1,359 aequans laguncula excipies ad locum obscuram reponenda. — Vel ℞. Nitratis Plumbi crystallisati quantum vis, immitte in retortam bene siccatam, ex qua tubus curvatus exiens in vas, mixturâ refrigeranti circumdatum immergit; calore adhibito acidum in recipiente condensatum excipe. (GalH. *T.*) Durch dieses Verfahren erhält man eine wasserfreie Säure.

Gas oxydum nitrosum (*Murray* mat. med.) obtinetur decompositione Nitratis Ammoniae caloris ope. Rein oder mit atmosphärischer Luft verdünnt einzuathmen, bei Krankheiten von großer Schwäche ꝛc., jedoch stets mit der größten Vorsicht.

Acidum oxalicum. Liquor (HassP.) Acidi pars 1, Aq. dest. part. 9. solve. — Reagens.

Acidum pyrotartaricum, *Liquor pyro-tartareus s. pyrotartaricus*, *Spiritus Tartari s. Tartari rectificatus s. Tartari simplex.* (Ams. Bor. Bor4 Han. Hass. HassP. O. Pal. Suec. Wir. Wür.) ℞. Tartari crudi quantum vis; immitte in retortam, pro duobus trientibus (ad dimidiam partem Bor4. HassP.)

implendam et destillationem primum igne leni, donec nubecula alba prodit, deinde vero sensim ad ruborem retortae usque aucto continua, donec nihil amplius prodit; liquorem deinde acidum ab oleo supernatante separa. P. spec. = 0,996 — 1,006. (Bor4.) — In operatione *Oleum Tartari foetidum* obtinetur.

Spiritus aperitivus Renoti, Spiritus Tartari vitriolatus (Wir.) praeparatum praecedenti simillimum obtinetur destillatione mixturae e Tartari albi sesquilibra et Sulphatis Ferri ad alborem calcinati, antea in cavam posita ut deliquescat.

Die brenzliche Weinsteinsäure wirkt schweiß- und urintreibend. — Gabe, ein halber Strupel bis halbe Drachme in Wasser.

Mixtura simplex s. simplex alba s. pyrotartarica s. Diatrion, Mixt. simplex ordinaria, Aqua s. Spiritus Diatrion s. de tribus. (B*. Bor. Bor4 Br. Han. HassP. O. Pal. Sax. Sax. Wir. Würt. *Sp. Vm.*) ℞. Spiritus Tartari uncias duodecim, Acidi sulphurici uncias tres; destillatis ad siccum, producto adde Spiritus theriacalis camphorati uncias viginti. Serva mixturam in lagena obturata. (Pal. Wir.)

B*. Br. Wir. et Würt. Spiritus Tartari uncias tres, Acidi sulphurici unam et Spiritus theriacalis camphorati quinque (*Mixt. simpl. ordin.*); — *Sp.* Spiritus Tartari uncias sex, Acidi duas et Spir. th. camph. decem; — Bor. Bor4. Han. HassP. O. Sax. et *Vm.* Spiritus Tart. partes octo, Acidi unam et Spir. Angelic. comp. duodecim.

℞. Solutionis Camphorae spirituosae uncias quinque, Spiritus Tartari uncias tres, Acidi sulphurici Aqua diluti unciam unam, Succi Baccarum Myrtilli quantum sufficit ad colorandum. (Suec.)

Schweißtreibend. — Gabe, 40 bis 50 Tropfen.

Mixtura simplex Ludovici, Guttae febrifugae, Tinctura febrifuga acida. (Wir. *Sw.*) ℞. Tincturae bezoardicae Ludovici uncias quinque, Spiritus Tartari uncias quatuor, Acidi sulphurici unciam unam, Camphorae scrupulos duos. Misce. (Wir.) — *Sw.* Spiritus Angelicae compositi uncias duodecim, Acidi tartarici liquidi uncias octo, Acidi sulphurici unciam unam et si placet pro quaque hujus mixturae uncia Camphorae grana decem. — Schmerzstillend und schweißtreibend. — Gabe, vierzig bis funfzig Tropfen. — *Spiritus carminativus de tribus.* (Br. Wir.) ℞. Nitri crudi, Tartari albi, singulorum libras duas; immitte in retortam cum recipiente Alcoholis libras duas continente communicantem et destillando ita procede ut nonnisi drachmae duae vel tres mixturae prodeant; productum quod excepisti, destillatione rectifica. (Wir.) — ℞. Spiritus Nitri fumantis unciam unam, Alcoholis concentrati uncias duodecim, Spiritus Tartari uncias sex. Misce et destillationi subjice. (Br.) — Gabe, dreißig bis sechzig Tropfen.

Acidum sulphuric. — *Aq. Acid. sulph. diluti* (RC.): Acidi unc. 1, Aquae vel Decoct. Hord. vel Inf. Calami lib. 2, Mellis vel Syr. unc. 2. — Gabe, 2 Drachmen bis ½ Unze. — *Linim. sulphurico-terebinth.* (RC.) Ol. Tereb. unc. 2, Ol. Oliv. unc. 5, Acid. sulph. drachm. 1½. Frostbeulen, Verbrennung, Quetschung, Entzündung von Insectenstichen ꝛc. — *Ung. Acidi sulph.* (RC.) Adip. suill. unc. 1, Acid. gutt. 30. Misce. — Flechten, Krätze. — *Potus acid. min.* (RC.): Dec. Furf. vel Hord. vel Aq. Panis biscoct. lib. 2, Acid. sulph. dilut. drachm. 1, Mell. desp. unc. ½ vel Syr. simpl. vel Roob Oxycocci unc. 1. — *Solutio styptica.* Cupri sulph., Aluminis, sing. part. 3, Aq. dest. part. 24, Acid. sulph. concent. part. 2.

Acidi tartarici s. Salis essentialis Tartari Liquor (HassP.): Salis ess. drach. 2, Aq. dest unc. 1. — Reagens.

Adeps s. Axungia cetaria, Wallfischthran: In Clyst. bei hartnäckigen Verstopfungen, äußerlich bei Hornhautflecken.

Aether. Spir. acetico-aethereus (Bor4.) ut spir. sulph.-aeth, sed ex Aethere acetico et Spir. Vini Gall. fortiori, coloris experti vel in hujus defectu e Spir. Vini rectificatissimo. Pond. spec. = 0,885 — 0,895. — *Aetheris sulphurici alcoholisati Potus* (RC.) Aeth. alcoholis. drachm. 1, Aq. fort. vel Dec. Furf. vel Hord. lib. 2, Sacch. puri unc. ½ vel Mellis flavi unc. 1. Frigide misceantur.

Alcohol. Alcohol dilutum amarum (RC.): Extracti amari (RC.) unc. unam, Alcoholis diluti sesquilibram. — Reizend, stärkend, bei Magenschwäche. — Gabe, zwei, drei Unzen, täglich zwei Mal. — *Aqua cardiaca* (RC.) Alcoh. dilut. vel im-

puri lib. 1, Aq. bull. lib. 4, Saccbari unc. 2 ad 4. Misce; interdum additur Succus Oxycocci vel Citri etc.

Allium. Cataplasma aere Kerndlii. ℞. Saponis nigri unc. 3 Aq. fervid. unc. 2; ebulliant leni calore per momentum, tunc admisce Ceparum sub cinere assatarum et bene contusarum uncias 3, Farin. Semin. Sinap. unc. ½; ebulliat massa denuo leni calore paulisper saepius agitando. — Zur Zertheilung syphilitischer Drüsengeschwülste.

Aloë.— Massa Pilular. contra obstruct. Halensium (*Dulk*): Extr. Rhei comp. unc. ½, Aloës Socotr. drachm. 2, Limat. Ferri pulv. drachm. 1. — *Massa Pilul. polychrest. bals.* (*Dulk*): Extractorum Aloes, Absinthii, Centaurii minoris sing. unc. ½, Extr. Helleb. nigri, drachm. 2, Myrrhae, Mastichis, Benzoës, sing. pulverat. drachm. 1, Terebinth. Venet. drachm. 2. — *Massa Pilular. Ruffii* (Dulk): Aloës Socotr., Gummi Ammoniaci, sing. unc. 1, Myrrhae unc. ½, fiant cum Succo Limonum (et Spir. Vini parva quant.) massa. — *Pilulae de Succino auctae* (Wir.): Massae Pil. de Succ. Craton. drachm. 9, Resin. Jalap. drachm. 3. Misce et ex una drachma pil. 60. forma.

Alumen. Electuarium dentifricium (*Maury.*) Mell. opt. lib. 2, Alum. ust. unc. 2, Extr. Chinae unc. 1, Ol. Menth. pip, Ol. Cinn. sing. unc. ½, Ess. Ambrae c. Moscho et Ess. Ros. drach. 2; melli coctione ad trientes duos consumpto et cum Alcanna colorato extractum admisce et per pannum tenerem exprime; massae tepidae alumen et penitus refrigeratae essentias admisce. — *Aluminis Saccharum, Saccharum aluminatum* (Bor.) Aluminis pulv., Sacch. albiss., sing. part aeq.

Ammoniacum. — Gargarisma Muriat. Ammoniae (RC.): Muriatis drachm. 1 ad 2, Infusi Spec. arom. vel Flor. Arnic. vel Chamom. vel Dec. Hord. lib. 1, Oxymell. simpl. unc 1. — *Mixtura ammonio-citrica.* Eine Art Potio Riverii mit kohlensaurem Ammonium und selbst Hirschhorngeist, worauf man Citronensaft nehmen läßt, in besondern Fällen, wenn man mehr reizen und auf die Ausdünstung wirken will. — *Sapo superammoniacatus* (*Gondret*) Ammon. caust. et Axung. vervecin. part. aeq. Als Pflaster auf die Haut gelegt, macht sie diese binnen 12 Minuten roth, in zwei Stunden wirkt sie ätzend — *Fumigatio volatilis.* Salis Ammoniaci part. 1, Calcis viv. part. 2.

Liq. Ammonii oxalici. (*Dulk*): Solutio Salis Acetos., Liquoris Ammon. caust. ope neutralisata et filtrata. — Reagens.

Ammonium muriaticum. — Fomentum commune cum Muriate Ammoniae (RC.): Alcohol. dilut. lib. ½, Acidi acet. dilut. libr. 1, Amm. muriat. drachm. 2, vel: Aq. bilibram, Aceti, Alcoh. dil., sing. lib. 1, Amm. mur. unc. ½. Tepide vel frigide admovendum. — *Solutio Muriat. Ammon. acetata* (RC.): Muriat. unc. 1. Aceti unc. 2, Aq. font. unc. 4. — Zu 1 Dr. bis ½ Unze bis selbst 6 Drachmen.

Haustus Acetatis Ammoniae et Stibii (RC.): Acetat. liq. unc. 1, Tinct. Op. Vini stibiati gutt. 25, Syr. simpl. drachm. 2. — Schweißtreibend. — *Spir. Salis Amm. foeniculatus, Liq. Ammonii foen.* (*Dulk.*) ut spir. sal. amm. anis. sed cum Oleo foenic.

Andromeda mariana (*Coxe*). Abkochung bei einem Fußgeschwür (toe-itch genannt) in Amerika mit Nutzen gebraucht. Das um die Blätterstiele und die Saamen herum sitzende Pulver ist ein starkes Riesmittel.

Antimonium. Pulvis antarthrit. Wepferi (Wir.): Lumbric. terr. exsicc. unc. 1½, Cornu C. philos. praep., Ras. Eboris, Ocul. Cancror., Cinnab., sing. drachm. 2, Antim. diaphoret. simpl. unc. ½, Nitri cryst. drachm. 6, Sacch. alb. unc. 1½, Ol. Nucist. scrup. ½. Fiat. pulv. — Gabe, 1, 2 Scrup. bis 1 Drachme. — *Ung. Tartrat. Stibii et Potassae* (RC.) Tart. emet. scrup. 1, Adip. suill. unc. 1; interdum additur Merc. dulc. vel M. solub. Hahnem. et Camph., sing. scrup. 1. — *Sapo Antimonii resinosus cum Ammoniaco Kaempfii.* Hepar Antim., Natron, Jalappa et Ammoniacum.

Aqua. — Fomentum commune tepidum (RC.): Vesica bovilla vel suilla ad dimid. Aqua tepida repleta, vel pannus laneus porosus, Aquae fervidae immersus, deinde expressus parti affectae admoveatur.

Argenti Nitras fusus.— Pilulae (RC.): Nitratis gr. 5, Extr. Liquir. scrup. 1 fiant. pil. 20. aeq. Epilepsie ꝛc. Anfangs eine bis zu sechs allmälig, oder bis Ekel entsteht.

Arnica. Oleum Florum. Man erhält aus 100 Pfd. blos eine Drachme und zehn Gran. Von Schneider bei veralteten Lähmungen, apoplektischen Anfällen und

Verhärtungen im Unterleibe gezähmt. In erfterer Krankheit 4 — 12 Tropfen al Stunden.

Arsenicum. — *Aqua toffana* (*Coxe*): Arsenici albi, Kali praep, sing. p aeq. Aq. Cymbalariae q. p. erzeugt Auszehrung. — *Kali arsenicosum* (*Dulk*, tinetur tractando Arsenicum album cum Solutione Kali carbon. caloris o filtrando et ad siccum evaporando. — *Natron arsenicosum*, *Hepar Arsenici nerale.* Coctione paratur Acidi arsenicosi cum Lixivio minerali caustico. *quor Natri arsenicosi*, *Solutio arsenicalis natrosa* simili modo ut Kali arseni so Liquór parari potest.

Arundo Calamagrostis — kräftiges Diureticum; in Rußland gegen Wa ſucht und ihre Folgen. Aufguß 1 Hand voll mit 3 Taſſen heißem Waſſer übergoß

Asa foet. Massa Pil. visceral. Kaempfii (*Dulk*): Extr. Tarax. unc. ½, Ex Millefolii, Cardui bened., Arnicae, sing. drachm. 2, Gummi Amm, (Asae fo Kali acet., Gummi Hederae, sing. unc. ½, Rhei pulv. drachm. 2; fiat mass pil. gran. 2 dividenda. — *Mist. vel Solutio* (RC.): As. foet. drachm. 2, Aq. font Menth. crisp. vel Foenic. unc. 8. Solve Keuchhuſten, Dyſpepſie, Amenor Bleichſ. ꝛc. — Gabe, 1 oder 2 Unz 2 oder 3 mal täglich. Si a das Acetat. A mon. liq unc. 4, Tinct. Digit., Tinct. arom., sing. unc. ½, habes *Mixt. Ro si.* Gegen Waſſerſucht, Aſthma, Schleimſchwindſucht, Blutſpucken.

Asphalti oleum (*Dulk*) destillatione sicca obtinetur.

Athyrium Filix mas. — *Oleum Filicis*, *Extractum Filicis oleoso-re sum* (*Ma. Dulk*) obtinetur extractione Pulveris Filicis recentis Aetheris *tractum Filicis aethereum*: Radicis pulv. unc 1, Aeth. sulph. venalis unc. 8 occlusum sepone, saepius agitando, donec liquidum colorem flavescentem a perit, et liquido defuso, operationem repete. Liquores commixti et colat stillatione aetheris ad partem quartam reducti in balneo aquae ad extracti sistentiam redige.) vel Alcoholis ope; si per alcoholem extrahitur, extra tum alcoholicum deinde cum aethere tractari potest. — In vielen Fällen Bandwurm mit Nutzen angewendet. Man giebt die eine Hälfte der Dosis (30 — Tropfen) Abends, die andre den folgenden Morgen und 2 Stunden nach dieſer zwei zen Ricinusöl, um den Wurm abzuführen. Eine Wiederholung iſt ſelten nöthig; ſ dieß der Fall ſeyn, ſo giebt man den nämlichen Abend und folgenden Morgen die Dosis. — *Massa Pilularum Schmidtii contra taeniam* (*Dulk*). ℞. Asae fet Extr. Gramin., sing. drachm. 3, Gutti, Rad. Rhei, Jalap., sing. dr. 2, Ra Ipec. Herb. Digit., Sulphur. aurat., sing. gr. 10, Hydr. mur. mit. scrup. 2, O Filic. aeth., Ol. Anisi, sing. gutt. 15. P. pil. gr. 2. Zur Vorbereitung der Cu folgende Mixtur: ℞. Rad. Valer. dr. 6, Fol. Senn. dr. 2. Para infusum, col rae unc. 6 adde Natri sulph. dr. 3, Syr. Mann. unc. 2, Elaeosacch. Filicis e 2 Misce.

Barium. — *Barytae aceticae Liquor* (HassP.): Baryt. acet. pars 1, Aq. dest part. 8. — Reagens.

Betula. — *Oleum betulinum s. Rusci.* (*Dulk*) e Cortice obtinetur destillatio nis descendentis ope. Iſt in Rußland ein ſeit langen Zeiten gebräuchliches Volksmittel bei Menorrhoe, welches auch außerdem bei Würmern, Hämorrhoiden, chroniſchen Rheu matismen, vener. Geſchwüren, Krebs ꝛc., ſowohl äußerlich als innerlich angewendet wird Liboſchitz empfiehlt es neuerdings gegen Wechſelfieber, zu 6 bis 10 Tro täglich dreimal in Pillen.

Bromum, Brom, ein einfacher, dem Chlor und Jod verwandter Stoff, wurde in d Mutterlauge der Salzſoolen, im Meerwaſſer, in vielen Quellen, in Seegewächſen un Seethieren und andern im Meere vorkommenden Subſtanzen gefunden. Hr. Balard der Entdecker deſſelben, gewinnt es auf die Weiſe, daß er einen Strom Chlor in d Lauge der Salzſoolen ſtreichen läßt und oben auf die Flüſſigkeit eine Schicht Schwefe äther gießt, welcher ſich in Brom verwandelt. Schüttelt man den ſo mit Brom ver ſetzten Aether mit Kali, ſo erhält man ein Bromſalz, welches, getrocknet, mit Mangan oxyd vermiſcht und mit verdünnter Schwefelſäure behandelt, beim Deſtilliren rothe be Dämpfe ausſtößt, die verdichtet das Brom geben. In dünnen Schichten und im fractionslichte geſehen, iſt es hyacinthroth, bei reflectirtem Lichte ſchwärzlichroth, flüchtig, verbreitet einen erſtickenden, dem des Chloroxyds ähnlichen Geruch ꝛc. Waſſerſtoff bildet es die ſogenannte Hydromſäure (Acidum hydromicum), welche m Baſen verſchiedene Salze, Bromüre, liefert (Henry im Journ. de Pharm. Fé 1829.) Wir führen hier unter andern an:

Perbromuretum Ferri, 1 Thl. Brom und 1 Thl. Eiſenfeile gemiſcht und m Waſſer erhitzt, wenn die Flüſſigkeit grünlich iſt, filtrirt, bis zur Trockenzeit abgedampft

den röthlichen Rückstand von neuem mit Wasser behandelt und abgedampft; ein ziegelrothes, sehr leicht lösliches und zerfließendes Salz von sehr styptischem Geschmack.

Bromuretum Potassii et Sodii erhält man durch Zersetzen des Eisenbromürs mittelst kohlensauren Kali's oder Natron's, Filtrirens und Abdampfens.

Magendie (Formulaire 1829) wendet die Präparate des Broms an 1) gegen Scrofeln, 2) zur Wiederherstellung der unterdrückten Menstruation, 3) gegen Hypertrophie des Herzens (des ventricules). Es finden sich am a. O. folgende Präparate:

1) *Potio cum Hydrobromate Potassii.* ℞. Aquae Lactucae uncias tres, Hydrobromatis Potassii grana duodecim, Syrupi Althaeae unciam unam; Eßlöffelweise in 24 Stunden.

2) *Pilulae cum Bromureto Ferri.* ℞. Bromureti Ferri pulverati grana duodecim, Conservae Rosarum grana octodecim, Gummi Arabici grana duodecim, Misce sedulo ut f. pil. no. 20. — Morgens und Abends 2 Stück.

3) *Unguentum cum Bromo:* ℞. Axungiae unciam unam, Hydrobromatis Potassii vel Sodii grana triginta quatuor. Misce sedulo. — Eine halbe bis eine Drachme in Einreibung auf Scrofelgeschwülste.

4) *Unguentum cum Hydrobromate Potassae bromureto.* ℞. Axungiae purae unciam unam, Hydrobromatis Potassii grana viginti quatuor, Bromi liquidi drachmas sex ad duodecim. Misce. — In Einreibung.

Buccu. Folia, Buccublätter, von Diosma crenata, L. (Pentandria Monogynia, *L.* Rutaceae, J.), einem am Vorgebirge der guten Hoffnung wachsenden Strauche (Düss. off. Pfl. XVIII. t. 3.) Sie stehen von den Zweigen ab, einander entgegen, sind 10 bis 12 Lin. lang und 3 bis 4 breit, kurzgestielt, umgekehrt eiförmig-länglich, am Rande gleichförmig, stumpf sägezähnig, ganz glatt, oben dunkelgelbgrün, glänzend, unten heller graulich matt und besonders auf der untern Fläche mit deutlichen Drüsen besetzt. Sie haben einen durchdringenden, eigenthümlichen, rauten- und kampferartigen Geruch und einen gewürzhaften, etwas stechenden, pfeffermünzartigen, nicht bittern Geschmack. Sie sind bei Verdauungsbeschwerden, Gries, erhöhter Reizbarkeit der Blase ꝛc. angewendet worden. Der Aufguß möchte wohl die zweckmäßigste Anwendungsform seyn. — Von Diosma serratifolia, *Vent.*, (Düss. off. Pfl. XVIII. 9.), einem ebenfalls Capischen Strauche, welcher von Einigen nur als Varietät des vorigen angesehen wird, kommen die langen Buccublätter.

Calamus aromaticus. Rotulae. ℞ Olei Calami et Saccharo.

Calcariae Chlorureti. (*Ma.*) — *Solutio antipsorica cum Chlorureto Calcariae:* Chlorureti Calcis uncias 3, Aquae dest. libram 1. Solve et filtra. Von Derheims gegen scabies empfohlen. Man wäscht damit die Arme und Beine. Sechs bis acht Tage sind zur Heilung hinreichend. — *Solutio Chlorureti Calcis alcoholisata:* Chlorureti sicci drachmas tres, Aquae destill. uncias duas; chloruretum tere in mortario vitreo cum pistillo vitreo, adde partem aquae, sepone, decantha liquorem clarificatum, adde novam aquam, tritura, sepone et tertio cum Aqua reliqua ablue, decantha, liquores decanthatos commisce, filtra et adde Alcoholis 36° uncias duas et Olei essentialis cujuslibet aliquot guttas. — Von Chevalier zur Verbesserung des Athems. Man thut ½ Kaffeelöffel davon in ein Glas Wasser und bürstet das Zahnfleisch mittelst einer Schwammbürste damit. Auch dient sie, um den Geruch vom Tabacksrauch zu benehmen. Dr. Angelot in Briançon giebt folgende Formel: Chlorureti grana 16 ad 20, Solutionis Gummi unc. 1, Syrupi Cort. Aurant. drachm. 4., welche er in Waschung gegen die so häufigen Geschwüre des Zahnfleisches bei Soldaten anwendet. — *Trochisci Chlorureti Calcis pro desinfectione halitus* (*Chevalier*): Chlorureti Calcis drachmas septem, Saccheri vanillati drachmas tres, Gummi Arabici drachmas quinque; fiant trochisci granorum 15 ad 18. Zwei oder drei Stück sind hinreichend, den übeln Geruch nach Tabaksrauche zu benehmen. Weitere Trochisken erhält man: Chlorureti Calcis sicci grana 24; infunde sensim aquam ad solutionem necessariam, sepone, decantha et filtra et cum Sacchari pulverati uncia una, Gummi Tragacanthae drachmis duabus et hujus solutionis sufficiente quantitate fiat pasta, de qua formentur trochisci granorum 18 ad 20, nec oleum volatile quodlibet addatur. Ein oder zwei Stück sind hinreichend. — *Trochisci cum Chlorureto* (Calcis) (*Deschamps*). Chlorureti Calcis sicci drachmas duas, Sacchari uncias octo, Amyli unciam unam, Gummi Tragac. drachmam unam, Carmini grana tria; fiant trochisci granorum trium. In denselben Fällen wie die vorigen, 5 bis 6 Stück binnen zwei Stunden. — *Pulvis dentifricius* (*Deschamps*): Chlorureti Calcis sicci grana quatuor, Corallii rubri drachmas duas. Man taucht eine neue schwach befeuchtete Zahn-

dürfte in diesen Pulvis und dürfet damit die Zähne ab; nach wenigen Tagen bekommen sie ihre natürliche weiße Farbe wieder.

Calcium. Liq. Salis Ammoniaci fixi (Calcar. muriat.) (Hass.): Salis drach. Aq. unc. 1. — Reagens. — *Mistura Carbonatis Calcis comp.* (RC.): Carbonatis pra. Gummi Arab. pulv., Sacch. puri, sing. drachm. 2, tritis adde sensim Vin. Ip. drachm. 1½, Tinct. Op. 1, Tinct. arom. unc. 1½, Aq. font. vel Menth. cr. unc. 8. Sodbrennen, Diarrhöe, Ruhr. — *Linimentum causticum.* Calc. usta. Saponis, sing. part. aeq. Aeußerlich bei Warzen, Muttermälern ꝛc. — *Conchae s. phuratae.* Concharum et Sulphuris depurati part. aeq.

Camphora. — *Linim. camphorato-ammoniatum* (RC.) Camph. c. Alcohole pulv. part. 6, Adip. suill. part. 12, Ammon. liq. part. 1.

Carbo et China. Pulvis dentif. (*Maury.*): Carbon. Ligni albi unc. 4, Chinae unc. 4, Sacch. alb. unc. 8., Ol. Menth. aeth. drachm. 4., Ol. Cinnam. drachm. 2., Ess. Ambrae c. Mosch. et Ess. Ros. drachm. ½. Subtilissime pulvis misce.

Carbonis Pulvis acidulus (RC.): Carbonis Ligni scrup. 1, Acid. citr. cryst. gr. 5. M. f. pulv. tenerrimus. — Bei übelriechendem Stuhlgang ꝛc. Täglich 3 Mal. — *Pulvis dentifricius niger* (*Dulk*) Myrrh. pulv., Sal. culin. decrepit. ana drachm 1½, Irid. Flor. pulv. drachm. 2, Caryophyll. pulv. drachm. 1, Pumicis pulv., Pulv. Carbon., sing. unc. ½, Ol. Bergam., Ol. de Cedro, sing. gutt. 5.

Carbo Spongiae. Pulvis ad strumam (RC.): Muriat. Hydr. oxydul. gr. 3, Mur. Ferri ammoniacal. Ph. Ross. gr. 3, Pulv. Rhei gr. 4, Spong. ust. gr. 6, Pulv. Cassiae gr. 2. M. f. pulv. subtiliss. dent. dos. 12. Ein Stück 2 mal der Woche mit etwas Syrup beim Schlafengehen. —

Cerasus. Aqua Cerasorum amygdalata (*Dulk*) ℞. Cerasorum acidorum siccatorum cum nucleis contusorum, Amygd. amar. contus., sing. lib. 1, Aq. font. quantum satis. Destillatione libras 24 elice. Erfordert wegen des großen Gehalts an Blausäure und wegen des ätherischen Bittermandelöls mehr Vorsicht als das Kirschwasser.

Chamomillae Oleum citratum (Bor.): Flor. Cham. libr. 60, in vesicam destillat. immissis adde Olei Cort. Citri unc. 3 et Aq. font. q. s.; destillatione prohibens oleum separetur.

Chenopodii oleum a *Coxe* indicatur, ut Ol. Anisi Juniperi etc. parandum.

China. Mist. Cinchonae offic. (RC.): Cort. pulv. unc. 1, Extr. Liquir. drachm. 1, vel Mucilag. G. Arab. unc. 2, Aq. font. libr. 1, Tinct. Cinch. c. unc. 1, vel Tinct. arom. uno. ½. Si opus, Acidi sulph. dilut. drachm. 2 addas.

Chinini Citras (*Ma.*) obtinetur solutione Chinini in Acido citrico; — *Syrupus Citratis acidi Chinini* (*Ma.*) Syrupi Saccharo perfecte clarificati libras unam, Citratis acidi, Chinini grana triginta sex. — Tonisch und antiseptisch, ist der Syrup. antiscorb. anzuwenden. — Gabe, 1 oder 2 Eßlöffel in 24 Stunden.

Chlorum. Balneum Chlori (*Ma.*) Peroxydi Manganesii unc. 4, Salis marini unc. 1½, Acidi sulphurici unc. 1. — Man wendet diese Localbäder mittelst eines den Büchsen, deren man sich sonst zu Dunstbädern bedient, ähnlichen Apparats an, indem man den Gasstrom unmittelbar auf die leidenden Theile gehen läßt. Die Temperatur kann 32 bis 36° R. betragen. Die Quantität der Substanzen kann allmälig bis auf das Dreifache gesteigert werden. Man hat sie besonders bei chronischen Leberkrankheiten nützlich befunden. Sie können mit Nutzen auch durch nitromuriatische ersetzt werden, welche Bernhard (de utilitate acidi nitrici et muriatici etc. Lips. 1825.) nicht nur bei Leberkrankheiten, sondern auch gegen Bauch- und Brustwassersucht, Flechten, syphilitische Nachkrankheiten und verschiedene Fälle von Menstruationsstörungen empfiehlt. — *Gas Acidi muriatici oxygenati s. oxymuriatici s. Chlori* (Bor.) Natri Muriat. unc. 12, Mangani unc. 8, Acidi sulph. crudi unc. 10 cum Aq. comm. aequali quant. dilutas, infundatur sensim acidi solutio salibus in retortam ingestis excipulo et tubulo incurvato aqua hactenus repleto, ut retortae orificium infra hujus superficiem positum sit, instructam; gas infra superficiem aquae calidae apparatus pneumatici lagenis Aqua destillata repletis excipe, donec haec expulsa sit.

Cinae semen. Extractum Seminis Santonici aethereum. ℞. Semin. Cyn. contusi uncias quatuor, Aetheris sulphurici uncias sedecim, digere saepius agitando per dies tres ad quatuor, filtra et aetherem ad partem quintam usque destillando abstrahe; residuum calore lenissimo (balnei aquae) ad molliorii extracti consistentiam evaporatum serva. — Vom Apoth. Pehn zu Celle bereitet und von Dr. Schuppmann als sehr wirksames, gar nicht widerliches Wurmmittel empfohlen. —

Gabe, für Kinder von 1 — 3 Jahren 1 bis 3 Gran, für ältere nach dem Alter 4 bis 5, für Erwachsene 10 Gran. Die Dosis wird einige Morgen hinter einander wiederholt. (Hufel. und Osann Journ. 1830. 1.)

Pulvis contra vermes s. anthelmintieus (*Dulk*): Rad. Valer. drachm. 1½, Rad. Jalap. drachm. 1, Cinae unc. ½, Tart. natronat. drachm. 2. Pulverata misce.

Citrus. Oleum de Cedro rectif. (*Dulk*) ut. ol. succ. rectif. obtinetur. — *Acetum Naphae.* Destillationis ope ut acet. rutae.

Colchicum. Spirit. Semin. ammoniatus (*Williams*) Infus. vinos. c. Ammonio. *Tinctura Seminum* (*Williams*). Semin. unc. 2, Vini Hispan. lib. 2. digere per octo dies.

Convolvulus panduratus (*Coxe*); wild Potatoe vine (Delaware). Die Wurzel (Kussander oder Kassader genannt) in Pulver, Aufguß oder Abkochung in Nordamerica gegen Harngries gebraucht.

Costus. Oleum costincum (Wir.): Costi amari unc. 2, Majoranae floresc. unc. 8, contusis superfunde Olei Oliv. albi recent. libr. 1½, Vini albi unc. 2. Digere ad siccum, exprime et cola.

Croton. Alcohol Crotonis (*Nimmo*) Ol. gutt. 12. Alcoh. unc. ½. — Gabe, ½ Drachme in Emulsion.

Cucumis. Succus Cucumeris. (Hass.) ℞. Cucumerum maturorum quantum vis, putamine et seminibus semotis contunde in mortario, exprime fortiter et succum post sepositionem filtratum in lagenis serva. — *Unguentum Cucumerum.* (GalF. GalH.) ℞. Cucumerum recentium quantum vis, Axungiae Porci partes quatuor, Adipis vitalinae partem unam; liquatis simul utraque adipe, adde Succi Cucumerum pondus earum dimidium, subige iteratum per horas viginti quatuor, decantha et adde Succi eandem quantitatem, quod sexies ita repete; cola liquidum, et adipe liquefacta, adde libras cuique drachmas circiter duas amyli, quo facte seponatur. — *Oleum Seminis Cucumeris.* (Gal. Sar.) ℞. Seminum Cucumerum quantum vis; pellicula detracta contunde in mortario marmoreo pistilli lignei ope et pulpam in sacco e tela confecto inclusam frigide exprime. — *Semina frigida majora.* (Gal. Wir.) ℞. Seminum Cucumerum, Melonum, Citrulli, Cucumeris Lagenariae, singulorum partes aequales.

Cuprum. Vitrioli coerulei Liquor (HassP.): Vitrioli drachm. 1, Aq. dest. unc. 1. — Reagens. — *Solutio Subacetatis Cupri et Ammoniae* (RC.): Acetat. Cupr. cryst. drachm. 1, Ammoniae liq. unc. 1. Bei syph. Geschwüren und dergl. Man setzt einer Unze Wasser ungefähr 10 Tropfen davon zu. — *Liquor Cupri ammoniato-muriatici cum Hydrargyro.* Solutioni c. Calomell. drachm. 1 et Acidi muriat. unc. 1 additur sub agitatione assidua Liquoris Cupri ammoniato-muriatici tantum, donec mixtura turbida facta subito clarefacta colorem viridem accepit. (unc. 2 circiter pro scrup. 16 solutionis). Buchner räth dafür lieber eine *Aqua antimoniasmatica composita* zu bereiten, dadurch daß man der Aq. antim. simpl. bei jedesmaliger Verordnung die nöthige Menge Sublimat zusetzen läßt. Wird besonders bei inveterirter Lustseuche gerühmt. — *Aethiops Cupri* e Cupro carbonico digestionis c. Mercurio ope. — Nach Pasquillati gegen Epilepsie, soll nach Andern, heftige Zufälle erregen. —

Datura. Tinctura Stramonii ammoniata. Herbae unc. 4, Spir. Vin. aquos. unc. 15, Spirit. Ammoniac. unc. 1. Digerantur per dies quatuordecim. — Gabe, 12 — 14 Tropfen.

Digitalis. Pulv. Supertartrat. Potassae et Digitalis (RC): Crem. Tart. scrup. 1, Pulv. Fol Dig. gr. 1, Pulv. Rad. Zing. gr. 10. Wassersucht, von ½ bis nach und nach 1½ Drachmen zweimal täglich.

Eupatorium Ayapana, Vent; Aya-Pana; Aya-Pana (*Gal.*) ♃ (Fer. *Br. C. G.*) (Syngenesia Polygamia Aequalis, L.; Synantherae *Cass.*) Eine Pflanze Brasiliens. (*Vent.* Jard. Malm.) — Man wendet die Wurzel, Zweige und Blätter an. Erstere ist dünn, stark behaart, faserig, außen hellgelb, inwendig weiß; die Zweige sind rankend und knotig; die Blätter brüchig, dünn, schmal, lanzettförmig und dunkelgrün. — Geruch gewürzhaft, Geschmack zugleich etwas adstringirend. — *Infusum Aya-Panae* (*Br.*) Foliorum no. 6. 1. Aq. bull. libr. 2. Infunde et decantha. — Von Albert bei leichten scorbutischen Affectionen empfohlen.

Euphorbia. Extractum Esulae. (Wir.): Radicis Esulae lib. 1, Aq. ferv. lib. 6, macerentur per triduum, tunc leniter ebulliant, expressa et colata leni igne ad extracti consistentiam evaporent.

Euphorbii Correctio (Wir.). Euphorb. triti unc. 4, Succi Citri depur. lib. 1, digestione solutum cola per linteum et ad extr. consist. evapora. — Heftig purgirend, bei Wassersucht — Gabe 8 bis 15 Gran.

Ferrum. Vitrioli Martis Liquor (HassP.): Vitrioli recens part. drachm. 1, Aq. dest. unc. 1. — Reagens. — Attactui aëris diu exponendo fuscus redditur, tunc filtratus *Liquorem Vitrioli Martis oxydati* (HassP.) habes. — *Mixtura Myrrhae ferrata* (*Griffithii*?) (RC.): Myrrh. pulv. drachm. 1, Carbonat. Ferri praecip. dr. ½, Syr. Zing. unc. ½, tere et adde Aq Menth. pip. lib. ½, Tinct. Cinch. comp. unc. ½. Cacherie, Schwindsucht. Ein und eine halbe Unze 2 bis 3 mal täglich Statt derselben kann man anwenden: Tinct. Muriat. Ferri unc. 2, Tinct. aror. unc. ½. 1 Drachme drei Mal täglich mit Chamillenthee. — *Opiatum antiapoplecticum* (*Be.*): Croci Mart. aper. unc. ½, Croci, Rhei, sing. drachm. 1½, Antim. diaphor, Salis Tamarisci, Terebinth., Sal. Ammon., Jalapae, Irid. Florent., sing. drachm. 1, Scammon., Extr. Helleb. nig, sing. scrup. 2, Syr. Ros. pall. q. s. — Gabe, 2 Drachmen Morgens nüchtern, mit Kräuterbouillon. — *Acetas ferricus, ferrum acetic. oxydat.* Obtinetur dilvendo solutionem Ferri oxydati muriat. vel sulph. cum Aq. dest quantitate sextupla, addendo Lixiv. caust. quamdiu aliquid praecipitatur; praecipitatum pluries elotum et pressione inter chartas emporet. maxima parte humiditatis privatum, cum mixtura ex Acido acet. concentr. pond. sp. 1,080 et Aquae aeq. quant. contritum, massae in arena mollice calefacta positae Acidi tantum affunditur donec omnia soluta sint. — Innerlich 2 — 4 Gran, auch äußerlich gegen Krebs. Letzterer benutzt in d. Klaproth'schen Eisentinct. — *F. oxydulatum arsenicicum*, arsenikfaures Eisenoxydul. Von Gaitmichael als Aetzmittel, äußerlich bei offenem Krebs, später benutzte er eine Salbe aus Ferr oxydul. ars. drach. 1, Ferr. oxydul. phosphor. drachm. 2 et Ungt. Crucei drachm. 6, mittelst eines Pinsels aufzutragen, auch nicht auf die ganze Oberfläche anzuwenden, wenn sie sehr ausgedehnt ist.

Fuligo. Emplast. aus gemeinem Herz und Kienruß; bei kalten Geschwülsten vorzüglich Gliedschwamm.

Gadus Lota. Oleum jecoris s. Liquor hepaticus Mustelae fluviatilis Kalquappenleberthran. Die aus der eingeschnittenen fetten Leber des genannten Fisches erhaltene Flüssigkeit, welche als eine ranzige Fettigkeit zu uns gebracht wird. De Haen gebrauchte sie gegen Hornhautflecke; Beer in einer Salbe mit rothem Präcipitat, weißem Bittriol und ungesalzener Butter.

Galbanum. Massa Pilular. resolv. Schmuckeri (*Dulk*): Galbani, Sagapeni, Sapon. med, Pulv. Rhei, sing. drachm. 1½, Tart. emet. in Aq. dest. solut. gr. 16; fiant pil. gr. iij.

Gas nitrosum, Aër nitrosus. Obtinetur infundendo in lagena thene obturata Cuprum vel Auricalcum in fila ductum cum Acido nitrico diluto. Ist ganz irrespirabel, wird aber häufig in Büchern unrichtig mit dem Gas azoticum oxydatum verwechselt.

Gas sulphurosum, sulphuricum, Aër vitriolicus. Deflagratione lenta Sulpuris etc. obtinetur. In Ermangelung oder bei zu großer Kostbarkeit anderer saurer Gasarten zu Vertilgung von ansteckendem Krankheitsstoff benutzt.

Iodium. — *Aquae iodatae, Balnea iodata.* Lugol wendet mit Vortheil bei Scrofeln Jodwasser zu ½, ⅔ und 1 Gran auf die halbe Flasche oder ein Pfund Salzwasser auf's Bad an. No. 1.) Salis marini purificati grammata (grammes) sexaginta sex, Tinctura Iodii (Iodii granum unum pro grammate) grammata quinquaginta, Aquae destillatae libras centum; — No. 2.) Salis marini gramm. 66, Tinct. Iodii gramm. 75. Aquae purae libras 100; — No. 3.) Salis mar. gramm. 66, Tinct. Iodii gramm. 100, Aquae purae libras 100. — *Aquae iodatae s. Balnea iodata cum Potassa iodica.* 1) Iodinae scrup. 2, Kali iod. sc. 4; 2) Iodinae scr. 2½, Kali iod. scr. 5. 3) Iodinae scr. 3, Kali iod. scr. 6; 4) Iodinae scr. 4, Kali iod. scr. 8. Von Lugol in denselben Fällen Bei Erwachsenen fängt er mit der Flüssigkeit No. 2 an; bei Kindern ist, nach Erfahrung, der dritte Theil der Auflösung hinreichend. (Notizen der Nat. und Heilk. No. 579. S. 110.) — *Solutio atrophica* (*Ma.*): Aquae destill. Lactucae uncias octo, Aq. Menthae drachmas duas, Hydriodatis Potassae drachmas quatuor, Syrupi Althaeae unciam unam. — Ein Eßlöffel Morgens und Abends in etwas Wasser, man kann bis auf 2 Eßlöffel steigen. Bei Hypertrophie des Herzens, welche im Allgemeinen in kürzerer Zeit als einem Monat geheilt wurde. Ist bei dieser Hypertrophie, welche an einem starken Herzschlag und einem dumpfen Geräusch erkannt wird, zugleich die Bewegung des Herzens beschleunigt, so setzt *Ma.* die Tinct. Dig. hinzu: *Solutio atrophica:* Aqu. dest. Lactucae unc. 8, Aq. Flor. Aur. drachm.

2; Hydriodat. Potass. drachm. 4, Tinct. Dig. alcohol. drach. 1 ad 2, Syr. Alth. unc. 1½. Morgens und Abends 1 Eßlöffel in etwas Wasser oder genauer ½ Unze jedesmal. — *Unguenta s. Pomata cum Hydriodate iodurato Potassae.* Lugol läßt sie in drei verschiedenen Stärkegraden bereiten, 1) Iodureti Potassii gr. 64, Iodii ß, Axungiae 1000; 2) Iodureti 160, Iodii 22,4, Axungiae 100; 3) Iodureti 160, Iodi 25,6, Axungiae 1000. Er gebraucht sie so wie die oben angeführten Wasser im Ludwigs-Spital bei Scrofeln, z. B. Knoten, Augenentzündung, Nasengeschwüren, Geschwüren, behinderter Menstruation, weißen Scrofelgeschwülsten, wo sie sich sehr nützlich zeigten. — *Ioduretum Barii (Ma.)* obtinetur calefaciendo Hydriodatem Ferri cum excessu Carbonatis Barytae, evaporando ad siccum, redissolvendo in Aqua et crystallisationi subjiciendo. — *Pomatum s. Unguentum cum Iodureto Barii.* Iodureti grana 4, Axungiae unciam unam. Misce. Von Biett in einigen Fällen von Scrofelgeschwülsten angewendet. — *Iodure tum Arsenici (Ma.)* Obtinetur vel: calefaciendo in retorta vitrea mixturam Arsenici 16 et Iodi 100, vel: coquendo Arsenici pulverati gramm. 80, Iodi 100 in Aquae 1000, liquorem quum colorem perdidit, filtrando et ad siccum, evaporando; sublimationi si necesse videtur, potest subjici. — *Unguentum s. Pomatum cum Arsenici Iodureto:* Iodureti Arsenici grana tria, Axungiae unciam unam. Von Biett in einigen Fällen fressender tuberkulöser Flechten angewendet. — *Iodure tum Sulphuris (Ma.)* Iodi partes 4, Sulphuris sublimati part. 1; mixta et in vitrum medicamentis capiendis inservieus (Mehlzinglas) introducta calefac leviter, quo facto excessus Iodi separatur et iodure tum massae instar ad griseum vergenti, crystallos aciculares praebenti remanet. — *Unguenta Iodureti Sulphuris* (St. Louis. 1) Iodureti Sulphuris partes quinque, Axungiae 96 2) Iodureti part. 8, Axungiae 144. — Von Biett seit einigen Jahren in Fällen tuberkulöser Hautkrankheiten angewendet.

Jacea. Unguentum. Extracti et Axungiae, sing. part. aeq. Von Stein mit Nutzen bei verschiedenen Hautkrankheiten.

Kadmium, Zincum Silesiacum, Cadmium. — *Oxydum Kadmii.* (B*) ℞. Zinci Silesiaci quantum vis, Acidi sulphurici tenuis quantum sufficit ad solvendum, caloris ope, minerale; per liquorem refrigeratum et filtratum transmitte torrentem Gasis acidi hydrosulphurici; praecipitatum elotum per Acidum hydrochloricum liquidum calidum tracta, et solutione fere ad siccum evaporata et residuo addita Aquâ, Ammoniacum causticum affunde, praecipitatum totum sicca — Scheint reizend und selbst in kleiner Gabe giftig zu wirken. — *Sulphas Kadmii* (B* *T.*) ℞. Oxydi Kadmii quantum vis, Acidi sulphurici quantum sufficit ad dissolutionem, Liquorem vaporando in crystallos coge — *Aqua ophthalmica.* (B*.) ℞. Sulphatis Kadmii grana duo ad octo, Aquae destillatae unciam unam. — Von Gräfe äußerlich bei chronischer Augenentzündung gerühmt.

Magnesium. Pulvis antacidus Vogleri. Magn. carb. drachm. 1, Ipec. gran. 8, Sacch. alb. drachm. 7 et Ol. de Cedro gutt. 6. — *Pulvis dentifricius (Maury):* Magnes. Anglic., Cremoris Tart., sing. lib. 1, Chinini sulph. drach. 3., Cocoion. unc. 1½, Ol. Menth. crisp. drachm. 4., Ol. Cinnam. drach. 3., Ol. Neroli drachm. 2, Ess. Ambrae c. Mosch. et Ess. Rosar. drachm. 1. Magnesiam cum essentia in vas infunde et simulac haec absorpta fuerit cum pulveribus commisce et per cribrum tenerrimum trajice. — *Liq. Magnes. sulph. s. Salis amari* (HassP.): Salis drachm. 2, Aq. dest. unc. 1, solve et filtra. — Reagens. — *M. aceticum* solutione oxydorum imperfectorum. Zur Auflösung in Wasser sind 3, 5 Theile in der mittlern Temperatur nöthig. 1 und mehrere Gran in Pulver und Pillen, theils in Auflösung. — *M. muriaticum oxydulatum* solutione Mangani et oxydorum in Acido muriatico. In Auflösung zu 1 und mehreren Granen. Aeußerlich von Kapp in Gerstendecoct mit Arab. Gummi und Honig zu Gurgelwässern bei scorbut. und syphil. Geschwüren im Munde und Halse empfohlen. — *M. sulphuricum oxydulatum* tractando Manganum et Oxyda ejus cum Acido sulphurico. Zur Lösung der Crystalle sind drittehalb Theile Wasser von mittlerer Temp. nöthig. Innerlich bei syphil. Krankh und chron. Hautausschl. am besten in wäss. Aufl. Aeußerlich bei Krätze in Salbenf. (1 Dr. auf 1 Unze frische ungesalzene Butter) wirkt aber langsamer als Schwefelsalben.

Menthae Liquor philadonticus et antispasmodicus (Maury): Alcoholis 38° octarios (litres) duos, Ol. Menth. crisp. unc. 1, Ess. Cinnam. drachm. 2, Ol. Neroli drachm. 4, Ess. Ambrae c. Mosch. et Ess. Ros. drach. 1½, Aeth. sulph. drachm. ½. Liquori colorato et filtrato aetherem admisce.

Menthae crispae Tinctura (An. *Vm.*): Herb. part. 1, Alcoholis 20° part. 8. Digere per tres dies et filtra — Reizend.

Mercurius.— *Empl. Oxynitratis Hydrarg. et Ammoniae s. mercuriale* (RC
Empl. simpl. libr. 1, Oxynit. Hydr. et Amm. drach. 2. ad 3. — *Hydrargyr*
Phosphas (*Coxe*) Acidi sulph. unc. 8, Aq. lib. 4, misce in vase vitreo capac
et adde Ossium ad alborem calcinat. unc. 14. Stent in digestione calore 6
per tres dies, saepius bacilli vitrei ope agitata; filtra deinde et loco frigido a
aptam consistentiam evaporata crystallisationi subjice, crystallos (Potas
phosphorata) in Aqua destillata solutas decompone per solutionem supersatura
tam Mercurii in Acido nitrico, residuum cum Aqua dest. edulcora, ad siccu
evapora etc. (*Bergmanni* procedendi methodus). Parari etiam potest adden
Acidum phosphoricum solutum Solutioni Mercurii in Acido nitrico. — *Hydr*
gyrum oxydatum phosphoricum acidum, Mercurius phosphoratus Fuchsii prae
ratur infundendo Hydrargyri oxydati rubri subtilissime pulverati semunciae
phiala vitrea Solutionem Acidi phosphorici sicci puri unciarum duarum
Aquae unciis octo coquendo massam et continua agitatione ad perfectam sicc
tatem usque continuando. et si necesse, pulverem in Aquae eadem quantita
redissolvendo et evaporando, donec oxydum rubrum evanuerit etc. Massa
obtenta in Aquae unciis octo soluta seponitur, donec omnia insolubilia praec
pitata sint, quo facto liquor defusus bulliat, addendo de residuo, quamd
aliquid solvitur. Liquidum hoc modo saturatum cum Aquae tanta quantita
solutum ut totum unciarum sit octo, quiete refrigeret, ut excessus hydra
phosph. subsideat vel idem ipsum sub nomine: *Liquor Hydrargyri oxyd*
phosphorici acidi servatur. — In venerischen Uebeln kleiner Kinder, aber auch
andern Krankheiten, häutiger Bräune, chronischen Hautausschlägen ꝛc. innerlich und b
serlich; in Auflösung zu 1 und mehrern Granen. Ganz kleinen Kindern 3 Gran in
Unzen Wasser, theelöffelweise. — *Pulvis antivenereus* (*Coxe*) Phosph. Hyc
gr 4, Cinnamomi pulv. gr. 14, Sacch. albi drachm. ½. Misce, fiant pulv.
Morgens und Abends ein Pulver, bis Speichelfluß droht, wo es auszusetzen ist. B
alten venerischen Geschwüren, besonders an den Geschlechtstheilen, venerischer Opht
mie, Schanker, Rheumatismen ꝛc. — *Massa Pilul. hydragog. Janini* (*Dulk*)
dem substantiis ut pilul. II. 165. indicatae componuntur, mutatis tamen qua
titatibus. — *Mercurius cinereus Blackii.* obtinebatur praecipitatione completa Sol
tionis Hydr. nitr. oxydul. per Ammon. carbonic. — *M. praecip. Saunderi*: Cal
mellis part. 1, cum Ammonii caust. part. 4 per horas aliquot agitatae. — *M.*
praecip. ruber per se obtinebatur coquendo mercurium in phiola longicolli aper
ta ita ut vapores metallici cum oxygenio aëris nupti oxydum formarent. —
Unguent. Oxynitrat. Hydr. et Ammoniae (Merc. solub. Hahn.) (RC.): Oxynitr.
part. 1, Adip. suill. part. 12. — *Ung. comp.* (RC.): Oxynitr. Oxydi Zinci, sin
part 1, Adip. suill. 4. — *Pilulae Suboxydi Hydrargyri* (RC.): Hydr. unc.
Terebinth. drachm. ½, tere ad globulorum disparit.; adde si opus, mucilag. G.
Arab. et cum Pulv. Rad. Liq. vel Amyli pil. 80 aeq. forma. Eine oder zwe
Morgens und Abends. — *Ung. acre* (HassP.): Merc. subl. corros., But. Antim
sing. part 1, Ung. irritant. part. 4. — *Hydrargyrum oxydulatum nigrum p*
rum, Oxydum hydrargyrosum. ℞. Liquoris Hydrarg. nitrici oxydulati quantu
lubet, instilla Kali caustici tantam quantitatem ut kali sufficienter praevale
praecipitatum filtri ope separatum cum Aqua destillata fervida bene ablue e
leni calore sicca. (*Dulk*). — *H. glyzyrrh., Succ. Liquir. mercurialis.* Hydr. et Su
Liq. part. aeq. — *Hydrarg. terebinth., Merc. tereb.* Hydr. part. 1, Terebint
part 1½. — Bei Wassersucht in Pillen. — *Pilulae mercuriales Barbarossae:* Hy
drarg. terebinth., Aloë, Agaric. alb. et Rheum. — *Mercurius Zinci.* Merc. ter
binth. cum Oxydulo Zinci. In vener. und krampfh. Ueb. und Wurmkrankh. — *A*
thiops min. aurat., Hydr. stibiato-sulphurat. aurant. Merc. et Sulph. aurat. An
tim., partes aeq. contrita in mortario vitreo calefacto.

Morphina. M. sulphurico. Morphinum in Acido sulphurico diluto so
lutum, ad certum gradum vaporatum et loco frigido crystallisationi subjectum
Löst sich in 2 Theilen Wasser. In ähnlichen Formen und Dosen, wie das essigsaur
Morphin.

Moschus. Tinctura (*Dulk*). Moschi drachm. 1, Spir. Vini rectif., Aq.
destill., sing. unc. 8. Digere ad perfectam moschi solutionem.

Mudarii Radix von Calotropis Mudarii, *Browne* (Asclepiadeae), einer i
Hindostan wachsenden Pflanze. Die Wurzel ist gelblichbraun, ½ bis 1½ Zoll dick. M
wendet die Rinde an. Die Wirkung hat Aehnlichkeit mit der der Ipecacuanha. I
Hindostan ist es schon lange ein Volksmittel gegen Hautkrankheiten, besonders elepha

tiasis und lepra. Der Extractivstoff derselben oder das Rubaxin bewirkt zu 1 Gran auf 3 mal genommen, schnelles und reichliches Erbrechen. (Notizen a. d. G. d. N. u. H. Bd. XXVI. S. 92.)

Mures marini a Wir. indicantur contra haemorrhoides coecas.

Nitrum. Pulvis leniens Thedenii (*Dulk*): Pulv. Nitr. depur, Conchar. praep., Natri sulph. sicc., Rad. Rhei, sing. part. aeq.

Nux vomica. Alcohol Nucis vomicae (*Mag.* ed. 7 1829) Alcoholis 36° unciam unam, Extracti Nucis vomicae sicci grana quatuor; — *Spiritus ad paralysin* (*Ma.*) Alcoholis nucis vomicae unciam unam, Ammoniaci concentrati drachmas duas. — Zu Einreibungen auf gelähmte atrophische Theile.

Oleum pyro-carbonicum Aus der Braunkohle durch trockne Destillation gewonnen. Von Lucas bei Gicht, Hysterie, Hypochondrie, Lähmung, Magenkrampf, Kolik, Lungensucht ꝛc. empfohlen. Seine Pillenmasse besteht aus Ammoniakgummi, Galbanum, Guajacharz, Aloë, Seife ♃ 1 Unze und 2 Unzen Braunkohlenöl.

Oleum Terrae a Wir. indicatur in nervorum affectibus externe adhibendum.

Opium. Elixir de Squire (*Coxe*): 1) Opii unc. 4, Camph. unc 1, Coccinellae tantidem, Ol. Foenic. drach. 2, Tinct. Serpent. octar. 1, Spirit. Anisi octar. 16, Aq. oct. 2, adde Auri musiv. unc. 6; 2) Rad. Liquirit. lib. 1, Kali pp. unc. 4, Coccin. unc. 1, Aq. oct 12, coque ad octar. 8 reman., adde Tinct. Opii unc. 12, Camph. unc. 1, S. V. R. oct. 4, Aur. mus. unc. 12; 3) Opii unc. 1 et drachm. 4, Camph. unc. 1, Coccinell., Kali pp., sing. drachm. 1, Sacchari usti unc. 2, Tinct. Serpent. oct. 1, Spir. Anisi oct. 16, Auri mus. unc. 8. — *Haustus opiatus* (RC.): Tinct. Op. gutt. 25., Aq. font. unc. 1., Syrup simpl. drachm. 2. Si Vini stib. guttas 30 addis, *Haustum opiato-stibiatum* (RC.) habes. — *Liquor Citratis Morphinae.* (Black drops) Opii puri unc 4, Acid. citric. crystall. unc. 2, tere in mortario lapideo, sensim addendo Aq. destill. unc. 16, macera per horas 24 et cola. (*Porter.*) — *Liq. tartarisatus Morphinae.* Simili modo cum Acido tart.

Ovi Vitellus. Linimentum. Ol. Oliv. et Vitelli Ov. ut f. ung. Bei einfachen Wunden sehr empfohlen.

Paeonia. Pulvis antiepilepticus niger (*Dulk*): Radic. Paeon. pulv. unc. 1, Rad. Dictamni alb. pulv., Visci albi pulv., sing. unc. ½, Sem. Paeon. pulv., Conchar. praep. sing. unc. 2, Succini praep. drachm. 2, Terrae sigill. rub. unc. ½, Pulv. Carb. unc. 3, Auri fol. q. s.

Pinus. Alcohol dilutum antiscorbuticum. (RC.) Extr. amar., Extr. Tar. Pini (*Extr. Pin. Tur.* Turion. partem 1, Aquae 8 ad dimid. coct. et ad extr. consist. redact.), sing. semunc., Alcoh. diluti semilibram. Gabe wie bei'm vorigen. — *Spec. Turionum Pini comp. s. antiscorbuticae* (RC.): Turion. Pini, Herb. Millef., Fumar., Trifol. fibr., Rasur. Lign. Junip, Rad. Cal. arom., sing. part. aeq. *Decoctum* paratur e Specier. harum semunc. et Aq. purae lib. 1½ ad lib 1. colat. consumpt., cui, si libet, addes Acid. tart. drachm. ½ vel Acid. sulph. drachm. 1 vel. Roob Oxycocc. vel Syr. Molass. vel Oxym. simpl. vel Succ. Citri unc. 1. Ein Pfund und mehr täglich.

Platinum. Liq. Platini muriatici (HassP.): Platini laminati concisi q. s. neutralisa quantum fieri potest, cum Aquae regiae q. s, liquorem cum Aq. dest. decuplo dilue et ad ebullitionem calefacto Sal. Amm. pulv. adde quamdiu praecipitatum flavum oritur, quod elotum et siccatum in crucibulo exsudescat; residuum griseum metallicum in Aqua regia iterum solve et acido salis superfluo evaporato, liquorem cum quadruplo Aquae destill. dilue ac per chart. bibulam filtratum serva in vitro colore nigro obducto. — Reagens.

Plumbum. Empl. universale Waltheri (*Dulk*): Emplastro fusco adhuc molli adde pro libra quaque Aluminis usti, Succini praep., sing. drachm. 3. — *Ung. Superacetat. Plumb. comp.* (RC.) Ung. Acetat. Plumbi, Solut. Muriat. Hydr. oxyd. et Ammon., sing. part. aeq.; probe misceantur. — Flechten, Kopfgrind ꝛc. — *Plumbum hydrocyanicum* (*Dulk*) miscendo Saccharum plumbic. depuratum solut. cum Lixivio Sanguinis ut pulvis in Aqua insolubilis praecipitetur. — *Plumb. phosphoricum, Saturnus phosphoratus* (id.): Oxydi Plumbi muriat. recen-

ter praecip. quantum vis, Aq. dest. ferv. quantum sufficit, solve et adde [illegible] trum phosphoricum in Aqua dest. solutum, ut praecipitatum provocetur, q[illegible] cum Aqua bulliente ablutum filtri ope separa et in loco umbroso siccat[illegible] serva. — *Plumbi Acetatis cryst. Solutio fortior, Aq. vegeto-mineralis* (RC.): Ac[illegible] Plumb. cryst. scrup. 1, Aceti vel Acid. acet. dilut. drachm. 1, Aq. dest. [illegible] font. unc. 5.

Potassium. — *Potassii Cyanuretum purum. Potio pectoralis* (M[illegible] Aquae Lactucae uncias duas, Cyanureti Potassii granum dimidium ad duo, S[illegible] rupi Althaeae unciam unam. — *Kali oxalici Liquor* (HassP.): Kali pars 1, Aq. d[illegible] part. 8. ut reag. — *Sal Tartari purissimum* (HassP.) ut sal sodae puriss. sed e Fe[illegible] fol. Tart. cum Sale Tartari parata: lixivium elutriatione carbonis residui [illegible] tentum et filtratum ad siccum inspissetur et sal residuum servetur. — Re[illegible] gens. — *Liquor* (HassP.) Salis drachm. 2, Aq. dest. unc. 1. — Reagens. — *Salis Tartari perfecte saturati Liquor* (HassP.): Salis drachm. 2, Aq. dest. u[illegible] 1. — Reagens. — *Mixtura Nitratis Pot. s. nitrosa* (RC.): Nitratis drachm. 1. A[illegible] Menthae pip. vel font. unc. 3, solutioni adde Aceti unc. 1½. Alle 3 — 4 St[illegible] tunden 1 Unze. Bisweilen den einzelnen Gaben 5 Tropfen Tinct. Op. zugef. — *P[illegible] tio oxygenata* (RC.): Muriatis Potassae drachm. 1, Aq. dest. lib. 3. — *P[illegible] acidus vegetab.* (RC.): Decoct. Furfuris vel Hord. vel Aq. Panis biscoct. lib. 2, C[illegible] moris Tart. scrup. 4, Syr. simpl. vel Rob. Oxycocc. unc. 1, vel Mell. de[illegible] unc. ½. — *Solutio saponacea Hahnemanni* (RC): Saponis part. 1, Aq. 4. Laum[illegible] als Gegengift gegen Arsenik.

Prunus Virginiana (*Coxe*) wild Cherry Tree. Die Rinde (besonders der W[illegible] zel) wurde bei Wechselfiebern heilsam befunden. Die wilden Amerikaner gebrau[illegible] sie bei Syphilis. Auch hat man sie bei Dyspepsie, Lungenschwindsucht und Lende[illegible] sceß mit Nutzen angewendet.

Pyrothonid s. Liquor pyro-oleosus ex panno vegetabili paratus wird [illegible] Ranque aus feinenem, hanfenem oder baumwollenem Zeuge durch Verbrennung de[illegible] ben bereitet. Er wird äußerlich besonders bei chronischen Augenentzündungen, Mutterv[illegible] flüssen, weißem Fluß, Tripper und Frostbeulen in Einspritzungen, Waschwassern, Um[illegible] schlägen ꝛc. empfohlen.

Quercus. — *Ung. Autenriethii contra decubitum* (*Dulk*): Cort. Quercus quantum vis cum Aq. part. 8 ad dimid. dec., colat. et add. Aceti Plumb. quamdiu praecip. oriatur, quod in colatorio charta empor. tecto impositum cum Aq. comm sedulo elotum in tantum siccetur ut pultem unguinosam praebeat, quae loco frigido servanda est. — Muß bald verbraucht oder besser jedesmal frisch bereitet werden.

Ratanhia. — *Extractum* in Brasilia praeparatur. — *Elixir. tonicum* [illegible] *dentes* (*Maury*): Rad. Ratanh. unc. 8, Aq. vulner. spirit. octarios (lit.) 4, Ol. Menth. drach. 2, Ol. Cort. Aur. drachm. 3. Radicem contusam per dies [illegible] in aq. vuln. macera, filtra tincturam et adde essentias, aptissime in Spir. Vin. rectificatiss. unc. 4 solvendas.

Rheum. — *Charta Rhabarbari* (HassP.). Paratur ex Infuso Rhei aquoso (Pulv. unc. 1, Spir. Vin. rectif. unc. 6, digesta sec. art. et filtrata).

Rhododendron maximum (*Coxe*) bei chronischen Rheumatismen.

Sagapenum, ut Ammoniacum etc. depuratur.

Salvia. — *Elaeosaccharum* (HassP.) ut elaeosaccharum anisi. — *Aqua de Herbis vulnerariis* (Gal.) Specier. vulnerar. (Gal.) partem unam, Aquae communis decem, destillent partes quatuor.

Senna. Pulv. pectoralis viridis (*Dulk*): Pulv. Folior Senn., Sacch. alb., sing. drachm. 6, Tart. depur. drachm. 2, Sem. Foenic. et Anisi, sing. drachm. 1. — *Pulv. stomachalis Dörflingensis* (*Dulk*): Rad. Inulae, Calami, Pimpin., Zedoar., Liquir. et Zingib., sing. drachm. 2, Caryophyll., Cardam. min., Cass. cinnam., Piment., Anisi, Cumini, Foenic., Petroselin., Aloës, Rhei, sing. drachm. 3, Macid, Nuc. mosch., sing. drachm. 1, Tart. depurat. unc. 1½, Folior. Senn. unc.

2½, Veronic., Centaur. min., Card. bened., Bacc. Junip., sing. scrup. 4, Conchar. praep. drachm. 2, Sacch. albi unc. 10. Pulverata misce sedulo.

Sodium. Linim. ad strumam (RC.): Fell. Tauri rec. unc. 1, Muriat. Sod. unc. ½, solve in Aq. tep. unc. 1, adde Olei Oliv. unc. ½ vel q. s. — *Liq. Natri hydroiodinici* (HassP.) Natri hydr. drachm. 1½, Aq. dest. unc. 1, solutionem filtra. — Reagens. — *Natri muriatici s. Salis communis Liquor* (HassP.) Acidi Salis puri q. libet, saturetur cum Liquore Salis Sodae purissimi, fluidum filtratum vaporatione in crystallos redigatur, quarum pars una in Aq. dest. part. 8 solvatur. — Reagens. — *Natri sulphurici s. Salis mirab. Glaub. Liquor.* (HassP.): Salis depur. drachm. 2, Aq. dest. unc. 1. — Reagens. — *Sal Sodae purissimum* (HassP.): Terra fol. Tart. cryst. in Aq. dest. copia solvitur, solutio Liquoris Barytae acet. et Arg. nitr. dilutioris ope depurata et filtrata ad siccum inspissatur et residuum in crucibulo platineo comburitur, carbo residuus c. Aqua dest. elutriatur et lixivium vaporando et refrigerando in cryst. cogitur, quae siccatae serventur. — Reagens — *Liquor* (HassP.): Salis drachm. 3, Aq. dest. unc. 1. — Reagens. — *Murias Sodae s. Sal commune depuratum, Murias Sodae purus* (An. Bel. Gal. HassP.): Sal venale in Aq. comm. triplo solvitur et liquori fervido instillatur Sal Sodae depuratae in Aqua solutum, donec non amplius turbetur; sedimento sponte posito liquorem per chartam bibulam filtra et crystallisationi subjice. — *Murias Sodae exsiccatus s. siccatum* (Du. *Coxe*). Uritur supra ignem in vase ferreo leviter tecto, donec decrepitare cessaverit. — *Natrum chloratum s. chlorinicum, Chlorum s. Chloretum Natrii* (*Dulk*). Paratur ut Kali muriat. oxygenat., intromittendo Gas Chlori in Solutionem Natri carbonici; in operatione formatur *Natrum muriat. oxygenatum.* — *Sal Thermar. Carolinarum* (Bor4.). Paratur evaporatione Aquae mineralis. Constat e Natro sulph. et carbonico. — *Natrum Succo Citri neutralisatum* ut Citras kalicus parari potest.

Succini Oleum reductum (*Coxe*): Ol. Succini lib. 1, Petrol. lib. 2.

Sulphur. S. iodatum, Iodetum Sulphuris. Massa sublimatione Vaporum Iodi et Sulphuris obtenta. Neuerdings bei chronischen Hautausschlägen (in Salbenform 1 bis 2 Scrupel auf die Unze Fett) besonders psoriaris, lepra vulgaris, favus mit Nutzen angewendet.

Taraxacum. Spec. viscer les pro clysmate Kaempfii (*Dulk*): Herb. Tarax., Rad. Tarax., Valerian, Gramin., Marrub. alb., Chamom. vulg., sing. unc. 1.

Terebinthina. — *Emplast. Thuris comp.* (*Coxe*) Picis Burg. lib. ½, Sang. Drac. unc. 3, Empl. Litharg. lib. 3. — *Linimentum ammoniato - terebinthinatum* (RC.) Ol. Oliv. part. 4, Ol. Terebinth., Aq. font., Ammoniae liq., sing. part. 1. Lähmung, rheum. und Gelenkschmerzen. Interdum additur Solutionis Saponis aequa portio et Tinct. Canth. part. 2. — *Unguent. resinosum* (RC.) 1) Terebinth. part. 7, Coloph., Adip. suill., sing. part. 1. 2) Adip. suill., Coloph., Cerae flav., Ol. Oliv., sing. part. 1. 3) Adip. suill. part. 8., Coloph. part. 5, Cerae flav. part. 2. — *Linim. resinoso - terebinthinatum* (RC.) Ung. resinos., Olei Tereb. sing. part. aeq.

Tormentilla. Extracti Tinctura (RC.) ut Tinct. Kino II. 45.

Vaccae Stercus, Kuhmist; wird bisweilen als Cataplasma von dem gemeinen Manne empirisch gegen Hämorrhoiden angewendet. In der Pharmacie hat man davon die *Aqua Florum omnium* (Wir. *Sp.*) ℞. Vaccae Stercoris recentis et mense Junio collecti partem unam, Aquae partes tres; stercore in sacco linteo incluso, destillatio ita instituatur ut pro libra quaque materiae stercoralis Aquae sesquilibra prodeat. — Aeußerlich als cosmetisches, innerlich als Gichtmittel, bei Kolik, Harnsteinen und Unterdrückung der Urinabsonderung empfohlen.

Valeriana. Pilulae. Rad pulv., Extract. Valerian., sing. drachm. 1, Olei Valer. gutt. 10. F. pil. gr. jj. 5 bis 15 Stück.

Vinum et Vitis. Spir. Vini Gallici (Bor4.). Eine gelbliche, aus Alcohol, Wasser und irgend einem ätherischen Princip bestehende Flüssigkeit, welche durch Destillation aus französischen Weinen und aus den der weinigen Gährung unterworfenen Weintrestern bereitet wird. Spec. Gew. = 0, 940 — 0, 950.

Zincum. Z. *hydraiodicum oxydatum*, *Hydriodas zincicus*. Iodi et Zinci, sing. part. aeq. vel Zinci, 20, 28 et Iodi 76, 52 — *Collyrium Hydriodatis zincici*: Hydriodat. gr. 15, Aq. dest. unc. 6. Von Proutet bei scorphulösen Augenentzündungen empfohlen. — *Unguent. ad strumam*: Hydriodat. drach. 1, Axung. unc. 1. Ein oder zwei Mal täglich einzureiben (Ure). — *Liquor Zinci muriatici s. Muriatis zincici* paratur e Zinco Indico a ferro libero et Acido muriatico concent., addendo acido in vitro amplo contento prioris tantum, donec partunculu postrema, et vase calefacto, non amplius solvitur. Solutio cum Aquae aequali quantitate diluta colatur. Parari potest quoque liquor monitus solutione Zinci chlorici (Butyri Zinci) in Aqua. Aetzmittel, mit 15 Theilen Wasser noch mehr verdünnt, als Waschwasser oder Salbe, als Hautreiz, wodurch ein Ausschlag entsteht, von Papenguth bei hartnäckigen scrofulösen Hohlgeschwüren; Hauke wandte beide Formen, nach Umständen, bei veralteten atonischen, syphil., scrof. und herpet. Geschwüren an.

Register.

(Um nicht durch ein besonderes französisches und englisches Register das Werk zu sehr auszudehnen, sind die Kunstnamen jener fremden Sprachen so genau wie möglich in's Lateinische übertragen worden, Acetate, Chlorure etc. durch Acetas, Chloruretum. Sollte indeß der Raum es gestatten, so werden einige der abweichendsten fremden Kunstnamen am Ende angehängt werden. Das Add. nach II. im Register selbst bezieht sich auf die Nachträge; nur der zweite Band ist mit II. bezeichnet)

A.

Abelmoschus, 1.
Abies balsamea, 1. 2.
— pectinata, 1. 2. II. 618.
— picea, 1.
Abrotanum foemin., 4. II. 514.
— hortense, 4.
— mas, 4.
— montanum, 4 II. 514.
Abrus precatorius, 4.
Absinthium alpinum, 4. 277.
— maritimum, 5.
— Ponticum, 5.
— Romanum, 5.
— vulgare, 5.
Acacia Aegyptiaca, 15.
— Germanica, 15. II. 423.
— Arabica-vera.
— nostras, 15. II. 423. 424.
— Catechu, 442.
— vera, 15.
— vulgaris, II. 423.
Acaciae Gummi, 720.
Acanthium vulgare, 417.
Acanthus mollis, 15.
Acemella, 59.
Acetabularia Mediterranea, 741.
Acetas Aluminae, 141.
— ammoniacalis, 173.
— Ammoniae, 173
— — aquosus, 173.
— — dilutus, 173.
— — liquidus, 173.
— — solutus, 173.
— — — dilutus, 173.
— Barytae, 318.
— calcicus, 368.
— Calcis, 368.
— Calcii Protoxydi, 368.
— Cinchonini, 524.
— Cupri, 592.
— — cum baseos excessu, 592.
— — brutus, 592.
Acetas Cupri crudum, 592.
— — Deutoxydi, 594.
— — imperfectum, 592.
— — mellitus, 582.
— — neutrum, 594.
— cupricus, 594.
— — cum Aqua, 594.
— Ferri alcoholisatus, 659.
— — liquidus 659.
— — Peroxydi, 659.
— — Protoxydi, 659.
— — Tritoxydi 659.
— Hydrargyri, II. 203.
— hydrargyrosus, II. 203.
— Kali, II. 398.
— kalicum, II. 398.
— kalicus II. 398.
— Lixiviae, II. 398.
— — solutus, II. 399.
— Morphei, II. 215
— morphicus, II. 215.
— Morphii, II. 215.
— Morphinae, II. 215.
— natricus, II. 585.
— — cum Aqua, II. 585.
— Oxydi Ferri liquidus, 660.
— Plumbi, II. 339. 346. 347.
— — crystallisatus, II. 347.
— — in cryst. concret. II. 347.
— — acidulus siccus, II. 346.
— — — solutus, II. 346.
— — cum baseos excessu, II. 340.
— — depuratus, II. 347.
— — liquidus, II. 339. 350.
— — — cum Alcohole, II. 342.
— — neutrum, II. 346.
— — Protoxydi, II. 346.
— — solutus, II. 350.
— plumbic. crystallis, II. 346.
— — crudus, II. 339.
— — cum Aqua depurat. II. 347.
Acetas Potassae, II. 398.
— — aquosus, II. 399.
— — liquidas. liquidus, II. 399.
— Protoxydi Calcii, 368.
— — Potassii, II. 398.
— — Sodii, II. 585.
— Sodae, II. 585.
— — crystallisatus, II. 585.
— superplumbicum aquos., II. 339.
— Zinci, II. 694.
— — dilutum, II. 695.
Acetis Ammoniae, 173.
— — liquidus, 173.
— Hydrargyri, II. 203.
— kalicum s. kalicus, II. 398.
— Lixiviae, II. 398.
— Plumbi, II. 339. 346. 347.
— — liquida, II. 339.
— Potassae, II. 398.
— — liquida, II. 399.
— Sodae, II. 585.
— Zinci, II. 694.
Acetosa nostras, 15.
— officinalis, 15.
— pratensis. 15.
— rotundifolia, 15.
Acetosella, 16.
Acetosellae Sal, II. 403.
Acetum, 17.
— acetosum, 17.
— alliatum, 91.
— Allii, 91.
— — compositum, 92.
— antimephiticum, 92.
— antisepticum, 92. 204.
— Armoraciae, II. 439.
— aromatic., 204. II. 20. 118. 478.
— — alliatum, 92.
— Belladonnae, 297.
— benzoardicum, 204. II. 118.
— — Sylvii, 202.
— Calendulae Florum, 376.
— camphoratum, 377.

Acetum Capsici spirituosum,
— Caryophylli, 609.
— chalybeatum, 659.
— Coffeae, 550.
— coffeae extemporan., 550.
— Colchici, 552.
— colchiticum, 552.
— commune, 17.
— concentratum. 20.
— — Westendorfii, 20.
— Convallariae majalis, 568.
— crudum, 17.
— Cyperi longi aromaticum, 601.
— destillat. — A. acet. dilut.
— — concentrat., 20.
— Digitalis saccharat., 614.
— Dracunculi, 277.
— dulcificatum, 63
— per frigus concentrat — Acet. concent.
— gelu concentrat., 17.
— glaciale, 20.
— Hellebori nigri, 741.
— — albi, 741.
— hystericum, 440.
— Lavandulae, II. 58.
— — compositum, II. 59.
— laxans, II. 559.
— laxativum, II. 559.
— Lithargyri, II. 340. 341. 350.
— lithargyrites, II. 341.
— maravillianum, 92.
— martiale, 659.
— medicatum, 204.
— Myrrhae, II. 230.
— Nicotianae, II. 238.
— odoratum, II. 112. 478.
— odoriferum, II. 112.
— opiaceum, II. 247.
— Opii, II. 247.
— Papaveris erratici, II. 308.
— Piperis Jamaicensis, II. 327.
— — longi spirituos. II. 327.
— Plumbi, II. 341.
— — concentrat., II. 340. 341.
— plumbicum, II. 340.
— Primulae veris, II. 422.
— prophyllacticum, 204.
— Pseudo-Narcissi, II. 232.
— purificatum, 17.
— pyrolignos. — Acid. pyrol.
— purum concentrat., 17.
— quatuor latronum, 92. II. 69.
— — — composit., 93.
— radicatum, 10.
— Rhoeados, II. 308.
— Rorismarini, II. 478.
— Rosae, II. 471.
— Rosarum, II. 471.
— — compos., II. 472.
— Rubi Idaei, II. 488.
— rutaceum, II. 491.
— Rutae, 491.
— — camphorat., II. 492.
— — compos., 440.
— Salviae, II. 502.
— Sambuci, II. 509.
— sambucinum, II. 509.
— Saturni, II. 341.
— — concentratum, II. 340.
— saturninum, II. 340. 341.
— Scillae, II. 540.
— Scillites alcoholicum, 541.
— scilliticum, II. 540
— Terebinthinae, 19. II. 627.
— theriacale, II. 5.
— tunicae, 609.
— Veratri, 741.
— Vini, 17.
— — camphorat, 577.
— — concentrat., 17. 19.
— — destillat, 17.
— — glaciale — Acet. concentrat.

Acetum Vini pur. concentr., 17.
— — radicale, 19.
Achillea Ageratum, 692
— atrata. 692.
— Millefolium, II. 208.
— moschata, 692.
— nana, 692.
— Ptarmica, II. 424.
— vulgaris, II. 208.
Achmella, 59.
Achras mammosa, 473.
Acidum Aceti, 17. 20.
— aceticum, 17.
— — aromat., II. 59. 478.
— — aromatico-camphorat., II. Add.
— — concentrat., ſ. Acetum concentr.
— — debile s. dilutum, 17.
— — impurum, 17.
— — odoratum, II. 478.
— — pur., ſ. Acid. acetic.
— — cum Scilla, II. 540.
— — scilliticum, II. 540.
— — tenue, 17.
— — camphoratum, 377.
— — dilutum et vulnerarium, II. 502.
— Acetosellae, 49.
— acetosum, 17.
— — destill. — Acid. acet. dilut.
— — camphorat. — Acid. acet. camphorat.
— acetosum forte, 17.
— aëreum, 27.
— antimonicum, 215. 219.
— arsenicale, 273.
— arsenicosum, 270.
— — liquidum, 270.
— — vitreum, 270.
— Benzoës, 24.
— benzoicum, 24.
— boracicum, 26.
— Boracis, 26.
— borussicum, 34.
— boruss. alcoholic., 36.
— carbonicum, 27.
— carthamicum, 421.
— citricum, 30.
— — concretum, 31.
— cretaceum, 27.
— ellagicum, 678.
— formicicum, 671.
— hydriodicum, II. 8.
— hydro-carbonicum, 49.
— hydrochloricum, 31.
— hydrochloro-nitricum, 258.
— hydrocyanicum, 34.
— — Vauquelini, 35.
— — alcoholic., 36.
— — dilutum, 37.
— — — spirit. aquos., 37.
— — Harlesii, 37.
— — Kelleri, 36.
— hydro-iodicum, II. 8.
— hydro-sulphuratum, 42.
— hydro-sulphuricum, 42.
— hydrothionicum, 42.
— — liquidum, 42.
— iodicum, II. 8.
— kramericum, 442.
— laccicum, II. 47.
— Ligni pyro-oleos., 18.
— Lignorum, 18.
— Limonum, 30.
— muriaticum, 31.
— — alcoholisatum, 34.
— — concentratum, 31.
— — crudum, 31.
— — dephlogist., 509.
— — dilutum, Add.
— — liquid. — Acid. mur.
— — nitroso-oxygenat., 258
— — oxygenat., 509. 510.

Acidum mur. oxygenat. ad contagia, 509.
— Nitri, 45. 46.
— — concentratum, 46.
— — fumans, 46.
— nitrico-muriaticum, 258.
— — nitros. concentrat. 46.
— — — dilutum, 47.
— nitricum, 45.
— — alcoholisatum, 48. 71.
— — aromaticum, 47.
— — crudum, 45.
— — dilutum, 47.
— nitro-muriaticum, 258.
— nitroso-nitricum, 46.
— — oxymuriaticum, 258.
— nitrosum, 46. 47. et Add.
— — alcoholic., 71.
— — dilutum, 47.
— — liquidum, 46.
— oxalicum, 49.
— oxymuriaticum, 509. 510.
— Phosphori, 49.
— — fusum s. glaciale, 50.
— phosphoricum, 49.
— — depuratum, 50.
— — purum, 50.
— phosphorosum, 52.
— prussicum, 34.
— — medicinale, 35.
— pyroligneosum s. pyroligneosum crudum, 18.
— pyrolign. rectif., 19.
— pyrotartaric., II. Add.
— rheumicum, II. 447.
— ricinicum, II. 463.
— sabadillicum, II. 493.
— Sacchari, 49.
— saccharinum, 49.
— Salis culinaris, 31.
— — dephlogist. — Acid. murist. oxygen.
— — marini, 31.
— — oxygenat., 509. 510.
— sorbicum, II. 588.
— stearo-ricinicum, II. 463.
— stibiosum et stibicum, 215.
— Succini, 52.
— succinicum, 52.
— — crudum, 52.
— — depuratum, 52.
— sulphuricum, 52.
— — alcoholic. — Elixir acid. Hall.
— — alcoholisat., 55.
— — aquosum, 53.
— — aromat., 395.
— — concentrat., 53.
— — — rectif., 53.
— — crud. s. venale, 52.
— — dephlogisticat. s. depuratum s. defaecatum, 53.
— — dilutum, 53.
— — purum, 53.
— — purissimum, 53.
— — rectificatum, 53.
— — tenue, 53.
— Sulphuris volatile, 56.
— sulphurosum, 56.
— — aethereum, 76.
— Tartari, 57.
— — crystallis., 57.
— tartaricum, 57.
— tartarosum, 57.
— uricum, 59.
— Vitrioli, 53.
— — c. Alcoh. arom., 395.
— — alcoholisat, 55.
— — aromatic., 395.
— — defaecat., 53.
— — dephlogisticat., 53.
— — depuratum, 53.
— — dilutum, 53.
— — purissimum, 53.
— — rectificatum, 53.

Acidum Vitrioli vinosum, 65.
— vitriolicum, 52.
— — vinosum, 65.
— zooticum, 34.
— zootinicum, 34.
Acipenser Huso, 680.
— Ruthenus, 680.
— stellatus, 680.
— Sturio, 680.
Acmella, 59.
Aconita, 60.
Aconitinum, 60.
Aconitum, 60.
— Anthora, 60.
— Cammarum, 60.
— elatum, 60.
— Meyeri, 60.
— Napellus, 60.
— neomontanum, 60.
— Neubergense, 60.
— racemosum, 62.
— Stoerkeanum, 60.
— strictum, 60.
— tauricum, 60.
— variegatum, 60.
— vulgare, 60.
Acor aceticus crystallin., 20.
— benzoicus, 24.
— boracicus, 26.
— succineus, 52.
— Sulphuris condensat., 53.
— — merus, 53.
— tartaricus, 67.
Acorus adulterinus, II. 18.
— Calamus, 348.
— palustris, II. 18.
— vulgaris, II. 18.
Actaea, 62.
— racemosa, 62.
— spicata, 62.
Acus Veneris, 623.
Adeps, 62., s. Axungia s. Sevum.
— Coturnicis, 63.
— Nitrate Hydrargyri medicatus, II. 197
— Ovis Arietis — Sevum Ovillum.
— Pavonis, 64.
— Subcarbonatis Plumbi medicatus — Unguent. Cerussae.
— Tart. stibiati medicat., 243.
— suilla s. suillus, 63.
— Suis Scrofae purificata, 63.
— Vulpis, 63.
Adhatoda, 64.
Adiantum, 64. 65.
— album, 64. 393.
— aureum, II. 368.
— Canadense, 65.
— Capillus Veneris, 65.
— fragile, 65.
— melanocaulon, 65.
— nigrum, 65.
— pedatum, 65.
— rubrum, 65.
— trapeziforme, 65.
— villosum, 65.
Adipocera cetosa, 453.
Admella, 59.
Aegagropilus, 369.
Aër dephlogisticatus, II. 300.
— fixus, 27
— hepaticus — Gas hepaticum.
— inflammabilis — Gas Hydrogenium.
— mephiticus, 27.
— purus, II. 300.
— vitalis, II. 300.
Aeris Flores, 594.
Aerugo, 592.
— Aeris, 594.
— crystallisata, 594.
— praeparata, 592.
Aes ustum, 583. II. 333. 334.
— viride crystallisatum, 594.
Aeschynomene, 66.
— aspera, 66.
Aesculus, 66.
— Hippocastanum, 66.
Aether aceticus, 68.
— — alcoholicus, 75.
— — alcoholisatus, 69. 75.
— — ammoniacalis, 151.
— — antiodontalgicus, 377.
— — ferrat. Klaproth., 660.
— — martialis, 660.
— alcoholisatus muriatic., 70.
— — nitricus, 73.
— — cum Cantharide, 404.
— cupricus, 590.
— cyprіacus, 590.
— hydrochloricus, 70.
— — alcoholisatus, 71.
— iodinicus, II. 8.
— iodouratus, II. 8.
— martialis, 655.
— mercurialis, II. 180.
— muriaticus, 70.
— — alcoholicus, 70.
— — spurius, 71.
— nitricus, 71. 73.
— — alcoholisatus s. alcoholicus, 73.
— nitrosus, 71.
— oleo-sulphurosus, 76.
— phosphoratus, II. 320.
— phosphoricus, 74.
— phosphoro-phosphoricus, II. 320.
— spiritnosus, 75.
— sulphurico-ferrat., 655.
— — nitricus, 72.
— sulphuricus, 74.
— — acidus, 56.
— — alcalis. Digit. — Tinct. Digit. aetherea.
— — cum Alcohole, 75.
— — — aromat., 395.
— — alcoholicus, 76.
— — alcoholisato-camphoratus, 375.
— — alcoholisatus, 75.
— — camphorat. aquosus, 375.
— — ferratus, 655.
— — oxydul.-ferrar., 655.
— — phosphoratus, II. 320.
— — rectificatus, 75.
— terebinthinatus, II. 627.
— Vitrioli aquosus, 76.
— vitriolicus, 74.
— Zinci, II. 684.
Aethereoleum Absinthii, 5.
— Anethi, 197.
— Angelicae, 199.
— Anisi, 209.
— Anthos, II. 479.
— Artemisiae, 275.
— Aurantii, 527.
— Basilici, 319.
— Buxi, 345.
— Calami, 349.
— Cardamomi, 417.
— Carvi, 422.
— Cascarillae, 427.
— Caryophyllor. arom., 425.
— Cassiae cinnamomeae, 384.
— de Cedro, 537.
— Cerefolii, 457.
— Chaerophylli, 457.
— Chamaemeli, 460.
— Chamomillae, 460.
— Chenopod. anthelmint., 470.
— Cinnamomi, 584.
— Citri, 537.
— Coriandri, 569.
— Cubebarum, 579.
— Cumini, 581.
— Dictamni, II. 296.
— Hyperici, 757.
Aethereoleum Foeniculi, 195.
— Galbani, 337.
— — compositum, 337.
— Hyssopi, 762.
— Juniperi Baccarum, II. 40.
— — Ligni, II. 40.
— Lavandulae, II. 59.
— Ligni Rhodii, II. 71.
— Limonum, 537.
— Macidis, II. 324.
— Majoranae, II. 296
— Meliloti Florum, II. 106.
— Melissae, II. 109.
— Menthae, II. 117.
— Millefolii, II. 209.
— Monardae, II. 213.
— Nucistae, II. 224.
— Origani, II. 296.
— Petroselini, 257.
— Peucedani, II. 317.
— Pimentae, II. 327.
— Piperis Jamaicensis, II. 327.
— Pulegii, II. 425.
— Rorismarini, II. 479.
— Rosarum, II. 472.
— Rutae, II. 492.
— Sabinae, II. 41.
— Salviae, II. 502.
— Santali citrini, II. 513.
— — albi, II. 513.
— Sassafras, II. 525.
— Saturejae, II. 526.
— Serpylli, II. 649.
— Succini, II 598.
— Tanaceti, II. 614.
— Terebinthinae, II. 627.
— Thymi, II. 649.
— Valerianae, II. 670.
— Zedoariae, II. 683.
— Zingiberis, II. 697.
Aethiops alcalisatus, II. 127.
— antimonialis, II. 140
— — Huxhami, II. 140
— auripigmentalis, II. 135.
— graphiticus, II. 136
— martialis, 638.
— mineralis, II. 136. 151.
— — Harrisii, II. 138
— — oxydulatus, II. 138.
— — praecipitatus, II. 151.
— — triturat. duplus, II. 138.
— narcoticus, II. 138.
— saccharatus, II. 126.
— vegetabilis, 412. II. 247.
Aethusa Cynapium, 513.
Aetites, 641.
Agaricum, Boletus Laricis, 78.
Agaricus, 78.
— albus s. albus praeparatus, 78.
— chirurgorum, 78.
— mineralis, 357.
— muscarius, 142.
— quernus, 78.
— — praeparatus, 78.
— trochiscatus, 78.
Agathophyllum, 79.
— aromaticum, 79.
Agava, 79.
Agave, 79.
— Americana, 79.
Ageratum, 692
Agnus castus, 79.
Agresta, II. 680.
Agrimonia, 79.
— Eupatoria, 79.
Ajuga, 80.
— Genevensis, 80.
— pyramidalis, 80.
— reptans, 80.
Alabastrites, 366.
Alabastrum, 366.
Alamum, 278.
Albedo Corticum Citri, 525.
Album Argenti, II. 336.

Album Cerussae, II. 336.
— Ceti, 453.
— graecum, 364.
— de Krems, II. 336.
— Plumbi, II. 336.
Albumen aluminos., 139. II. 300.
— Ovi, II. Add.
Alcahest Glauberi, II. 380.
— ammoniacale, 159.
Alcali ammoniacale spirit., 148.
— Ammoniacum acetat., 173.
— — caust., 144.
— — fluid., 144.
— — spirituos., 148.
— — succinat., 179.
— causticum, II. 371.
— fixum tartarisat., II. 404.
— — vegetabile impurum, II. 377.
— Lignorum depurat., II. 378.
— minerale, II. 577.
— — acetatum, II. 585.
— — crudum, II. 577.
— — crystall., II. 577.
— — depurat., II 577.
— — fixum, II. 577.
— — perfecte saturatum, II. 579.
— — phosphorat., II. 582.
— — sulphuric., II. 583.
— — tartarisat., II. 412.
— — vitriolat., II. 583
— phlogisticatum, 38.
— Tartari, II. 378.
— — Aceto saturatum, II. 398
— vegetabile aërat., II. 377. 378.
— — — crud., II. 377
— — c. Aceto, II. 398.
— — caust. — Alc. caust.
— — crystallisat., II. 384.
— — perfecte saturatum, II. 384
— — salito-dephlogisticatum, II. 397.
— — tartarisatum, II. 404.
— — vitriolatum, II. 385.
— volatile acetatum, 173.
— — aëratum, 159.
— — ammoniacale, 159.
— — anisatum, 149.
— — aquosum, 161.
— — causticum, 144.
— — concretum, 159.
— — crudum, 159.
— — depuratum, 159.
— — fluor, 144.
— — nitratum, 169
— — purum, 144.
— — exSaleAmmoniaco, 159
— — siccum, 159.
— — tartarisat., II. 413.
Alcanna, 192.
— orientalis, II. 62.
— spuria, 192.
— vera, II. 62.
Alcea, 80.
— aegyptiaca, 1.
— rosea, — Althaea rosea.
Alces ungula, 682.
Alchemilla, 81.
— major, 81.
— vulgaris, 81.
Alchornea latifolia, 88.
Alcis cornu, 364.
Alcohol, 81. 85.
— Absinthii — Tinct. Abs.
— absolutum, 81. 83. 84. 85.
— Aceti, 20.
— aethereum ferrat., 655.
— cum Albumine, II. 299.
— — albuminosum, II. 299.
— alcalisatum, 83. II 373.
— cum Aloë perfoliata, 96.
— aluminosum, II. 299.
— ammoniacale, 148.
Alcohol ammoniacale camphorat., 150.
— ammoniacat aromatis., 151.
— Ammoniae anisatum, 149.
— — et Guajaci, 712.
— ammoniat., 148.
— — foetidum, 286.
— — anisat, 149.
— — aromatic., 151.
— — aromatisat., 151.
— — cum Guajaco, 712.
— Angelicae composit., 199.
— Anisi, 210.
— — composit., 210.
— Anthos composit., II. 484.
— antedontalgicum, 377.
— cum Aromatibus compositum, 393.
— — — sulphuricat., 395.
— aromaticum, 3-8 393. II. 57.
— — ammoniat., 151.
— — sulphuric., 395.
— aromatisat. Colonienſe, 538.
— Asae foet. etc., ſ. Essentia oder Tinctura.
— c. Asa foetida et Opio, 287.
— cum Aurantio, 534.
— Aurantior. Cortic., 534.
— balsamicum, 758.
— c. Balsamo Peruviano, 308.
— — Benzoate Ammoniae, II. 259.
— Brucini, 334.
— Camphorae saponaceum, II. 418.
— — nitricatum, 377.
— camphoratum, 376.
— — crocatum, 376.
— cum China compos. Huxhami, 503.
— castoreatum, 436.
— Chinae comp. — Elix. rob. Whytt.
— Cinnamomi, 387.
— Citri compositum, 538.
— cum Coccionella compositum, 394. II. 671
— c. Cochlearia et Lacca, 549.
— Cochleariae destill. — Spir. Cochl.
— commune, 84.
— concentratiss., 85.
— concentratum, 85.
— crocatum, 376.
— c. Crotone Cascarilla, 428.
— depuratum — Spir. Vini rectificat. u. rectificatiss.
— cum Deutoiodureto Mercurii, II. 188.
— dilutius, 82.
— dilutum, 83. 86.
— — amarum, II. Add.
— — antiscorbut., II. Add.
— ferratum, 654.
— Formicarum destillat., 671.
— fortius, 82.
— cum Guajaco offic. ammoniat., 712.
— Helenii — Tinct. Hel.
— — compositum, II. 484.
— Iodi, II. 7.
— Iodii, II. 7.
— Juniperi compos., II. 42.
— cum Lacca, II. 48.
— — Lavandula comp., II. 60.
— Lavandulae — Spir. Lav.
— Melissae comp., II. 110.
— Muriatis Oxyduli Ferri — Tinct. Ferri ammon.
— nitricatus Camphorae, 377.
— nitrico-aethereum, 71.
— nitricum aethereum, 71.
— odontalgicum. 377.
— opiatum, II. 253.
— Opii dilutum, II. 256.
Alcohol cum Opio, II. 253.
— — — aromaticum II. 256.
— phosphoratum, II. 320.
— polyaromaticum, II. 50
— Potassae, II. 373.
— purissimus — Alc. absolut
— cum Ratanhia acetatus, 44
— rectificatissimus, 85.
— rectificatus, 85.
— cum Rheo, 458.
— — Resinis balsamicis, 321
— Rorismarini comp., II. 48
— Salviae vulnerarius, II. 50
— saponatum, II. 417.
— Serpylli compositus., 152.
— cum Succino, II. 697.
— — Sulphate Ferri tartarisatum, 666.
— sulphuricatum, 55.
— sulphurico-aethereum, 75.
— — — Ferri, 65
— sulphuricum aether., 75
— — cum Ferro, 655.
— sulphuricus, 55.
— — acidus — Elix. acid. Hall.
— Sulphuris, II. 600.
— supercarbonatum, 376.
— cum Tartrate Potassae ferratum, 665.
— Terebinthinae, II. 627.
— terebinthinatum compos., II. 628
— Thymi, II. 649.
— venale, 81.
— Vini, 84. 85.
— — alcoholisatus, 85.
— — rectificatissimus, 83.
— — — communis, 84.
— — rectificatus, 85.
— Vitae saponaceum. II. 418.
Alcool camphoratus — Alcohol camph.
Alcoolatum de Cochlearia, Lavandula, Melissa comp., Rosmarino, ſ. Spir. Cochlear. etc.
Alcornoco, 88.
Aletris farinosa, 88.
Alexiterium aceticum, 21.
— ammoniacale, 160.
— chloricum, 509.
— nitricum, 47.
— nitro-muriaticum, 258.
Alimentatio antiscorbutica, 482.
Alisma Plantago, II. 332.
Alkali, ſ. Alcali.
Alizarinum, II. 486.
Alkanna, 192.
Alkekengi, 88.
Alkermes liquidum, 394. II. 671.
Alleluja, 16.
Alliaria, 89.
Allium, 89.
— alpinum, 93.
— Ascalonicum, 89.
— Cepa, 89.
— montan. latifol., 93.
— Porrum, 90.
— sativum, 90.
— Scorodoprasum, 93.
— victoriale, 93.
Alnus glutinosa.
— nigra baccifera, II. 444.
Aloë, 93.
— Barbadensis, 93.
— caballina, 94.
— Capensis, 93.
— depurata, 94.
— hepatica, 93.
— insuccata, 94.
— linguaeformis, 94.
— lota, 94.
— lucida, 93.

Aloë pellucida, 93.
— perfoliata, 93.
— praeparata, 94.
— purificata, 94.
— rosata, 94.
— Socotrina, 93.
— Socoterina, 93.
— Socotorina, 93.
— spicata, 94.
— Succotrina, 93.
— violata, 94.
— vulgaris, 94.
Aloysia, II. 673.
Alpinia Cardamomum — Cardam. min.
— Galanga, 676.
Alsine, 118.
— media, 118.
Althaea, 118.
— officinalis, 118.
Altingia rosea, II. 96.
— coerulea et excelsa — Liquidambar styraciflua.
Altix, 290.
Alumen, 134.
— calcinatum, 134.
— crudum, 134.
— draconisatum, 135.
— exsiccatum, 134.
— igne exsiccatum, 134.
— kinosatum, 136.
— plumosum, 144.
— a Rocca, 134.
— rupei, 134.
— rupeum, 134.
— saccharinum, 136.
— scissile, 366.
— tinctum, 135.
— — Mynsichti, 135.
— ustum, 134.
Alumina, 131.
Aluminum, 131.
Alveolaria lamellifera, 357.
— corticifera, 357.
Amalgama Stanni, II. 591.
Amanita, 142.
— muscaria, 142.
Amara dulcis, 618.
Amaranthus luteus, II. 593.
Amaryllis Zeylanica, II. 531.
Ambarum cinereitium, 142.
Ambarvalis, 609. II. 365.
Amblutum, 609.
Ambra, 142.
— ambrosiaca, 142.
— flava, II. 596.
— grisea, 142.
— liquida, II. 595.
— vera, 142.
Ambutus, 524.
Amianthus, 144.
Amidon, 189.
Ammi, 144.
— Creticum, 144
— verum, 144.
Ammonia, 144.
— caustica, 144.
— — liquida, 144.
— liquida, 144.
— muriatica, 169.
— praeparata, 159.
— pura, 144.
— — liquida, 144.
Ammoniaca alcoholisata, 148.
Ammoniacum, 141.
— causticum, 144.
— depuratum, 719.
— Gummi, 718.
— liquidum, 144.
— Sal depuratum — Amm. mur. depur.
— succinatum, 158.
— volatile mite, 159.
Ammoniae Phosphas etc. s. Ph. Ammon.
Ammonium carbonicum, 189.
— — crudum, 159.
— — depurat., 159.
— — pyro-oleos., 162.
— citratum, 181.
— hydrosulphurat. liqd., 172.
— hydrothionic. liquid., 172.
— muriaticum, 169.
— — crudum, 169.
— — depurat., II. 169.
— — ferruginosum, 657.
— — martiale, 657.
— — martiatum, 657.
— oxalicum, 178.
— subcarbonicum, 159.
— — pyro-oleos., 162.
— sulphuricum, 169.
— tartaricum, II. 413.
Ammoniuretum Cupri, 584. 588. 589.
— — compos., 588.
— Hydrargyri, II. 189.
— Mercurii, II. 189.
— Zinci, II. 690.
Amomum, II. 326.
— Cardamomum — Matonia.
— Curcuma — Curcuma.
— Galanga — Alpinia Galng.
— Granum Paradisi, 706.
— latifolium — A. Zedoaria
— maximum, 706.
— racemosum, 416.
— repens, 416.
— Zedoaria, II. 682.
— Zerumbeth, 431.
— Zingiber, II. 695.
Amoracum, II. 295.
Amygdalae, 182.
— amarae, 182.
— dulces, 182.
— excorticatae, 182.
Amygdalus, 181.
— communis, 181.
— nana, 181.
Amylum, 189.
— Solani tuberosi, II. 587.
— Hordei, 745.
— Marantae - Arrowroot
Amyris, 191. 319.
— elemifera, 620.
— Gileadensis, 307.
— Kataf, II. 225. 244.
— Opobalsamum, 191. 307.
Anacardium longifolium, 191.
— orientale, 191.
Anacyclus officinar. u. Pyrethrum — Anthemis Pyrethr.
Anagallis aquatica, II. 673.
— mas, 192.
— phoenicea, 192.
Anatron, II. 387.
Anchusa, 192.
— officinalis, 192.
— tinctoria, 192.
Andromeda mariana, II. Add.
Andropogon Nardus, II. 233.
— Schoenanthus, 193.
Androsaemum, 767.
Anemone, 193.
— nemorosa, 193.
— pratensis, 193.
— Pulsatilla, 193.
Anemoneum, 194.
Anemoninum, 194.
Anethum, 195.
— Foeniculum, 195.
— graveolens, 197.
— hortense, 197.
— ursinum, II. 207.
Angelica, 198.
— Archangelica, 198.
— hortensis, 198.
— sativa, 198.
— sylvestris, 198.
Anguis odoratus, 357.
Anguillae hepar, 682.
Anguria, 579.
Angustura, 346.
— ferruginea, 206.
— spuria s. venenosa, 206.
— vera, 206.
Anima Rhabarbari, II. 451. 452.
— Rhei, II. 451. 454.
Anime, 726.
Anisum, 207.
— Sinense, 211.
— stellatum, 211.
— vulgare, 207.
Anodynum specif. Paracelsi — Guttae nigrae.
Anserina, II. 421.
Antennaria dioica, 211.
Anthemis Cotula, 458.
— nobilis, 458.
— Pyrethrum, II. 428.
— tinctoria, 344.
Anthophylli, 424.
Anthora, 60.
Anthos, 477.
— sylvestris, II. 62.
Antidotus mithridatica Damocratis, II. 275.
Antihecticum Poterii, 592.
Antimonii minera, 221.
— Murias, 235.
— Oxydum, 214.
— — vitrificat., 214.
— Sulphuretum praecip. 221.
— Tartris, 236.
— Vitrum hyacinthin., 214.
Antimonium, 211.
— calcinat. cum Nitro, 219.
— catharticum Wilsoni, 214.
— chloratum liquidum, 235.
— crudum, 221.
— — praeparatum, 221.
— diaphoreticum ablut., 215.
— — Keupii, 215.
— — lotum, 214.
— — martiale, 215.
— — nitratum, 219.
— — non ablut., 219. 220.
— — rubrum, 212.
— muriaticum, 235.
— nativum, 221.
— salitum, 235.
— sulphuretum, 221.
— tartarisatum, 236.
— tartarizatum, 236.
— ustum cum Nitro, 219.
— vitrificatum, 214.
Antiquartium, II. 145.
Antirrhinum, 248. II. 73.
— Linaria, II. 73.
— majus, 248.
Antophylli, 424.
Aparine, 677.
Apatites, 363.
Apis mellifica, 248.
Apium, 254.
— graveolens, 254.
— montanum, II. 547.
— petraeum, 336.
— Petroselinum, 254.
— saxatile, 336.
Apochylisma Berberum, 326.
Apocynum androsaemifol., 258.
Apozema aperitiv. ferrat., 256.
— diureticum, 90. s. üb. Decoctum.
Apri dentes, 364.
Aqua Absinthii, 5.
— — composita, 6.
— Acaciae Florum, II. 424.
— Acetatis s. Acetitis Ammoniae, 173.
— — superplumbici, II. 342.
— Acetosae, 16.
— Acetosellae e Succo, 16.
— Acidi carbonici, 27.

Aqua Acidi carbonici camphorata, 378.
— — nitrici diluti, II. Add.
— — sulphur dil., II. Add.
— acidula hydrosulphurosa 45.
— acidulata, 27.
— — c. Acido carbon., 27.
— acustica, 107.
— — Ludovici, II. 669.
— adstringens, II. 692.
— aerata, 27.
— — alcalina, II. 384.
— Aëris fixi, 27.
— aetherea camphorata, 375.
— Agrimoniae, 80.
— alcalinae gasosa, II. 580.
— — oxymuriatica. II. 397.
— alexiteria acetica, 199.
— — simplex, 199.
— — spirituosa, 199.
— aloëtica mercur., II. 145.
— d'Alibour, II. 693.
— Aluminis vitriolata, 140.
— aluminosa, 138. II. 692.
— — Bateana, II. 692.
— — Batiana, II. 692.
— — Fallopii, 138.
— amara. II. 94.
— Ammoniae, 144. 161.
— — acetatae, 173.
— — Acetatis, 173.
— — cansticae, 144.
— — Carbonatis, 161.
— — diluta, 147.
— — purae, 144.
— Amygdalar. amar., 41.
— — — concent., 41.
— Anemones, 195.
— Anethi, 198.
— Angelicae, 199.
— Angelica Viennens., II. 100.
— Anthaltina. II. 629.
— Anisi, 209.
— anodyna, 160.
— Anthemidis, 460.
— Anthos, II. 483.
— — spirituosa, II. 483.
— — compos., II. 484.
— antiarthritica, 34.
— antiasthmatica, II. 3.
— antiherpet. Cardinalis de Lugnes, II. 186.
— antihysterica Quercetani reformata.
— antimelancholica, 674.
— antimiasmatica, 501.
— — composita, 501.
— — Koechlini, 500.
— antinephritica, II. 578.
— antiophthalmica, II. 694.
— antipsorica, II. 575. 230.
— antiscorbutica, 547.
— apoplectica, II. 484.
— Aquisgranensis artific., 45.
— aromatica, 388. II. 110. 505.
— — compos. cum Acido acet., II. 644.
— — Olei Citri comp., 538.
— — cum Opio, II. 251.
— — spirituosa, II. 223.
— d'Armagnac, 393.
— Armoraciae, II. 438.
— Artemisiae, 275.
— artificialis Baregiens., 45.
— — Bonnensis, 45.
— Asae foetidae, 285.
— — — composita, 286.
— Atriplicis foetidae, 470.
— Aurantii Florum, 527.
— — Foliorum, 527.
— — s. Aurantior. Cort. 527.
— — — alcoholica, 528.
— — — spirituosa, 528.
— — — vinosa, 528.
— Barytae, 317.
— barytica, 315.
— Beccabungae, II. 674.
— Bellilucana, II. 577.
— benedicta, II. 525.
— — composita, II. 25.
— — Rulandi, 239.
— — Serpylli, II. 660.
— benzoica, 321.
— Betulae artificialis, 86.
— Bonfermii, 393.
— Boraginis, 332.
— Borvonensis, II. 677.
— ad botium, 415.
— Bryoniae albae comp. 436.
— Buglossi, 192.
— Calami, 340.
— Calcariae. 352.
— — acidula, 363.
— — cum China, 353.
— — prima et secunda, 352.
— — sulphurato-stib., 234.
— — ustae, 352
— Calcis. 352.
— — cum Cera, 154.
— — cerata, 254.
— — cum China, 353. 490.
— — composita, II. 525.
— — potassata, 352.
— — vivae, 352.
— — vulneraria, II. 333.
— Camphorae, 372.
— camphorata Bateana, 586.
— Caponis, 683.
— Carbonatis Ammon., 161.
— — Calcis acidula, 363.
— — Potassae acidula, 354.
— cum Carbonate Potassae acidula, II. 384.
— — Sodae acidula, II. 580.
— carbonica, 27.
— — Ferri acidula, 647.
— Carbunculi s. contra carbunc., 390
— del carcer. di Rom., II. 644.
— cardiaca, II. Add.
— Cardui benedicti, 480.
— Carmelitana, II. 110.
— Carmelitarum. II. 110.
— carminativa, 529. 570.
— — simplex, 461.
— carminativa spirituos., 461.
— Carvi, 423.
— Cascarillae, 426.
— Caryophyllor. arom., 425.
— Cassiae lignene simpl., 380
— — — sine vino, 380.
— — — spirituosa, 387.
— — — vinosa, 387.
— Castorei vinosa. 434.
— catapultarum, II. 503.
— catarrhalis, 389.
— cathaeret. Plenckii, II. 187.
— caustica, II. 187.
— — ad condylomata, II. 190. 201.
— Centaurii minoris, 448.
— cephalica — Aq. aromat.
— — Caroli Quinti, 389.
— Cerasorum. 40.
— — nigror., 40.
— — — alcoholica, 40.
— Cerefolii, 457.
— chalybeata, II. 647.
— Chamaemeli, 460.
— Chamomillae, 450.
— — anisata, 462.
— — Florum vinosa, 461.
— Chelidonii, 468.
— Cichorii, 513.
— Cicutae, 517.
— Cinnamomi buglossat., 387.
— — cordialis. 386.
— — cydoniata, 388.
— — hordeata, 386.
— — simplex, 386.
Aqua Cinnam. sine Vino, 386.
— — spirituosa, 387.
— — vinosa, 387.
— Citreorum Corticum, 537.
— Citri s. Citri Aurantii, 527.
— — Aurantii Florum, 527.
— — medicae, 537.
— — totius, 538.
— Cochleariae, 547.
— coelestis, 591. 595.
— coerulea, 691.
— Coloniensis, 538.
— communis, 680.
— confortativa, 41. 387.
— Convallariae, 568.
— — vinosa, 568.
— cordialis Colladeni, 640.
— — frigida, 387.
— — temporaus s. temperata Saxonica, 389.
— Coriandri, 670.
— Cornu Cervi citrata, 686.
— Cortic. Aurant. — Aq. Aurant. Cort.
— cosmetica, 42. 185. 321. 631. II. 582. 145. 631.
— Cupri ammoniacl., 591. 595.
— — ammoniati. 591.
— — ammon.-muriat., 591.
— — vitriolati comp., 587.
— Cyani, 597.
— Cydoniorum, 599.
— dentifricia, II. 112.
— destillata, 680.
— Diatrion, II. Add.
— diuretica, II 438.
— — camphorata, II. 394.
— — ex nucleis, 42.
— divina Fernelii, II. 177.
— — mirabilis, 538.
— „Eau de javelle" dicta, II. 575.
— Ebuli, II. 511.
— embryonum, II. 505.
— emetica, 240. II. 439.
— Enulae, II. 3.
— epidemica Londinens., 201.
— epileptica Langii, 568.
— Euphrasiae, 628.
— exsiccans, II. 342.
— Falconeri. II. 384.
— Farfarae, 630.
— ferrata. 644.
— Ferri aërata, 647.
— ferruginosa, 669.
— — cum Gummi, 650.
— — salina, 647.
— ferruginoso-gumm., 650.
— Florum Aurantiorum. 527.
— — omnium, II. Add.
— Foeniculi, 196.
— foetida, 285. 337.
— — antihysterica, 285.
— — Pragensis, 285.
— fortis. 47.
— Fragariae, 672.
— Fragorum, 672.
— fruct. Myrti Pimentae — Aq. Pimentae.
— Fumariae, 675.
— ad gangraenam, II. 195.
— gelatinosa, 685.
— ad gingivas, 139.
— contra gonorrh., II. 630.
— Goulardi, II. 342.
— Graminis, 704.
— grisea, II. 196.
— — Gohlii, II. 196.
— gummosa, 728.
— Helenii, II. 3.
— contra hemicraniam, 150.
— hepatica, 42.
— — acidulata, 43.
— Hirundin. c. Castoreo, 434.
— — simplex, 166.

Aqua hordeata c. Gummi, 746.
— Hordei, 746.
— Hungarica, II. 484.
— Hydrarg. mur. corros. c. Opio, II. 186.
— — — mitis nigra, II. 143.
— hydrocyanica vegetab., 42.
— hydrosulphurata, 42.
— — acidula, 43.
— hydrosulphurica acida, 43.
— — acidula, 43.
— hydrothionica, 42.
— Hyssopi, 762.
— hysterica, 434. 438. 462.
— immortalis, 570.
— Jugland. Nucum, II. 34.
— Juniperi, II. 41.
— Kali, II. 380.
— caust. — Liq. Potass.
— puri II. 370.
— sulphurati, II. 376.
— Sulphureti, II. 375.
— kalino-aetherea, II. 381.
— Lactucae sativae, II. 50.
— Lauri Cassiae — Aq. Cass.
— Laurocerasi, 39.
— cum Belladonna, 297.
— Lavandulae, II. 59.
— laxativa, II. 100. 410. 562.
— — Viennensis, II. 562.
— Ligni Rhodii, II. 71.
— Ligustri, II. 72.
— Liliorum, II. 72.
— Convallium, 568.
— — vinosa, 568.
— Limonum, 537.
— — totorum, 538.
— Lithargyrii Acetatis, II. 339.
— acetati, II. 339.
— compos., II. 318.
— lithontriptica, II. 384.
— Looch sani et experti, 387.
— Luciae, 158.
— Lupuli, II. 86.
— Mad. Lavrillière, 649.
— magnanimitatis, 671.
— — simplex, 671.
— Magnesiae, II. 91.
— Majoranae, II. 296.
— Malvae, II. 97.
— marinas. mar. artif., II. 576.
— Marrubii, II. 103.
— martialis, 669.
— mastichina, II. 104.
— Matricariae, II. 105.
— medicinalis Hussoni, 551.
— Melissae, II. 109.
— antihysterica, II. 110.
— composita, II. 110.
— spirituosa, II. 110.
— — compos., II. 110.
— Mellis Andernaci, 249.
— — odorata regia, 570.
— Menthae alcohol., II. 119.
— — composita, II. 120.
— — crispae, II. 118.
— — piperitae, II. 119.
— — Pulegii — Aq. Puleg.
— — spirituosa, II. 119.
— — vinosa, II. 119.
— — viridis, II. 119.
— mephritica alcalina, II. 384.
— mercurialis, II. 185. 187. 195. 198. 201.
— — bals. Plenkii, II. 172.
— — comp., II. 200.
— — nigra, II. 143.
— — simplex, II. 123.
— — salina, II. 195.
— mercurista, II. 201.
— Mercurii alumin., II. 182.
— — vivi cocta, II. 123.
— — vitriolati, II. 182.
— Millefolii, II. 209.
Aqua mineralis, II. 584.
— — acidulata, II. 576.
— — cathartica, II. 93.
— — ferrata, 647.
— — sulphurata, II. 576.
— miraculosa, 587.
— mulsa, 249.
— muriatico-mercurialis rubra, II. 144.
— Muriatis Calcis, 367.
— — Ferri, 654.
— — — composita, 654.
— Myrrhae, II. 231.,
— Naphae, 527.
— — Florum, 527.
— Nasturtii aquat., II. 234.
— Neapolitana, 45.
— nephritica, II. 578.
— nigra, II. 143.
— Nucum Jugland., II. 34.
— Nymphaeae, II. 242.
— odorifera, II. 62.
— ad oculos d'Yvel, II. 693.
— Ononidis, II. 245.
— ophthalmica, 170. 587. II. 339. 341. 350. 686. 691. 692. 693.
— — adstringens, 138. II. 692.
— — alba Danica, II. 694.
— — aluminosa, 138.
— — caerulea, 691. 695.
— — communis 139.
— — Conradi, II. 185.
— — mercurial., II. 177. 178.
— — Ohdelii, II. 693.
— — resolvens, 246. II. 373.
— — usualis, II. 686.
— — vitriolica, II. 691.
— — e Vitriol. Zinci, II. 691.
— Opii, II. 246.
— Origani, II. 296.
— Oryzae, II. 298.
— Oxycarbonat. aciduli Potassae, II. 384.
— oxygenata, 47. 510. II. 300.
— oxygeno-muriatica, 510.
— oxymuriatica, 510.
— — Chlori, 510.
— Paeoniae, II. 301.
— Panis, II. 306.
— Papaveris erratici, II. 307.
— paralyseos, II. 422.
— Parietariae, II. 313.
— perlata, 41.
— pestilentialis, 376.
— petalor. Rosae — Aq. Rosar.
— Petroselini, 257.
— phagedaenica, II. 144. 145. 177. 200.
— — alba, II. 201
— — — comp., II. 201.
— — comp., II. 178.
— — Grindelii, II. 180.
— — Pideritii, II. 176.
— physagoga, 210.
— picea, II. 330.
— Picis, II. 330.
— — liquidae, II. 330.
— Pimentae, II. 327.
— — vinosa, II. 327.
— Pimpin. Anisi — Aq. Anisi.
— Pini Turionum, 2.
— Piperis Jamaicens., II. 327.
— — vinosa, II. 327.
— — nigri, II. 327.
— Plantaginis, II. 332.
— Plumbi acetosi, II. 342.
— plumbica, II. 341.
— pontificalis, II. 210.
— Portulacae, II. 370.
— Potassae, II. 370.
— — purae, II. 370.
— — Carbonat. acidul., II. 384.
— — Supercarbonatis — Aq. Superc. Potass.
— Pragensis, 286.
Aqua Primulae veris, II. 422.
— prophylactica, 202.
— Pruni Avium alcoholic., 40.
— — Laurocerasi, 39.
— — Padi, 41.
— Pulegii, II. 425.
— Pulsatillae nigric., 195.
— Pyrmontan. factit., II. 91. 576.
— pura destill. vulner., II. 505.
— purgans c. Tartaro emet., II. 584.
— purificata (filtrata vel cocta et filtr.)
— Rabelii, 56.
— Ranunculi albi, 195.
— regia, 258.
— Reginae Hung., II. 483. 484.
— Regis, 258.
— resolvens, II. 584.
— Rhoeados, II. 307.
— roborans, II. 344.
— Rorismerini spirit., II. 483.
— Rosae, II. 472.
— — centifol., II. 472.
— Rosarum, II. 472.
— Rubi Idaei, II. 489.
— rubra, II. 277. 501.
— Rutae, II. 493.
— Sabinae, II. 41.
— c. Saccharo Saturni, II. 350.
— salina, II. 411.
— Salviae, II. 502.
— — composita, II. 502.
— — spirituosa, II. 502.
— Sambuci, II. 510.
— — Florum, II. 510.
— saphirina, 691. 695.
— Sassafras, II. 526.
— — compos., II. 526.
— Saturni, II. 342.
— saturnina, II. 341. 346. 350.
— Scabiosae, II. 527.
— sclopetaria, 23. II. 503.
— — aromatica, II. 503.
— Scordii, II. 605.
— — composita, II. 286.
— Sedlits. artificialis, II. 93.
— Selderana, II. 576.
— Seminum Foeniculi — Aq. Foenic.
— Serpylli, II. 649.
— — composita, II. 650.
— Sinapis, II. 572.
— sine pari, 538.
— Sodae, II. 580.
— — Supercarb. — Aq. Superc. Sodae.
— Solani nigri, II. 587.
— spermatis Ranarum, 692.
— Sperniolae, 692.
— spirit. Citri compos., 538.
— splenetica, 438.
— Stettinensis, II. 187.
— stibiata, 240.
— stomachica, II. 120. 579.
— styptica, 457. 587. 650. II. 692.
— — de Motte la Faveur, 650.
— — Clementina, II. 644.
— — Loofii, 654.
— Subacetat. plumb., II. 342.
— Subcarbonatis Kali, II. 380.
— — Magnes. carbonica, II. 94.
— Sulphatis Aluminae, 138.
— — Zinci aluminosa., II. 692.
— sulphurata acidula, 43.
— — acida, 43.
— Sulphureti Ammoniae, 172.
— — Kali, II. 375.
— — Potassii, II. 375.
— sulphurosa, 44.
— — composita, II. 509.
— Superacetatis Plumbi liquidi — Aq. vegeto-min.
— Supercarb. kalici, II. 384.

Aqua Supercarb. Potass., II. 384.
— — Sodae, II. 580.
— Swietenii, II. 178.
— ad synoviam, II. 196.
— Tanaceti, II. 614.
— Tenellorum Cornu Cervi composita, 166.
— terebinthinata, II. 618.
— Thedemiana, 23.
— theriacalis, 200.
— — calida, 200.
— — composita, II. 286.
— — frigida, II. 286.
— — Romana, II. 286.
— — simplex, II. 286.
— Thymi, II. 640.
— Tiliae. Tiliae Flor., II. 650.
— toffana, II. Add.
— Tormentillae, II. 651.
— ad tormina infant., II. 121.
— traumatica, II. 503.
— — Thedenii, 23.
— Travezii, II. 93.
— de tribus, II. Add.
— Typhor. Cervi comp., 166.
— Valerianae, II. 670.
— — composita, II. 670.
— anillae, II. 671.
— etabilis mineralis Goulardi, II. 342.
— vegeto-mineralis, II. 342.
— — Bellii, II. 351.
— — Goulardi, II. 342.
— — de Prestavin, II. 205.
— Veronicae, II. 674.
— — vinosa, II. 674.
— violacea, II. 20.
— Violarum, II. 677.
— viridis, 696.
— visceralis, 760.
— Vitae, 81.
— — Guajaci, 711. 712.
— — mulierum, 389.
— — purgans, II. 32.
— — rectificata, 84.
— — saponacea, II. 418.
— Vitrioli alba, II. 695.
— — coerulea, 691.
— vitriolica coerulea, 687.
— vitulina, 683.
— vulneraria, 23. 56. II. 58. 333. 503. 644.
— — acetosa, II. 502. 644.
— — acida, 23.
— — cum Alcohole — Aq. vuln. vinosa.
— — aquosa, II. 506.
— — camphorata, II. 351.
— — Plenkii, II. 261.
— — Romana, II. 210.
— — spirituosa, II. 501. 503.
— — Succorum vegetabilium, II. 210.
— — Thedenii, 23.
— — vinosa, II. 503.
— Vulvariae, 470.
— Zedoariae anisata, II. 683.
— — vinosa, II. 683.
Aquifolium, 259.
Aquila alba, II. 155.
— mitigata, II. 155.
Aquilaria ovata, II. 69.
Aquilegia, 259.
— vulgaris, 259.
Aracus aromaticum, II. 670.
Aralia, 259.
— nudicaulis, 259.
— spinosa, 259.
Aranea domestica, 260.
Arbor Vitae, 260.
Arbutus Uva Ursi, II. 660.
Arcanum Archideti, 356.
— bechicum Willisii, II. 377.
— corallinum, II. 145.
— cosmeticum, II. 95.
Arcanum duplicatum, II. 385.
— — depurat., II. 385.
— — Mynsichti, II. 385.
— Tartari, II. 398.
Arctium Bardana et Lappa, 313.
Areca Catechu, 442.
Argel, II. 548.
Argentaria, II. 421.
Argenti Nitras — Arg. nitr. fus.
Argentina, II. 421.
Argentum, 260.
— cupellatum, 260.
— foliatum — Argentum.
— nativum, 260.
— nitratum, 260.
— nitricum, 260.
— — crystallisat., 260.
— — fusum, 261.
— purum, 260.
— sulphuricum, 263.
— vivum, II. 122.
Argilla, 131.
— ferruginea rubra, 131.
— Kali sulphur. alcalisata, 134.
— pura, 131.
— sulphurica, 134.
— — alcalisata, 134.
— — usta, 134.
Arguel, II. 648.
Arisarum, 277.
Aristolochia, 263.
— cava, 674.
— Clematitis, 263.
— Cretica, 263.
— fabacea, 674.
— longa, 263.
— Pistolochia, 263.
— polyrrhiza, 263.
— rotunda, 263.
— Serpentaria, 264.
— tenuis, 263.
— trilobata, 264.
— vulgaris, 263.
— — rotunda, 674.
Armoracia, II. 437.
Arnica, 265.
— montana, 265.
— Plauensis, 266.
— spuria, II. 2.
— Suedensis, II. 2.
Arnoglossum, II. 331.
Aroph Paracelsi, 657. 659.
Arrowroot, 268.
Arsenias Ammoniae, 274.
— Ferri, 275.
— Kali, 275.
— Potassae, 275.
— — alcoholisatus, 273.
— Sodae, 274.
Arsenici Oxydum, 270.
— — sublimatum, 270.
Arsenicum, 268.
— album, 270.
— — sublimatum, 270.
— antimoniatum, 271.
— crudum, 270.
— flavum, 269.
— rubrum, 269.
Arsenidum Sodae liquidum, 274.
Arsenis Potassae, 273.
— — aquosus, 273.
— — liquidus, 273.
— Sodae, 274.
— — liquidus compositus, 274.
Artemisia, 275.
— alba, 275.
— Abrotanum, 4.
— Absinthium, 4.
— campestris, 277.
— Chinensis, 276.
— Contra, 520.
— Dracunculus, 277.
— glacialis, 277.
— glomerata — A. Contra.
— Judaica, 520.
Artemisia Maderaspatana, 5.
— maritima, 5.
— Pontica, 5.
— rubra, 276.
— rupestris, 277.
— Santonica, 520.
— Vallesiana, 277.
— vulgaris, 276.
Arthanita, 697.
Arum, 277.
— Arisarum, 277.
— Dracunculus, 278.
— maculatum, 277.
— triphyllum, 278.
Arundo, 279.
— Donax, 279.
— Phragmites, 279.
— saccharifera, II. 494.
Asa, 279.
— dulcis, 320.
— foetida, 279.
— — depur. ut Ammoniac. dep.
Asarum, 288.
— Canadense, 288.
— Europaeum, 288.
Asbestus, 144.
Asclepias, 289.
— decumbens — A. tuberosa.
— incarnata, 289.
— syriaca, 289.
— tuberosa, 290.
— Vincetoxicum, 290.
Asellus, oleum jecoris, II. 216.
Asparaginum, 290.
Asparagus hortensis, 290.
— officinalis, 290.
— sativus, 290.
Asperula odorata, 292.
Asphaltum, 292.
Asphaltus, 292.
Asphodelus albus, 292.
— mas, 292.
— ramosus, 292.
Aspidium coriaceum, 292.
— Filix Mas — Athyrium.
— Rhaeticum, 64.
Asplenium, 293. 456.
— Adiantum nigrum, 65.
— Ruta muraria, 293.
— Trichomanes, 65.
Assa foetida — Asa foet.
Astacus fluviatilis, 369.
Aster conyzoides, 622.
— inguinalis, 623.
Astragalus Creticus, II. 653.
— exscapus, 293.
— gummifer, II. 653.
— Tragacantha, II. 653.
— verus, II. 653.
Astrantia, 293. II. 1.
— major, 293.
Athamanta Cretensis, 293.
Athanasia, II. 613.
Athyrium Filix mas, 293.
Atriplex angustifolia, 294.
— foetida, 469.
— glauca, 294.
— hortensis, 294.
— odorata, 469.
— olida, 469.
— sativa, 294.
Atropa, 295.
— Belladonna, 295.
— Mandragora, 297.
Atropia, 295.
Atropina, 295.
Atropinum, Atropium, 295.
Atmella, 59.
Aurantiorum Poma, 525.
Aurantium, 525.
— Curassavicum, 525.
— Hispalense, 525.
Auricula Judae, II. 656.
— muris, 744.
— — major, 744.

Auridum Ammoniacae, 300.
Auripigmentum, 269.
Auris Ceti, 364.
Aurum, 296.
— divisum, 298.
— — per Saccharum, 298.
— foliatum, 298.
— fulminans, 300.
— horizontale Zwingeri, 300.
— mosaicum, II. 592.
— muriatico-natricum, 299.
— — — praeparatum, 299.
— muriaticum 298.
— — c. Chloreto Natrii, 299.
— — liquidum, 298.
— — natronatum, 299.
— oxydatum, 300.
— potabile, 299.
— purum. 298.
Avellana, 571.
Avena, 301.
— excorticata, 301.
— nuda, 301.
— orientalis, 301.
— sativa, 301.
Avicula margaritifera,
Axungia, 62.
— Anatis, 63.
— Anguillae, 64.
— Anseris, 64.
— antipsorica, II. 134.
— Ardeae, 64.
— Aschiae, ibid.
— Aschii, ibid.
— Canis, 63.
— Caponis, 63.
— Castoris, 63.
— Cati sylvestris, 63.
— Ciconiae, 63.
— composita, 64.
— Coturnicis, 63.
— Cuniculi, 63.
— Equi e collo, 63.
— — e juba, 63.
— Erinacei, 63.
— Gallinae, 64.
— Hominis, 63.
— Leporis, 63.
— Lucii Piscis, 64.
— Lupi, 63.
— Muris alpini, 63.
— — montani, 63.
— nitrica, nitricata, 48.
— oxygenata, 48.
— Pavonis, 64.
— Phocae, 63.
— Porci, 63.
— — purificata, 63.
— porcina, 63.
— Serpentum, 64.
— Suis Scrofae, 63.
— suilla, 63.
— pedum Tauri, 63.
— Taxi, 63.
— Thymalli piscis, 64.
— Ursi, 63.
— Viperarum, 64.
— vulpina, 63.
— Vulpis, 63.
Ayapana, II. Add.
Azarum, 288.
Azedarach, 302.
Azotum, 302.

B.

Baccae Jujubae, II. 35.
— Norlandicae, II. 487.
— Actes, II. 607.
Bacilli Liquiritiae albi, II. 80.
— — citrini, II. 80.
Baetica sylvestris, II. 231.
Balanus myrepsica, II. 213.
Balaustia, II. 426.
Ballota, 302.
Ballota lanata, 302.
— nigra, 302.
Balneum antisyphiliticum, II. 178.
— aromaticum, II. 478.
— emolliens, II. 75.
— — et antisepticum, II. 418.
— incitans, 24.
— resolvens, 171. II. 376.
— sulphuratum, 44. II. 376.
— — et gelatinos. Dupuytren., II. 376.
— sulphurosum, II. 585.
Balsamita mas, 302.
— odorata, 303.
Balsamum acetic. camph., II. 419.
— acusticum, 90. 157.
— adstringens, II. 633.
— aegyptiacum, 307.
— aethereum, II. 605.
— anodynum, II. 253. 419.
— antiarthriticum, II. 419.
— antihystericum, 99.
— antiodontalgic., II. 271.
— apoplecticum, II. 479.
— Apparitii, 760.
— Arcaei, II. 621.
— aromaticum, 159. 178. 426. II. 479.
— — liquidum, II. 622.
— — aethereum, 434.
— arthriticum, II. 258
— ad aures, 90. 157. 310. 632.
— Auri, 301.
— Basvillianum, II. 635.
— e Benzoë, 321.
— Brasiliense, 303.
— Calaba, II. 608.
— Canadense, 1.
— ad cancrum, II. 272.
— Carpathicum, 303.
— catholicum, 321.
— — ex Vino, 757.
— — cum Spiritu Vini, 758.
— cephal. Saxonicum, II. 479.
— chalybeatum, 652.
— Chironis, II. 624.
— Cinnamomi, 385.
— Commendatoris, 321. 323.
— de Condom, II. 221.
— Copaibae, 303.
— Copaivae, 303.
— ad dentitionem, 131.
— embryonum, II. 595.
— Feuilleti, 593.
— Fioravanti, II. 628.
— — nigrum, II. 629.
— — oleosum, II. 629.
— — spirituosum, II. 629.
— Fourcroyi, II. 638.
— Frahmii, II. 621.
— Genovevae, II. 624.
— Gileadense, 307.
— Goulardi, II. 348.
— Guajaci, 716.
— — saponaceum, 716.
— guajacinum, 712.
— Hoffmanni, 385.
— Hungaricum, 303.
— Hyperici compositum, 760.
— Indicum, 308.
— — album, 308.
— — nigrum, 308.
— — siccum, 308.
— innocentianum, 757. 758.
— ischaematicum, II. 633.
— Italicum, II. 623.
— Judaicum, 307.
— Laricis nativum, II. 617.
— Lavandulae, II. 60.
— Lectorense, II. 221.
— de Leictour, II. 221.
— Liboschitzii, 403.
— Locatelli, II. 623.
— ad loricand. cadaver, II. 596.
— Majoranae, II. 297.
— de Mecca, 307.
— Meccaënse, 307.
— Meccanense, 307.
— mercuriale, II. 149. 197.
— — Plenkii, II. 131.
— Myroxyli peruiferi, — Bals. Peruvian.
— Myrrhae, II. 228.
— narcoticum, II. 633.
— nativum, II. 617.
— nervinum, II. 479.
— Nucistae, II. 224.
— — expressum, II. 221.
— Oleae, II. 243.
— ophthalmicum, II. 149. 180.
— — rubrum, II. 148.
— — Yveanum, II. 149.
— — St. Yves, II. 149.
— Opodeldoc, 156.
— orientale, 307.
— palustre, II. 113.
— pectorale, II. 624.
— persicum, 321.
— ad s. contra perniones, II. 634.
— Peruvianum, 308.
— — album, 308.
— — nigrum, 308.
— — siccum, 308.
— Pini sylvestris nativum, II. 617.
— — Laricis, II. 617.
— — liquidum, II. 617.
— — sylvestris, II. 617.
— — exsiccatum—Colophon.
— pleureticum, 580.
— Plumbi, II. 339.
— Rakasira, 311.
— resolvens, 310. II. 376.
— Rulandi, II. 604.
— Rutae, II. 494.
— Samaritanum, II. 676.
— saponaceum, II. 418.
— — compos., II. 418
— — terebinthinat., II. 634.
— Saponis, 156. II. 418. 634.
— — compos., II. 418.
— Saturni, II. 340. 341. 348.
— — Goulardi, II. 346. 348.
— saturninum, II. 344.
— Schauerianum, II. 630.
— Scherzeri, II. 479.
— somniferum, II. 258.
— stomachicum, II. 479.
— Styracis, II. 593.
— — Benzoini, 320.
— Succini, II. 420. 599.
— Sulphuris, II. 604.
— — anisat., II. 604.
— — simplex, II. 604.
— — succinat., II. 604.
— — terebinthinat., II. 604.
— Syriacum, 307.
— Terebinthinae, II. 634.
— terebinthinatum, II. 622.
— thebaicum, II. 258.
— de Tolu, 311.
— Toluiferae Balsami, 311.
— Tolutanum, 311.
— tranquillans, 754.
— tranquillum, 754.
— traumaticum, 321.
— universale, II. 344.
— verum, I. 307.
— de Vinceguère, II. 221.
— viride, II. 608. 625.
— — Metensium, 593.
— vitae, 365.
— — album, II. 630.
— — externum, II. 634.
— — Hoffmanni, 385. II. 481.
— — de Lelièvre, 116.
— — Rulandi, II. 604.
— vulnerarium, 321. II. 622. 628.

Balsamum vulnerarium commune, II. 618.
— — Burrhus, 323.
— — minerale Dippelii, 666.
— de St. Yves, II. 149.
— — vegetabile, II. 210.
Balsamus, ſ. Balsamum.
Bamia moschata, 1.
Banilla, II. 670.
Baptisecula, 597.
Barba Aronis, 278.
— caprina, II. 589.
— Hirci, II. 655.
Barbarea, 623.
Barbula caprina, II. 589.
Bardana, 313.
— minor, II. 681.
Barilla, II. 377.
Barium, 314.
Barotes salitus, 314.
Baryta, 317.
— acetica, 318.
— carbonica, 317.
— fusa, 317.
— muriatica, 314.
— nitrica, 318.
— pura liquida, 317.
— sulphurica nativa, 317.
Barytes, 317.
— salitus, 314.
Basilicum, 318.
— citratum, 319.
— majus, 319.
— minimum, 319.
Batrachites, 363.
Bdellium, 319.
Beccabunga, II. 673.
Becetta, II. 47.
Bechium, 630.
Bedeguar, 319.
Been, II. 213.
Behen, 319.
— album, 319.
— nostras, 320.
— rubrum, 320.
Belladonna, 295.
Belliculus marinus, 368.
Bellis, 320.
— hortensis, 320.
— major, 511.
— minor, 320.
— perennis, 320.
— pratensis, 511.
Belsoinum, 320.
Ben, II. 213.
Benedicta sylvestris, 703.
Benzoë, 320.
— amygdaloides, 320.
— in sortis, 320.
Benzoin, 320.
Benzoinum, 320.
Berberis, 326.
— vulgaris, 326.
Bergamottae oleum, 536.
Beta, 327.
— Cycla, 327.
— rubra, 327.
— vulgaris, 327.
Betel, 327.
Betonica, 327.
— aquatica, II. 545.
— officinalis, 327.
— purpurea, 327.
Betula, 328.
— alba, 329.
— Alnus, 328.
Bezoar, 369.
— Coromandelianus, 369.
— occidentalis, 369.
— orientalis, 369.
Bezoardicum animale, 681.
— Curvi completum, II. 644.
— — incomplet., II. 644.
— — purgans, II. 544.
Bezoardicum joviale, II. 692.
— martiale, 215.
Bicarbonas kalicus cum Aqua, II. 384.
— natricus cum Aqua, II. 579.
— Potassae, II. 384.
— Protoxydi Ferri, 647.
— Sodae, II. 579.
Bichloretum Hydrargyri, II. 175.
— — venale, II. 175.
— Mercurii, II. 175.
Bichloruretum Calcis, 355.
— Mercurii, II. 175.
Bidens, 329.
— cernua, 329.
— tripartita, 59.
Bilis bovina, 630.
Binoxalas Potassae, II. 403.
— kalicus cum Aqua, II. 403.
Bislingua, II. 490.
Bismalva, 119.
Bismuthi Subnitras, 329.
Bismuthum, 329.
— nitricum, 329.
— — praecipitatum, 329.
— oxydulatum album, 329.
— subnitricum, 329.
Bistorta, 330.
Bisulphas Cupri, 684.
— kalicus, II. 388.
— Potassae, II. 388.
Bisulphuretum Hydrargyri, II. 152.
Bitartras kalicus cum Aqua crudus, II. 406.
— — — depuratus, II. 406.
— Potassae, II. 406.
Bitumen Asphaltum — Asphaltum.
— Judaicum, 292.
— Petroleum — Petroleum.
Bixa Orellana, II. 297.
Blatta byzantina, 337.
Boetica sylvestris, II. 231.
Boletus, 331.
— cervinus, 331.
— fomentarius, 78.
— igniarius, 78.
— Laricis — Agaricus albus.
— purgans, 78.
— Salicis, 331.
Boli adstringentes, 135. 307. 643. II. 12. 443. 448.
— alterantes, 710.
— amari, 695.
— anthelmintici, 521.
— — et antispasmodici, II. 165.
— anthelmintico-laxantes, II. 174.
— — nervini, II. 169
— — tonici, 742. II. 159.
— antiarthritici, II. 632.
— antiasthmatici, II. 602.
— anticatarrhales, II. 215.
— antichlorotici emmenagogi incitantes, 640.
— — — tonici, 635.
— anticonvulsivi, 330.
— antidysenterici, II. 12.
— antifebriles, 509. 524.
— antigonorrhoici, 307. II. 626.
— antihaemorrhoidales, II. 602.
— antihysterici, 282.
— antilactosi, II. 400
— antiscorbutici, 487.
— antiscrophulosi, 415.
— antispasmodici, 371. 645. II. 218. 272.
— — et anticonvulsivi, 282.
— antisyphilitici, 299.
— — resolventes, II. 143.
— — stomachici, II. 143.
— antivenerei, II. 142.
— aromatici, II. 223.
Boli cum Camphora et Nitro, 371.
— camphorati, 371.
— — cum Kermete, 372.
— cardiaci, 566.
— carminativi, 208.
— cathartici, II. 24.
— chalybeati, 646.
— Chinae, 478.
— — aromatisati, 478.
— — opiati, 478.
— — — et aromatici, 478.
— — et Rhei, 478.
— coerulei, II. 120.
— contrastimulantes, 37. 39
— in cystitide lenta, II. 602.
— deprimentes, II. 214.
— — ac nauseantes, 613.
— — cinnabarini, II. 154
— — resolventes, 612.
— diaphoretici, 218. II. 602. 154. 270.
— — nauseantes, 228.
— — sedantes, II. 686.
— ad diarrhoeam, II. 264. 448
— digestivi, II. 12.
— de Digitale, 612.
— Digitalis, 612.
— diuretici et antispasmodici, 613.
— drastici, 732. II. 161.
— emetici, II. 191.
— emmenagogi, II. 38. 98. 159.
— — irritantes, 98. 811.
— — resolventes, 368. II. 8.
— ad epilepticos, II. 664.
— excitantes, 371. II. 428.
— febrifugi, 478. 486. 509. 649. II. 328.
— e Ferro compositi, 640.
— ferruginosi, 640. 659.
— hydragogi, II. 24.
— ex Hydrargyro, II. 194.
— — oxydato rubro, II. 137.
— incitantes, diaphoretici et expectorantes, 228.
— — emmenagogi, 509. 6x
— — stomachici, 640. 609
— kermetico-ammoniacal., 228
— lac pellentes, II. 400.
— laxantes Chaussieri, II. 171
— lenientes, II. 214. 215.
— lithontriptici, II. 415.
— Magnesiae crocat., II. 90.
— martiales emmenagogi, 635. 640.
— Martis, 664.
— mercuriales, II. 128. 194.
— e Mercurio glyzyrrhizato, II. 127.
— — dulci, II. 159
— e Muriate Hydrargyri, II. 159
— Myrrhae, II. 227.
— narcotici, 750.
— e Narcotina, II. 232.
— in necrosi syphilitica, II. 142
— nervini, 282. 433.
— ad oedema pulmonum, II 532.
— ad paralysin, II. 571.
— pectorales, II. 655.
— — adstring., II. 655.
— in pertussi, II. 160.
— in ptyalismo mercuriali, II. 377.
— purgantes, 565. II. 24. 167. 171. 550.
— — irritantes, 732.
— — et tonici, II. 160.
— in quartana, 478.
— resolventes, 117. II. 24. 142.
— — et antisyphilitici, II. 143.
— — deprimentes, II. 8.
— — diaphoretici, 228.
— — et incitantes, II. 164.
— — et purgantes, II. 448.

Boli e Rheo, II. 448.
— — sedativi, II. 448.
— roborantes, 307.
— ex Roremarino, 635.
— rubri, II. 154.
— ex Sabina, II. 159.
— ad salivationem, II. 377.
— saponacei, II. 415.
— Scammonii compositi, II. 174.
— scillitici, II. 532.
— sedativi, 27. II. 270.
— e Spongia, 415.
— e Stanno, II. 591.
— stibiati, 221.
— stimulantes, II. 571.
— — et tonici, 266.
— stomachici, 116. 459. 574. 635. 640. 645. 669. II. 578.
— contra strumas, 416.
— Sulphuris, II. 602.
— — compositi, II. 602.
— Tartari chalybeati, 669.
— temperantes, 371.
— tonici, 478. 487.
— — adstringentes balsamici, 694.
— — sedativi cum Muriate Barytae, 316.
— tonico-antiseptici, 282.
— ad tussim, II. 395.
— e Valeriana, II. 664.
— vermifugi, 294. 742. II. 173. 176. 591.
— — diaphoretici, 372.
— vomitivi, II. 12.
Bolus alba, 131.
— Armena s. Armenia s. orientalis s. rubra, 131.
— rubra artificialis, 132.
Bombax, 704.
Bombyx Mori, II. 567.
Bonifacia, II. 490.
Bonplandia trifoliata — Angustura vera.
Bonus Henricus, 469.
Borago, s. Borrago.
Boras Hydrargyri, II. 190.
— Mercurii, II. 190.
— Sodae, II. 580.
— — alcalescens, II. 580.
— — alcalinum, II. 580.
— — alcalinus, II. 580.
— — cum baseos excessu, II, 580.
— — saturatus, II. 580.
— — supersaturatus, II. 580.
— supersodicum, II. 580.
Borassus flabelliformis, 319.
Borax, II. 580.
— crudus, II. 580.
— natricus cum Aqua, II. 580.
— officinalis, II. 580.
— pura, II. 580.
— raffinata, II. 580.
— supersodicus, II. 580.
— Venetus s. Veneta, II. 580.
Borrago, 331.
— officinalis, 331.
Borussias Ferri, 669.
— Hydrargyri, II. 189.
— Potassae et Oxyduli Ferri, 38.
Bos Taurus, s. Lac vaccinum, Fel Tauri.
Boswellia serrata u. thurifera — Olibanum.
Botrychium Lunaria, II. 85.
Botrys ambrosioides, 469.
— Mexicana, 468.
Botrytis, II. 684.
Bovista, 333.
Bowdichia virgilioides, 88.
Branca ursina, 15. 333.
Brassica, 333.
— capitata alba, 333.
Brassica capitata rubra, 333.
— Eruca, 334.
— marina, II. 587.
— Napus, 334.
— oleracea, 333.
— oleifera, 334.
— Rapa sativa, 334.
— rubra, 333.
Brodium, s. Jus.
— depurativum, II. 684.
— diureticum, II. 543.
— Rosarum, II. 467.
Brontias, 363.
Brucea ferruginea, 206.
Brucia, 206. 334.
Brucina, 206. 334.
Brucinum, 206. 334.
Brucium, 206. 334.
Brunella, II. 423.
Bruscus, II. 490.
Bryonia, 335.
— alba, 335.
— dioica, 335.
— nigra, II. 612.
Bubon, 336.
— Galbanum, 336.
— Macedonicum, 336.
Bufones exsiccati, 681.
Bufonites, 363.
Bufonius lapis, 363.
Buglossum, 192.
— latifolium, 332.
— urbanum, 332.
— verum, 332.
Bugula, 80.
Bulbulus thrasus, 601.
Bunias, 334.
Buphthalmum, 344.
Bupleurum rotundifolium, II. 314.
Bursa pastoris, II. 648.
Bursera gummifera, 345. II. 44.
Butua, 524.
Butyrum, II. 46.
— Amygdalarum dulcium, 182.
— Antimonii, 235.
— Cacao, 346.
— Cerae, 251.
— Majoranae, II. 297.
— cum Oxydo Mercurii rubro, II. 148.
— Rutae, II. 492.
— Saturni, II. 344.
— Stanni, II. 592.
— Stibii, 235.
— Zinci, II. 684.
Buxus sempervirens, 345.

C.

Cabbagum, 701.
Cacao, 345.
— praeparata, 346.
— tabulata, 346.
Cachen laguen, 625.
Cachinlagua, 625.
Cactus coccinelliifer, 544.
— cochenillifer, 544.
— Opuntia, 295.
— Tuna, 544.
Cadmia, II. 684.
— fossilis, II. 684.
— praeparata, II. 684.
Cadmium, II. 684.
Caeruleum Berolinense, 669.
— Borussicum, 669.
— montanum, 584.
Caesalpinia echinata, II. 69.
Caffeinum, 550.
Cahuchu, II. 444.
Calaguala, 298.
Cajeputi Oleum, 347.
Calamina, II. 684.
— praeparata, II. 684.
Calamintha, II. 108.
Calamintha agrestis, II. 108.
— humilior, 734.
— montana, II. 108.
— Pulegii odore, II. 108.
Calamita, II. 594.
Calamites vera, II. 594.
Calamus, 348.
— aromaticus, 348.
— Asiaticus, 348.
— Draco, II. 512.
— odoratus, 348.
— Rotang, II. 512.
— Sancti, 348.
— verus, 348.
— vulgaris, 348.
Calcareus lactiformis, 357.
Calcaria carbonica, 356.
— chlorinica, 365.
— iodica, II. 8.
— iodinica, II. 8.
— muriatica, 367.
— oxyphosphorica, 366.
— phosphorica, 363.
— pura, 361.
— — liquida, 362.
— sulphurata, 364.
— — liquida, 365.
— sulphurato-stibiata, 234.
— sulphurica, 366.
— usta, 361.
Calcis Phosphas etc. s. Phosphas Calcis etc.
Calcitrapa, 361.
— stellata, 361.
Calcitrippa, 607.
Calcium, 351.
— sulphuratum, 354.
Calculi, 369.
Calendula, 370.
— alpina, 266.
— arvensis, 370.
— officinalis, 370.
Calendulae minerales, 657.
Calendulinum, 370.
Callicocca Ipecac. — Cephael. Ip.
Calluna vulgaris, 622.
Calmontana, II. 108.
Calombo, 559.
Calomel, II. 156.
Calomelanos, II. 156.
Calomelas, II. 156. 167.
— ferruginosus, II. 167.
Calophyllum Calaba, II. 608.
— Inophyllum, II. 608.
Caltha alpina, 266.
— sativa, 370.
Calumba, 559.
Calx, 361.
— acetata, 368.
— Antimonii, 214.
— — elota, 215.
— — Hoffmanni, 234.
— — nitrata, 215. 219.
— — sulphurata, 234.
— — cum Sulphure, 234.
— Arsenici alba, 270.
— Bismuthi, 329.
— citrata, 368.
— Cupri viridis, 584.
— extincta, 352.
— Hydrargyri alba, II. 199.
— — rubra, II. 145
— Mercurii, II. 194.
— — cinerea, II. 192.
— — vitriolata, II. 191.
— muriatica Bergmanni, 367.
— oxymuriatica, 366.
— phosphorata, 364.
— Plumbi alba, II. 336.
— recens usta, 351.
— salita, 367.
— Stibii cum Sulphure, 234.
— sulphurica, 366.
— usta, 351.
— Vismuthi, 329.

Calx viva, 361.
— Zinci, II. 684.
Calyculi glandium Querc., II. 433.
Calyptranthes Caryophyll., 380.
Calystegia Soldanella, II. 587.
Cambodium, 732.
Cambogia Gutta — Garcinia Cambogia.
Cambogium, 732.
Cammarum 60.
Camphora, 370.
— artificialis, II. 633.
Camphorosma, 379.
— Monspeliaca, 379.
Cancanum, 726.
Cancer Astacus, 359.
— Pagurus, 359.
Cancri herba, II. 648.
Cancror. lapides s. lapilli, 359.
— chelae, 359.
Candelae cereae, II. 353.
— chirurgicae, II. 344.
— fumales, 325.
— mercuriales, II. 173.
— mitigantes, II. 344.
— resolventes, II. 344.
— saturninae, II. 353.
Canella, 379.
— alba, 379.
— Cubana, 380.
— Malabarica, 380.
— Zeylanica, 379.
Canellinum, 379.
Canis Vulpes, 681.
Cannabina aquatica, 625.
Cannabis, 398.
— sativa, 398.
Cantharides, 398.
Cantharidinum, 399.
Cantharis vesicatoria, 399.
— vittata, 399.
Capillus Veneris, 65.
— — Canadensis, 66.
Capitulum Martis, 623.
Capparis, 410.
— spinosa, 410.
Capra Aegagrus, 369.
— Ibex, sanguis, 682.
Caprifolium, 411.
Capsicinum, II. 325.
Capsicum annuum, II. 325.
— frutescens, II. 325.
Capsina, II. 325.
Capsinum, II. 325.
Caput mortuum Vitrioli, 641.
Caranna, 411.
Carbo, 412.
— animalis, 413.
— Ligni, 412.
— pilae marinae, 412.
— praeparatus, 412.
— purus, 412.
— Spongiae, 412.
— — marinae, 412.
— e vegetabilibus, 412.
— vegetabilis, 412.
— — praeparatus, 412.
Carbonas Ammoniaci, 159.
— — alcalin. liqd., 161.
— — — solutus, 161.
— — Cornu Cervi crystallisatus, 162.
— — Lumbricor. crystallisatus, 162.
— — Viperarum crystallisatus, 162.
— Ammoniae, 159.
— — alcalin. liquid., 161.
— — — solidum, 160.
— — alcalinus, 159. 160.
— — — solutus, 161.
— — — pyro-animal., 162.
— — — pyro oleos., 162.
— — — pyro-vinos. solutus, 163.
Carbonas Ammoniae crystallisatus, 162.
— — incompletus, 159.
— — pyro-animalis s. pyro animale, 162.
— — — — s. fluidus, 163.
— — pyro-oleosus, 162.
— — — — liquidus, 163.
— — solidus, 160.
— ammonicus crudus, 162.
— — depuratus solidus s. crystallis., 160.
— Barytae 317.
— baryticus, 317.
— calcareus, 356.
— calcicus bituminat., 357.
— Calcis, 356.
— — nativum, 356.
— — nativus pulverulentus, 356.
— — praeparatus, 356.
— Ferri, 643.
— — oxydati, 643.
— — praeparatus, 643.
— Hydrargyri, II. 190.
— kalicus e Cineribus clavellatis, II. 378.
— — crudus, II. 377.
— — e Tartaro, II. 378.
— Lixiviae alcalinus, II. 377.
— — — solutus, II. 380.
— Magnesiae, II. 88.
— — purus, II. 88.
— magnesicum, II. 88.
— magnesicus c. Aqua, II. 88.
— — — venalis, II. 88.
— natricus, II. 577. 579.
— — c. Aqua crud., II. 577.
— — — venalis, II. 577.
— — depuratus, II. 578.
— — impurus, II 577.
— — venalis, II. 577.
— Oxydi Zinci, II. 684.
— Plumbi, II. 336
— plumbicum, II. 336.
— plumbicus, II. 336.
— Potassae, II. 384.
— — alcalescens liquidus, II. 380.
— — alcalinum s. alcali nus, II. 377.
— — completum, II. 384.
— — et Ferri liquid, 644.
— — et Ammoniaci, II. 385.
— — impurus, II. 377.
— — neuter, II. 384.
— — purissimus, II. 378.
— — venale s. venalis, II. 377.
— Protoxydi Potassii, II. 384.
— — — et Ammoniaci, II. 385.
— Sodae, II. 577. 579.
— — alcalinum, II. 577.
— — alcalinus, II. 577.
— — completum s. completus, II. 579.
— — crystallisatus, II. 579.
— — impurus, II. 577.
— — incompletus, II. 577.
— — neuter, II. 579.
— — venale s. venalis, II. 577.
— Sodii Protoxydi, II. 579.
— superammonicus, 159.
— — aquosus, 161.
— — pyro-oleosus, 162.
— — — aquosus, 163.
— superpotassicus depuratus, II. 378.
— — purus, II. 378.
— Zinci, II. 685.
— — impura, II. 634.
— — impurus, II. 684.
Carbonas Zinci Oxydi, II. 6
— — praeparatus, II. 6
— zincicus terrestris, II. 6
Carbunculus, 131.
Carburetum Ferri, 637.
— — nativum, 63
— Iodii, II. 10.
— Sulphuris, II. 600.
Cardamine, II. 234.
— pratensis, II. 234.
Cardamomum, 416.
— Javanicum, 416.
— longum, 416.
— majus, 416.
— Malabaricum, 416.
— medium, 416.
— minus, 416.
— rotundum, 416.
Cardamum majus, II. 233.
Cardiaca, 417.
Cardopatia, 421.
Cardopatium, 421.
Carduus, 417.
— benedictus, 417. 418.
— lacteus, 418
— Mariae, 418.
— Marianus, 418.
— sanctus, 418.
— stellatus, 351.
— tomentosus, 417.
— Veneris, 617.
— volutans aculeatus, 63
Carex arenaria, 490.
Carica, 420.
— pinguis, 420.
Carlina, 421.
— acaulis, 421.
— humilis, 421.
— vulgaris, 421
Caro testudinum, 680.
— Viperae, 681.
— Vulpis, 681.
Carpionum lapides, 358.
Carpobalsamum, 191.
Carthamita, 421.
Carthamus, 421.
— lanatus, 421.
— sativus, 421.
— tinctorius, 421.
Carum Carvi, 422.
Carvum, 422.
Caryophyllata, 380. 702.
— aquatica, 703.
Caryophylli, 424.
— aromatici, 424.
Caryophyllinum, 424.
Caryophylloides, 580.
Caryophyllus, 425.
— aromaticus, 423.
— ruber, 609.
Cascarilla, 426.
Caseum, II. 46.
Cassia, 428.
— acutifolia, II. 548.
— Caryophyllata, 380.
— cinnamomea, 380.
— elongata, II. 548.
— pro clysteribus, 429.
— cocta, 430.
— Fistula, 428. 429.
— fistularis, 429.
— lanceolata, II. 548.
— lignea, 380.
— cum Manna, II. 100.
— Marylandica, 429.
— obovata, II. 548.
— obtusata — Senna Tripolit
— officinal — Senna Tripolit
— potabilis, 431.
— Senna — Senna.
Cassumuniar, 431.
Cassuvium occidentale, 431.
Castanea equina, 66.
— pumila, 432.
— Vesca, 431.

Castaneae, 432.
Castor Fiber, 432.
Castoreum, 432.
— Canadense s. Anglic., 432.
— Moscoviticum, 432.
Castorina, 432.
Castorinum, 432.
Castrangula, II. 545.
Catalpa, 440.
— arborea, 440.
Cataplasma Acetatis Plumbi, II. 342.
— acetatum, 21. II 306.
— adstringens, 642. 652.
— Althaeae, 127.
— aluminosum, II. 299.
— Amyli, 191.
— ammoniacale, 167.
— anodynum, 749. 752. II. 249. 264.
— anthelminticum, 99.
— anticancrosum, 272.
— antiophthalmicum, 576.
— antipleuriticum, II, 328.
— antisepticum, 13. 414. 433. 434. 479. II. 498.
— — c. Camphora, II. 434
— — Reussii, 479.
— antispasmodicum, II. 271.
— Aquae marinae, 268.
— aromaticum, II. 108.
— ad blennorrhagiam, 189.
— ex Bryonia, 514.
— ad cancrum, 272. 514. II. 249.
— Cantharidum, 405.
— Cicutae compositum, 514.
— c. Concinno, II. 433
— — et Camphora, II. 231.
— e Conio s. Conii maculati ammoniatum, 514.
— Crustae Panis acetos., 21.
— Dauci, 607.
— e Dauco, 514.
— desiccativum, II. 676.
— discutiens, 208 721.
— domesticum—C. emolliens.
— emolliens, 127. 189. 576. II. 74. 97. 306
— epispasticum, II. 571.
— fermentans, 632.
— fermenti, 632.
— — Panis theriac., II. 287.
— ad ischias, 351.
— contra ischuriam, 89.
— Lini cum Galbano, 89.
— maturans, 16. 89. 337. 632. II. 416.
— Medullae Panis, 127.
— — — c. Cicuta, 514.
— de Mica Panis, II. 306.
— Micae Panis anodyn., 576.
— narcoticum, 749 752.
— Nicotianae, II. 237.
— Nidi Hirundinis, 576.
— Panis, Lactis et Malvae, II. 306.
— cum Opio, II. 264.
— Papaveris et Hyoscyami compos., 752.
— pomaceum, 576.
— Pradierii, 308.
— pus maturans, II. 416.
— resolvens, 89. 127. 456. 632. 721. II. 342. 416.
— roborans, 669.
— — ad scirrhos, 514.
— rubefaciens, II. 328.
— saturninum, II. 342.
— saponaceum, II. 416.
— sedans, II. 264.
— sedativum, II. 264.
— Sinapeos, II. 571.
— sinapinum acre, 572.
— — mite, 571.
Cataplasma Sinapis, II. 571.
— ad singultum, II. 287.
— stypticum, 652.
— virosum, 749.
— theriacale, II. 287.
— vomitivum, 287.
Catapotia ad catarrhos, II. 272.
— minor, 441.
Catapultia, 440.
Cataria, 441.
Catechu, 441.
— depuratum, 442.
Catelli, 681.
Cathartina, II. 548.
Cathartinum, II. 548.
Catholicon dupl. — Elect. catholic.
Causticum alcalinum, II. 371.
— ammoniacale, 154.
— antimoniale, 835.
— arsenicale, 272.
— commune, II. 371.
— — fortius, II. 371.
— — mitius, II. 372.
— lunare, 261.
— potentiale, II. 372.
— salinum, II. 371.
— vegetabile, 370.
Cauterium potentiale, II. 371.
Ceanothus, 447.
— Americana, 447.
Cedria, II. 329.
Cedronella, II. 108.
Centaurea Behen, 319.
— benedicta, 418.
— febrifuga, 447.
— lanata, 421.
Centaureum minus, 447.
Centaurium, 447.
— majus, 447.
— minus, 447.
— officinale, 447.
Centinodia, 450.
Centummorbia, II. 88.
Centumnodia, 450.
Cepa — Allium Cepa.
Cephaëlis Ipecacuanha, II 11.
Cera, 250
— alba, 250.
— arborea, II. 638. 639.
— citrina, 250.
— cruda, 250.
— depurata, 250.
— flava, 250.
— inaurata, 593.
— ad labia, 464.
— purificata, 250.
— viridis, 693.
Ceramium aegagropilum, 741.
— albinum, 741.
— cancellatum, 741.
— catenatum, 741.
— forcipatum, 741.
— gracile, 741.
— Helminthochortos — Helminthochortos.
— incurvum, 741.
— scoparium, 741.
Cerasa acida, 450.
Cerasi Gummi, 732.
Cerasus, 450.
— acidus, 450.
— Avium, 450.
— Lauro-Cerasus, 451.
— Mahaleb, 451.
— niger, 450.
— Padus, 450.
— racemosus sylvestris, 450.
— rubet acidus, 450.
— Virginiana, 451.
— vulgaris, 450.
Ceratonia, 452.
— Siliqua, 452.
Ceratum — Linimentum simpl.
— Acetatis Plumbi, II. 349.
— — plumb., II. 344.
Ceratum adhaesivum, II. 639.
— Aeruginis, 693.
— album, 463.
— — Ceti, 463.
— — simplex, 463.
— de Althaea, 128.
— ad ambusta, II. 687.
— anodynum, II. 368.
— antipsoricum, II. 140.
— arsenicale, 272.
— Arsenici, 272.
— Axungiae, 281.
— Baumei, II, 107.
— Betonicae, 388.
— Calaminae, II. 686.
— calaminare, II. 686.
— camphoratum, 378.
— Cantharidis, 405. 468.
— Cantharidum camphoratum, 408.
— Carbonatis Zinci impuri, II. 686
— de Cerussa, II. 337.
— Cerussae, II. 337.
— — compos., II. 364.
— Cetacei, 453.
— — album, 463.
— — rubrum, 464.
— Ceti, 453.
— cum China, 689.
— Chinae camphorat., 493.
— citrinum, II. 638. 639.
— cosmeticum, 347. 464.
— detergens, II. 181.
— diapompholigos, II. 687.
— emolliens, 90.
— epuloticum, II. 686.
— exploratorium, II. 414.
— exsiccans, II. 173. 687.
— — Kirklandi, II. 345.
— flavum, 262.
— fuscum, II. 364.
— Galeni, 252.
— Goulardi, II. 348.
— Hufelandi, II. 687.
— Juniperi Virginian., II. 43.
— ad labia, 252. 464.
— labiale, 252. 347. 464. II. 245.
— — album, 453.
— — rubrum, 464.
— Lapidis calaminar., II. 686.
— Lithargyri, II. 344.
— Lyttae, II. 405
— Meliloti simplex, II. 107.
— Mercantini, II. 336.
— mercuriale, II. 130. 134. 148.
— — Falckii, II. 151.
— Minii, II. 335.
— — gummoso-resinosum, II. 336.
— mundificans balsamicum, 464.
— Nicotianae, II. 238.
— nigrum, II. 638. 639.
— Norimbergense, II. 361.
— oleo-resinosum, II. 638.
— ophthalmicum, II. 687.
— opiaceum, II. 260.
— opiatum, II. 267.
— Oxy-carbonatis Zinci, II. 686.
— Oxydi Plumbi semivitrei, II. 352.
— Plumbi, II, 344.
— — Acetatis, II. 349.
— — compos., II. 344. 346.
— — Subacetat. liquidi, II. 346.
— — Subcarbonatis comp. II. 364.
— — Superacetatis, II. 344.
— e Plumbo, II. 344.
— Pottii, II. 349.
— de Ranis cum Mercurio, II. 134.

Ceratum de Réchoux, 164.
— refrigerans Galeni, 282.
— Resinae, II. 638. 639. 640.
— — Burgundicae, 128.
— — flavae, II.
— — Pini, II. 638.
— — — Burgund resinos., II. 638.
— resinosum, II. 638. 642.
— — compos., II.
— rubrum, II. 155. 336.
— — camphoratum, II. 336.
— Sabinae, II. 10.
— saponaceum, II. 349.
— Saturni, II. 344. 348.
— — Goulardi, II. 344.
— saturninum, II. 348. 353.
— simplex, 251. 453.
— Spermatis Ceti, 453.
— Subacetate Plumbi medicatum, II. 349.
— e Sulphure, II. 605.
— tabacinum, II. 238.
— viride, 593.
— Zinci Carbonatis impuri, II. 686.
— e Zinco, II. 686.
Ceraunius, 388.
Cerberus triceps, 218.
Cerefolium, 466.
— hispanicum, 456.
Cerebri communes, II, 344.
— demulcentes, 254.
— emollientes, 254.
— exploratorii, 254. II. 353.
— Falckii, II. 151.
— cum Kali caustico, II. 373.
— medicati, II. 344.
— mercuriales, II. 133. 173. 197.
— — dissolubiles, II. 686.
— mitigantes, II. 344.
— Plumbi Acetatis, II. 344.
— plumbici, II. 344.
— Saturni, II. 344.
— saturnini, II. 344. 346.
— simplices, 254. II. 344.
Cerevisia, 463.
— Absinthii, 8.
— adstringens, II. 435.
— amara, 4.
— antihydropica, II. 30.
— antiicterica, II. 566.
— antiscorbutica, 3. 547. II. 438. 439. 546.
— antispasmodica, II. 667.
— aperiens, II. 572.
— aperitiva, II. 572.
— Armoraciae, II. 438.
— aromatica, 361.
— cephalica, II. 667.
— Chinae, 499.
— Cochlearine, 547.
— Colocynthidis, 557.
— diuretica, II. 572.
— ad hydropem, II. 30.
— martialis, 660.
— Pini compos., 3.
— — Turionum, II. 439.
— prophylactica, 499.
— purgans, II. 30. 566.
— quercina, II. 435.
— stimulans, II. 572.
— stomachica, 697.
Cerinum, 250.
Ceromel, 249.
Cerussa, II. 336.
— acetata, II. 346.
— alba Hollandica, II. 336.
— — Norica, II. 336.
— Antimonii, 215.
— citrina, II. 334.
— in lamellis — Cerus. alb.
Cervaria alba — Gentiana alba.
— nigra, II. 547.
Cervi cordis ossa, 364.
Cervi priapus, 682.
Cervus Alces, 682.
— Elaphus, 364.
Cetaceum, 453.
Ceterach, 456.
— officinarum, 456.
Ceti auris, 364.
— priapus, 682.
Cetraria Islandica, II. 64.
Chacarilla, 426.
Chaerefolium, 466.
Chaerophyllum, 466.
— odoratum, 466.
— sativum, 466.
— sylvestre, 466.
Chalcantum album, II. 690.
Chalcitis, 641.
Chalybs, 634.
— praeparatus, 632.
— tartarisatus, 663.
Chamaecacte, II. 507.
Chamaeclema, 734.
Chamaedrys, II. 643.
— aquatica, II. 645
Chamaeleagnus, 676.
Chamaeleo album, 421.
Chamaemelum nobile, 468.
— Romanum, 468.
— vulgare, 468.
Chamaemorus, II. 487. 643.
Chamaepithys, II. 643.
— Monspeliaca, II. 644.
Chamaerops humilis, 389.
Chamomilla, 467.
— foetida, 468.
— nobilis, 468.
— Romana, 468.
— nostras, 468.
— vulgaris, 468.
Chanca lagua, 625.
Charta ad cauterium, II. 620.
— cerata, 253.
— Curcumae, 596.
— exploratoria coeruL, II. 48.
— — lutea, 596.
— — rubefacta, II. 49.
— — rubra, II. 49.
— Laccae musci, II. 48.
— Rhabarbari ex infuso Rhei aquoso, II. Add.
— vesicans, 604.
Cheiranthus Cheiri, 466.
Cheiri, 466.
Chelae Cancrorum, 359.
— — praeparatae, 360.
Chelapa, II. 22.
Chelidonium, 467.
— Glaucium, 467.
— majus, 467.
— minus, 467.
Chelonites, 363.
Chenopodium, 468. 469.
— ambrosiacum, 468.
— ambrosioides, 468.
— anthelminticum, 468.
— bonus Henricus, 469.
— Botrys, 469.
— Vulvaria, 469.
Chermes Grana, 470.
Chimaphila corymbosa, 472.
— umbellata—Pyrola umbell.
China, 472. 473.
— Carthagenensis, 474.
— coronae, 473.
— flava, 474.
— fusca, 473.
— orientalis, 472.
— ponderosa, 472.
— regia, 474.
— rubra, 474.
— vera, 472.
Chinachina, 473.
Chinina, 505.
Chininium, 505.
— sulphuricum, 506.
Chininum, 505.
— sulphuricum, 506.
Chinium, 505.
— sulphuricum, 506.
— Centaurium — Erythraea Centaur.
Chloras Calcis, 356.
— kalicus depuratus, II. 397.
— — venalis, II. 397.
— Potassae, II. 397.
— Protoxydi Potassii, II. 397.
Chloretum Auri cum Chloreto Natrii, 299.
— Barii cum Aqua, 314.
— Calcariae, 355.
— Calcii, 367.
— Ferri, 653.
— Hydrargyri, II. 166.
— Natrii, II. 575.
Chlorina, 509.
Chlorinum, 509.
Chlorum, 509.
— Aqua solutum, 510.
— Calcariae, 355.
— liquidum, 510.
Chloruretum Antimonii, 235.
— Auri, 298.
— — et Sodii, 299.
— — — praeparatum, 299.
— Barii, 314.
— Calcii, 367.
— — oxydatum, 355.
— Calcis, 355.
— Magnesii, II. 94.
— Ferri, 652.
— Oxydi Calcii, 355.
— Platinae, II. 333.
— Plumbi, II. 333.
— Potassae, II. 397.
— Potassae oxydat., II. 397.
— Potassii, II. 398.
— — protoxydatum, II 397.
— Sodae, II. 575.
— Sodii, II. 575.
— — Protoxydi, II. 575.
— Stanni, II. 592.
— Zinci, II. 684.
Chocolata alba, II. 497.
— aromatica, 346.
— antivenerea, II. 182.
— Castaneae, 432.
— Lichenis Islandici, II. 65.
— medica, 346.
— purgans, II. 171.
— simplex, 346.
— cum Vanilla praep., 346.
— Vanillae odore, 346.
Christophoriana, 62.
— americana, 62.
Chrysanthemum Leucanthemum, 511.
Chrysolithus, 133. 363.
Chrysoprasius, 133.
Cicer, 511.
— arietinum, 511.
Cichorium, 512.
— Endivia, 512.
— Intybus, 512.
Cicuta, 513.
— aquatica, 513.
— major, 514.
— terrestris, 514.
— virosa, 513.
— vulgaris, 514.
Cicutaria, 466.
— aquatica, 513.
Cicutina s. Cicutinum, 514.
Cina, 520.
Cinchona angustifolia, 474.
— Caribaea, 473.
— condaminea, 473.
— cordifolia — C. lancifolia et oblongif.
— grandifolia — C. oblongif.

Cinchona floribunda, 474.
— lanceolata, 473.
— lancifolia, 474.
— nitida, 473.
— oblongifolia, 474.
— officinalis — China.
— ovata, 473.
— pallida — C. lancifolia.
— purpurea — C. condaminea.
— rubra — C. oblongif.
— scrobiculata — C. condaminea.
Cinchonia, 522.
— acetica, 524.
— sulphurica, 523.
Cinchonina, 522.
— acetica, 524
— sulphurica, 523.
Cinchoninum, 522.
— aceticum, 524.
— sulphuricum, 523.
Cinchonium, 522.
— aceticum, 524
— sulphuricum, 523.
Cineres Animalium ustae, 369.
— clavellati, 377. 378.
— — depurati, II. 378.
Cincus marinus, 681.
Cinis Plumbi, II. 334.
Cinnabaris, II. 152.
— artificialis, II. 152.
— factitia, II. 152.
— nativa, II. 152.
— praeparata, II. 152.
Cinnamomum, 379.
— acutum, 379.
— Indicum, 380.
— Magellanicum, 571.
— Sinense, 380.
— verum, 379.
— Zeylonense, 379.
Cissampelos, 524.
— Caapeba, 524.
— Pareira, 524.
Cistus Creticus, II. 51.
Citras Ammoniaci, 181.
— Ammoniae, 181.
— Calcariae animalis, 368.
— calcicus, 368.
— Calcii Protoxydi, 368.
— Calcis, 368.
— Ferri, 662.
— kalicus, II. 403.
— kalinus, II. 403.
— Morphinae, II. 216.
— Morphini, II. 216.
— Potassae, II. 403.
— — aquosus, II. 404.
— Potassii Protoxydi, II. 403.
Citrullus, 579.
Citrus, 525. 536.
— acida, 536.
— Aurantium, 525.
— medica, 536.
Claretum aromaticum, 210.
— Fructuum, 452.
— ex sex seminibus, 570.
Clematis, 543. II. 675.
— crispa, 543.
— erecta, 542.
— Vitalba, 543.
Cleome dodecandra, II.
Clinopodium montanum, II. 648.
Clutia Eluteria — Cascarilla.
Clysma antispasmodicum, 374. 464. II. 576.
— antispasm. resolv., II. 576.
— adstringens, 679. II. 428.
— ad ascarides, II. 493. 576.
— camphoratum, 374.
— commune, II. 76.
— emolliens, 189. II. 76.
— — anthelmintic., II. 464.
— excitans, 494.
Clysma grassum, 64.
— incitans, 374.
— — et sedans, 284.
— involvens, II. 76.
— nutriens, 683.
— oleosum, II. 76. 243.
— purgans, II. 576.
— refrigerans, 680. II. 392.
— resolvens, II. 416.
— Sabadillae, II. 493.
— sedans et adstring., II. 291.
— — et emolliens, 189. II. 299.
— ad soporosos affectus, 248.
— tonicum et antispasm., 284.
— Vini antimonial. irrit., 248.
Clyssus Antimonii, 56.
— Sulphuris, 56.
Clyster v. Enema.
Cnicus benedictus, 147.
Coagulum aluminosum officinale, II. 300.
Cobaltum, 643.
Coccinella, 644.
— septempunctata, 644.
Coccionella, 644.
Coccognidium, 602.
Coccoloba uvifera, II. 44.
Cocculus, 544.
— Indicus, 644.
— palmatus, 559.
— suberosus, 644.
Coccus, 644.
— baphica, 470.
— Cacti, 644.
— — coccinelliferi, 644.
— cnidius, 602.
— Ficus, II. 47.
— Ilicis, 470.
— Laccae, II. 47.
Cochlearia, 545.
— Armoracia, II. 437.
— hortensis, 646.
— officinalis, 545.
— vulgaris, 545.
Cochlearinum, 545.
Cochlearum folia, 358.
— opercula, 358.
— testae, 367.
Cocos butyracea, 243.
Coeruleum Berolinense, 647.
— montanum, 684.
— Parisiense, 669.
— prussicum nativum, 647.
Codagapala, 550.
Coffea, 550.
— Arabica, 550.
— c. Cortice Peruviano, 474.
— Glandium, II. 436.
Coix Lacryma, II. 49.
Colchicum, 551.
— autumnale, 551.
— Illyricum, 744.
Colcothar, 641.
— Vitrioli, 641.
Colla, 680.
— Piscium, 580.
Collutorium acidul.—Lit. acid.
— adstringens, 139. II 341. 350. 471. 581. 691. 694.
— alcalinum, II. 381.
— aluminosum, 139.
— antiodontalgicum, 752. II. 247. 429.
— antiscorbuticum, 540. 549. 560. 608.
— cum Borace, II. 581.
— Catechu saturnin., II. 350.
— detergens, 48. 587. II. 471. 230. 691.
— — et adstringens, 54.
— excitans, II. 429. 573.
— humectans, 541.
— gingivale, 549.
— mercuriale, II. 185.
Collutorium opiatum, 255.
— saturninum, II. 342.
— sialagogum, II. 429.
— Sinapi, II. 572.
— tonicum — Coll. aluminos.
— e Zinco composit., II. 694.
Collyrium Acetatis Ammoniae liquidi, 176.
— adstringens, 721. II. 473. 686. 692. 694.
— aluminosum, 138.
— anodynum, 576. II. 255. 266.
— boracicum, II. 582.
— de Brun, 96.
— coeruleum, 691.
— crocatum, 576.
— cupratum, 580.
— emolliens, 124.
— exsiccans, 691.
— Fernandezii, II. 175.
— ferruginosum, 649.
— Gimbernati, II. 373.
— ex Hydrargyro muriatico corrosivo, II. 185.
— Hyoscyami, 751.
— de St. Jerneron, II. 693.
— Lanfranci, 269.
— leniens, II. 266.
— mercuriale, II. 178.
— molle, II. 693.
— ex Muriate Hydrargyri oxygenato, II. 177.
— narcoticum, II. 266.
— Neumanni, 176.
— Nihili, II. 686.
— opiaceum, II. 264.
— plumbatum, II. 341.
— Plumbi Acetatis, II. 341.
— — — et Opii, II. 342.
— resolvens, 171. 576. 587. 592. 595. II. 341. 350. 686. 692.
— roborans, 242.
— rubrum, 96. II. 383.
— de Salibus igne fusis, 587.
— saphirinum, 591.
— saturninum, II. 343.
— — opiatum, II. 342.
— sedans, II. 266.
— sedativum, 576.
— siccum, II. 147. 172. 183. 685.
— — ammoniacale, 144.
— simplex, 351.
— Stierncronense, II. 693.
— Supersulphatis Aluminae et Potassae, 138.
— tenquianum, II. 351.
— tonicum, II. 693.
— vitriolicum, II. 691.
— e Vitriolo albo, II. 691.
— Zinci, II. 686. 691.
— — Acetatis, II. 694.
— — Sulphatis, II. 691.
— zincicum, II. 686.
— e Zinco, II. 686.
— — compositum, II. 694.
— — sulphurico, II. 691.
Colocynthina, 563.
Colocynthinum, 563.
Colocynthis, 562.
— praeparata, 563.
Colomba, 559.
Colombo, 559.
Colophonium, II. 636.
Color Indicus, II. 1.
Colubrina, 264. 331.
Columbo, 559.
Colutea arborescens, 552.
Conchae, 367.
— calcinatae, 368.
— citratae, 368.
— marinae, 367.
— — praeparatae, 369.
— Ostrearum, 367.
— praeparatae, 369.
— ustae, 352.

Concrementa Astaci, 369.
Conditum antiepilepticum, II. 267.
— Calami, 348.
— catechuicum, II. 289.
— corroborans, II. 637.
— Cydoniorum, 597.
— epilepticum, II. 604.
— febrifugum, II. 632.
— hydrargyro-unguinosum, II. 124.
— Iridis saccharatum, II. 19.
— muscarium, 122.
— nephreticum, II. 620.
— pectorale, II. 603.
— purgativum, II. 439.
— Satyrii, II. 496.
— tamarindinaceum, II. 563.
— ad vermes, II. 25.
— vermifugum, II. 25.
Coneina s. Coneinum, 514.
Confectio Alkermes, 479.
— Amygdalae, 182.
— Amygdalarum, 183.
— Anisi laxativa, II. 25.
— aromatica, 383. II. 606.
— Aurantiorum Corticum, 526.
— Calami aromatici, 349.
— Cassiae, 430.
— — Fistulae, 430.
— Chinae antiepileptica, 482.
— — antimonialis, 482.
— Cinae Seminis, 521.
— Cinnamomi regia, 386.
— communis, 384.
— cordialis, 383.
— Cynosbatos, II. 467.
— Diaprunum, II. 550.
— Diascordii, II. 289.
— Fistulae, 430.
— Foeniculi, 395.
— Hamech, 554.
— hyacinthina, 575.
— de Hyacintho, 575.
— Japonica, II. 289.
— Iridis, II. 19.
— Margaritar. kermesina, 479.
— opiata, II. 278.
— Opii, II. 278.
— passulata, II. 550.
— — cathartica, II. 550.
— de Prunis, II. 550.
— de Rebecha, II. 29.
— Rosae, II. 466.
— Rosarum, II. 466.
— Rutae, II. 491.
— Santalorum cordialis, 626.
— Scammoniae, II. 489.
— Sennae, II. 540.
— Tanaceti sicca, II. 613.
— vermifuga, 521.
Conium maculatum, 514.
Conserva Absinthii, 12.
— Acetosae, 16.
— Acetosellae, 16.
— Amygdalarum dulcium, 183.
— Angelicae, 198.
— Anthos, II. 477.
— antiscorbutica, 546. II. 234.
— Apii, 265.
— Ari, 278.
— Aurantii, 526.
— Aurantiorum Corticum, 526.
— — Florum, 626.
— Beccabungae, II. 674.
— Bellidis minoris, 320.
— Betonicae, 328.
— Boraginis, 332.
— Botryos ambrosioidis, 470.
— Buglossi, 192.
— Calendulae Florum, 370.
— Capilli Veneris, 65.
— Cardui benedicti, 418.
— Caryophyllorum rubrorum, 609.
Conserva Castiae, 430.
— de Cedro, 537.
— Centaurii minoris, 442.
— Cerefolii, 452.
— Chamaemeli s. Chamomillae Florum, 454.
— Cichorii, 512.
— Cicutae, 514.
— Citri, 537.
— — Aurantii, 526.
— Cochleariae, 546.
— Consolidae majoris, 562.
— Cornorum, 570.
— Cydoniorum, 597.
— Cynosbatos, II. 467.
— Dactylorum, II. 219.
— depectorans, 320.
— Erucae, 334.
— Eryngii, 623.
— Erysimi, 622.
— Farfarae, 630.
— Fumariae, 634.
— Genistae, 692.
— Hederae, 731.
— Hyssopi, 761.
— Inulae, II. 2.
— Juniperi, II. 37.
— Lauro-Cerasi, 451.
— Lepidii, II. 63.
— Liliorum Convallium Florum, 567.
— — alborum Florum, II. 72.
— Majoranae, II. 206.
— Malvae, II. 97.
— Marrubii albi, II. 409.
— Melissae, II. 162.
— Melonum, 670.
— Menthae s. Menthae Foliorum, II. 186.
— Mesembryanthemi crystallini, II. 189.
— Millepedum, II. 211.
— Nasturtii, II. 234.
— Nymphaeae, II. 242.
— Orchidis, II. 490.
— Paeoniae, II. 291.
— Persicorum Florum, II. 376.
— Plantaginis, II. 332.
— Portulacae, II. 370.
— Primulae veris, II. 422.
— Prunorum, II. 424.
— — leniens, II. 424.
— resolvens et aperiens, II. 401.
— Rhododendri Chrysanthi, II. 459.
— Rhoeadis, II. 307.
— Ribium nigror. Folior. II. 461.
— Rorismarini, II. 477.
— Rosae caninae fruct. II. 467.
— — gallicae, II. 467.
— Rosarum, II. 465.
— — adstringens, II. 466.
— — anthelmintica, II. 466.
— — mercurialis, II. 466.
— — sicca, II. 466.
— — vitriolata, II. 465.
— Rutae, II. 491.
— Sabinae, II. 37.
— Salviae, II. 499.
— Scordii, II. 645.
— Sorbi fructuum, II. 688.
— spagyrica, II. 687.
— Symphyti, 562.
— Tamarindorum, II. 610.
— Tanaceti, II. 613.
— Tiliae, II. 620.
— Trifolii fibrini, II. 656.
— Veronicae, II. 674.
— Violarum, II. 677.
— — sicca, II. 677.
Consolida, 562.
— major, 562.
— media, 80.
— minor, II. 423.
— regalis, 607.
Consolida Saracenica, II. 679.
Contrayerva, 565.
— alba, 565.
— Germanica, 190.
— major, 565.
— Mexicana, 566.
— nova, 565.
— Virginiana, 264.
Convallaria majalis, 567.
Convolvulus arvensis, 568.
— Jalapa s. Jalappa, II. 22.
— major, 569.
— Mechoacanna, II. 165.
— minor, 569.
— panduratus, II. App.
— Scammonia, II. 527.
— scoparius, II. 71.
— sepium, 569.
— Turpethum, II. 664.
Conyza coerulea, 622.
— major, 622.
— media, II. 2.
— minor, 622.
— squarrosa, 599.
— vulgaris, 599.
Copaiba, 303.
Copaifera officinalis, 303.
Copal resina, 509.
Coptis trifolia, 569.
Corallina Corsicana, 741.
— officinalis, 741.
— officinarum, 741.
— rubens, 742.
— rubra, 742.
Corallium album, 357.
— praeparatum, 358.
— rubrum, 357.
Cordia Myxa, II. 235.
Cordiale nervinum de Brodum, 116.
Coreopsis bidens, 339.
Coriandrum, 369.
— sativum, 369.
Cornina, 570.
Corninum, 570.
Cornu Alces, 304.
— Cervi, 364.
— — calcinatum, 365.
— — praeparat. sine igne, 365.
— — — philosophice, 365.
— — raspatum, 364.
— — ustum, 365.
— — — praeparatum, 365.
— Rhinocerotis, 304.
— ustum, 365.
Cornus, 570.
— circinata, 570.
— florida, 570.
— mascula, 570.
— sericea, 570.
Coronopus Ruellii, 670.
Corpus pro Balsamo Saponis, II. 630.
— — — Sulphuris, II. 604.
Corrector Opii, II. 604.
— Starkeyi, II. 394.
Cortex Chinae Caraibicus, 473.
— — Caribaeus, 473.
— — Carolinensis, 473.
— — flavus, 473.
— — fuscus, 473.
— — officinalis, 473.
— — Piton, 474.
— — regiae, 473.
— — regius, 473.
— — ruber, 474.
— — rubrae, 474.
— — St. Luciae, 474.
— Citri, 536.
— Conessi, 550.
— Magellanicus, 621.
— Peruvianus, 473.
— — flavus, 473.
— — fuscus, 473.
— — officinalis, 473.

Cortex Peruvianus regius, 473.
— — ruber, 474.
— Poegereba, II. 364.
— profluvii, 550.
— regius, 473.
— Winteranus, 571.
— — spurius, 379. 571.
Corylus, 571.
— Avellana, 571.
Costa, 760.
Costus, 571.
— amarus, 571.
— Arabicus, 571.
— corticosus, 379. 571.
— dulcis, 571.
— hortorum, 303.
— nostras, 760.
— speciosus, 571.
Cotinus, II. 460.
Cotula — Anthemis Cotula.
— aurea, 572.
— foetida, 468.
Cotyledon latea, 572.
— Umbilicus, 572.
Coumaruna odorata, 689.
Coutarea speciosa — China flava.
Cranium humanum, 364.
Crassula, 572.
— major, 572.
Cremor, II. 46.
— Cinnabaris, II. 152.
— cosmeticus, 454.
— Hordei, 748.
— pectoralis, 38. 312. 347.
— Tartari, II. 466.
— — Borace solubilis, II. 411.
— — solubilis, II. 411.
Crepitus Lupi, 333.
Creta, 356.
— alba, 356.
— Gallica, II. 95.
— Plumbi, II. 376.
— plumbica: II. 336.
— praecipitata, 369.
— praeparata, 369.
— pura, 356.
— Sodae, II. 577.
Cristallum und Cristallus, s. Crystallum.
— maritimum, 572.
Crithmum, 572.
Crocus, 572.
— Antimonii, 220.
— autumnalis — C. sativus.
— Ferri, 613.
— Martis, 643.
— — adstringens, 641.
— — aperiens, 643.
— — aperitivus, 643.
— — — antimoniatus, 642.
— — rore majali paratus, 643.
— — sulphuratus, 642.
— — vitriolatus, 641.
— metallorum, 220.
— sativus, 572.
— Solis, 300.
— Veneris, 683.
Croton Cascarilla, 406.
— castaneifolium, II. 47.
— Eleutheria, 406.
— Eluteria, 406.
— lacciferum — Lacca in ramulis.
— Tiglium, 577.
— tinctorium, II. 47.
Cruciata, 576.
Crysoprasius, 133.
Crystalli lunae, 260.
— lunares, 260.
— Tartari, II. 446.
— — pulverisati — Cremor Tart.
— Veneris, 604.
Crystallum minerale, II. 300.
Crystallus mineralis, II. 300.
Cubeba, 578.
Cubebae, 578.
Cuculus, II. 234.
Cucumis, 579.
— agrestis, II. 211.
— asininus, II. 211.
— Colocynthis, 552.
— Melo, 579.
— sativus, 579.
Cucurbita, 579. 580.
— Citrullus, 579.
— Lagenaria, 580.
— Pepo, 580.
Culen, 580.
Culilaban, 580.
Culilawan, 580.
Cuminum, 580.
— Cyminum, 580.
— nigrum, II. 239.
Cunila bulbula, II. 296.
— sativa, II 526.
Cupressinus officinalis, 626.
Cupressus, 581.
— sempervirens, 581.
Cupri Sulphas etc., s. Sulphas Cupri.
Cupridum Ammoniacae liquidum, 695.
Cuprum, 582.
— aceticum, 592. 694.
— Aceto corrosum, 592.
— aluminatum, 587.
— ammoniacale, 588.
— — vitriolicum, 588.
— ammoniacum, 588.
— ammoniato muriaticum, 590.
— — sulphuricum, 588.
— ammoniatum, 588.
— Armenus, 584.
— calcinatum, 584.
— muriatico-ammoniacale, 590
— oxydatum sulphuricum, 584.
— purum, 582.
— — politum, 582.
— subaceticum, 592.
— sulphurico-ammoniat., 588.
— sulphuricum, 584.
— venale, 582.
— vitriolatum, 584.
Cupulae Glandium Quercus, II. 433.
Curcuma, 596.
— angustifolia, 268.
— aromatica — Zedoaria.
— longa, 596.
— rotunda, 596.
— Zedoaria — Zedoarie.
— Zerumbet — Zedoaria.
Cuscuta, 596.
— Epithymum, 596.
— Europaea, 596.
— major, 596.
Cusparia Angustura s. febrifuga — Galipea Cusparia.
Cyanetum Kalii et Ferri venale, 38.
Cyanuretum Ferri, 669.
— — hydratatum, 669.
— Hydrargyri, II. 189.
— Mercurii, II. 189.
— Potassii, 38.
— Zinci, II. 604.
Cyanus, 596.
— segetum, 596.
Cycas circinalis — Sago.
Cyclamen Europaeum, 597.
— officinale, 597.
Cydonia, 597.
— communis, 597.
— cotonea, 597.
— vulgaris, 597.
Cymbalaria, 600.
Cyminum, 580.
Cyna, 520.
Cynanchum, 600.
Cynanchum Arghel, II. 548.
— Monspeliacum, 600. II. 527.
Cynara Cardunculus, 600.
— Scolymus, 600.
Cynips Gallae tinctoriae, 678.
— Quercus Folii, 678.
— Rosae, 319.
Cynoglossa major, 601.
— vulgaris, 601.
Cynoglossum, 601.
— officinale, 601.
Cynomorium, 601.
— coccineum, 601.
Cynorrhodum, II. 465.
Cynosbatos, II. 465.
Cyperus, 601.
— esculentus, 601.
— longus, 601.
— rotundus, 601.
— odoratus, 601.
— orientalis major, 601.
— Romanus, 601.
Cyprus, II. 62.
Cyphoides Galli, II. 626.
Cytinus Hypocistis, 761.
Cytiso-Genista, 693.

D.

Dactyli, 602. II. 318.
Dactylus, 602.
— Idaeus, 358.
Daedalea suaveolens, 321.
Dalbergia monetaria, II. 512.
Daphne, 602.
— Gnidium, 602.
— Laureola, 602.
— Mezereum, 602.
— Thymelaea, 602.
Daphnoides, II. 675.
Datura, 604. 605.
— fastuosa, 605.
— Metel, 604.
— Stramonium, 604.
Daturia, 605.
Daturina, 605.
Daturinum, 605.
Daucus, 607.
— Candianus, 293.
— Carota, 607.
— Creticus, 293.
— cyanops, II. 323.
— gummifer, 319.
— sativus, 607.
— sylvestris, 607.
— vulgaris, 607.
Decoctum adstring., II. 652.
— album, 729. II. 305.
— — c. Gummi Mimosae, 686.
— — Sydenhami, II. 305.
— Alcornoco Corticis, 88.
— Aloës s. Aloës compositum, 110
— Althaeae, 123. 471.
— — officinal. — Dec. Alth.
— — cum Ammoniaco muriatico, 124. 171.
— — compositum, 123.
— — emolliens, 123.
— amaro-aromaticum laxativum, II. 462.
— amarum, 496. II. 432.
— — aethereum, 697.
— — alcoholisatum, 697.
— — anthelmintic. 520. 701.
— — antifebrile, 483.
— Angusturae, 207.
— anthelminticum, 99.
— — Rosensteinii, II. 123.
— Anthemidis nobilis, II. 465.
— antiarthriticum, II. 521
— antiasthmaticum, 440.
— anticachecticum, II. 567.
— antidysentericum, 64.
— antifebrile, 497.

Decoctum antihaemorrhoidale, II. 561.
— antiherpeticum et tonic., 672.
— antiictericum. 498. 672.
— antilacteum, 677.
— antiperiodicum et pectorale. 495.
— antiphthisicum, 516.
— antipsoricum, 215.
— antiscorbuticum, 548. 747. II. 441.
— antisepticum, 267. II. 545.
— antisyphiliticum nutriens, II. 519.
— — Pollini, II. 34
— — Yvo Gaukes, 716.
— antivenereum lax., II. 520.
— — Musitani, II. 670.
— — Passerini vel. Salvadorii, II 522.
— — Ulyssiponense, II. 521.
— apertens, II. 455. 615.
— — et tonicum, II. 245.
— aperitivum, 267. 291.
— — nitratum, 291.
— Araliae nudicaulis, 260.
— Arctii Lappae — Decoct. Bardanae.
— Arnicae Florum, 267.
— Asparagi, 291.
— Astragali exscapi, 293.
— Aurantii Corticis, 529.
— — Foliorum, 529.
— avenaceum Lowerianum, 301.
— Axedarach Corticis, 302.
— Bardanae, 311.
— Bignoniae Catalpae, 440.
— Bistortae, 331.
— Boragnis, 334.
— Bryoniae, 335.
— Carbonatis Potassae Absinthii, II. 287.
— Caricarum. 421.
— carminativum, II. 490
— — pro clystere. 198.
— e Carne gallinacea. 663.
— cum Carne pectorale, II. 68.
— Carnis antispasm., II. 301.
— — aperiens s. aperitiv., II. 486.
— — purificans, II. 5. 684.
— Caryophyllatae, 703.
— — aethereum, 703.
— — cum Cascarilla, 703.
— — cum Rheo, 703.
— Cassiae Fistulae, 439.
— Catechu, 446.
— catholicum, II. 620.
— Centaurii minoris, 448.
— Cerasorum acidi siccor., 452.
— Chamaedryos amar., II. 613.
— Chamaemeli s. Chamomillae, 465.
— — compos., 465.
— Chinae, 492.
— — radicis, 272.
— — acidum, 496.
— — alcalinum, 498.
— — cum Alumine, 491.
— — antisептic. purg., 498.
— — cum Arnica, 494.
— — cum Caryophyllata et Opio, 495.
— — cum Cascarilla, 495.
— — c. China pulver., 496.
— — compositum, 497.
— — — et laxans, 498.
— — factitium, 67.
— — cum Lichene, 495.
— — nitratum, 493.
— — opiatum, 498.
— — cum Potassa, 493.
Decoctum Chinae c. Rheo, 496.
— — cum Senega, 496.
— — cum Serpentaria, 497.
— — cum Valeriana, 497.
— Cichorii, 513.
— Cinae, 520.
— Cinchonae, 492.
— — cardiacum, 497.
— — lancifolae, 492.
— — officinalis, 492.
— Citri Myrsichi, 541.
— Collae Piscium, II. 6.
— Colombae s. Columbo, 561.
— — compositum, 561.
— Colocynthidis, 557.
— commune, II. 465.
— Consolidae, 563.
— Corallinae Corsicanae, 742.
— Cornu Eboridae, 570.
— Cornu Cervi, 668.
— — — citratum, 686
— — — compositum, II. 305.
— — — Elaphi compos., II. 305.
— — — gummos., 720.
— — — cum Mica Panis, 305.
— — cervini, 720.
— Corticis Mezerei, 668.
— — Peruviani, 492.
— Cucumerum cum Extracto Nucis vomicae, II. 241.
— Cydoniae, 599.
— Cynae, 580.
— Daphnes Mezerei, 668.
— depuratus et diuretic., 291
— — et tonic., II. 584.
— Daturae, 605.
— diaphoreticum, II. 66. 714.
— — incitans, II. 519.
— Digitalis, 613.
— diureticum, 258. 716. II. 367. 447.
— — alcalinum, 760.
— — Hafelandi, II. 536.
— Dulcamarae, 619.
— — compositum, 620.
— emmenagogum, II. 367.
— emolliens et carminans, 128.
— Enulae, II. 5.
— — compositum, II. 6.
— febrifugum, 498. II. 381.
— — laxans, 498.
— — magistrale, 498.
— — et pectorale, 495.
— — purgans, 498.
— — salinum, 148.
— — et tonicum, 496.
— — simplex, 68.
— Ficuum, 421.
— Filicis maris, 294.
— Fœnesti, 718.
— ad fungos articulor., II. 351.
— Furfuris, 676.
— — Tritici, 676.
— Gallarum, 679.
— Gei urbani, 703.
— — — aethereum, 703.
— Gentianae compositum, 696.
— Geoffraeae inermis, 701.
— — Jamaicensis, 701.
— — Surinamensis, 701.
— Graminis, 706.
— — compositum, 706.
— Granati Corticis, II. 327. 428.
— — — Radicis, II. 382.
— Gratiolae, 707.
— Guajaci, 713.
— — compositum, 714. II. 628.
— — — et purgans, II. 640.
— Gummi Arabici, 728.
— Haematoxyli, II. 20.
Decoctum Helenii, II. 5.
— — compositum, II. 5.
— Hellebori albi, 739.
— — foetidi, 739.
— Helmintochorti, 742.
— Hippocastani Corticis, 68.
— hordeat. amygdalin., 183.
— Hordei s. per se, 745.
— — acidulatum, 747.
— — acidulum, 747.
— — cum Cera et Oleo, 7.8.
— — curatum, 747.
— — compositum, 747.
— — decorticati, 745.
— — gummosum, 746.
— — integri, 745.
— — simplex, 745.
— hydragogum, 91. II. 536.
— Hydrargyri, II. 123.
— Ichthyocollae compositum, II. 519.
— incitans aromatic., II. 501.
— — nutriens, 215.
— incrassans Fulleri, 728.
— Ipecacuanhae, II. 14.
— Jaceae, II. 91.
— Juglandis, II. 81.
— — compositum, II. 34.
— Juniperi, II. 43.
— — Fructuum carminativum, II. 48.
— — Ligni, II. 43.
— Kalmiae latifoliae, II. 44.
— Lapathi, II. 490.
— Lauri, II. 684.
— laxativum, II. 100.
— — Viennense, II. 562.
— Leontodontis Taraxaci, II. 615.
— Lichenis, II. 65.
— — Islandici, II. 65.
— — — amarum, II. 66.
— — — compos., II. 66.
— — — lacteum, II. 66.
— Ligni Campechensis, II. 70.
— — Campechiani, II. 70.
— Lignorum, 714.
— Lobeliae syphiliticae, II. 84.
— ad lupias synovial. II. 351.
— Lusitanicum, II. 522.
— Malti, II. 95.
— — acidulum, II. 95.
— — per se, II. 95.
— — compos., II. 95.
— Malvae, II. 97.
— — compositum, II. 97.
— Mannae purgans, II. 100.
— masticinum, II. 103.
— mercuriale, II. 123.
— Mercurialis, II. 128.
— Mercurii, II. 128.
— ad metrorrhagiam, 329.
— Mezerei, 668.
— — compositum, 669.
— mucilagineum, 729.
— et Myrrhis, 580.
— narcoticum, II. 286.
— nervinum, 530.
— Nicotianae, II. 286.
— nigrum Alsenii, 498.
— ophthalmicum mucilaginosum, 123.
— Orchidis Morionis aromaticum, II.
— Oryzae, II. 208.
— — acidulatum, II. 208.
— Papaveris s. Papaver. albi, II. 310.
— Pareirae, 585.
— Parietariae, II. 313.
— Passularum, II. 680.
— pectorale, 247. II. 36. 83. 366. 367.
— — corroborans, II. 397.

Decoctum pectorale et incisivum, II. 536.
— — nutriens, II. 66.
— — solutivum, II. 567.
— — — et incitans. II. 66.
— — in phthisi, II. 378.
Perdicae Foliorum, II. 314.
Pini Turionum, 3. II. 325.
— — saponatum, 3
— — — vinos Hoffm., 3.
Poltini, II. 34.
Polygalae amarae, II. 366.
— — Virginicae, II 366.
— — Senegae, II. 366.
Pomorum, II. 368.
del Pomponaccio, II. 679.
Prunorum cum Senna, II. 561.
Pruni Padi, 462.
Pruriens, II. 366.
— antiphlogistic., II. 424.
Quassiae, II. 432.
— compositum, II. 432.
Quercus, II. 434.
— cum Aceto, II. 435.
— cum Alumine, II. 435.
— alumnosum, II. 435.
— Roboris, II. 434.
Quinquae comp. et lax., 436.
Quinquae Radicum, 291.
Retanhiae, II. 443.
refrigerans Lieutaud, 748.
resolvens, II. 675.
— — diuretic., II. 395. 401.
Rhabarbari, II. 482.
Rhododendri chrysanthi, II. 459.
Rubi villosi, II. 487.
Rubiae, II. 486.
— compositum, II. 486.
Rutae zincatum, II. 693.
Sabinae, II. 33.
de Salep Radice, II. 496.
Salicariae, II. 497.
Salicis, II. 499.
— compositum, II. 499.
Sambuci Cortices, II. 509.
Santali citrini, II. 513.
Saponariae, II. 515.
Sarsae, II. 517.
Sarsaparillae, II. 517.
— ex Callac, II. 522.
— compos., II. 518. 521.
— cum Mezereo, II. 521.
saturninum, II. 339.
Scillae, II. 530.
Scorzonerae hexandricum, II. 544.
— solutivum, II. 544.
Secalis cornuti, II. 548.
Seminum Cydoniorum, 599.
Senegae, II. 366.
Serpentariae Virg., 265.
Simarubae, II. 629.
Smilacis Sarsaparillae, II. 517.
Specierum guajacinarum, II. 515.
— — cum Rheo, II. 516.
— — cum Mezereo, II. 516.
Spigeliae, II. 588.
Spongiae ustae, 415.
Staphisagriae, 608.
stomachic. resolv., II. 392.
strumale, 415.
contra strumas, 416.
Suberis Corticis, II. 434.
sudoriferum, II. 518.
sudorificum, 214.
Sulphureti Calcis Hoffmanni, 234.
syphiliticum robor., II. 35.
— Yvo Gaukes, 715.
Decoctum Taboci, II. 236.
— Tamarindorum, II. 610.
— — composit., II. 610.
— Taraxaci, II. 615.
— — composit., II. 615.
— Tartari citrati, II. 410.
— — crystalloram, II. 409.
— temperans Lieutaud, 748.
— tonicum, II. 486.
— — et lenitens, 488.
— Tormentillae, II. 632.
— Ulmi, II. 660.
— — campestris, II. 660.
— Uvae Ursi Folibr., II. 661.
— Veratri, 739.
— Verbasci anodyn., II. 673.
— vermifugum, 520. 742.
— Violae tricoloris c. Aqua, II. 21.
— — — cum Lacte, II. 21.
— Visci albi, II. 679.
— vomitivum, 289.
— Zittmanni, II. 522.
Decoctura, Decoctum.
Delphinium, 606.
Delphinianum, 606.
Delphinium, 606.
Delphinum, 607.
— Consolida, 607.
— Staphysagria, 608.
Delphinus edentulus v. Orca, 453.
Dens Leonis, II. 615.
Dentales, 355.
Dentalia, 358.
Dentalium Dentalis, 358.
— Entalis, 358.
Dentaria, 608. II. 128.
— digitata, 608.
— major, 609.
— minor, 608.
— pinnata, 609.
Dentes Apri, 364.
— Equi marini, 364.
— Hippopotami, 364.
— Monocerotis s. Unicornu marini, 363.
Dentillaria, 609.
Desmarestia aculeata, 741.
Desvauxia fluitans, 609.
Deutpacetas Cupri, 594.
— Ferri, 659.
— Mercurii, II. 206.
— Sodii, II. 585.
Deutocarbonas Potassii, II. 384.
— Sodii, II. 579.
Deutochloruretum Hydrargyri, II. 176.
— Mercurii, II. 175.
Deutohydrochloras Antimonii, 235.
— Cupri, 590.
— — et Ammoniaci, 590.
— Hydrargyri, II. 175.
— Mercurii, II. 175. 177.
— Stanni, II. 592.
Deutoiodas Mercurii, II. 198.
Deutoioduretum Mercurii, II. 198.
Deutomurias Antimonii, 235.
— Hydrargyri, II. 175.
— Mercurii, II. 175.
— Stanni, II. 592.
— Stibii, 235.
Deutonitras Cupri, 589.
— Hydrargyri solutus, II. 198.
— Mercurii, II. 198.
Deutophosphas Cupri, 593.
Deutosulfas s. Deutosulphas.
Deutosulfuretum Hydrargyri rubrum — Cinnabaris artific.
Deutosulphas Cupri, 594.
— — et Ammoniae, 588.
— Potassii — Kali sulphuric.
— Sodii — Natrum sulphuric.
Deutosulphuretum Antimonii, 229.
— Hydrargyri rubr, II. 152.
Deutotartras Potassii, II. 404.
— — et Sodii — Tart. natronat.
Deutoxycyanuretum Ferri hydrat., 660.
Deutoxydum Antimonii, 214.
— Ferri, 638.
— Hydrargyri, II. 136.
— — nitrat. — Hydr. oxydat. rubr.
— Hydrogenii, II 300.
— Mercurii, II. 144.
— Plumbi, II. 334.
— — rubrum, II. 334.
— Potassii — Kali caust. sicc.
— — liquidum, II. 370.
— Zinci — Flores Zinci.
Deutoxysulphuretum Sodii, II. 574.
Diacaryon, II. 33.
Diacodium liqd. Mont., II. 311.
Diacrydium, II. 527.
— cydoniatum, II. 528.
— glyzyrrhizatum, II. 528.
— Liquiritiae edulcorat., II. 528.
— rosatum, II. 528.
— sulphuratum, II. 527.
Diacydonium aromaticum, 598.
— Jalappinum, II. 29.
— lucidum, 597.
— — Jalappinum, II. 29.
— simplex, 597.
— solutivum pellucid., II. 29.
— cum speciebus, 598.
Diamoron cum Melle, II. 488.
Dianthus Caryophyllus, 609.
Diapensia, II. 512.
Diascordium liquidum, 289 616.
Dictamnus albus, 610.
— Creticus, II. 295.
Diervilla, 610.
— Tournefortii, 610.
Digestivum liquefactum, II. 621.
— Plenkii, II 622.
Digitalinum, 610.
Digitalis, 610.
— ferruginea, 610.
— purpurea, 610.
Diospyros, 617.
— Ebenum, 617.
— Virginiana, 617.
Dipsacus Fullonum, 617.
— sylvestris, 617.
Diptamnus officinalis, 610.
Dolichos pruriens — Stizolobium.
Doronicum Germanicum, 266.
— latifolium, 617.
— officinale, 617.
— Pardalianches, 617.
— plantagineum, 617.
— Plantaginis folio, 266.
— Romanum, 617.
Dorstenia Contrayerva, 605.
Dracaena Draco, II. 512.
Draco mitigatus, II. 165.
Dracocephalum Moldavica, II. 108.
Draconinum, II. 512.
Draconis Sanguis, II. 571.
Dracontia minor, 278.
Dracontium foetidum, 617.
Dracunculus esculentus, 277.
— hortensis, 277.
Dragees vermifugae, II. 160.
— Keyseri, II. 204.
Dropax antiparalyticum, II. 329.
Drosera, 617.
— longifolia, 617.
— rotundifolia, 618.
Drymis Winteri, 571.
Dryobalanops Camphora, 371.

Dulcamara, 618.
Dulcichinum, 601.

E.

Ebulus, II. 507.
Ebur, 364.
— fossile, 364.
— ustum album, 365.
Echioglossum, II. 245.
Echium vulgare, 620.
Eclegma album, 187.
— amygdalinum, 187.
— gummoso - oleosum, 187.
Elaeocarpus copallifera, 569.
Elaeosaccharum Absinthii, II. Add.
— Anisi, 207.
— Aurantii s. Aurantiorum, 527.
— — Florum, 527.
— Cajeputi, 347.
— Calami, 349.
— Carvi, 423.
— Caryophyll. arom., 425.
— Cassiae cinnam., 385.
— Chamaemeli, 460.
— Chamomillae, 460.
— Cinnamomi s. Cinn. acuti, 385.
— Citri, 537.
— Crotonis, 577.
— Foeniculi, 196.
— Juniperi, II. 41.
— Macidis, II. 224.
— Menthae crispae, II. 117.
— — piperitae s. piperitidis, II. 117.
— Myrrhae, II. 226.
— Salviae, II. Add.
— Sassafras, II. 520.
— Succini, II. 599.
— Terebinthinae, II. 632.
— Valerianae, II. 670.
Elais Guineensis, II. 243.
Elaterinum, II. 211.
Elaterium, II. 212.
Elatinum, II. 211.
Electrum, II. 596.
Electuarium de Acoro, 349.
— adstringens, 441. 480. 481. 586. II. 45. 430. 443. 288. 291.
— — Duhaumi, 137.
— — Fulleri, II. 407.
— alcalino - ferratum, 641.
— Aloës compositum, 104.
— — Hydrarg. mur. et Ferri, 636.
— alterans, II. 139.
— anodynum pro infantibus, II. 91.
— antacidum, II. 91.
— anthelminticum, 521. II. 175. 304. 661.
— — Heisteri, II. 138.
— — Vogleri, II. 175.
— antiarthriticum, II. 165.
— anticachecticum, II. 328.
— anticardialgicum, 480.
— antidysenteric., 207. II. 419.
— antiepilepticum, 451. 482. II. 664.
— antifebrile, 480.
— — Masdevalli, 480.
— antihaemorrhoidale, II. 100. 348. 553.
— antiherpeticum, 244. 248. II. 142. 182.
— antihydrophobicum, II. 33.
— antilyssicum, II. 113.
— antirheumaticum, II. 623.
— antiscorbuticum, 545. II. 571.
— antiscrophulos., II. 401. 402.
— antispasmodicum, 482. II. 664.
Electuarium antisyphiliticum, II. 184.
— aperiens, II. 635. 650.
— aphrodisiacum, 472. II. 497.
— Arnicae Florum, 266.
— aromatico - opiatum, II. 278.
— benedictum laxativum, 283. 458.
— bechicum, II. 90.
— Boleti suaveolentis, 331.
— cum Calbano, 424.
— cardiacum, 308.
— caryocostinum, II. 529.
— Cassiae, 430.
— — Fistulae, 430.
— — lenitivum, 430.
— — Sennae, II. 640.
— — tamarindinatum, 430.
— Catechu, II. 289.
— — compositum, II. 289.
— catharticum, 550.
— — commune, 550.
— — duplicatum, II. 564.
— ceratum, 19.
— chalybeatum, 636. 646.
— e Chamaemelo, 458.
— cum Chamomilla, 458.
— Chinae, 482.
— — alcalinum, 480.
— — antimoniatum, 482.
— Cochleariae c. Calamo, 545.
— Contrayervae, 566.
— cordiale, 576.
— Cremoris Tartari, II. 407.
— demulcens, 441.
— dentifricium, 163. II. 408.
— desobstruens, II. 535.
— detergens, 80. 428.
— diacatholicon, II. 554.
— diaphoreticum, II. 529.
— diaprunum, II. 550.
— ad diarrhoeam, 244.
— diasatyrium, II. 497.
— diascordium, II. 289.
— dietartarum, II. 283.
— diatragacanthae, II. 653.
— diureticum, II. 39. 535.
— ad dysenteriam, II. 419.
— eccoproticum, II. 550.
— eroticum, II. 120.
— febrifugum, 167. 265. 479. 480.
— — et aperiens, II. 402.
— ad flatus, 441.
— Florum Arnicae, 266.
— foetidum, 437.
— gingivale, 137. 443. II. 228.
— ad gingivas, II. 228.
— de Graphite, 637.
— ad haemoptysin, 749.
— ad herpetem, II. 142.
— hierae picrae, 104.
— hydragogum, II. 24. 29. 529.
— Hyoscyami opiatum, II. 293.
— pro infantibus, II. 91.
— ingrassans, II. 68. 309.
— Ipecacuanhae moschatum, II. 13.
— joviale ad taeniam, II. 591.
— de Junipero, II. 38. 39.
— Lauri Baccarum, 57.
— cum Lauro - Cerasi Conserva, 451.
— laxans et emmenagog., 98.
— laxativum, 430. II. 611. 623.
— lenitivum, II. 409. 550. 555.
— — cum Sulphure, II. 551.
— Limaturae Ferri Garzonii, 636.
— de Manna, II. 99.
— martiatum, 636.
— Mimosae Catechu compositum, II. 289.
— — contra morsum canis rabidi, II. 113.
Electuarium mithridaticum, II. 91. 275.
— mundificans, 718. II. 554.
— — pauperum, 718.
— — Werlhofii, 718.
— Myrrhae compositum, 443.
— opiatum, 140. 278.
— — ad dentes, 137.
— — polypharmacon, II. 278.
— Opii compositum, II. 278.
— pro pecoribus, II. 228.
— pectorale, II. 365. 603. 695.
— — Rineri, II. 29.
— Piperinum, II. 528.
— Polygalae amarae, II. 306.
— purgans, II. 90. 155. 409. 529. 554. 603.
— purificans, II. 14.
— ad rabiem, II. 113.
— refrigerans, II. 409.
— requies Nicolai, II. 293.
— resolvens antihepaticum, II. 135.
— — urinale diureticum, 641. II. 535.
— resumptivum, 630.
— de Rhabarbaro, II. 554.
— Rhei compositum, II. 564.
— roborans, 480.
— du Roc amore, 466.
— sanans, 251.
— Scammonii, II. 529.
— Scordii, II. 289.
— — Fracastorii, II. 289.
— — opiatum, II. 289.
— — opiatum, II. 289.
— e Scordio, II. 289.
— ad scrophulas, II. 401. 402.
— sedativum et adstringens, 441.
— de Senna febrifugum, 481.
— e Senna, II. 550.
— — cum Carbone, II. 554.
— Sennae, II. 550.
— — compositum, II. 550.
— — cum Pulpis, II. 550.
— contra stomacacen, 137.
— stomachicum, 328. 526. II. 449.
— — alterans, II. 328.
— Tamarindorum, II. 550. 611. 622.
— temperans, II. 391.
— terebinthinatum, II. 632.
— thebaicum, II. 278.
— Theriaca, II. 278.
— theriacale magnum, II. 278.
— tonico - resolvens, 641.
— tonicum, 480. 641.
— Tragacanthae, II. 653.
— traumaticum, 333. II. 467.
— ad vermes, II. 175.
— vermifugum, II. 25. 175. 591. 690.
— vomitivum, II. 13.
Elemi, 690.
— occidentale, 690.
— orientale, 690.
Elemitochorton, 341.
Elemiinum, 690.
Elettaria Cardamomum, 416.
Eleutheria, 416.
Elichrysum montanum, 211.
Elixir acido - aromaticum, 395.
— acidum, 55.
— — Dippelii, 56.
— — Halleri, 56.
— adstringens, II. 71.
— ad longam vitam, 114.
— Alkermes, 394.
— Aloës saponaceum, 109.
— amarum, 109. 114. 490. 535. II. 406.
— — aquosum, II. 529. 536.
— — Peyrilhe, 699

Elixir amarum vinosum, 698. 699. II. 658.
— Americanum Courcellesii, II. 6.
— ammoniato-opiatum, II. 84.
— antacidum, 362. II. 432.
— anthelminticum Suecorum, II. 31.
— antiapoplecticum Jacobinorum, 396.
— antiarthriticum cum Aconito, 661.
— caribaeum, 712.
— antiasthmaticum, II. 458.
— Lemorti, 640.
— anticolicum crudatum, 106.
— antifebrile, 605.
— antihypochondriacum, 504.
— antihystericum, 436. 437.
— officinale, 437. 438.
— antinephriticum, 56.
— antiodontalgicum, II. 429.
— antipodagricum, 56.
— antiscorbuticum, II. 658.
— — amarum, 649.
— — Boerhavii, 648.
— — Seldi, 648.
— antiscrophulosum Peyrilhe, 699.
— antisepticum, 505.
— antispasmodic., 361. II. 669.
— antisyphiliticum, 394.
— antivenereum, 394.
— aperiens, II. 106.
— aperitivum, 105. II. 617.
— Clauderi, 109.
— cum Aqua Calcariae ustae, II. 432.
— aromaticum, 219. 260. 302.
— — acidum, 395.
— — adstringens, II. 640.
— asthmaticum, II. 268.
— Aurantiorum compos., 532. 536.
— aurantii, 660.
— balsamicum, 631. 632.
— — Hoffmanni, 631. 632.
— — pector. tolutan., 312.
— — purificans, II. 183.
— — spirituosum Hoffmanni, II. 646.
— — Werlhofii, 602.
— de Cedro, 540.
— cholagogum, 106.
— Citri, 540.
— — purgans, II. 31.
— cordiale et stomachic., 106.
— Croci c. Castoreo, 438.
— Daffyi, 31.
— Duboisii, 705.
— dulce Rhei, II. 458.
— febrifugum, 67. 505.
— foetidum, 437.
— Gambogiae alcalin., 733.
— Glyzyrrhizae, II. 83.
— Guajaci volatile, 712.
— guajacinum, 712.
— — volatile, 712.
— Hippocastani Extracti, 61.
— Jalapae composit., II. 31.
— Jernitzii, 114.
— juniperinum, II. 40.
— — malvaticum, II. 40.
— mastichinum, II. 104.
— Mastichis, II. 104.
— de Mittie, II. 697.
— Myrrhae, II. 230.
— Papaveris, II. 258.
— paregoric., II. 257. 258. 269.
— pectorale, 308.
— — anglicum, II. 540.
— — dulce, II. 83.
— — Elsneri, II. 6.
— — Regis Danor. s. Daniae, II. 83.
Elixir pectorale simplex, II. 83.
— — Wedelii, 538.
— polychrestum Halense, II. 670.
— — pungens, II. 589.
— proprietatis, 106.
— — c. Acido, Boerhavii, Paracelsi, 106.
— — sine Acido, 106.
— — albam Helmonti, 106.
— — antiscorbuticum, 108.
— — aquosum, 109.
— — dulce, 106.
— — Paracelsi, 108.
— — rhabarbarinum, 115.
— — c. Rhabarbaro, 115.
— — cum Rheo, 115.
— — Stahlii, 109.
— Radeliffii, 109.
— Rawlini, 660.
— resolvens, 403. 405. 617.
— Rhabarbari, II. 458.
— Rhei amarum, 457.
— — compositum, II. 457.
— — dulce, II. 457. 458.
— Ringelmanni, II. 83.
— roborans, 504. 657.
— — acidum, 428.
— — Whyttii, 504.
— sacrum, 113.
— salutis, II. 457.
— scorbuticum, 649.
— Sennae, II. 660.
— de spina, 116.
— de Squillis, II. Add.
— stomachicum, 114. 129. 308. 531. 532.
— — amarum, 698.
— — aquosum, 696.
— — dulcificatum, 114.
— — spirituosum, 504.
— — temperatum, 532.
— — Viennense, 531.
— de Stoughton, 114.
— e Succo Glycyrrhiz., II. 83.
— — Liquiritiae, II. 83.
— sudoriferum, II. 259.
— — Lettsomii, II. 259.
— sudorificum Willisii, II. 17.
— suecicum, 114.
— sulphurico-acidum, 56.
— tonicum, 113.
— traumaticum, 321.
— uterinum, 437.
— — Crollii, 438.
— vermifug. de Reginhau, 116.
— viscerale, 8. 531. 532. 536.
— — Hoffmanni, 532.
— — Rosensteinii,
— vitae Matthioli, 300.
— — mulierum, II. 506.
— Vitrioli, 395.
— — acido-aromatic., 396.
— — aromaticum, 395.
— — dulce, 395.
— — Edimburgensium, 396.
— — Mynsichti, 396.
— — c. Tinctura aromatica, 395.
— Weighti, II. 186.
— Whyttii, 504.
Elleborus, 736.
Eluteria, 426.
Embrocatio ammoniacalis, 161. 163.
— refrigerans, 77.
— resolvens, 177. 178.
— Saponis rubefaciens, 403.
Emetina, 621. II. 11.
Emetinum, 621. II. 11.
Empetrum, 744.
Emplastrum adhaesivum, 690. II. 638. 639. 642.
— — Anglicum, 690.
Emplastrum adhaesiv. Woodstockii, 690.
— adstringens, II. 364.
— album coctum, II. 363.
— de Althaea, 168.
— Ammoniaci, 338. 724.
— — c. Hydrargyro, II. 133.
— — c. Mercurio, II. 133.
— de Ammoniaco, 338. 724.
— — c. Mercurio, II. 133.
— ammoniaco-galbanicum, 338.
— — mercuriale, II. 133.
— Ammonii c. Camphora, 168.
— Andreae a Cruce, II. 640.
— Anglicanum, 690.
— Anglo-saxonicum, II. 362.
— Anglicum, 690.
— anodynum, II. 272. 274. 353.
— antiarthriticum, II. 362.
— anticancrosum, II. 370.
— anticolicum, 343.
— antihaemorrhoidale, II. 287.
— antihystericum, 343. 724.
— antiodontalgicum, II. 105.
— antispasmodicum, II. 271.
— antistrumale, 244.
— ad s. contra apoplexiam, II. 625.
— aromaticum, 384. 444. 726.
— Asae foetidae, 724.
— — et Ammoniaci, 724.
— — compos., 724.
— — matricale, 343.
— Asae foetidae. Empl. Asae foetidae.
— attrahens, II. 638. 639.
— balsamicum, 2. 421.
— — Schiffhausii, II. 363.
— Bechholzii, 344.
— Belladonnae, 397.
— benedictum, II. 364.
— Betonicae, 398.
— ad bubones venereos, II. 134.
— calefaciens, 408.
— camphoratum Stahlii, II. 652.
— e Cantharidibus epispast. solidius, 405.
— Cantharidis, 405.
— — perpetuum, 409.
— — resinosum, 409.
— — vesicatoriae, 405.
— — — compos., 409.
— Cantharidum, 405.
— — camphorat., 408.
— — cereum, 405.
— — cum Euphorbio, 409.
— — ordinarium, 405.
— — perpetuum, 409.
— — resinosum, 405.
— Capucinorum, 627.
— Carbonatis Plumbi ustum, II. 364.
— catagmaticum, 655.
— cephalicum, II. 274.
— Cerae, 253. II. 638.
— Cerae terebinthinatum, II. 638. 639.
— cereum, II. 638. 639.
— Cerussae, II. 363.
— — compositum, II. 364.
— Cetacei, 463.
— — album, 463.
— de Cicuta, 517.
— — cum Ammoniaco, 518.
— — composit., 518.
— Cicutae s. de Cicuta, 517.
— citrinum, 128. 129. II. 638. 639.
— ad clavos pedum, 159.
— ad colicam, II. 274.

Emplastrum Collae ad hernias, II. 357.
— commune, II. 338. 363. 638.
— — adhaesivum, II. 642.
— — attrahens, II. 638.
— — gummatum, 338.
— — cum Resina, II. 642.
— confortativum Vigonis, II. 366.
— Conii, 517.
— — maculati, 517.
— e Conio, 517.
— consolidans, II. 668.
— — vegetabile, 444.
— corrosivum, II. 281.
— Croci compositum, 344.
— de Crusta Panis, II. 668.
— Cumini, 581.
— — compositum, 581.
— — saponaceum, II. 400.
— e Cumino, 581.
— defensivum, 642.
— — rubrum, 642. II. 335. 366.
— — viride, II. 640.
— detergens rubrum, II. 395.
— diabotanum Mondelli, II. 359.
— diachalciteos, II. 366.
— diachylon s. diachylum, II. 366.
— — compos., 338.
— — c. Gummatibus, 338
— — gummatum, 338.
— — c. Gummi, 338.
— — c. Gummi - Resinis, 338.
— — simplex, II. 362. 363.
— diapalmae, II. 363.
— diaphoenix, II. 363. 639.
— diaphoreticum Mynsichti, 336.
— diapompholigos, II. 669.
— diasulphur. Rulandi, II. 288.
— Digitalis, 646.
— divinum, II. 358.
— ad dolores dentium, II. 105.
— de Doyen, II. 364.
— emolliens, 128
— epispasticum, 406.
— — camphoratum, 405.
— epuloticum, II. 353.
— Euphorbii, 409.
— de Euphorbio, 409. 627.
— Ferri, II. 365.
— Illii, 338.
— — Zachariae, 642.
— flavum, 128. II. 399.
— Foenu graeci s. e Foenu graeco, 728.
— foetidum, 343. 734.
— ad fonticulos, 258. II. 385.
— ad fracturas, 565.
— — et luxationes, 565.
— frigidum Riedlini, 130.
— fundens, II. 389. 396.
— ad fungos articulor., 627.
— fuscum, II. 364.
— Galbani, 338.
— — camphorat., 338.
— — compositum, 338.
— — crocat., 341.
— — roborans, 343.
— — saturninum, 338.
— — simplex, 338.
— de s. e Galbano, 338.
— — crocatum, 341.
— ad ganglia, 725.
— glutinans Litharygri, II. 642.
— glutinosum, 600.
— de Graphite, 637.
— Gratia Dei, II. 627.
— griseum, II. 363. 668.
— — costum, II. 362.
— Guillermi scriptor., II. 607.
— Gummi c. Gummiresib., 338.
— — resinosis, ibid.
— gummatum, 338.
— cum Gummi, 338.
— gummi-resinosum, 724.
— c. s. e Gummi Resinis 338.
— gummosum, 338. 724.
— — compositum, 340.
— ad hernias, 564.
— — Saumé, 564.
— pro herniosis, 564.
— Hjerneri, II. 365.
— Hydrargyri, II. 132.
— — cum Conio, II. 134.
— — — et Opio, II. 134.
— hydrargyricum, II. 132.
— ex Hydrargyro, II. 132.
— Hyoscyami, 753.
— de Hyoscyamo, 753.
— Ichthyocollae telae inductum, 690.
— imperiale, II. 357.
— incognitum, II. 515.
— irritans, 405.
— ischiadicum, 344. 627.
— Janini, 405.
— Juchii, II. 138.
— labiale album, 343.
— Ladani, II. 641.
— — compos., II. 91.
— de Lapide calaminari, II. 668.
— Lauri Sebastiani, 57.
— Lithargyri, II. 352.
— — cum Resina Pini, II. 642.
— — compositi., 338.
— — glutinans, II. 642.
— — c. Hydrargyro, II. 132.
— — simplex, II. 352. 353.
— lithargyricum cum Resina, II. 642.
— — Lithargyrii simpl., II. 352.
— ad lapiam, 694.
— Lythargyrii s. Empl. Litharg.
— Lyttae vesicatoriae, 405.
— magneticum, 276.
— malacticum cl. Gummi, 130.
— — sine Gummi, 130.
— mammillare, 655. II. 362. 420.
— ad mammillas, 1485.
— mastichinum, II. 105.
— matricale, 343.
— Matris, II. 362.
— maturans, II. 642.
— Meliloti, II. 100.
— — camphoratum, II. 107.
— Meloës vesicatorius, 405.
— — — compos., 409.
— mercuriale, II. 138. et Add.
— — gummosum, II. 133.
— — resolvens, II. 132.
— Mercurii cum Genio et Opio, II. 134.
— Minii adustum, II. 361.
— — camphorat., II. 361.
— miraculosum, II. 362.
— mesehatum, II. 218.
— de Mucilaginibus, 724.
— mucilaginosum, 128.
— de Nicotiana, II. 236.
— nigrum, 344.
— — Becholdi, 344.
— — sulphuratum, 344.
— Norimbergense, II. 362.
— Noricum, II. 362.
— odontalgicum, 408. II. 274.
— opistatum, II. 274.
— Opii, II. 268.
— Opodeldoc, II. 357.
— oxycroceum, 341.
— Oxydi Ferri rubri, 642.
— — s. ex Oxydo Plumbi diabotanum, II. 359.
— Oxydi Plumbi epuloticum, II. 353.
— — II. mucilagineum, II. 352.
— — — rubri camphorat., II. 361.
— — — rubrum, II. 355.
— — — semivitrei, II. 352.
— — — — c. Resina, II. 642.
— — — — Pini, II. 642.
— — — — compositi., II. 420.
— — — — gummos., 338.
— — — — resinos., II. 642.
— — — — e Sulphate Ferri calcinato, II. 366.
— — plumbici, II. 352.
— Ovyduli Plumbi semivitrei, II. 352.
— — — gummosum, 338.
— — — adust., II. 361.
— oxynitratis Hydrargyri et Ammoniae, II. Add.
— perpetuum, 409.
— peruvianum, 309.
— piceum, II. 638. 639.
— Picis, II. 638. 639.
— — composit., II. 640.
— — liquidae, II. 331.
— — navalis, II. 638. 639.
— — nigrae regium, 564.
— — et Resinae, II. 640.
— — solidae, II. 638. 639.
— piperitum, II. 349.
— Plumbi, 352.
— — gummi-resinos., 338.
— — gummosum, 338.
— — nigrum, II. 363.
— — Protoxydi fusi, II. 352.
— — — fuscum, II. 354.
— — — simplex, II. 352.
— — Subcarbonatis comp. II. 364.
— e Plumbo compos., II. 363.
— polychrestum, II. 642.
— Porri, II. 274.
— Priorii ad hernias, 564.
— Pyrethri, II. 129.
— — contra rachitidem, II. 640.
— Ranarum simplex, II. 389.
— de Rana sine Mercurio, II. 389.
— regale, II. 275.
— e Resina elastica, II. 644.
— cum Resina, II. 642.
— Resinae, II. 639. 642.
— Resinar. glutinans, II. 640.
— resinosum, II. 642.
— — Cantharidum, 405.
— — sulphuratum, II. 607.
— resolutivum, II. 359.
— resolvens, 272. 689. 724. 725. II. 123. 131. 335. 336. 340. 376.
— — sinapinicat., 168.
— — et anticancrosum, II. 376.
— — composit., II. 134.
— — c. Mercurio, II. 134.
— — opisteum, II. 361.
— — e quatuor fundantib. s. ex mixtis quatuor resolventibus, II. 131.
— — Rastingii, II. 357.
— — c. Sapone et Camphora, II. 421.
— — Schmuckeri, 724.
— Rhei composit., 118.
— roborans, 642. II. 364. 365. 638. 642.
— rubefaciens, 405. 408. 627.

Emplastrum rubefaciens, 668.
— ruhrum, 341. II. 338.
— contra rapturam, 669.
— santalinum, II. 513.
— saponaceo - plumbicum, II. 365.
— saponaceum, II. 420.
— — de Barbette, II. 363.
— saponatum, II. 420.
— — camphosatum, II. 421.
— de Sapone, II. 420.
— Saponis, II. 420.
— — ammoniaci, 272.
— — camphorat., II. 421.
— saturninum, II. 689.
— — Mynsichti, II. 689.
— Scammonii, et Turpethi compos., II. 529.
— de Scrophularia, 693.
— sevi anodynum, II. 353.
— Siliquarum, II. 355.
— — imperiale, II. 357.
— simplex, II. 352. 353. 638. 642.
— — agglutinans, II. 642.
— — glutinans, II. 642.
— de Spermate Ceti compositum, 638.
— — Rhazarum, II. 363.
— Spermatis Ceti, 663.
— splenicum, 720.
— stibiatum, 244.
— stictherium, 226. 638. 639.
— — Rembergense, II. 639.
— stomachicum, II. 51. 262. 329. 608.
— ad strumam, 644.
— stypticum, 642. II. 366. 642.
— de Styrace, II. 366.
— Styracis stomachi, II. 506.
— Subcarbonatis Plumbi, II. 363.
— — compos., II. 365.
— sulphuratum, 344. II. 228. 607.
— suppuratorium, 236.
— Tabaci, II. 338.
— de Tacamahaca, II. 608.
— tacamahacinum, II. 608.
— ad tempora, II. 224.
— Thuris cum Galbano, II. 366.
— ad tormina ventris, 274.
— Trifolii Meliloti, II. 106.
— triphармacum, II. 361.
— universale, II. 366.
— ad verrucas, II. 366.
— vesicatorium, 406.
— — Janini, 409.
— — Monspeliense, 409.
— — pulveratum, 405.
— — perpetuum, 409.
— — compositum, 409.
— Vigonis cum Mercurio, II. 359.
— — Mercurio, II. 133.
— viride, 503.
— — compositum, 503.
— volatile, 668.
— zinckico - plumbicum, II. 689.
Emulsio Acaciae Arabicae, 185.
— adstringens, 185. II. 485.
— Ammoniaci simplex, 719.
— Amygdalarum, 183.
— — camphorata, 184.
— — camphorata, II. 91.
— — c. Manna, 186.
— Amygdali communis, 183.
— amygdalina, 183.
— — hordeata, 183.
— anthelmintica, II. 295.
— anticatarrhalis, II. 318.
— antihysterica, 284.
— antimonialis camphorata, 244.
— antirheumatica, 731.
— Arabica, 183.
— c. Bals. Sulphuris anis., II. 604.
— Balsami Copaivae, 304.
— balsamica, 304.
— Barthezii, II. 393.
— bechica, II. 393.
— Brunneri, 221.
— de Cades, 304.
— Cajeputi, 345.
— Camphorae, 274.
— camphorata, 274.
— — c. Nitro, 275.
— canabina, 298.
— Cantharidum, 404. 410.
— ad catarrhum, II. 318.
— cerea, 250.
— Chinae, 490.
— Citri Seminum, 541.
— Cornu Cervi usti, 729.
— cosmetica, 308.
— diuretica, 400. 721.
— emetica, 228.
— excitans, 347.
— febrifuga, 450.
— Ferri composita, 644.
— Guajaci Resinae, 716.
— guajacina, 716.
— Gummi Arab., 183. 189. 734.
— gummosa, 189. 731.
— hordeata amygdalina, 183.
— Jalapae, II. 29.
— kermetica, 228.
— laxans, II. 29.
— leniens, 73. 185. 188. 579. II. 316.
— ad lumbaginem, II. 382.
— Myrrhae Griffithii, 644.
— narcotica, 751. II. 252.
— nitrosa, II. 393.
— c. Nuce vomica, II. 248.
— e nucleis Persicae externa, II. 346.
— oleosa, II. 243.
— pectoralis, 185.
— phosphorata, II. 329.
— Pinus sylvestris, II. 325.
— Pini s. Tumoris Pini, 4.
— Pistacinum, II. 389.
— purgans, 26. 69. 101. 463. 530.
— refrigerans, 187. 388. 396.
— salina, II. 305.
— sedativa, 751.
— — simplex, II. 266.
— Sublimati corrosivi, II. 128.
— temperans, II. 309.
— c. Terebinthina, II. 618.
— terebinthinacea, 681. 648.
— terebinthinata, II. 631.
— vermifuga, 42. II. 630.
— Viblasmin, 21. 672.
— violata, 721. 672.
Emys lutaria, 680.
Endivia, 512.
Enema gummi Acaciae sulphurico, 54.
— acetosum, 54.
— acidum, 54.
— adstringens pro., 444. 679. II. 488.
— — c. Opio, 679.
— — et tonicum, 679.
— amylaceum, 190.
— Anisi, II. 266.
— anodynum, 754. II. 295. 310.
— anthelminticum, II. 295.
— antiperiodicum, 492.
— antisepticum, 149.
— antispasmodico-resolvens, II. 576.
— antispasmodicum, II. 221. 264. 576.
— astringens, II. 781.
— antisyphiliticum, 178.
— ad asthmaticos, II. 493. 576. 614.
— balsamicum, II. 619.
— — c. Opio, II. 619.
— Belladonnae, 297.
— camphoratum, 277.
— — Chinae c. Ass., 284.
— carminativum, 220. II. 33.
— catharticum, 91. II. 93.
— Chamomillae, 465.
— Chinae, 492.
— — c. Opio, 487.
— ad clavos pedum, 694.
— commune, II. 416.
— emolliens, 129. II. 76. 97.
— foetidum, 284.
— gracum, 64.
— Hyoscyami, 751.
— involvens, II. 76.
— irritans, II. 237.
— laxans, II. 568.
— — et lenicns, 499.
— lenicns, 676. II. 265. 310. 619.
— ad lapidem, 690.
— mannatum, II. 169.
— mercuriale, II. 238. 269. 177.
— Nicotianae, II. 237.
— oleosum, II. 98.
— opiaceum, II. 264.
— opiatum, II. 264.
— oxymelitum, 22.
— Papaveris, II. 310.
— purgans, 241. 707. II. 93. 122. 568. 576. 584.
— refrigerans, 580. II. 309.
— resolvens, 465. 594. II. 416.
— rhoumns, 496.
— Sabadillae, II. 493.
— sedans, II. 264.
— solutivum, II. 249. 256. 264.
— stibiatum, 248.
— tabacinum, II. 237.
— Tanaceti, II. 284.
— temperans, 675.
— terebinthinatum, II. 619. 631.
— — c. Opio, II. 619.
— tonicum, 492.
— vermifugum, 578. II. 464. 576. 619.
— ad verrucas, 694.
Ens Martis, 667.
— Veneris Boylei, 687.
Entalia, 368.
Enula, II. 2.
— Campana, II. 2.
Epidendrum Vanilla, — Vanilla aromatica.
Epithema antirhitic., II. 260.
— antihystericum, 208.
— rubefaciens, 168. II. 328.
— vermifugum, 97.
Epithymum Creticum, 596.
— officinarum, 596.
Equi marini dentes, 364.
— testes, 682.
Equisetum, 621.
— arvense, 621.
— fluviatile, 622.
— hyemale, 622.
— majus, 622.
— minus, 622.
— palustre, 622.
Erica, 622.
Erigeron, 622. II. 642.
— acre, 622.
— Canadense, 622.
— Philadelphicum, 622.
— viscosum, 622.
Erinaceus combustus, 359. 413.
— Europaeus, 359.
Erioxylon, 704.
Erodium moschatum, 702.
Errhinum adstringens, II. 331.
— contra ozaenam, 199.
— haematiticum, II. 692.
Eruca, 334. II. 570.

Eruca nigra, II. 570.
Erysimum, II. 675.
— Lens, II. 62.
Eryngium, 622.
— aquaticum, 622.
— campestre, 622.
— marinum, 623.
— maritimum. 623.
Erysimum Alliaria, 89.
— Barbarea, 623.
— officinale, 623.
— vulgare, 623.
Erythraea Centaurium, 447.
— Chilensis, 625.
Erythrodanimum, II. 486.
Erythronium Americanum, II. Add.
— flavescens, 625.
— Indicum, II. 581.
Esox Lucius, 364.
Essentia Absinthii, 9
— — amara, 10.
— — — composita, 10.
— — — totius, 10.
— Asopiti, 62.
— Agallochi Ligni, II. 89.
— alexipharmaca Stahlii, II. 646.
— — temperata, II. 646.
— Aloës, 98.
— amara, 448. 699. II. 698.
— — Halensis, 11.
— Ambrae composita aetherea, 142.
— — Hoffmanni, 142.
— — liquida, 143.
— — Mindereri, 143.
— — sicca, 142.
— Amomi repentis, 446.
— Angelicae, 202.
— Angusturae, 207.
— anodyna Ludovici, II. 367.
— — officinalis, II. 266.
— antarthritica Hoffmanni c. Opio, 437.
— — — sine Opio, 437.
— antihydropica Hoffmanni, 102.
— antihysterica, 287. 434. 438.
— Antimonii, 290.
— antiscorbutica, 398.
— antiseptica Huxhami, 503.
— Aristolochiae Serpentariae, 286.
— aromatica, 308.
— Asae foetidae, 286.
— — — aetherea, 286.
— — — kalica, 287.
— Aurantii, 534.
— — dulcis, 536.
— — immaturi, 536.
— — sicca, 537.
— Aurantiorum Cortic., 534.
— — — vinosa, 539.
— — Pomorum immaturorum, 536.
— Balsami Canadensis roborans, 1.
— — — mundificans, II. 283.
— — Copaivae kalica, 304.
— — Peruviani, 308.
— balsamica, 540.
— Belladonnae, 292.
— Benzoës, 321.
— Benzoini, 321.
— bezoardica Halensis, 203.
— Bonplandiae, 297.
— Bruceae, 207.
— Calami, 340.
— Canellae albae, 392.
— Cantharidis, 401.
— Cardamomi, 446.
— Cardui benedicti, 419.
— carminativae, 391.
— — Trilleri, 536.
— — Wedelii, II. 683.
— Caryophyllatae, 703.
— Cascarillae, 128.
— Cassiae cinnamomeae vel lignene, 392.
— Castorei, 436.
— — Canadensis, 436.
— — carminativa, 440.
— — Moscovitici, 436.
— — opiata, 437.
— — thebaica, 437.
— — vulgaris, 436.
— Catechu, 446.
— — Terrae, 446.
— catholico-purgans Rothii, II. 31.
— de Cedro, 537.
— Centaureae benedictae, 419.
— Centaurii minoris, 448.
— cephalica, 351.
— Chinae, 502.
— — alexipharmaca, 503.
— — antiseptica Huxhami, 503.
— — composita, 508.
— — Hellwigii, 503.
— Cicutae, 517.
— Cinchonae, 502.
— — lancifoliae, 502.
— Cinnamomi, 392.
— — composita, 393.
— Citri sicca, 537.
— Cochleariae, 547.
— Conii, 517.
— Corticis Peruviani, 502.
— — alexipharmaca Huxhami, 503.
— — — composita, 504.
— — Winterani, 571.
— Corticum Winteranorum, 571.
— cosmetica, 321.
— — simplex, 321.
— Croci, 574.
— Cubilabae, 580.
— Digitalis, 615.
— — purpureae, 615.
— dulcis, II. 402.
— emetica Helvetii, 214.
— Fuliginis Clauderi, 178.
— Galbani, 337.
— Gei urbani, 703.
— Gentianae, 698.
— — rubrae, 698.
— Glechomae hederacei, 735.
— Guajaci, 711.
— Gummi Ammoniaci, 720.
— — — kalina, 720.
— haemato-cathartica, 178.
— — et alexipharmaca Clauderi, 178.
— Hederae, 735.
— Hyoscyami, 752.
— — nigri, 752.
— Hyperici, 765.
— hysterica, 438.
— Jasmini, II. 32.
— Juglandis cortic. virid., II. 34.
— Lactucae virosae, II. 50.
— Levistici, II. 72.
— Ligni Aloës, II. 69
— — Guajaci, 711.
— Lignorum, 711.
— Liquiritiae, II. 83.
— Lyttae vesicatoriae, 402.
— Macidis, II. 223.
— Macis, II. 223.
— Malti, II. 95.
— matriata aperitiva, 652.
— Martis aperiens, 652.
— — aperitiva, 652.
— Mastiches, II. 105.
— Melissae composita, II. 109.
— Menthae piperitae, II. 116.
— Menyanthis, II. 668.
— Millefolii, II. 209.
— Millepedum, II. 211.
— Mimosae Catechu, 446.
— Moschi, II. 221.
— moschata, II. 221.
— Myrrhae alcalisata, II. 229. 230.
— — alcoholica, II. 229.
— nigra Anglica, II. 247.
— Nucum Corticis viridis, II. 34.
— — Jugland. Cort. virid., II. 34.
— Papaveris, II. 248.
— Pareirae bravae, 525.
— Pimpinellae albae, II. 323.
— — — kalica, II. 324.
— Pini, 2.
— Piperis, II. 326.
— polychresta Gundelsheimeri, II. 326.
— Populi, II. 369.
— — oculorum, II. 369.
— — vulneraria, II. 369.
— Rorismarini, II. 479.
— Sabinae, II. 30.
— Sassafras, II. 525.
— — composita, II. 525.
— scillitica Reupii, II. 402.
— Scordii, II. 696.
— de Scordio composita, II. 696.
— Senegae, II. 366.
— Serpentariae, 285.
— Spicae indicae, II. 233.
— splenetica Stahlii, 763.
— Stibii, 239.
— stomachica, 532.
— — polychresta Gundelsheimeri, II. 326.
— Stramonii, 606.
— Succini, II. 497.
— — alcalisata, II. 498.
— — alcoholica, II. 498.
— Terebinthinae, II. 618.
— Terrae Catechu, 446.
— — Japonicae, 446.
— theriacalis, 140. II. 287.
— traumatica, II. 652.
— Trifolii fibrini, II. 668.
— Valerianae, II. 667.
— — ammoniata, II. 668.
— — composita, II. 668.
— — volatilis, II. 668.
— contra vermes, II. 614.
— vermifuga, II. 614.
— Vincetoxici, 890.
— vulneraria simplex, II. 105.
— — Stahlii, II. 698.
— Zedoariae, II. 682.
Esula minor, 626.
Eucalyptus resinifera, II. 44.
Euchloras Potassae, II. 397.
Eugenia Caryophyllata, 423.
Eupatorium, 625.
— Ayapana, II. Add.
— cannabinum, 625.
— Mesues, 625.
— perfoliatum, 625.
— purpureum, 625.
— teucrifolium, 625.
— veterum, 80.
Euphorbia, 626.
— Antiquorum, 626.
— Canariensis, 626.
— corollata, 626.
— Cyparissias, 441. 626.
— Helioscopia, 626.
— Ipecacuanha, 660.
— Lathyris, 440.

Euphorbia officinarum, 626.
— palustris, 626.
— Peplus, 626.
— sylvatica, 626.
Euphorbii corrector, II. Add.
Euphorbium, 626.
Euphragia, 628.
Euphrasia, 628.
— officinalis, 628.
Evonymus, 628.
— Europaeus, 628.
Excoecaria Agallocha, 19 69.
Exostema angustifol. — Cinchona angustif.
Extractum Absinthii, 7.
— — alcoholicum, 9.
— Acetosellae, 17.
— Aconiti, 60. 61.
— — Herbae recentis, 60.
— Agallochi Ligni, 69.
— Agarici aquosum, 70.
— — alcoholicum, 70.
— — alcoticum, 69.
— Agrimoniae, 80.
— Aloes, 95.
— — Acido hydrochlorico correctum, 95.
— — gummosum, 95.
— — aquosum, 95.
— — Poerneri, 95.
— — purificatum, 95.
— — resinosum, 95.
— amarum, II. 658.
— Angelicae, 202.
— Angusturae, 206.
— anodynum, II. 263.
— Anthemidis, 402.
— — nobilis, 402.
— Aristolochiae, 265.
— Arnicae alcoholicum, 268.
— — aquosum, 267.
— Artemisiae, 276.
— Asari, 280.
— Aurantii Folliorum, 529.
— Aurantior. Cort. aquos., 529.
— — alcoholicum, 535.
— Bardanae, 313.
— Beccabungae, II. 674.
— Belladonnae, 295.
— — Herbae recentis, 295.
— Betulae, 329.
— bezoardicum Camerarii, 903.
— Bilis, 631.
— — bovinae, 631.
— Bistortae, 331.
— Boraginis, 332.
— Bryoniae, 336.
— Calami, 350.
— — aromatici alcoholicum, 350.
— — gummoso-resinosum, 350.
— — vinosum, 350.
— Calendulae, 370.
— — Herbae recentis, 370.
— Campechiensis Ligni, II. 70.
— Cantharidum, 399.
— Cardui benedicti, 418.
— — tomentosi, 418.
— Carpini, II. 298.
— Caryophyllatae, 93.
— Cascarillae alcoholicum, 427.
— — aquosum, 427.
— — gummosum, 427.
— — resinoso-gummos., 427.
— — resinosum, 427.
— Cassiae, 430.
— — Fistulae, 430.
— — Sennae, II. 665. 666.
— Castorei, 432.
— Catechu, 442.
— catharticum, 655.
— catholicum, 655. II. 461.

Extractum Centaureae benedictae, 418.
— Centaurii minoris alcohol., 452.
— — — aquos., 449.
— — — spirit., 450.
— Cerefolii, 467.
— — hispanici, 467.
— Chacarillae cort., 427.
— Chaerophylli, 467.
— Chamaedryos, II. 643.
— Chamaecrisi, 462.
— Chamaemilae, 462.
— — vulgaris, 462.
— Chelidonii majoris, 467.
— — Herbae recentis, 467.
— Chinae alcoholico-aquos., 486.
— — alcoholicum, 486.
— — aquosum, 483. 484.
— — emulsivum, 484.
— — frigide paratum, 483.
— — fuscae et regiae frigide parat., 483.
— — gummosum, 483.
— — resinosum, 486.
— — spirituosum, 486.
— — vinosum, 485.
— Cichorii, 512.
— Cicutae, 515.
— — virosae, 515.
— Cinchonae, 483.
— — aquosum, 483.
— — gummosum, 483.
— cnico pharmacum, II. 451.
— Cocculi, 544.
— Cochleariae, 545.
— Colchici, 551.
— Colocynthidis, 555.
— — compositum, 555.
— Colombo, 561.
— Columbo, 561.
— Conii, 515.
— — maculati, 515.
— — Herbae recentis, 515.
— Contrayervae, 566.
— Convallariae, 568.
— Convolvuli Jalapae, II. 26.
— Cortices Peruviani alcoholico-aquosum, 486.
— — — alcoholicum, 486.
— — — aquosum, 483.
— — — frigide parat., 483.
— — — gummosum, 483.
— — — cum Resina, 486.
— — — resinos., 486.
— — — spirituosum, 486.
— — — vinosum, 485.
— — Salicis, Extr. Salicis.
— Crocci alcoholicum, 573.
— — aquosum, 573.
— Dauci, 607.
— — Carotae, 607.
— — Radicis, 607.
— Digitalis Herb. recent., 613.
— — purpureae, 613.
— Dulcamarae, 618.
— Elaterii, II. 212.
— Endiviae, II. 4.
— — alcoholicum, II. 6.
— Esulae, II. Add.
— Fellis, 631.
— — Tauri, 631.
— Ferri, 659 660.
— — cydoniatum, 661.
— — pomatum, 660.
— — cum Tartaro, 664.
— Flammulae Jovis, 543.

Extractum Fumariae, 674.
— Gallarum, 679.
— Genistae, 693.
— Gentianae, 694.
— — alcoholicum, 695.
— — aquosum, 694.
— Geoffraeae, 701.
— Glechomae hederac., 734.
— Glycyrrhizae, II. 77.
— Goulardi, II. 341.
— Graminis, 704.
— — liquidum, 704.
— Gratiolae, 706.
— — alcoholicum, 707.
— — Herbae recentis, 706.
— Guajaci, s. Extr. Ligni Guajaci etc.
— Haematoxyli, II. 70.
— Hederae terrestris, 734.
— Helenii, II. 4.
— — alcoholic., II. 6.
— Hellebori nigri, 737.
— — alcoholicum, 738.
— — secundum Bacheri methodum, 738.
— — vinosum, 738.
— Hippocastani, 67.
— — spirituosum, 67.
— Humuli, II. 85.
— Hyoscyami alcohol., 752.
— — aquosum, 750.
— — Herbae recentis, 750.
— Hyperici, 757.
— Jaceae, II. 21.
— Jalappae gummosum, II. 26.
— — alcoholicum, II. 26.
— — aquosum, II. 26.
— — resinosum, II. 26.
— Inulae, II. 4.
— Ipecacuanhae, II. 14.
— Iridis Florentinae et nostrat., II. 19.
— Juglandis, II. 33.
— Juniperi, II. 38.
— Ivae, II. 644.
— Lactucae sativae, II. 50.
— — virosae, II. 49.
— Lapathi, II. 402.
— Laurocerasi, 452.
— Leontodontis Taraxaci, II. 616.
— Levistici, II. 72.
— Lichenis Islandici, II. 65.
— Ligni Aloes, II. 69.
— — Campechiani, II. 70.
— — Campechiensis, II. 70.
— — Guajaci alcoholicum, 709.
— — — aquosum, 708.
— — — resinosum, 709.
— — Haematoxyli, II. 70.
— Ligustici, II. 72.
— Liliorum Convallium, 568.
— Liquiritiae crudum, II. 77.
— — depuratum, II. 77.
— — siccum crudum, II. 77.
— — Succi, II. 77.
— Lupuli, II. 85.
— — alcoholicum, II. 86.
— Malatis Ferri, 660.
— marocostinum, 102.
— Marrubii albi alcoholic., II. 103.
— — — aquosum, II. 103.
— Martis, 659. 660. 663.
— — aceticum, 659.
— — aperiens Lemery, 662.
— — Mynsichti, 663.
— — cydoniatum, 661.
— — pomatum, 660.
— — e Succo Pomporum, 660.
— — cum Tartaro, 664.
— Matricariae, II. 105.

Extractum Melampodii, 737.
— Melissae, II. 108.
— Millefolii alcohol., II. 209.
— — aquos., II. 209.
— Momordicae Elaterii, II. 212.
— Myrrhae aquos., II. 225.
— — composit., II. 225.
— — graminat., II. 226.
— — gummos., II. 226.
— — resinos, II. 226.
— Narcissi pratensis, II. 232.
— Nasturtii, II. 234.
— Nicotianae, II. 236.
— — mitigatum, II. 236.
— c. Nuce vomica II. 240.
— Nucis vomicae alcoholic., II. 240.
— — — aquos., II. 240.
— — — siccum, II. 241.
— Nucum, II. 93.
— — Juglandis, II. 33.
— — Juglandum, II. 33.
— — vomicar., II. 240.
— — — spirit., II. 240.
— Opii, II. 260.
— — acetos., II. 247.
— — alcoholic, II. 253.
— — aquos, II. 260.
— — Narcotina privat., II 262.
— — cinnabarin., II. 155.
— — crocat., II. 262.
— — cydoniat., II 262.
— — Dlestii, II. 262.
— — per fermentationem, II. 262.
— — glyzyrrhizat., II. 263.
— — gummos., II. 260.
— — siccum, II. 246. 262.
— — thebaic., II. 260.
— — vinos., II. 248.
— Paeoniae, II. 301.
— panchymagog., II. 451.
— — Crollii, 555.
— — Quercetani, 555.
— Papaveris albi, II. 310.
— — erratici, II. 306.
— — Rhoeadis, II. 307.
— — somniferi, II. 310.
— Patientiae, II. 490.
— Peucedani, II. 317.
— phlegmagogum Quercetani, II. Add.
— Pimpinellae albae, II. 323.
— Pini alcoholic., 2.
— — aquos., 2
— Plantaginis, II. 332.
— Plumbi, II. 341.
— Podophylli, II. 314.
— Polygalae amarae, II. 366.
— — Virginicae, II. 366.
— Pomorum ferrarium, 660.
— — — liquid., 661.
— Pulsatillae alcoholic., 194.
— — aquos., 194.
— — Herbae recentis, 194.
— — nigricantis, 194.
— Quassiae alcoholic., II. 431.
— — aquos., II. 431.
— — Ligni, II. 431.
— Quercus Corticis, II. 434.
— Ratanhae, II. 442.
— Ratanhiae, II. 442.
— — siccum, II. 443.
— Rhabarbari alcoholicum, II. 451.
— — aquos., II. 450.
— Rhapontici, II. 446.
— Rhei alcoholic., II. 451.
— — aquos., II. 450.
— — composit, II. 451.
— Rhoeados, II. 307.
— Rhois radicantis, II. 460.
— — Toxicodendri, II. 460.
— Rorismarini, II. 478.
— Rubiae alcoholic., II. 485.
Extractum Rutae aquos., II. 488.
— Rutae alcoholic., II. 491.
— — aquos., II. 491.
— Sabinae alcoholic., 39.
— — aquos., II. 39.
— Salicis aquos., II. 498.
— — spirituos., II. 498.
— Salviae, II. 501.
— Sambuci, II. 508.
— Saponariae, II. 514.
— Sarsaparillae, II. 517.
— Sassafras, II. 525.
— Saturni, II. 340. 341. 352.
— Scillae, II. 533.
— Scordii, II. 536.
— Scorsonerae, II. 544
— Senegae, II. 366.
— — Radicis, II. 366.
— Sennae alcoholic., II. 556.
— — aquos., II. 555.
— Siliquae dulcis, 453.
— solutivum, II. 556.
— Stramonii, 605.
— — Herbae recentis, 605.
— e seminibus, 605.
— Tabaci, II. 576.
— Tamarici alcoholic, II. 614.
— — aquos., II. 613.
— Tararaci, II. 616.
— — liquid., II. 616.
— thebaicum, II. 260.
— — ammoniacale, II. 84.
— thriacale, II. 286.
— Tormentillae, II. 651.
— Trifolii fibrini alcoholic., II. 657.
— — — aquos., II. 656.
— Tritici repentis, 704.
— Turionum Pini aquos., 2.
— — — alcoholic. ibid.
— Turpethi, II. 699.
— Ulmi, II. 660.
— Urticae, II. 660.
— Valerianae alcoholic., II. 667.
— — aquos., II. 666.
— — frigide parat., II. 666.
— — siccum, II. 667.
— Verbasci, II. 672.
— Verbenae, II. 673.
— Veronicae, II. 675.
— Vincetoxici, 290.
— Virgae aureae, II. 679.
— Visci aquos., II. 679.
— — vinos, II. 679.
— Vitis Pampinorum, II. 681.
— Zedoariae, II. 682.
Extuviae Serpentum, 682.

F.

Faba, 628.
— alba, 628.
— febrifuga, 629.
— St. Ignatii, 629.
— Indica, 629.
— marina, 358.
— Pichurim, 629.
— — major et minor, 629.
— Tunka, 629.
— vulgaris, 628.
Fabae f. Faba.
Fabaria, 572.
Faecula amylacea, 189.
— Ari, 278.
— Arrowroot, 208.
— Belladonnae, 295.
— Bryoniae, 335.
— Cicutae, 515.
— Cucumeris agrestis, II. 212.
— Hippocastani fruct., 67.
— Hyoscyami, 750.
— Iridis, II. 19
— Marantae, 268.
— Paeoniae, II. 301.
Faecula Sagu, II. 495.
— Solani tuberosi, II. 587.
— Stramonii, 605.
— Tapioca, II. 614.
Fagara bclandra, II. 608.
Fagopyrum, 629.
Fagus, 629. 630.
— sylvatica, 629.
Farfara, 629.
Farina Hordei, 745.
— — amygdalata, 745.
— — praeparata, 745.
— fossilis, 357.
— Secalis, II. 545.
Farinae emollientes, II. 74
— resolventes, 671. II. 545
Febrifugum Crantii, 212.
— salsum, II. 382.
Fecula f. Faecula.
Fel bovinum, 630.
— Tauri 630.
— — inspissat., 631.
— Terrae, 447.
— Vitri, II. 387.
Fenum f. Foenum.
Fercutum commune, 746.
— Saxonicum, 746.
Fermentum Cerevisiae, 632.
— Panis — Panis.
Ferraria — Scrophularia aquat.
Ferri Carbonas, 643.
— Murias, 652.
— Ramenta s. Scobs, 632.
— Limaturae purificatae, 632.
— Oxydi squamae, 638.
— Oxydum, 638. 641.
— — nigrum, 638.
— Rubigo s. Subcarbonas, 643.
— Squamae purificatae, 638.
— Sulphas, 648.
— Tartarum, 664.
Ferrocyanas Potassae, 38.
Ferrum, 631.
— ammoniacale, 657.
— ammoniacat., 657.
— ammoniat., 657.
— Borussic., 639.
— carbonic., 643.
— Haematitis, 641.
— hydraticum, 643.
— hydrocyanic., 669.
— hydroiodic., II. 20.
— magnetic. compact., 638.
— muriatic., 652.
— — oxydat., 652.
— — — crystallis., 653.
— — oxydulat., 652.
— nitric., 652.
— oxydat, 643.
— — carbonic. fuscum, 643.
— — fuscum, 643.
— — hydratic., 643.
— — hydrocyanic., 669.
— oxydulat. magnetic., 638.
— — nigrum, 638.
— — rubrum, 641.
— — et oxydatum hydrocyanicum, 669.
— — sulphuric., 648.
— phosphoricum, 647.
— potabile, 663.
— praeparat., 632.
— pulveratum, 632.
— purum politum, 633
— — select., 632.
— salit., 652.
— sidero-zooticum, 669.
— subcarbonicum, 643.
— sulphurat., 647.
— sulphuric., 648.
— — crystallisat., 648.
— — oxydulat., 648.
— tartarisat, 663.
— vitriolat, 648.
— — exsiccat., 648.

Ferrum vitriolat. ustum, 641.
— zooticum, 669.
Ferula Ammon — Gummi Amm.
Ferulago — Gummi Ammon.
— Asa s. Assa foetida, 279.
— Opoponax — Opopanax.
— orientalis, 718.
— persica, II 496.
Festuca fluitans — Desvauxia.
Ficaria, 467. II. 545.
Ficus Carica, 490.
— Indica, II. 47.
— infernalis, II. 239.
— passae, 492.
— religiosa, II 47.
Filicula dulcis, II. 368.
Filipendula, II. 589.
Filix, 294.
— mas, 294.
Flammula, II. 437.
— Jovis, 643.
Flavedo Corticis Aurantior., 525.
— — Citri, 536.
Flores Aeris, 694.
— Antimonii argentei — Stibium oxydat. griseum.
— Auri, 657.
— bechici, II. 97.
— Benzoës, 24.
— Boracis, 28.
— Cassiae, II.
— martiales, 657.
— Salis Ammoniaci, 189.
— — — haematitati, 657.
— — — martiales, 657.
— — — volatiles, 180.
— — Armoniaci, 189.
— Sulphuris, II. 600.
— — compositi, 104. 110.
— — depurati, II. 602.
— — loti, II. 600.
— Viridis Aeris, 694.
— Zinci, II. 604.
Foeniculum, 195.
— aquaticum, II. 318.
— dulce, 195.
— Lusitanicum, 144.
— marinum, 572.
— porcinum, II. 317.
— ursinum, II. 297.
— vulgare, 195.
Foenum camelorum, 193.
— Graecum, 670.
Folia Cochlearum, 368.
Folliculi Sennae, II. 548.
Fomentatio acetosa camphorata, 377.
— adstringens, 138. 353. 650. 679. II. 332. 344. 428. 434. 438. 692.
— ammoniacalis camphorata, 185.
— anodyna, 125. II. 310.
— anthelmintica, 265.
— antihaemorrhoidalis, 91. II. 97.
— antiphlogistica, II. 417.
— antipleuretica, II. 310.
— antiseptica, 436. 493. 495.
— aromatica, 424.
— Brünninghauseni, II. 373.
— camphorata, 377.
— contra colicam, 465.
— cum Concinno, II. 434.
— communis, 23.
— detersiva, II. 295.
— discutiens, 37.
— diuretica, 172.
— emmenagoga, 336.
— emolliens, 125. II. 76.
— — et laxativa, 125.
— excitans, 258. II. 251. 405.
— frigida Schmuckeri, Richteri, II. 394.
— incitans, 376. II. 405.
Fomentatio laxans et antispasmodica, II. 428.
— leniens, II. 248. 255. 310. 351.
— narcotica, II. 204.
— nitrica, 48.
— contra perniones, 511.
— c. Quercus cortice, II. 434.
— refrigerans, II. 343. 394.
— — Schmuckeri, II. 394.
— resolvens, 172. 176. 178. II. 343. 350. 435.
— saturnina, II. 350.
— saponacea, II. 417.
— sedans, II. 255. 362.
— c. Tannino, II. 434.
— vinosa, II. 676.
Fomentum Acidi phosphor., 50.
— adstringens, 353.
— aluminosum — Aqua alum
— ammoniacale-camphoratum, 185.
— aromaticum, II. 479. 646.
— Belladonnae ammoniat., 176.
— calcareum c. Myrrha, 353.
— camphoratum, 377.
— commune, 23.
— — c. Muriate Ammoniae, 172 et II. Add.
— — per se, 23.
— — tepidum, II. Add.
— detergens, II. 295.
— discutiens, 23.
— excitans, II. 501.
— frigidum Schmuckeri, II. 394.
— nitricum, 48
— ad pernones, 511.
— ad pustulas favendas, 258
— quercinum, II. 434.
— refrigerans, II. 343.
— resolvens, 463. II. 510.
— Saponis composit., II. 417.
— — ammoniat., II. 417.
— saturninum, II 350.
— — c. Opio, II. 344.
— siccum, II. 510.
— Specier. aromat., 489.
— tonico-adstringens, II. 692.
— — antisepticum, 285.
— vulnerarium acidum, 23.
Formica, 671.
— fusca, 671.
— nigra, 671.
— rufa, 671.
Formicae, 671.
— c. acervo, 671.
Fotus adstringens, II. 435.
— anodynus, 673.
— antisepticus, II. 435.
— aromaticus, 8.
— ex Bryonia, 335.
— communis, 8.
— discutiens, 23. 172. 465.
— frigidus, 23
— — Schmuckeri, Richteri, II. 394.
— ad gangraenam, 49.
— refrigerans, 23. II. 394.
— — et deprimens, 23.
— resolvens, II. 510.
Fraga, 672.
Fragaria, 672.
— Vesca, 672.
Fragum, 672.
Frangula, II. 444.
Frasera Caroliniensis, 560.
— Walteri, 560
Fraxinella, 610.
Fraxinus, 673.
— argentea, II. 99.
— excelsior, 673. II. 99.
— Ornus, II. 99.
— parviflora, II. 99.
— pumila, 610
Fraxinus rotundifolia, II. 99.
— subrufescens, II. 99.
Frontale anticephalic., 370.
— hypnoticum, 740.
Fructus Cardamomi, 498.
— pectorales, 421. II. 35.
Frumenti Spiritus — Spir. Frum.
Frumentum, II. 545.
Fucus, 674.
— barbatus, 741.
— ericoides, 741.
— fascistus, 741.
— Helmintochortos, 741.
— plumosus — Fuc. Helmintochortos.
— purpureus — Fuc. Helmint.
— saccharatus — Iodum.
— sedoides, 741
— vesiculosus, 673.
Fuligo, 673.
— Ligni, 673.
— splendens, 673.
Fumaria, 674.
— bulbosa, 674.
— officinalis, 674.
Fumigatio Acidi nitrici, 47.
— antiloimica Gattii, 258.
— antiseptica, 47.
— Chlori, 509.
— desinfectans, 47. 258.
— Guyton-Morveauiana, 509.
— hygiaenica, 509.
— muriatico-oxygenata, 509.
— nitrica Smithiana, 447
— nitrosa, 47.
— oxy-muriatica, 509.
— resinosa, II. 638.
— Smithiana, 47.
Fumigationes s. Fumigatio.
Fumiterra, 674.
Fundans Lassone, II. 411.
— Richardi, II. 634.
— Rotrou, 219
— Ruhlandi, 220
Fungus Bedeguar, 319.
— chirurgorum, 78. 333.
— Cynosbati, 319.
— Laricis, 78.
— Melitensis, 601.
— quercinus, 78.
— Salicis — Bolet. suav.
— Rosae, 319.
— Sambuci, II. 656.
Furfur, 675.
— Amygdalarum, II. Add.

G.

Gadus Lota, 364.
— Morrhua, II. 216.
Gagates, 676
Galanga, 676.
— major, 676.
— minor, 676.
— spuria, 676.
Galbanetum Paracelsi, 337.
Galbanum, 336.
— depuratum, 336.
— in gramis, 336.
— in lacrymis, 336.
— in massis, 336.
Galbuli Cupressi, 581.
Gale, 676.
Galega, 676.
— officinalis, 676.
— Virginiana, 677.
Galeopsis, II. 52.
Galipea Cusparia, 206.
— febrifuga, 206.
Galium, 677.
— album, 677.
— Aparine, 677.
— cruciatum, 578.
— luteum, 677.
— Mollugo, 677.
— verum, 677.

Galla, 677.
— alba, 678.
— de Aleppo, 677.
— nigra, 678.
— quercina, 677.
— tinctoria, 677.
— turcica, 677.
Gallae, 677. v. Galla.
Gallato-Carbonas Potassae, II. 378.
Gallinae stercus, 89.
— ventriculus, 682.
Gallitriche, II. 500.
Gambogia 732.
Gambogium, 732.
Garcinia Cambogia, 732.
Gardenia gummifera, 620.
Gargarisma aceticum, 23.
— acetosum, 171.
— acidulum, 23.
— acidum, 51.
— adstringens, 34. 139. 176. 375. 679. II. 342. 428. 443. 573. 652. 692.
— aluminosum, 139. II. 609.
— ammoniacale, 147. 164.
— ammoniatum, 147. 164.
— in angina maligna, 24.
— antiodontalgicum, II. 499.
— antiphlogisticum, 73.
— anticorbuticum, 34. 549. 550. II. 96. 439.
— antisepticum, 171. 493. 497. 511. II. 436.
— antisyphiliticum, II. 178. 179. 180.
— antivenereum, II. 168.
— ad aphthas, 446. II. 587.
— Belladonnae cum Hydrargyro, II. 183.
— — mercuriale, II. 183.
— e Borace, II. 581.
— boraxatum, II. 581.
— camphoratum, 376.
— chlericum, 511.
— Cochlearine, 550.
— commune, 748. II. 391. 471.
— cupratum, 586.
— detergens s. detersivum, 34. II. 230. 471. 609.
— emolliens, 124. 663.
— excitans, II. 328. 329. 429.
— leniens, 124. II. 97. 340. 311.
— mercuriale, II. 178. 186.
— Muriatis Ammon., II. Add.
— — Hydrargyri oxydati, II. 200.
— nitrosum, II. 392.
— opiaceum, II. 254.
— piperitum, II. 329.
— refrigerans, II. 392.
— resolvens, 171. II. 350.
— salitum, 176.
— Salviae cum Acido muriatico, 34.
— e Scilla, II. 542.
— saturninum, II. 350.
— sedans, II. 310. 350.
— sedativum, II. 264.
— sialagogum, II. 429. 573.
— stimulans, 603. II. 501.
— stypticum, II. 342.
— Subboratis Sodae, II. 581.
— tonicum, 566.
— in ulceribus venereis, II. 178.
— viride, 583.
Garrus — Blix. cord. et stom.
Gas Acidi carbonici, 27.
— — muriat. oxygenat., II. Add.
— — oxymuriatici, II. Add.
— acidum carbonicum, 27.
— azoticum, 302.
— — oxygenatum, 302.
Gas Chlori, II. Add.
— hepaticum, 42.
— hydrocarbonatum, 680.
— Hydrogenium, 680.
— — carbonatum, 680.
— — percarbonatum, 680.
— — sulphuratum, 42.
— hydrosulphuratum, II. 42.
— inflammabile — Hydrogenium.
— Oxygenium, II. 300.
— Oxydum nitrosum, II. Add.
Gascarilla, 426.
Gaultheria procumbens, 680.
Gaz, f. Gas.
Gelappium, II. 22.
Gelatina, 680.
— Amyli, 193
— ex Amylo Solani tuberosi, II. 587.
— analeptica, 689.
— animalis, 680. 688.
— Brassicae rubrae, 334.
— e carne quadrupedum, volatilium, 688.
— cum China, 494.
— Chinae, 472.
— Collae, 687.
— Cornu Cervi, 688.
— — — acida, 688.
— — — amygdalata, 688.
— — — citrata, 688.
— e crure bubuli, 688.
— Cydoniorum, 597.
— — aromatica, 598.
— Ichthyocollae, 687.
— Helmintochorti, 742.
— laxans, II. 99.
— leniens, 687. 688.
— Lichenis cum China, II. 68.
— — Islandici, II. 67.
— — opiata, II. 68.
— Liquiritiae, II. 78.
— Panis, II. 304.
— purgans, II. 99.
— Ribesiorum nigror., II. 461.
— Ribium, II. 462.
— Sagu, II. 495.
— Saleb s. Salep, II. 496.
— Testudinum, 687.
— vitulina, 688.
Genepi album, 277.
— spurium, 692.
— verum, 692.
Genicella, 692.
Geniculata, 692.
Genista, 692.
— angulosa, 693.
— Canariensis, II. 71.
— juncea, 693.
— sagittalis, 692.
— scoparia, 693.
— tinctoria, 692. 693.
Genistella, 692.
Gentia, 693.
Gentiana, 693.
— alba, II. 52.
— Catesbaei, 693.
— Centaurium — Erythraea Cent.
— Chiragita, 318.
— cruciata, 578.
— lutea, 693.
— major, 693.
— minor, 578.
— nigra, II. 547.
— purpurea — G. lutea.
— rubra, 693.
— veterum, 693.
Gentianeina, 693. 700.
Gentiania, 700.
Gentiamina, 693. 700.
Gentianinum, 693. 700.
Geoffraea, 700.
— inermis, 700.
Geoffraea Jamaicensis, 700.
— Surinamensis, 700.
Geoffroya Jamaicensis, 700.
Geranium, 702.
— batrachioides, 702.
— maculatum, 702.
— moschatum, 702.
— pratense, 702.
— Robertianum, 702.
— rotundifolium, 702.
— sanguineum, 702.
Germanica, 333.
Geum, 702.
— rivale, 702.
— urbanum, 702.
Ghitta Jemoco, 732.
Gialappa, II 22.
Gigartina Helmintochorton, 741.
— plicata, 741.
Gilla, 642.
— Theophrasti, II. 690.
— Vitrioli, II. 690.
Gillenia, 703.
— trifolia, 703.
— trifoliata, 703.
Ginseng, II. 304.
Glacies Mariae vulgaris, 366.
Gladiolus coeruleus, II. 17.
— communis, 703.
— luteus, II. 18.
Glandes Quercus, II. 433.
— — tostae, II. 435.
Glans unguentaria, II. 213.
Glastum, II. 21.
Glaucium corniculatum, 467.
Gleehoma hederacea, 734.
Glecoma hederacea, 734.
Glessum — Succinum.
Globularia, 704.
— vulgaris, 704.
Globuli bezoardici, 264.
— carminativi, 631.
— chalybeati, 664.
— ad erysipelas, II. 337.
— ad infectionem, 511.
— Ferri tartarisati, 664.
— martiales, 664.
— — solati, 664.
— martiati, 664.
— Molsheimi, 665.
— moschati, II. 219
— — rubri, II. 219.
— de Nancy, 664.
— Tartari ferruginosi, 664.
— — martiales, 664.
— — martiati, 664.
— Tartrat. Ferri et Lixiv., 664.
Gluten pectorale, II. 78.
Glycine scandens, 4.
Glyzyrrhiza, II. 76.
— echinata, II. 77.
— glabra, II. 76.
— lucida, II. 78.
Glyzyrrhizina s. Glyzyrrhizinum, II. 77.
Gnaphalium dioicum, 211.
Gossypina, 704.
Gossypium, 704.
— herbaceum, 704.
Gramen, 704.
— album, 704.
— caninum, 704.
— majus, 490.
— Manna, 609.
— orientale, 193.
— rubrum, 420.
Grana Actes, II. 607.
— Cnidia, 602.
Grana Kermes s. tinctorum, 470.
— Moluccana, 577.
— moschata, 1.
— Paradisi, 706.
— Sago s. Sagu, II. 495.
— Tiglia, 577.
— Tiglii, 577.

Grana Tilli, 677.
— Vitae Mesuae, 103.
Granatum, 133.
Graphites, 637.
— depuratus, 637.
— hydrargyratus, II. 135.
Gratia Dei, 706.
Gratiola, 706.
— officinalis, 706.
Grutum, 301.
Guajacina, 768.
Guajacum, 707.
— officinale, 707.
Gualtheria procumbens, 680.
Guilandina Moringa, II. 71.
Gummi Acaciae, 726.
— adstringens Fothergilli, II. 44.
— Aloës, 93.
— Ammoniacum, 718.
— — alcalisatum, 726.
— — amygdaloides, 718.
— — electum, 718.
— — in granis, 718.
— — in lacrymis, 718.
— — in massis, 718.
— — in panibus, 718.
— — placentis, 718.
— Amyridis Kataf — G. Olibanum.
— Anime, 726.
— Arabicum, 726.
— Asae foetidae, 279.
— Astragali Tragacanthae, II. 652.
— Bdellii, 319.
— Benzoës, 320.
— Benzoinum, 320.
— Bubon Galbani — G. Galbani.
— Carannae, 411.
— Cerasi, 732.
— Cerasorum, 732.
— Copal, 509.
— elasticum, II. 444.
— Elemi, 620.
— Euphorbii, 624.
— Ferulae Ammon. — G. Ammoniacum.
— — Asae foet. — G. As. foet.
— Galbani s. Galbanum, 336.
— Gamandra, 732.
— Gamba, 732.
— Gambiense, II. 44.
— de Goa, 732.
— Guajaci, 708.
— Gutta, 732.
— Guttae, 732.
— — Americanum, 732.
— — Cambogium, 732.
— — Siamense, 732.
— — spurium, 732.
— — verum, 732.
— — Zeylanicum, 732.
— Gutti, 732.
— Hederae, 734.
— Hymenaeae Courbaril — G. Anime.
— de Jemu, 732.
— Juniperi, II. 511.
— Kikekunemalo — Kikekun.
— Kino, II. 44.
— Laccae, II. 46.
— — in ramulis, II. 46.
— Ladanum, II. 51.
— L. Myrrhae — G. Myrrhae.
— Ligni sancti, 708.
— Mastiches, II. 103.
— Mimosae, 726.
— — niloticae, 726.
— Myrrhae, II. 225.
— nostras, 732.
— Oleae, II. 243.
— Olibani s. Olibanum, II. 244.
— Panacis, II. 294.
Gummi Sagapenum, II. 495.
— Sanguinis Draconis, II. 511.
— Sarcocollae, II. 516.
— Senegal s. Senegalense, 732.
— Serapionis, 726.
— serapinum, II. 495.
— Stalagmitidis cambogioidis — G. Guttae.
— Tragacanthae, II. 652.
Gummi-resina Euphorbii, 626.
— s. ibrigens Gummi.
Gutta Gambir — Catechu.
Guttae Abbatis Rousseau, II. 264.
— acidae tonicae, 56.
— amarae, 631. II. 241.
— Anglicae cephalicae, II. 61.
— Anglicanae cephalicae, 265.
— anodynae acidae, II. 260.
— anthelminticae, II. 34.
— antihystericae, 267.
— ad arthrodyniam, 181.
— ad blennorrhoeam, 304.
— cordiales Warneri, II. 558.
— e Cupro, 584.
— deprimentes, II. 215.
— excitantes, 347.
— ferratae, 662.
— Generalis La Motte, 301.
— Jenanae, 115.
— lenientes, II. 215.
— martiales, 652.
— nervinae, 655.
— nigrae, II. 247.
— resolventes, 316.
— stomachicae, 447.
— uterinae, 287.
— — Reginae Hispan., II. 241.
Guttaefera s. Guttifera vera — Gutti.
Gutti, 732.
Guttulae albae Wardii, II. 198.
— diureticae, II. 237.
— phosphoratae, 51.
Gypsum, 366.

H.

Haematinum, II. 70.
Haematites, 641.
Haematoxylinum, II. 70.
Haematoxylon s. Haematoxylum Campechianum, II. 70.
Halcyonium rotundum, II. 322.
Halicacabum, 88.
Haloidum oxygenatum, II. 397.
Hamamelis, 733.
— Virginiana, 733.
Hastula Regis, 292.
Haustus Acetatis Ammoniae et Stibii, II. Add.
— Acidum carbon. evolvens, II. 29. 30.
— adstringens, II. 255. 570.
— anodynus, II. 251.
— antiemeticus, 28.
— balsamicus, 311.
— ad blennorrhagiam, 304.
— camphoratus, 373.
— catharticus pro infantibus, II. 450.
— — oleosus, II. 464.
— — salinus, II. 92.
— Collae animalis, 685.
— Crotonis purgans Nimmo, 578.
— diaphoreticus resolvens, 61.
— diureticus Milmanni, II. 402.
— emeticus, 240.
— guajacinus, 710.
— incitans diaphoreticus, 176.
— — nervinus, 376.
— — resolvens, II. 452.
— oleosus laxans, II. 558.
— ex Olibano, II 244.
— opiato-stibiatus, II. Add.
— opiatus, II. 265. et Add.
Haustus pectoralis fmeitans, II. 367.
— — resolvens, 620.
— salinus effervesc., II. 29. 30.
— saponaceus, II. 29. 30.
— sedans narcoticus, 761. II. 215.
— stomachicus, II. 432.
— terebinthinatus, 304.
— tonicus adstringens, II. 261.
— — martialis, 662.
Hedera, 733.
— arborea, 733.
— Helix, 733.
— terrestris, 734.
Hedysarum Alhagi, II. 99.
Helenium, II. 2.
Helianthus tuberosus, 736.
Helichrysum, II. 593.
— arenarium, II. 593.
— Stoechas, II. 593.
Heliotropium Europaeum, 735.
Helix Pomatia, 681.
Helleboraster, 736.
Helleborus, 736. 736.
— albus, 735.
— foetidus, 736.
— niger, 736.
— orientalis, 736.
— viridis, 736.
Helmintochorton, 741.
Helminthochortos, 741.
Helmintocortos, 741.
Helxine, II. 313.
Hepar Anguillae, 682.
— Antimonii, 230. 235.
— Canis rabidi, 681.
— Lupi, 681.
— Sulphuris, II. 375.
— — alkalinum, II. 375.
— — calcareum, 364.
— — salinum, II. 376.
— — volatile, 172.
— — vulgare, II. 375.
Hepatica, 743.
— alba, 743.
— fontana, 743.
— nobilis, 743.
— stellata, 292.
— triloba, 743.
Hepatorium, 80.
Heptaphyllum, II. 651.
Heracantha, 421.
Heracleum gummiferum, 718.
— lanatum — H. Sphondyl.
— Sphondylium, 333.
Herba aegyptiaca, II. 106.
— Britannica, II. 499.
— Cancri, 735. II. 648.
— Ignis, II. 63.
— ophthalmica, 628.
— paralyseos, II. 422.
— Ruperti, 702.
— Sardoa, II. 437.
— Trinitatis, II. 21.
— Ventis, 193
Herbae aromaticae, II. 500.
— vulnerariae, II. 500.
Hermodactyli, 744.
— spurii, 744.
Herniaria, 744
— glabra, 744.
— hirsuta, 744.
Heuchera Americana, 744.
Hevea Guianensis — Siphonia Cahuchu.
Hibiscum, 110.
Hibiscus Abelmoschus, 1.
Hiera picra, 104.
Hieracium murorum, 744.
— Pilosella, 744.
Hippocastanum, 66.
Hippocras — Vinum Cinnamomi.
Hippolapathum, II. 447.
Hippopotami dentes, 364.

Hirci sanguis, 686
Hirudo officinalis, medicinalis, 746.
Hirudines, 749.
Hirundinaria, 220.
Hirundines combustae, 349. 413.
Hirundinum nidi combusti, 359.
Hirundo rustica, 359.
Hispidula, 218.
Hispidus cristatus, 370.
Hordeum, 749.
— crudum, 746.
— decorticatum, 746.
— distichon, 745.
— excorticatum, 746.
— hexastichon, 746.
— integrum, 745.
— mundatum, 746.
— perlatum, 746.
— praeparatum, 746.
— vulgare, 749.
Horminum, 500.
Humulus Lupulus, 87.
— — foemina, 85.
Hyacinthus, 607.
Hydragogum Boylei, 260.
Hydrargyri Acetas, 203.
— Murias, 175.
— nitrici Oxyd., 145.
— nitrico-oxydum, 145.
— — cinereum, 142.
— — rubrum, 145.
— Oxydum per Acidum nitricum, 145.
— Oxymurias, 175.
— Permurias, 175.
— Phosphas, 190 et Add.
— Submurias, 155.
— — ammoniatus s. ammoniatum, 199.
— Subnitras, 145.
— Subsulphas flavus, 191.
— Sulphuretum nigr., 138.
— — rubrum, 152.
— — sublimat., 152.
Hydrargyrum, 122.
— acetatum, 203.
— aceticum, 203.
— ammoniato-muriaticum, 199.
— bichlorat. s. Oxydo et Ammonio muriat., 199.
— bicyanatum, 189.
— Borussicum, 189.
— chloratum, 155.
— cum Creta, 127.
— depuratum, 132.
— haloidatum, 176.
— hydrochloricum, 176.
— hydrocyanicum, 189.
— cum Magnesia, 127.
— muriaticum corrosivum, 175.
— — — venale, 176.
— — mite, 155.
— — praecipitatum, 199.
— nitricum, 194.
— oxydatum nigrum, 142.
— — muriatic ammoniat., 199.
— — rubrum (praeparat.), 145.
— — — venale, 146.
— oxydulatum nigrum, 142.
— — nitrico-ammoniatum, 192.
— perchloratum, 175.
— phosphoratum, 190.
— phosphoreum, 190.
— phosphoric., 190 et Add.
— praecipitatum album, 199.
— purificatum, 122.
— purum, 122.
Hydrargyrum sulphurat. praeparat., 138.
— saccharat., 126.
— stibiato-sulphuratum, 140.
— sulphuratum nigr., 138.
— sulphuretum nigr., 138.
— — rubrum, 152.
— tartarisatum, 205.
— virgineum, 122.
— zooticum, 189.
Hydrargyrus, 122.
— acetatus, 203.
— calcinatus, 145.
— corrosivus albus, 176.
— cum Creta, 127.
— — Magnesia, 127.
— muriaticus ammoniacalis fortior, 199.
— — dulcis, 156.
— — oxydulatus, 155.
— muriatus, 175.
— — corrosivus, 175.
— — dulcis, 156.
— — mitis, 155.
— — oxydulatus, 155.
— nitratus ruber, 146.
— oxydulatus, 155.
— praecipitatus albus, 199.
— — ruber, 145.
— purificatus, 122.
— sulphuratus niger, 138.
— — ruber, 152.
— cum Sulphure, 138.
— vitriolatus, 191.
Hydrae Calcariae, 392.
— ferricum s. ferrosum, 643.
— kalicum s. kalicus, 371.
— kalicum et kalicus fusus, 371.
— Potassae, 372.
— — fusae, 371.
— — purae fusae, 371.
— Potassii Protoxydi, 371.
— Sulphuris, 600.
Hydrastis Canadensis, 748.
Hydratum Sulphuris, 600.
Hydriodas Ferri, 20.
— Potassae, 8.
— — ioduratus, 20.
— Potassii Protoxydi, 8.
Hydrocarbonas Cupri coeruleus, 584.
— — viridis, 584.
Hydrochloras Ammoniae, 169.
— Ammoniaci, 169.
— — cupricus, 590.
— — et Ferri, 657.
— ammonicus depuratus, 169.
— — — cum Oxydo hydrargyrico, 199.
— — — cum Sesquichloreto Ferri, 657.
— Argenti et Ammoniaci — Liq. Argenti muriat. ammoniat.
— Auri — Liq. Auri muriat.
— — et Sodae — Aurum muriat. natronat.
— Barytae — Liq. Terrae ponid. salit.
— Cupri Deutoxydi, 590.
— Ferri, 652. 653.
— Magnesiae, 91.
— Manganesii, 98.
— Mercurii et Ammoniaci, 198.
— — ferrati, 167.
— natricus, 575.
— Potassae, 397.
— Potassii Protoxydi, 397.
— Sodae, 575.
— Sodii Protoxydi, 575.
Hydrochloretum Ammonii crudum, 169.
— — depurat., 169.
Hydrochloretum Ammonii cum Oxydo hydrargyrico, 199.
— — — cum Subbichloreto Ferri, 657.
— — Deutoxydi Hydrargyri, 199.
Hydrochlorinas Ferri, 653.
— natricus, 575.
Hydrocyanas Ferri, 669.
— — — Trioxydi, 669.
— Mercurii, 189.
— Potassae, 38.
— — et Ferri, 38.
— — ferruginosus, 38.
— — medicinalis, 38.
— Potassii Protox., 38.
— Protoxydi Potassii, 38.
— Zinci, 684.
Hydrogale, 46.
Hydrogeninum, 680.
— zooticum, 144.
— oxydatum, 680.
Hydrogeno-Sulphuretum Ammoniae liquidum, 172.
Hydroiodas ioduratus Potassae, 10.
— halicus, 8.
— Potassae, 8.
— Potassii, 8.
— — Protoxydi, 8.
— Sodae, 10.
Hydrolapathum, 489.
Hydromel, 249.
— antiasthmaticum, 614.
— anticatarrhale, 68.
— asthmaticum, 614.
— compositum, 5.
— simplex, 249.
— vinosum, 80.
Hydropiper, 316.
Hydroselinum, 264.
Hydrosilicas Zinci, 684.
Hydrosulphas Ammoniae, 172.
— Ammoniaci, 172.
— — sulphuratus, 172.
— Antimonii sulphurat., 229.
— Calcii Protox., 366.
— Calcis, 366.
— — antimoniatus, 234.
— — compactus, 366.
— — lenticularis, 366.
— Potassae, 398.
— Protoxydi Calcii, 366.
— Sodae, 583. 585.
Hydrosulphocyanas Potassae, 39.
Hydrosulphuretum ammoniacale aquosum, 172.
— Ammoniae, 172.
— — liquidum, 172.
— ammonicum, 172.
— Antimonii rubrum, 223.
— liquidum, 43.
— luteum Oxydi Stibii sulphurat., 229.
— — Oxyduli Stibii sulphurat, 229.
— Oxydi Stibii aurantiac., 229.
— — — fuscum, 223.
— — — rubrum, 223.
— Oxyduli Stibii, 223.
— — — sulphurat., 229.
— Potassae, 398.
— rubrum Stibii sulphurati, 223.
— Stibii, 223.
— — sulphurati rubrum, 223.
— stibiosum, 223.
— — cum Sulphure, 229.
Hydroxydum Ferri-Ochra lutea — — globulare—Aetites.
Hymenaea Courbaril, 726.
Hyosciamus, s. Hyoscyamus.
Hyoscyama, 749.
Hyoscyamina, 749.

Hyoscyamidinum, 749.
Hyoscyamus, 748. 749.
— albus, 748. 749.
—, niger, 749.
Hypercarbonas Potassae vegetalis, II. 377.
— Sodae, II. 577.
Hypericum, 757.
— Androsaemum, 757.
— baccíferum, 732.
— Cayennense, 732.
— perforatum, 757.
— quadrangulare, 757.
Hyperoxalas Potassae, II. 403.
Hyperoxodes Ferri nigrum, 638.
— Hydrargyri, II. 146.
Hyperoxydum Arsenici, 270.
Hyperprototartras Potassii boraxatus, II. 411.
— — cum Borate Sodae, II. 411.
— — Protox., II. 406.
Hypersulphas Aluminae et Potassae, 134.
Hypertartras Potassae, II. 406
— Potassii Protoxydi, II. 406.
Hypoboras Sodae, II. 580.
Hypocarbonas Ammoniae, 189.
— — liquidum s. liquidus, 162.
— — pyro-animale s. pyro-animalis, 162.
— — — liquidum s. liquidus, 163.
— Magnesiae, II. 88.
— Potassae liquidum, II. 380.
— pyro-oleosus liquidus, 163.
— Sodae, II. 577.
Hypochaeris maculata, 760.
Hypocistis, 701.
Hypoglossum, II. 490
Hypophosphis Potassae, II. 385.
— Sodae, II. 586.
Hyposulfites Mercurii et Ammoniaci s. Ammonii, II. 192.
— — et Potassae, II. 192.
— — et Sodae, II. 192.
— Potassae, II. 389.
— Sodae, II. 585.
Hyposulphas Antimonii, 284.
Hyposulphites s. Hyposulphis, v. Hyposulfites.
Hypoxodes Ferri — Ferr. oxydul. nigrum.
Hyssopus, 761.
— officinalis, 761.
Hystrix, v. Histrix.

I.

Iberis, II. 63.
Ichthyocolla, 680.
Icica Caranna, 412.
— Icicariba, 620.
Ictodes foetidus — Dracontium foet.
Ignatia amara, 629.
Ilex Aquifolium, 259.
— vomitoria, II. 1.
Illecebrum majus, 678.
— vermiculare, II. 546.
Illicium anisatum, 211.
Imbricaria parietina, II. 64.
Imperatoria, I.
— Ostruthium, I.
Indigofera Anil, II. 1.
— argentea, II. 1.
— tinctoria, II. 1.
Indigotina, II. 21.
Indigotinum, II. 1. 21.
Indum — Malabathrum.
Infusio anthelmintico-tonica, 561, v. Infusum.
Infusum Absinthii, 6.
— — nitratum, 6.
— Acaciae Catechu, 445.
— astringens, II. 466. 692.
— alexiterium, 265.
— Althaeae, 123.
— amarum, 419. 695.
— — alcalisatum, 696.
— — Edinburgense, 695.
— — cum Natro, 696. II. 579.
— — et Rorismarini, 696.
— — vinosum, 697.
— Angelicae, 402.
— Angusturae, 206.
— Anisi, 210.
— anthelmintico-incitans, II. 645.
— — tonicum, 561.
— anthelminticum, 742. II. 588.
— Anthemidis, 463.
— antihydropicum, II. 441.
— antiscorbuticum, 546.
— Armoraciae, II. 441.
— — compositum, II. 441.
— Arnicae Florum, 266.
— — — compositum, 267.
— — vinosum, 267.
— Artemisiae Absinthii — Inf. Absinth.
— Astragali exscapi, 293.
— Aurantii compositum, 529.
— Aurantiorum Folior., 529.
— Baccarum Juniperi — Inf. Junip. Bacc.
— bechicum, II. 97. 388.
— Belladonnae, 297.
— Boraginis Florum, 332.
— Bruceae, 206
— Buglossi, 193.
— Bynes, II. 95.
— Calami aromatici, 349.
— — — cum Acido muriatico oxygenato, 511.
— Calcis cinchonatum, 490.
— Calombae, 560.
— Cannabis, 598.
— Cantharidum, 400.
— Capilli Veneris, 65.
— cardiacum, 265.
— — acetatum, 265.
— Cardui benedicti, 449.
— carminans, 464.
— Caryophyllorum, 424.
— Cascarillae, 488.
— Cassiae Fistulae, 429.
— — Marylandicae, 430.
— Catechu s. Catechu compositum, 445.
— cathartico-anodynum, 464.
— Centaureae benedictae, 449.
— Centaurii minoris, 448.
— Ceraserorum pedunculorum, 452.
— Ceterach Folíorum, 456.
— Chamaedryos, II. 643.
— Chamomillae, 463.
— — compositum, 464.
— — cum Subcarbonate Potassae, 464.
— Chenopodii ambrosioidis, 460.
— Chimaphilae, 472.
— Chinae cum Aqua Calcis, 490.
— — calidum, 490.
— — compositum, 492.
— — — s. sine calore, 489.
— — potassatum, 490.
— — cum Succo Limonum, 492
— Ciceris Seminum, 512.
— — decoctum Salicis, II. 499.
— Cichoriae cum Aqua Calcis, 490.
— — aquosum compos., 491.
— — sine calore, 489.
— — frigidum, 489.
— — cum Magnesia, 490.
— — cum Succo Limonum, 492.
— Cinnamomi, 391.
— Cochleariae armoracis. — Inf. Armor.
— Colombae, 560.
— Colombo, 560.
— Columbae, 560.
— Columbo, 560.
— Conii maculati, 516.
— Corticis Peruviani vinosum, 499.
— Croci, 678.
— Cusparide, 206.
— Digitalis, 613.
— — purpureae, 613.
— diureticum, 288. 614.
— Dulcamarae, 619.
— emmenagogum, 696.
— Eupatorii perfoliati, 696.
— Extracti Mimosae Catechu, 445.
— — — cum Opio, 445.
— — — Katechu, 445.
— — — — cum Opio, 445.
— Flammulae Jovis, 543.
— Galli lutei, 677.
— Gallarum, 679.
— Gentianae compos., 695.
— Glycyrrhizae, II. 82.
— Gratiolae, 707.
— haemastaticum, II. 466.
— Hederae terrestris, 734.
— Hellebori nigri, 739.
— — — Hoffmanni, 739.
— Helmintochorti, 742.
— ad hemicraniam, II. 658.
— ad hydropicos, II. 441.
— Hyssopi, 761.
— Imperatoriae, II. 1.
— Ipecacuanhae, II. 14.
— — vinosum, II. 14.
— Jaceae, II. 81.
— Japonicum, 415.
— Juglandis compositum, II. 42.
— Juniperi Baccarum, II. 42.
— — — compositum, II. 43.
— Kali carbonici cum Squilla vinosum, II. 538.
— Lauro-Cerasi Foliorum, 452.
— Lavandulae, 58.
— laxativ. Mannagettae, II. 563.
— — sedans, II. 562.
— — simplex, II. 562.
— — Viennense, II. 562.
— Ledi, II. 62.
— — palustris, II. 62.
— Lepidii, II. 83.
— Lichenis Islandici, II. 65.
— Lini, II. 74.
— — cathartici, II. 75.
— — compositum, II. 74.
— — usitatissimi, II. 74.
— Liquiritiae, II. 82.
— Lupuli, II. 66.
— Malti, II. 95.
— Malvae, II. 97.
— Melissae, II. 109.
— Menthae, II. 115.
— — compositum, II. 115.
— — crispae, II. 116.
— Millepedum, II. 211.

Infusum Menyanthis, II. 688.
— nervinum, II. 666.
— — aethereum, 268.
— — martiale, 268.
— Nicotianae, II. 236.
— Nymphaeae, II. 242.
— Opii aquosum, II. 266.
— Orchidis, II. 466.
— Origani, II. 296.
— Paeoniae petalorum, II. 301.
— Papaveris erratici, II. 307.
— ad paralysin, II. 441.
— paralyticum, II. 441.
— Pareirae bravae, 624.
— Pastae Althaeae, 730.
— pectorale, 123. 734.
— Persicorum s. Persicorum Florum, II. 315.
— Picis empyreum. liquidae, II. 330.
— — liquidae, II 330.
— Pimpinellae, II. 323.
— Pini turionum, 3.
— Piperis Cayennensis, II. 329.
— Polygalae amarae, II. 366.
— Pulsatillae, 195.
— purgans, II. 30.
— Quassiae, II. 432.
— — excelsae, II. 432.
— — cum Natro, II. 579.
— — et Sulphatis s. cum Sulphate Zinci, II. 432.
— Quercus Glandium tostarum, II. 436.
— Raphani, II. 441.
— Rhabarbari, II. 451.
— Rhei, II. 451. 454.
— — alcalisatum, II. 454.
— — alcoholisatum, II. 456.
— — amarum, II. 452.
— — aquosum, II. 454.
— — boraxatum, II. 456.
— — palmati, II. 451. 454
— — salinum, II. 455.
— — cum Subcarbonate Potassae, II. 454.
— Rhododendri, II. 459.
— Rhoeados, II. 307.
— roborans, 696.
— Rorismarini, II. 478.
— Rosae, II. 467.
— Rosarum, II. 467.
— — acidulum, II. 468.
— — compositum, II. 468.
— Sabinae, II. 42.
— — cum Acido phosphorico, 50.
— Salep cum adstringentibus, II. 581.
— Salviae, II. 501.
— — acidulum, II. 501.
— — vinosum, II. 501.
— Sambuci, II. 509.
— — cum Tartaro stibiato, 242.
— Sanguinariae, II. 517.
— Santonici seminis, 522.
— Sassafras Ligni, II. 525.
— scilliticum vinosum compositum, II. 538.
— Secalis cornuti, II. 546.
— Sennae, II. 560.
— — sine Aromatibus, II. 562.
— — citratum, II. 561.
— — compositum, II. 560. 561.
— — — sine Aromatibus, II. 562.
— — laxativum, II. 562.
— — cum Manna, II. 562.
— — purgans, II. 562.
— — simplex, II. 560.
— — cum Succo Citri, II. 561.
— — tamarindatum, II. 561.
— — et Tamarindi, II. 561.
— — tamarindinatum, II. 561.
Infusum Sennae cum Tamarindo, II. 561.
— — tartarisatum, II. 562.
— Serpentariae Virginianae, 265.
— Simarubae, II. 570.
— Sinapios, II. 441.
— Specierum arom., 469.
— Spigeliae, II. 588.
— stomachicum, 491.
— Tabaci, II. 236.
— Tamarindi et Sennae, II. 561.
— Tamarindorum, II. 610.
— — compositum, II. 610.
— Tanaceti, II. 614.
— Thymi, II. 649.
— Tiliae, II. 660.
— tonico-nervinum, II. 665.
— tonicum, 491. II. 14.
— Trifolii fibrini, II. 658.
— Ulmi, II. 660.
— Valerianae, II. 665.
— — compositum, II. 665
— — vinosum, II. 667.
— vermifugum, II. 589. 645.
— Veronicae, II. 674.
— Violarum, II. 677.
— vulnerarium, 80.
Inhalatio balsamica, 311.
Injectio acustica, 310.
— adstringens, 138. 444. 495. 589. 650. 679. II. 201. 46. 342. 351. 434. 692. 694.
— Aluminis compos, II. 351.
— anodyna, II. 265.
— antiseptica, 493. II. 499.
— c. Aqua Lauro-Cerasi, 40.
— ad aures, 310.
— auricularis detersiva, II. 491.
— balsamica, 304.
— ad biennorrhoeam II. 694.
— ad carnem luxuriantem urethrae, II. 159.
— Catechu, 444.
— Chinae, 495.
— — antiputrida, 493.
— contrastimulans, 40.
— cuprata, 586 589.
— Cupri ammoniacalis, 584.
— deprimens, II. 251.
— detergens, 98. 583. II. 230.
— — et roborans, 110.
— detersiva adstringens, II. 692.
— diuretica, 613.
— emolliens, II. 310.
— excitans, 353 631.
— fellea, 631.
— ad fistulas, 353. 402.
— ex Gallis, 679.
— Girtanneri, II. 373.
— in gonorrhoea, II. 173.
— hydrargyrica simplex, II. 125.
— hydrargyro-saturnina, II. 186.
— — terebinthinata, II. 128.
— Ichthyocollae et Myrrhae, 684.
— incitans, 402.
— Lactis opiata, II. 265.
— leniens, 748. II. 214. 251. 266.
— ad leucorrhoeam, II. 342. 692.
— lithontriptica, II. 392. 579.
— mercurialis, II. 143. 177.
— — Aliberti, II. 177.
— — opiacea, II. 185.
— — Plenkii, II. 125.
— — simplex, II. 125.
— e Mercurio dulci, II. 158.
— mucilaginosa, II. 75.
— ex Muriate Hydrargyri, II. 168.
Injectio Muriatis Hydrargyri camphorata, II. 175.
— narcotica, 781. II. 232.
— in necrosi syphilitica, II. 178.
— opiacea, II. 265.
— ad phimosin, 588.
— de Plumbo et Mercurio, II. 186.
— resolvens, II. 350.
— saturnina, II. 394.
— — cum Myrrha, II. 351.
— — myrrhata, II. 351
— sedans, II. 264. 348.
— sedativa, II. 265.
— — adstringens, II. 692.
— Sulphatis Zinci aluminosa, II. 692.
— terebinthinacea, II. 620
— tonica, 493.
— vaginalis emmenagoga, 148.
— — cum Mercurio, II. 143.
— Whately, II. 180.
Inspissamentum Cucumeris agrestis, II. 212.
— Urticarum, II. 660.
Intybus angustum, II. 49.
— hortensis, 512.
Inula, II. 2.
— dysenterica, II. 2.
— Helenium, II. 2.
Inulinum, II. 2.
Iodas Calcis, II. 8.
— Potassae, II. 8.
Iodetum Kalii, II. 8.
Iodina, II. 7.
Iodinum, II. 7.
Iodum, II. 7.
Ioduretum Carbonii, II. 10.
— Mercurii, II. 138.
— Potassii, II. 9.
Ipecacuanha, II, 11.
Ipomoea Jalapa s. macrorrhiza — Convolv. Jalapa.
Iris, II. 17.
— Florentina, II. 18.
— foetidissima, II. 18.
— Germanica, II. 17.
— nostras, II. 17.
— palustris, II. 18.
— Pseudacorus, II. 17.
— tuberosa, 744.
— versicolor, II. 18.
Isatina s. Isatinum, II. 21.
Isatis, II. 1. 20.
— tinctoria, II. 1. 20.
Isolusinum, II. 365.
Iva, II. 614.
— arthritica, II. 613.
Izarinum, II. 485.

J.

Jacea, II. 21.
— nigra, II. 21.
Jacobaea, II. 548.
Jalapa, II. 22.
— alba, II. 105.
Jalapina, II. 22.
Jalapinum, II. 22.
Jalappa, II. 22.
Jalappium, II. 22.
Jamaicinum, 701.
Janipha Manihot, II. 615.
Jasminum, II. 32.
— officinale, II. 32.
Jatropha Curcas, II. 239.
— Manihot — Janipha.
— elastica — Siphonia Cah.
Jecoris Aselli oleum, II. 216.
Jodum, s. Iodum.
Juglans, II. 32.
— cinerea, II. 32.
— regia, II. 32.
Jujuba, II. 35.

Julapium acidulatum, 72.
— acidum, 33 54.
— adstringens, 140. II. 29. 512.
— aethereum, 76.
— anodynum, II. 313.
— anthelminticum, 522.
— antiarthriticum, 375.
— antihaemorrhagicum, 54.
— antihystericum, II. 220. 493.
— antiphthisicum, 686.
— antispasmodicum, 77.
— e Camphora, 373.
— — cum Aceto, 374.
— camphoratum, 373.
— — acidulum, 374.
— diatartareum, II. 466.
— diureticum, II. 631.
— emmenagogum, 576.
— expectorans, 313.
— foetidum, 284.
— gummosum, 731.
— hydragogum, 248.
— leniens, II. 316. 251. 350. 382.
— — et purgans, II. 393.
— Menthae, II. 320.
— mithridaticum, II. 278.
— moschatum, II. 220.
— Moschi, II. 220.
— narcoticum, II. 313.
— nitrosum, 48.
— oxymellitum, 22.
— pectorale, 731. II. 313. 696.
— purgans, II. 29.
— refrigerans, 69. 541. II. 392.
— regium, II. 473
— Rosarum, II. 473.
— roseatum, II. 473.
— sambucinum, II. 512.
— scilliticum, II. 543.
— scoticum, 312.
— sedans, II. 216. 382.
— sedativum, II. 251.
— sistens, II 291.
— stomachicum, II. 383.
— succinatum, II. 598.
— sudorificum, 176.
— temperans, 375. II. 393.
— Violarum, II. 677.
— violatum, II. 677.
— vitriolatum, 54.
Julep, s. Julapium.
Juncus odoratus, 193
Juniperus, II. 37.
— communis, II. 37. 511.
— Lycia, II. 244. 511
— Phoenicea, II. 244.
— Oxycedrus, II. 511.
— Sabina, II. 37.
— thurifera, II. 244.
— Virginiana, II. 37.
Jupiter, II. 590.
Jus adstringens, 563.
— antiherpeticum, 673.
— aperitivum, 292.
— Cancrorum, 683 684.
— Caponis, 684.
— Carnis bubulae, 684.
— Columbae, 684.
— depurativum, 314.
— diureticum, 292. 642.
— Lacertarum, 683.
— leniens, 687.
— Liquiritiae, II. 77.
— Millepedarum, II. 211.
— ossium, 683.
— pectorale, 334. 684. 686. II. 68.
— purificans, II. 5.
— Ranarum, 683.
— temperans, 687.
— Testudinum, 683. 684.
— Vituli pulmonum, 683. 684.
— vitulinum, 683. 684
Jusculum antiepilepticum, II. 301
— antispasmodicum, II. 301
— helicinum, 684.
— lientericum, 687.
— pectorale, II. 36. 310.
— Pulli gallinacei lientericum, 687.
— siccum, 689.
— Viperae, 683.
— viperinum, 684.
Jusquiamum, 749.
Justicia Adhatoda, 64.
— pectoralis, 43.

K.

Kadmia, II. 684.
Kadmium, II. 684.
Kaempferia Galanga, 676.
— rotunda, II. 682.
Kali acetatum, II. 398.
— aceticum, II. 398.
— ammoniato - tartaricum, II. 413.
— arsenicosum, II. Add.
— bisulphuric., II. 388. et Add.
— Borussicum, 38.
— — venale, 38.
— carbonicum, II. 377. 378.
— — acidulum, II. 384.
— — e Cineribus clavellatis, II. 378.
— — crudum, II. 377.
— — impurum, II 377.
— — neutrale, II. 384.
— — perfecte saturatum, II. 384.
— — e Tartaro, II. 378.
— causticum, II. 371
— — cum Calce, II. 372.
— — fusum, II. 371.
— — siccum, II. 371.
— chloricum depurat., II. 397.
— — venale, II. 397.
— citratum, II. 403
— ferro borussicum, 38.
— ferrocyanicum, 38.
— ferruginoso - hydrocyanicum, 38.
— hydroiodicum s. hydroiodinicum, II. 8.
— hydrosulpho-cyanicum, 39.
— iodinicum, II. 8.
— iodicum, II. 8
— muriaticum oxygenat. depurat et venale, II. 397.
— nitratum, II. 389.
— nitricum, II. 389
— — crudum, II. 390.
— — depuratum, II. 389.
— — purificatum, II. 389.
— — purum, II. 389.
— oxalicum acidulum, II. 403.
— — purum, II. 403.
— oxymuriaticum depurat. et venale, II. 397.
— praeparatum, II. 378.
— purum, II. 371.
— sidero-zooticum, 38.
— stibiato sulphurat. — Hepar Antimonii.
— subcarbonicum, II. 377.
— — crudum, II. 377.
— — purissimum II. 378.
— sulphurato-stibiatum, 235.
— sulphuratum, II. 375.
— — pro balneo, II. 335.
— sulphuricum, II. 386.
— — acidum, II. 388
— — crudum, II. 395.
— — depuratum, II. 386.
— tartaricum, II. 404
— tartarisatum, II. 404.
— vegetabile caustic., II 370.
— — purum, II. 370.
Kali vitriolatum, II. 386.
— zooticum, 38.
— — venale, 38.
Kalium iodatum, II. 8.
— sulphuratum, II. 375.
Kalmia, II. 44.
— latifolia, II. 44.
Keiri, 466.
Kermes Grana, 470.
— minerale, 223.
Ketmia Aegyptiaca, 1.
Kikekunemalo, II. 44.
Kininum, 605.
Kino, II. 44.
Krameria triandra, II. 442.

L.

Labdanum, II. 51.
Lac, II. 46.
— adstringens, II. 425.
— ammoniacale. 719.
— — compositum, 720.
— Ammoniaci, 719.
— Amygdalae s. Amygdalarum, 183.
— anodynum, 186.
— antipsoricum, 367.
— artificiale, 185.
— Asae foetidae, 284.
— asininum, II. 46.
— — artificiale 685.
— bubulum, II. 46.
— caprinum, II. 46.
— diureticum, II. 618.
— ebutyratum, II. 46.
— Guajaci Gummi, 716.
— guajacinum, 716.
— leniens, 188
— infantum, II. 382.
— Lunae, 357.
— mercuriale, II. 199.
— — Plenkii, II. 186.
— pectorale, 455.
— Plumbi, II. 333.
— Sulphuris, II. 600.
— terebinthinaceum, II. 618.
— Terrae, II. 88.
— vaccinum, II. 46.
— virginale, II. 339 351.
Lacca, II. 46.
— in baculis, II. 46.
— coerulea, II. 47.
— Florentina, II. Add.
— in granis, II. 47.
— in massis, II. 47.
— Musci, II. 47.
— in ramis, II. 46.
— in ramulis, II. 46.
— in tabulis, II. 47.
Laccae Muscus, II. 47.
Laccinum, II. 47.
Lacerta agilis, 681.
Lacmus, II. 47.
Lacryma Job, II. 49.
Lactuca, II. 49.
— sativa, II. 49. 50.
— Scariola, II. 49.
— sylvestris, II. 49.
— virosa, II. 49.
Lactucarium, II. 50.
Ladanum, II. 51.
— in massis, II. 51.
— in tortis, 51.
Lagophthalmus, 702.
Lamium album, II. 52.
— montanum, II. 113.
Lana philosophica, II. 684.
Lapathum acutum, II. 489.
— aquaticum, II. 489.
— crispum, II. 489.
— unctuosum, 69.
— sanguineum, II. 489.
Lapha, 278.

Lapides Cancri s. Cancrorum. 359.
— — acetati, 368.
— — citrati, 368.
— — praeparati, 360.
— Carpionum, 358.
— Percarum, 358.
— Spongiarum, 358.
— — praeparati, 360.
Lapilli Cancrorum, 359.
Lapis Armenius, 584
— Bufonius, 363.
— calaminaris, II. 684.
— — praeparatus, II. 684.
— canaticus, II. 371
— — Chirurgorum, II. 371.
— divinus, 587.
— de Goa, II. 220.
— Haematites, 641.
— infernalis, 261.
— — alcalinus, II. 371.
— Judaicus, 358.
— — praeparatus, 360.
— Lazuli, 133.
— Lyncis, 358.
— Manati, 364.
— medicamentosus, 136.
— miraculosus, 587.
— nephriticus, II 52.
— ophthalmicus. 587.
— porcinus, 357. 369.
— Pumicis, II. 426.
— septicus, II. 371.
— specularis, 366.
— suillus, 357.
— — praeparatus, 360.
— vulnerarius externus, 587. II. 693.
Lappa major, 313
— minor, II. 681.
Lappula hepatica, 80.
Larix Europaea, II. 99. 617.
Laserpitium, II. 52.
— Germanicum, II. 72.
— latifolium, II. 52.
— Siler, II. 52.
Lathyris major, 441.
Laudanum antihystericum, II. 263.
— cinnabarinum, II. 156.
— compositum, II. 248.
— crocatum, II. 248.
— cydoniatum,
— diureticum, II. 263.
— Helmontii junioris, II. 263
— de Lalouette, II 247.
— liquidum, II. 248 253. 255.
— — compositum, II. 248.
— — Sydenhami, II. 248.
— — Warneri, II. 258.
— nepentesQuercetani, II. 247.
— opiatum, II. 247. 248. 260. 262.
— — cydoniatum, II. 263.
— — Rousseau, II. 254.
— simplex, II. 260.
— urinarium, II. 263.
— — Micheli, II. 263.
Lauri Oleum, II. 53.
Lauro-Cerasus, 450
Laurus, II. 52.
— Alexandrina, II. 490.
— Camphora, 371.
— Cassia, 379.
— Cinnamomum, 379.
— Culilaban, 580.
— Myrrha-Myrrha.
— nobilis, II. 52.
— Sassafras, II. 524.
Lavandula, II. 57.
— latifolia, II. 57.
— Spica, II. 57.
— Stoechas, II. 693.
— vera, II. 57.
Lawsonia inermis, II. 62.
Lawsonia spinosa, II. 62.
Lecanora tartarea—Lacca.
Ledum palustre, II. 62.
Lemithochorton, 741.
Lens, II 62.
Leontodon Taraxacum — Taraxacum. Dens Leonis.
Leontopodium, 51.
Leonurus Cardiaca, 417.
Lepidium, II. 62 63.
— Iberis, II. 63.
— latifolium, II. 63.
Leporum talus, 363.
Lepus combustus, 359. 413.
— timidus, 359. 681.
Leucanthemum odoratum, 458.
Leucoium luteum, 466.
Levisticum, II. 71.
Libanus thurifera, 244.
Lichen, II. 63.
— coccifertus, II. 63.
— infundibuliformis, II. 63.
— Islandicus, II. 63.
— cinereus terrestris, II. 63.
— petraeus latifolius, 743.
— pulmonarius, II. 64.
— Roccella — Lacca coerulea.
— stellatus, 743.
— tartareus — Lacca coerulea.
— terrestris cinereus, II. 63.
Lignum Agallochi veri, II. 69
— Agallochum, II. 69.
— Aquilae, II. 69.
— Aspalathi II. 69.
— benedictum, 707.
— Brasilianum rubrum, II. 69.
— Brasiliense, II. 69.
— Buxi, 346.
— Campecheanse, II. 69.
— Campechianum, II. 69.
— Campechiense, II. 69.
— Campescanum, II. 69.
— cedrinum, II. 37.
— coerulenm, II. 69.
— colubrinum, II. 695.
— Ebenum, 617.
— Fernambuci, II. 69.
— Guaci, 707.
— Indicum, 707.
— Juniperi, II. 37.
— Mahagoni. II. 608.
— Moluccanum, 577.
— Moluccense, 577.
— nephriticum, II. 71.
— Panavae, 577.
— Pavonae, 577.
— Quassiae, II. 431.
— Rhodii, II. 71.
— sanctum, 707.
— Santali albi, II. 513.
— — citrini, II. 513.
— — rubri, II. 512.
— Sappan, II. 69.
Ligusticum, II. 71. 72.
— Levisticum, II. 71.
— Meum, II. 207.
Ligustrum, II 72.
— Aegyptiacum, II. 62.
— vulgare, II. 72.
Lilium, II. 72.
— album — L. candidum.
— candidum, II. 72.
— Convallium, 567.
Limatura Chalybis, 632.
— Ferri, 632.
— — alcoholisata, 632.
— — depurata, 632.
— — praeparata, 632.
— — puri, 632.
— — purificata, 632.
— Martis, 632.
— — alcoholisata, 632.
Limatura Martis depurata, 632.
— — praeparata, 632.
— — purificata, 632.
— Stanni, II. 690.
— — puri, II. 690.
Limonata alcoholica. 87.
— Cremoris Tartari solubilis, II. 405.
— emetica, 242.
— haemastatica, 54.
— laxatica, II. 411.
— mineralis, 54.
— nitrica, 47.
— phosphorica, 52.
— sicca, 31. 541.
— stibiata, 242.
— sulphurica, 54.
— tartarica, 59.
— vegetabilis, 59. 540.
— vinosa, II. 676.
Limonium, 320.
Limonum, 320.
Linaria, II. 73.
— Cymbalaria, 600.
— spuria, II. 73.
— vulgaris, II. 73.
Linctus acidus, 53. 600.
— albus, 187.
— amygdalinus, 42.
— antisyphiliticus, II. 208.
— aperiens, II, 108.
— ad aphthas, II. 582.
— de Borace, II. 581.
— camphoratus, 373.
— Cetacei, 455.
— communis, 455. II. 667.
— compositus, II. 266.
— demulcens, 187.
— emeticus, 245.
— emolliens, 187.
— expectorans, 26. II. 542.
— gelatinosus nutriens, 588.
— ad gingivas, II. 230.
— de Haen, 430.
— laxans, 430.
— leniens, II. 252. 654.
— mannatus, II. 100.
— Mesembryanthemi crystallini, II. 207.
— Olei Terebinthinae, II. 632.
— oleosus, 187.
— Oxymuriatis calcici, 356.
— pectoralis, II. 12. 209.
— Phosphori, II. 380.
— purgans, 733.
— refrigerans, 464. II. 392.
— saponaceus, II. 416.
— saponato-hydrosulphuratum, II. 376.
— saponatus, II. 416.
— ad stomacacen, 356. 511.
— subadstringens, 445.
— vermifugus, II. 665.
Lingua Avis, 673.
— Bovis, 192.
— cervina, II. 544.
— serpentaria, II. 245.
Linimentum Absinthii, 8
— AcetatisCupri s cuprici, 582.
— aceticum, II. 419.
— acidum, 34.
— Aeruginis, 582.
— aethereum, II. 53. 419.
— aethericum, II. 419.
— album, 453.
— Albuminis Ovi, II. 300.
— alcalinum, II. 382.
— aluminosum, 138. 139
— ad ambustiones, 353.
— — cum Opio, 354.
— Ammoniacae, 154.
— ammoniac. c. Cantharidibus 403.
— — camphorat., 154. 167.
— — compositum, 165.
— ammoniacatum, 154.

Linimentum ammoniacat. mixtum, 167.
— Ammoniaci Gummi, 720.
— Ammoniae, 144.
— — et Antimonii tartarisati, 206.
— — Subcarbonatis, 167.
— ammoniato-aethereum, 159. 403.
— — aromaticum, 159. 403.
— — camphoratum, 164.
— — terebinthinat. II. Add.
— ammoniatum, 154.
— — cum Camphora, 164.
— ammonicum, 154.
— Ammonii foetidum, 166.
— — opiatum, 155.
— ammonitum, 154.
— Ammoniureti Mercurii, II. 190.
— Amygdalarum, 182.
— contra anginam, 180.
— Anglicanum, 164.
— anodynum, 166. II. 250. 267. 268. 429.
— — et resolvens, 761.
— antarthriticum, 166. 168. 308. II. 695.
— anthelminticum, 564.
— antihaemorrhoidale, 462. 757. II. 73. 621.
— antiherpeticum, 637.
— antihystericum, II. 346.
— antiophthalmicum, 642. II. 327.
— antipleureticum, II. 490.
— antipsoricum, 354.
— antirheumaticum, II. 633.
— antispasmodicum, II. 250.
— antispasticum, 156.
— antivenereum, II. 135.
— aphrodisiacum, 309.
— ad aphthas, II. 681.
— ex Aqua s. Aquae Calcis, 353.
— aromaticum, II. 60.
— — stimulans, II. 479.
— arsenicale, 272.
— ad arthrodyniam, 408.
— Balsami Peruviani, 308
— baryticum, 317.
— Boracis, II. 681.
— de Borate, II. 681.
— boraxatum, II. 681.
— calcareum, 353.
— Calcariae sulphuratae, 355.
— calcicum, 353.
— — cum Opio, 354.
— Calcis, 353.
— Camphorae compositum, 160. 166.
— camphorato-ammoniatum, 164. et Add.
— — opiaceum, 378.
— — saponatum, 376.
— camphoratum, 378.
— — compositum, 155.
— — opiaceum, II. 257.
— Cantharidum, 404.
— — camphoratum, 403.
— Capae, 90.
— cuprosum, 692.
— digestivum, II. 621.
— diureticum, II. 535. 631.
— — gastro — scilliticum, II. 535.
— emolliens, 189.
— epilatorium, 263.
— excitans, 408. II. 42. 536. 224. 256.
— — aethereum, 403.
— — aromaticum, 403.
— — camphoratum, 403.
— — terebinthinat, 403.
— ex Felle Tauri, 631.
Linimentum farinaceum cum Pice, II. 330.
— gingivale, 34. 443.
— — mundificans, II. 228.
— — roborans, 443.
— gummoso balsamicum, 310.
— Hydrargyri, II. 134.
— hydrargyro-acetosum, II. 204.
— incitans, 375.
— irritans, 403. 159.
— — saponaceum, 403.
— juniperinum, II. 42.
— leniens, 378.
— ad mammillas, 310.
— mercuriale, II. 124.
— — ammoniacale, II. 136.
— — — camphoratum, II. 135.
— — opiaceum, II. 135. 250. 264.
— muriaticum, 34.
— narcoticum, II. 250.
— Nicotianae, II. 238.
— nigrum, 344.
— oleo calcareum, 353.
— — — opiatum, II. 354.
— ophthalmicum, 642.
— opiaceum, 264.
— — camphorat, II. 250.
— opiato-camphoratum, II. 250.
— — saponac., 250.
— opiatum, II. 255. 419.
— — et saponaceum, II. 250.
— Petrolei, II. 317.
— — ammoniatum, 154.
— phosphoratum, II. 321.
— — camphoratum, II. 321.
— plumbatum, II. 344.
— psoricum, 605.
— resinoso-terebinthinatum, II. Add.
— resolvens, 155. 167. 310. 356. 372. 408. 631. II. 633.
— — et diureticum, II. 42.
— rubefaciens, 403. II. 571.
— saponaceum, 156. II. 417. 418.
— — camphoratum, II. 419.
— — compositum, 156.
— saponato-ammoniat., 166.
— — camphoratum, 166. II. 418.
— Saponis, II. 418 420.
— — aethereum, II. 419.
— — camphoratum, 166. II. 268. 418.
— — compositum, 156. II. 268. 418.
— — et Opii s. cum Opio, II. 258. 419.
— — rubefaciens, 403.
— saturnino-quercinum, II. 352.
— sedans, 766. II 250.
— — aethereum, 260.
— sedativum, 755. II. 264.
— — camphoratum, II. 267.
— simplex, 251.
— spirituosum, 166.
— — anodynum, II. 258
— stimulans, 400. II. 634.
— stomachicum, II. 479.
— ad strumam, II. Add.
— Subboratis Sodae, II. 681.
— de Sulphure, II. 604.
— sulphurico-terebinthinatum, II. Add.
— sulphuro saponaceum, II. 576.
— Superacetat. Plumbi camp. II. Add.
Linimentum Tabaci, II. 238.
— Terebinthinae, II. 633.
— — aethereum, II. 628.
— terebinthinatum, II. 633.
— terebinthino - ammoniatum, 168.
— contra tineam, 155.
— vermifugum, II. 614.
— volatile, 154.
— — cum Camphora, 154.
— — camphoratum, 154.
Linum, II. 74.
— catharticum, II. 74.
— purgativum, II. 74.
— usitatissimum, II. 73.
Liquamen Martis, 653.
— Myrrhae, II. 220.
— Salis Tartari, II. 380.
Liquidambar, II. 595.
— imberbis, II. 595.
— orientale, II. 691.
— styraciflua, II. 596.
Liquiritia, II. 76.
— cocta citrina, II. 80.
— officinalis, II. 76.
Liquiritiae Succus crudus, II. 77.
— — depuratus, II. 77.
Liquor Acetatis Ferri aetherei, 660.
— — ammonici, 173.
— — kalici, II. 390.
— — Plumbi basici, II. 340.
— Acidi muriatici oxygenati, 510.
— — oxalici, 15. Add.
— acidus Halleri, 56.
— — phosphoricus parus — Acid. Phosphori.
— adstringens, II 692.
— Aeris cinnamomatus, 586.
— Aeruginis, 587.
— aethereus martialis nitricus, 652.
— — oleosus, 76.
— — sulphuricus, 75.
— Aetheris nitrosus, 75.
— Alcali acetici nigri, II. 389.
— — volatilis acetici, 174.
— — — compositus, 180.
— alexiterius acetatus, 21.
— — extemporalis, 511.
— — extemporaneus, 511.
— — oxygenatus, 510.
— Aluminis compositus, 139. II. 692.
— ex Ammonia et Oleo Succini, 158.
— ammoniaco-mercurialis, II. 200.
— ammoniacalis cum Aceto, 173.
— Ammoniae, 144.
— — Acetatis, 173.
— — anisatus, 149.
— — carbonicae, 161.
— — purae, 144.
— — spirituosus, 148.
— — Subcarbonatis, 161.
— — subcarbonicae, 161.
— ammoniato-stibiatus, 181.
— Ammonii, 144.
— — acetici, 173.
— — anisatus, 149.
— — carbonici, 161.
— — — aquosus, 162.
— — — pyro-oleosi, 163.
— — caustici, 144.
— — foeniculatus, 149.
— — hydrothiodic., 172.
— — oxalici, 179.
— — puri, 144.
— — pyro-oleosi, 163.
— — — succinici, 179.
— — subcarbonici aquosus, 161.

Liquor Ammonii succinici, 179.
— — sulphurati, 172.
— — Sulphureti, 172.
— — tartarici, 181.
— — vinosus, 148.
— anodynus animalis, 74.
— — martialis, 655.
— — mineralis, 75.
— — — Hoffmanni, 75.
— — — aquosus, 76.
— — — martialis, 655.
— — succinatus, II. 599.
— — topicus, 166.
— — Trilleri, 166.
— — vegetabilis, 69.
— — de Vicat, 151.
— antarthriticus Elleri, 181.
— — de St. Marie, 181.
— antimiasmaticus, 590.
— — Beisseri s. Koechlini, 590.
— — Laberraquii, 356.
— Antimonii tartarisatus, 239.
— — tartarisati, 239. 240.
— antiophthalmicus, 249.
— antiphlogisticus, 23.
— antipyreticus, 272.
— antiscrophulosus Niemanni, 295.
— antispasmodicus, 37. 180. 181.
— antisyphiliticus, II. 170.
— — Chaussieri, II. 189.
— antivenereus, II. 179.
— — Rouseni, II. 618.
— aperitivus, II. 410.
— ad aphthas, II. 581.
— Argenti muriatico-ammoniati, 263.
— — nitrici, 261.
— — sulphurici, 263.
— aromaticus saponato-ammoniatus, 166.
— Arseniatis Potassae, 273.
— arsenicalis, 273.
— — Fowleri, 273.
— Arsenici albi, 270.
— arthriticus Elleri, 181.
— — Pottii, II. 633.
— Auri muriatici, 298.
— auricularis, 310.
— balsamico-aromaticus, II. 481.
— Barytae aceticae, II. Add.
— — Muriatis, 315.
— — muriaticae, 315.
— — nitricae, 318.
— baryticus, 316.
— Beisseri, 590.
— Bellosti, II. 195
— Calcariae chloratae, 356.
— — muriaticae, 307.
— — sulphuratae, 355.
— — sulphuricae, 360.
— Calcis, 352.
— — Muriatis, 367.
— — oxymuriaticae, 396.
— Camphorae artificialis, II. 638.
— Carbonatis Ammoniae, 161.
— — ammonici, 161.
— — — cum Oleo empyreum., 163.
— — kalici, II. 380.
— cathaereticus, 567.
— Chloreti Stibii, 235.
— Chlori, 510.
— — extemporaneus, 511.
— Ciner. clavellat. depurat., II. 380.
— ad condylomata, II. 179. 187.
— Cornu Cervi alcalinus, 163.
— — — succinatus, 179.
— Liquor Cornu Cervi succinatus albus, 179.
— — — tartarisatus, 181.
— — — terebinthinatus, 173. 174.
— — — volatilis, 163
— Capri ammoniacalis, 589.
— — ammoniati, 589.
— — ammoniato-s. ammonio-muriatici, 590.
— — sulphurici — Reag.
— — sulphurico-ammoniati, 589
— cuproso-mercurialis, 291.
— Deutochlorureti Mercurii, II. 177.
— digestivus Boerhaavii, II. 399.
— discutiens, 23.
— diureticus, 211.
— enixus, 269.
— excitans, 168.
— exsutorius, 403. 404.
— febrifugus, 649.
— Ferri alcalini, 644.
— — muriatici oxydati, II. 654.
— — — oxydul., 653.
— — saliti, 653.
— — sulphurici, 648.
— fumans Boylei, 172.
— — Libavii, II. 592.
— ad gangraenam, 171.
— ad gingivas, 200.
— Gypsi, 366.
— Hoffmanni anod., 75.
— Hydrargyri ammoniati, II. 200.
— — camphorati, II. 179.
— — muriatici corrosivi, II. 177.
— — nitrici, II. 196
— — — oxydati, II. 198.
— — — oxydulati, II. 195.
— — Oxymuriatis, II. 178
— hydrargyro-aceticus, II 205.
— Hydratis kalici, II. 370.
— — natrici, II. 674.
— Hydrogenii sulphurati, 43.
— hydrosulphuratus pro balneo, 44.
— hydrosulphuretico-acidulus, 43.
— hydrosulphuricus pro balneo, 44.
— Kali acetici, II. 399.
— — — nigri, II. 399.
— — — cum Rheo, II. 402.
— — carbonici, II. 380.
— — caustici, II. 370.
— — ferreo-borussici, 38-39.
— — ferruginoso-hydrocyanici, 38. 39.
— — oxalici, II. Add.
— — subcarbonici, II. 380.
— Koechliai, 590.
— Lithargyri Acetatis, II. 340.
— — — comp., II. 342.
— de Lamotte, 655.
— Magnesiae sulphuricae, II. 92. et Add.
— martialis, 655.
— mercurialis, II. 177. 196.
— Mercurii ammoniati, II. 200.
— — nitrosi, II. 196.
— — — calore paratus, II. 196.
— — — dilutus, II. 196.
— — — frigore paratus, II. 196
— — sublimati corrosivi, II. 177.
— Mindereri, 173.
— — tenuior, 173.
— muriatico-hydrargyro-cupricus ammoniacalis, 591. II. 200.
— Muriatis deutoxydo-hydrargyro-calcarei, II. 134.
— — Ferri, 654.
— — Hydrargyri, II. 177.
— — hydrargyro-ammoniacalis, II. 200.
— Myrrhae, II. 229.
— — alcalisatae, II. 229.
— Natri carbonici, II. 578.
— — caustici, II. 594.
— — chlorici, II. 599.
— — hydrojodidici, II. Add.
— — muriatici, II. 577.
— ad nephritidem calculosam, II. 310.
— nervinus, 655.
— — Bangii, 295.
— — Pereboomii, II. 695.
— Nitratis Hydrargyri, II. 195.
— — hydrargyrosi, II. 198.
— — hydrargyrosi, II. 195.
— nitrico-aethereus martialis, 652.
— ad odontalgiam, II. 105.
— odontalgicus, II. 105.
— Olei animalis et Cajeputi, 347.
— oleosus Sylvii, 151.
— ophthalmicus, 291.
— — anodynus, II. 653.
— — detersivus, II. 692.
— — roborans, 110.
— ad pannum oculorum consumendum, 594.
— ad perniones, II. 342.
— Platini muriatici, II. Add.
— Plumbi Acetatis, II. 340.
— — acetici, II. 350.
— — basici, II. 340.
— — Subacetatis, II. 340.
— — — dilutus, II. 342.
— Potassae, II. 370.
— — Arseniatis, 273.
— — causticae, II. 370.
— — Subcarbonatis, II. 380.
— probatorius Hahnemanni, 43.
— — Moeglingii, 270
— — Vini, 270
— — Wirtembergicus, 270.
— ad pterygium, 594.
— pyrotartareus, II. Add.
— pyrotartaricus, II. Add.
— resolvens, II. 198. 402.
— Saccheri Saturni, II. 350.
— salinus laxativus, II. 92. 410.
— Salis Alcali vegetabilis acetati, II. 399.
— — amari, II. 92. et Add.
— — Ammoniaci anisatus, 149.
— — — fixi, II. 367 et Add.
— — communis, II. Add.
— — essentialis Tartari, II. Add.
— — mirabilis Glauberi, II. Add.
— — Sodae purissimi, II. Add.
— — Tartari, II. 380.
— — — perfecte saturati, II. Add.
— — — purissimi, II. Add.
— Saponis stibiati, 233.
— scilliticus, II. 402.
— Sodae concentratus, II. 574.
— — oxymuriaticae, II. 577.
— Spangenbergii, II. 185.
— splenitivus ex Tartaro, II. 401.

Liquor Stanni muriatici, II. 394.
— stibiatus cum Aconito, 61.
— Stibii muriatici, 235.
— stypticus, 132. 654.
— — Weberi, 660.
— Subacetatis Lithargyri, II. 340.
— — Plumbi s. plumbici, II. 340.
— Subbichloreti Ferri, 654.
— Subcarbonatis Ammoniae, 261.
— Succinatis ammonici s. Ammoniae, 179.
— sucodmicus anodynus, II. 699.
— Sulphatis calcarei, 366.
— — Zinci aluminosus, II. 692.
— Sulphureti Ammoniae, 272.
— Swietenii, II. 176. 200.
— syphiliticus Swietenii, II. 178. 200.
— — Turneri, II. 178.
— Tartari emetici, 240. 241.
— — solubilis, II. 413.
— — — chalybeati, 669.
— — — stibiati, 240. 241.
— — tartarisati, II. 405.
— — vegetabilis, II. 399.
— — vitriolati, II. 387.
— Tartratis ammonici, II. 281.
— Terrae foliatae, II. 399.
— — — Tartari, II. 399.
— — — — spiritnosus, II. 401.
— — ponderosae salitae, 396.
— tonicus, 162.
— Trilleri, 166.
— ad ulcera atonica, II. 397.
— — faucium, II. 230.
— — oris, 683.
— ad unguem oculorum consumend., 694.
— vegeto-mineralis de Praessavin, II. 208.
— Vini probatorius Hahnemanni, 42
— visceralis, 662.
— Vitrioli coerulei, II. Add.
— — Martis, II. Add.
— — — oxydati, II. Add.
— volatilis Cornu Cervi, 163.
— vulnerarius, II. 698.
— — mineralis, 666.
— — vegetabilis Dippelii, II. 210.
Liriodendron tulipifera, 473. II. 84.
Liryngium, 628.
Lithagrostis, II. 49.
Lithargyrium, II. 334.
Lithargyrius, II. 334.
Lithargytum, II. 334.
Lithargyrus, II. 334.
Lithontripticum Talpii, 402.
Lithospermum, II. 84.
— officinale, II. 84.
Litus acidus, 34.
— ad haemorrhoides, 757.
— Hydrargyri, II. 285.
Lixiva pura, II. 371.
— — liquida, II. 370.
Lixivia acetata, II. 398.
— caustica, II. 370.
— putrificata, II. 376.
— tartarisata, II. 404.
— vitriolata, II. 385.
Lixivium alkali vegetabilis, II. 380.
— ammoniacale, 144.
— — anisatum, 149.
— — aromaticum, 251.
— — causticum, 144. II. 374.
Lixivium ammoniacale vinosum, 146.
— causticum, II. 370.
— — minerale, II. 374. et Add.
— — vegetabile, II. 370.
— juniperinum, II. 380.
— cum Junipero, II. 380.
— Kali vegetabilis, II. 380.
— lithontripticum Saundersii, II. 372.
— magistrale, II. 370.
— Martis, 663.
— Potassae purae magistrale, II. 370.
— Matris Salis marini, 367.
— sanguinis, 38.
— Saponariorum, II. 374.
— Sodae, II. 374.
— — purae, II. 374.
— Tartari, II. 380.
Lobaria pulmonaria, II. 64.
Lobelia, II. 84.
— inflata, II. 84.
— syphilitica, II. 84.
Lonchitis, II. 644.
Lonicera Periclymenum, 411.
Looch adstringens, 86. 445.
— album, 187.
— Amygdalarum, 187.
— amygdalinum, 187.
— Amyli, 445.
— cum Amylo, 445.
— anisatum, 269.
— anthelminticum, 622.
— ad asthma, II. 236.
— antiasthmaticum, 721.
— anticatarrhale, 71.
— antisyphiliticum, II. 201.
— balsamicum, I. 320.
— bechicum, 600.
— Brassicae rubrae, 338.
— camphoratum, 873.
— commune, 187. 445.
— compositum, II. 206.
— crocatum, II. 654.
— demulcens, 187.
— emolliens, 187.
— emeticum, 269.
— expectorans, 60. 268. 231. 249. 730. II. 604.
— Farfarae, 630.
— Glacialis, II. 207.
— Gordoni, 333.
— gummoso-oleosum, 187.
— gummosum, 731.
— Japonicum, 445.
— hermeticum, 269.
— laxans, 513.
— lenions, 456. II. 75. 352.
— — balsamicum, II. 678.
— de Manna, II. 100.
— Mannae, II. 100.
— Mesembryanthemi cryst., II. 207.
— oleosum, 187.
— Ovorum, 188.
— Oxymuriatis calcici, 366.
— pectorale, 187. 269. 730. II. 209. 536. 642.
— — lenions, 268. 729.
— pulmonale, 268. II. 82.
— de pulmonaria vulpis, 268 II. 82.
— purgans, 738.
— refrigerans, II. 392.
— rubrum, 188.
— sanum et expertum, II. 61.
— saponaceum, II. 416.
— saponatum, II. 416.
— saponicum, II. 416.
— de Scilla, II. 636.
— simplex, 187. 731. II. 644.
— contra stomachum, 396.
Looch temperans, II. 642. 632.
— contra tussim, II. 252.
— vermifugum, II. 665. 743.
— viride, II. 654.
— vomitivum, 245.
Lopezia racemosa, II. 496.
Lotio acida, 48.
— adstringens, 86. II. 340. 362. 686.
— alcoholica saponacea, II. 417.
— alcoholisata, 363.
— anodyna, II. 320.
— antipsorica, 44. II. 168.
— astrachitica Bonhemmii, II. 380.
— antiseptica, 493. II. 359.
— e Cupro et Zinco composita, II. 686.
— excitans, 240. 668. II. 684.
— exsiccans, II. 186.
— ad haemorrhoides, 757.
— helleborata, 740.
— Hydrargyri, II. 268. 277.
— — lutea, II. 144.
— hydrocyanica, 37.
— hydrosulphurata, 44.
— mercurialis, II. 177.
— — Alberti, II. 177.
— — Manry, II. 196.
— Nicotianae, II. 257.
— contra pernones, 150. II. 381.
— phagedaenica, II. 230.
— plumbata, II. 343.
— Plumbi composita, II. 286.
— Quercus saturnina, II. 352.
— resolvens, II. 343.
— ad rheumatismum, II. 633.
— saturnina, II. 343.
— sedativa, II. 320.
— e Staphisagria, 608.
— sulphuro-saponacea, II. 605.
— Tartari stibiati, 240.
— terebinthinata, II. 668.
— ad tineam, 353. II. 676. 684.
— Veratri mercurialis, II. 258.
— e Veratro, 740.
— vinosa, II. 676.
— e Zinco et Cupro composita, II. 686.
Lotus ad haemorrhoides, 757.
— odorata, II. 106.
— ad rheumatismum, II. 633.
— urbana, II. 106.
Lucii maxillae praeparatae, 359.
— Piscis mandibula, 364.
Lujula, 16.
Lumbricus terrestris, 692.
Lunaria, II. 85.
— Botrytis, II. 85.
Lupinus, II. 85.
— albus, II. 85.
Lupulina, II. 86.
Lupulinum, II. 85.
Lupulus, II. 85.
Lybisticum, II. 71.
Lycoperdon Bovista, 889.
Lycopersicum, II. 686.
Lycopodii semen s. sulphur, II. 87.
Lycopodium, II. 87.
— annotinum, s. clavat.
— clavatum, II. 87.
— complanat. — s. clavat.
Lyringium, s. Liryngium.
Lysimachia lutea, II. 67.
— Nummularia, II. 87.
— purpurea, II. 497.
— vulgaris, II. 87.
Lythargyrum, s. Lithargyrum.
Lythrum Salicaria, II. 499.
Lytta coerulea, 389.
— Gigas — Cantharis.

Lytta vesicatoria, 399.
— vittata — Cantharis.

M.

Macis, II. 222.
Madrepora oculata, 357.
Magisterium Antimonii diaphoret., 215.
— Bismuthi, 389.
— Coralliorum, 389.
— Gummi Guttae — G. Guttae praep.
— Jalapae, II. 28.
— Marcasitae, 329.
— Margaritarum, 389.
— Matris Perlarum, 389.
— Oculorum Cancrorum, 389.
— Saturni, II. 337.
— Sulphatis Ferri, 642.
— Sulphuris, II. 600.
— Tartari purgans, II. 398.
— Vitrioli Martis, 642.
— Zinci, II. 665.
Magistrantia, II. 1.
Magma scytodepsicum ex Quercu, II. 362.
Magnes, 638.
— arsenicalis, 270.
Magnesia — M. pura.
— agrata, II. 88.
— alba, II. 88.
— — genuina, II. 88.
— calcinata, II. 88.
— — usta, II. 88.
— carbonica, II. 88.
— — venalis, II. 88.
— crystosa, II. 88.
— dulcis, II. 88.
— Edimburgensis, II. 88.
— effervescens, II. 88.
— hydrochlorica, II. 94.
— mitis, II 88.
— nigra, II. 98.
— Nitri, II. 89.
— nitrica, II. 88.
— opalina, 212.
— phosphorica, II. 92.
— pura, II. 88.
— Salis amari, II. 88.
— — Ebshamensis, II. 88.
— — Epsomensis, II. 88.
— silicica, II. 95.
— stibiata, 243.
— subcarbonica, II. 88.
— sulphurica, II. 92.
— — cruda, II. 92.
— — depurata, II. 92.
— usta, II. 88.
— vitrariorum s. vitriarior., II. 98.
— vitriolata, II. 92.
— — depurata, II. 92.
Magnesiae Subcarbonas, II. 88.
Magnesium, II. 88.
— oxydatum nativum, II. 98.
— — nigrum, II. 98.
Magnolia glauca, II. 95.
Mahagoni, II. 608.
Majorana, II. 295.
Mala insana, II. 586.
— Lycopersica, II. 586.
— Punica, II. 406.
Malabathrum, 390.
Malas Ferri, 660.
— — Protoxydi, 660.
Malicorium, II. 427.
Malthum, II. 95.
— Hordei, II. 95.
Maltum, II. 95.
— Hordei, II. 95.
Malucorium, II. 427.
Malum citreum, 536.
— insanum, II. 586.
— Lycopersicum, II. 586.
Malum Punicum, II. 406.
Malus communis, II. 388.
Malva, II. 96.
— Alcea, 80.
— arborea, II. 96.
— hortensis, II. 96.
— minor, II. 96.
— rosea, II. 96.
— rotundifolia, II. 96.
— sylvestris, II. 96.
— vulgaris, II. 96.
Malvaviscum, 109.
Manati lapis, 364.
Mandibula Lucii Piscis, 364.
Mandragora, 297.
Manganesium, II. 98.
— ochraceum nigrum, II. 98.
— oxydatum, II. 98.
— — nativum, II. 98.
Manganum, II. 98.
— hyperoxydatum, II. 98.
— oxydatum nativum, II. 98.
Maniguetta, 706.
Mangostana Cambog. — Garcinia.
Manna, II. 98.
— Alhagi, II. 99.
— brigantina, II. 99.
— Calabrina, II. 99.
— canaliculata, II. 98.
— cannellata, II. 98.
— cannulata, II. 98.
— communis, II. 99.
— electa, II. 99.
— di fronde, II. 99.
— Gerace, II. 99.
— granulosa, II. 99.
— grassa, II. 99.
— in lacrymis, II. 99.
— lacrymata, II. 99.
— laricina, II. 99.
— liquida, II. 100.
— longa, II. 98.
— metallorum, II. 165.
— Persica, II. 99.
— pinguis, II. 99.
— sordida, II. 99.
— in sortis, II. 99.
— spissa, II. 99.
— tabulata, II. 99.
— tartarisata, II. 399.
Mannita, II. 99.
Maranta arundinacea, 268.
— Galanga — Alpinia.
— Indica, 268.
Marathrum, 195.
Marcasita, 329.
— argentea, 329.
Marchantia polymorpha, 743.
Margaritae, 388.
— praeparatae, 389.
Marmelada adstringens, II. 637.
— antinephretica, II. 620.
— expectorans, 289.
— febrifuga, 468. II. 632.
— de Haen, 430.
— Iridis, II. 19.
— mercurialis, II. 124.
— pectoralis, II. 12. 608. 695.
— purgans, 733.
— Tronchini, 430.
— de Zanetti, 289.
Marmor album, 357.
— calcareum, 357.
— praeparatum, 360.
— — salinum, 357.
— saccharoides, 357.
Marrubium album, II. 102.
— foetidum, 302.
— nigrum, 302.
— vulgare, II. 102.
Mars, 632.
— solubilis, 663.
— vitriolatus, 648.
Martia, II. 676.
Martis limatura, 632.
Marum, II. 644.
— Syriacum, II. 644.
— verum, II. 644.
— vulgare, II. 648.
Massa Althaeae, 799.
— pro fermace odorifera, 325.
— ad fornacem, 325.
— de Gummi Arabico, 729.
— Liquiritiae alba, II. 79.
— — fusca, II. 80.
— odontalgica, II. 204.
— Pilularum e Cynoglosso, II. 273.
— — hydragogarum Jamini, II. 105. et Add.
— — contra obstructiones Halensis, II. Add.
— — polychrest. balsamicar., II. 112 et Add.
— — resolv. Schmuckeri, II. Add.
— — Ruffi, II. 111. et Add.
— — scillitic arum, II. 633.
— — de Succino Cratonis, 104.
— — visceral. Kaempfii. II. Add.
Massicot — Minium.
Masticatorium excitans, II. 428.
Mastiche, II. 203.
Mastichina, II. 99.
— Gallorum, II. 646.
Mastix, II. 203.
Mater Margaritarum, II. 388.
— Perlarum, 388.
— — praeparata, 389.
Materia perlata Kerkringii, 215.
Matonia Cardamomum, 416.
Matricaria, II. 105.
— Chamomilla, 457.
— Parthenium, II. 105.
Matrisylva, 290.
Maxillae Lucii praeparatae, 389.
Mays, II. 681.
Mechoacanna, II. 105.
— alba, II. 105.
— nigra, II. 22.
Meconas Sodae, II. 586.
— Sodii Protoxydi, II. 586.
Meconium, II. 246.
Medulla bovilla, 69.
— saxorum, 132.
Mel, 248.
— Aceti, 22.
— — colchitici, 662.
— — Scillae, II. 541.
— album, 248.
— anthosatum, II. 478.
— Armoraciae, II. 498.
— Boracis, II. 581.
— boraxatum, II. 582.
— Chelidonii, 468.
— Colchici, 662.
— commune, 248.
— — purum, 248.
— cupratum, 682.
— depuratum, 248.
— despumatum, 248.
— — inspissat., 248.
— flavum, 248.
— glyzyrrhizatum, II. 82.
— hydrargyratum, II. 126.
— Hydrargyri, II. 158.
— Liquiritiae, II. 82.
— mercuriale, II. 121. 126. 248. 194.
— Mercurialis annuae, II. 121.
— Mercurii dulcis, II. 158.
— Mororum, II. 217.
— e Muriate Hydrargyri, II. 158.
— Rorismarini, II. 478.
— rosaceum, II. 470.
— Rosae, II. 470.
— — Gallicae, II. 470.

Mel Rosatum, II. 470.
— rosatum, II. 470.
— — solutivum, II. 471.
— de Rosis, II. 470.
— Rubi Idaei, II. 488.
— Sambuci Florum, II. 508.
— — Fructuum, II. 509.
— Sanitatis, II. Add.
— Saponis, II. 496.
— Scillae, II. 536. 541.
— — acetatum, II. 541.
— — compositum, II. 537.
— — maritimae, II. 541.
— scilliticum, II. 536.
— — compositum, II. 537.
— Subboratis Sodae, II. 581.
— Superacetatis Capri, 582.
— terebinthinatum, II. 633.
— Vermium majalium, II. Add.
— Violarum, II. 677.
— virgineum, 248.
Melaleuca Cajuputi, 347.
— Leucadendron, 347.
Melampodium, 736.
Melanthium, II. 239.
Melia Azedarach, 302.
Meliguetta, 706.
Melilotus citrinus, II. 106.
— coeruleus, II. 108.
— officinalis, II. 106.
— vulgaris, II. 106.
Melissa Calaminthe, II. 107.
— citrata, II. 108.
— citrina, II. 108.
— hortensis, II. 108.
— humilis, II. 113.
— Nepeta, II. 108.
— officinalis, II. 108.
— Turcica, II. 108
Melissophyllum, II. 113.
Melitochorton, 741.
Melittis Melissophyllum, II. 112.
Mellago Graminis, 704.
— Taraxaci, II. 616.
— Tritici repentis, 704.
Mellitum de Acetate Cupri, 582.
— Aceti simplex, 22.
— de Cupro acetatum, 582.
— Mercurialis compos., II. 121.
— Rosarum s. de Rosis, II. 470.
— simplex, 248.
Melo, 579.
Melos, II. 113.
— majalis, II. 113.
— niger — Cantharis.
— Proscarabaeus, II. 113.
— vesicatorius — Cantharis.
Melongena, II. 586.
Menispermum lacunosum et M. Cocculus—Cocculus palmat.
— palmatum—Cocculus palmat.
Menstruum Auri, 258.
— pro essentia dulci, II. 402.
Mentha aquatica, II. 113.
— arvensis, II. 113.
— balsamica, II. 113.
— Cataria, 441.
— crispa, II. 114.
— — verticillata, II. 114.
— equina, II. 111.
— gentilis, II. 113.
— longifolia, II. 114.
— Menthastrum — Menthastrum
— piperita, II. 114.
— Piperitidis, II. 114.
— Pulegium, II. 425.
— Romana, 303.
— rotundifolia, II. 114.
— rubra, II. 113.
— Saracenica, 303.
Mentha sativa, II. 113.
— sylvestris, II. 114.
— — folio rotundiore, II. 114.
— verticillata, II. 114.
— viridis, II. 114.
Menthastrum, II. 114.
Menyanthes trifoliata, II. 696.
Mephitis, 356.
— barotica, 327.
— hepatica, 42.
— Plumbi, II. 336.
— Sodae, II. 597.
Mercurialis, II. 121.
— annua, II. 121.
Mercurius, II. 122.
— acetatus, II. 203.
— aceticus, II. 203.
— alcalisatus, II. 127.
— boraxatus, II. 190.
— calcinatus ruber, II. 145.
— cosmeticus flavus, II. 191.
— — luteus, II. 191.
— cinereus Blackii, II. Add.
— corallinus, II. 145.
— corrosivus flavus, II. 191.
— — ruber, II. 145.
— — sublimatus, II. 175.
— cosmeticus, II. 199.
— cum Creta, II. 127.
— depuratus, II. 122.
— dulcis, II. 155.
— — martiatus, II. 167.
— — per viam humidam, II. 156.
— emeticus flavus, II. 191.
— flavus, II. 191.
— gummosus Plenkii, II. 124.
— hydrocyanicus, II. 189.
— liquidus, II. 201
— cum Magnesia, II. 127.
— mortis, 235.
— muriaticus, II. 155.
— muriatus corrosivus, II. 175.
— niger Moscati, II. 142.
— nitratus ruber, II. 145.
— nitrosus, II. 194. 198.
— — alior, II. 195.
— phosphoratus — Hydrarg. phosphoric.
— praecipit. albus, II. 155. 199.
— — flavus, II. 191.
— — fuscus, II. 190.
— — Moscati, II. 142.
— — niger, II. 192.
— — ruber, II. 145.
— — — per se, II. Add.
— — — praeparat., II. 145.
— — — venalis, II. 145.
— — Saunderi, II. Add.
— — viridis, II. 147.
— — Wurtzii, II. 190.
— rectificatus, II. 122.
— redivivus Cinnabaris, II. 122.
— ruber, II. 145.
— saccharatus, II. 126.
— — cinereus Hahnem., II. 192.
— solubilis Hahnemanni, II. 192.
— — Moretti, II. 143.
— — Moscati, II. 142.
— sublimatus corros., II. 175.
— — — venalis, II. 175.
— — dulcis, II. 155.
— cum Sulphure, II. 138.
— tartarisatus, II. 205.
— terrestris, II. 310.
— vitae, 213. 235.
— vitriolatus, II. 190.
— vivus, II. 122.
— — depuratus, II. 122.
— — rectificatus, II. 122.
Mesembryanthemum crystallinum, II. 207.
Mespilus, II. 207.
— arbutifolius, 473.
— Germanica, II. 207.
— Oxyacantha, II. 207.
Metel, 604.
Metella, 604.
Metroxylon Sagu — Sagu.
Meum, II. 207.
— athamanticum, II. 207.
— Foeniculum — Foeniculum.
Mezereum, 602.
Mica Panis albi, II. 304.
Milium, II. 304.
— Solis, II. 84.
Millefolium, II. 208.
Millepedae s. Millepedes, II. 230.
— praeparati, II. 211.
Milligrana, 744.
Mimosa Catechu, 441.
— cinerea, II. 47.
— Corinda, II. 47.
— Nilotica, 15. 727.
— Senegalensis, 732.
— Unguis Cati, II. 71
Minium s. Minium rubrum, II. 334.
Mirospermum toluiferum, 311.
Mistura, s. Mixtura.
Miva Cydoniorum, 597. 599.
— — aromatica, 598.
Mixtura absorbens, 353. 368.
— acida, 269. II. 368.
— — anodyna, II. 260.
— Acidi muriatici, 34.
— — — oxygenati, 511.
— — nitrici, 48.
— — phosphorici, 51.
— acido-minoralis, 269.
— adstringens, 304. 444. 489. II. 71. 265. 467. 620.
— aetherea, 76.
— alba, 246. 721.
— alcalina, II. 381.
— aloëtica, 110.
— alterans, 248.
— amara, II. 450.
— — cum Rheo, II. 459.
— ammoniacalis, 719.
— — salina, 171.
— Ammoniaci, 719.
— — et Antimonii, 246.
— Ammonii acetici, 196.
— — — Liquoris, 177.
— — carbonici pyro-oleosi camphorata, 165.
— — — — composita, 165.
— — caustici Liquoris, 147.
— ex Ammonio muriatico, 170.
— Amygdalarum, 183.
— analeptica, II. 299.
— anodyna, 76. II. 251.
— antacida, II. 91. 578.
— anthelmintica, 300. 522. II. 173. 317.
— anthelmintico-incitans, II. 645.
— antiacida, II. 91.
— antiasthmatica, 721. II. 508.
— — Swietenii, 164.
— antiaphthosa, II. 299.
— antiblennorrhagica, 304. 333.
— anticatarrhalis, II. 539.
— anticathartica, II. 250.
— antidiarrhoica, 250. II. 224.
— antidysenterica, 18. 242. 497.
— antiepileptica, 100.
— antifebrilis, 488.
— antigonorrhoica, 304.
— antihaemorrhagica, 54. 681.
— antiherpetico-diaphoretica, 61.
— antihydropica, 410.
— antiicterica, II. 400.

Mixtura antilithagica, II. 434.
— anthelmintica, 369.
— antiodontalgica, II. 270.
— antiodontalgica, 425. II. 270.
— antiperiodica, 686. 689.
— antiphlogistica, II. 394.
— antiphthisica, 610.
— antipsorica, 637.
— antiscabiosa, 637.
— antispasmodica, 98. 265. 180.
— — et diuretica, 77.
— — resolvens, 79.
— — simplex, 69.
— antisyphilitica, 683. II. 174.
— — de Haen, II. 184.
— antivomitiva, 5.
— aperiens, 245.
— ad aphthas, II. 299.
— Aquae Laure-Cerasi, 80.
— aromatica, 398.
— Asae foetidae s. Assae foetidae, 284.
— — — pro clysmate. 284.
— balsamica, II. 619.
— bechica, 719.
— boraxata, II. 381.
— cum Calomelane, II. 298.
— Camphorae, 373.
— e Camphora cum Aceto, 374.
— camphorata, 373.
— — aetherea, 376.
— camphorato - spirituosa, 376.
— camphorica, 377.
— Carbonatis Calcis comp., II. Add.
— — Potassae stomachica, II. 383.
— cardiaca, 385. 393.
— carminativa, 210. II. 446.
— Castorei aetherea, 430.
— — ammoniato-spirituosa, 430.
— cathartica, 260.
— cathartica Arabica, 41. 330.
— cerea, 298.
— Chelidonii, 468.
— Chinae phosphorata, II. 381.
— Cicutae, 536.
— Cichoreae effecta, II. Add.
— citro-muriatica, II. 576.
— e Cornu, 516.
— Cornu Cervi, 729.
— — cervini, 729.
— — usti, 729.
— cretacea, 393.
— Cretae, 393.
— Cupri ammonio - muriatici, 597.
— demulcens, II. 496.
— — ammoniacalis, 171.
— deprimens, 40. 613.
— — et valde diuretica, 613.
— — et expectorans, 614.
— desobstruens, II. 402. 466.
— detergens, II. 473.
— diaphoretica, 166. 176. 576.
— ad diarrhoeam, II. 224.
— Diatrion, II. Add.
— Digitalis camphorata, 615.
— — diuretica, II. 395.
— diuretica, 552. II. 87. 539. 628. 679.
— — et refrigerans, II. 394.
— ad dysenteriam, II. 266.
— ad dyslochium, 77.
— emetica, 621. II. 14.
— emeto anodyna, 289.
— excitans, 439. II. 576.
— — mitis, 177.
Mixtura expectorans stomachica, II. 16. 1
— febrifuga, 688.
— — et purgans, II. 26.
— ferrea, 846.
— Ferri composita, 644.
— foetida, 285. 432.
— frigorifica, II. 394.
— pro gingivis roborand, 443.
— Guajaci, 716.
— — Gummi Senegal, 716.
— guajacina, 716.
— Gummi-resinae F. Ammoniac. comp., 720.
— — — Asae foet., II. 284. et Add.
— — — Myrrhae ferrata. II. Add.
— gummosa ex Hydrargyro corrosivo, II. 291.
— — e Sublimato corrosivo, II. 291.
— — coilitica, II. 643.
— in haematuria chronica, II. 29.
— Hahniana, 30.
— hydragoga, II. 279.
— ad icterum, II. 400.
— incisiva, II. 513.
— incitans mesenterica, 662.
— — nervina, 269.
— — et sedans, II. 232.
— e Kali nitrico, II. 391.
— — sulphurico, 247.
— Kali tartarici, II. 407.
— kermetica, 228.
— Lactis Cerasi Aquae, 40.
— laxans, II. 106. 230. 46. 611.
— lenions, 688. 690.
— Liquoris Ammon. acet. et caust. — Mixt. Ammon. acet. et caust. Liq.
— lithontriptica. 77.
— e Lupulo, 46. 80.
— Lycopodii, II. 87.
— Magnesiae, II. Add.
— e Magnesia sulphur., II. 92.
— Marrubii, II. 69.
— martiata amara, 662.
— mercurialis, II. 284. 288.
— — balsamica, II. 125.
— Mercurii gummosa, II. 284.
— Millefolii, II. 209.
— mineralis, II. 180.
— moschata, II. 220.
— Moschi, II. 220.
— mucilaginosa, 734.
— mucilaginose - aromatica, 427.
— — balsamica, 3. 312.
— Myrrhae alcalisata, II. 230.
— — Griffithii, 644.
— Natri phosphorici, II. 481.
— nervina et resolvens, 266.
— Nicotianae diuretica, II. 238.
— nitrata, II. 393.
— Nitratis Potassae, II. 391.
— nitrato - camphorata, II. 394.
— nitrosa, II. 391. Add.
— Nucum Juglandium, II. 34.
— Olei Ricini cum Salapa, II. 41.
— oleosa, 188.
— — cum Aceto, 22.
— oleoso-acida, 31. 542.
— — balsamica, 385. II. 481.
— — salina, II. 93.
— opiacea, II. 252. 256.
— opiato-aetherea, II. 252. 253.
— — antidysenterica, II. Opii adstringens, II. 291.
— oxygeno-muriatica, 511.
— ad partum, II. 381.
Mixtura pectoralis, 39. 698. II. 4. 313. 642.
— — hydrocyanica, 37.
— contra pernones, 309.
— piperita, 398.
— purgans, II. 31.
— — acidula, II. 410.
— pyrotartarica, II. Add.
— refrigerans, II. 391. 395. 396.
— Resinae Copaybae, 304.
— resolvens, 171 316. 619. II. 10. 324. 466. 488. 406. 472. 628.
— — et roborans, II. 406.
— — spirituosa, II. 274.
— Rhois radicantis Extracti, II. 482.
— Riverii, 29.
— roborans, II. 45.
— salina, II. 402 404.
— — antacida, II. 98.
— — — composita, II. 404.
— — Machridii, II. 404.
— — pauperum, II. 399.
— — simplex, II. 396. 404.
— — volatilis, 273.
— saponacea, II. 382.
— — purgans, II. 28.
— scillina, II. 536.
— sedans aromatica, II. 236.
— sedativa, II. 252. 260. 266.
— sedativo - narcotico - pectoralis, II. 252.
— — refrigerans, II. 391.
— simplex, 23. et II. Add.
— — alba, II. Add.
— — antiscorbutica, 599.
— — Ludovici, II. Add.
— — sudinaria, II. Add.
— sicca, II. 591.
— solvens, 247.
— stomachica, 536. 695. II. 36.
— styptica, 688.
— Subcarbonatis Magnesiae, II. 92.
— — Potassae, 89.
— succinea, II. 481.
— sulphurico acida, 86.
— Sulphuris praecipitati, II. 604.
— sylvii, II. 247.
— Tartari stibiati et boraxati jumperina, 242.
— tartarica, II. 407.
— temperans, 22. 722.
— terebinthinata, II. 619.
— theriacalis, II. 288.
— tonica, 505. 651. II. 401.
— tonico-adstringens, 496.
— — — antiseptica, 284. 494.
— — — balsamica, 602.
— — — diaphoretica, 496.
— — — nervina Stahlii, II. 37.
— — — stomachica, 541.
— topica — Sapo cham. Dipp. II. 374.
— Trifolii aquatici foetida, II. 642.
— ad tussim convulsivam, 488.
— vinosa, 288.
— volatilis, 181.
— ad vomitum sanguinis, II. 292.
— vomitiva, II. 14.
— vulneraria acida, 23. 177.
— Zinci Sulphatis, II. 691.
Mofetta — Gas acid. carbonicum.
Molybdaenum Magnesii, II. 98.
Momordica, II. 211.
— Balsamina, II. 211.
— Elaterium, II. 211.
Monarda punctata, II. 213.
Monoceros, 364.
Monodon Monoceros, 364.

Moringa, II. 213.
— oleifera, II. 213.
Morpheum, II. 213.
Morphia, II. 213.
Morphina, II. 213.
Morphinum, II. 213.
Morphium, II. 213.
— aceticum, II. 215.
— citricum, II. 216.
Morrhua, II. 216.
Morsuli Aceti, 21.
— cum Acido citrico, 31.
— Acidi oxalici, 49.
— anthelmintici, 521.
— antimoniales, 222.
— — Kunkelii, 222.
— antistrumales, II. 415.
— aromatici, 383.
— aromatico-stomachici, 383.
— Chinae, 479.
— chinati, 479.
— Citri, 540.
— Ginseng, II. 304.
— Imperatoris, 383.
— Menthae piperitae, II. 117.
— Oculorum Cancri, 360.
— pectorales, II. 264.
— purgantes, II. 29.
— restaurantes Kunkelii, 222.
— Rhoeados, II. 308.
— ad scabiem, II. 603.
— ad sitim restinguendam, 59.
— ad sodam, 362.
— solventes, s. solutivi, II. 24.
— stibiati, 222.
— Stibii, 222.
— stimulantes, II. 696.
— stomachici, 383.
— ad ventriculi ardorem, 362.
— contra vermes, 521.
Morsus Diaboli, II. 527.
— Gallinae, 118.
Morus, II. 216.
— Indica, II. 436.
— nigra, II. 216.
— rubra, II. 487.
Moschus, II. 217.
— artificialis, II. 599.
— moschiferus, II. 217.
Moscowatum, II. 494.
Motacilla Troglodytes, 369.
Mucharum Rosarum, II. 467.
Mucilago Acaciae, 728.
— Altheae, 123.
— Amyli, 100.
— Astragali Tragacanthae, II. 663.
— camphorata, 372.
— Cantharidum, II. 402.
— Consolidae majoris, 563.
— Corallinae Corsicanae, 742.
— cretica, 363.
— Cydoniorum, 599.
— — Seminum, 599.
— — — acidulata, 600.
— Foenu graeci, 671.
— Glycyrrhizae, II. 78.
— Gummi Arabici, 728.
— — — mercurialis, II. 123.
— — Mimosae, 728.
— — Tragacanthae, II. 663.
— Helmintochortos, 742.
— Lichenis Islandici, II. 67.
— Lini Seminis, II. 74.
— Liquiritiae, II. 78.
— mercurialis Plenkii, II. 123.
— oleosa, 187.
— Psyllii, II. 332.
— Salep, II. 496.
— Tragacanthae, II. 663.
Mumia Persica nativa — Bitumen.
Mumiae, 292.
Mungos, II. 222.
Mures marini, II. Add.
Muria, II. 575.
— fontana, II. 575.
Murias Ammoniacae, 169.
— — aeruginatus, 590.
— — et Cupri, 590.
— — ferratus, 657.
— — superhydrargyricus, II. 199.
— Ammoniae, 169.
— — et Cupri liquidus, 590.
— — depuratus, 169.
— — et Ferri, 657.
— — ferricus, 657.
— — martiatus, 657.
— — et Oxydi Ferri, 657.
— — purus, 169.
— Ammonii ferricum, 657.
— — et Cupri, 590.
— ammonio-ferricum, 667.
— Antimonii, 235.
— — superoxygenatus, 235.
— Auri, 298.
— — liquidus, 298.
— — et Sodae, 299.
— aurico-natricum, 299.
— — — praeparatum, 299.
— Barytae, 314.
— — liquidus, 315.
— baryticum s. baryticus, 314.
— Calcariae, 367.
— calcicum, 367.
— Calcis, 367.
— — oxygenatus, 355.
— — superoxygenatus s. hyperoxygenatus, 355.
— Cupri, 590.
— Deutoxydi Hydrargyri, II. 176.
— Ferri, 653.
— — ammoniacalis, 657.
— — liquidus s. liquidum, 653.
— — sublimatus, 652.
— ferricus, 653.
— ferro ammoniacale, 657.
— Hydrargyri, II. 175.
— — basi oxydi imperf., II. 175.
— — corrosivus, II. 175.
— — Deutoxydi, II. 175.
— — dulcis sublimatus, II. 155.
— — ferratus, II. 167.
— — mitis, II. 155.
— — oxydatus, II. 176.
— — Oxydi ammoniacalis, II. 199.
— — oxydulati, II. 155.
— — oxydulatus praeparatus, II. 156.
— — oxygenatus sublimatione s. praecipitatione parat, II. 175.
— — spiritnosus liquidus, II. 178.
— — suboxygenatus, II. 155.
— — superoxygenat., II. 175.
— hydrargyricus corrosivus, II. 175.
— hydrargyro-ammoniacalis, II. 199.
— — — insolubilis, II. 199.
— — — acerrimus, II. 199.
— — — solutus, II. 200.
— hydrargyrosus mitis, II. 155.
— Magnesiae, II. 94.
Murias Manganesii, II. 98.
— Mercurii corrosivi, II. 175.
— — dulcis, II. 156.
— — suboxygenat., II. 156.
— — superoxygenat., II. 176.
— Oxydi Hydrargyri ammoniacalis, II. 199.
— — — corrosivus, II. 175.
— Oxyduli Hydrargyri mitis, II. 155.
— — Stanni, II. 592.
— — — liquidus, II. 592.
— — Stibii, 235.
— — — liquidus, 235.
— oxygenatus Hydrargyri sublimatus, II. 175.
— Platinae, II. 333.
— Plumbi, II. 333.
— Potassae, II. 397.
— — hyperoxygenat., II. 397.
— — oxygenatus, II. 397.
— Protoxydi Hydrargyri, II. 155.
— Sodae, II. 575.
— — fossilis, II. 575.
— — depuratum, II. Add.
— — exsiccatus, II. Add.
— — purus, II. Add.
— Stanni, II. 592.
— — Oxyduli, II. 592.
— — — liquidus, II. 592.
— — protoxygenati, II. 592.
— Stibii, 235.
— stibiosus, s. stibiosum, 235.
— — oxygenatus, 235.
— Zinci, II. 684.
Murigenium, 599.
Muscae Hispanicae, II. 398.
Muscari ambrosiacum, II. 222.
Muscus Acaciae, II. 64.
— albus quernus, II. 64.
— arboreus, II. 64.
— caninus, II. 63.
— capillaceus major, II. 368.
— catharticus, II. 64.
— clavatus, II. 87.
— corallinus, 741.
— — marinus, 741.
— Helminthochorton, 741.
— Helminthochortos, 741.
— Islandicus, II. 64.
— marinus, 741.
— pulmonarius, II. 64.
— pyxidatus, II. 63.
— quernus albus, II. 64.
— terrestris, II. 87.
Mustelae Piscis spinae s. vertebrae, 364.
Mustum, II. 660.
— Hordei, II. 95.
Myrica Gale, 676.
Myricinum, 250.
Myristica, II. 222.
— aromatica, II. 222.
— moschata, II. 222.
Myrobalani belliricae, II. 226.
— chebulae, II. 225.
— citrinae, II. 225.
— emblicae, II. 225.
— flavae, II. 226.
— Indae s. Indicae, II. 225.
— nigrae, II. 226.
Myrobalanus bellirica, II. 225.
— chebula, II. 225.
— citrina, II. 225.
Myroxylon s. Myroxylum peruiferum, 306.
— toluiferum — Mirospermum.
Myrrha, II. 225.
— liquida, II. 229.
— rubra, II. 225.
Myrrhis annua, 293.
Myrtacantha, II. 490.

Myrtillus, II. 661.
Myrtus, II. 231.
— Brabantica, 676.
— Caryophyllata — Calyptranthes
— communis, II. 231.
— Pimenta, II. 325.
Mytilus margaritiferus, 368.
Myxa, II. 231.

N.

Nacra Perlarum, 368.
Napellus, 60.
Naphae flores, 525.
Naphtha, II. 231.
— Aceti, 68.
— Nitri, 71.
— Petrolei, II. 317.
— Vitrioli, 73.
— — camphorata, 375.
— — diluta, 70.
— — martialis, 655.
— — phosphorata, II. 320.
— — rectificata, 75.
Napus, 334.
— sylvestris, 331.
Narcissus Pseudo-Narcissus, II. 231.
Narcotina, II. 280.
Narcotinum, II. 232.
Nardus, II. 268.
— Celtica, II. 233.
— — altera, 206.
— Indica, II. 232.
— rustica, 288.
— sylvestris, 288.
Nasturtium aquaticum, II. 234.
— hortense, II. 232.
— Indicum, II. 232.
— pratense, II. 234.
— sylvestre, 571.
Natron s. Natrum, II. 577.
— aceticum, II. 585.
— carbonicum, II. 577.
— — acidulum, II. 579.
— — crudum, II. 577.
— — crystallin., II. 577.
— — depuratum, II. 577.
— — — siccum, II. 578.
— — neutrale, II. 579.
— — perfecte saturat., II. 579.
— chloratum, II. Add.
— glaciale, 306.
— hydriodinicum, II. 10.
— hydrochloricum, II. 585.
— muriaticum, II. 585.
— — oxygenatum, II. Add.
— nitricum, II. 585.
— oxyphosphoricum, II. 582.
— praeparatum, II. 577.
— phosphoricum, II. 582.
— subboracicum, II. 579.
— subcarbonicum crudum, II. 577.
— sulphuratum, II. 574.
— sulphuricum, II. 583.
— — acidum, II. Add.
— — crudum, II. 583.
— — crystallisatum, II. 583.
— — depuratum crystall. II. 583.
— — — siccum, II. 583.
— tartaricum, II. 412.
— tartarisatum, II. 412.
Nauclea Gambir, 441.
— longifolia, II. 44.
Nenufar, II. 242.
Nenuphar, II. 242.
Nepeta, 441. II. 108.
— Cataria, 441.
Nephrecatharticum Foresti, 268.
Nephrodium Filix mas — Athyrium.
Nerium, II. 235.
Nerium Oleander, II. 236.
Nezetta, II. 47.
Nicotiana, II. 236.
— minor, II. 236.
— rustica, II. 235.
— Tabacum, II. 235.
Nicotianina, II. 235.
Nicotianinum, II. 235.
Nicotinum, II. 235.
Nidi Hirundinum, 000.
Nigella, II. 239.
— arvensis, II. 239.
— Damascena, II. 239.
— sativa, II. 239.
Nigrum Eboris, 413.
Nihil s. Nihilum album, II. 684.
— griseum, II. 684.
Ninsi, II. 574.
Niasing, II. 574.
Ninsinus, II. 574.
Nitras Ammoniacae, 169.
— ammonicus c. Oxydo hydrargyroso, II. 192.
— Argenti, 269.
— — ammoniacale, 268.
— — crystallin., 260.
— — crystallisatum, 260.
— — fusus s. fusum, 261.
— argenticus crystallis., 260.
— — fusus, 261.
— Barytae, 318.
— Bismuthi, 309.
— — cum baseos excessu, 330.
— — praecipitatus, 309.
— Cupri, 689.
— — Deutoxydi, 689.
— Ferri, 652.
— — Tritoxydi, 652.
— Hydrargyri, II. 194.
— — liquidus, II. 196.
— Kali, II. 389.
— kalicum s. Kalicus, II. 389.
— — crudus, II. 389.
— — depurat., II. 389.
— — purus, II. 389.
— Lixiviae, II. 389.
— Mercurii Deutoxydi, II. 198.
— — Protoxydi, II. 194.
— natricum s. natricus, II. 585.
— Oxyduli Hydrargyri liquidus, II. 196.
— Potassae, II. 389.
— — crudus, II. 389.
— — depuratus, II. 389.
— — impurus, II. 389.
— — purgatus, II. 389.
— — purus s. purus, II. 389.
— — cum Sulphure fusum, II. 390.
— Potassi Protoxydi, II. 389.
— Sodae, II. 585.
— Sodii Protoxydi, II. 585.
— Strychninae s. Strychnini, II. 696.
— subbismuthicum, 329.
Nitri Naphtha, 71.
— Spiritus fumans, 46.
Nitrogenium, 372.
Nitrum, II. 389.
— alkalisatum, II. 389.
— antimoniatum, 240.
— — Stahlii, 220.
— baroticum, 318.
— crudum, II. 389.
— crystallisatum et depurat., II. 389.
— cubicum, II. 585.
— depuratum, II. 389.
— fixum, II. 389.
— — Schroederi, II. 385.
— — per Tartarum, II. 389.
— flammans, 169.
— fontanum — Sal Anglicum.
— lunare, 260.
Nitrum Mercurii, II. 194.
— nativum, II. 389.
— papaveratum, II. 390.
— perlatum, II. 390.
— purificatum, II. 389.
— purissimum, II. 390.
— purum, II. 389.
— regeneratum, II. 389.
— rhomboidale, II. 585.
— rosatum, II. 390.
— saturninum, II. 347.
— Schroederi, II. 385.
— tabulatum, II. 390.
— Terrae ponderosae, 318.
— venale, II. 389.
— vitriolatum Schroederi, II. 385.
Nodulus purgans, II. 550.
Nola culinaria, 193.
Nostoc, II. 230.
Nostochium commune, II. 230.
Nuces Cupressi, 681.
— Juglandis immaturae, II. 32.
— moschatae, II. 222.
— Quercus, II. 433.
— — tostae, II. 436.
— quernae tostae, II. 436.
— vomicae, II. 240.
Nucista, II. 222.
Nuclei Pineae s. Pinii, II. 324.
Nummularia, II. 87.
Nux Barbadensis, II. 280.
— cathartica Americana, II. 239.
— Juglans s. Juglandis, II. 32.
— moschata, II. 222.
— vomica, II. 240.
Nymphaea alba, II. 242.
— lutea, II. 242.

O.

Ochioglossum, II. 282.
Ochra lutea, 681.
— rubra, 681.
— Veneris, 684.
Ocimum basilicum — Ocymum.
Octopus vulgaris — Sepia offic.
Oculi Cancrorum, 369.
— — citrati, 368.
— — praeparati, 360.
Ocymum Basilicum, 318.
— magnum, 318.
— medium, 318.
— minimum, 318.
— vulgatius, 318.
Oenanthe Phellandrium — Phell. aquat.
Oenos, II. 675.
Oestrus, II. 243.
Offa alba, 185.
— Helmontii, 185.
Olea Europaea, II. 243.
Oleo-Ceratum Aquae subactum, 252.
— Margaras Mercurii, II. 206.
— resinae Copahu, 303.
— — de Mecca, 307.
Oleosaccharum, s. Elaeosaccharum.
— cephalicum, II. 222.
— Crotonis Tiglii, 577.
— Myrrhae, II. 226.
— Succini, II. 569.
— Terebinthinae, II. 632.
Oleum Absinthii aethereum, 5.
— — coctum, II.
— — destillatum, 5.
— — infusum, II.
— — stillatitium, 5.
— Aconiticum, 285.
— aethereum — Oil, Vini dulce.
— Aloës, 87.
— aloëticum batavum, 94.

leum Althaeae, 127.
— ammoniatum, 154.
— Ammoniaci Gummi, 721.
— Amygdalae, 182.
— Amygdalarum s. Amygdalorum, 182.
— — amarar. essent., 42.
— — dulcium, 182.
— Anagallidis, 192.
— Anethi aethereum, 197.
— — coctum, 198.
— Angelicae, 199.
— animale, 691.
— — aethereum, 691.
— — — empyreumaticum, 690.
— — Dippelii, 691.
— — foetidum, 690.
— Anisi aethereum (destill.) s. volatile, 209.
— — expressum, 209.
— anthelminticum, 55*. II. 632.
— Anthemidis — Ol. Chamomillae.
— Anthos, II. 479.
— Antimonii, 236.
— Apparitii, 760.
— arilli Myrist. mosch. aeth. — Ol. Macidis.
— aromo-narcoticum, 754.
— Artemisiae, 275.
— Arthanitae compos., 558.
— arthriticum, 713.
— Asphalti, II. Add.
— Aurantii aethereum s. destillatum, 527.
— — expressum, 526.
— Aurantiorum, s. Aethereo leum.
— ad aures, 90. 755.
— Avellanarum, 571.
— balatinum, II. 213.
— Basilici, 319.
— Been, II. 213.
— Benzoës 323.
— Bergamottae s. Bergamotte, 526.
— betulinum, II. Add.
— bezoardicum Wedelii, 378.
— Bryoniae compos., II 643.
— Bubonum, 764.
— Buxi. 345.
— Cacao, 346.
— — concretum. 346.
— — fructus, 346.
— — spissatum, 346.
— — Theobromae, 346.
— Cajaputi, 347.
— Cajeput, 347.
— Cajeputae s. Cajeputi, 347.
— — rectificatum, 347.
— Cajuputi, 347.
— Calami, 349.
— Calcis, 367.
— Camphorae, 377.
— — liquidum et butyraceum, 377.
— — nitricatum, 377.
— camphoratum, 377.
— Cannabis, 398.
— Cantharidum, 404.
— de Capparibus, 411.
— Capparum, 411.
— Cardamomi, 417.
— carminativum, 466
— — aethereum, 466.
— Carpathicum, 3*3.
— Carvi, 422
— — aethereum, 422.
— Caryophyllor. arom, 425.
— Cascarillae, 427.
— Cassiae cinnamomeae, 384.
— Castorei, 134.
— Cataputiae minoris, 441
Oleum Catellorum, 759.
— de Cedro, 537.
— — — rectific., 537. et Add.
— Cerae, 251.
— Cerefolii, 457.
— Chamaemeli aethereum s. destillat., 459.
— — coctum s. infus., 465.
— — compos., 460.
— chamaemelinum, 465.
— Chaerefolii, 457.
— Chaerophylli, 457.
— Chamomillae aeth. (destill.). 459.
— — citratum, II. Add.
— — coctum s. infus, 465.
— — terebinth., 460.
— Cheiri, 467.
— Chenopodii, Add.
— — anthelmint., 470.
— Cicutae, 547.
— — destillatum, 517.
— Cinnamomi, 384.
— — Ceylanici, 384.
— — Sinensis — Ol. Cass. cinnam.
— Citri Aurantii Corticis expressum, 526.
— — mediae Corticum aethereum, 537.
— — — — — expressum, 537.
— Colocynthidis, 557.
— Conyzae comp., II. 212.
— Coriandri, 569.
— Cornu cervi empyreum. rectif., 691.
— — — foetidum, 690.
— — — rectificatum, 691.
— — — succinatum, 691.
— — — volatile, 690.
— Cort. Aurantior — Ol. Aurant. Cort.
— corylinum, 571.
— costincum, II. Add.
— Croci, 574.
— Crotonis, 577.
— Cubebarum aether., 579.
— Cucumeris Semin, II. Add.
— de Cucurbita, 580.
— Cucurbitae pleureticum, 589.
— Cumini aeth., 581.
— Cupri Oxydi viride, 593.
— Dictamni, II. 296.
— Dippelii, 691.
— dulce, 70.
— empyreumat. animale, 690.
— — Pini sylvestris — Pix nigra liquida.
— — — exsicc., — Pix.
— Enulae comp., II. 7.
— Euphorbii, 627.
— Filicis, II. Add.
— Florum Aurantii — Aethereol.
— — septem, 466.
— — Slotani, 759.
— Foeniculi, 195.
— — aethereum s. essent., 195.
— Formicarum, 672.
— Fructus Cacao, 346.
— Galbani, 337.
— — comp., 337.
— Gaultheriae, 680.
— Guajaci, 708.
— — compos., 708.
— Gummi Ammoniaci, 721.
— Habacuci, 557.
— Helenii comp., II. 7.
— hieraclinum, 571.
— Hyoscyami, 752.
— — ammoniaco-camphoratum, 156.
Oleum Hyoscyami Foliorum coctum, 752.
— — — infusum, 752.
— — Herbae coctum, 762.
— — — — infusum, 762.
— — Seminum, 749.
— — viride, 752
— Hyperici infusum s. coctum, 758.
— — compos., 760.
— — Florum, 767.
— — Seminum, 757.
— Hyssopi, 762.
— Inulae compos., II. 7.
— Irees, II. 20.
— Iridis, II. 20.
— irinum, II 20.
— Jecoris s. Jecoris Aselli, II. 216.
— Juglandis, II. 53.
— Juniperi Baccarum, II. 40.
— — Ligni, II. 40.
— Lacertarum viridium, 690.
— Laricis, II. 627.
— — rectificatum, II. 627.
— cum s. de lateribus, II. 243.
— Lauri Baccarum, II. 53.
— — expressum, II. 53.
— laurinum, II. 53.
— — expressum, II. 53.
— — infusum, II. 53.
— Lavandulae s. Lavendulae, II. 59.
— — pingue, II. 60.
— Ligni Rhodii, II. 71.
— — Santali citr., II 513.
— — Sassafras, II. 525.
— Liliorum alborum, II. 72.
— Limonum Corticum, 537.
— Lini (usitatiss.) expressum, II. 75.
— — cum Calce, 353.
— — coctum, II. 75.
— — recens paratum, II. 75.
— — sulphuratum, II 604.
— Lumbricorum terrestrium, 689.
— Macidis, II. 224.
— Majoranae aether., II. 296.
— — infusum, II. 297.
— Mariae, 608.
— Martis, 653.
— — per deliquium, 653.
— Masticbes, II. 104.
— mastichinum, II. 101.
— Melaleucae Leucadendron — Ol. Cajeput.
— Meliloti, II. 106.
— — Florum volat., II. 106.
— Melissae, II. 109.
— Menthae aethereum, II. 117.
— — crispae, II. 117.
— — — terebinthinat., II. 117.
— — infusum, II. 116.
— — piperitae, II. 117.
— Millefolii, II. 209.
— Momordicae, II. 212.
— — compos., II. 212.
— Monardae, II. 213.
— Morrhuae, II. 216.
— Moschi, II. 221.
— de mucilaginibus, II. 75.
— Mucilaginis, 671.
— mucilaginosum, II. 75.
— Myristicae s. Myristicae mosch., II. 224.
— Myrrhae, II. 229. 230.
— — per deliquium, II. 229.
— myrtinum, II. 231.
— Myrti Pimentae, II. 347.
— Naphae, 526.
— narcoticorum, 754.

Oleum Neroli, 627.
— Nicotianae, II. 238.
— Nucis moschatae, II. 223.
— — — express. aethereum, II. 224.
— Nucistae aethereum, II. 224.
— — expressum, II. 223.
— Nucum Juglandium, II. 33.
— Olivarum, II. 243.
— — Provinciale, II. 243.
— — empyreumaticum, II. 243.
— — oxygenatum, 511.
— Origani, II. 290.
— — Cretici, II. 290.
— Ovorum s. e Vitellis Ovorum, II. 299.
— Oxydi Cupri viride, 693.
— Palmae, II. 243.
— — Christi, II. 463.
— Papaveris albi, II. 309.
— — succo paratum, II. 309.
— — somniferi, II. 309.
— paregoricum, 750.
— Perfoliatae infusum, 758.
— Petrae, II. 317.
— — album, II. 317.
— — nigrum, II. 317.
— — rubrum, II. 317.
— Petrolei, II. 317.
— Petroselini, 257.
— Peucedani, II. 317.
— Philosophorum, II. 243.
— phosphoratum, II. 321. 322.
— — aromaticum, II. 322.
— phosphoricum, II. 321.
— Pimentae, II. 277.
— Pimpinellae Anisi, 309.
— pingue animi, 64.
— Pini aethereum, II. 627.
— — Laricis — Ol. Terebinth.
— — sylvestris destill. — Ol. Terebinth.
— — volatile, II. 627.
— Piperis nigri s. piperinum, II. 327.
— — Jamaicensis, II. 327.
— Pistaciarum, II. 329
— Pulegii, 405.
— purgans, II. 595.
— pyro-animale, 690.
— — depuratum, 691.
— pyrogenium animale, 690.
— Ricini, II. 463.
— — Americani, II. 639
— — artificiale, 577. II. 29.
— Rorismarini, II. 479.
— Rosarum, II. 472.
— — aethereum, II. 472.
— rosaceum, II. 472.
— Rusci, II. Add.
— Rutae aethereum, II. 492.
— — infusum, II. 492.
— Sabinae, II. 41.
— Salviae, II. 502.
— Sambuci, II. 510
— Santali citrini vel albi, II. 513.
— Saponis, II. 410 421.
— Sassafras, II. 525.
— Saturejae, II. 526.
— Saturni, II 348.
— — Goulard, II. 348.
— Scarabaeorum, II. 113.
— Scorpionum simplex, 689.
— — compos., 689.
— Scrophulariae, II. 545.
— septem Florum, 466.
— Serpylli, II. 610.
— Sesami orientalis, II. 569.
Oleum Sinapi infusum, II. 572.
— Solani nigri, II. 580.
— Spermatis Ranarum, 690.
— stomachale, 12.
— Stramonii, 607.
— — compos., 754.
— Succini, II. 598.
— — aethereum, II. 598.
— — crudum, II. 598.
— — depuratum, II. 598.
— — oxydatum, II. 599.
— — rectificatum, II. 598.
— — reductum, II. Add.
— sulphuratum, II. 604.
— Sulphuris, 56.
— — Beguini, 178.
— Tacamahacae, II. 606.
— contra taeniam Chaberti, II. Add.
— Tanaceti, II. 614.
— Tartari per delig., II. 380.
— — foetidum, II. Add.
— — per solutionem, II. 380.
— templinum, 303. II. 627.
— Terebinthinae, II. 627.
— — depuratum, II. 627.
— — rectificatum, II. 627.
— — sulphuratum, II. 604.
— Terrae, II. Add.
— Thapsiae antirheumaticum, II. 647.
— Thymi, II. 649.
— Tiglii — Ol Crotonis.
— ad tormina ventris, 466.
— de Tribus, II. 633.
— Valerianae, II. 670.
— Verbasci, II. 673.
— Vini, 76.
— — aethereum, 76.
— — dulce, 74. 76.
— — volatile, 76.
— Violarum, II. 678.
— viride, 693.
— e Vitellis Ovorum, II. 299.
— Vitrioli, 52. 53.
— — Anglicum, 53.
— — depuratum, 53.
— — dulce, 75.
— — Nordhusanum, 53.
— — purificatum, 53.
— — purissimum, 53.
— — rectificatum, 53.
— volatile animale, 691.
— — Dippelii, 691.
— vulpinum, 759.
— Zedoariae, II. 683.
— Zingiberis, II. 697.
Olibanum, II. 244.
— electum, II. 244.
— in sortis, II. 244.
Olivae, II. 243.
Olivillum, II. 243.
Olivum — Oleum Olivarum.
Olnitium, II. 547.
Omphacium, II. 680.
Onicus Asellus, II. 210.
Ononis, II. 214. 215.
— arvensis, II. 244.
— spinosa, II. 245.
Onopordon Acanthium, 417.
Onosma echioides, II. 246.
Opercula Cochlearum, 358.
Ophioglossum, II. 245.
— vulgatum, II. 245.
Ophiorrhiza Mungos, II. 222.
Opiatum adstringens, 306. 444. 481. II. 176. 436. 497.
— antiapoplecticum, II. Add.
— anticachecticum, II. 328
— antichlroroticum, 646.
— antidysentericum, II. 13.
— antiepilepticum, II. 267. 304.
— antigonorrhoicum, 306.
Opiatum antihaemorrhoidale, II. 328.
— antiherpeticum, II. 24.
— antiodontalgicum, 426.
— antiperiodicum et tonicum, 219.
— antiphthisicum, II. 603.
— antisyphiliticum, II. 167.
— aperitivum et purgans, 647. II. 138.
— Arabicum, II. 517.
— dentificium, 132. 366.
— deseiterans, 623.
— detersivum, II. 228.
— dysentericum, II. 267.
— — balsamicum, II. 288.
— emmenagogum, 636. 646.
— febrifugum, 19. 479. 481. 482.
— — et incisivum, 482.
— — et purgans, 479.
— hydragogum, 647.
— lenions, II. 361.
— mesentericum, 636.
— Neapolitanum, II. 271.
— de Pajot-Laforest, II. 183.
— pectorale, 306.
— tonicum, 636.
— purgans, II. 260.
— purgativum, II. 260.
— — et tonicum, II. 167.
— de Roccasmoor, 526.
— sedans, II. 351.
— stimulans, II. 25.
— stomachicum, II. 666.
— sulphuratum, II. 603.
— cum Sulphure, II. 603.
— terebinthinatum, II. 632.
— vermifugum, II. 28. 239.
Opium, II. 246.
— brutum, II. 246.
— colatum, II. 246. 260.
— crudum, II. 246.
— depuratum, II. 246. 260.
— gummosum, II. 260.
— Indicum, II. 246.
— Persicum, II. 246.
— purificatum, II. 246.
— thebaicum, II. 246.
— tonefactum, tostum, II. 247.
— Turcicum, II. 246.
Opobalsamum siccum, 308.
— verum, 307.
Opodeldoc, 156.
Opopanax s. Agiopanax, II. 294.
Opuntia, II. 295.
Orchis fusca — Salep.
— mascula — Salep.
— militaris — Salep.
— Morio — Salep.
— ustulata — Salep.
Oreoselinum, II. 647.
Origanum, II. 295.
— aquaticum, 625.
— commune, II. 296.
— Creticum, II. 295.
— Dictamnus, II. 295.
— Majorana, II. 296.
— vulgare, II. 296.
Orleana, II. 297.
— Terra, II. 297.
Ornithoglossa, 672.
Orobanche, II. 297.
— Virginiana, II. 297.
Orobus, II. 625.
Orontium majus 248.
Orvietanum, II. 288.
Oryza, II. 297. 298.
— sativa, II. 297.
Os Sepiae, 358.
— — praeparatum, 359.
— triquetrum, 364.
Osmazoma, II. 298.
Ossa, 363.
— de Cordibus Cervi, 364.

Ossa Sepiae, 358.
— usta praeparata, 365.
Osteocolla, 357.
— praeparata, 359.
Ostrea edulis, 357.
Ostrearum testae, 357.
Ostruthium, II. 1.
Ova gallinacea, id. 299.
Ovorum testae, 357.
— — praeparatae, 359.
Oxalas Ammoniaci, 176.
— Ammoniae, 176.
— — liquidus, 178.
— Hydrargyri, II. 205.
— Mercurii, II. 205.
— Potassae acidalum s. acidulus, II. 395.
— — acidum s. Acidum, II. 403.
— — basicum, II. 403.
— — et Ferri, 663.
— — neutrum, II. 403.
— subpotassicus, II. 395.
Oxalis, 26.
— Acetosella, 26.
— corniculata, 26.
Oxalium, II. 403.
Oxidum s. Oxydum.
Oxodes Ferri, 638.
— Hydrargyri nigrum, II. 192.
— — rubrum, II. 196.
— Mangani nativum, II. 98.
— Plumbi nigrum, II. 334.
— Stibii album, 215.
— — sulphuratum, 229.
— Zinci, II. 684.
— — album, II. 684.
— zincicum, II. 684.
Oxyacantha, II. 267.
Oxyacetas Ammoniacae, 173.
— Mercurii, II. 203.
Oxycarbonas Plumbi, II. 336.
— Zinci impuri praep., II. 684.
Oxychlosmetum Calcis, 355.
Oxycoccos s. Oxycoccus, II. 661.
Oxycratum, id. 1.
Oxydulum Antimonii hydrosulphuretum auranticum, 229.
— Arsenici album, 270.
— Ferri, 638.
— — fuscum, 643.
— — nigrum, 638.
— Hydrargyri Hahnemanni, II. 192.
— — ammoniacale, II. 192.
— — nigrum, II. 142.
— — salinum, II. 192.
— Plumbi, II. 334.
— — semivitreum, II. 334.
— Stanni, II. 500.
— Stibii per Acidum muriaticum, 213.
— — fuscum, 220.
— — griseum, 213.
— — hydrosulphurat., 229.
— — hydrosulphurat. rubrum, 223.
— — sulphuret. fuscum, 220.
— — — semivitreum, 220.
— — vitreatum, 214.
— — vitreum, 214.
Oxydum Aluminis, 131.
— — factitium, 131.
— — naturale, 131.
— Antimonii album, 213. 215.
— — — per praecipitationem, 215.
— — — lotum, 215.
— — auratum, 229.
— — hydrosulphurat. aurantiacum, 229.
— — — fuscum, 223.
— — — rubrum, 223
— — majus per Nitrum, 215.
— — minus, 213.
Oxydum Antimonii nitro-muriaticum, 235.
— — non ablutum, 219.
— — cum Phosphate Calcis, 216.
— — per Potassam, 219.
— — sulphuratum aurantiacum, 229.
— — — griseum, 214.
— — — rubrum, 223.
— — cum Sulphure per Nitrat. Potass., 220. Croc. Ant.
— — — vitrif., 214.
— — vitrificatum, 214.
— — — cum Cera, 214.
— arsenicale album, 270.
— Arsenici album, 270.
— — — cum Sulphureto Stibii, 271.
— — sublimatum, 270.
— Auri, 300.
— — ammoniat., 300.
— Bismuthi, 329.
— — album, 330.
— Cadmii, II. 695.
— calcicum purum, 351.
— Calcis, 351.
— Cupri per Acidum vegetabile, 592.
— — viride, 592.
— Ferri, 643.
— — fuscum, 643.
— — nigrum, 638.
— — — purif., 638.
— — rubrum, 641.
— ferricum, 638. 641.
— — cum Aqua, 643.
— — crystallisatum nativum, 641.
— ferroso-ferricum, 638. 643.
— ferrosum, 638.
— Hydrargyri, II. 145.
— — ammoniacale, II. 192.
— — cinereum, II. 142. 193.
— — completum, II. 145.
— — mediante Ammon. praecip., II. 193.
— — nigrum, II. 142. 192.
— — — mediante Ammoniae praecip., II. 193.
— — nitratum, II. 145.
— — — rubrum, II. 145.
— — — — per Acidum nitricum, II. 145.
— — nitrici, II. 146.
— — nitrico-antimoniale, 192.
— — nitricum, II. 146.
— — rubrum, II. 145.
— — — per Acidum nitricum, II. 145.
— — saccharatum, II. 126.
— — salinum, II. 192.
— — sulphuricum, II. 191.
— hydrargyricum, II. 146
— — praecipitatum, II. 142.
— — praeparatum, II. 146
— hydrargyrosum, II. 142. 193.
— Hydrogenii — Aqua communis.
— Kadmii, II. 695.
— Magnesii, II. 88.
— — nigrum, II. 98.
— — — nativum, II. 98.
— Manganesii nigrum, II. 98.
— Mangani nativum, II. 98.
— — nigrum, II. 98.
— — — nativum, II. 98.
— Mercurii, II. 142.
— — album per Acidum sulphuricum, II. 191. 192.
— — griseum, II. 192.
— — nigrum, II. 192.
— — rubrum, II. 144.
— Platinae, II. 333.
Oxydum Plumbi album, II. 336.
— — — carbonatum, II. 336.
— — — — per Acid. acetos., II. 336.
— — flavum, II. 334.
— — fusum, II. 334.
— — griseum, II. 334.
— — pulicare, II. 336.
— — rubrum, II. 334.
— — semifusum, II. 334.
— — semivitreum, II. 334.
— plumbicum semivitreum, II. 334.
— plumbosum, II. 334.
— Stanni hydrosulphuratum, II. 502.
— stibicum, 213.
— — cum Sulphureto Stibii, 220.
— Stibii e Acido muriatico oxygenato paratum, 235.
— — griseum, 213.
— — hydrosulphurat., 229.
— — — rubro-fuscum, 223.
— — non ablutum, 219.
— — cum Potassa non ablutum, 219
— — potassicum non ablutum, 219.
— — cum Subphosphate Calcis, 216.
— — sulphuratum — Vitr. Antimonii.
— — — rubrum, 223.
— — — vitreum, 214.
— — cum Sulphure vitrif., 214.
— stibiosum, 215. 220.
— Vismuthi, 329.
— Zinci, II. 684.
— — cinereum, II. 684.
— — impurum, II. 684.
— — — praeparatum — Tutia praep.
— — nativum, II. 684.
— zincicum, II. 684.
— — album, II. 684.
— — griseum, II. 684.
— — per praecipitationem, II. 685.
— — per se, II. 684.
Oxygenium, II. 300.
Oxygeno-chloretum Potassii, II. 397.
Oxylapathum, II. 489.
Oxymel, 22.
— Aeruginis, 582.
— alliatum, 92.
— Allii, 92.
— antispasmodicum, 285.
— Belladonnae, 297.
— chalybeatum, 650.
— Colchici s. colchicum, 562.
— colchiticum, 562.
— cuprosum, 592.
— helleboratum, 741.
— martiale, 650.
— Narcissi pratensis, II. 233.
— Nicotianae, II. 238.
— Oxyduli Cupri, 582.
— pectorale, II. 5
— Primulae veris, II. 422.
— saccharinum, 22.
— Sambuci, II. 509.
— Scillae, II. 541.
— scillinum, II. 541.
— scilliticum, II. 541.
— simplex, 22.
— Tabaci, II. 238.
— tartarosum, II. 407.
Oxymurias Calcis, 355
— Hydrargyri, II. 175.
— Plumbi, II. 333.
— Potassae, II. 397.

Oxynitras Hydrargyri et Ammoniae, II. 192.
— — et Ammoniae mellitus, II. 194.
Oxyphosphas Calcii, 366.
Oxysaccharum, 22.
— Digitalis, 614.
— emeticum, 243.
— scilliticum, II. 541.
Oxyseptonicum, 45.
Oxytartaras, II. 398.
Oxytriphyllum, 16.

P.

Padus, 460.
Paeonia, II. 301.
— officinalis, II. 301.
Palampissa, II. 636.
Palma Christi — Ricinus comm.
Palmae sebaceum, II. 243.
Palmulae, 602.
Paludapium, 254.
Pamphilus Chirurgorum, II. 688.
Pampini Vitis, II. 679.
Panacea duplicata, II. 385.
— de Holstein, II. 385.
— Kornmanni, 300.
— lapsorum, 266.
— mercurialis, II. 156.
— Mercurii rubra, II. 146.
— tartarea, 715.
Panada Anglorum, II. 304.
Panavae lignum, 577.
Panax Quinquefolium, II. 304.
Panchymagogum mercuriale, II. 155.
— quercetanum, II 155.
— Pancratium verum, II. 531.
Panes purgantes et vermifugi. II. 171.
— saccharati purgantes, II. 24.
Panicum miliaceum, II. 304.
Panis, II. 304.
— albus, II. 304.
— Cassaviensis, II. 614.
— Cydoniorum, 597.
— — cum Aromatibus, 598.
— — compos., 598.
— porcinus, 597.
Papaver, II. 306. 307.
— album, II. 307.
— coeruleum, II. 307.
— corniculatum, 467.
— erraticum, II. 306.
— nigrum, II. 307.
— officinale, II. 246.
— Rhoeas, II. 306.
— somniferum, II. 246. 307.
Pareira brava, 624.
Parietaria, II. 313.
— officinalis, II. 313.
Parillina s. Parillinum, II. 516.
Paris, II. 314.
— quadrifolia, II. 313.
Parnassia palustris, 743.
Paronychia, 293.
— argentea, II. 314.
Parthenium, II. 106.
Paspalum Dactylum, II. 314.
Passae Ficus, 420.
Passulae, II. 680.
— anthelminticae, II. 449.
— Corinthicae, II. 680.
— Corinthinaceae, II. 680.
— laxativae, II. 550.
— majores, II. 680.
— minores, II. 680.
— vermifugae, II. 449.
Pasta adstringens, 132.
— Althaeae, 729.
— amygdalata cosmetica, 183.
— amygdalina, 182.
— anticephalalgica, 749.
— Apii, 235.
Pasta arsenicalis, 278.
— Cacao, 345.
— — cum Lichene Islandico, II. 65.
— cocaotina, 345.
— — lichenifera, II. 65.
— — saccharata, 346.
— cosmetica, 183.
— Dactylorum, 602.
— emulsiva, 182.
— epilatoria, 269.
— Glycirrhizae, II. 78.
— de Gummi Arabico, 729.
— gummosa, 729.
— — saccharata, 729.
— Iridis Florentinae, II. 20.
— Jujubarum, II. 36.
— cum Lichene Islandico, II. 68.
— lichenifera, II. 68.
— limacina, 689.
— Liquiritiae, II. 78.
— — anisata, II. 79.
— — fusca, II. 79.
— — nigra, II. 79.
— — opiacea, II. 79.
— — cum Opio, II. 79.
— ad naevos, 354.
— pectoralis, 728.
— contra pernliones, 137.
— regia, 182.
— rubefaciens et febrifuga, II. 491.
— vesicatoria, 405.
Pastinaca, II. 344.
— Anethum — Aneth. graveolens.
— Opopanax, II. 294.
— sativa, II. 314.
Pata lupina, 417.
Patientia, II. 489
Pavonae lignum, 577.
Pavonis stercus, 69
Pediluvium ex Armoracia, II. 437
— alcalinum, II. 380.
— irritans, II. 437.
— sedativum, II. 50.
Pedra de porco spuria — Lapis porcinus.
Pelias Berus, 681.
Pellis Goulardi, II. 346.
Peltigera aphthosa, II. 63.
— canina, II. 63.
— horizontalis, II. 63.
— polydactyla, II. 63.
— venosa, II. 63.
Penaea Sarcocolla, II. 516.
Pentaphyllum, II. 422.
Perca fluviatilis, 358.
Percarum lapides, 368.
Perchloruretum Mercurii, II. 176.
Perdeutoxysulphuretum Antimonii, 229.
Perfoliata, II. 314.
Periclymenum, II. 411.
Periploca Indica, II. 516.
— Secamone, II. 527.
Perlae, 358.
— textiles, 358.
Permurias Hydrargyri, II. 175.
Peroxydum Cupri, 583.
— Ferri, 641.
— — stalacticum, 641.
— Hydrargyri, II. 140
— Manganesii, II. 98.
— — nigrum, 000.
— — — nativum, II. 98.
— Mercurii, II. 144.
— Plumbi, II. 336.
Persica, II. 316.
— vulgaris, II. 314.
Persicaria minor, II. 316.
— urens, II. 316.
Personata, 313.
Persulphuretum Stanni, II. 9
Pervinca, II. 675.
Pes Columbi, 702.
— Cati, 281.
— Leonis, 81.
Petasites, II. 316.
— major, II. 316.
— rubens, II. 316.
— vulgaris, II. 316.
Petroleum, II. 317.
— album, II. 317.
— Barbadense — Petroleum
— nigrum, II. 317.
— rectificatum, II. 317.
— rubrum, II. 317.
Petroselinum, 254.
— Macedonicum, 398.
Peucedanum, II. 317.
— officinale, II. 317.
— Ostruthium — Imperatoria O.
— Silaus, II. 660.
Peziza Auricula — Auricula Judae.
Phaseolus, 628.
— nanus, 628.
— communis, vulgaris, 628
Phasianus Gallus — Ova
Phellandrium aquaticum, II. 317.
Philonium Romanum, II. 39.
Phoenicites, 358.
Phoenix dactylifera, 602.
Phosphas ammoniaco-mercurialis, II. 190.
— Ammoniacae, 168.
— Ammoniae, 168.
— calcicum stibiatum, 2
— Calcii, 363.
— — Protoxydi acidus, 3
— Calcis, 363.
— — acidus, 366.
— — stibiatus, 216.
— Cupri, 584.
— Ferri, 647.
— Hydrargyri, II. 190.
— Magnesiae, II. 98.
— Mercurii, II. 190.
— natricum, II. 582.
— natricus cum Aqua, II. 58
— Sodae, II. 582.
— — et Ammoniaci, II. 58
Phosphorus, II. 319.
— liquidus, II. 320.
— pulveratus, II. 320.
— urinae, II. 319.
Phosphuretum Calcis, 351
Phrasium, II. 109.
Phyllanthus Emblica, II. 28
Phyllitis, II. 514.
Physalis Alkekengi, 88.
Physcia Islandica, II. 64.
— nivalis, II. 63.
— Prunastri, II. 64.
Physeter macrocephalus, 142.
— microps — P. macrocep
— Orthodon, f. P. macrocep
— Tursio, f. P. macrocep
Phytolacca, II. 322.
— decandra, II. 322.
Picea, 2.
Pichurim — Faba Pichurim.
Picrotoxa, 544.
Picrotoxinum, 544
Pigmentum Indicum, II. 1.
— Urucu, II. 297.
Pila Caprae Rupicaprae — Aegagropila.
— marina, II. 322.
Pilae Damarum, 369.
— Rupicaprarum, 369.
Pilosella, 744.
Pilulae absorbentes, 631. II. 49
628.
— Acetatis Plumbi, II. 36

Pilulae Acetatis Plumbi et Ipecacuanhae, II. 318.
— Aconiti mercuriales, II. 182.
— adstringentes, 136. 307. 442. 443. 635. 651. II. 46. 166. 227. 626. 637. 651.
— — et tonicae, 650.
— aethiopicae, II. 141.
— — comp., II. 141.
— albae, 646. II. 171.
— Allii sativi, II. 416.
— Aloëphanginae, 111.
— Aloës, 98.
— — et Agarici, 98.
— — amarae, 113.
— — et Asae foetidae s. c. As. foet., 99.
— — — — saponaceae, 99.
— — cum Colocynthide s. et Colocynthidis, 99.
— — compositae, 97.
— — crocatae, 111.
— — et Gummi Ammoniaci, 102.
— — martiales, 101.
— — cum Myrrha s. et Myrrhae, 111.
— — Myrrhae et Guajaci s. cum Myrrha et Guajaco, 218.
— — et Chinae, 113.
— — saponaceae, 97.
— — et Stalagmitidis cambogioidis, 732.
— — et Substantiarum foetidarum, 101.
— — et Tartari stibiati, 98.
— — cum Zingibere, 97.
— aloëticae, 97.
— — amarae, 113.
— — martiales, 100. 101.
— — cum Myrrha, 116.
— alterantes, 710. II. 160.
— — compositae, II. 161.
— — Plummeri simplices, II. 161.
— Aluminis, 136.
— amarae, 605. II. 410.
— amaro-catharticae, 112.
— contra amaurosin, 284.
— Ambrae, 143.
— de Ammoniaco, 721.
— ex Ammoniaco cum Sulphure stibiato, 231.
— Ammonioreti Cupri, 589.
— analepticae, 218.
— Andersoni, 103.
— anethinae, 100.
— Angelicae, 116.
— anglicae, 97.
— anodynae, 231. 500. 751. II. 267.
— — et sudorificae, 246.
— ante cibum, 113.
— anthelminticae, 117. 621. II. 161. 163. 165. 241. 493. 591.
— — purgantes, II. 162.
— antiarthriticae, 161. 222. 231. 247. 710. II. 143. 168.
— antiasthmaticae, 315.
— antidiarrhoeicae, II. 44.
— antidysentericae, 478. II. 275.
— antiemeticae, II. 265. 701.
— antiepilepticae, 262. II. 664.
— antifebriles, 487.
— antigalacticae, 372.
— antigonorrhoicae, 307. 372.
— antiherpeticae, 310. II. 140. 161. 169. 168. 183.
— antihydropicae, 724. II. 172. 174.
— antihystericae, 280. 433. 751. II. 218.
Pilulae antihystericae Josephi del Papa, 433.
— — opiatae, 280.
— antiictericae, 117. 296. II. 159.
— antilactosae, II. 585.
— antimoniales, 000.
— — compositae, II. 164.
— — Kleinii, 223.
— Antimonii compositae, II. 164.
— antiphlogisticae, II. 342.
— antirheumaticae, II. 168.
— antiscrophulosae, II. 137.
— antisepticae, 371.
— antispasmodicae, 262. 280. II. 218. 271. 664.
— — et tonicae, 372.
— antispasticae, 280.
— antisyphiliticae, II. 164. 167. 168. 183.
— — Plenkii, II. 126.
— — et resolventes, II. 159.
— antivenereae, II. 136. 143. 147. 160. 186.
— — Kaempfii, II. 163.
— — Lassonne, II. 187.
— — Swediaur, II. 203.
— aperientes, 100.
— — hydrargyratae, II. 172.
— — laxantes, 117.
— — Stahlii, 636.
— aperitivae, II. 301.
— aromaticae, 97.
— Arseniatis Ferri, 275.
— arsenicales, 272.
— Arsenici, 272.
— ad arthritidem, II. 143.
— ex Asa foetida, 280.
— Asae foet. s. Assae foet. compos., 99. 280.
— — — helleboratae, 283. 739.
— — — martiatae, 283.
— — — saponatae, 280.
— — — scilliticae, 283.
— — — simplices, 280.
— asiaticae, 272.
— aureae, 118.
— Auri muriatici, 299.
— — Muriatis, 299.
— ex Auro fulminanti, 301.
— Bacheri, 738.
— Baldingeri, II. 141.
— balsamicae, 117. II. 227. 244. 626.
— — aperitivae, II. 626.
— — Junkeri, II. 637.
— — martiales, II. 227.
— — Mortonianae, 25.
— — opiaceae, II. 264.
— — cum Opio, II. 264.
— — terebinthinatae, II. 626.
— Belladonnae, 296.
— Bellostii, II. 136.
— benedictae Fulleri, 101.
— benzoicae, 26.
— bilis, 631.
— in bronchitide lenta, II. 318.
— Brucini, 335.
— cum Butyro Cacao, 347.
— cachecticae, 636.
— caeruleae, 580. II. 127.
— Calcariae sulphurato-stibiatae, 234.
— Cambogiae comp., 103. 732.
— camphoratae, 371.
— Cantharidum, 410.
— — cum Hydrargyro, 410.
— — mercuriales, 410.
— — opiaceae, 410.
— Carbonatis Kalinae, II. 375.
— carminativae, 631. 283.
— Castorei comp., 433.
— catarrhales, II. 170.
Pilulae catharticae, 565.
— cathartico-diureticae, II. 170.
— cephalicae, II. 28.
— chalybeatae, 635. 639. 645.
— e Chelidonio, 468.
— Chinae, 478.
— — aluminatae, 136.
— — camphoratae, 487.
— — compos., 487.
— Chlorureti Auri, 299.
— ante cibum, 103. 113.
— Cicutae, 516.
— coccinae, 99.
— Cocchii, 99.
— cochiae, 99. 106.
— — Rhasis, 99.
— Colocynthidis comp., 99. 558.
— — extracti comp., 557.
— communes, 111.
— compos. Edinburgenses, 116.
— Conii, 516.
— — cinnabarinae, II. 155.
— e Conio, 516.
— cupratae, 589.
— Cupri ammoniaci, 589.
— — ammoniacalis, 584.
— e Cupro ammoniaco, 589.
— de Cynoglosso, II 272.
— — cum Castoreo, II. 273.
— demulcentes, 728.
— deprimentes, II. 214.
— depurantes, II. 162. 173.
— desobstruentes, 102. 640. 721. II. 633.
— diabulorum trium, II. 167.
— diaphoreticae, II. 142. 162.
— diaphoretico-sedativae, 227.
— — stibiatae, 218.
— ad diarrhoeam, II. 44.
— de Digitali, 612.
— Digitalis purpureae, 612.
— diureticae, II. 174. 625. 637.
— — resolventes, II. 633. 634.
— — roborantes, II. 637.
— Dulcamarae, 618.
— de duobus, 118.
— eccoproticae, 101.
— ecphracticae, 612. 118. II. 448.
— Elaterii comp., II. 212.
— ex Elaterio, II. 212.
— Emanuelis, 112.
— emeticae, 626.
— emmenagogae, 634. 640. 645. 724. II. 38. 166. 218.
— — et deprimentes, II. 215.
— — irritantes, 651.
— excitantes, 262. 560. II. 241. 498.
— expectorantes, II. 12. 165. 534. 660.
— Extracti cathartici, II. 528.
— — Opii, II. 272.
— febrifugae, 487.
— — Anglicae, 478.
— Fellis Tauri amarae, 631.
— Ferri comp., 645. 651.
— — cum Myrrha, 646.
— — Sulphatis, 651.
— — sulphurici, 649.
— — — comp., 651.
— e Ferro laxantes, 640.
— ferulaceae cum Ammonio, 280.
— — cum Arnica et Tartaro stibiato, 282.
— — camphoratae, 283.
— foetidae, 280.
— — majores, 553.
— — martiatae, 000.
— fundantes, 170. 646.
— Galbani comp., 337.
— e Galbano martiatae, 634.

Pilulae Gambogiae comp., 103.
— — et Scammoniae, II. Add.
— e Gentiana crocatae, 113.
— contra gonorrhoeam, II. 137. 166.
— de Graphite, 637.
— graphiticae, 637.
— Griffithii, 645.
— Guajaci, 716.
— — cum Hydrargyro, Stibio et Extractis narcoticis, 222.
— — cum Stibio, 233.
— guajacinae, 716.
— — comp., 770.
— de Gummatibus, 337.
— Gummi Ammoniaci, 721.
— — Guttae aloëticae, 103.
— gummi-resinosae, II. 227.
— gummosae, 280. 337.
— — laxativae, 97. 337.
— Hahnemanni, II. 194.
— Hellebori, 738.
— — aloëticae, 739.
— — balsamicae, 739.
— — compos., 738.
— ex Helleboro et Myrrha, 735.
— de Hiera, 98.
— Hierae cum Agarico, 98.
— Humuli Lupuli, II. 85.
— hydragogae, 578. 612. II. 165. 170. 218. 472. 534.
— — Bontii, 103.
— — Janini, II. 165.
— Hydrargyri, II. 127.
— — gummosae, II. 125.
— — Jalappinae, II. 170.
— — Muriatis camphoratae s. et Camphorae, II. 166.
— — — et Oxyd. Stib. hydrosulph., II. Add.
— — — oxydati, II. 182.
— — oxydulati nigri, II. 194.
— — Oxymuriatis, II. 203.
— — Submuriatis compositae, II. 162.
— ex Hydrargyro catharticae, II. 169.
— — — diureticae, II. 194.
— — — muriatico miti, II. 159.
— — — cum Sulphure stibiato aurantiaco, II. 161.
— — — nitrico, II. 196.
— — — oxydulato nigro, II. 194.
— Hydriodatis Potassae, II. 9.
— Hydrochloratis Manganesii, II. 98.
— hydropicae Bontii. 103.
— hypnoticae, II. 263.
— hystericae, 337.
— incisivae, 91. 640. II. 534
— incitantes, 560. II. 428.
— iodatae, II. 8.
— Iodii, II. 8.
— Iodureti Mercurii, II. 188.
— Jalapae, II. 28.
— — comp., II. 170.
— ex Jalapae Resina, II. 170.
— Jamesii, 218.
— Kali sulphurici aloët., 103.
— kermesinae, 228.
— Keyseri, II. 204.
— e Kino comp., II. 44.
— — et Camphora, II. 44.
— lac pellentes, 372. II. 167. 525.
— laxantes, II. 24. 28. 170. 525.
— — cum Mercurio, II. 170.

Pilulae laxantes et resolventes, II. 171.
— laxativae, II. 28.
— lenientes, 728. II. 214. 215. 250. 686.
— — Mesues, II. 272.
— de Leslie, II. 172.
— lithontripticae, II. 578.
— Lucis majores, 100.
— lunares, 262.
— Macchiavelli, 112.
— majores, 653.
— — Hoffmanni, II. 181.
— majornae, 117.
— Manganesii muriatici, II. 98.
— martiales, 634. 639. 648. 651. 669.
— martiatae cum Galbano et Myrrha, 651.
— mastichinae s. e Mastiche, 104.
— Meglini, 751.
— Mellis hydrargyrati, II. 127.
— menagogae, 651.
— — catharticae, 118.
— ad menstrua, 101. 113.
— mercuriales, II. 128. 136. 167. 168. 170. 187.
— — ammoniacales, II. 202.
— — camphoratae, II. 160.
— — diureticae, II. 191.
— — Moscati, II. 143.
— — Noltii, II. 203.
— — Plenkii, II. 125.
— — — compos., II. 126.
— — cum Opio, II. 126.
— — purgativae, II. 136.
— — saponaceae, II. 170.
— Mercurii glycyrrhizati, II. 127.
— — melliti, II. 127.
— — terebinthinat., II 128.
— ex Mercurio dulci, II. 159.
— — — — et Camphora, II. 160.
— — — — et Guajaco, II. 168.
— — — — et Jalapa comp., II. 170.
— — — saponaceae, II. 170.
— — — — comp., II. 170.
— — — simplices, II. 160.
— — — et Opio, II. 172.
— — — — comp., II. 164.
— — glycyrrhizato, II. 127.
— — mellato, II. 127.
— — solubili Hahnemanni, II. 194.
— — sulphurato stibiato, II. 141.
— — terebinthinato, II. 128.
— ad morbos cutaneos, 231.
— — — deploratos, 218.
— Mortoni, 25.
— moscoviticae, 562.
— Moschi s. moschatae, II. 218.
— Muriatis Hydrarg. oxydulati stibiatae, II. 165. vrgl. Pil. Hydr. Mur.
— Myrrhae cum Arnica, II. 227.
— — amarae cum Ammoniaco, II. 227.
— — compos., 280. 645.
— — et Ferri, 645.
— cum Myrrha et Guajaco, 218.

Pilulae nauseam cientes, II. 12.
— narcoticae, 516. II. 250.
— Neapolitanae, II. 136.
— Nicotianae, II. 235.
— Nitratis Argenti fusi, 262. et Add.
— opiatae, II. 267.
— Opii comp, II. 272.
— — saponaceae, II. 270.
— ex Opio, II. 267.
— opticae, 100.
— orientales, II. 272.
— Oxydi Antimonii et Sulphureti Mercurii, II. 137.
— Oxymitratis Hydrarg. et Ammoniae, II. 194.
— pectorales, 231. 576. 721. II. 533.
— — opiaceae, II. 264.
— — tonicae, 645.
— perpetuae, 213.
— physagogae, II. 536.
— piceae, II. 331.
— Picis, II. 331.
— Plumeri, II. 161.
— — compos., II. 162.
— — simplices, II. 161.
— polychrestae, II. 147.
— — balsamicae, 112.
— — Starkeyi, 737.
— e Praecipitato rubro, II. 147.
— Pringelii, II. 172.
— prophylacticae ad variolas, II. 161.
— Protochlorureti Mercurii, II. 159.
— — — cum Sulph. Antim. aurato, II. 161.
— purgantes s. purgativae, 89. 117. 567. 677. 732. 739. II. 24. 28. 136. 160. 170. 172. 528.
— — dictae Pievani, 118.
— — cum Hydr. muriat. miti, II. 169.
— — cum Calomelle, II. 169.
— — cum Mercurio, II. 170.
— purificantes, 231.
— ad putredinem nosocomialem, II. 218.
— Pyrethri, II. 428.
— relaxantes, 79.
— e Resina Jalapae, II. 170.
— resolventes, 102. 170. 247. 300. 516. 612. 634. 640. 646. 673. 721. II. 140. 143. 159. 163. 164. 165. 168. 305. 415. 448. 528. 617. 626.
— — diureticae et deprim., 612.
— — Finkii, II. 162.
— — cum Mercurio, II. 162.
— — et purgantes, 220.
— — cum Rheo, II. 448.
— — in scrophulis, 316.
— — Stahlii, 100.
— rhabarbarinae antacidae, II. 449.
— Rhei, II. 448.
— — compos., 116.
— — palmati, II. 448.
— e Rheo cum Natro acetico, II. 448. 585.
— Rhois toxicodendri, II. 461.
— Richteri, 247.
— roborantes, 586. II. 227.
— — ad blennorrhoeam, II. 449.
— Rufi, 111.
— sanitatis Frankii, 104.
— di Santa Fosca, 118.
— saponaceae, 354. II. 415.
— Saponis, II. 415.
— — aloëticae, 97.
— — compos., II. 170.

Pilulae Saponis cum Opio, II. 270.
— Scammonii hydrargyrosae, II. 187.
— e Scammonio comp., II. 187.
— — mercuriales, II. 187.
— Schmuckeri, 247.
— Scillae, II. 532.
— scillinae et Muriat. Hydrarg. oxydul., II. 274.
— scilliticae s. scillinae, II. 532.
— scoticae, 103.
— contra scrophulas, II. 137.
— sedantes et bechicae, II. 250.
— sedativae, 272. 760. II. 263. 686.
— Sedilloti, II. 232.
— sialagogae, II. 173. 182.
— Sodae Subcarbonatis, II. 578.
— solares Wildegansii, 301.
— solventes del Forati, II. 415.
— specificae, II. 902.
— spleneticae, 102. 117.
— ad sputum sanguinis Dekkers, II. 274.
— Stahlii, 100. 218.
— sthenicae, II. 164.
— stibiatae, 282. 246.
— — cum Opio et laxantibus resinosis, 222. 233.
— e Stibio et Hydrargyro, II. 161.
— stimulantes, II. 327. 449.
— — ad gonorrhoeam, II. 45. 637.
— stomachicae, 118. 216, 487. 695. II. 227.
— e Storace, II. 269.
— Strychnini, II. 691.
— styptica, II. 348.
— de Styrace vino Ambra, II. 269.
— e Styrace, II. 269.
— Subcarbonatis Cupri et Ammoniaci, 684.
— — Sodae, II. 578.
— ex Sublimato corros. — Pil. majores Hoffm.
— de Sublimato et Opio, II. 184.
— Suboxydi Hydrargyri, II. Add.
— Subsulphatis Capri et Ammoniae, 685.
— Succini Crutonis, 104.
— de Succino, 104.
— — — auctae, II. Add.
— sudorificae, 710.
— — lenientes, 228.
— — sedativae, 228.
— suecicae, II. 184.
— Sulphatis ammonico-cuprici, 683.
— — Ferri, 649.
— — comp., 650. 651.
— — Potassae aloëticae, 103.
— sulphurato-stibiatae cum Arnica et Camphora, 231.
— — — — cum Cicuta, 231.
— Sulphureti Antimonii et Calcis, 284.
— syphiliticae, II. 149.
— systema nervosum et musculare vellicantes, 268. II. 240.
— Tabaci, II. 236.
— Taddei, II. 184.
— contra taeniam, 316. II. 137. 686.
— tartareae Bontii, 103.
— — Schroederi, 101.
— e Tartaro boraxato, II. 412.
— temperantes, 612.
— e Terebinthina, II. 625. 637.
— thebaicae, II. 267.
— Thomsoni, 650.
— tonicae, 220. 330. 609. 662. 686. 634. 646. 652. 659. 695.
— — et anodynae, 476.
— — et antispasmodicae, 218.
— — Bacheri, 798.
— — et hypnoticae, II. 272.
— — et lenientes, 478.
— — nervinae, 651.
— — et purgantes, II. 560.
— torpentes et resolventes, II. 51.
— Toxicodendri, II. 461.
— traumaticae, II. 628.
— de tribus, 117.
— ad tussim Schroederi, II. 272.
— Unguenti mercurialis, II. 131.
— Valerianae ferulaceae, 280.
— ad variolas, II. 161.
— venereae, 689.
— Veratrini, II. 672.
— de Vigarous, II. 160.
— Vogleri, II. 182.
— Werlhofii, II. 193.
— Zellert, II. 196.
Pimenta, II. 386.
Pimento, II. 386.
Pimpinella alba, II. 382.
— Anisum, 207.
— dissecta — P. Saxifraga.
— hircina, II. 382.
— hostensis, II. 383.
— Italica, II. 383.
— magna, II. 383.
— minor, II. 383.
— nigra, II. 383.
— nostras, II. 382.
— rubra, II. 383.
— Saxifraga, II. 382.
— umbellifera, II. 382.
Pincneya pubescens, 473.
Pineolus, II. 324.
Pinus Abies — Abies.
— balsamea, 1.
— Canadensis, 1.
— Cembra, 303.
— Larix — Larix Europ.
— maritima, II. 617.
— Mughus, 303. II. 627.
— palustris — P. sylv.
— Picea — Picea.
— Pinaster — P. sylv. var.
— Pinea, II. 324.
— pumilio, 303.
— sylvestris, II. 324. 617.
Piper, II. 325.
— album, II. 325.
— Betel, 327.
— caudatum, 578.
— Cubeba, 578.
— Hispanicum, II. 326.
— Indicum, II. 326.
— Jamaicense, II. 386.
— longum, II. 326.
— nigrum, II. 325.
— rotundum — P. nigrum.
— Tabasci, II. 326.
— Turcicum, II. 326.
Pipera, II. 325.
Piperinum, II. 325. 329.
Pisa pro fonticulis, II. 620.
Pissa, II. 329.
Pissasphaltus — Petroleum, Asphaltus.
Pistacia, II. 329.
— Atlantica — P. Lentiscus.
— Lentiscus, II. 103.
— Terebinthus, II. 617.
— vera, II. 329.
Pistolochia, 263.
Pix alba, II. 630.
— atra, II. 636.
— Burgundica, II. 636.
Pix Cadria, II. 329.
— Graeca, II. 636.
— liquida, II. 329.
— — nigra, II. 329. 636.
— navalis, II. 636.
— solida, II. 636.
— vegetabilis, II. 636.
Plantago angustifolia, II. 331.
— aquatica, II. 332.
— arenaria — Psyllium.
— Cynops, II. 331
— lanceolata, II. 331.
— latifolia, II. 331.
— major, II. 332.
— media, II. 331.
— Psyllium, II. 331.
Platina, II. 333.
Platinum, II. 333.
Plumbago, 637.
— Europaea, 609.
Plumbi Acetas, II. 347.
— Carbonas, II. 336.
— Subcarbonas, II. 336.
— Superacetas, II. 347.
Plumbum, II. 333.
— acetatum, II. 336.
— aceticum, II. 346.
— — crudum, II. 346.
— — depuratum, II. 347.
— carbonicum, II. 336
— hydrocyanicum, II. Add.
— oxydatum — Plumbum.
— — rubrum, II. 334.
— phosphoricum, II. Add.
— spathicum, II. 336.
— ustum, II. 334.
Pocgereba, II. 364.
Podalyria tinctoria — Sophora.
Podophyllum peltatum, II. 364.
Polanisia dodecandra, II. 304.
Polium Creticum, II. 644.
— montanum, II. 644.
Pollen jattorum, 672.
Polychroites, 573.
Polygala, II. 366.
— amara, II. 365.
— amarella — P. amara.
— Americana, II. 366.
— rubella, II. 365.
— Senega s. Seneka, II. 365.
— Virginiana, II. 365.
— vulgaris, II. 365.
Polygalinum, II. 365.
Polygonatum angulosum, 602.
— latifolium, 602.
— majus, 602.
— vulgare, 602.
Polygonum, 460.
— aviculare, 460.
— Bistorta, 330.
— Fagopyrum, 609.
— Hydropiper, II. 316.
— Persicaria, II. 316.
Polypodium, II. 368.
— Filix Mas — Athyrium.
— vulgare, II. 368.
Polyporus fomentarius, 78.
— igniarius, 78.
— officinalis, 78.
— officinalis — Agaric. albus.
Polytrichum aureum, II. 368.
— commune, II. 368.
— vulgare, II. 368.
Poma s. Poma acidula, II. 368.
— Acajou, 431.
— Aurantia, 525.
— Borsdorfiana, II. 368.
— Citrea s. Citri, 530.
— Colocynthidis — Colocynthides.
— Renetia, II. 368.
Pomatum albissimum, 454.
— ammoniacalesaponac., 154.
— antihaemorrhoidale, II. 251.

Pomatum antiherpeticum, 228. 354. II. 155. 169. 344. 386. 348.
— — Chevallierii, 356.
— — Goulardi, II. 346.
— antipsoricum, 413. II. 148. 605.
— antispasmodicum, 434.
— antivenereum, 298. II. 272.
— Autenriethii, 243.
— Belladonnae, 298.
— camphoratum, 456.
— Cantharidum, 405.
— Carbonis, 418.
— Desaulti, II. 150.
— Deutochlorureti Mercurii, II. 181.
— epispasticum, 405. 409.
— — ammoniacale, 154.
— — camphorat., 400.
— escharoticum, 278.
— Fabri, 244.
— Gondreti, 154.
— de Grandjean, 408.
— ad haemorrhoides, II. 251.
— Hellmundi, 274.
— Jenneri, 243.
— laurinum, II. 53.
— lenions, 64. 378.
— Lugdunense, II. 148.
— contra lumbagimem, 164.
— Lupulini, II.
— mercuriale opiaceum, II. 135.
— — oxygenat, II. 134.
— — Sanchezii, II. 131.
— — saponaceum, II. 135.
— Naphae Florum, 529.
— nitricum, 48.
— ophthalmicum Pelletani, II. 148.
— Oxydi Zinci, II. 686.
— oxygenatum, 48.
— de Papavere, Hyoscyamo et Belladonna, 765.
— de Praecipitato rubro, II. 148.
— purgans, 554. II. 171.
— Resinae viridis Wenerei, 603.
— resolvens, 673. II. 175.
— Saturni, II. 344.
— Seminum frigid., 464.
— stibiatum, 243.
— Stramonii, 606.
— sulphuro saponaceum, II. 606.
— a la sultane, 454.
— ad tineam, 413. 673.
— vesicatorium, 405
Pompholyx, II. 684.
Pomum Citri, 5, 6.
— Hierosolymitanum, II. 211.
Populus, II. 369.
— balsamifera, II. 369. 608.
— nigra, II 369.
— tremula, II. 369.
Porcinus lapis — Lapis porcinus
Portlandia hexandra — China flava.
Portulaca, II. 370.
— oleracea, II. 369
Posca Galeni, II. 676.
Potassa, II. 377.
— per Alcoholem, II. 372.
— cum Calce, II. 372.
— Calcis ope parata et fusa, II. 371.
— caustica, II 370. 372.
— — cum Calce, II. 372.
— — fusa, II. 371.
— fusa, II. 371.
— impura, II. 377.
— liquida, II. 370.
— praeparata, II. 378.
— pura, II 370.
Potassa pura liquida, II. 370
— — fusa, II. 372.
— purificata, II. 378.
— sulphurica, II 385.
— tenalis, II. 377.
— vitriolata, II 385.
Potassae Acetas, II. 398.
— Carbonas, II. 384.
— et Sodae Tartras, II 412.
— Euchloras, II. 397.
— Subcarbonas, II. 377. 378.
— Sulphas, II. 385.
— — cum Sulphure, II. 385.
— Sulphuretum, II. 375.
— Supercarbonas, II 377.
— Supersulphas, II. 388.
— Supertartras, II. 400.
— — impura, II. 406.
— Tartras, II. 404.
Potassidum Myrrhae, II. 228
Potassium, II. 370.
Potentilla, II. 421 422.
— Anserina, II. 421.
— reptans, II. 422.
— Tormentilla — Torment. erecta.
Poterium Sanguisorba, II. 323.
Pothos foetida, II. Add.
Potio absorbens, 148. II. 256. 381. 578.
— acetosa et oleosa, 22.
— acida, 51.
— acidula, 81.
— acidulata, 89.
— adstringens, 56. 133. 178. 304. 331. 445. 447. 487. 496. 563. 613. 679. II. 45. 71. 256. 414. 570. 581.
— — et tonica, 494
— aetherea, 76.
— — camphorata, 376.
— alba, 304.
— alcalina, II. 384.
— — gasosa, 28.
— alcoholica camphorata, 376.
— alexipharmaca, 180.
— alterans, 742.
— aluminosa, 140.
— amara, 602.
— — antifebrilis, 68.
— ammoniacalis, 166.
— — Peyrilhe, 164.
— ammoniata, 164.
— ad anginam malignam, 245.
— anglica, II. 100.
— anodyna, 284. II. 236. 312.
— antemetica, II. 14.
— anthelmintica, 592. II. 464.
— — alostica, 96.
— — parum laxans, 820
— — oleoso-aromatica, II. 464.
— antiacida, II. 92.
— antiasthritica, 710. 716.
— antiasthmatica, 147. 177. II. 382.
— anticatarrhalis, 211. II. 438. 442.
— antichloretica, 56.
— anticolica, II. 108.
— anticypanchica, 245.
— antidiarrhoeica, 170.
— antidysenterica, II. 258.
— antiemetica, 446.
— antiepileptica, 677. II. 664.
— antifebrilis, 34 Mixt. Ac. mur.
— antigonorrhoica, 504.
— antihaemorrhagica, 51. 488 II. 241.
— antiherpetica, II. 376.
— antihydrophobica, 177.
— antihydropica, II. 101.
— antihysterica, 180. 439.
— antiicterica, II. 400.
— antilactosa, II. 382.
Potio antilyssica, 297. II. 223.
— antinarcotica, 551.
— antinephretica, 734. II. 395.
— antiperiodica, II. 262.
— antiphlogistica, II. 392.
— — laxans, 217.
— antipleuretica, 219
— antirachitica, II. 486.
— antiscorbutica, 487. II. 382.
— antiscrophulosa, 266. 493. II. 579.
— antiseptica, 30. 177. 489. 494.
— antisoporosa, 242.
— antispasmodica, 48. 69. 147. 180. 219. 433. 439. 464. 470. II. 14. 121 220. 242. 298. 381. 606.
— — et diuretica, 77.
— — et resolvens, 77.
— — et tonica. 488.
— antistrumalis s. antistrumosa, II. 381.
— antisyphilitica, II. 178.
— antitetanica, 169.
— antivomitiva, 18. II. 14.
— aperiens s. aperitiva, II. 392. 400.
— contra aphonism, 87.
— aromatica, 576.
— contra asthma, 147.
— asthmatica, 177.
— ad atram bilem, II. 405.
— balsamica, 304.
— bechica, 176.
— camphorata, 376.
— Capivi, 304.
— Carbonatis Calcis, 363.
— cardiaca, 166. 606. 576.
— carminativa, 147. II. 120. 252.
— ad catarrhum, II. 438. 512.
— cathartica, II. 92. 93. 585.
— cathartico - diaphoretica, 217.
— Chinae comp., 490.
— cum Chinae decocto, 493.
— — — pulvere, 482.
— chlorica, 511.
— Choparti, 306.
— confortans, 496 577.
— — acidulata, 577.
— Copahu s. Copaivae comp. 304.
— cordialis, 576. II. 288.
— — diuretica, II. 6.
— cum Creta, 363.
— cretacea, 361.
— demulcans, 729. II. 496
— deprimens, II. 258.
— cum Deutochlorureto Mercurii, II. 178
— diaphoretica, 176 181. 219. 246.
— — et bechica. 219.
— contra diarrhoeam, 178.
— digestiva — Inf. am. cum Natro.
— diuretica, 48. 73. 177. 310. 402. 457. 518. 551. 613. 686. II. 238. 382. 391. 392. 400 401. 410. 411. 536. 539 542. 632
— — et lemons., II. 403.
— — Milmanni, II. 402.
— drastica, 78.
— contra ebrietatem, 147.
— effervescens, 28.
— emetica, 228. 240. 245. 289. II. 15.
— — cordialis, 242.
— emeto-cathartica, 249.
— — laxans, 247.
— emetissans, 240.
— examenagoga, 374. 402. 657. II. 40. 41. 402
— emulsiva, 189.
— Emulae compositae, II. 5.

Potio cestitata, 177. 369. 389. 411. II. 209 241. 327. 466. 666.
— — et antispasmodica, II. 665.
— — martialis, 662.
— — nervina, 468
— — et resolvens, II. 668.
— expectorans, 48. 177. 231. 241. 284. 520. 614. 616. 685. 719. II. 381. 541. 599.
— et incisiva, II. 15
— febrifuga, 274. 275. 458. 508. 550. II. 15. 266. 391. 579.
— — amara, 283.
— — et lavativa, 288.
— ferruginosa, 650. 656
— frigida martialis; 669.
— fundans, 245.
— gummosa s. gummata, 729. II. 653.
— — scillitica, II. 583
— gummoso-opiata, II. 313.
— haemastatica, 140. 651.
— ad herpetem, II. 376.
— Hulmii s. Hulmiana, 30.
— hydragoga, 236. 468. 614. II. 40. 410. 658.
— hypnotica, II 251. 296 312.
— incisiva, II. 383. 543.
— incitans, 497
— juniperina. II. 40.
— cum Kermete s. kermetica, 228.
— laxans, II. 92. 405. 564. 583. 608. 617.
— — oleosa, II. 652.
— laxativa, II. 108. 388. 562.
— — et leniens, II. 459.
— — oleosa, II. 558.
— — et resolvens, II. 462.
— — et sedans, II. 452.
— — Viennensis, II. 562.
— leniens, 87. 188. 495. 615 729. II. 75. 215. 231. 251. 252. 265. 310. 312. 399.
— — Andry, II. 126.
— lithontriptica, 34. II. 92. 380. 385. 579.
— cum Manna et Rheo, II. 456.
— Mannae tamarindata, II. 100.
— Martis aurata, 654.
— — salita, 643.
— mercurialis, II. 123.
— — Plenkii, II. 124.
— Mercurii vivi, II 123.
— narcotica, II. 214. 265.
— nervina, 493.
— nitrata s. nitrosa, II. 392.
— nutriens et sedans, II. 52 66.
— ocytica, II. 646.
— oleosa, 188. II. 653.
— — drastica, 578.
— — leniens, 189.
— oxygenata, II. 397. et Add.
— oxymellata, 22.
— paregorica, II. 251.
— partum accelerans, II. 646.
— pectoralis, 37. 38. 221. 216. 320. 620. 719. 728. II. 103. 252. 367. 496.
— — amara, 490. II. 305.
— pellens, II. 381.
— peruviana, 310.
— phosphorata, II. 320.
— picea, II. 330.
— purgans s. purgativa, 229. 248. 431. 578. II. 20. 32. 91. 100. 405. 410. 445. 450. 456. 494. 530. 594. 583. 611.
— — anglica, II. 29.
— — camphorata, II. 566.
— — pro infantibus, II. 405.
— — et febrifuga, II. 382. 566.
Potio purgans minor, II. 96.
— — et tonica, II. 446.
— — et vermifuga, II. 450. 566.
— ad rabiem, II. 113.
— refrigerans, II. 393.
— resolvens, 245. II. 10. 388.
— — ex Iodio, II. 9.
— — et laxans, II. 452.
— — Mutzelii, II. 405.
— Riverii, 28.
— roborans, 496.
— — acidulata, 527.
— salina, II. 93.
— — mannata, II. 100.
— — purgans, 247.
— saponacea, II. 381. 417.
— scillitica acidulata, II. 542.
— sedans et leniens, II. 255.
— — et diuretica, II. 393.
— sedativa s. sedans, 751. II. 81. 256. 473.
— sistens, 576.
— solutiva cum Cassia, 431.
— stibiata, 240.
— stibio-opiacea, 236.
— stimulans, 165. 335. II. 9 594. 632.
— — et tonica, 489.
— stomachica, 98. 331. 561. II. 121. 432.
— — visceralis, 8.
— ad strumam, II. 381.
— sudorifica, 171. 178.
— sulphurata, II. 604.
— sulphurosa, II. 376.
— contra taeniam, 306. II. 631.
— tartarica composita, II. 410.
— tartaro-boracica, II. 411.
— temperans, 207. 439. 616. 731. II. 164. 392. 400.
— terebinthinata, II. 618.
— tetanica, 169.
— tonica, 178. 207. 281. 393. 487. 489. 492. 493. 494. 496 497. 500. 526. 576. 650. 700. II. 288. 452.
— — et antispasmodica, 488. 576.
— — adstringens, II. 251.
— — camphorata, 488.
— — martialis, 662.
— tonico-anodyna, 560.
— ad tormina infantum, 461.
— ad tussim convuls., II. 251.
— vermifuga, 153. 470. 522. 733. 743. II. 632. 645.
— Viennensis, II. 562.
— vinosa, 388. II. 676.
— vomitiva, 240. II. 13. 15.
— — stibiata, 240.
Potus cum Acido tartarico, 69.
— acidus, 22. 53.
— — mineralis, II. 53. et Add.
— — vegetabilis, II. Add.
— Aetheris sulphur. alcoholisati, II. Add.
— aluminosus, 138.
— analepticus, 87.
— antichloroticus, 56.
— antifebrilis acidulus, 58.
— antiphlogisticus, diaphoreticus et leviter laxans, 241
— — diureticus, II. 395. 396.
— — leviter laxans, 242.
— ad blenorrhoeam, 304.
— carminativus, II. 43.
— Cerasorum, 462.
— Citri stibiatus, 242.
— communis incitans, 86.
— diureticus, II. 43.
— — simplex, II. 401.
— hydrocyanicus, 38.
Potus mineralis Bathi, II. 197.
— muriatico-acidus, 33.
— Oryzae citratus, II. 298.
— oxygenatus, II. 397.
— oxymellicus, 22.
— ad pernliones, 138.
— ex Pomis, II. 396.
— Pomorum, II. 368.
— Sacchari Lactis, II 46.
— spirituosus, 86.
— sulphurico-salinus, II. 388.
Praecipitatus albus, II. 156. 199.
— flavus, II. 190
— niger, II. 192.
— per se, II. 145.
— roseus, II. 191.
— ruber, II. 145.
— solubilis niger, II. 192.
— viridis, II. 147.
— Wurtzii, II. 190.
Prassium, II. 700.
Priapus Cervi, 682
— Ceti, 682.
— Tauri, 682.
Primula officinalis, II 422
— veris, II. 422.
Prinos, II. 422.
— verticillatus, II 422.
Propolis, 254.
Protocretae Barii, 318.
— Calcii, 368.
— Mercurii, II. 203.
— Plumbi, II. 340.
— Potassii, II 398.
— Sodii, II. 585.
Protocarbonas Magnesii, II. 88.
— Potassii, II. 354.
— — et Ammoniaci, II. 385.
— Sodii, II. 579.
Protochloras Potassii, II. 397.
Protochloruretum Ferri, 652. 653.
— Hydrargyri, II. 156.
— Mercurii, II. 165.
Protocitras Calcii, 368.
— Ferri, 609.
— Potassii, II. 403.
Protogallas Plumbi, II. 352.
Protohydriotas Potassii, II. 8.
Protohydrochloras Calcii, 367.
— Ferri solidus s. crystallus, 653.
— Magnesii, II. 91.
— Mercurii, II. 156.
— Potassii, II. 392.
— Sodii, II. 575.
Protohydrocyanas Potassii, 38.
Protohydroferrocyanas Potassii, 38
Protohydrosulphas Calcii, 366.
Protohydrosulphocyanas Ferri, 670.
— Potassii, 39.
Protohyposulphites Potassii, II. 390.
— Sodii, II. 588.
Protoiodas Mercurii, II. 198.
Protoioduretum Mercurii, II. 188.
Protomalas Ferri, 660.
Protonitrous Sodii, II. 580.
Protonitras Barii, 318.
— Hydrargyri solubus, II. 196.
— Mercurii, II. 194.
— — et Ammoniaci, II. 198.
— Plumbi, II. 330.
— Potassii, II. 389.
— Sodii, II. 582.
Protooleomargaras Plumbi. II 352.
— Potassii, II. 413.
— Sodii, II. 586.
Protophosphas Calcii acidus 366.

Protosulfas, s. Protosulphas.
Protosulphas Barii, 317.
— Calcii, 366.
— — cum Deutosulphate Sodii, II. 94.
— Ferri 648.
— Magnesiae, II. 92.
— Potassii, II. 385.
— — et Ammoniaci, II. 388.
— — et Magnesiae, II. 388.
— Sodii, II. 583.
Protosulphites Potassii, II 389
— Sodii, II. 585.
Protosulphuretum Antimonii, 221. 223.
— Cupri, 683.
— Stanni, II. 692.
Prototartras Antimonii, 236.
— — et Potassii, 230.
— Potassii, II. 404.
— — et Ammoniaci, II. 413.
— — et Ferri, 663.
— — et Sodii, II. 412.
Protoxychloruretum Calcii, 356.
— Sodii, II. 575.
Protoxydum Antimonii, 213.
— Barii, 317.
— Calcii, 360.
— Cobalti, 543.
— Ferri, 638.
— Hydrargyri nitrico-ammoniacale, II. 192.
— Plumbi, II. 334.
— Potassii, II. 370.
— Sodii, II. 574.
— Stanni, II. 692.
— Stibii griseum, 213.
— — sulphuratum fusc., 220.
— Zinci, II 684.
— — impurum, II. 684.
Protoxyphosphuretum Calcii, 364.
Protoxysulphuretum Calcii. 354.
— Potassii, II. 374.
— Sodii, II. 574.
Pruna agrestia — Prunus spinosa.
— Damascena — Prunus domest.
— laxativa, II. 529.
— praeparata s. purgans, II. 529.
Prunella, II. 422. 423.
— vulgaris, II 422.
Pruneolus sylvestris, 15. II. 423.
Prunus, II. 423.
— Avium — Cerasus.
— Cerasus — Cerasus.
— domestica, II. 423.
— Laurocerasus — Lauro-Cerasus.
— Padus, 450.
— spinosa, 15. II. 423.
— Virginiana, II. Add.
Prussias Lixiviae et Ferri, 38. 670.
— Mercurii, II. 189.
— Potassae et Ferri, 38. 670.
Pseudacorus, II. 18.
Pseudoalcannunum, 102.
Pseudo-Angustura, 206.
Psoralea glandulosa, 580.
— pentaphylla, 566.
Psychotria emetica, II. 11.
Psyllium, II. 331.
Ptarmica, II. 424
— montana, 266.
Pteris aquilina, II. 424.
Pterocarpus Draco, II. 512.
— erinacea — Kino.
— officinalis — Pt. Draco.
— santalinus, II. 512. 513.
Ptisana Callaci, 000.
— Datisbli, 541.
— hippocratica, 745.
— laxativa, II. 562.
— Oryzae, II. 298.
Ptisana ex pane, II. 300.
— parmlata, II. 562.
Pulegium, II. 426.
Pulicaria, II. 331.
Pulmonaria arborea, II. 64.
— Gallica, 744.
— maculosa, II. 426.
— officinalis, II. 426.
Pulpa Caricarum, 421.
— Cassiae, 429.
— — pro clysteribus, 429.
— — compos., 430.
— — Fistulae, 429.
— Ceparum, 89.
— Cynorrhodontis, II. 467.
— Dactylorum, 602.
— Ebuli, II. 508.
— emolliens, 123.
— Ficuum, 421.
— Jujubarum, II. 35.
— Lilii, II. 72.
— Melimelorum, II. 368.
— Passularum, II. 680.
— Pomorum dulcium, II. 368.
— Prunorum, II. 423.
— — depurata, II. 423.
— Sambuci — Roob Samb.
— Scillae, II. 531.
— Sorbi Baccarum, II. 582.
— Tamarindorum, II. 609.
— Uvarum, II. 680.
Puls arsenicalis, 272.
Pulsatilla coerulea, 193.
— minor, 194.
— nigricans, 194.
— vulgaris, 193.
Pulticula de Manna, II. 99.
— saponacea, II. 449.
Pulvis contra abortum, II. 475.
— absorbens, 217 II. 89. 447.
— — Wedelii, II. Add.
— — pro usu externo, II. 645.
— ex Acido tartarico, 58.
— acidulus, 58.
— Aconiti, 61.
— — foliorum, 60.
— — nitratus, 61.
— contra acredinem — P absorb., 217.
— adstringens, 135. 586. 643. 646. II. 43. 269. 512. 604.
— aërophorus, 28. II. 89.
— — e Magnesia carbonica, II. 89.
— — e Natro carbonico acidulo, 28.
— ex Aethiope antimoniali, II. 140.
— aethiopicus, II. 141.
— alexipharmacus, 132. II. 394.
— — Camerarii, 132.
— — Rollwagii, 132.
— — ruber, II. 394.
— — sinicus, II. 218.
— alexiterius, 265. 585. II. 12. 269.
— Algarothi, 213. 235.
— Aloës cum Canella, 104.
— — compositus, 101.
— — cum Guajaco, 104.
— alterans comp., II. 102.
— — Plummeri, II. 161.
— Aluminis comp., 135.
— — cum Kino, 136.
— — kinosatus, 135.
— aluminoso-mercurialis, II. 147.
— aluminosus, 132. 135.
— — Helvetii, 136.
— amarus, 694.
— — ferratus, 649.
— ammoniato-camphorat., 164.
— Ammonii, 164.
— — muriatici, 170.
Pulvis Anagallidis, 292.
— analepticus, II. 152.
— Angelicae comp., 170.
— angelicus, 235.
— — Sharpii, II. 147.
— anodynus, II. 89. 264. 268. 269. 270.
— — Camerarii, II. 264.
— — Doveri, II. 269.
— — Ludovici, II. 264.
— anonymus, II. 655.
— antacidus, 360. II. 89.
Pulv. antiarth.
— antarthriticus, II. 528.
— — purgans, II. 528.
— — Wepferi, II. Add
— anthelminticus, 580. II. 23. 127. 152. 664.
— antiacidus, II. 89.
— antiarthriticus, 694. 469.
— — amarus, 647.
— — purgans, II. 549.
— antiasthmaticus, II.
— anticalculosus, II.
— anticachecticus, 633
— anticatarrhalis, 226. 328. 391. 601.
— antichloroticus, 634.
— anticolicus Camerarii, 380.
— anticonvulsiv. stomach 432.
— antidiarrhoicus, II.
— antidysentericus, 565. 269. 601.
— antiemeticus, II. 89.
— antiepilepticus, II.
— — Marchionis, II
— — niger, II. 303. et
— antifebrilis, 475.
— antihaemorrhagicus,
— antihectico-scrophulosa. II. 223.
— antihecticus, II. 448.
— antihydropicus, 611.
— antihystericus, 432.
— antiictericus, II. 549.
— antileucorrhoicus, 639
— antilyssus, 362. II. 65. 491.
— — Ormskirkianus,
— — Tunchinensis s. Jesuitarum, II. 218.
— antimonialis, 216. 221.
— antiperiodicus, 508.
— — et purgans, 476.
— antiphlogisticus, II.
— antiphthisicus, 586. II.
— antipleuriticus, II.
— antisporicus, II. 348.
— — Pyhorelii, 365.
— antirachiticus, II.
— antirheumaticus, 240.
— antisepticus, 475. 477.
— antispasmodicus, 227. 477. 611. II. 194. 264. 272. 684. 685.
— — infantum, II. 679.
— — nitrosus, II. 154.
— — et anticonvulsivus machicus, 439.
— — Rosensteinii, II.
— — Stahlii, II. 531.
— antispasticus, II. 663.
— antistrumalis, 361. II. 666
— aperiens et resolvens, II.
— aperitivus, II. 365. 391
— aphrodisiacus, II.
— ad aquam comfortativam, 363.
— ad arsenalis, 524.
— Argenti Nitratis, 262

Pulvis Ari alcalinus, 238.
— — — comp., 238.
— Arnicae comp., 266.
— — opiatus, 266.
— aromatico-ferratus, 639. 649.
— aromaticus, 380. 381. II. 327. 477.
— arsenicalis, 271. 272.
— — Baumanni, 271.
— — Justamondi, 271.
— — Plenciaii, 271.
— — Plunketii, 271.
— — Rousselotii, 271.
— arthriticus, 61.
— Asari comp., 288.
— atramentarius, 649.
— Auri muriatici, 299.
— Auripigmenti factitii, 269.
— balsamicus, II. 226.
— basilicus, II. 162.
— Belladonnae, 295.
— benzoicus, 25.
— e Benzoino, 25.
— Bernhardi, 271.
— bezoardicus albus Ludovici, 365.
— — Anglicus completus, 216.
— — — incomplet., 217.
— — Curvi, 477.
— — Halensis, 217.
— — Rollwagii, 132.
— — Sennerti, 360.
— ad botium, II. 414.
— cachecticus, 639.
— — Chesneau, 646.
— — Ludovici, 215.
— — Quercetani incompl, 643.
— Calami aromatici, 348.
— Calcariae sulphuratae cum Aconito, 355.
— ad calculum, 694.
— camphoratus, 371.
— e Cancrorum Chelis comp., 360.
— — — pretiosus, 360.
— Cantharidum camphorat., II. 410.
— Capucinorum, II. 493.
— Carbonatis Calcis comp., 361.
— capitalis Sancti Angeli, 288.
— Carbonis acidulus, II. Add.
— cardiacus, 565. II. 152.
— contra cariem, 279.
— de Carignan, II. 302.
— carminativus, 208. II. 12. 89.
— Carthusianorum, 223.
— caryocostinus, II. 528.
— Caryophyllatae, 703.
— — et Rhei, 703.
— castoreatus, 432.
— contra casum, II. 512.
— catarrhalis, II. 602.
— ad catarrhum, II. 318.
— Catechu comp., 442.
— cathartico-diuret, II. 584.
— catharticus, 94. II. 173. 447.
— — absorbens, II. 448. 601
— — febrifugus, 476.
— catholicus, II. 588.
— causticus, II. 147.
— — Krügeri, II. 183.
— Cellensis aureus, II. 152.
— — nobilis, II. 152.
— cephalicus, 328. II. 236. 302
— — albus, II. 303.
— — Camerarii, II. 153.
— — niger, II. 685.
— — ruber, II. 153. 476.
— — Winteri, II. 153.
Pulvis e Cerussa comp., II. 330.
— cervinus Camerarii, 365.
— Chamomillae cum Antim., 217.
— e Chelis Cancrorum minus pretiosus, 360.
— — — pretiosus, 361.
— Cheltenhamensis, II. 92.
— Chinae, 474 475.
— — antisepticus, 477.
— — camphoratus, 474.
— — compos., 476.
— — factitius, 67.
— — cum Sale Ammoniaco, 476.
— Chocolatae chinatae, 474.
— e Cinchona cathart., 476.
— Cinnamomi comp., 380.
— Coffeae cum Cort. Peruv., 474.
— Colocynthidis, 553.
— Comitis de Warwick, 218.
— Comitissae Kantii, 565.
— compositus Stahlii, II. 531.
— ad condienda intrana, 110.
— ad condiendas carnes, 111.
— ad condiendum, 110.
— — cor, 111.
— confortans Camerarii, II. 153.
— Constantini, II. 505.
— contentus, 380.
— Contrayervae comp., 505.
— cordialis Cellensis, II. 152.
— Cornachinus, 218.
— Cornu Cervi usti cum Opio, II. 267.
— corroborans, 475.
— Corticis Quercus et Anthemidis nobilis, II. 433.
— cosmeticus, 183. II. 314.
— — ad manus, 67. 183.
— Cosmii, 271.
— cretaceus, 361.
— Cretae comp., 361.
— — — cum Opio, II. 267.
— Cupressi restrictivus, II. 691.
— dentifricius, 362. 413. 477. II. 497. 600
— — albus, II. 496.
— — Hufelandi, 477.
— — niger, II. Add.
— — Pelletier, 508.
— deprimens et nauseosus, 611.
— depurans, II. 141.
— contra diabetem, 133.
— diacarthami, II. 528.
— diaphoreticus, 217. 366. 710. II. 104. 172. 269. 396. 600.
— — et sedativus, II. 270.
— diapnoicus, II. 269.
— diaromaton, 380.
— diarrhodon, II. 476.
— ad diarrhoeam, II. 11.
— diascordii, II. 289.
— diesenmae, II. 549.
— digestivus, 208. 247. II. 89. 92. 174. 380. 388. 409. 418.
— — Kleinii, II. 404.
— — cum Rhee, II. 387.
— — Umzeri, II. 397.
— Digitalis purp., 511.
— diureticus, 410. 611. M. 37. 395. 585. 661.
— — martialis, II. 394.
— Doveri s. Doweri, II. 269.
— dysentericus, 566.
— ad dysuriam, 122.
— eccoproticus, II. 409.
— ecphracticus, 649. II. 90. 409.
— — Seilii, II. 90.
— Edinburgensis, II. 161.
— emeticus, 585. 245. II. 12.
Pulvis emeticus comp., 243.
— — Helvetii, 245.
— emeto-catharticus, II. 11.
— emmenagogus, 410. 634. II. 37. 226.
— ad epilepticos, II. 664.
— epilepticus, II. 153. 302. 663.
— — albus, II. 303.
— — Cellarii, II. 303.
— — ad guttetam Riverii, II. 302.
— — Holsaticus, II. 303.
— — Marchionis, II. 302. 303.
— — Marchionum, II. 89.
— — mirabilis Mynsichti, II. 153.
— — niger (Viennensis), II. 303.
— — ruber, II. 153.
— pro epithemate cordis et pulsuum, II. 476.
— equorum, 223.
— errhinus, 288. II. 167.
— ad erysipelas, II. 334. 607.
— — externus, 13.
— erysipelatodes Mynsichti, II. 334.
— — externus, 13.
— escharoticus, 585. 594. II. 147. 203. 348.
— evacuans puerorum, II. 169.
— excitans, II. 41. 166. 447.
— in excoriatione aegri, 362.
— ad excrescentias, 135.
— expectorans, 226. II. 12. 172. 602.
— exsiccans et incitans, 371.
— Extracti Pulsatillae, 194.
— febrifugus, 170. 271. 475. 480. 588. 694. II. 12. 327.
— — adstringens, 474.
— — et anticachecticus, 475.
— — antimonialis, 215.
— — Finesii, 476.
— — Gaubii, 476.
— — Hoffmanni, 475.
— — et incisivus, 475.
— — Jodelot, 476.
— — Lescure, 477.
— — Mortoni, 217.
— — et nervinus, 476.
— — cum Opio s. opiatus, 476.
— — pauperum, 703.
— — et purgans, II. 23.
— — salinus, II. 396.
— — stibiatus, 475.
— — Trilleri, 475.
— — Unzeri, 231.
— ferratus, 639.
— Ferri alcoholisatus, 632.
— — limati, 633.
— ferruginosus, 639.
— ad flatus, 208.
— contra fluorem album, 629. II. 103.
— Foeniculi comp., 197.
— Fontanellesii, 272.
— de Fordyce, II. 412.
— Frahkii, II. 409.
— fumalis, 323. II. 697.
— — Haagii, 324.
— — nobilis, 324.
— — odoratus, 324.
— ad fumigationes muriaticas, 509.
— galactopoeus, II. 89.
— galactopoieticus, 197.
— di gambello, II. 602.
— Gentianae comp., 694.
— Glycyrrhizae comp., II. 549.
— graphiticus, 637.

Pulvis Gratiolae cum Hydrargyro, 706. II. 165.
— gregorianus, II. 549
— Grimaldii, 696.
— Guajaci cum Senna, II. 549.
— Guarini, 226.
— Gummi - resinae Guajaci opiatus. II. 709.
— — — —
— — — et Subcarbonatis Ammoniae, II. 709.
— — — —
— — — et Tartrat. Stib. et Potass., II. 709
— gummosus, 727.
— — alcalinus, 727. II. 386.
— — cum Liquiritia et Sulphure stibiato, 230.
— — stibiatus, 226.
— — sulphuratus, 727.
— contra guttam serenam, 191.
— de gutteta, II. 302.
— ad guttetam, II. 153. 302. 303.
— ad haemoptysin, II. 512.
— de Haly, 190.
— Helmintochorti comp., 712.
— hepaticus ruber, II. 407.
— ad herpetem, II. 141.
— Hierae picrae, 104.
— hydragogus, II. 38. 173.
— Hydrargyri cum Camphora, II. 166.
— — cinereus, II. 142. 192.
— — cum Opio, II. 171.
— — oxydati rubri, II. 147.
— — stibiato - sulphurati cum Cicuta, II. 141.
— — stibiatus, II. 161. 164
— — — cum Hyoscyamo, II. 164.
— ex Hydrargyro mur. miti cum Sulphure Stibii aurantiaco, II. 161.
— — rubro cum Alumine, II. 147.
— — stibiato - sulphurato, II. 140.
— hypnoticus, II. 138.
— hystericus, 432.
— Imperatoris, 36. 381.
— incidens s. incisivus, 227. 243. 369. II. 405. 631.
— — Stahlii, 369.
— Incrassans Fullerl, 727.
— pro infantibus, 362. II. 89.
— Infantum, 362. II. 89.
— — anodynus, II. 89.
— — antacidus, II. 89.
— — citrinus, II. 89.
— — cum Rheo, II. 448.
— ad intertrigines, 362.
— Iridis aromatis., II. 9.
— Ipecacuanhae comp., II. 269.
— — et Cupri Sulphatis s. Cupri sulphurici, 586.
— — Hydrargyratus, II. 168.
— — opiatus, II. 269.
— — et Opii, II. 269.
— — cum Opio, II. 269.
— — cum Tartaro stib., 245.
— — thebaicus, II. 269.
— Iridis cum Nitro, II. 391.
— Jalapae comp., II. 22.
— — hydrargyratus, II. 22.
— — cum Hydrargyro muriatico mitl, II. 22.
— — cum Kali sulphurico, II. 22.
— — et Muriat. Hydrarg. oxydulati, II. 169.
— — cum Natro, II. 22.
— — salinus, II. 22.
— — et Supertartrat. Potassae, II. 22.
— — tartarisatus, II. 82.
Pulvis Jamesii, 216.
— Johannis de Vigo, II. 146.
— Juniperi Sabinae comp., II. 37.
— pro jusculo extemporaneo, 683.
— Kentianus, 216.
— kermesinus, 224.
— — cum Camphora, 226.
— e Kermete mineral, 226.
— Kermetis cum Ipecacuanha, 227.
— Kino comp., II. 44.
— — gummosus, II. 44.
— Knoxii, 356.
— Lauri carbonicus, II. 52.
— — Baccarum comp., II. 223.
— laxans, II. 32 418. 519. 601.
— — cum Mercurio, II. 22.
— — puerorum, II. 169.
— — cum Sale, II. 32
— — et temperans Tremchini, II. 409.
— laxativus vegetabilis, II. 92.
— lenions antihypochondriacus Kleinii, II. 484.
— — Thedeni, II. Add.
— lenitivus, II. 447.
— — tartarisat., II. 447. 549.
— pro Limonata, 58.
— Liquiritiae comp., II. 549.
— lithontripticus, II. 661.
— longae vitae s. ad longam vitam, II. 440.
— ad lumbricos, II. 169.
— Lunaris, 262.
— Lupulini, II. 86.
— ad maculas cornene, II. 408. 694.
— e Magnesia carbonica, II. 89.
— Magnesiae comp., II. 89. 448.
— — cum Rheo, II. 89.
— — tartaricus, 28.
— Mantuanus, 565.
— manualis, 67. 183.
— Marchionis, II. 302. 303.
— martialis, 633.
— — Anglicus, 633.
— masticatorius, II. 1.
— mercurialis, II. 164. 168.
— — antimoniatus, II. 161.
— — argenteus, II. 205.
— Mercurii Moscati, II. 142.
— — dulcis cum Opio, II. 171.
— e Mercurio, II. 164.
— — dulci, II. 157.
— ad mictum involuntarium, 616.
— mitigans Wepferi, 122.
— ad morsum canis rabidi, II. 391.
— Moschi, II. 218.
— — comp., II. 218.
— — opiatus, II. 217.
— motum peristalt. invertens, II. 18.
— mucilaginosus, II. 653.
— Muriatis hydrargyrosi thebaic., II. 171.
— Myrrhae comp., II. 226.
— Nardi Celticae comp., II. 233
— nasalis odoratus, II. 476.
— Natri carbon. cum Acido tart., 28.
— nauseam ciens, II. 12.
— nephriticus pretiosus, 369.
— nervinus, II. 663.
— Nitratis Argenti, 262.
— — Potassae comp., II. 391.
— Nitri oxalicus, II. 396.
— — tartaricus, II. 396.
Pulvis Nitri thebaicus, II. 268.
— nitrosus camphorat., II. 393.
— nitrosus, II. 390. 396.
— — cinnabarinus, II. 154.
— Nucis vomicae, II. 240.
— Nucum moschatar. comp., II. 223.
— nutricum, 197. II. 85.
— nutriens, 683.
— ocyticus, II. 388.
— Olibani compos., II. 213.
— ophthalmicus, 628. II. 406.
— — Baldingeri, II. 408.
— opiatus, II. 267.
— Opii comp., II. 264.
— Oxalatis Potassae, II. 403.
— Oxydi Stibii comp., 218.
— ex Paeonia comp., II. 302.
— Pannonicus ruber ordinarius, 133.
— — — incomplet., 133.
— — — minus pretiosus, 133.
— paregoricus, II. 89.
— ad partum, II. 326. 560.
— pectoralis, 170. 217. 220. 226. 266. 321. II. 36. 309. 539. 602.
— — balsamicus, II. 602.
— — — Wedelii, II. 602.
— — et diaphoreticus, 220.
— — resolvens, 230. II. 601.
— — viridis, II. Add.
— ad s. contra pediculos, 608
— peristalticum motum invertens, II. 12.
— Peruvianus purgans, 476.
— ex Phellandrio aquatico gummosus, II. 318.
— ad s. contra phthisin, 486. 550. II. 318.
— pleuriticus, 365.
— — Mynsichti, II. 601.
— Plumbi compos., II. 337.
— e Plumbo comp., II. 337.
— Plummeri comp., II. 162.
— ad pollutiones nocturnas, 406.
— Portlandii, 691.
— praecipitans Stahlii, 227.
— Principis, II. 146.
— — de Carignan, II. 302.
— ad procidentiam ani, 132.
— ad prolapsum ani, 132.
— ad ptyalismum, II. 374.
— puerorum citrinus, II. 89.
— — epilepticus cum Rheo, II. 448.
— Pulsatillae Extracti, 194.
— purgans, 240. 631. II. 22. 89. 92. 169. 448. 528.
— — absorbens, II. 601.
— — anthelminticus, II 173.
— — et diureticus, 611.
— — et irritans, 708
— parificans, II. 141.
— — Jasseri, 223.
— — Kaempfii, 228.
— purpureus Anglicus, 362.
— pyrrheus s. pyrrhus de Sarnensee, II. 397.
— contra quartanam, 475.
— Quercus compos, II. 433.
— — marinae, 412.
— ad rubiem Comitis d'Isemburg, 362.
— contra rubiem, 192.
— refrigerans, 56. II. 391. 409.
— ad rachitidem, II. 486.
— relaxans, 217.
— Resinae Guajaci et Subcarb. Ammoniae, 709.
— resolvens, 226. 243. II. 174. 475.

Pulvis resolvens antiphlogist., II. 365.
— — comp. 218
— — Stahlii, 218.
— restaurans, 345.
— Rhei comp., II. 387. 447.
— — cum Magnesia, II 448.
— — et Muriat. Hydrar. oxydulati, II. 173.
— — saponaceus. II. 448.
— — salinus, II. 448.
— — et Sulphatis Potassae, II. 448.
— — cum Tartaro, II. 447.
— — cum Tartrate Potassae, II. 447.
— e Rheo, II. 448
— rheumaticus anodynus, 245.
— roborans P. corrob., II. 153.
— — antispasmod., II. 663.
— — martialis, 476.
— Rubiae comp., II. 486.
— Rudingii, 214.
— Sacchari acidulus, 48.
— Sabinae compos., II. 37.
— Salep, II. 498.
— Salicis compos., 498.
— salino-stibiatus, 247.
— salinus, II. 409.
— — compositus, II. 98. 164.
— ad salivationem, II. 378.
— Sambuci, II 607.
— Sanguisis Draconis dentifric., 365.
— Saponis compos., 631.
— contra scabiem, II. 600.
— Scammoneae comp., II. 528.
— Scammonii antimonialis, 218.
— — comp., II. 528.
— — compos. Odieri, 218.
— Scillae comp., II. 531.
— — — Stahlii, II. 531.
— sedativus, 296. II. 268.
— Sedlitzensis, 28.
— Sennae compos., II. 594.
— — cum Sulphure, II. 549.
— sialagogus, 170.
— Sodae tartarisatus s. tartaricus, 28.
— Specierum Diatragac. s. Tragacanthae comp., II. 654.
— Spongiae comp., 414.
— stagnoticus, II. 247.
— Stanni, II. 592.
— — ferratus, II. 591.
— — martiatus, II. 591.
— — philosophice paratus, II. 590.
— sternutatorius, 288 327. 567. 579. 626. 736. II. 167. 233. 405.
— — albus, II. 222.
— — Nopsii, II. 567.
— — variegatus, 567
— — viridis, 567.
— stibiato-opiatus, 245 709.
— stibiatus, 216. 217. 230 243.
— — de Marryat, 244.
— stimulans, II. 62.
— stomachicus, 288. 475. 476. 560. 693. II. 695
— — s. stomachalis Birckmanni, 278.
— — Dörflingensis, II. Add.
— ad strumam, 361. 414. II. 139. et Add.
— contra strumam, 361. 414. II. 686.
— Strychnini, II. 591.
— stypticus, 132. 136. 649. II. 44. 348.
— Subcarbonatis calcici, 360.
— sudorificus, II. 260.
— — Doveri, II. 260.
Pulvis sudorificus et tonicus, II. 517.
— ad suffitendum, II. 597.
— pro suffumigio s. suffimento II. 244. 597.
— Sulphatis Ferri c. Kino, 649.
— — Aluminae comp., 135.
— ex Sulphure stibiato, 231.
— — — rubro, 220.
— — — — cum Camphora. 226.
— Sulphureti Antimonii, 221.
— sulphureus, II. 601.
— Sulphuris comp., 104.
— — sublimati comp., II. 601.
— sulphurosus, II. 601.
— Supersulphat. Aluminae et Potassae comp., II. 147.
— Supertartratis Potassae et Stalagmitidis cambogioidis, II. 409.
— — — et Digit. purp., II. Add.
— Tanaceti comp., II. 613.
— Tartari argillatus, II. 408.
— — compos., II. 407. 409.
— Tartratis Stibii et Potassae, 709.
— temperans, 27. 330. 611. II. 347. 397. 409.
— — albus, II. 396.
— — Bouillon - Lagrange, II. 396.
— — camphorat., II. 301
— — diureticus, II. 390.
— — Rosensteinii, II. 396.
— — ruber, II. 154.
— — Stahlii, 127. II. 164.
— — Tennanti, 365
— — Unzeri, II. 397.
— terebinthinatus, II. 632.
— terrestris, 360.
— thebaicus, II. 267.
— contra tineam, 316.
— tisaniferus, 727.
— tonico adstringens, 475.
— — antispasmod. martialis, 633.
— — martialis, 633.
— — stomachicus, 633.
— tonicus, 476. 509. 526. 639. 646 649. 670.
— — Bangii, 476.
— — et resolvens, 227.
— Tormentillae comp., II. 651.
— ad tormina infantum, II. 448.
— — — — antacid., II. 89.
— Tragacanthae comp., II. 653. 654.
— Tranchinensis, II. 218.
— contra tussim convulsivam, 227.
— — — infantum, II. 302.
— ad ulcera crurum, II. 22.
— — — sordinum, II. 226.
— Uvae ursi, II. 661.
— Valerianae, II. 664.
— — aromat., II. 663.
— Vanillae, II. 671
— contra vermes, 520. II. 136. et Add.
— vermifugus, 218. 294. 520. 706. 712. II. 38. 127. 139. 168. 169. 169. 174. 175. 676. 580. 592. 694.
— — mercurialis, II. 137.
— Vernicis, 686.
— Viennensis albus virgineus, 366.
— Vigonis, II. 146.
Pulvis Vitae Imperatoris, 382.
— vomicus, II. 12.
— vomitivus Scherfii, 246.
— Zinci oxydati albi, II. 686.
Pumex, II. 420.
Punch, 87.
Punica Granatum, II. 426.
Purgativum Grandii, II. 405.
— Leroyi, II. 30.
Purpura Cassii, 300.
— mineralis, 300.
Putamen Juglandis, II. 33.
Pyrethrum officinale, II. 428.
— Parthenium — Matricaria.
— salivale, II. 428.
Pyri martiales, 601.
Pyrites arsenicalis micaceus, 260.
— Ferri artificialis, 637.
Pyrola, II. 429.
— rotundifolia, II. 429.
— umbellata, II. Add.
Pyroleum ossium rectificat, 691.
— Succini, II. 608.
Pyrus Cydonia — Cydonia.
— Malus — Malus comm.

Q.

Quadrichloruretum Sodii, II. 676.
Quadroxalas Potassae, II. 403.
Quassia amara, II. 430.
— excelsa, II. 431.
— Simaruba — Simaruba.
Quassina s. Quassinum, II. 431
Quercula minor, II. 643.
Quercus, II. 433.
— Aegilops — Q. infectoria.
— alba, II. 433.
— Cerris s. Cerrus, 678.
— Esculus — Q. infectoria.
— Ilex, II. 433.
— infectoria, 678.
— marina, 673.
— pedunculata, II. 433.
— Robur, II. 433.
— Suber, II. 433.
— tinctoria, II. 433.
Quinina s. Quininum, 595.
Quininum sulphuricum — Chinium sulph.
Quinium, 595.
Quinquefolium majus, II. 422.
Quinque lapides pretiosi, II. 697.
Quinquenervia minor, II. 331.

R.

Radices conditae Carlinae, 421.
Radix Brasiliensis, II. 11.
— Lopeziana, II. 436.
— Mungos, II. 222.
— Serpentum, II. 222.
Ramenta Ferri, 632
Rana esculenta, 681.
— temporaria, 681.
Ranunculus, II. 436.
— acris, II. 436.
— albus, 193.
— aquaticus, II. 436. 437.
— bulbosus, II. 436. 437.
— Ficaria, 467.
— Flammula, II. 437.
— nemorosus, 193.
— palustris, II. 437.
— pratensis, II. 436.
— sceleratus, II. 437.
Raphanus hortensis, II. 437.
— marinus, II. 437.
— niger, II. 437.
— rusticanus, II. 437.

Raphanus rusticus, II. 437.
— sativus, II. 437.
Rapus raber, 327.
Raspatura Cornu Cervi, 364.
— Ligni Guajaci, 707.
Rasura Cornu Cervi, 364.
— Ligni Guajaci, 707.
— — Santali rubri, II. 513.
— Succini — Succin. raspat.
Ratafia antiscorbutica, 452.
— Caraibum s. Caribaeorum, 712.
Ratanha, II. 442.
Ratanhia, II. 442.
Ratania, II. 442.
Realgar, 296.
Recrementum Vitri, II. 387.
Regina pratensis, II. 589.
Reguli usti, 359. 413.
Regulus Antimonii, 211.
— — martialis, 212.
— — medicinalis, 212.
— — simplex, 211.
— — stellatus, 211.
— Stibii, 211.
Remedium contra accidentias a fungis veneficis, 105.
— antidiabeticum Redfearn, II. 383.
— antihydropicum, 643.
— antiphthisicum Adairi, 686.
— antisaeniosum, II. 158.
— antivenereum de Mittie, II. 33.
— Capucinorum, II. 195.
— Christiani (Chrestien) ad bilem, 512.
— Ducis d'Antin, II. 195.
— contra hydropem, 643.
Requies Nicolai, II. 293.
Resina alba, II. 636.
— Anime, 726.
— Benzoës, 320.
— benzoica, 321.
— Burgundica, II. 636.
— Cachibu, 345.
— Canadensis fluida, 1.
— Carannae, 411.
— Cayennensis, II. 444.
— Chinae, 486.
— communis, II. 636.
— Copahu, 303.
— Copaiferae officinalis, 303.
— copallina, 569.
— Corticis Peruviani, 486.
— elastica, II. 444.
— Elemi, 620.
— flava, II. 636.
— Galbani, 356.
— Gialappae, II. 27.
— Gnidii viridis, 604.
— de Gomart, 345.
— Guajaci nativa, 708.
— Hederae, 724.
— Jalapae s. Jalappae, II. 27.
— — praeparata, II. 28
— Jalappae, II. 27.
— — praeparata, II. 28.
— Juniperi, II. 511.
— Kikekunemalo, II. 44
— Laccae in ramulis — Lacca.
— Laricis liquida, II. 617.
— Lentisci, II. 103.
— Ligni Guajaci, 708.
— liquida — Terebinth. Veneta.
— Mastichis, II. 103.
— Meccanensis fluida, 397.
— — liquida, 397
— nigra, II. 329. 636.
— Novae Hispanicae liquida, 398.
— Oleae, II. 243.
— Pini Abietis, 1.
— — balsameae liquida, 1.
Resina Pini empyreuma liquidi, II. 330.
— — — solida, II. 636.
— — fusa — Colophonium
— Quinquinae, 486.
— Sanguinis Draconis, II. 511.
— Scammonii, II. 528.
— Styrax, II. 502.
— Succini, II. 598
— — balsamica, II. 599.
Resino-extractivum Chinae, 468.
Resta Bovis, II. 244. 245.
Rhabarbarina s. Rhabarbarinum, II. 447.
Rhabarbarum s. Rheum, II. 446.
— album, II. 105.
— Britannicum, II. 446.
— Bucharicum, II. 446.
— Chinense, II. 446.
— Danicum, II. 446.
— Europaeum, II. 446.
— Gallicum, II. 446.
— Indicum, II. 105. 446.
— Monachorum, II. 447.
— Moscoviticum, II. 446.
— nigrum, II. 22.
— nostras, II. 446.
— officinale, II. 446.
— pauperum, II. 647.
— Rhaponticum, II. 446.
— Russicum, II. 446.
— Sinense, II. 446.
— spurium, II. 447.
— Tartaricum, II. 446.
— tostum, 447.
— verum, II. 446.
Rhamnina s. Rhamninum, II. 445.
Rhamnium, II. 445.
Rhamnus, II. 444.
— catharticus, II. 444.
— Frangula, II. 444.
— Jujuba, II. 47.
— Zizyphus — Zizyph. sat.
Rhaponticinum, 445.
Rhaponticum, II. 445. 589.
— verum, II. 446.
Rheinum — Rhabarbarinum.
Rheum, II. 446.
— compactum, II. 446.
— officinale, II. 446.
— palmatum, II. 446.
— Rhabarbarum — Rh. undulat.
— Rhaponticum, II. 445.
— spurium, II. 447.
— undulatum, II. 446.
— verum, II. 446
Rheuminum, II. 447.
Rhinoceros Indicus, 364.
Rhinocerotis cornu, 364.
Rhodia, II. 546.
Rhododaphne, II. 835.
Rhododendron Chrysanthum, II. 459.
— maximum, II. Add.
Rhodomel, II. 470.
Rhodosaccharum, II. 468.
Rhoeas, II. 306.
Rhus Cotinus, II. 460.
— copallinum, 569.
— Coriaria, II. 460.
— glabrum — Rh. Toxic.
— radicans, II. 460.
— Toxicodendron, II. 460.
Ribes Grossularia, II. 461.
— nigrum, II. 461.
— rubrum, II. 461.
— Uva crispa, II. 461.
Richardsonia Brasiliensis, II. 11.
Ricinus, II. 463.
— communis, II. 463
— major, II. 239.
— undulatus — R. comm.
Rob Acaciae German. Fruct. II. 424.
Rob antisyphiliticum, 490. II. 520. 522.
— Berberum, 326.
— Cerasorum, 451.
— Citri Medicae, 540.
— Cydoniorum, 597.
— Cynosbatos, II. 467.
— Dauci, 607.
— — Carotae, 607.
— — crudus, 607.
— — depuratum, 607.
— Diacaryi Galeni, II. 33.
— Ebuli, II. 508.
— Fragariae, 672.
— Jugland. reg. Nuc., II. 33.
— Juniperi, II. 39.
— — Baccarum, II. 39.
— — — communis, II. 39.
— de Laffecteur, 420.
— Mororum, II. 216
— Myrtillorum, II. 662.
— Nucum, II. 33.
— Oxycoccos, II. 662.
— Prunorum, II. 424.
— Ribesiorum, II. 462.
— — nigrorum, II. 461.
— Ribium, II. 462.
— Rosae caninae fructus, II. 467.
— — Gallicae, II. 467.
— Rubi Idaei, II. 488.
— Sambuci, II. 508.
— — crudum, II. 507.
— — depuratum, II. 508.
— Sorbi, II. 588.
— Spinae cervinae, II. 446.
— tonicum et antiperiodicum, 480.
— Uvarum, II. 680.
— Vaccinii Myrtilli, II. 662.
— — Oxycocci, II. 662.
— Vitis Idaeae, II. 662.
Robinia Pseudo-Acacia, II. 465.
Roccella, II. 672.
— tinctoria, II. 672.
Roob s. Rob.
Rorella, 618.
Rosa alba, II. 465.
— canina, 319. II. 465.
— Centifolia, II. 465.
— Damascena, II. 10.
— Gallica, II. 465.
— incarnata, II. 465.
— mineralis, II. 191.
— moschata, II. 465.
— pallida, II. 465.
— rubra, II. 465.
— — vulgaris, II. 465.
— sylvestris, II. 465.
Rosae benedictae flores, II. 301.
— regiae flores, II. 301.
Rosago, II. 235.
Rosaria, 546.
Rosmarinus, II. 477.
— hortensis, II. 477.
— officinalis, II. 477.
— Stoechadis facie, II. 644.
— sylvestris, II. 62.
Ros Solis, 618.
— Chinae, 503.
— Vitrioli, 53.
Rotulae anthelminticae, II. 174.
— Berberum, 326.
— Citri, 540.
— diacreos, II. 20.
— Manus Christi, II. 495.
— Menthae piperitae, II. 117.
— pectorales, II. 602.
— contra vermes, II. 139.
— vermifugae, II. 160.
Rubetae terrestres majores, 681.
Rubia major, II. 485.
— Munjista, II. 485.
— sativa, II. 485.

Rubia tinctoria, II. 487.
— tinctorum, II. 487.
Rubigo, 643.
— Ferri, 643.
— — praeparata, 643.
Rubinus, 131.
Rubrica fabrilis, 131.
Rubrum Anglicanum, 641.
— cinchonicum, 474.
— montanum, 641.
Rubus arcticus, II. 487.
— Chamaemorus, II. 487.
— fruticosus, II. 487.
— Idaeus, II. 487.
— niger, II. 487.
— trivialis, II. 487.
— villosus, II. 487.
Rumex Acetosa, 15.
— acutifolius, II. 489.
— acutus, II. 489.
— alpinus, II. 447.
— aquaticus, II. 489.
— Britannica, II. 489.
— crispus, II. 489.
— nemorosus — R. obtusif.
— obtusifolius, II. 489.
— sanguineus, II. 489.
— scutatus, 15.
Rupterium commune, II. 371.
Ruscus, II. 490.
— aculeatus, II. 490.
— Hypoglossum, II. 490.
Ruta, II. 490. 491.
— capraria, 676.
— graveolens, II. 490.
— hortensis, II. 491.
— muraria, 293.

S.

Sabadilla, II. 493.
Sabadillina s. Sabadillinum, II. 493.
Sabadillum, II. 493.
Sabina, II. 37.
Saccharum, II. 494.
— albissimum, II. 494.
— album, II. 494.
— Aluminis, II. Add.
— anthelminticum, II. 126
— aurantiacum purgans, II. 23.
— candum s. candis s. candum, II. 494.
— Chinae, 490.
— clarificatum, II. 494.
— crystallisatum, II. 494.
— — album, II. 494.
— glyzyrrhizatum, II. 78.
— hordaceum, 745.
— hordeatum, 745.
— Lactis, II. 46.
— mercuriale, II. 126.
— — compos., II. 126.
— Mercurii vermifug., II. 126.
— moscowatum, II. 494.
— Myrrhae, II. 296.
— myrrhatum, II. 226.
— nitratum, II. 396.
— officinarum, II. 494.
— perlatum, II. 467. 495.
— purgans aurant. — Pulv. Jal. comp.
— purificat., II. 494.
— purissimum, II. 494.
— Quinquinae, 490.
— ro atum, II. 466.
— rubrum — S crudum.
— Saturni, II 346.
— — depuratum, II. 347.
— saturninum, II. 346.
Sacculus aromaticus, II. 115.
— purgans, II. 550.
— resolvens, 144. 170. II. 106. 575.
Safranum, 421.
Sagapenum, II. 495.

Sagapenum depuratum, II. 295. et Add.
Sago, II. 495.
Sagu, II. 495.
Sagus farinaria, II. 496.
— genuina, II. 496.
— Rumphii, II. 496.
Sal Absinthii, II. 379.
— — citratum, II. 403.
— Aceti — Vapor aceticus.
— Acetosellae, II. 403.
— acetosum ammoniacale, 173
— — minerale, II. 585.
— Alcali volatile siccum, 160.
— Alembroth, II. 198.
— Alkali, s. S. Alcali.
— amarum crudum, II. 92.
— — depuratum, II. 92.
— Ammoniacum, 169.
— — Anglicanum, 160.
— — crudum, 169.
— — depuratum, 169.
— — fixum, 367.
— — martiale, 657.
— — nitrosum, 169.
— — purificatum, 169.
— — secretum Glauberi, 169.
— — tartareum, II. 413.
— — volatile, 160.
— Ammoniacus, 169.
— — fixus, 367.
— — volatilis, 160.
— Anglicanum, II. 92.
— — catharticum, II. 92.
— Anglicum s. Anglicus, II. 92.
— — cathart. depuratum, II. 92.
— Armoniacum, 169.
— Benzoës acidum, 24.
— — essentiale, 24.
— — volatile, 24.
— Boracis acidum, 26.
— — volatile, 26.
— Cardui benedicti, II. 379.
— catharticum, II. 583.
— — amarum, II. 92.
— Centaurii minoris, II. 379.
— Chalybis, 648.
— Chinae essentiale, 485.
— Cinerum clavellat depurat., II. 378.
— commune s. communis, II. 575.
— — depuratum, II. Add.
— Coralliorum, 368.
— Cornu Cervi, 162.
— — — depuratum, 162.
— — — succinatum, 179.
— — — volatile, 162.
— culinare, II. 575.
— digestivum, II. 398.
— diureticum, II. 398.
— — vegetabile, II. 404.
— diureticus, II. 398.
— — veget., II. 404.
— de duobus, II. 385.
— Ebshamense, II. 92.
— Epsomense, II. 92.
— Epsomense, II. 92.
— — depuratum, II. 92.
— essentiale Benzoës, 24.
— — Tartari, 67. II. 406.
— Fabarum stipitum, II. 379.
— febrifugum Sylvii, II. 398.
— Gemmae, II. 575.
— Glauberi, II. 583.
— Guindre, II. 584.
— Juniperi Ligni, II. 379.
— de Lagaraye, 485.
— lixiviale Tachenian., II. 379.
— Margaritarum, 368.
— marinum s. marinus, II. 575.
— — calcareum, 367.
— — Calcariae, 367.
Sal martiale Lagraeie, 649.
— Martis, 648.
— — muriaticum, 653.
— — — ammoniacale, 657.
— Matris Perlarum, 368.
— mercuriale acetosum, II. 203.
— Mercurii acetosum, II. 203.
— microcosmic. urinae, II. 386.
— mirabile Glauberi crud. et depurat., II. 583.
— — — depurat., II. 583.
— — — siccatum, II. 583.
— — perlatum, II. 582.
— Modenense artificiale, II. 94.
— muriat baroticum, 314.
— Nitri, II. 389.
— Oculorum Cancrorum, 368.
— Ononidis, II. 379.
— Opii essentiale, II. 262.
— panchrestum, II. 404.
— Plumbi, II. 346.
— polychrestum s. polychrestus Glaseri, II. 386.
— — Lemery, II. 386.
— — Parisiense, II. 386.
— — Seignette s. Seignetti, II. 412.
— — solubile, II. 412.
— polychrestus, II. 386.
— Prunellae, II. 390.
— pungens, 21.
— Rectae bovis, II. 379.
— Rupellense s. Rupellensis, II. 412.
— sapientiae, II. 198. 385.
— Saturni, II. 346.
— Scientiae, II. 198.
— sedativum s. sedativus, 26.
— — Hombergi, 26.
— — mercuriale, II. 190.
— Sedlitzense, II. 92.
— Seidlitzense, II. 92.
— Seidschützense, II. 92.
— Seignette, II. 412.
— Sennae essentiale, II. 566.
— Sodae acetatum, II. 586.
— — crudum, II. 577.
— — depuratum, II. 577. 578.
— — siccum, II. 578.
— — perfecte saturat., II. 579.
— — purissimum, II. Add.
— Succini, 52.
— — depuratum, 52.
— — essentiale, 52.
— — volatile, 52.
— Tachenianum, II. 379.
— Tamarisci, II. 379.
— Tartari, II. 378.
— — essentiale, 57. II. 406.
— — per se liquidum, II. 380.
— — perfecte saturatum, II. 384.
— — purissimum, II. Add.
— — sulphuratum, II. 386.
— — volatile, 162
— Thermarum Carolinarum, II. Add.
— Urinae fusibile, II. 386.
— — microcosmic., II. 386.
— — nativum, II. 386.
— — volatile, 162.
— urinosum purissimum, 160.
— vegetabile s. vegetabilis, II. 404.
— Vitae, II. 198.
— Vitri, II. 387.
— Vitrioli narcoticum, 26.
— volatile, 169.
— — Anglicanum, 160.
— — aromaticum, 164
— — concretum, 162.
— — Cornu Cervi, 162.

Sal volatile oleosum Angelicae, 200.
— — — Sylvii, 151.
— — Salis Ammoniaci, 180.
— — Succini, 52.
— — Tartari, 162.
— — urinae, 162.
— vomitorium Vitrioli, II. 692.
— Westendorffii, 21.
Salab, II. 495.
Salap, II. 495.
Salep, II. 495.
Salicaria, II. 497.
Salicina s. Salicinum, II. 498.
Salivalis, II. 428.
Salix alba, II. 498.
— amygdalina, II. 498.
— capraea, II. 498.
— eryocephala, II. 498.
— fragilis, II. 498.
— latifolia, II. 498.
— pentandra, II. 498.
— Russeliana — S. frag.
— vitellina, II. 498.
Salsaparilla, II. 516.
— Germanica, 420.
Salsilago ammoniacalis, 173.
— — acetosa, 173.
— Cornu Cervi succinata, 179.
— Oxytartari, II. 399.
Salsola Kali, II. 499.
— sativa — S. Soda.
— Soda, II. 499.
— Tragus, II. 499.
Salvia agrestis, II. 645.
— Horminum, II. 500.
— minor, II. 500.
— officinalis, II. 499.
— pratensis, II. 500.
— Sclarea, II. 500.
— sylvestris, II. 645.
Sambucus, II. 506.
— agrestis, II. 507.
— Canadensis, II. 507.
— Ebulus, II. 506.
— humilis, II. 507.
— nigra, II. 507.
Sampsuchum, II. 295.
Sanamunda, 702.
Sandaraca, 269 II. 511.
— Germanica, II. 511.
Sanguinalis, 450.
Sanguinaria, 450. 702. II. 648.
— Canadensis, II. 511.
— minor, II. 314.
Sanguis Caprae Ibex, 682.
— Draconis, II. 511.
— — in granis, II. 512.
— — in guttis, II. 512.
— — in lacrymis, II. 512.
— — in placentis, II. 512.
— — in tabulis, II. 512.
— Hirci, 682.
Sanguisorba, II. 323.
— officinalis, II. 323.
Sanicula alba, 609. II. 612.
— Europaea, II. 612.
Santolina s. Santalinum, II. 513.
Santalum album, II. 513.
— citrinum, II. 513.
— rubrum, II. 512.
Santolina, II. 514.
— Chamaecyparissias, II. 514.
Santonicum, 580.
Sapa Uvarum, II. 680.
— vomitoria Sylvii, 240.
Sapo acetico-aethereus, II. 419.
— aceticus aethereus, II. 419.
— Acidi sulphurici, 55.
— acidus, 55. II. 633.
— — Achardi, 56.
— — sulphuricus, 55.
— Aetheris acetici, II. 419.
— albus, II. 413. 414.
Sapo alcalico-ammoniacalis s. ammoniatus, 156.
— Alicantinus, II. 413.
— Aloniensis, II. 413.
— ammoniacalis, 154.
— — camphoratus, 156.
— ammoniaco-camphorat., 156.
— Ammoniae, 154.
— — oleaceus, 154.
— amygdalinus, II. 414.
— animalis, II. 414.
— — aromaticus, II. 414.
— antimonialis, 232.
— Antimonii, 232.
— antiphlogisticus resolvens, II. 344.
— antisialagogus Singeri, II. 376.
— aromaticus, 156. 416.
— — pro balneis, II. 418.
— arthriticus Pottii, II. 633.
— cacaotinus, II. 414.
— calcareus, 353.
— Calcariae, 353.
— Cerae, II. 574.
— cereus, II. 574.
— chemicus Dippelii, II. 374.
— — pro usu externo, II. 634.
— chymicus, 165.
— cosmeticus, II. 415.
— domesticus, II. 413.
— durus, II. 413.
— guajacinus, 716.
— Gummi Ammoniaci, 736.
— — Gutti, 733.
— Hispanicus albus, II. 413.
— Hydrargyri, II. 206.
— Hydro-sulphureti Oxyduli Stibii sulphurati, 232.
— Jalapae s. Jalappae, II. 28.
— Jalapinus s. Jalappinus, II. 28.
— kalicus, II. 413.
— medicatus, II. 414.
— medicinalis, II. 413.
— Medullae bovinae, II. 414.
— — — ammoniacalis camphoratus, 156.
— mercurialis, II. 206.
— — Chaussieri, II. 206.
— — volatilis, II. 135.
— Mercurii, II. 206.
— mollis, II. 413.
— niger, II. 413.
— nostras, II. 413.
— Olei Crotonis, 577.
— — Terebinthinae et Potassae, II. 634.
— oleosus — S. Alicantinus.
— ex Oleo Tereb. volat. et Potassa, II. 634.
— ex Olivo et Sodae, II. 414.
— piceus, II. 413.
— Potassae tereblathinaceus, II. 634.
— sebaceus — Sapo domesticus.
— Sodae oleaceus s. oleosus — S. Alicant. et medicat.
— — sebaceus, II. 413.
— Starkeyanus, II. 634.
— stibiatus, 232.
— sulphurato-ceratus, II. 376.
— Sulphureti Sodae, II. 675.
— tartareus, II. 634.
— — Starkeyi, II. 634.
— terebinthinatus, II. 634.
— de toelette, II. 414.
— vegetabilis, 727. II. 380.
— Venetus, II. 413.
— viridis, II. 413.
— vitriariorum, II. 98.
— Wologdensis, II. 413. 414.
Saponaria officinalis, II. 514.
— rubra, II. 514.
Saponina, II. 514.
Sapota dissecta, 473.
— salicifolia, 473.
Sapphirus, 131.
Sarcocolla, II. 516.
Sarcocollinum, II. 516.
Sarsa, II. 516.
Sarsaparilla, II. 516.
Sassafras, II. 524.
Satureja, II. 526.
— capitata, II. 526.
— hortensis, II. 526.
— Thymbra, II. 526.
Saturnus, II. 233.
— phosphoratus, II. Add.
Saxifraga alba, II. 526.
— Anglicana, II. 569.
— granulata, II. 526.
— rubra, II. 689.
Scabiosa arvensis, II. 527.
— succisa, II. 527.
Scammonium, II. 527.
— Aleppense, II. 527.
— de Aleppo, II. 527.
— Americanum, II. 105.
— Halepense, II. 527.
— Monspeliacum, II. 527.
— Smyrnaeum, II. 527.
— Syriacum, II. 527.
Scandix Cerefolium — Chaerophyll. sat.
Scarabaeus unctuarius, II. 113.
Scariola, 512. II. 49.
Schoenanthus, 193.
Scilla marina, II. 681.
— maritima, II. 530.
— — exsiccata, II. 531.
— praeparata, II. 531.
— rubra, II. 531.
Scillitina, II. 531.
Scillitinum, II. 531.
Scincus, 681.
— marinus, 681.
— maximus, 681.
— officinalis, 681.
Sclarea, II. 500.
Scleroderma cervinum, 311.
Sclerotium Clavus, II. 545.
Scobs Ferri, 632.
— Ligni Sant. rubri, II. 513.
Scolopendrium, II. 544.
— officinale, II. 544.
— verum, 496.
Scoparia, 693.
Scordium, II. 645.
Scorodonia, II. 645.
Scorpio Europaeus, 682.
Scorzonera, II. 544.
— Hispanica, II. 544.
— humilis, II. 544.
— latifolia sinuata, II. 544.
Scrofularia, II. 646.
Scrophularia aquatica, II. 544.
— foetida, II. 646.
— nodosa, II. 546.
— vulgaris, II. 546.
Scutum antispasmodicum, II. 287.
— stomachicum, II. 287.
— pro umbilico, 343.
Scyphophorus cocciferus, II. 63.
— pyxidatus, II. 63.
Sebaceum Palmae, II. 843.
Sebestena, II. 231.
Sebum, 62. s. Sevum.
— ovillum, 63.
— vervecinum, 63.
Secale, II. 545.
— cereale, II. 545.
— cornutum, II. 545.
Sedum acre, II. 546.
— majus, II. 546.
— minus, II. 546.
— Rhodiola, II. 546.

Sedum Telephium, 572.
Segestria cellaria, 260.
Selinum Cervaria, II. 547.
— Galbanum — Bubon.
— Oreoselinum, II. 547.
— palustre, II. 547.
Semen Cinae, 520.
— Contra, 520.
— Cynae, 520.
— Lumbricorum, 520.
— sanctum, 520.
— Santonicum, 520
— Sinae, 520.
— contra vermes, 520
— Zedoariae, 520.
Semina frigida majora, II. Add.
— Perlarum, 358.
Semmedina, 520.
Sempervivum, II. 546.
— tectorum, II. 546.
Senecio, II. 547.
— coeruleus, 622.
— Jacobaea, II. 548.
— vulgaris, II. 547.
Senega, II. 305.
Senegina, II. 305.
Seneka, II. 305.
Senna, II. 548.
— de la Palthe, II 548.
Sepia officinalis, 358.
Sepiae os, 358.
— — praeparatum, 359.
Septemfolium, II. 651.
Septinervia, II. 331.
Sérici folliculi, II. 667.
Sericum adhaesivum, 690.
— Anglicum, 690.
— crudum, II. 667.
— tostum, 413.
Serpentaria, II. 544.
— minor, 278.
— rubra, 331.
— Virginea, 264.
— Virginiana, 264.
— Virginica, 264.
— vulgaris, 331.
Serpillum, II. 649.
Serpyllum, II. 649.
Serum, II. 667.
— Lactis, II. 667.
— — acetosum, II. 668
— — acidum, II. 668.
— — aluminatum, 141. II. 668.
— — aluminosum, 141. II. 668.
— — — cum Cinnamomo, 141.
— — antiscorbuticum, 546. II. 669. 611
— — aperitivum, II. 94.
— — chalybeatum, II. 668.
— — compositum, II. 669.
— — depuratum, II. 667.
— — dulce, II. 667.
— — — Hoffmanni, II. 667.
— — dulcificatum, II. 668.
— — Magnesiati, 736.
— — mannatum, II. 101.
— — pulveratum, II. 667.
— — cum Sinapi, II. 672.
— — sinapinum, II. 672.
— — sincerum, II. 667.
— — van Swieten, II. 412.
— — tamarindatum, II. 668. 611.
— — tamarindinatum, II. 668. 611.
— — tartarisatum, II. 668.
— — temperans, II. 611.
— — vaccinum, II. 667.
— — vinosum, II. 668.
— — Weissii, II. 669.
Sesamum, II. 569.
— orientale, II. 569.
Sesoli Cretici um, II. 569.
— Massiliense, II. 569.
— montanum, II. 569.
— pratense, II. 569.
— tortuosum, II. 569.
Sesquichloreti Ferri Liquor, 654.
Sesquichloruretum Ferri, 653.
Sevum, 62
— bovillum, 63.
— bubulum, 63.
— cervinum, 63.
— Ceti, 453.
— hircinum, 63.
— ovillum, 63.
— praeparatum, 62.
— Vervecinum, 63.
Siciliana, 757.
Sideritis hirsuta, II. 590.
Siderocyanas Ferri, 669.
Sief album, II. 317.
— — cum Opio, II. 337.
Siegesbeckia orientatis, 59.
Sigillum Salemonis, 692.
Silene, II. 569.
— Behen, 319.
— Otites, II. 569.
— Virginica, II. 569
Siler montanum, II. 62.
Silicas Aluminae et Ferri, 133.
— — et Glucini, 133.
— — et Sodae, 133
— Magnesiae, II. 98.
— Zirconii. II. 697.
Siliciphthoruretum Alumimii, 133.
Siliqua Banillae, II. 670.
— dulcis, 462.
— hirsuta, II. 593.
— Vanigliae s. Vanillae s. Vamilliae, II. 670.
Silurus Glanis, 690.
Simaroruba, II. 570.
— amara, II. 570.
Simaruba, II. 570.
— officinalis, II. 570.
Sinae, 520.
Sinapis alba, II. 570.
— nigra, II. 570.
Sinapismus fortior, II. 571.
— irritans, II. 571.
— mitior, II. 571.
— simplex, II. 571.
Sinopis, 131.
Siphonia Cahuchu, II. 444.
— elastica — Siph Cahuchu.
Sison, II. 573.
— Amomum, II. 573.
Sisymbrium Nasturtium, II. 233.
— Sophia, II. 573.
Sium Ammi, 144.
— Amomum, II. 573.
— angustifolium, II. 573.
— latifolium, II. 573.
— Ninsi, II. 574.
— nodiflorum, II. 573.
— Sisarum, II. 574.
Smaltum, 643
Smaragdus, 133.
Smilacinum, II. 516.
Smilax China, 472.
— officinalis — S. syphil.
— Sarsaparilla, II. 516.
— syphilitica, II. 516.
Smiris, 131.
Smyris, 131.
Soda, II. 577.
— acetata, II. 582.
— acetosa, II. 582.
— aërata, II. 577.
— boraxata, II. 580.
— caustica, II. 574.
— — fluida, II. 574.
— communis, II. 577.
— cretacea, II. 577.
— depurata, II. II.
Soda effervescens, II. 587.
— impura aërata, II. 577.
— muriatica, II. 575.
— nativa, II.
— phosphorata, II. 582.
— phosphorica, II 582.
— pura, II. 574.
— — liquida, II. 574.
— purificata, II. 577.
— sulphurica, II. 583.
— tartarisata s. tartarizata, II. 412.
— vitriolata, II 583.
Sodae Subcarbonas exsiccata, II. 578.
— Carbonas, II. 579.
— Murias, II. 575.
— — exsicc., II. Add.
— Phosphas, II. 582.
— Subboras, II. 580.
— Sulphas, II. 583.
— Sulphuretum, II. 674.
Sodium, II. 574.
— iodatum, II. 10.
Sol, 298.
Solamen hypochondriacorum, II. 404.
— scabiosorum, 674.
Solanina, 618. II. 586.
Solaninum, 618 II. 586.
Solanum Dulcamara, 618.
— furiosum, 295.
— lethale, 295.
— Lycopersicum, II. 586.
— maniacum, 605.
— Melongena, II. 586.
— nigrum, II. 586.
— quadrifolium, II. 314.
— scandens, 618.
— tuberosum, II. 586.
— vesicarium, 88.
Soldanella, II. 587.
Solenostemma Argel — Cynanchum.
Solidago Saracenica, II. 679.
— Virga aurea, II. 678.
Solutio Acetat. Cupri et Muriat. Ammon., 591.
— — Mercurii, II. 294.
— — Morphini, II. 215.
— — Plumbi aquosa, II. 360.
— — — crystallis. fortior, II. Add.
— — — — opiacea, II. 360.
— — plumbici, II. 349.
— — Zinci, II. 694.
— Acetitis zinzici, II. 694.
— Acidi arsenicosi et Nitratis Potass., 273.
— — muriat. oxyg. vaporif., 33.
— — nitrici vaporifera, 47.
— alexiteria, 33.
— — Ganhiana, 268.
— — oxygenata, 510.
— aluminosa, 138.
— Ammoniati subcarb. alcoholisata, 165.
— antiscorbutica, 316.
— antiscrophulosa, 316.
— antistrumalis s. antistrumosa, II. 20.
— Arseniatis Ammoniaci, 275.
— arsenicalis, 273.
— — amara, 273.
— — Borussica, 274.
— — Brerae, 273.
— — Fowleri, 273.
— — Heinii, 273.
— — Jacobi, 273.
— — simplex, 274.
— arsenicata, 273.
— Arsenici, 270.

Solutio Arsenitis kalicae . . 293.
— — Potassae, 273.
— balsamica alcalisata II. 679.
— Barytae muriaticae, 315.
— Belladonnae, 296.
— Calcariae muriaticae. 367.
— — sulphurato-stibiatae, 234.
— Calcis, 362.
— — Muriatis, 367.
— Camphorae aetherea, 376.
— — aquosa, 372.
— — oleosa, 378.
— cathaeretica, 269.
— cerata, 260.
— Chloratis Potassae, II. 397.
— Citratis kalici, II. 404.
— citro-muriatica, II. 576.
— Cohenii, II. 373.
— Coindeti, II. 20.
— Cremoris Tartari, II. 409.
— cuprata, 586.
— Cupri ammoniacalis, 695.
— — sulphurici aquosa, 580.
— cupro-arseniata, 269.
— Deutoiodureti Mercurii alcoholica, II. 188.
— — — aetherea, II. 188.
— Elaterii, II 212.
— epispastica, 241.
— evaporatoria, 77.
— excitans, II. 576.
— Extracti Nucis vomicae, II. 241.
— ferrata, 669.
— Ferri aluminosa, 650.
— — muriatici cum Baryta mur., 316.
— Ferrocyanatis Potassae, 39.
— Fowleri, 273.
— Fuliginis foetida, 287.
— gelatinosa, 684.
— Guajaci gummosa, 716.
— Gummi Guttae alkalina, 733.
— Hahnem. saponacea, II. Add.
— Heinekii, 274.
— Hepatis Sulphuris, II. 376.
— hydrargyrata, II. 186.
— Hydrarg. gummosi, II. 125.
— Hydriodatis Potassae, II. 9.
— — — iodurati, II. 10.
— Hydrochloratis Ammoniaci et Ferri, 669.
— — Zinci aetherea, II 684.
— Hydroiodatis Potassae, II 9.
— — — iodurati, II. 10.
— hypnotica, II. 254.
— lithontriptica, II. 380.
— della Lena, II. 401.
— Malatis Ferri, 661.
— Marryati, II. 179.
— mercurialis, II. 200.
— Mercurii corrosivi, II. 178
— mineralis, 273.
— — Fowleri, 273.
— Morphii acetici, II. 215.
— mucilaginosa, 728. II. 653.
— Muriatis Ammon. acetata, II. Add.
— — Barytae, 315.
— — Calcis, 367.
— — — hydrargyrata, II. 144.
— — Ferri, 654.
— — — composita, 654.
— — ferrici aetherea, 655.
— — — spirituosa, 654.
— — — spirituoso-aetherea, 655.
— — Hydrargyri oxydati, II. 200.
Solutio Muriatis Hydrargyri oxydati corrodens, II. 179.
— — — — et Ammoniae fortior, II. 200.
— — — oxygenati, II. 178.
— — — oxydati et Ammon. dilutior, II. 200.
— — Potassae oxygenati, II. 397.
— — Zinci aetherea, II. 684.
— Myrrhae, II. 229.
— — alcalisata, II. 229. 230.
— — alcoholica, II. 229.
— Nitratis Argenti, 261.
— — — fusi, 261.
— — Hydrargyri ammoniacalis, II. 198.
— — Sodae, II. 535.
— nitricata s. nitrosa, 48.
— Opii alcoholisata, II. 254.
— oxygenata Calcis, 365.
— Oxymuriatis calcici, 365.
— Pearsoni, 274.
— Plumbi in Acido acetoso, II. 340.
— Potassae, II. 370.
— — alcoholica, II. 373.
— — causticae, II. 370.
— prophylactica contra scarlatinam, 206.
— Resinae Guajaci aquosa, 716.
— resolvens Niemanni, 172.
— — Vogleri, 172.
— Rob Juniperi, II. 39.
— salina gelatinosa, II. 684.
— salino-gelatinosa, 687.
— Saponis, II. 417.
— — aetherea, II. 419
— — alcoholica, II. 417
— — — aromatica, II.
— — — — et camphorata, II. 418.
— — — camphorata, II. 418.
— — — — et opiacea. II. 419.
— Saviardi, II. 373.
— sedativa, II. 254. 284.
— ad strumam, II. 20.
— styptica Looffii, 654.
— Subacetatis Cupri et Ammoniae, 595. et Add.
— — plumbici, II. 342.
— Subcarbonatis Ammoniaci alcoholica, 148.
— — Ammoniae, 161.
— — ammonici spirit, 148
— — Potassae aquosa, II. 389.
— Sublimati, II. 178.
— — corros. alcoholica, II. 178.
— — — — opiacea, II. 185.
— — — aetherea, II. 180.
— — — aquosa, II. 177.
— Sulphatis argenti — Liq. Arg. sulph.
— — Cupri, 580.
— — — et Ammoniaci, 589.
— — — aromatisata, 586.
— — — camphorata, 586.
— — — composita, 587.
— — Potassae, II. 387.
— — Zinci, II. 690.
— — — aluminosa, II. 692.
— — — aquosa simplex, II. 690.
— — zincici, II. 691.
— Sulphureti Antimonii et Calcis, 234.
Solutio Sulphureti Potassae alcoholica, II. 377.
— Tartari depurati, II. 409.
— — solubilis, II. 405.
— — — alcoholica, II. 406.
— — — aquosa, II. 405.
— Tartratis Stib. et Potassae, 240.
— Thescheri, 164.
— Veratrini, II. 672.
— vitriolica, II. 692.
— Weikardi, II. 201.
— Zinci aluminosa, II. 692.
Sonchus asper, II. 587.
— laevis, II. 587.
— oleraceus, II. 587.
Sophia Chirurgorum, II. 573.
Sophora tinctoria, M. Add.
Sorbus, II. 587.
— aucuparia, II. 587. 588.
— domestica, II. 587.
Sotirella parva, II. 271.
Seymida, II. 608.
Sparadrap s. Sparadrapium adhaes., II. 638.
— album, II. 356.
— aromaticum, II. 224.
— e Cetaceo, 485.
— commune, II. 620.
— compositum c. emplastris, II. 366.
— ad corpus conditum involvend., II. 224.
— desiccativ. s. exsiccans, II. 338.
— cum emplastris, II. 605.
— epuloticum, II. 364.
— Goulardi, II. 346.
— ordinarium, 263.
— pallidum, II 364.
— resinosum, II. 640.
— resolvens, II. 319.
— rubrum, II. 155.
— vesicans, 408.
— viride, 693.
— vulgaris, 263.
Spartium scoparium — Genista scop.
Spathula foetida, II. 18.
Spathum s. Spatum calcareum, 366.
— ponderosum, 317.
Species adstringentes, II. 208.
— — pro gargarismate, II. 427.
— Althaeae, 119.
— — compositae, 121.
— amarae, 13. 448.
— amaricantes, 13.
— anodynae, 410. II. 309.
— anthelminticae, 13. 264.
— antihaemorrhoidales, 91.
— antinephreticae, 256.
— antipsoricae, 706.
— antiscorbuticae, II. 437. et Add.
— antispasmodicae, II. 603.
— aperitivae majores, 257.
— — minores, 257.
— — cum Rheo, 257.
— contra apoplexiam, II. 302.
— aromaticae, 380. 459. II. 57. 85. 477. 900.
— — caryophyllatae, 382.
— — — completae, 382.
— — rosatae, 380. 381.
— — — completae, 381.
— avenaceae, 301.
— bechicae, 421. 456. 630. 734. II. 35. 76. 306. 680.
— pro bromio Avenae, 301.
— de Bryonia, 330.
— carminativae, 422. 459.
— caryocostinae, II. 548.

Species ad cataplasma, 225. 290.
— pro cataplasmate emolliente, 119.
— catharticae et sudorificae, 246.
— cephalicae, 170. II. 214.
— — pro cucuphis, II. 19.
— — — epithemate, II. 58.
— — — fomentatione, II. 58.
— — — sacculo, II. 19.
— pro clysmate, 121.
— cordiales, II. 69.
— — temperatae, II 69.
— pro cucuphis, II 58.
— Decocti antinephritici, 256.
— — pro gargarismo adstring., II. 427.
— — Lignorum, 490. 716.
— — antipodagrici Viennensis, 718.
— — nephro-cathart. Borestii, 256.
— pro Decocto antiarthritico, 718.
— — — antipsorico, 256.
— — — antipodagr. Vienn., 718.
— — — Avenae, 301.
— — — carminativo, 422.
— — — demulcente, 727.
— — — Florum et Fructuum, II. 36.
— — — ad gangraenam, II. 476.
— — — infantum, II. 76. 682.
— — — Lignorum, 490. 726
— — — nigro, 678.
— — — vulnerario, II. 324.
— ad Decoctum Lignorum, 716.
— depurantes, 2.
— detergentes s. detersivae, 717.
— Diaboracis, II. 580.
— Diacinnamomi, 380. 382.
— Diacratae, 301.
— Diacreos, II. 19.
— Diajalappae, II. 22.
— Diamargaritae frigidae, II. 242.
— — calidae, II. 695.
— Diambrae, 380. 382.
— — sine odoratis, 381.
— — completae, 382.
— Dianthos, II. 477.
— Diapentes, II. 228.
— diaphoreticae, II. 507.
— Diarrhodon, II. 476.
— Diascordii, II 289.
— Diatragacanthae, II. 654.
— — frigidae, II. 654.
— Diatrion Santalon, II. 514.
— Diaturbith cum Rheo, II. 447.
— discutientes, 14.
— diureticae, 255. 256. 291. II. 316.
— emmenagogae, 396.
— emollientes, 119. 459. II. 96.
— — ad s. pro cataplasmate, II. 74.
— — ad enema, 121.
— ad enema, 121.
— pro enemate emolliente, 121.
— pro epithemate, II. 476.
— — cordis et pulsuum, II. 476.
— Extracti Nucis vom., II 241.
— ad fomentum, II. 85.

Species ad fomentum emolliens, 119.
— pro fomento emolliente, 119.
— pro fotu ad colicam, 489
— — emmenagogo, 396.
— — ad gangraenam, 14.
— — antihaemorrhoidali, II. 427.
— — laterali, II. 309.
— fotus discutientis et nervini, 170.
— fumales, 323.
— — pro suffimento, II. 244.
— ad fumigationem anticontagiosam, 57.
— pro fumigationibus, 323.
— pro fumo, 323.
— contra gangraenam, 14. II. 476.
— ad gargarisma, 121.
— pro gargarismate, 121.
— — adstringenti, II. 427.
— — emolliente, II. 96.
— de Gemmis frigidae, II. 242.
— guajacinae compositae, II. 516.
— Herbarum pro infuso analeptico, 260.
— Hierae picrae, 104.
— de Hyacintho, II. 495.
— Imperatoris, 380. 381.
— pro infuso diuretico, II. 316.
— — pectorali, 121.
— ad infusum pectorale, 121.
— lenientes, 727.
— laetificantes Alhasis, 380. 382.
— Lapid. prestpsor. frigid, II. 242.
— Lignorum, 716.
— mundificantes, 2.
— nephro-catharticae Foresti, 256.
— nervinae, 526.
— — pro cucuphis, 613.
— — externae, II. 114.
— pro odoramento, II. 18.
— odoriferae, II. 18.
— pectorales, 121, 683. II. 65. 76. 674.
— — cum Fructibus, II. 35.
— contra pleuresiam, II. 309.
— pro potu infantum, II. 76.
— purgantes, II. 549.
— resolventes, 14 459. II. 428. 485. 515.
— — externae, 14.
— contra scorbutum, II. 427.
— — sputum sanguinis, II. 208.
— sudorificae, 313. 420. II. 507.
— ad suffiendum, 323.
— pro suffitu, 323.
— pro Thea, II. 108.
— pro Tisana, 704.
— Turionum Pini comp., II. Add.
— pro vaporibus Acidi acetici, 21.
— — — — muriatici, 33.
— — — — nitrici, 47.
— — Superoxydi muriatici, 509.
— vermifugae, 13.
— viscerales pro clysmate s. enematibus Kaempfii, H. Add.
— vulnerariae, 448. II. 324. 500.

Specificum antatrophicum Wepferi, 673.
— antepilepticum Weismanni, 586.
— antifebrile Crollii, 392.
— cephalicum, II. 268.
— Cranii, 212.
— Genevense, II. 208.
— jalapinum, II. 22.
— Paracelsi, II. 385.
— stomachicum Poterii, 215.
— Tartari pharyngicum, 136.
— de Zobel, 136.
Specilla cerea, II. 353.
Sperma Ceti, 462.
— Mesuarii, II. 209.
— Ranarum, 667.
Spermiola Crollii, II. 209.
Sphaera marina, II. 322.
— thalassia, II. 322.
Sphaerococcus Helminthochorton — Gigartina.
Sphondylium, 333.
Spica, II. 57.
— alpina, II. 233.
— Celtica, II. 233.
— Indica, II. 233.
— Nardus, II. 233.
Spigelia anthelmia, II. 588.
— Marylandica, II. 588.
Spilanthus, II. 234.
— Acmella, 69.
— oleracea, II. 234.
Spina alba, 417. 418. II. 207.
— cervina, II. 444.
— domestica, II. 444.
Spinachia, II. 589.
Spinacia, II. 589.
— oleracea, II. 589.
Spinae dorsi Mustelae Piscis, 364.
— Viperae, 681.
— Vulpis, 681.
Spiraea Filipendula, II. 589.
— trifoliata — Gillenia trifoliata.
— Ulmaria, II. 589.
Spiritus Absinthii, 5.
— Abietis, 2.
— Aceti, 17.
— acetico-aethereus, II. Add.
— Aeruginis, 19.
— aethereus nitrosus, 71.
— — vitriolatus, 76.
— Aetheris aromaticus, 395.
— — ferratus, 656.
— — nitratus, 71.
— — nitrici, 72.
— — nitrosi, 71.
— — sulphurici, 75.
— — — comp., 76.
— — vitriolici, 75.
— — compositus, 76.
— Alcali volatilis, 148.
— alexiterius, 388.
— Aluminis, 53.
— ammoniacalis terebinthinatus, 150.
— ammoniacatus, II. 257.
— Ammoniae, 148.
— — anisatus, 149.
— — aromaticus, 152.
— — compositus, 151.
— — foetidus, 286.
— — succinatus, 158.
— — cum Succino, 158.
— ammoniato-anisatus, 149.
— Angelicae, 199.
— — compositus, 199. 200.
— — — camphoratus, 199.
— Anhaltinus, II. 629.
— Anisi, 210.
— — compositus, 210.
— Anthos, II. 483.
— antihystericus, 285. 434.

Spiritus anticoscorbicus, II. 438.
— anticorbut. Drawitzii, 549.
— aperitivus Rencti, II. Add.
— Armoraciae, II 438.
— — compos., II. 438.
— aromaticus, 388. II. 210. 210. 484. 649.
— — acetosus, II. 59.
— — acidus, II. 210.
— — ammoniacalis, 141.
— — camphoratus, 190.
— arthriticus Pottii, II. 633.
— Aurantiorum abstractitius, 528.
— — Corticum, 526.
— Balsami Copaivae, 304.
— — Peruviani, 308.
— balsamicus, II. 630.
— Beguini, 172.
— bezoardicus Bussii, 180.
— Bryoniae albae compositus, 435.
— caeruleus, 396.
— Camphorae, 376.
— camphorato-crocatus, 376.
— camphoratus, 376.
— Cantharidum ammoniacalis, 150.
— Carl Carvi, 422.
— carminativus, II. 484.
— — Sylvii, 200.
— Carvi, 483.
— Caryophyllor. aromatico-tartar, 425.
— Castorei compositus, 434.
— Cerusorum nigrorum, 452.
— Cinnamomi, 389.
— Citri Corticis, 526.
— Cochleariae, 547.
— — compositus, 548.
— Convallariae, 566.
— Corau Cervi, 102. 163.
— — — rectificatus, 163.
— — — succinatus, 179.
— — — vinosus, 148.
— Cortic. Aurantiorum, 528.
— Crocei, 374.
— Diatrion, II. Add.
— Eboris, 163.
— Foeniculi alcalinus, 196.
— Formicarum, 19. 672.
— Frumenti, 82.
— — concentratissimus, 85.
— — concentratus, 85
— — depuratus, 82. Alcoh. dilut.
— — dilutus, 85.
— — rectificatus, 85.
— Fuliginis, 19. 673.
— fumans Beguini, 172.
— Fumariae, 675.
— Jasmini, II. 32.
— Juniperi, II. 41.
— — compositus, II. 42.
— Lauro-Cerasi, 39
— Lavandulae s. Lavendulae, II. 60.
— — ammoniacalis, II. 61.
— — compositus, II. 60.
— Ligni Guajaci, 708.
— Liliorum Convallium, 566.
— Lumbricorum, 162.
— — vinosus, 149.
— Mastiches compos., II. 204.
— mastichinus, II. 204.
— Mastichis, II. 204.
— matricalis, II. 204.
— Melissae, II. 120.
— — compositus, II. 120.
— — magistralis officin., II. 110.
— Mellis Andernaci, 249.
— Menthae crispae, piperitae et viridis, II. 120, 120.
— — saccharatus, II. 120.
— Millefolii, II. 220.
— — acetatus, II. 220.
— Mindereri, 173. 174.
— muriatico-aethereus, 70.
— Myristicae s. Myristicae moschatae s. aromaticae, II. 223.
— Myrti Pimentae, II. 327.
— nervinus Riemeri, 166.
— Nasturtii aquatici, II. 231.
— Nitri, 45.
— — acidus, 45.
— — dulcis, 72.
— — fumans, 46.
— — — Glauberi, 46.
— — — Glauberianus, 46.
— — tenuior, 47.
— — tenuis, 47.
— nitrico-aethereus, 71.
— Nucis moschatae, II. 223.
— — — compos., II. 223.
— Olei Terebinth aethereus, II. 627.
— oleosus aromat Sylvii, 191.
— ophthalmicus Himlyi, 309.
— — Mindereri, 173.
— Oryzae, 81.
— Panis, II. 306.
— Pimentae s. Pimento, II. 327.
— potassatus, II. 393.
— Pulegii, II. 425.
— purgans, II. 39.
— Pyrethri, II. 430.
— — compos., II. 430.
— Raphani compos., 548.
— — rusticani, II. 438.
— rectificatus, 82.
— resolvens, II. 617.
— — Schmuckeri, 172.
— Ribium nigror., II. 462.
— Rorismarini, II. 489.
— — acetatus, II. 210.
— — compositus, II. 210.
— — officinalis, II. 483.
— Rosarum, II. 473.
— Sabinae, II. 42.
— Sacchari, 81.
— salinus aromaticus, 152.
— Salis, 31.
— — acidus, 31.
— — Ammoniaci per Alcali fixum, 161.
— — — anisatus, 149.
— — — aquos., 144. 161.
— — — c. Calce viva parat., 144.
— — — causticus, 144.
— — — cum Cinerib. clavell., 161.
— — — dulcificatus, 148.
— — — dulcis, 148.
— — — foeniculatus, 149. et Add.
— — — lactescens, 158.
— — — lacteus, 158.
— — — per Sal Tartari, 161.
— — — simplex, 161.
— — — succinatus, 158.
— — — cum Succino, 158.
— — — sulphurat., 172.
— — — tartarisat., 161.
— — — uvinosus, 144.
— — — vinosus, 148.
— — — volatilis, 144.
— — Armoniaci anisat. 149.
— — dephlogisticatus, 509. 510.
— — Dubois, 72.
— — dulcis, 70.
— — fumans, 31.
— — marini, 31.
— — — coagulat., II. 398.
— — — dephlogist., 509. 510.
Spiritus Salis terebinthinatus, II. 633.
— — volatilis oleos. Sylvii., 191.
— Salviae, II. 502.
— Sambuci, II. 512.
— saponaceus, II. 417.
— saponatus, II. 417.
— Saponis, II 417.
— — compositus, II. 694.
— Saturni, 20.
— Serpylli, II. 649.
— suaveolens pro suffitu, 337.
— Succinatis Ammoniatus. 179.
— — ammoniaci, 179
— sulphureo-aethereus, 75.
— — -vinosus, 75.
— sulphurico-aethereus, 75.
— — — camphoratus, 376.
— — — ferruginosus, 656.
— — — martiat., 655.
— Sulphuris, 56.
— — Beguini, 172.
— — per campanam, 56.
— — volatilis, 53. 172.
— Tartari, II. Add.
— — rectificatus, II. Add.
— — simplex, II. Add.
— — vitriolatus, II. Add.
— tenuior 82.
— Terebinthinae, II. 627.
— theriacalis, II. 287.
— — camphoratus s. cum Camphora, 200.
— — non camphoratus, 200.
— — correctus, 200.
— — simplex, 200.
— Thymi, II. 649.
— traumaticus, II. 303.
— de tribus, II. Add.
— Trifolii fibrini, II. 649.
— Ungulae Alcis, 163.
— Valerianae compositus, II. 670.
— Vandilae, II. 671.
— Vini, 81. 85.
— — absolutus, 84.
— — alcoholisatus, 83.
— — alkalisatus, 84.
— — ammoniacosus, 172.
— — camphoratus, 376.
— — crocatus, 376.
— — communis, 83.
— — concentratissimus, 83
— — dephlegmatissimus, 84. 85.
— — depuratus, 83.
— — fortior, 82.
— — Gallici, 81. et Add.
— — rectificatissimus, 82. 83. 84. 85.
— — rectificatus, 81. 82. 83. 84. 85.
— — tartarisatus, 84.
— — tenuior, 82.
— — tenuis, 84. 85.
— vinosus camphoratus, 376.
— — Frumenti, 82.
— — rectificatus, 82.
— — tenuior, 82.
— Viperarum, 165.
— Viridis Aeris et Veneris, 89.
— Vitrioli, 53.
— — acidus, 52.
— — coagulat. Mynsichti, II. 395.
— — dulcis, 75.
— — phlogisticatus, 56.
— — tenuis, 53.
— — volatilis,
— — — causticus, 144.
— — — foetidus, 285.

Spiritus vulnerarius, II. 320.
— — acidus, II. 210.
Spodium, 365.
Spongia calcinata, 412.
— cerata, II. 590.
— Cynosbati, 319.
— lacinulosa, II. 590.
— marina, II. 589.
— maritima, II. 589.
— officinalis, II. 590.
— — cerata, II. 590.
— — tosta, 412.
— praeparata, II. 590.
— — absque cera, II. 590.
— usta, 412.
Spongiae ceratae, II. 590.
— compressae, II. 590.
— officinales, II. 588.
— ustae, 412. s. libr. Spongia.
Spuma Martis, 663.
Squamae Ferri purif., 638.
Squamaria, 609.
Squilla, II. 531.
Squinanthus, 103.
Stachys recta, II. 590.
Stalagmitis cambogioides, 732.
Stannas Auri, 300.
Stanni Amalgamatis Pulvis, II. 592.
— Pulvis, II. 590.
Stannum, II. 590.
— granulatum, II. 590.
— Indicum, II. 683.
— limatum, II. 590.
— muriaticum oxydulat., II. 592.
— praeparatum, II. 590.
— — cum Sulphure, II. 592.
— pulveratum, II. 590. 592.
— raspatum, II. 590.
— suboxydatum, II. 592.
— sulphuratum, II. 592.
Staphisagria, 608.
Staphysagria, 608.
Statice Caroliniana, 320.
— Limonium, 320.
Stella Terrae, II. 95.
Stercus caninum album, 364.
— diaboli, 279.
— Gallinae, 59.
— Pavonis, 59.
Stibiis Potassae, 215.
Stibium, 211.
— oxydatum album, 216.
— — — ablutum, 216.
— — non ablut., 219.
— — fuscum, 220.
— — griseum, 213.
— — sulphurat. vitrificat., 214.
— oxydulatum, 213.
— — fuscum, 220.
— praeparatum, 221.
— purum, 211.
— striatum, 221.
— sulphurat. nigrum, 221.
— — — alcoholisatum, 221.
— — — crudum, 221.
— — — laevigatum, 221.
— — — porphyrisatum, 221.
— venale, 212.
Stillicidium aromaticum, 171.
Stipites Angelicae Saccharo conditae, 198
— Apii Saccharo cond., 255.
Stitzolobium, II. 592. 593.
— pruriens, II. 592.
Stizolobium s. Stitzolobium.
Stoechas Arabica, II. 593.
Stoechas citrina, II. 594.
— Germanica, II. 593.
— Neapolitana, II. 593.
— purpurea, II. 593.
Stomachus vitulinus exsiccat., II. Add.
Storax, II. 594.
Stramonium, 604. 605.
Strobili s. Strobuli Pini, II. 325.
— Lupuli, II. 85.
Strombus lentiginosus, 357.
Strychna, II. 594.
Strychnina, II. 594.
Strychninum, II. 594.
— nitricum, II. 595.
Strychnos colubrina, II. 595.
— Ignatia — Ignatia amara.
— Nux vomica, II. 240.
Styracinum, II. 595.
Styrax amygdaloides, II. 594.
— Balsamum, II. 594.
— Benzoin, 320.
— Calamita, II. 594.
— cannulata, II. 594.
— communis, II. 595.
— in granis, II. 594.
— granulata, II. 594.
— liquida s. liquidus, II. 595.
— Liquidambar, II. 595
— in massis, II. 594.
— officinalis s. officinale, II. 594.
— purificata, II. 594.
— Resina, II. 594.
— solidus, II. 594.
Subacetas s. Subacetis Cupri, 592. 594.
— — impurus, 592.
— cupricus, 592. 594.
— Deutoxydi Cupri, 591.
— Plumbi, II. 336. 340.
— — liquidus, II. 340.
— — Protoxydi, II. 340.
— — — dilutus, II. 342.
— — — liquidus, II. 340.
Subbisulphuretum Stibii, 229.
Subboras natricum, II. 580.
— Sodae, II. 580.
— Sodii Protoxydi, II. 580.
Subcarbonas ammonicum empyreumaticum, 162.
— Ammoniaci oleosus concretus, 162.
— — liquidus, 163.
— ammoniacus, 159.
— Ammoniae, 159.
— — animale, 162.
— — liquidum s. liquidus, 160.
— — oleosus concentratus, 162.
— — pyro animale, 162.
— — — liquidum, 163.
— — — pyro-oleosum s. pyro-oleosus, 162.
— — — liquidus, 163.
— Barii Protoxydi, 317.
— Barytae, 317.
— bismuthicum, 329.
— Calcariae cretaceum s. cretaceus, 366.
— Calcii Protoxydi, 366.
— Calcis, 356.
— — praeparatus, 359.
— Ferri, 643.
— — Tritoxydi, 643.
— ferrosum ferricum, 643.
— kalicum depuratum, II. 378.
— — impurum, II. 377.
— Magnesiae, II. 88.
— natricum, II. 577.
— Plumbi, II. 330.
— — Protoxydi, II. 336.
— Potassae crudus, II. 377.
Subcarbonas Potassae impurum s. impurus, II. 377.
— — ex Tart. comb., II. 378.
— — liquidus, II. 380.
— — purus, II. 378.
— Potassii Protoxydi, II. 377.
— Sodae, II. 577.
— — exsiccata, II. 578.
— — impurus s. impura, II. 577.
— Sodii Protoxydi, II. 577.
Subchloras Calcis, 356.
Subchloruretum Antimonii, 235.
— Calcis liquidum, 356.
— Sodae liquidum, II. 577.
Subdeutoacetas Cupri, 592.
— — et Ammoniac., 595.
Subdeutocarbonas Cupri, 584.
— Potassii, II. 378.
— Sodii, II. 577.
— — impurum, II. 577.
Subdeutonitras Cupri et Ammoniaci, 589.
Subdeutosulphas ammoniaco-mercurialis, II. 192.
— Cupri et Ammon., 588.
— Hydrargyri, II. 191.
— Mercurii, II. 191.
Subdeutotartras Potassii et Stibii, 236.
Subdeutoxysulphuretum Antimonii, 223.
Suber, II. 433.
Suberina, II. 433.
Subhydrochloras Antimonii, 235.
Sublimatus corrosivus, II. 175.
— dulcis, II. 156.
Submurias ammoniaco-hydrargyricus, II. 199.
— Antimonii, 235.
— Hydrargyri, II. 155.
— — ammoniatus, II. 199.
— — Mercurii, II. 156.
— — mitis, II. 155.
— — praecipitatus, II. 155. 199.
— — sublimatus, II. 156.
Subnitras Bismuthi, 329.
— bismuthicum s. bismuthicus, 329.
Suboxydum Plumbi, II. 334.
— Stanni, II. 592.
Subphosphas Calcariae s. Calcis, 363.
— Calcii Protoxydi, 363.
— Sodae, II. 582.
— Sodii, II. 582.
— — Protoxydi, II. 582.
Subphosphuretum Calcis, 354.
Subprotoacetas Plumbi, II. 339.
Subprotoboras Sodii, II. 580.
Subprotocarbonas Barii, 317.
— Bismuthi, 329.
— Calcii, 366.
— Plumbi, II. 337.
— Potassii, II. 377.
— Sodii, II. 577.
Subprotohydrosulphas Antimonii, 223.
Subprotonitras Bismuthi, 329.
— Hydrargyri et Ammoniae, II. 192.
— Mercurii, II. 192.
Subprotophosphas Calcii, 363.
— Sodii, II. 582.
Subprotosulphas Plumbi, II. 339.
— Potassii, II. 388.
Subsulfas Cupri et Ammonii, 588.
— Hydrargyri peroxydati, II. 191.
— Stibii loti, 221.
Subsulphas ammonio-cupricum, 588.
— Antimonii, 214.

Subsulphas Cupri et Ammoniae, 588.
— Deutoxydi Cupri et Ammoniaci, 588.
— — Ferri et Ammoniae, 588.
— Hydrargyri peroxydati, II. 291.
— — flavus, II. 191.
— Potassae, II. 388.
— Stibii loti, 321.
Subtritocarbonas Ferri, 643.
Succinas Ammoniaci, 179.
— Ammoniae, 179.
— — liquidus, 179.
— — pyro-animale liquidum, 179.
— — pyro-oleoso-aquosum, 179.
— — solutus, 179.
Succinum, II. 596.
— album, II. 596.
— citrinum, II. 596.
— oxygenatum, II. 599.
— praeparatum, II. 597.
— raspatum, II. 596.
Succisa, II. 527.
Succolata alba, II. 497.
— antivenerea, II. 180.
— Castanae, 432.
— Lichenis Islandici, II. 65.
— mediea s. simplex, 346.
— purgans, II. 171.
— Vanillae odore, 346.
Succus Aceriae Germanicae inspissatus, 15.
— — nostratis, 15.
— Acetosae, 10.
— Acetosellae, 17.
— Aconiti inspissatus, 60.
— Agrestae, II. 680.
— antiscorbuticus, 546.
— Armoraciae compositus, II. 438.
— Aurantiorum, 526.
— e Baccis Myrtillorum, II. 602.
— Beccabungae, II. 674.
— Belladonnae inspissat., 296.
— Berberum, 326.
— Boraginis, 332.
— Bryoniae, 335.
— Buglossi, 192.
— Carotae, 607.
— Centaurii minoris, 447.
— Cerasorum, 451.
— Cerefolii, 467.
— Cichorii, 512.
— Cicutae, 515.
— — inspissatus, 515.
— Citreorum, 540.
— Citri, 540.
— Cochlearine, 546.
— — compositus, 546.
— Colchici macul., inspiss., 515.
— Consolidae, 562.
— Cucumeris, II. Add.
— Cydoniorum, 599.
— Dauci, 607.
— inspiss. crudus, 607.
— — depurat., 607.
— diureticus, II. 438.
— domesticus, II. 445.
— Ebuli, II. 507.
— — Baccarum, II. 507.
— Elaterii, II. 214.
— Fragorum, 672.
— Fumariae, 674.
— Glycyrrhizae crudus, II. 77.
— — depurat., II. 77.
— Graminis, 704.
— Granatorum, II. 427.
— Granorum Kermes, 470.
— Hyoscyami inspissatus, 750.
— Hypocistidis, 761.
— Hyppanicus, 441.
— Juniperi inspissatus, II. 38.
— — — depuratus, II. 38.
— Kermetis, 470.
— Lactucae virosae inspiss., II. 49.
— Limonum, 540.
— Liquiritiae crudus, II. 77.
— — anisatus, II. 77.
— — Ile Bleis, II. 79.
— — depuratus, II. 77.
— — c. Gummi, II. 77.
— — gummosus, II. 77.
— Malorum fermentat. chalybeat., 660.
— Marrubii albi, II. 198.
— Millefolii, II. 208.
— Momordicae Elaterii spissat., II. 214.
— Mororum, II. 216.
— — inspissatus, II. 216.
— Myrtillorum, II. 602.
— Nasturtii aquatici, II. 234.
— Oxycocci, II. 662.
— — c. Nitrate Potassae, II. 662.
— Parietariae, II. 313.
— e Persicorum Floribus, II. 315.
— Plantaginis, II. 332.
— Pomorum, II. 668.
— Prunellae, II. 423.
— Pulmonariae, II. 426.
— Rhamni, II. 448.
— — cathartici, II. 445.
— Ribesiorum nigror., II. 461.
— Ribium, II. 462.
— Rosarum pallidarum, II. 466.
— Rubi Idaei, II. 487.
— Sambuci, II. 507. 508.
— — Baccarum, II. 507.
— — crudus, II. 507.
— — inspissatus crudus, II. 508.
— — depuratus, II. 508.
— Saponariae, II. 514.
— de Spina cervina, II. 445.
— Spinae cervinae, II. 445.
— Stramonii spissat., 606.
— — concretus, 606.
— Taraxaci, II. 615.
— temperans et diureticus, 457.
— Thebaicus, II. 246.
— Trifolii fibrini, II. 636.
— — — contextus, II. 636.
— Tussilaginis, II. 660.
— Tritici repentis, 705.
— Vaccinii Oxycocci c. Nitrate Potassae, II. 662.
— Verbenicae, II. 674.
— Violarum, II. 677.
Suffitus chlorini, 509.
— oxymuriaticus, 509.
Sulphas acidulum Aluminae, 134.
— acidulus Aluminae et Lixiviae, 134.
— Aluminae, 134.
— — acetatum, 136.
— — acidulum, 134.
— — exsiccatum, 134.
— — fusum, 134.
— — et Lixiviae acidulus, 134.
— — et Potassae acidulum s. acidulus, 134.
— — — — — ustus, 134.
— — — acidum s. acidus, 134.
— aluminico-kalicus, 134.
— Aquae, 134.
— — ammoniacus c. Aqua, 134.
— Ammoniacae, 169.
— — cupratum, 588.
— Argenti, 262.
— — liquidum, 263.
— Barytae, 317.
— — nativus, 317.
— baryticus nativus, 317.
— Cadmii, II. Add.
— calcicum, 366.
— Calcii Protoxydi, 366.
— Calcis, 366.
— Chinini, 508. 518.
— cinchonicus, 523.
— Cinchonini, 523.
— Cupri, 588.
— — acidus, 588.
— — aluminosus, 587.
— — — et Ammoniae s. Ammoniaci, II. 388.
— — ammoniacalis, 588.
— cupricus, 588.
— — c. Aqua, 588.
— Cupri Deutoxydi acri, 588.
— cupro-Ammoniacalis, 588.
— Ferri, 643.
— — albidus, 643.
— — — et Ammoniae s. Ammoniaci, 644.
— — Deutoxydi, 648.
— — Oxydi, 648.
— — Protoxydi, 648.
— — viridis, 648.
— fermentat. Aquae pluv., 643.
— Hydrargyri, II. 191.
— — basicus, II. 191.
— hydrargyricum cum excessu Oxydi, II. 191.
— Kalii, II. 388.
— kalico-aluminicus, 134.
— kalicus crudus, II. 388.
— — depuratus, II. 388.
— Lixiviae, 511.
— Magnesiae, II. 92.
— — depuratus, II. 92.
— — gummosus, II. 92.
— — purus, II. 92.
— — et Sodae, II. 92.
— magnesicum cum Aqua crudus, II. 92.
— — — depuratum, II. 92.
— Magnesii Protoxydi, II. 92.
— Mercurii, II. 191.
— — Deutoxydi, II. 192.
— — oxydulati, II. 191.
— — et Morphinae s. Morphinii, II. 192.
— — Protoxydi, II. 192.
— Nickelicum nativum, II. 683.
— — nativum Aquae crudus, II. 683.
— — — depuratus, I. 583.
— — — depuratus, II. 583.
— Oxyduli Ferri, 648.
— Pigmenti Indici liquid., II. 1.
— Potassae, II. 388.
— — acidus, II. 388.
— — Indici, II. 388.
— — depuratus, II. 388.
— — ferruginosus, 649.
— — Protoxydi, II. 192.
— — cum Sulphure, II. 386.
— Potassii, II. 388.
— — Protoxydi, II. 386.

Sulphas quinicus, 396.
— Sodae, II. 583.
— — acidulum s. acidum, II. 583.
— — acidum s. acidus, II. 583.
— — et Magnesiae, II. 585.
— Sodii Protoxydi II 583
— super-ammoniaco-cupreus, 588.
— — — cupricus, 588.
— triammoniaco-cupricus, 588.
— Zinci, II. 690.
— — purus, II. 690.
— zincicum s. zincicus, II. 690.
— — venalis, II. 690.
— zinxicus c. Aqua, II. 690.
Sulphis s. Sulphites Potassae, II. 389.
— — sulphuratus, II. 389.
— sulphurat. Potassae et Mercurii, II. 498.
Sulphites Sodae, II. 585.
— — sulphuratus, II. 585.
Sulphur, II. 509
— antimonialium fuscum, 223. 233.
— — rubrum, 223.
— — praecipitatum, 223.
— — tartarisatum, 223.
— Antimonii, 229.
— — auratum, 229.
— — — liquidum, 233.
— — hydrogenatum, 229.
— — praecipitatum, 229.
— — saponatum, 232.
— auratum Antimonii, 229.
— — — liquid., 233.
— in bacillis, II 600.
— cabellinum — S. impurum.
— citrinum II. 600.
— Cupri, 583.
— depuratum, II 600.
— griseum — S. imparam.
— lotum, II. 600.
— Lycopodii, II. 87.
— praecipitatum, II. 600.
— rubeum, 223
— stibiatum, 243.
— — aurantiacum, 229.
— — rubeum, 229.
— — rubrum, 229.
— — rufum, 229.
— sublimatum, II. 600.
— — lotum, II. 600.
— vegetabile., II. 87.
Sulphuretum Ammoniacae, 172.
— — hydrogenatum, 172.
— Ammoniae, 172.
— Antimonii, 221.
— — et Calcis, 234.
— — nativum, 221.
— — nigrum, 221.
— — et Potassae, 235.
— — praecipitatum, 229.
— — praeparatum, 221.
— Arsenici, 269.
— — flavum, 269.
— — rubrum, 269.
— Barii, 314.
— Calcariae, 364.
— — et Stibii, 234.
— Calcii c. Sulphate calcico, 364.
— — c. Sulphureto Stibii et Sulphate calcico, 234.
— Calcis, 164.
— — antimoniatum, 234.
— — et Arsenici, 270.
— — liquidum, 360.
— — stibiatum, 234.
— Ferri, 637.
Sulphuretum Ferri pulveratum, 638.
— Hydrargyri nigrum, II. 138.
— — — et Stibii, II. 140.
— — oxydulatum, II. 138.
— — rubrum, II. 252.
— — simplex, II. 138.
— — stibiatum, II. 140.
— — et Stibii, II. 140.
— — sublimatum, II. 252.
— — triturabum, II. 138.
— kalicum, 376.
— Kalii c. Sulphate kalico, II. 375.
— Lixivae s. Lixiviae, II. 374.
— Lixiviae stibiatum, 219.
— Mercurii, II. 251.
— Oxyduli Stibii hydrogenatum, 229.
— Plumbi, II. 333.
— Potassae, II. 374.
— — et Ferri, 638
— — martiale, II. 376.
— — simplex, II. 376.
— Potassii Protoxydi, II. 374.
— Sodae, II. 574.
— — simplex, II. 574.
— Sodii Protoxydi, II. 574.
— Stanni, II. 592.
— Stibii, 221.
— — arsenicatum, 271.
— — hydrogenatum, 229.
— — nativum, 221.
— — nigrum, 221.
— — — crudum, 221.
— — — praeparatum, 221.
— — oxydulati, 229
— — Oxyduli hydrogenatum, 229.
— — praeparatum, 221.
— — rubeum, 223.
— — venale, 221.
— — — ablutum, 221.
— Suboxydi Antimonii hydrogenatum, 223.
— Vini. 137.
Sulphuroprunuretum Potassae hydrogenatum, 39.
Sumach, II. 460.
Superacetas Cupri impurus, 592
— Plumbi, II. 346.
Supercarbonas Calcii Protoxydi. 303.
— Potassae, II. 377.
Supercarburetum Ferri, 637.
Superdeutosulphas Cupri, 584.
Superhydrosulphuretum Mercurii, II. 151.
Superhydrosulpharo-Superhyposulfites Oxydi Antimonii, 229.
Supermuriae Hydrargyri, II. 175.
Superoxalas kalicum, II. 403.
— Potassae, II. 403.
— Potassii Protoxydi, II. 403.
Superoxydum manganicum, II. 96.
— Plumbi, II. 336.
— plumbicum, II. 334.
— plumbosum, II 334.
Superphosphas Calcii, 366.
— — cum Borate Sodae, II. 482.
— — boraxatus, II. 411.
Superpotocarbonas Calcii, 303.
— Ferri, 637
Superprotoxalas Potassii, II. 403.
Superproteophosphas Calcii, 366.
Superprotosulphas Sodii, II. 583.
Superstibias kalicus, 215.
Supersulphas Aluminae et Potassae, 134.
— — — exsiccatum, 134.
— — — fusus, 134.
— Argillae alcalisatum, 134.
— Oxydi Aluminii et Protoxydi Potassii, 134.
— Potassae, II. 388.
— Sodii Protoxydi, II. 583
Supersulphuretum Mercurii, II. 138.
— Potassii. II. 375
— Sodae, II. 574.
Supertartras kalicum, II. 406.
— Potassae, II. 406.
— — depuratum, II. 406.
— Potassii Protoxydi, II. 406.
Supertartris Potassae, II. 406.
Suppositorium ad alvum sollicitandum, II. 426.
— anthelminticum, 98. 102.
— antihaemorrhoidale, 413.
— commune, 269.
— emolliens, 347.
— irritans, 554.
— laxativum, II. 426.
— lenions, II. 268.
— Mellis commune, 250.
— — irritans, 554.
— roborans, II. 434.
— sedativum, II. 268.
Surinamina, 701.
Sus Scrofa, 364.
Swietenia febrifuga, II. 606.
— Mahagony, 473. II. 607.
Symphytum, 562.
— dentarium, 609.
— maculosum, II. 486.
— minimum, 320.
— officinale, 562.
— tuberosum, 562.
Symplocarpus foetidus — Dracontium.
Synopis, 131.
Syringites, 368.
Syrupus Absinthii, 6.
— — compositus, 6.
— de Absinthio, 6.
— — compositus, 6.
— Acaciarum, II. 424.
— — Florum, 424.
— Aceti, 22.
— — antimoniati, 243.
— Acetosae, 14.
— Acetosellae, 17.
— Acetositatis Citri, 542.
— Acidi acetici, 22.
— — acetosi, 22.
— — citrici, 3. 542.
— — hydrocyanici, 37.
— — phosphorici, 51.
— — sulphurici, 53.
— de Acido Tartari, 59.
— de Adianto Monspeliaco, 65.
— adstringens, II. 463.
— — Jouberti, II. 662.
— cum Aethere sulphurico paratus, 76.
— de Agrasta, II. 681.
— Agrestae, II. 681.
— alcalinus, II. 381.
— Alexantrinus, II. 473.
— Allii, 91.
— de Allio. 91.
— de Althaea, 125.
— — compositus, 126.
— Althaeae, 125.
— — compos., 126.
— — officinalis, 125.
— Ammoniaci, 709.

Syrupus Ammoniaci compos., 148.
— de Ammoniaco, 720.
— ammoniacalis, 720.
— Amomi Zingiberis, II. 696.
— Amygdalarum, 185.
— amygdalinus, 185.
— Amygdali Persicae, II. 315.
— — Florum, II. 315.
— de Amygdalis, 185.
— Amygdalium, 185.
— Anethi Foenic. comp., 256.
— anodynus, 606.
— Anthemidis, 464.
— antiarthriticus, II. 530.
— antihydropicus, II. 530.
— antiscorbuticus, II. 440.
— — compositus, II. 440.
— — Portali, II. 183.
— antiscrophulosus, 209.
— antivenereus St Ildephont, II. 180.
— aperitivus, 255.
— Apii, 255.
— de Apio, 255.
— — compositus, 255.
— Aquilegiae, 259.
— Armoraciae, II. 441.
— — compositus, II. 440.
— aromaticus, 276.
— cum Artemisia et Castoreo Lemery, 276.
— de Artemisia, 276.
— — compositus, 276.
— Artemisiae, 276.
— ad arthritidem et hydropem, II. 530.
— de Arundine, 319.
— Atriplicis Mexicanae, 470.
— Aurantii, 530.
— — Florum, 528.
— Aurantiorum, 526.
— — Corticum, 530.
— — — alcoholicus, 535.
— — — vinosus, 531.
— — e Succo, 526.
— de Aurantiis, 526.
— Auri, 208.
— — muriatico natrici, 209.
— Balsami Peruviani, 309.
— — Indici nigri, 309.
— — Tolutani, 311.
— balsamicus, 304. 309. 311.
— — pectoralis, 313.
— — de Tolu, 311.
— bechicus, II. 377.
— Belladonnae, 207.
— Belleti mercurialis, II. 196.
— Bellidis, 320.
— de Benzoë, 321.
— de Berberide, 326.
— Berberidum, 326.
— Berberum, 326.
— Betonicae, 328.
— Betulae albae, 329.
— Boraginis, 332.
— Botryos compositus, 470.
— de Boullay, 401.
— Boyleanus, 663.
— de Brassica rubra, 333.
— Bryoniae, 335.
— Buglossi, 193.
— Byzantinus Mesues, 256.
— Capilli Veneris, 65. 66. 528.
— Capillorum Veneris, 65.
— — — compos., 66.
— Capitum Papaveris, II. 311.
— Caprifolii, 411.
— cardiacus, 392.
— Cardui benedicti, 419.
— Carthami solutivus, 422.
— Caryophylli rubri, 609.
— Cascarillae, 428.
Syrupus Cassiae Sennae, II. 462.
— Catechu, 445.
— Centaurii minoris, 448.
— Cerasorum, 451.
— — acidorum, 451.
— chalybeatus, 650. 668.
— Chamaemeli, 464.
— Chamomillae, 464.
— Chenopodii, 470.
— chermesinus, 470.
— Chinae, 494.
— — compositus, 472.
— — vinosus, 499.
— Chinae chinae, 494.
— — compositus, 472.
— Chininae sulphuricae, 508.
— Chinini sulphurici, 508.
— de Cichorio, 513.
— — compositus, 513. II. 453.
— Cicutae, 515.
— Cinchonae, 494.
— — vinosus, 499.
— Cinchonini, 524.
— Cinnamomi alcoholicus, 390.
— — aquosus, 390.
— — vinosus, 392.
— Citreorum de Succo, 542.
— Citri Aurantii Corticis, 530.
— — Florum, 528.
— — Corticum Corticis amarus, 542.
— — — alcoholicus, 542.
— — — aquosus, 541.
— — — vinosus, 542.
— — aromaticus, 542.
— — medicae Succi, 542.
— — Succi, 542.
— — e toto, 541.
— de Cochlearia officinali, 546.
— Cochleariae, 546.
— — compos., 546.
— — officinalis comp., II. 440.
— Colchici, 552.
— — aceticus, 552.
— — autumnalis, 552.
— communis, II. 494.
— Consolidae majoris, 563.
— — composit., 564.
— Contrayervae, 566.
— — compos., 566.
— copaivicus, 302.
— Coralli, II. 209.
— — rubri, 369.
— Corallinae Corsicanae, 742.
— Coralliorum, 369.
— Corticis Peruviani, 495.
— Corticum Aurant., 530.
— Croci aquosus, 573.
— — vinosus, 574.
— de Cucurbita Mesues, 580.
— Cuisinieri, II. 523.
— cyanicus, 37.
— de Cydoniis, 599.
— Cydoniorum, 599.
— depurans s. depurativus, II. 523.
— depurativus Larreyi, II. 201.
— — Majaulti, 148.
— de Desessarts, II. 16.
— Diacodii, II. 311.
— Diacodion, II. 311.
— Diacodium crocatum, II. 312.
— — liquidum Montani, II. 311.
— Dianthi Caryophylli, 609.
— de Dictamno, II. 296.
— Digitalis, 614.
— — aceticus, 614.
— domesticus, II. 445.
— drasticus, II. 530.
Syrupus emeticus, [illegible]
— — Angelicae, [illegible]
— — Glauberi, [illegible]
— Emetini, 625.
— emulsivus, 185.
— Enulae, II. [illegible]
— Erysimi, 623.
— de Erysimo, 623.
— — compositus, 624.
— — Lobelii, 624.
— expectorans, II. 15.
— Farfarae, [illegible]
— Florum Aurantii, 528.
— — Naphae, 528.
— Foeniculi, Add.
— Fragorum, 672.
— de Framboesia, II. 488.
— de Fumaria, 675.
— Fumariae, 675.
— Gentianini, 700.
— Glycyrrhizae, II. 83.
— de Granatis, II. 487.
— Granatorum, [illegible]
— guajacinus, 713.
— Gummi Ammoniaci aquosus, 720.
— — [illegible], 72.
— — Acaciae, [illegible]
— — Arabici, [illegible]
— Hederae terrestris, 735.
— Helianthi Bonnet, 686.
— Hellebori nigri comp., 73.
— Helminthochorti, 744.
— Hepatis Sulphuris, II. 37.
— Hordeatus, [illegible]
— Hydriodatis Potassae iodurati, II. [illegible]
— Hydrargyri, II. 194.
— Hydrocyanatis [illegible], 3.
— Hyoscyami, [illegible]
— Hyperici, [illegible]
— hypnoticus, II. [illegible]
— Hyssopi, [illegible]
— — compositus, 761.
— — cum Scilla, 761.
— — scillitieus, 761.
— de Hyssopo, [illegible]
— incisivus, II. [illegible]
— Iodi, [illegible]
— Ipecacuanhae aquosus, II. 14.
— — alcoholicus, II. 17.
— — compositus, II. 15. 16.
— de Jalapa, II. 29.
— Jalapae aromaticus, II. 30.
— jalapinus, II. 30.
— de Jujubis, II. 36.
— Kali sulphurati, II. 37.
— Karabe, II. [illegible]
— Kermes Granorum, 470.
— kermesinus, 470.
— de Kinkina, 494.
— Kinae, [illegible]
— de Laccis, [illegible]
— Lichenis Islandici, II. 65.
— Limonis, [illegible]
— Limonum, 542.
— — compositus, 543.
— — e Succo, 542.
— Liquiritiae, II. 83.
— longae vitae, II. 121.
— Lupulini, II. 87.
— Macidis, II. 223.
— magistralis, 607.
— de Manna, II. 101.
— — laxativus, II. 101.
— e Manna c. Senna, II. 101.
— Mannae, II. 101.
— — cum Senna, II. 101.
— Marrubii, II. 103.
— de Marrubio, II. 103.
— martialis, 670.
— Mastichis, II. 104.
— mastichinus, II. 104.
— Matricariae, II. 105.
— de Meconio, II. 311.

Syrupus Melissae, II. 109.
— de Melle, 248.
— de Mentha piperita, II. 116
— Menthae, II. 115.
— — crispae, II. 115.
— — piperitae, II. 116.
— — — vinosus, II. 116.
— — piperitidis, II. 116.
— — viridis, II. 116.
— de Menyanthe, II. 656.
— — compos., II. 656.
— mercurialis, II. 121. 124.
204.
— — Chevalii, II. 180.
— — gummosi de Lagneau. II. 121.
— Mercurii, II. 124.
— — gummosus, II. 124.
— de Mercurio et Gummi, II. 124
— e Mercurio solub. Hahnem II. 124.
— Mesembryanthemi crystallini, II. 207.
— Millefolii, II. 209.
— de Millefolio, II. 209.
— Millepedum, II. 211.
— mineralis, 29.
— Mohrsea, II. 405.
— Mori nigrae, II. 217.
— de Moris, II. 217.
— Morosum, II. 217.
— Morphii acetici, II. 216.
— muriaticus, 33.
— de Musco quernei, II. 65.
— Myrtilli, II. 662.
— Myrtillorum, II. 662.
— de Myrto, II. 231.
— Naphae Florum, 528.
— de Nasturtio, II. 238.
— de Nicotiana, II. 237.
— Nicotianae, II. 237.
— Nucistae, II. 239.
— Nymphaeae, II. 242.
— — albae de Florib., II. 242.
— opiatus, II. 265.
— Opii, II. 264.
— — alcoholicus, II. 265.
— — emulsivus, II. 265.
— — succinatus, II. 266.
— — vinosus, II. 248.
— de Opio, II. 264.
— Oxycoccio Baccarum, II. 662.
— ex Oxydulo Hydrargyri Hahnem., 124.
— Paeoniae, II. 301.
— de Papavere albo, II. 311.
— Papaveris albi, II. 311.
— — anisatus, II. 312.
— — de capitibus, II. 311.
— — crocatus, II. 312.
— — erratici, II. 308.
— — Rhoeadis, II. 308.
— — Rhoeados, II. 308.
— — rubri, II. 308.
— — somniferi, II. 311.
— paralyseos Florum, II. 422
— pectoralis, 470. II. 265. 543.
675.
— — Anglicus, II. 312.
— — de Courti, II. 15.
— — leniens, 461.
— — Maloeti, II. 266.
— Persicae Foliorum, II. 315.
— Persicorum Florum, II. 316.
— ad pertussim, 491. 564.
— Peucedani, II. 317.
— Plantaginis, II. 332.
— — majoris, II. 332.
— Polygalae Virginianae, II. 366.
— de Pomis comp., II. 561.
Syrupus de Pomis comp. solutivus, II. 561.
— Pomorum helleboratus, 730.
— — compositus, II. 561.
— — redolentium, II. 368.
— — solutivus, II. 561.
— Prassii albi, II. 103.
— Primulae Veris, II. 422.
— prophylacticus, II. 121.
— Prunellae, II. 423.
— Psychotriae emeticae, II. 17.
— e Pulmonibus vitulinis, 685.
— purificans amarus, II. 441.
— e Quinque Radicibus, 255.
— Radicum quinque aperientium, 255.
— Raphani rusticani, II. 441.
— regius, II. 473.
— resolvens. 245.
— Rhabarbari, II. 452.
— de Rhabarbaro, II. 452.
— cum Rhabarbaro aromat., II. 453.
— Rhamni, II. 446.
— — cathartici, II. 446.
— Rhei, II. 452.
— — alcalisatus, II. 456.
— — aromaticus, II. 453.
— — palmati, II. 452.
— — cum Senna, II. 561.
— cum Rheo aromat., II 453.
— de Rheo, II 452.
— — compositus, II. 453.
— Rhoeadis s. Rhoeados, II. 308.
— Ribesiae nigrae, II. 462.
— de Ribesiis, II. 462.
— Ribesiorum, II. 462.
— Ribis nigri, II. 462.
— — rubri, II. 462.
— Ribium, II. 462.
— — nigrorum, II. 462.
— Rosae, II. 469.
— — Centifoliae, II. 469.
— — Gallicae, II. 468.
— Rosarum compos., II. 470.
— — pallidarum, II. 469.
— — rubrarum, II. 468.
— — simplex, II. 470.
— — solutivus, II. 469.
— — solutivus c. Senna, II. 470.
— rosatus simplex, II. 469.
— — solutivus, II. 469.
— de Rosis pallidis, II. 469.
— — siccis, II. 468.
— Rubi acetatus, 22.
— — arctici, II. 487.
— — fruticosi, II. 488.
— — — cum Melle, II. 488.
— — Idaei, II. 487. 488.
— Sacchari, II. 494.
— — albi, II. 494.
— — rubri, II. 494.
— saccharinus c. Aqua Naphae, 528.
— Sambuci, II. 508.
— de Sarsaparilla comp., II. 523.
— — et Guajaco, II. 523.
— — et Senna comp., II. 523.
— Sarsaparillae, II. 518.
— — et Guajaci, II. 523.
— Sassafras Corticis Ligni, II. 525.
— de Scammonio, II. 530.
— scelotyrbicus Foresti, II. 234.
— de Scilla, II. 536.
— Scillae, II. 536.
— — acetosus, II. 541.
— — compositus, II. 537.
— — maritimae, II. 536.
Syrupus scilliticus, II. 536.
— Scordii, II 646.
— de Scordio, II. 646.
— sedativus, II. 265.
— Sedi majoris, II. 547.
— Sempervivi, II. 547.
— Senegae, II. 366.
— — cum Liquiritia, II. 367.
— — moschatus, II. 367.
— Sennae, II. 560.
— — compositus, II. 561.
— — rosaceus, II. 470.
— simplex, II. 494.
— Smilacis Sarsaparillae, II. 523.
— solutivus, II. 561.
— Spigeliae, II. 590.
— de Spina cervina, II 445.
— Spinae cervinae, II. 445.
— splenelicus, 256.
— Stevensii, II. 523.
— de Stoechade, II. 593.
— — compos., II. 593.
— Succi Ribis nigri, II. 462.
— — Rubi Idaei, II. 487. 488.
— sudorificus, II. 523.
— Sulphatis Chinini compos, 508.
— — Morphii, II. 214.
— sulphureticus, 173.
— de Sulphureto Potassae, II. 372.
— Sulphuris, II. 377.
— Symphyti, 563.
— e Symphyto, 563.
— — Fernelii, 564.
— Tartratis Mercurii, II. 206.
— thebaicus, II. 265.
— de Thridace, II. 51.
— Toluiferae Balsami, 311.
— Tolutanus, 311.
— de Trifolio fibrino, II. 656.
— — — compositus, II. 656.
— Tunicae, 609.
— — Florum, 609.
— Tussilaginis, 630.
— de Urtica, II. 660.
— Urticarum, II. 660.
— Uvarum, II. 680.
— Valerianae, II. 665.
— — Radicis, II. 665.
— Vanillae, II. 671.
— vermifugus, 733.
— — et purgans, II. 566.
— de Veronica, II. 675.
— Violae, II. 677.
— — odoratae, II. 677.
— Violarum, II. 677.
— — communis, II. 678.
— — Petalorum, II. 677.
— — solutivus, II. 678.
— Viperarum, 685.
— vitriolatus, 53.
— Zingiberis, II. 696.

T.

Tabacum, II. 235.
Tabellae absorbentes, II. 90.
— Acidi citrici, 31.
— — oxalici, 39.
— alimentariae, 669.
— Althaeae, 122.
— Anisi compositae, II. 80.
— antacidae, II. 9.
— anthelminticae, 649. II. 24. 138. 160. 174.
— antiacidae laxantes, II. 90.
— anticatarrhales Tronchini, 227.
— antichloroticae, 636.
— antimoniales Kunkelii, 222.
— Antimonii, 222
— antiperiodicae, 487.

Tabellae antipsoricae, II. 609.
— aphrodisiacae, II. 210.
— ad ardorem ventriculi, 362.
— aromaticae, 383.
— Balsami Tolutani, 311.
— ad bolimum, 415.
— Calabricae, II. 99.
— Carbonatis Magnesiae, II. 90.
— Castorei, 333.
— de Catechu Terra, 442.
— — et Magnesia, 443.
— — odoriferae, 443.
— Chinae, 487.
— cum Coffea Mokk., II. 10.
— desalterantes, II. 387.
— Diacarthami, II. 528.
— Diarrhodon, II. 167.
— — cum Rhabarbaro, II. 449.
— Diatragacanthae, II. 655.
— emeticae, 245.
— Glycyrrhizae comp., II. 30.
— Ferri, 635.
— Guajaci, 716.
— gummosae, II. 655.
— Iridis Florent. comp., II. 20.
— Japonicae, 606.
— kermesinae, 226.
— Kermetis, 226.
— Liquiritiae, II. 79.
— Magnesiae, II. 90.
— Manus Christi, II. 466.
— mercuriales, II. 164.
— de Mercurio, II. 164.
— au Moka, II. 10.
— cum Oculis Cancrorum, 360.
— Opii, 10. 364.
— pectorales, 227. 310. 311. 364.
— [illegible] 608.
— purgantes comp., II. 528.
— purgativae, II. 20. 171.
— [illegible] 187.
— refrigerantes, II. 306.
— restaurantes Kunkelii, 222.
— de Rheo, 449.
— rosatae, II. 166.
— Sennae et Sennae purgantes, II. 528.
— de Semine Santonico, 521.
— sulfuris, 501.
— ad sodam, 362.
— Spitzlasii, 364.
— Stibii Kunkelii, 222.
— Sulphureti Antimonii, 222.
— Sulphuris, 502.
— temperantes, II. 306. 403.
— de Terra Catechu, 442.
— de tribus, 306.
— contra vermes, 521.
— vermifugae, II. 160. 169.
— violatae s. Violarum, II. 677.
— Vitae, 222.
Tabulae antihecticae, 222.
— antichloroticae, 635.
— Ferri compositae, 635.
— instaurantes, 635.
— Kunckelii, 222.
— martiales, 635. 640.
Tacamahaca, 608.
— communis, II. 608.
— in cortice, II. 608.
— sublimis, II. 608.
— in testis, II. 608.
Taffetas Anglicum, 698.
— epispasticum Guilberti, 400.
— Resinae Guidii, 604.
— vesicans, 400.
Taffia, 81.
Talcum, II. 96.
— transparens, 366.
— Venetae, II. 96.
Talpa Europaea, 359.
Talpae combustae, 359. 413.
Talus Leporum, 363.
Tamarindi, II. 609.
Tamarindus Indica, II. 609.
Tamariscus, II. 612.
— Gallicus, II. 612.
Tamarix Gallica, II. 612.
Tamnus, f. Tamus.
Tamus, II. 612.
— communis, II. 612.
Tanacetum, II. 612. 613.
— hortense, 303.
— vulgare, II. 612.
Tapioca, II. 614.
Tapioka, II. 614.
Taraxacum, II. 615.
— Dens Leonis, II. 615.
Tartari Crystalli, II. 406.
Tartarum, II. 406.
— antimoniatum, 236.
— crudum, II. 406.
— Ferri, 663.
— solubile, II. 404.
— vitriolatum, II. 385.
Tartarus, II. 406.
— acetosus, II. 398.
— albus — T. crudus.
— ammonialis, II. 413.
— ammoniatus, II. 413.
— antimonialis, 236.
— boraxatus, II. 411.
— chalybeatus, 663.
— — solubilis, 663.
— crudus, II. 406.
— crystallisatus, II. 406.
— depuratus, II. 406.
— emeticus, 236.
— ferruginosus, 663.
— impurus, II. 406.
— martialis, 663.
— — solubilis, 663.
— martiatus, 663.
— mercurialis, II. 205.
— natronatus, II. 412.
— ruber — T. crudus.
— solubilis, II. 404.
— — ammoniacalis, II. 413.
— stibiatus, 236.
— tartarisatus, II. 404.
— vitriolatus crudus, II. 385.
— — depuratus, II. 385.
Tartras acidulus Potassae admixto Acido boracico, II. 411.
— — — purus, II. 406.
— — — venalis, II. 406.
— Ammoniacae pyro-oleoso-aquosum, 181.
— Ammoniaci, 181.
— Antimonii, 236.
— — et Potassae, 236.
— Kali, II. 404.
— kalico-ammonicus, II. 413.
— — ferricum s. kalicoferricus, 663.
— — natricus c. Aqua, II. 412.
— — natricum, II. 412.
— — stibialis, 236.
— — stibicus, 236.
— kalicus, II. 404.
— kalinum, II. 404.
— Lixivae s. Lixiviae, II. 404.
— — acidulus depuratus, II. 406.
— — — impurus, II. 406.
— — et Sodae, II. 412.
— — stibiatum s. stibiatus, 236.
— Mercurii, II. 205.
— — et Potassae, II. 205.
— — Protoxydi, II. 205.
— Oxyduli Stibii et Potassae, 236.
— Potassae, II. 404.
Tartras Potassae acidulus [illegible]
— — [illegible], II.
— — [illegible] 406.
— — — [illegible], II. 406.
— — — [illegible] praeparat., II. 407.
— — [illegible], II. 406.
— — et Ammoniaci, II. 413.
— — [illegible]
— — antimoniatum, 236.
— — boraxatum, II. 411.
— — ferrugineum, 663.
— — [illegible] 663.
— — — liquidum, 663.
— — — solidum, 663.
— — ferronatum, 663.
— — ferrugineum, 663.
— — neutralum, II. 404.
— — Oxydi Ferri, 663.
— — et Sodae, II. 412.
— — sodicum, II. 412.
— — stibiatum, 236.
— — stibiatum s. stibiatus, 236.
— — stibiosum, 236.
— Potassae Protoxydi, II. 205.
— — et Ammoniac, II. 413.
— — et Sodae, II. 412.
— — [illegible], 236.
— Sodae et Kali, II. 412.
— Stibii, 236.
— — cum Potassa s. et Potassae, 236.
— subpotassicum, II. 406.
— superpotassicum, II. 406.
Tartris Antimonii, 236.
— [illegible] Potassae et Sodae, II. 412.
— Lixiviae stibiatus, 236.
Tartris [illegible]
— Potassae, II. 404.
— — acidulus [illegible], II. 406.
— — ammoniacalis, II. 413.
— — et Sodae, II. 412.
— — stibiatus, 236.
Tecolithus, 364.
Tela araneae, II. 269.
— emplastica [illegible], II. 854.
— [illegible] Maji, [illegible]
— Gualtheri, [illegible]
— Ichthyocollae [illegible] 696.
— vulgaris, 698.
Telephium vulgare, [illegible]
Terebinthina, II. 617.
— abiegna, II. 617.
— abietina, II. 617.
— Argentoratensis, II. 617.
— Balsamea, II. 617.
— Bordolensis, II. 617.
— Burdigalensis, II. 617.
— Canadensis, [illegible]
— Chia, II. 617.
— cocta, II. 618.
— communis, II. 617.
— de Copaifu, 298.
— Cypria, II. 617.
— empyreumatica, II. 330.
— laricea, II. 617.
— laricina, II. 617.
— larigna, II. 617.
— nativa, II. 617.
— pinea, II. 617.
— Pini Laricis, II. 617.
— — sylvestris, II. 617.
— pistacina, II. 617.
— Veneta, II. 617.
Terra absorbens mineralis, II. 88.
— Aluminis, 431.
— amara, II. 88.
— — aërata, II. 88.

Terra [illegible], II. 92.
— — [illegible], II. 92.
— [illegible]
— argillacea pura, 131.
— bolaris, 131.
— — pura, 131.
— calcarata, 360.
— calcarea [illegible], 351.
— [illegible]
— foliata Mercurii, II. 203.
— — mercurialis, II. 203.
— — mineralis, II. 585.
— — Tartari, II. 398.
— — — crystallisata, II. 585.
— Japonica, 241.
— Lemnia, 131.
— [illegible]
— magnesia, II. 88.
— Ossium, [illegible]
— ponderosa acetata, 318.
— — aerata, 317.
— — carbonica, 317.
— — muriatica, 314.
— — dicta muriatica Bergmanni, 315.
— — pura, 317.
— — salita, 314.
— — vitriolata Bergmanni, 317.
— sigillata, 131.
— — alba, [illegible]
— — rubra, [illegible]
— talcosa oxysantharacoides, II. 88.
— Tripolitana, II. 650.
— Umbra, [illegible]
— viridis, [illegible]
— Vitrioli dulcis, 641. 642.
Testae Cochleae, [illegible]
— Ostrearum, 357. [illegible]
— Ovorum, 357. 359.
— — praeparatae, 359.
Testes Equi, [illegible]
Tetranthera Pichurim, 629.
Tetroxydum Manganesii, II. 98.
Teucrium Chamaedrys, II. 643.
— Chamaepitys, II. 643.
— Creticum, II. 643.
— flavum, II. 643.
— Iva, II. [illegible]
— Marum, II. 644.
— montanum, II. 644.
— Scordium, II. 645.
— Scorodonia, II. 645.
Thalictrum flavum, II. 646.
— magnum, II. 647.
Thapsia Asclepium, II. 647.
Thea amara, II. [illegible]
— Bohea, II. 647.
— bouy, II. 647.
— Chinensis, II. 647.
— haematitica, II. [illegible]
— Heysan, II. 647.
— Mexicana, II. [illegible]
— Paraguay, [illegible]
— Pekao, II. [illegible]
— perlata, II. 647.
— poudre à canon, II. 647.
— Saxo-chinoe, II. 647.
— Schulang, II. 647.
— viridis, II. 647.
Theina — Theae principium salif.
Theobroma Cacao, 345.
Theriaca, II. 278.
— Andromachi, II. 278.
— coelestis Hoffmanni, II. 492.
— Diatessaron, II. 228.
— officinalis, II. 3. 228.
— pauperum, II. 228.
Thlaspi, II. [illegible]
— arvense, II. 648.
— Bursa pastoris, II. 648.
— campestre, II. 648.
— sativum, II. 237.
Thridax, II. 60.
Thuja articulata, II. 511.
— occidentalis, 260.
Thus, II. 244.
— verum, II. 244.
Thuya, f. Thuja.
Thymelaea, 602.
Thymus Alpinus, II. 648.
— Creticus, II. 648.
— hortensis, II. 648.
— mastichina, II. 648.
— Serpyllum, II. 648.
— vulgaris, II. 648.
Tiglium, 577.
Tilia, II. 650.
Tilia, II. 650.
— Europaea, II. 650.
Tillium, 577.
Tincal, II. 580.
Tinkal, II. 580.
Tinkar, II. 580.
Tinctura Absinthii, 9.
— — alcalina, 10.
— — amara, 10.
— — aquosa, 11.
— — composita, 10.
— Acetatis Ferri, 660.
— — — alcoholica, 660.
— — Zinci, II. 695.
— acida aromatica, 395.
— Acidi sulphurici, 395.
— Aconiti, 62.
— — aetherea, 62.
— — alcoholica, 62.
— Acori, 360.
— adstringens, II. 430.
— aetherea, 75.
— — alcoholica de Muriate Ferri, 655.
— — camphorata, 375.
— — ferrata, 655.
— alcalina, II. 373.
— — acris, II. 373.
— alcoholica aromatica, II. 255.
— Alcoae, [illegible]
— — purpureae, II. 98.
— Alcoholis Sulphuris iodata, [illegible]
— alexipharmaca Huxhami, 503.
— alkalina acris, II. 373.
— Aloes, 96. 97.
— — aetherea, 108.
— — alcoholica compos., 105.
— — aquosa, 97.
— — composita, 105.
— — crocata, 105.
— — cum Myrrha, 105.
— — — crocata, 105.
— — et Myrrhae, 105.
— — Socotrinae, 96.
— aloëtica alcalina, 107.
— amara, 532. 535. 698. II. 658.
— — Halensis, II. [illegible]
— Ambrae, 143.
— — aetherea, 143.
— — balsamica Dippelii, 143.
— — composita aetherea, 143.
— — grisea alcalina, 143.
— — liquida, 143.
— — Mindereri, 143.
— — moschata aetherea, 144.
— — cum Moscho, 143.
— ammoniata aromatica, 151.
— — asthmatica, 151.
— — foetida, 285.
— Amomi repentis, 336.
— — Zingiberis, II. 696.
— Angelicae, [illegible]
— — ammoniacalis, 200.
— Angusturae, 207.
— anodyna, II. 248. 669.
— — volatilis, II. 657.
Tinctura antiarthritica, II. 382.
— antiepileptica, 568.
— antigonorrhoica, II. 395.
— antihysterica, 438.
— Antimonii acris, II. 373.
— — alcalina, II. 373.
— — balsamica, II. 373.
— — Hermbstaedtii, 233.
— — Jacobi, 233.
— — nigra, II. 373.
— — saponata, [illegible]
— — tartarisata, II. 373.
— antiodontalgica, II. 429.
— antiphthisica Grammani, 662. II. 352.
— antirheumatica, 606.
— antispasmodica, 287. II. 669.
— — Christiani, II. 253. 267.
— — camphor., II. [illegible]
— — Dameii, II. [illegible]
— — Keupii, II. 669.
— — et tonica, II. [illegible]
— antispasmodico-emmenagoga, 106.
— antisyphilitica, II. 180.
— — Aconnelli, II. [illegible]
— — Talbotii, II. [illegible]
— antivenerea Falkii, II. 183.
— aperitiva, [illegible] II. 427.
— Aquilegiae Florum, 269.
— Aristolochiae serpentariae, 665.
— Arnicae, 269.
— — aetherea, 269.
— — alcoholica, [illegible]
— aromatica, 330. 398. II. 60.
— — acida, 395.
— — c. Acido sulphurico, 396.
— — ammoniacea, 151.
— — composita, II. 98. 501.
— — sulphurica, [illegible]
— Artemisiae Absinthii, 9.
— arthritica, II. 90.
— Asae foetidae, 286.
— — aetherea, 286.
— — ammoniata, 285.
— — kalina, [illegible]
— — stibiata, 283.
— Asari, 280.
— Asae foet., f. Tinct. Asae foet. etc.
— Aurantii, 534.
— — dulcis, 535.
— — immaturi, 535.
— — Pomor. immat., 535.
— Aurantiorum aetherea, 530.
— — Corticum, 536.
— — alcalina, 532.
— — Whyttii, 404.
— — Pomor. immatur., 535.
— aurea a. aurata, 667. 685.
— — nervina tonica, 685.
— — [illegible] Lamotte, 685.
— Auri, 290.
— Balsami Canadensis, 1.
— — coborum, 1.
— — Copaivae, 304.
— — — alcalina, 304.
— — de Mecca, 307.
— — Peruviani, 308.
— — Tolutani, 312.
— balsamica, 312. 321. II. 597.
— — composita, 1. 304. 321.
— — purificans, II. 183.
— Belladonnae, 307.
— Bellidis Florum, 320.
— Benzoatis Ammoniae camphorata, II. 298.
— — — composita, II. 250.
— Benzoës, 321.
— — balsamica, 321.

Tinctura Benzoës composita, 321.
— Benzoini, 321.
— balsamica, 321.
— composita, 321.
— Bestucheffii, 655.
— bezoardica, II. 653.
— — Ludwigii, 653.
— Bonplandiae trifoliatae, 207.
— Bottryos Mexicanae, 469.
— Bruceae, 207.
— Brucini, 336.
— Burgundica, 601.
— caerulea, 574. 596.
— Calami aromatici, 350.
— — composita, 350.
— Calendulae, 351.
— Cambogiae ammoniacata, 733.
— — ammoniata, 733.
— Camphorae, 356.
— — composita, II. 255.
— — opiata, II. 257. 258.
— Cancrorum Oculorum, 388.
— Canellae albae, 392.
— Cantharidis, 401.
— — vesicatoriae, 401.
— Cantharidum, 401.
— — aetherea, 404.
— — camphorata, 404.
— — composita, 404.
— — camphorata, s. alcoholica camphorata, 402.
— — composita, 402.
— — opiata, 403.
— — terebinthinata, 403.
— Capsici, II. 339.
— — annui, II. 339.
— — et Cantharidum, II. 339.
— Carbureti Sulphuris jodurata, II. [illegible]
— Cardamomi, 416.
— — composita, 417.
— Cardui benedicti, 419.
— carminativa, 423.
— — Wedelii, 423.
— Caryophyllatae, 207.
— Caryophillor. aromaticor., 424.
— Cascarillae, 428.
— — ammoniata alcalina, 428.
— — aquosa s. aquosa alcalina, 428.
— Cassiae cinnamomeae, 392.
— — ligneae, 392.
— — Sennae comp., II. 557.
— Castorei, 436.
— — aetherea, 440.
— — Canadensis, 436.
— — — aetherea, 440.
— — composita, 437.
— — foetida, 437.
— — kalina, 437.
— — Moscovitici, 436.
— — opiata, 437.
— — thebaica, 437.
— — vulgaris, 436.
— Catechu, 446.
— — aromatica, 446.
— — composita, 446.
— — Terrae, 446.
— cathartica, II. 557.
— Centaurii minoris, 448.
— Cerasorum nigror., 452.
— Chamaemeli, 463.
— Chamomillae, 463.
— Chenopodii, 469.
— — aetherea, 469.
— — ambrosioidis, 469.
— Chestoni, 452.
— Chinae, 504.
Tinctura Chinae alcoholica, 502.
— — amara, 504.
— — ammoniata, 503.
— — aquosa, 400.
— — Cort. compos., 503.
— — compos. alcohol. 503.
— — flavae, 502.
— — fuscae vinosa, ut Tinct. alcoh. sed cum Vino Hisp.
— — gingivalis, 506.
— — regiae, 502.
— — rubrae, 503.
— — simplex, 502.
— — volatilis, 503.
— Chinini sulphurici, 509.
— Cicutae, 517.
— — aetherea, 517.
— — aquatica, 517.
— Cinchonae alcoholica, 502.
— — aetherea comp., 505.
— — amara, 504.
— — ammoniata, 503.
— — composita, 503.
— — kalina, 503.
— — lancifoliae, 502.
— — martiata, 652.
— — officinalis, 502.
— — officin. comp., II. 505.
— — volatilis, 503.
— Cinchonini, 524.
— — sulphurici, 524.
— Cinnamomi, 392.
— — acuti, 392.
— — aetherea, 395.
— — composita, 393.
— — phosphorico-acida, 51.
— — Sinensis, 392.
— — Zeylanici, 392.
— Citri Aurantii, 534.
— Coccinellae septemp., 544.
— Coccionellae, 545.
— Cochleariae, 547.
— coerulea, 584. 596.
— Colchici autumnalis, 551.
— — Seminum, 552.
— — — vinosa, 552.
— — vinosa, 551.
— Colocynthidis, 557.
— — anisata, 557.
— — stiblata, 557.
— Colombae, 561.
— Colombo, 561.
— Columbo, 561.
— comp. Whyttii, 502.
— Conii composita, 517.
— Conorum Humuli Lupuli, II. 80.
— Contrayervae, 566.
— Convolvuli Jalapae, II. 31.
— Corallii, II. 495.
— Coralliorum, 306.
— Corticis Peruviani alcoholica, 502.
— — — alcalina, 503.
— — — aquosa kalina, 499.
— — — composita, 504.
— — — volatilis, 503.
— — Quercus, II. 434.
— — Winterani, 571.
— Corticum Aurantior., 534.
— — Winteranorum, 571.
— cosmetica, 321.
— — simplex, 321.
— Croci, 574.
— Crotonis Eleutheriae, 428.
— Culilaban s. Culilawan, 580.
— Cupri, 586.
— — Lewisii, 584.
— — sulphurici, 587. 588.
— Curcumae, 596.
— — aquosa, 596.
— Daffyi, II. 559.
Tinctura [illegible], 357.
— Delphinii, [illegible]
— [illegible]
— diaphoretica, 581.
— Dictamni albi, 610.
— digestiva, 608.
— Digitalis, 611.
— — aetherea, 616.
— — aquosa Fowleri, 613.
— — nitroso-aetherea, [illegible]
— — composita, 614.
— — Frimmeri, 616.
— — Harlessii, 615.
— — Macleani, 615.
— — Planckii, 615.
— — purpureae, 615.
— — [illegible], 616.
— — Rheineri, 614.
— — [illegible], 615.
— — simplex, 615.
— — spirituosa, 615.
— — Trommsdorffii, 616.
— diuretica, 616. II. 653.
— elastica, [illegible]
— Ellebori comp., [illegible]
— [illegible]
— Euphorbii, [illegible]
— excitans, [illegible]
— Extracti Opii [illegible]
— — [illegible]
— febrifuga, [illegible]
— — [illegible]
— — [illegible], 504.
— — [illegible], 503.
— — [illegible], 504.
— — [illegible]
— [illegible], 656.
— Ferri, 653.
— — acetatis [illegible]
— — acetici [illegible]
— — [illegible], 661.
— — aetherea, [illegible]
— — [illegible], 659.
— — [illegible], 662.
— — muriatici, [illegible]
— — muriatici, 653. 654.
— — oxydati [illegible], 654.
— — [illegible], 654.
— — oxydati tartar., 661.
— — pomata, 661.
— — pomati, 661.
— — [illegible]
— — sulphurico-[illegible], 670.
— — tartarici, [illegible]
— — tartarisata, [illegible]
— — [illegible] vinosa, 665.
— — [illegible]
— ferruginosa, 666.
— Flor. Salis Ammoniaci martialium, 659.
— foetida, 287. 437.
— — ammoniacalis, 437.
— — pyro-oleosa, II. [illegible]
— Formicarum comp., 671.
— Fuliginis alcalina, 178.
— — Clauderi, 178.
— — foetida, 287.
— Galangae, 676.
— Galbani, 337.
— — composita, 338.
— Gallarum, 679.
— Gei urbani, 703.
— Gentianae, 698.
— — alcalina, 699.
— — composita, 698.
— — — alcalina, 700.
— — rubrae, 698.
— Gentianini, 700.
— — alcalina, 700.
— Geoffraeae, 701.
— gingivalis, 506.

Tinctura [illegible], 446.
— Glechomae hederaceae, 735.
— Gnidii Resinae, 604.
— contra gonorrhoeam, II. 396.
— Guajaci, 711.
— — aetherea, 712.
— — ammoniacata, 712.
— — ammoniata, 712.
— — composita, 712.
— — Emerigonis, 712.
— — formiculata, 712.
— — Gummi, 712.
— — Ligni, 711.
— — officinalis, 711.
— — Resinae, 712.
— — volatilis, 712.
— — — Dewesii, 713.
— Gummi Ammoniaci, 720.
— — — kalina, 720.
— — Laccae aquosa, II. 47.
— — Guttae ammoniata, 733.
— — Gutti, 733.
— — — alcalina, 733.
— — — ammoniacata, 733.
— — — ammoniata, 733.
— haemastatica, 401.
— [illegible] ammoniaci, 659.
— [illegible]
— Hederae terrestris, 735.
— Helenii, [illegible]
— Hellebori albi, 740.
— — composita, 740.
— — nigri, 740.
— — [illegible], 740.
— — viridis, [illegible]
— Hieraei contra taeniam, 99.
— Humuli, 86.
— — Lupuli, II. 86.
— hydragoga, 650. 741. II. 48.
— Hyoscyami, 752.
— — [illegible], 752.
— — [illegible], 752.
— — nigri, 752.
— — Seminum, 752.
— Hyperici, 758.
— — vinosa comp., 757.
— — [illegible] alcoholica, 758.
— — comp., 758.
— hypnotica, II. 256.
— Indigo Resinae, II. [illegible]
— [illegible]
— Iodii, [illegible]
— Iodii, [illegible]
— — aetherea, II. 8.
— — [illegible]
— — diluta, II. 7.
— Ipecacuanhae, [illegible] 17.
— — [illegible]
— — [illegible]
— Ipecacuanhae [illegible]
— Jalappae, [illegible] II. 31.
— — aromatica, II. 31.
— — composita, II. 31.
— — [illegible], II. 31.
— — Resinae, II. 31.
— Japonica, [illegible]
— Juglandis Nucum Cort. virid., II. 3[illegible]
— kalina, 273.
— Kermetis, 479.
— Kinkinae amara, 604.
— Kino, [illegible]
— Laccae aquosa, II. 47. et Add.
— — alcoholica, II. 48.
— — — comp., II. 48.
— — aluminata, II. 48.
— — coerulea, II. 48.
— — — aquosa, II. 48.
— — kalica, II. 48.

Tinctura Laccae [illegible], II. [illegible]
— — Spiritus Cochlear. offic., 600.
— Lactucae, II. Add.
— — virosae, II. 50.
— Lactucarii, II. 50.
— Laudanum, II. 248.
— Lauri Cinnamomi — Tinct. Cinn.
— Lavandulae composita, II. 60.
— laxativa, 66.
— Ligni Agallochi, II. 69.
— — Aloes, II. 69.
— — Quassiae, II. 432.
— — Sassafras, II. 525.
— — — composita, II. 525.
— Lignorum, 3. 711.
— Lobeliae, II. 85.
— — inflatae, II. 85.
— longae vitae, 114.
— Lupuli, II. 86.
— — strobilorum, II. 86.
— Lupulini, II. 86.
— Lyttae vesicatoriae, 401.
— — — aetherea, 404.
— Macidis, II. 223.
— Macis, II. 223.
— Malatis Ferri, 661.
— Mari veri aetherea, II. 644.
— Martis, 654.
— — adstringens, 654. 659. 660.
— — alcalina, 644.
— — aperiens, 654. 664. 665.
— — aperitiva, 654. 659. 666.
— — — Glauberi — T. Mart. tart. Glaub.
— — — tartarisata, 666.
— — — Zwoelferi, 660.
— — aurea, 654.
— — cydoniata, 661.
— — dulcis, 654.
— — elleborata, 667.
— — helleborata, 667.
— — Klaprothii, 665.
— — pomata, 661.
— — pomati, 661.
— — cum Pomis Aurantiis, 661.
— — salita, 653. 654.
— — cum Spiritu Salis, 654.
— — cum Succo Cydoniorum, 661.
— — — — Pomorum, 661.
— — [illegible], 665.
— — [illegible], 666.
— — [illegible], 666.
— — [illegible] Malvat. et Aurant., 662.
— — — et Pomis, 662.
— — vinosa, 667.
— — Boerhaavii, 667.
— — e Vitriolo, 660.
— Mastiches, II. 105.
— — composita, II. 105.
— mastichina, II. 105.
— Matris Perlarum, 368.
— Melampodii, 740.
— Melissae, II. 109.
— Meloës vesicat. — Tinct. Canthar.
— Menthae crispae, II. Add.
— — piperitae, II. 116.
— — piperitidis, II. 116.
— — viridis, II. 116.
— Menyanthis, II. 658.
— Metallorum, II. 373.
— Millefolii, II. 209.

Tinctura Millepedum, II. 214.
— Mimosae Catechu, 420.
— moschata, II. 221.
— Moschi, II. 221.
— — aetherea, II. 221.
— — alcoholica, II. 221.
— — artificialis, II. 599.
— — vinosa, II. 221.
— — Muriatis Ferri aeth. alcoholica, 655.
— Muriatis Ferri, 654.
— — — alcoholisata, 654.
— — — cum Oxydo rubro, 654.
— Myrrhae, II. 229.
— — [illegible], II. 230.
— — alcoholica, II. 229.
— — [illegible], 287.
— — cum Aqua Kalcis, II. 230.
— — aquosa, II. 229.
— — phosphorata, 51.
— — uterina, 287.
— nervina Bestuscheffii, 655.
— — Halensis, 656.
— — (nervalis) et tonica, II. 668.
— nervino tonica martialis, 655.
— — — La Motte, 655.
— Nicotianae, II. 237.
— Nucis vomicae, II. 241.
— Nucum vomicarum, II. 241.
— Oculorum Populi, II. 369.
— odontalgica, II. 429.
— Olei camphorati, 377.
— ophthalmica, 246.
— Opii, II. 253.
— — acetosa, II. 247.
— — alcoholica, II. 253. 257.
— — et acidi benzoici camphorata, II. 258.
— — aromatica, II. 256.
— — composita, II. 258.
— — [illegible], II. 258.
— — [illegible], II. 257.
— — et camphorata, II. 257.
— — ammoniacata, II. 257.
— — ammoniata, II. 257.
— — et Benzoës Ammoniae, II. 258.
— — benzoica, II. 258.
— — comp., II. 259.
— — camphorata, II. 257. 258.
— — crocata, II. 248.
— — crocea, II. 257.
— — Eccardi, II. 258.
— — Extracti, II. 253.
— — officinalis, II. 253.
— — saponacea, II. 258.
— — simplex, II. 247. 253. 255.
— — spirituosa, II. 247. 252.
— — thebaica [illegible], II. 247.
— — vinosa, II. 247.
— — — colica, II. 256.
— — — et aromatica, II. 248.
— — — crocata, II. 248.
— — — Sydenhami, II. 248.
— Oreoselini, II. 347.
— Papaveris erratici, II. 308.
— — Florum, II. 309.
— — Rhoeadis s. Rhoeados, II. 308.

Tinctura Phellandrii aquatici, II. 697.
— physagoga, 580.
— Picis Graecae comp. s. alcoholica, 105.
— Pimentae sulphurica, II. 388.
— Pimpinellae, II. 323.
— — albae, II. 323.
— — comp., II. 324.
— — kalica, II. 324.
— Pini, 2.
— — comp., 3.
— Piperis Jamaicens. aetherea, II. 326.
— — nigri, II. 326.
— plumbosa, II. 312.
— Populi, II. 363.
— — Oculorum, II. 369.
— proprietatis Myrsichii, 220.
— Protohydrochlorat. Ferri, 664.
— purgans, II. 31.
— Pyrethri aetherea, II. 430.
— Quassiae alcoholica, II. 432.
— — excelsae, II. 432.
— — vinosa, II. 432.
— Quercus Corticis, II. 434.
— Raphani comp., II. 439.
— Ratanhiae, II. 443.
— — acetosa s. cum Aceto, II. 443.
— — aquosa, II. 443.
— — comp., II. 443.
— — saccharata, II. 443.
— regia, 143. 390.
— Resinae Guajaci, 712.
— — Indigo, II. 1.
— — Succini, II. 599.
— resino-saponacea, 713.
— Rhabarbari, II. 459.
— — alcoholica, II. 458.
— — — aromatica, II. 458.
— — aquosa, II. 460.
— — composita, II. 459.
— — spirituosa, II. 458.
— — vinosa, II. 457.
— Rhei, II. 454.
— — alcoholica, II. 458.
— — et Aloës, 113.
— — amara, II. 458.
— — aquosa, II. 461. 454.
— — — alcalina, II. 458.
— — — salina, II. 455.
— — composita, II. 458.
— — Darelli, II. 457.
— — dulcis, II. 457. 458.
— — et Gentianae, II. 459.
— — palmati, II. 454.
— — spirituosa, II. 458.
— — — dulcis, II. 458.
— — vinosa, II. 457.
— — — Darelii, II. 457.
— Rhododendri, II. 459.
— Rhois radicantis, II. 462.
— roborans, 393 503. 699.
— Rosarum, II. 471. 473.
— — acidula, II. 473.
— Sabinae, II. 40.
— — kalina, II. 40.
— sacra, 95. 113.
— salina, II. 378.
— — comp., 700.
— Salis Ammon. cuprifera, 690.
— — — cupriferi, 690.
— — Tartari, II. 373.
— — — phosphorata, II. 321.
— Sanguinariae Canad., II. 521.
— Sanguinis Draconis, II. 522.
— Saponis, II. 417.
— — camphorata, 156.
— — et Opii s. cum Opio, II. 258.
— Sarcocollae, II. 516.
— Sassafras, II. 526.
Tinctura Saturnino-cathartica, II. 696.
— — Ligni, II. 689.
— Saturni, II. 311.
— saturnino-martialis, II. 390.
— Scammonii, II. 539.
— Scillae, II. 538. 539.
— — aromatica, II. 539.
— — composita, II. 539.
— — kalina, II. 539.
— — maritimae, II. 538.
— Scordii, II 646.
— — composita, II. 646.
— sedativa, II. 253. 266.
— — camphorata, II. 258.
— Senegae, II. 360.
— Sennae, II. 557.
— — amara, II. 558.
— — aromatica, II. 557.
— — comp., II. 557.
— Serpentariae Virg., 265.
— stibiata, II. 260.
— Stibii alcalisata, II. 373.
— stomachica, 532. 536. 608. II. 326.
— — acuta Emstingii, II. 326.
— — aromatica, 395.
— — Leatini, 251.
— — Lipsiensis, 151.
— — martialis, 666. 668.
— — Whytti, 604.
— Stramonii, 606.
— — aetherea, 606.
— — alcoholica, 606.
— — Seminis, 606.
— Strychnini, II. 604.
— Strychnos, II. 241.
— Succini, II. 597.
— — aetherea, II. 597.
— — alcalisata, II. 598.
— — alcoholica, II. 597.
— — aromatica, II. 481.
— — balsamica, II. 597. 599.
— — foetida, II. 599.
— Sulphatis Chinini, 509.
— — Cinchonini, 524.
— — Cupri, 587.
— Sulphuris, II. 377.
— — Alcoholis iodata, II. 8.
— — Carburetі iodurati, II. 8.
— Sulphuro-prussureti Ferri, 676.
— Tanaceti, II. 618.
— Tartari, II. 373. 374
— — acris, II. 374.
— — composita, 715.
— tartarisata Glauberi, 666.
— — Ludovici, 666.
— Tartratis Potassae ferrici, 666.
— Terebinthinae, II. 618.
— Terrae Japonicae, 446.
— — Catechu, 446.
— thebaica, II. 253. 255.
— — Bamberg, II. 256.
— theriacalis, 199. II. 287.
— Toluiferae Bals., 312.
— tolutana, 312.
— — aetherea, 313.
— tonica, 491.
— — Huxhami, 499.
— — martialis, 666.
— — — lactea, 654.
— — et temperans, 491.
— — Whytti, 504.
— tonico-nervina Halensis, 695.
— — — Beetuscheffii, 695.
— Tormentillae, II. 652.
— Trifolii fibrini, II. 658.
— Tritohydrochlorat. Ferri, 664.
— Turionum Pini comp., 3.
— Valerianae, II. 669.
Tinctura Valerianae aethereo-ammoniata, II. 669.
— — — camphorata, II. 669.
— — ammoniacae comp., II. 669.
— — ammoniata, II. 668.
— — anodyna, II. 669
— — camphorata, II. 668. 669.
— — composita, II. 668.
— — officinalis, II. 667.
— — sylvestris, II. 667.
— — volatilis, II. 668.
— Vanilliae s. Vanillae, II. 671.
— Veratri s. Verat. albi, 740.
— — viridis, 741.
— Veratrini, II. 672.
— vermifuga, II. 260.
— cum Vino Boerhaavii, 667.
— vinosa Boerhaavii, 667.
— Vincetoxici, 291.
— pro vita prodmcenda, 114.
— volatilis anodyna, II. 267.
— vulneraria, II. 501.
— — rubra, II. 501.
— — simplex, II. 105.
— — Stahlii, II. 668.
— Zedoariae, II. 682.
— — composita, II. 682.
— Zinci Acetatis, II. 695.
— Zingiberis, II. 696.
Tinkal, Tinkar, II. 680.
Tisana acida, 541.
— acidulata, II. 463.
— adstringens, 54. 446. 563. 728. II. 427 & 7. 468.
— alcalina Mascagni, II. 380.
— Angelicae 202.
— antidysenterica, II. 381.
— antifebrilis acidula — Potus antif. acid.
— antigalactica, 466.
— antihysterica, II. 486.
— antilactosa, 456.
— antiphlogistica, II. 392.
— antiscorbutica, 549. II. 438. 486.
— antiscrophulosa, 495.
— antisyphilitica, 716.
— antivenerea, II. 715. II. 502.
— — purgans, II. 530.
— aperitiva, II. 400.
— Arabica, II. 518.
— ad arenulas, II. 529.
— Barquesredi, II. 180.
— Callaci, II. 522.
— camphorata, 374.
— carminativa, II. 109.
— Cerasorum Succi, 451.
— Cichorii, 513.
— Citri comp., 541.
— communis, 715.
— Cremoris Tartari, II. 410.
— depurativa — Tis. purif.
— — Vigarous, II. 530.
— diuretica, 420. II. 43. 392. 395. 401. 490.
— emulsiva, 185.
— — cum Camphora, II. 394.
— — et camphorata, II. 394.
— Enulae, II. 4.
— febrifuga, 530.
— — et laxans, II. 488.
— Feltzii, II. 519.
— — resolv. et diuret. — Decoct. resolv etc.
— de Fruct. pectoralibus, 481.
— haemastatica, II. 289.
— Helenii, II. 4.
— imperialis, II. 400.
— Inulae, II. 4.
— Jaubertandi, II. 521.
— laxativa, II. 611.
— leniens, 121.
— Lusitanica — Decoct. Lus.

Tisana Milmanni, II. 490.
— de St. Marie, II. 517.
— nitrata, II. 391.
— oxygenata, II. 397.
— pectoralis, 124. II. 46. 97.
— purgativa, II. 611.
— purificans, 620.
— refrigerans et diuretica, II. 396.
— regalis, II. 462.
— resolvens et diuretica, II. 401.
— ad scorbutum, II. 438.
— stomachica resolvens, II. 392.
— sudorifica. 314. 714. II. 519.
— — Astruc, II. 521.
— — excitans — Decoct. diaphor. incit.
— — et nutriens — Decoct. incit. nutr.
— — et purgans, II. 522.
— sulphurico salina. II. 388.
— contra tineam, 715.
— tonica et antiherp., II. 486.
— ad urinam arenosam, II. 579.
— vermifuga, 204.
— Vinachi, II. 521.
— vinosa. II. 393.
— — Williamsi, 552.
— vulneraria, 267.
— — Yvo Gaukes, 715.
Tithymalum latifolium, 431.
Tithymalus Cyparissiae, 626.
Toluifera Balsamum — Mirosperm. toluif.
Tonco — Faba Tunca
Topasius, 133.
Topicum antispasmod., 434.
— — et tonicum, II. 287.
— aurificum, 298.
— detersivum. II. 128.
— jeniens s. sedans, II. 247.
— purgans, 554.
— resolvens, 535.
— vermifugum, 564.
Tordylium, II. 569.
— officinale, II. 569
Tormentilla erecta, II. 651.
— sylvestris, II. 651.
Tornasolis coerulea, II. 47.
— rubra — Nezetta.
Totasana, 757.
Toxicodendron — Rhus radic. et Toxic.
Tragacantha, II. 652.
Tragacanthae Gummi, II. 652.
Tragea Actis Granorum, II. 507.
— alba, 727.
— aromatica. 380. 381.
— — Gabelchoveri s. Gabelkoveri, 381.
— — officinalis, 381.
— Granorum Actes, II. 507.
— ophthalmica, 207. 628.
Tragemata de Semine Santonico, 521.
— Chinae, 487.
Tragopogon, II. 656.
— porrifolium. II. 656.
— pratense, II. 655.
Tragoselinum, II. 322.
— majus, II. 323.
Trapa natans, II. 655.
Tremella Auricula Judae, II. 655.
Tribuli aquatici — Trapae nat. fructus.
Trichechus Manatus, 364.
Trichites — Alumen plumosum.
Trichomanes, 65.
Trifolium, II. 656.
— acetosum. 16.
— antiscorbuticum, II. 656.
— aquaticum, II. 656.
— aureum, 743.
Trifolium cervinum, 625.
— fibrinum, II. 656.
— Melilotus officinalis, II. 106.
— paludosum, II. 656.
— palustre, II. 656.
— pratense, II. 656.
— purpureum, II. 656.
Trigonella Foenum graecum. 670.
Trinitatis Herba, II. 21.
Triosteum perfoliatum. II. 659.
Tripela s. Tripela officinalis, II. 659.
Tripolitana Terra, II. 659.
Trissago, II. 613.
Triticum aestivum, Spelta et hybern turgidum — Farina, Amylum, Furfur.
— fagium, 629.
— repens, 704.
Trito-Acetas Ferri, 659.
Tritohydrochloras Ferri, 653.
Tritohydrocyanas Ferrureti Ferri, 669.
Tritohydroferrocyanas Ferri, 669.
Tritonitras Ferri, 652.
Tritophosphas Ferri, 647.
Tritoxydum Antimonii, 219.
— Ferri, 641.
— Plumbi, II. 334. 636.
Trochisci de Agarico, 78.
— absorbentes, II. 90.
— ex Acetate Mercurii, II. 205.
— albi, II. 337.
— — Rhazis, II. 337.
— Alhandal, 553.
— Alipti moschati, II. 219.
— Alkekengi, 88.
— — cum Opio, 89.
— Alkermes, 472.
— — completi, 472.
— Alhaeae, 122.
— — compos., 122.
— de Ambra, 142.
— Amyli. 190.
— antacidi, II. 90.
— anthelmintici, 521. 649. II. 24. 174.
— — Doct. Ching, II. 160.
— antihysterici, 575.
— Antimonii, 222.
— — martiales, 649.
— aromatici, 383.
— aromatico-stomachici, 383.
— bechici, 727. II. 79.
— — albi, 122. 190. 727. II. 20. 79.
— — citrini s. flavi, 728. II. 80.
— — nigri, II. 80.
— — opiacei s. opiati, II. 268.
— — rubri, II. 655.
— Calami aromatici, 328.
— Calcis Carbonatis, 302.
— de Carabe, II. 275.
— Carbonatis Magnesiae, II. 90.
— — Plumbi camphorati, II. 337.
— carbonici, 414.
— Castorei, 433.
— Catechu, 412. 443.
— — cum Ambra, 443.
— — cum Liquiritia, 443.
— — cum Magnesia, 443.
— Chaussieri, II. 272.
— Chlorureti Calcis, II. 696.
— Citratis ferrici, 663.
— Colocynthidis, 553.
— — praep., 553
— de Cremore Tart., II. 409.
— Cretae, 362.
— Cupressi Fruct. 681.
— Cypheos, II. 626.
Trochisci digestivi, II. 560.
— emetici, 621.
— emmenagogi, 636. II. 10.
— Enulae, II. 3.
— escharotici, II. 181. 186.
— — albi, II. 181.
— excitantes, II. 328. 428.
— ferruginosi, 636.
— ad foetorem oris, 443.
— fumales, 325.
— Galliae moschatae, II. 219.
— e Glyzyrrhiza, II. 79.
— Glycyrrhizae, II. 79.
— — comp., II. 80.
— — cum Gummi, II. 80.
— — cum Opio, II. 81.
— — thebaici, II. 81.
— Gordoni, 728.
— Gummi Acaciae, 727.
— gummosi, 727. II. 685.
— hedychroi, 348.
— hermetici, II. 169.
— — Scretae, II. 174.
— Hydrargyri, II. 194.
— Japonici, 606.
— Imperatoris, 383.
— iodati, II. 8.
— Iodii, II. 8.
— Ipecacuanhae, II. 13.
— — comp., II. 13.
— — opiatae, II. 13.
— de Karabe, II. 275.
— de Lagneau, II. 125.
— Lichenis Islandici, II. 68.
— Liquiritiae, II. 80.
— — cum Gummi, II. 80
— Magnesiae, II. 90.
— Mannae, II. 99.
— masticatorii, II. 104.
— Menthae piperitae, II. 117.
— mercuriales, II. 165. 164. 194
— Mercurii saccharati, II. 125.
— — saccharini, II. 125
— de Minio, II. 186.
— Mogolici, II. 219.
— moschati, II. 219.
— Muriat. oxygenat. Hydrargyri, II. 181.
— muscardae — Troch. Catechu.
— de Myrrha, 283.
— — comp., 283.
— Myrrhae comp., 283.
— Nitratis Potassae, II. 391.
— de Nitro, II. 391.
— odoriferi, 142.
— cum Oxydo Merc. nig. et Sacch. arom., II. 143
— pectorales, 621. 727.
— — Regis Danorum, II. 81.
— purgantes, II. 171.
— refrigerantes, II. 396.
— Rhazis, II. 337.
— de Scilla, II. 531.
— — Damocratis, II. 531.
— scillitici, II. 531. 534.
— sedativo-balsamici, II. 81.
— solventes s. solutivi, II. 24.
— ad sputum cruentum, 442.
— stibiati, 228.
— stomachici, 383.
— ad strumam, 415.
— Succini, II. 275.
— e Sulphure, II. 602.
— temperantes, II. 396. 413.
— de Terra Catechu, 442.
— contra vermes, II. 169.
— vermifugi II. 169.
— — Barthezii, II. 160.
— Viperarum, 682.
— de Vipera, 682.
Tropaeolum majus, II. 233.
Tryphera magna, II. 288.
Tubera cervina, 331.

Tunica, 609.
— hortensis, 609.
— rubra, 609.
Tunicae interiores ventriculi Gallinae, 682.
Turiones Piceae, 2.
— Pini, 2.
Turpethum album, II 659.
— minerale, II 190. 191.
— nigrum, II. 192.
— rubrum, II. 190.
— vegetabile, II. 659.
Tussilago, 630.
— Farfara, 629.
— Petasites, II. 316.
Tuthia, II. 684.
Tutia, II. 684.
— Alexandrina, II. 684.
— praeparata, II. 684.
Tyllelinum, II. 547.

U.

Ulmaria, II. 589.
Ulmus, II. 659.
— campestris, II. 659
— effusa — Ulmus campestris.
— fulva, II. 659.
Ultramarinum, 133.
Ulva Lactuca, 741.
— pavonia, 741.
— squamaria, 741.
Umbilicus, 572.
— marinus, 358.
Umbra, 641.
Uncaria Gambeer — Nauclea G.
Unguentum Abbatiae du Bec, II. 640.
— Acetatis Cupri, 582. 592.
— — — crystallis., 592.
— — — cum Melle, 582.
— — Plumbi, II. 344.
— — — carbonatum, II. 354.
— — superplumbic., II. 344.
— acetatum, 23.
— Acetitis Cupri c. Melle, 582.
— — Plumbi, II. 344.
— Acidi nitrici, 48.
— — nitrosi, 48.
— — sulphurici, II. 696 c.
— acre, II. 696 i.
— Adipis suillae, II. 473.
— Adipocerae Cetorum, 453.
— adstringens, 138. II 339. 443. 681.
— Aegyptiacum, 582.
— Aegyptiacum, 582.
— Aeruginis, 582. 583. 592.
— — melleum, 582
— Aethiopicum, II. 140
— agglutinans martiale, II. 642.
— Agrippae, II. 543.
— alabastrinum, 130.
— Alabastrum, 130.
— albissimum, 454.
— album, 251. 453 II. 337
— — camphoratum, II. 338.
— — resolvens, 154.
— — Rhasis, II. 337.
— — simplex, II. 337.
— alcalinum, II 578.
— Aloës c Petroleo, 98.
— de Althaea, 128.
— Althaeae s. Altheae, 128. 252.
— amarum, 558.
— ad ambusta 754. II. 687. 689.
— ad ambustiones, II. 338.
— ammoniacale saponaceum, 154.
— ammoniatum, 168.
— amygdalinum, 252.
— Amyridis elemif., II. 641.
— anodynum, 754.
— anthelminticum, 12. 98. 558.
— antiarthriticum, II. 131.
— antihaemorrhoidale, 678. II. 250. 266. 339. 345. 349 354. 591. 687.
— antiherpetic., 228. 354. II. 156. 169. 202. 344. 346. 348. 607.
— — Chevallieri, 354.
— — Cullerieri, II. 191.
— — Goulardi, II. 346.
— antiophthalmicum, II. 250.
— antiphthiriacum, 257.
— antipsoric., 413. II. 130. 144. 148. 181. 202. 382. 384. 576. 605.
— — Jasseri, II. 605.
— — c. Nicotiana, II. 239.
— antiscrophulos., II. 10. 238.
— antispasmod., 134.
— antisyphilit., 298.
— antivenereum, 298. II. 149. 172.
— Apostolorum, II. 358.
— Aquae Rosarum, II. 473.
— Arcaei, II. 621.
— aromaticum, II. 53. 55. 56. 479.
— — camphorat., II. 56.
— arsenicale, 272.
— Arsenici, 272.
— de Arthanita, 558.
— aureum, II 640.
— Autenriethii, 243.
— — contra decubitum, II. 696 k.
— Balsami et Olei Laricis, II. 621.
— balsamicum, II. 621.
— basilicum, II. 621. 640.
— — flavum, II. 621. 640.
— — nigrum, II. 641.
— — pallidum, II. 640.
— — cum Pice navali, II. 641.
— Belladonnae, 296.
— Bellii, II. 150.
— de Bicour, II. 364.
— ad blennorrhag. chordatam, II. 135.
— de Bolo, 132.
— c. Bromo, II. 696 e.
— Bryoniae, II. 543.
— Burdenii, II. 384.
— Calaminae comp., II. 690.
— calaminare, II 686.
— e calaminari lapide, II. 686.
— Calcis vivae, 353
— Calendulae Flor., 370.
— de Calomelle, II. 158.
— camphoratum, 456.
— Cantharidis 399.
— — cereum, 404.
— — infusi, 399.
— Cantharidum, 404. 405.
— — cereum, 404.
— — colatum, 409.
— — irritans, 403.
— — opiatum, 400.
— Carbonatis plumbici, II. 337.
— — Zinci impuri, II. 686.
— Carbonis, 413.
— cardiacum, 690.
— carminativum, 466. II. 56.
— Catechu, 444.
— cathaereticum, 558. II. 148.
— Cerae, 251.
— ceratum, 252.
— cereum, 251.
— — Curcumae 252.
— Cerussae, II. 337.
— — acetatae, II. 337.
— — camphoratum, II. 338.
— Cetacei album, 453.
— Ceti, 453.
— cinnabarinum, II. 156.
— Cirilli, II. 181.
— Cirilli opiaceum, II. 181.
— citricum, 31.
— citrinum, 128. II. 197. 640.
— clysmaticum, 130.
— coeruleum — Ungt. Hydrargyri.
— ad combustiones, 754. II. 338. 345.
— Comitissae, 678. II. 693.
— commune, 251.
— Conii, 517.
— Conyzae, 627.
— corrodens, II. 148.
— cosmeticum, 464.
— Cucumerum, II 696 g.
— cupratum, 589. 594.
— Cupri, 589.
— — compositum, 592.
— e Cupro, 585.
— Curcumae, 252.
— Cyanureti Mercurii, II. 189.
— Cyrilli, II. 181., s. Ungt. Cirilli opiac.
— Damascenum, 583. 592.
— — coeruleum, 544.
— defensivum, 134.
— depilatorium, 519. II. 620.
— depurativum, II. 238.
— Desaulti, II. 150.
— desiccativum, II. 687.
— Deutochlorureti Merc., II. 181.
— Diapompholigos, II. 686. 687. 689.
— digerens balsamicum, II. 621.
— digestivum, II 622.
— — animatum, II. 622.
— — aloëticum, II. 622.
— — compositum, II. 622.
— — flavum, II. 621.
— — mercuriale, II. 131.
— — myrrhatum, II. 622.
— — opiaceum, II. 623
— — simplex, II. 622.
— Digitalis, 616.
— — purpureae, 616.
— diureticum resolvens, II. 535.
— dodecapharmacum, II. 358.
— ad dolorem faciei, II. 337.
— Duboisi, II. 197.
— Elemi, II. 621.
— — cum Alumine, II. 139.
— — compositum, II. 621.
— — et Terebinthinae, II. 621.
— emolliens, 90. 251. II. 620. 640.
— — et sedans, II. 255.
— empiricum Tlaki, II. 591.
— emplasticum, II. 107.
— Enulae, II. 2.
— enulatum, 399. II. 2.
— epispasticum, 399. 495. 407. 409. 603.
— — ammoniacale, 154.
— — camphorat., 400. 408.
— — fortius, 407
— — mitius, 399.
— — viride, 409.
— escharoticum, 272. II. 149.
— excitans, 404.
— exsiccans, II. 339. 687. 689. 690.
— — rubrum Acrelii, II. 690.
— exsutorium, 407.
— c. Extr. Canth. comp., 399.
— Fabri, 244.
— Falckii, II. 151.
— Fellis bovini comp., 631.
— Filii Zachariae, 252.
— flavum, 128. II. 638. 639.
— Florum Naphae, 529.
— ad fonticulos Bergii, 409.
— fuscum, II. 149. 354. 641.

Unguentum Gallae, 678.
— Gallarum, 678.
— — compos., 678.
— ex Gallis comp. c. opiatum, 678.
— Gondreti, 154.
— Goulardi, II. 346.
— de Grandjean, 408.
— de Graphite, 637.
— griseum, II. 666.
— — camphoratum, II. 144.
— haemorrhoidale, 576. 750.
— ad haemorrhoides, II. 260. 266. 270. 354.
— Helenii, II. 2.
— Hellebori albi, 741.
— — viridis, 741.
— Hydrargyri, II. 128.
— — albi, II. 202.
— — album, II. 202.
— — cinereum, II. 128.
— — — fortius, II. 181.
— — — cum Terebinthina, II. 130.
— — citrinum, II. 197.
— — compositum, II. 197.
— — Deutoxynitrat., II. 148.
— — fortius, II. 130.
— — griseum, II. 144.
— — mitius, II. 130.
— — Muriatis ammoniacalis, II. 202.
— — — nitrati, II. 197.
— — Nitratis, II. 197.
— — nitrico oxydi, II. 148.
— — Oxydi cinerei, II. 128.
— — praecipitati albi, II. 202.
— — rubri, II. 148.
— — rubrum, II. 148. 149.
— — Sulphuretisublimati, II. 155.
— c. Hydrobromate Potass. bromureto, II. 696 c.
— — sine et c. Terebinth., II. 128.
— ex Hydrargyro oxydato rubro, II. 148.
— Hydriodatis Potassae, II. 9.
— — — iodurati, II. 10. 696 h.
— Hyoscyami s. de Hyoscyamo, 753.
— hypnoticum, II. 275.
— de Infuso Cantharidum, 309.
— infrigidans Galeni, II. 474.
— Inulae, II. 2.
— — Helenii, II. 2.
— iodatum, II. 8.
— Iodii, II. 8.
— Iodureti Arsenici, II. 696 b.
— — Bami, II. 696 b.
— — Mercurii, II. 188.
— — Sulphuris, II. 696 b.
— irritans, 405. 407.
— Jadelotii, II. 208. 376.
— Janini, II. 202.
— Jenneri, 243.
— Joerdensii, II. 150.
— Juchii, II. 132.
— juglandinum c. Pelle Taurr., 632.
— Juniperi, II. 43.
— Kali hydroiodici, II. 9.
— Lapidis calaminaris, II. 689. 689.
— labrino-camphorat., II. 56.
— laurinum, II. 53.
— leniens, 64. 376. II. 265. 268. 347.
— — et balsamicum, II. 621.
— lenitivum, 128. II. 620.
— de Linaria, II. 73.
— Linariae, II. 73.
— de Liquiritia, II. 339.
— Lithargyri, II. 344.
Unguentum Lithargyri rectum, martiale, II. 642.
— de Lithargyro s. de Lithargyrio, II. 344.
— Lugdunense, II. 143.
— Lupuli, II. 86.
— Lupulini, II. 86.
— luteum, II. 622.
— Lyttae, 404.
— — cereum, 404.
— — irritans, 404.
— ad maculas corneae, 632.
— magistrale, II. 361.
— Majoranae, II. 207.
— majorum issaiorum, 692.
— Malvae, II. 98.
— malvinum, II. 98.
— martiatum, II. 56.
— Matrae, II. 354.
— — Theclae, II. 354.
— Medullae mucilagin., 262.
— — vaccinae, 61.
— mercuriale, II. 128. 149.
— — album, II. 202.
— — — Werlhofii, II. 202.
— — aptyalizomenon, II. 187.
— — Baekingii, II. 149.
— — camphorat., II. 135.
— — cinereum, II. 128.
— — citrinum, II. 197.
— — — Bamé, II. 197.
— — corrosivum, II. 181.
— — mitius, II. 130.
— — opiaceum et opiatum, II. 135.
— — oxygenatum, II. 131.
— — rubrum, II. 148.
— — Sanchezii, II. 131.
— — saponaceum, II. 135.
— — c. Terebinthina, II. 130.
— Mercurii rubrum, II. 148.
— — sulphurati, II. 140.
— de Mercurio dulci, II. 158.
— Mezerei, 603.
— — Resinae viride, 603.
— Minii, II. 335.
— — camphoratum, II. 335.
— de Minio, II. 335. 361.
— — camphoratum, II. 335.
— Monspeliacum, 167.
— mundificans, II. 139.
— — Poterii, II. 238.
— — Stahlii, II. 131.
— — Zelleri, II. 202.
— Muriatis hydrargyro-ammoniacalis, II. 202.
— — oxygenati Hydrarg., II. 181.
— Myrrhae, II. 228.
— myrtinum comp., 678.
— Naphae Flor., 539.
— narcoticum, II. 268.
— Neapolitanum, II. 128.
— nervinum, 169. II. 53. 479.
— de Nicotiana s. Nicotianae, II. 238.
— nigrum, II. 155.
— Nihili, II. 686. 687.
— — ad oculos, II. 686. 687.
— de Nihilo, II. 686.
— Nitratis Hydrargyri, II. 197.
— — — fortius, II. 197.
— — — mitius, II. 197.
— — hydrargyrici, II. 197.
— — Mercurii et Ammoniae, II. 198.
— nitricatum, 48.
— — fortius, 48.
— — mitius, 49.
— nitricum, 48.
— nutritum, II. 344.
— oculare, II. 349.
— — album, II. 668.
— — Keyseri, II. 668.
Unguentum ad oculorum defluxiones, II. 693.
— ophthalmicum, 66. 594. 632. II. 151. 349. 667. 693.
— — album, II. 686. 688.
— — cupratum, 594.
— — Dupuytrenii, II. 150.
— — Janini, II. 202.
— — Pelletani, II. 138.
— — Richteri, II. 149.
— — rubrum, II. 148. 688.
— — Sloanii, II. 688.
— — viride, II. 688.
— — St. Yves, II. 150.
— opiatum s. opiaceum, II. 250. 267. 268. 316.
— Opodeldoch, 156.
— Oxycarbonatis Zinci impuri, II. 686.
— Oxydi albi Merc. per Acid. sulphuric., II. 191.
— — Cobalti, 541.
— — Cupri melleum, 582.
— — Hydrarg. cinerei, II. 130.
— — — nitrati, II. 148.
— — — rubri, II. 148.
— — — rubrum Tittmanni, II. 148.
— — Plumbi acetatum, II. 344.
— — — albi, II. 344.
— — — carbonati, II. 337.
— — — fuscum, II. 354.
— — — rubrum, II. 361.
— — Zinci, II. 686.
— — — camphoratum, II. 687.
— — — impuri, II. 686.
— — — nativi, II. 686.
— Oxyduli Plumbi semivitrei adustum, II. 354.
— oxygenatum, 48.
— ex tempore parandum, 511.
— Oxynitratis Hydr. et Ammoniae, II. 696 i.
— — — — comp., II. 696 i.
— oxymeimenon, 48.
— de Papav., Hyosc. et Bellad., 755.
— paralyticum, 66. II. 420.
— ad paralysin, II. 420.
— pectorale, II. 20.
— pediculorum, II. 131.
— contra pediculos, 497. II. 499. 493.
— — — capitis, 608.
— ad parniones, 138. 378. II. 56. 698.
— phosphoratum, II. 321.
— phosphoricatum, 51.
— Phytolaccae Radicis, II. 322.
— de Pice et Cera, II. 641.
— piceum comp., II. 640.
— Picis, II. 640.
— — aridae, II. 640.
— — et Cerae, II. 641.
— — empyreum., II. 640.
— — liquidae, II. 330.
— — cum Oxydo Merc. rubro, II. 149.
— — et Sulphuris, II. 330.
— Piperis nigri, II. 328.
— Plumbi compositum, II. 339.
— plumbicum, 344.
— pomadinum, 252. II. 473. 476.
— pomatum oxygenatum, 48.
— Pompholigis, II. 689.
— populeum, 755. II. 369.
— Populi Gemmar. comp., 755.

Unguentum Praecipitati viridis, II. 206.
— de Praecipitato rubro, II. 148.
— propolicum, 264.
— ad prosopalgiam, II. 337.
— psoricum Anglicum, II. 606.
— Pulveris Meloes vesicatorii a. Canth., 309.
— purgans, 554. II. 171.
— purpureum Wurzii, 583.
— refrigerans, 378. II. 473.
— Regentii, II. 150.
— regium, II. 640.
— de Renal, II. 272.
— de Resina Pini comp., 128.
— Resinae albae, II. 638.
— — Elemi, II. 621.
— — flavae, II. 621. 640.
— — nigrae, II. 641.
— — Pini Burgund., II. 639.
— — — sylv. comp. 128
— resinosum, II. 638. 696 f.
— resolvens, 400. 420. 673. II. 135 175. 349.
— — mammarum tumores — Linim. volat.
— resumtivum, 128. 189.
— Roriamarina comp., II. 53.
— Rosae Aquae, II. 472.
— Rosarum, II. 473.
— rosatum, II. 473. 474.
— — compositum, II. 209.
— — simplex, II. 474.
— rubefaciens, 673.
— rubrum, II. 150. 335.
— — ad labia oris, II. 245.
— — potabile, II. 245.
— Rustii, II. 150.
— Rutae, II. 492.
— Sabadillae c. Mercurio, II. 131.
— Sabinae, II. 40.
— Salicis, II. 498.
— Salis marini, II. 676.
— Sambuci, II. 510.
— sambucinum, II. 510.
— sandalinum, II. 513.
— saponaceum, II. 416 419.
— Saponis, II. 419.
— saturninum, II. 344. 349.
— — s. Saturni saponaceum, II. 346.
— saturno mercuriale, II. 297.
— ad scabiem, II. 144. 297. 605.
— — Anglicum, II. 607.
— — — Jasseri, II. 606.
— — Zelleri, II. 208.
— Scillae, II. 535. 538.
— — maritimae, II. 537.
— scilliticum, II. 537.
— ad scrophulas, II. 10.
— Sebi Arcaei, II. 621.
— sedans, II. 349. 547.
— sedativo-narcoticum, II. 208.
— sedativum, II. 204. 265.
— Semin. frigidor., 464.
— siccativum, II. 187.
— simplex, 251. 252. II. 638. 639.
— Sinapis, II. 671.
— Solani, II. 587.
— somniferum, II. 276.
— Spermatis Ceti, 453.
— spleneticum, 726.
— de Staphisagria 608.
— — compos., 608.
— Staphysagriae, II. 131.
— — compositum, II. 131.
— stibiatum, 243.
— stimulans, 401. II 149.
— stomachale, 12. 424. 466.
— Stramonii, 696.
Unguentum contra strumam, 299 II. 696 p.
— Styracis, II. 696.
— — comp., II. 696.
— — resinosum, II. 695.
— Subacetatis Cupri, 692.
— — cum Melle — Oxymel cupros.
— — Plumbi liquidi, II. 344.
— — — opiatum, II. 346.
— — — camphoratum, II. 346.
— — — saponaceum, II. 346.
— — plumbici, II. 344.
— Subacetitis Cupri, II. 692.
— Subcarbonat. Plumbi, II. 337.
— Submur. Hydr. amm., II. 202.
— Subnitrat. Hydrarg., II. 148.
— Suboxydi Hydrarg., II. 130.
— Sulphat. Hydrarg., II. 191.
— sulphuratum, II. 605.
— — compositum, II. 606.
— — simplex, II. 605.
— e Sulphure, II. 605.
— — — hydrargyrato, II. 140.
— sulphuricum, 55.
— Sulphuris, 605.
— — compos., II. 605. 606.
— sulphuro-alcalinum, II 370.
— à la sultane, 435.
— Superacetat. Plumbi comp. II. 696 k.
— Supernitrat. Hydrarg., II. 197.
— suppurans, 90.
— suppurativum, II. 149.
— ad tabida membra, 627.
— Tartari emetici, 243.
— — stibiati, 243.
— e Tartaro stibiato, 243.
— Tartratis Potass. stibiati, 243.
— — Stibii et Potassae, 243. II. 696 d.
— de Terebinthina, II. 622.
— — — et Adipibus, II. 621.
— — — et Cera — Ung. Althaeae et Ungt. cer. Cercum.
— — — et Ovorum Vitellis, II. 622.
— Terebinthinae, II. 622. 623.
— — camphoratum, II. 622. 624.
— — et Picis, II. 640.
— — resinosum, II. 640.
— terebinthinatum, II. 620 621.
— tetrapharmacum, II. 630.
— ad tineam, 413. 673. II. 173. 198. 202. 607. 638.
— de Tormentilla, II. 337.
— tripharmacum, II. 344.
— Turpethi mineralis, II 191.
— Tutiae, II. 646. 687.
— ad ulcera lymphatica, II. 140.
— — — scrophulosa, II. 149.
— — — venerea, II. 149.
— de Uvis, 252.
— ad varices ani, II. 345. 354.
— Veratri, 74.
— Veratrini, II. 672.
— ad s. contra vermes, 12 98. 558.
— ad vesicata, 409
— vesicatorium, 405. 407.
— virginale, II. 693.
— viride, 592 691.
— — potabile, 760.
— Zinci, II. 680. 687.
— — potabile, 760.
Unguis odoratus — Blatta byzant.
Ungula Alcis, 682.
— — praeparata, 682.
— Caballina, 682.
Ungulae Camelorum, 319.
Unicornu, 304. 682.
— fossile, 304.
— marinum, 364.
— — praeparatum, 364.
— minerale, 364.
— verum, 364.
Uniones, 268.
— praeparatae, 360.
Urea, 69.
Uredo Frumenti — Sclerotium Clavus.
Ursinum verum, 15.
Ursus, 323.
Urtica, II. 660.
— dioeca, II. 660.
— Hispanica — U. pilulifera.
— major, II. 660.
— minor, II. 660.
— mortua, II. 52.
— pilulifera, II. 660.
— Romana, II. 661.
— urens, II. 660.
Urucu, II. 297.
Usnea plicata, II. 65.
Uva ursereina, H. Add.
— Ursi, II. 660. 661.
— vepea, II. 314.
— vulpina, II. 314.
Uvae, II. 679.
— passae, II. 680.
Uvularia, II. 490.

V.

Vaccae Stercus, II. 696l.
Vaccinium, II. 661.
— Myrtillus, II. 661.
— Oxycoccos, II. 661.
— Vitis Idaea, II. 661.
Valeriana, II. 662.
— Celtica, II. 232 233.
— major, II. 662.
— minor, II. 662.
— officinalis, II. 663.
— Phu, II. 662.
— sylvestris, II. 663.
Valerianella olitoria, II. 670.
Vanigliae, II. 670.
Vanilla, II. 670.
— aromatica, II. 670.
Vanillia, II. 670.
Vapor aceticus, 121.
— Acidi acetici, 121.
— hepaticus, 43.
— hydro-sulphuratus, 43.
— Muriatis Calcis oxygenati i. e. Muriatis Calcis oxygenati quant. placet.
— oxymuriat. acidus — Liq. alex. extemp.
Vapores, s. Vapor.
Variolaria, II. 671.
— orcina, II. 671.
Vateria Indica — Elaeocarp. co- pallif.
Ventriculus Gallinae, 687.
Venus, 582.
Veratria, 736. II. 672.
Veratrina, II. 672.
Veratrinum, 736. II. 672.
Veratrum, 736.
— album, 736.
— Lobelian. — Verat. album.
— Sabadilla, II. 693
Verbasculum pratense, II. 422.
Verbascum, II. 672.
— album, II. 672.
— nigrum, II. 672.
— phlomoides, II. 672.

Verbascum thapsiforme — Verb. Thapsus.
— Thapsus, II. 672.
Verbena, II. 673.
— officinalis, II. 673.
— triphylla, II. 673.
Verbesina, 289.
Vermis majalis, II. 173.
Vernix sicca, II. 521. —
Veronica, II. 674.
— Amagallis, II. 673.
— Beccabunga, II. 673.
— officinalis, II. 673.
— purpurea, 387.
— teucriifolia, II. 674.
— Teucrium, II. 674.
— Virginica, II. 674.
Verrucaria, 370. 785.
Verrucariae, 371.
Vertebrae Mustulae Piscis, 364.
Vesicatorium de Lemmate, 409.
— magistrale, 406.
Vicia, II. 675.
— Ervilia, II. 675.
— sativa, II. 675.
Victorialis femineus, 702.
— longa, 93.
— mascula, 93.
— rotunda, 703.
Vinaigre de quatre voleurs — Acet. quatuor latronum.
Vinca, II. 675.
— major, II. 675.
— minor, II. 675.
Vincetoxicum, 290.
Vini Gallici Spiritus — Spir. Vin. Gall.
Vinum, II. 675.
— absinthiatum, 8.
— Absinthii, 8.
— — compos., 9.
— Absinthitis, 8.
— adstringens, 304. 446. 581. II. 487.
— adustum, 81.
— album, II. 676.
— Alicantinum, II. 676.
— Aloës, 95.
— — Socotrinae, 95.
— aloëtico-alcalinum, 109.
— aloëticum, 95.
— amaro-chalybeatum, 667.
— amarum, 450. 697.
— — alcalisat., 532.
— — aromaticum, 9.
— — et diureticum, II. 557.
— — scillit. comp., II. 538.
— — cum Spiritu Vini, 697.
— ammoniat. c. Tinctt. analept., 180.
— anthelminticum, 8.
— antiapoplecticum, II. 31.
— antiictericum, 531. II. 556.
— antimoniale, 239.
— antimoniatum Huxh., 239.
— Antimonii, 239.
— — Huxhami, 239. 240.
— — tartarizati, 239.
— antileucorrhoicum, 501.
— antiperiodicum, 501.
— antirheumaticum, 243
— antiscorbuticum, 501. II. 439.
— aperiens et purgans, II. 557.
— aperitivum et tonicum Barthez, 411.
— Armoraciae, II. 439.
— aromaticum, II. 501.
— — alcalisatum, 532.
— — camphoratum, 376.
— — opiaceum, II. 248.
— aromo-chalybeatum, 668.
— — -opiaceum, II. 248.
— Aurantior. comp., 531.
— — Corticum, 530.
— Aurantiorum Corticum alcalisatum, 532.
— Bordegalense, II. 676.
— Burgundicum, II. 676.
— Calami, 350.
— calidum, 391.
— camphoratum, 376.
— Catechu, 446.
— Cephaelis Ipecac. — Vin. Ipecac.
— chalybeatum, 667. 668.
— — comp., 668.
— Chinae, 499.
— — amarum, 500.
— — aromaticum, 500.
— — compos., 500.
— — martiatum, 500.
— chinatum, 499.
— c. Chinino sulph., 509.
— Cinchonae, 499.
— Cinnamomi, 524.
— Cinnamomi, 391.
— Cochleariae comp., II. 439.
— Colchici, 551.
— Colocynthidis, 557.
— cordiale, 391. 393.
— Corticis Peruviani, 499.
— crocato-opiatum, II. 248.
— crocatum, 573.
— Cupressi compositum, 581.
— Cydoniorum, 86.
— Dictamni martiatum, 668.
— Digitalis, 615.
— diureticum, II. 43. 247. 440. 628.
— — amarum, II. 538.
— — Anglicum, II. 411.
— — Sydenhami, II. 410.
— emetico-purgans Leroy, 248.
— emeticum, 239. II. 16.
— — turbidum, 240.
— Enulae, II. 5.
— enulatum, II. 5.
— excitans, 400. II. 421. 658.
— de Extractis, 531.
— febrifugum, 500.
— ferratum, 667.
— Ferri, 667.
— ferruginosum, 668.
— Gallicum album, II. 676.
— — rubrum, II. 676.
— Genistae Sydenhami, II. 410.
— Gentianae, 697.
— — compositum, 697.
— Graveti, II. 427.
— Gratiolae, 767.
— Guaci helleborat., 740.
— Hellebori albi, 740.
— — viridis, 740.
— hippocraticum, 391.
— Hispanicum, II. 676.
— Hungaricum, II. 676.
— hydragogum, II. 410.
— Hydromellis, 86.
— Inulae, II. 5.
— Ipecacuanhae, II. 16.
— — compositum, II. 16.
— Juniperi alcalisat., II. 400.
— Juniperinum, II. 43.
— Ixiviale, II. 410.
— Lusitanicum arte fact., 87.
— Maderanum, II. 676.
— Malacense, II. 676.
— martiale aromaticum, 668.
— martiatum, 667. 668.
— — compositum, 668.
— Martis, 667.
— mellitum, 86.
— Nicotianae II. 237.
— — Tabaci, II. 237.
— ophthalmicum, 99.
— opiaceum, II. 248. 291.
— opiatum per fermentat., II. 254.
— Opii, II. 248. 256.
— — aromaticum, II. 248.
— — compositum, II. 248.
— — croceatum, II. 248.
— — Oxydi Antimonii, 239.
— de Opio compositum, II. 248.
— paregoricum, II. 248.
— Psychotriae, II. 16.
— — emeticae, II. 16.
— purgans, II. 557.
— — et tonicum, II. 556.
— Raphani martiatum, 668.
— Rhabarbari amarum, II. 457.
— Rhei, II. 457.
— — amarum, II. 457.
— — aromaticum, II. 457.
— — compositum, II. 457.
— — palmati aromat., II. 457.
— Rhenanum, II. 676.
— — arte factum, 87.
— roborans, 9. 500.
— rubrum, II. 676.
— Salviae, II. 501.
— Scillae, II. 537.
— — alcalinum, II. 538.
— — maritimae, II. 537.
— scillitieum, II. 537.
— Scillites, II. 537.
— Sennae, II. 560.
— Sinapios, II. 572.
— stibiatum, 239. 240.
— — c. Extr. nasturt., 69. 242.
— stomachicum, 419. 502. 697.
— Stramonii, 606.
— stypticum, 581.
— Sulphatis Chinini, 509.
— sulphuratum, 137.
— Tabaci, II. 237.
— ex Tartrate Antimonii, 239.
— Tartratis s. Tartritis Antimonii, 239.
— — Potasae et Antimonii, 239.
— — Stibii et Potasae, 239.
— tonico-stimulans, 500.
— tonicum, 697.
— — et antiperiod., 500.
— Trifolii fibrini, II. 658.
— Valerianae, II. 667.
— Veratri, 740.
— — albi, 740.
— — viridis, 740.
— Vincetoxici amarum, 450.
— Viperarum, 283.
— Xeranse, II. 676.
Viola, II. 676.
— canina, II. 676. 677.
— dentaria, 608.
— Jatamarensis, II. 233.
— odorata, II. 676.
— pedata, II. 676.
— tricolor, II. 21.
Violaria, II. 676.
Viperae s. Viperarum Caro et Spinae, 681.
Vipertina, 268. 620.
Virga aurea, II. 679.
Viridé Aeris, 592.
— — crystallisatum, 592.
— — praeparatum, 592.
— cubicum, 648.
— montanum, 584.
Viscago, II. 569.
Visci Lignum, II. 679.
Viscum s. Viscus, II. 679.
— album, II. 679.
— Betulae — V. album.
— Coryli — V. album.
— quercinum, II. 679.
— quernum, II. 679.
— Salicis — V. album.
— Tiliae — V. album.

Viscum Xylobalsamum — Xylobalsamum.
Vismuthum, 399.
Vitellum s. Vitellus Ovi — Ova gallinacea.
Vitex Agnus castus, 79.
Vitis Idaeae, II. 662.
— Pampini, II. 679.
— vinifera, II. 679.
Vitri Herba, II. 499.
Vitrioli Gilla Theophrasti — Gilla.
— Phlegma s. Ros, II. Add.
— Terra dulcis — Terra Vitr. dulcis.
Vitriolum album, II. 690.
— — purum, II. 690.
— Anglicum, 648.
— camphoratum, 587.
— coeruleum, 584.
— — purum, 584.
— Cupri, 584.
— — factitium, 584.
— Cyprinum, 584.
— Cyprium, 584.
— de Cypro, 584.
— ferreum, 648.
— Ferri, 648.
— Goslariense, II. 690.
— Hungaricum, 648.
— Londinense, 648.
— Magnesiae, II. 97.
— Martis, 648.
— — ad albedinem calcinatum, 648.
— — calcinatum, 648.
— — exsiccatum, 649.
— — factitium, 648.
— — purum, 648.
— — siccatum, 648.
— Potassae, II. 385.
— Romanum, 648.
— Sodae, II. 583.
— Veneris, 584.
— viride, 648.
— vulgare, II. 690.
— Zinci, II. 690.
— — factitium, II. 690.
Vitrum Antimonii, 214.
— — ceratum, 214.
— — hyacinthinum, 214.
— — Moscoviticum — Alumen scissile.
— Stibii, 214.
Viverra Civetta, II. 683.
— Zibetha, II. 683.
Volkameria aculeata, 478.
Vulnerarium Helveticum, 266.
Vulpis Caro et Spinae, 681.
Vulvaria, 469.

W.

Wakaka Indorum, II. 671.
Wintera aromatica — Cort. Wint.
Winteranus Cortex — Cort. Wint.
— — spurius — Cort. Wint. spurius.
Wismuthum, 399.
Wrightia antidysenterica, 88. 473. 660.

X.

Xanthium, II. 681.
— strumarium, II. 681.
Xyloaloës, II. 69.
Xylobalsamum, 191.
Xylocassia, 280.
Xyris, II. 18.

Z.

Zanthorrhiza apiifolia, II. 681
Zanthoxylum clavatum, II. 681.
Zarsa, II. 516.
Zarsaparilla, II. 516.
Zea Mays, II. 681.
Zedoaria, II. 682.
— longa, II. 682.
— rotunda, II. 682.
Zerumbet, 431.
Zibebae, II. 680.
Zibetha, II. 683.
Zibethum, II. 683.
Zinci Acetas, II. 694.
— — impurus, II. 684.
— Carbonas, II. 685.
— Flores, II. 684.
— Magisterium, II. 685.
— Oxycarbonas, II. 684.
— Oxydum, II. 684.
— — album, II. 684.
— — impurum, II. 684.
— — per se, II. 684.
— — per praecipitationem, II. 685.
— Protoxydum, II. 684.
— Sulphas, II. 690.
Zincum, II. 683.
— acetatum, II. 694.
— aceticum, II. 694.
— album, II. 684.
— calcinatum, II. 684.
— hydrocyanicum, II. 684.
— oxydatum, II. 684.
— — album, II. 684.
— — subaminare, II. 684.
— — sulphuricum, II. 690.
— — via humida paratum, II. 685.
— praecipitatum, II. 685.
— purum, II. 683.
— Silesiacum, II. 696 b.
— sulphuricum, II. 690.
— — venale, II. 690.
— terrestre, II. 684.
— vitriolatum, II. 690.
Zingiber, II. 695.
— album, II. 695.
— commune, II. 695.
— nigrum, II. 695.
— officinale, II. 695.
— officinarum, II. 695.
— vulgare, II. 695.
Zinziber, II. 695.
— vulgare, II. 695.
Zircohinum, II. 697.
Zixyphus, II. 35.
— sativus, II. 36.
— vulgaris, II. 36.
Zostera marina, 741. II. 328.

Acetas ferricus, II. 696 d.
Acetum Castorei comp., 440.
— de Framboesiis — A. Rub. Id.
— Lilior. Convall., 588.
— Naphae, II. 696 b.
— pestilentiale — Acet. aromat.
— plumbosum, II. 340.
— pyroxylicum — A. pyroligneos.
— stillatit. — Acet. destill.
Acidum azoticum — Acid. nitricum.
— carbonic. aëroideum — A. carbonic.
— chloro-nitrosum, 258.
— hydriodosum, II. 8.
— hydrochlorinicum, 31.
— hydrothion. liq. extemporan., 43.
— muriatico-nitros., 258.
— muriaticum oxygenat. aëroideum, 509.
— Nitri dulcificatum, 71.
— nitricum fumans — A. Nitri fum.
— Ossium — Acid. phosphoric.
— Phosphori p. deliquium, 52.
— — perfectum, 49.
— pyroxylicum — A. pyroligneos.
— Salis dulcificat., 70.
Acidum Vitrioli phlogisticat. s. volatile, 56.
Adeps, s. Unguent. s. Pomatum.
— cetaria, II. 696 c.
— suilla — Axungia Porci.
Aër nitrosus, II. 696 i.
— phlogisticatus — Gas azoticum.
— vitriolicus, II. 696 i.
Aerugo destillata, 594.
Aether Cupri, 590.
— oxygenatus — Liq. anod. succ., II. 609.
Aethiops Cupri, II. 696 b.
— graphitialis, II. 135.
— mercurialis, II. 138.
— mineralis apyrus s. via sicca parat., II. 138.
— — auratus, II. 140. 696 l.
— — via humida parat., II. 138.
Aethusa Meum — Ligusticum M.
Album Bismuthi — Magister. Bism.
Alcali fluor, 144.
— min. aërat. s. mite, II. 577.
— — vitriolic., II. 583.
— vegetabile acetatum, II. 398.
— volatile salitum, 169.
Alcohol Crotonis, II. 696 b.
— Nucis vomicae, II. 696 m.
Alumen album. glaciale, romanum — Alumen.
Amalgama Auri, 298.
Ammonii acetici Liq., s. Liq. Amm.
Ammonium aëratum — A. carbonic.
— carbonic. pyro-oleos. — Ammon. carbon. crud.
— hydrogenato-sulphurat., 172.
— liquid. canst., 144.
— muriat. ferrat., 667.
— nitricum, 169.
Andira inermis, retusa, Surinamensis — Geoffraea inerm. et Surinam.
Antimonium purum, 211.
Apozema de Cochlearia comp., II. 442.
Aqua antimiasmat. compos., II. 695.
— Calcariae c. Cera, 264.
— Cerasorum amygdalata, II. 696 c.
— chlorata — Liquor Chlori.
— hepatica s. hydrosulphurata s. hydrothionica extemporanea, 43.
— de Herbis vulnerariis, II. 696.
— hydrogenato-sulphurata, 42.
— Hyssopi, 551.
— ophthalmica, II. 696 k.
— phagedaenica mitis, II. 143.

Aqua Raphani rust. — Aq. Armoracc.
— sulphurato-stibiata, 239.
— vegeto-minerel., II. 696 a.
— viridis Hartmanni, 595.
— Vitae Germanica — Tinct. purgans.
Aquae iodatae, II. 696 i.
— — c. Kali iod., II. 696 i.
Argentum nitricum oxydatum fusum, cryst., 260. 261.
Argyritis — Lithargyrum.
Arsenicum oxyd. alb. — Ars alb
— sulphuratum u. sulphurat. flav. — Ars. flav.
— — rubrum — Ars rubrum.
Arundo Calamagrostis, II. 696 c.
Aselli — Millepedae.
Athamantha Oreoselin. — Oreosel.
Aureum crepitans s. diaphoreticum s. sclopetans — A. fulminans.
— limatum, 296.
— musivum, II. 598.
— oxydat. ammoniat. — A. fulmin.
— subexydatum, 300.
Axungia cetaria, II. 696 e.
Balnea Chlori, II. 696 g.
— Jodi, II. 696 i.
Balsamum Libani — B. Carpathic.
— Lithuanicum — Ol. betulin., II. 696 r.
— Mechae, 307.
— Myristicae, II. 284.
— Resinar. antirheumat. Liboschitzii, 403.
— Terebinth. Pramii, II. 681.
— vulnerarium Stahlii, II. 618.
Bezoardicum metallic. — Aur. oxydat.
— pestilentiale — Acet quat. latron.
Bicarburetum Sulphuris — Alcohol Sulphuris.
Boras hydrargyrosus, II. 190.
— natricus c. Aqua — Borax.
Borussias ferroso-ferricus, 669.
— — kalicus, 38
— hydrargyricus, II. 189.
Bromum, II. 696 e.
Bromuretum Potass. et Sodii, II. 696 f.
Bucco, II. 696 f.
Cadmia fornacum — Tutia.
Cadmium, II. 696 k.
Calcareum sulphuratum, 354.
Calcaria acetica, 368.
— caustica — C. usta.
— chlorata, 355.
— hydrochlorica, 345.
Calophyllum Tacamahaca — Tacam.
Calotropis Mudarii, II. 696 l.
Calx sulphurata, 354.
— pura — C. usta.
Caphura — Camphora.
Carbonas ammonicus admixto Oleo empyreumatico animali. — Ammon. carbon. crud
— biplumbicus — Cerussa.
— calcicus, 356.
— Ferri praecipitatus, 643.
— magnesicus cum Hydrate magnesico, II. 88.
Cassia cocta — Conserva.
— solutiva — Pulpa Cassiae.
Cataplasma acre Kerndlii, II. 696 d.
— de Farinis et Pulpis — C. emolliens.
— c. Kinakina et Camph. — Catapl. antisept.
Cataplasma de Euphorbio et Hyoscyamo — C. anodyn.
— e Pipere et Aceto — Catapl. antipleuret.
— de Pulpis et Unguento — C. maturans.
— ad suppurationem promov. — C. maturans.
Ceratum Diapompholig, II. 689.
— Kinakina medicat., 489.
Cerevisia abietina comp., 3.
— de Kinakina — C. Chinae.
Chininum sulph., 523.
Chloretum Amm. c. Oxydo hydr.
— Hydrarg. ammon. mur.
— s. Chloruretum Natrii, II. 696 b.
Chloris calcicus — Calcaria chlorinica venal.
Chrysitis — Lithargyrum.
Citras Chinini, II. 696 g.
Clavus secalinus — Secale cornutum.
Clematis Flammula — Cl. erecta.
Collyrium Hydriodat. zinc., II. 696 p.
Coluber Berus — Pelias B.
Conchae sulphuratae, II. 696 g.
Conditum Vermium majalium, II. 113.
Confectio de Croco — C. de Hyacintho.
Conserva Cynorrhodi, II. 467.
— Helenii, II. 2.
Cornu Cervi ustum album — C. C. ust.
Corydalis tuberosa — Aristol. bulbacea.
Cremor Tartari volatilis, II. 413.
Crocus Auri ceraunochrysos — Aurum fulmin.
— Martis obstructivus, 611.
— — Zwelferi, 642.
Cuprum carbonicum oxydat., II. 696 g.
Cyanetum Plumbi, II. 696 m.
Cyanuretum Ferri c. Cyaneto F., 669.
— kalis et Ferri c. Aqua, 38.
Decoct. antiscorb. s. Specier. Pini comp., II. 696 m.
— Kinaekinae — D. Chinae.
— de Panis Medulla — D. album.
Diosma crenata u. serratifolia, II. 696 t.
Electuarium anth. Mathieui, II. 691.
— de Croco — Confect. de Hyacintho.
— dentifric., II. 696 d
— de Kinakina — E. Chinae.
— opiat adstringens, II. 289.
Elixir tonic. ad dentes, II. 696 n.
Elixirium dictum de Garus — Garus.
— s. Elixir ad scrophulas — Tinct. Gent. alcalina.
Emplastrum ad nodos mammarum — E. Melil. camph., II. 107.
— Fuliginis, II. 696 i.
— piceum comp., II. 630.
Extractum Aconiti vinos, 61.
— Filicis aethereum, II. 696 c.
— — oleoso-resinos, II. 696 e.
— Kinaekinae — E. Chinae.
— Ligni Quassiae, II. 431.
— Menyanthis — E. Trifol. fibr.
— phlegmagog. Quercetani, 550.
— Pini Turion., II. 696 m.
— Ratanhiae, II. 696 n.
— Rhamni cathartici — Rob.
Extractum Ribesiorum — Rob.
— Semin. Santon. s. Chinae aeth., II. 696 g.
— ex Uvis — Sapa.
Ferrugo — Ferri Rubigo.
Ferrum acetic. oxydat., II. 696 i.
— Borussi. oxydato-oxydulatum, 669.
— hydriod. oxydulat., II. 10.
— limatum — Limatura Ferri.
— muriaticum rubrum, 652.
— — viride, 652
— oxydatum nigrum, 638.
— — rubrum, 641.
— oxydulatum, 638.
— — arsenicicum, 275. et II. 696 i.
— pomat. semiliquid. — Extr. Ferri pomat.
— potabile Willisii, 663.
— sulphuric. viride — F. sulph. oxydulat.
Fumigatio volatilis, II. 696 d.
Gas azoticum oxydatum, 302.
— hydrosulphuricum, 42.
— hydrothionicum, 42.
— nitrogenium — G. azoticum.
— — dephlogisticat. — G. azot. oxydat.
— nitrosum, II. 696 i.
— oxydum nitrosum. 302. II. 696 b.
— sulphuricum, II. 696 i.
— sulphurosum, II. 696 i.
Glandes quercinae tostae, II. 436.
Globuli Tartari ferrati, 664.
Gummi Opopanacis, II. 294.
Guttae febrifugae, II. 696 c.
Hepar Arsenici minerale, II. 696 e.
— Calcis — Hepar Sulphuris calcar.
Hordeum praeparatum Thilenii, 746.
Hyacinthus Muscari Muscari ambros.
Hydrargyrum ammoniato-muriaticum insolub., II. 199.
— — — solubile — Sal Alembroth.
— Boruss. s. hydrocyanicum oxydat. — H. boruss. et hydrocyanic.
— chlorat in maximo — H. muriat. corrosiv.
— — mite praep. — H. mur. mite.
— cyanatum, II. 189.
— glyzyrrhizatum, II. 696 l.
— iodatum, II. 188.
— mellitum, II. 126.
— nitric. oxydatum, II. 194.
— — oxydulat., II. 194.
— oxydat. phosphoric. acid. II. 696 l.
— — subsulphuricum, II. 191.
— oxydulat. aceticum, II. 203.
— — calcareum — H. c. Creta.
— — magnesiatum — H. c. Magnesia.
— — nigrum purum, II. 696 l.
— — saccharatum, II. 126.
— phosphoric. oxydulatum, II. 190.
— stibiato sulphurat. aurantiacum, II. 696 l.
— sulphuratum, II. 162.
— — oxydulatum, II. 138.
— terebinth., II. 696 l.
Hydras aluminicus — Terra Aluminis.
— natricus — Natron caust.
— Oxydi ferrici, 643.
Hydriodas ferrosus, II. 10.
— Kali, II. 8.
— zincicus, II. 696 p.

Hydrochloras ammonicus crudus — Ammon. muriat. crudum. Sott Hydrochlorat. Amm. crud.
Infusum Ayapanae, II. 696 a.
— Rhei Camerarii, II. 662.
— — — cum Alcali. I. 662.
Iodetum Ferri, II. 22.
— Hydrargyri, II. 122.
— Sulphuris, II. 696 b.
Ioduretum Arsenici, Barii et Sulphuris, II. 696 c.
Kadmium, II 696 d.
— sulphuricum oxydatum, II. 696 e.
Kali arsenicosi Liquor, 273.
— Boracicum ferratum, 35.
— causticum s. c. in baculis — K. caust. fus.
— chloratum, II. 397.
— hydrocyanicum, 38.
— — ferratum, 38.
— hydrothionicum c. Stibio hydrothion. — Sapo stibiatus.
— hyperoxymuriaticum, II. 397.
— muriaticum. II. 398.
— — hyperoxygenat., II. 397.
— nitrosum — Nitrum antimoniatum.
— oxalicum acidum, II. 403.
— purum mite, II 377.
— subcarbonic. eCiner. clavell. e Tart. — Kali carbon. e Cin. et e Tart.
— Succo Citri neutralisatum, II. 403.
— sulphuratum stibiat. 235.
— tartaricum ammoniatum, II. 413.
— — ferratum — Ferrum potab. Willis.
— — hydrargyrat. oxydulatum, II. 205.
— — natronatum, II. 412
— — stibiat. oxydatum, 236
Kalium chloratum, II. 398.
Lapis Aetites, 641.
Lignum Sassafras, II. 524.
— Visci, II. 679.
Limatura Auri, 298.
Linimentum causticum, II. 696 f.
— hydrosulphurat. saponac. Jadelot., II. 376.
— saponac. opiat., II. 258. 419.
— saponato-terebinthinatum. II. 631.
— sulphurico-terebinthinatum s. sulphuricum, II. 696 g.
— ex Vitello Ovor., II. 696 h.
Liquor Acetatis triplumbici, II. 390.
— acetatis Ammonii, 173.
— Acidi tart., II. 696 c.
— Ammon. foenic., II. 696 d.
— ex Ammonia Oleo Succini commixto — Aq. Luciae.
— Ammonii acetici dilutus = Spir. Mind.
— — oleosi — Sal vol. oleos.
— — oxalici. II. 696 i.
— — spirituosus, 148.
— anodyn. Fuchsii — Liq. anod succin., II. 599
— — martialis Klaprothii, 660.
— — valerianatus, II. 669
— antarthriticus Pottii, II. 633.
— Citratis Morphinae, II. 696 m.
— Cupri ammoniato-muriatici c. Hydrargyro, II 696 n.
— hepaticus Mustelae fluviat., II. 696 i.
Liquor Hydrarg. ammoniato-muriat., II. 220.
— — oxydati. II. 195.
— — — phosphorici. II. 696.
— Iodinae — Solut. Coindeti II. 20
— Kali hydriodici, II. 9.
— Kali hydriodici iodurati. II. 10.
— Muriatis zincici. II. 696 y.
— Natri murat. II 696 a.
— — sulph., II 696 c.
— [illegible], II. 696 c.
— pyro-oleos. ex ramo vegetab. parat., II 696.
— Salis comm., II. 696 s.
— Stibii chlorati s. Stib. muriat. oxydul. 235.
— stypticus Loofii, 651.
— tartarisatus Morphinae, II. 696 n.
— Zinci muriatici. II. 696 a.
Linimentum Saponat.-acetum s. kalinum. II. 370.
Lotio Hydrargyri nigra. II. 123.
Magnesia arsenica is. 270
— carbonica gravior s. ponderosior et levior — Magn. carbon.
— Muriae, II. 23.
Magnesium aceticum, II. 696 i.
— hyperoxydatum, II. 98.
— muriatic oxydulat., II 696.
— oxydat. cinereo-nigrum, II. 98.
— sulphuricum oxydulat., I. 696.
Malaguetta — Maniguetta.
Marcasita alba Hispanica — Magist. Bism.
Massa caustica — Pulv. arsenical. Rousselotii.
— de Dactylis etc. — Pasta.
— mercurialis — Ung. Hydr. citrin.
— Pilular. Schmidtii contra taeniam. II. 696.
Mercurius cinereus Moscati, II. 142.
— griseus — M. praecip. Saunderi.
— nitrosus calide parasus, II. 195.
— — frigore paratus, II. 191.
— phosphoratus Fuchsii, II. 696.
— tartarisatus liquidus, II. 205.
— terebinthinatus, II. 696 t.
— Zinci, II. 696 t.
Mixtura ammonio-citrica, II. 696 u.
— As. foet., II. 696 e.
— Cinchon. offic, II. 696 r.
— kalino-citrica et natro citrica, 29.
— — sulphurica et natro-sulph., 29.
— Myrrh. ferrata, II. 696 i.
— Nitrat. Potass., II. 696 a.
— Rogersi, II. 696 e.
Morphina acetica s. Morphinum acet., II. 215.
— sulphurica. II. 696 t.
Morsuli stibiato-sulphurati, 222.
Mucago, f. Mucilago.
Mucilago Hydrargyri, II. 123.
Mudarii Radix, II. 696 t.
Murias ammonicus, 169.
— — ferratus, 657.
— Ferri cum Aqua, 652.
— Sodae siccat., II. 696 a.
Naphtha chlorica et muriatica
— Spir. muriat. aeth.
— Petrae — N. Petrolei.
Naphtha Zinci — Aether Zinci.
Narcotina — [illegible]
Natr. ammonium Liquor, II. [illegible]
Natron s. Natrium [illegible] II. 696.
— boracic. [illegible]
— Borax.
— causticum — Liq. Natri caust.
— chloratum, II. 696 c.
— hyperoxymuriat. — Natrum chloratum.
— muriat. hyperoxygenatum — N. chloratum.
— phlogistum — [illegible]
— phosphoric. simpl. s. natronatum, II. 592.
— potassio-[illegible], [illegible] 412.
— subcarbon. depuratum. 553
— — siccum, II. 552.
— Succo Citri neutralisatum. II. 696.
— sulphuric. siccum. [illegible]
Nitras ammonicus [illegible]
Oxydo hydrargyrico — [illegible]
oxydati [illegible]
— Ammonii, 169.
— argenticus, 180.
— hydrargyricus, II. 196.
— hydrargyrosus, II. 194.
— quadribismuthicum — Magist. Bism.
Nitrum ammoniacale — N. flammans.
— Argenti, 180.
— non fixum — N. flammans.
— regeneratum — N. flammans
— semivolatile — N. flammans.
Novum antidysentericum — Ipecacuanha.
Nuces Cacao — Cacao.
— Myristicae — N. moschatae.
— purgantes — Bern.
Oleo-ceratum Aqua subactum — Ceratum Galeni.
Oleum Anisi sulphurat. — Bals. Sulph. anis.
— Arnicae Florum II. 696 i.
— Aurantii Florum, 526.
— Chamomill. citrat., II 696.
— infernale — Ol. Ricini Americ.
— Jecinoris Lotae, II 696.
— Nucis — Ol. betulinum.
— Lathyridis — Ol. Cataput. minoris.
— Laurocerasi — Ol. Amygd. amar.
— Moringae — Ol. Been.
— Ocymi — Ol. Basilici.
— pyrocarbonicum, II. 696 w.
— contra taeniam Chaberti, II. 632.
Orellana, II. 227.
Oxydum Aluminii, 131.
— Ferri ferrato-boruss. — Ferr. boruss.
— ferricum — Ferr. oxydat. rubrum.
— Kadmii, II. 696 t.
— Stibii album, 223. 225.
— — c. Chloreto Stibii — Pulv. Algarothi.
— — hydrargyrosum. II. 696 l.
— — praecipitando parat. 215.
— — c. Sulphureto Stibii
— Crocus metallor.

Oxyphosphas Ferri — Ferr. phosphoric.
Pastilli de Catechu odorati etc., s. Tabellae und Trochisci.
Perbromuretum Ferri, II. 696 c.
Phosphas ferricus simplex, acidulus, ferreus, acidulus et simplex — Phosphas Ferri.
— — Hydrarg., II. 696 l.
— — hydrargyrosus, II. 190.
Pilulae Aloës et Cambogiae, 103.
— c. Bromureto Ferri, II. 696 f.
— Cambog. et Scammon., 732.
— **coeruleae** — P. Cupri ammoniac.
— **Hoffmanni** — P. balsamicae
— e Hydrarg. muriat. corros., II. 185.
— **mercuriales Barbarossae**, II. 696 l.
— **Muriat. Hydr. oxydul. et Oxydi Stib. hydrosulph.**, II. 102.
— **Valerianae**, II. 696 n.
Platinum s. **Platina muriat.**, II. 333
Plumbum aceticum oxydatum — Liq. Pl. acet. basici s. Sacch. Sat.
— — — oxydulat. acidum — Sacch. Sat.
— **Borussicum**, II. 696.
— **oxydulat. carbonic.** — Cerussa.
Pomatum s. **Unguentum.**
— **Cyrilli** — Unguent.
— **epispast flav. et mitius** — Ungt. episp. mitius.
— — **viride** — Ungt.
Pothos foetida — Dracontium
Potio antispasmodica, 76.
— **emetica antimoniata**, 240.
— — c. Ipecacuanha, II. 13.
— **ex foetidis** — P. antihyst.
— **ex G. Ammon. et Scilla** — P. incisiva.
— c. Hydrobromate Potassii, II. 696 l.
— **ex Ipecac. comp. s. ad pertussim**, II. 15. P. exp.
— **pectoralis**, II. 696 n.
Potiuncula Huimiana, 30.
Ptisana Callaci, II. 522.
— **ex florib bech.** — Tis. pector., II. 97.
— — — Chamaemeli — ut Ptis. ex flor. bech.
— — — Sambuci et Tiliae, s. Infusum.
— **de foliis Cichorii, Borraginis, Buglossi, Chamaedryos et Inulae** — Infusum et Tisana.
— **de fructibus** — Tis. de fruct. pect.
— **de Radice Graminis** — Decoct. Gramin.
Pulpa Colocynthidis — Colocynthides.
— **de Plant. emoll.** — P. emoll.
— **Ros. canin.** — P. Cynosrhod.
Pulvis aërophorus Vogleri, 28.
— **aloëtic. c. Ferro**, 101.
— — c. Guajaco, 104.
— **antacid. Vogleri**, II. 696 k.
— **antipodagric. Portlandi**, 694
— **antivener.**, II. 696 l.
— **Auri** — Aurum fulmin.
— **Cambogias. G Gutta comp.** s hydragogus, II. 22.
— **Comitissae** — China.
Pulvis dentifric., II. 696 f. g. k.
— — **niger**, 696 g.
— **hypnoicus Krielii**, II. 138.
— **Jacobi febrifugus** — P. Jamesii.
— **Jalapae et Scammon. compos**, II. 22. 23.
— **Jesuitarum s. Patrum** — China
— **magnesio-tartaricus**, 28.
— **natroso-tartaricus**, 28.
— **Sapo vegetab.** — P. gummos. alcalin.
— **de Scammon. et Oxydo Stib. comp.** — P. Cornachin.
— — **Senna, Scamm. et Lignis comp.**, II. 540.
— **ad strumam**, II. 696 g.
— **de Sulphate Potass. comp.** — P. temp. Stahlii.
— — **Sulphure et Scilla compos.**, II. 601.
— — **Sulphureto Hydr. nigro et Scamm. comp.**, II. 137
— — **Tribus** — P. Cornachini.
— **vermifugus absque Merc.**, 732.
Pyrothonid, II. 696 n.
Quadristibias kalicus — Antimon diaphoret.
Resina Ligni Guajaci artificialis — Extr. Guaj. spirit.
Risigallum — Realgar.
Rob Rhamni cathart. — R. Spin. cervin.
Rotulae Calami aromatici, II. 696.
Rubinus Antimonii — Magnesia opalina.
Saccharum aluminatum, II. 696 d.
Sal Ammoniacum Cupri — Cuprum ammoniat.
— **Anglicanus volatilis**, 160.
— **aperitiv. Friedericianum** — S. mirab. Glaub.
— **mirab. delapsum**, II. 583.
— **Plantar. Tachenii modo parat.** — S. Tachenian.
— **Rochellense**, II. 412
— **volat. Vitrioli narcoticum**, 26.
Sapo Antimon. resinos. c. Ammon. Kaempf., II. 696 d.
— **Cacao**, II. 414.
— **ceraceus s. ceratus**, II. 574.
— **Crotonis**, 577.
— **hydrargyratus** — S. mercurialis.
— **medicus s. purissimus**, II. 414.
— **Sulphuris** — Kali sulphurat.
— **superammoniacatus**, II. 696 d.
Semichloretum Hydrargyri — Merc. dulcis.
Semiiodetum Hydrargyri, II. 188.
Semina ex Umbellif. s. carminat. — Pulv. carmin.
Serapinum s. Serapium — Sagapenum.
Sericum epispast. Guilberti, 400.
Sesquisulphuretum Stibii — Antim. crud. praep.
Solutio antipsorica, II. 696 f.
— **arsenicalis kalina**, 273.
— — **natrosa**, II. 690.
— **As. foet**, II. 696 e.
— **atrophica**, II. 696 i.
— **ad balneum salino-gelatin.**, 687.
— **Chlorureti Calcis alcoholis**, II. 696 l.
— **Jodinae**, II. 9.
Solutio Mercur. calide parata — Liq. Bellostii.
— **styptica**, II. 696 c.
Species ad tussim — Sp. bechicae.
Specificum antipodagric. Emerigonis — Tinct. Guajaci c. Taffia.
Spiritus aceticо-ferratus, 660.
— **carminat. de tribus**, II. 696 c.
— **chorico-aethereus**, 70.
— **e faecibus Vini** — Sp. Vini.
— **muriatico-oleosus**, 70.
— **ad paralysin**, II. 696 m.
— **saponatus comp.**, II. 634.
— **Seminum Colchici ammoniatus**, II. 696 h.
— **Succi Sacchari** — Taffia.
— **sulphuratus Beguini**, 172.
— **sulphurico-acidus** — Mixt. sulphurico-acida.
— — **aethereus muriatico ferrat**, 655.
— **Vini alcoholisatissimus** — Alcoh. absolut.
— **volat. aromatico-oleos.**, ?
Stibium calcareo-phosphorat. — Pulv. Jacobi febrifug.
— **hydrothionic. oxydat.** — Sulphur stibiatum rubrum.
— **oxydat. alb. kalisatum** — St. oxydat. album.
Strychnium — Strychninum.
Suboxyphosphas Ferri — Ferr. phosphoric.
Succus Chermes, 430.
— **Liquirit. merc.**, II. 696 l.
— **Uvarum immaturarum** — Omphacium.
Suffumigatio Guytoniana und Smithiana — Fumigatio.
Sulphas Alum. et Potass. purus, 134.
— **Ammonii**, 169.
— **Hydrarg. peroxydati**, II. 191.
— **kadmicus c. Aqua**, II. 696 k.
— **Kadmii**, II. 696 k.
— **manganosus c. Aqua**, II. 696 k.
Sulphur aurat. Antim saponat., 232.
— **iodatum**, II. 696 o.
Sulphuretum Stibii c. Sulphate Calcii — Calcaria sulphurata stibiata.
— — — — Kalii — Kali sulphuratum stibiat.
Syrupus de Adianto Canad. — S. Capill. Ven.
— **Cichorii c. Rheo**, II. 453.
— **Citrat. acid. Chinini**, II. 696 g.
— **hydrocyanicus** — S. cyanicus.
— **de Kinakina etc.** — Syr. Chinae etc.
— — **de Omphacio** — S. Uvar.
Tabellae de Acido Tart., 159.
— **de Concrement. s. Lapid. Cancror.**, 160.
— — **Ipecacuanha**, II. 13.
— — **Kinakina** — T. Chinae.
Tartarus hydrargyratus, II. 205.
— **vitriolat. acidus** — Kali sulph. acidum.
Tartras Hydrargyri, II. 205.
— **hydrargyrosus**, II. 205.
Terra aluminaris, 131.
— **muriatica** — Magnesia carbonica.
Tinctura Acetatis ferrosi, 660.
— **Ammoniaci**, 720.
— **Antimonii Thedenii** — Liq. Kali acet. spirit.